



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

XXIX

A

13


NAPOLI

496.

27

2

F



S Y N O P S I S
P L A N T A R U M,
S E U
ENCHIRIDIUM BOTANICUM.



SYNOPSIS 16
PLANTARUM,
SEU
ENCHIRIDIUM BOTANICUM,

COMPLECTENS
ENUMERATIONEM SYSTEMATICAM SPECIERUM
HUCUSQUE COGNITARUM.

CURANTE
DR. C. H. PERSOON,
DIVERSARUM SOCIETATUM MEMBRO.


In parvo copia. . .

PARS PRIMA.



PARISIIS LUTETIORUM,
Apud CAROL. FRID. CRAMERUM.
ET TUBINGÆ,
Apud J. G. COTTAM.

1805.





PRAEFATIO.

QUM duo abhinc et quod excurrit annos, suasu cl. *Crameri*, amici conjunctissimi itidemque Botanices aman-
tissimi, hocce quaecumque opusculum exarandum susci-
perem, rei herbariae studiosis non melius posse consuli
arbitrati sumus, quam si quæ hucusque in variis aut
nimis voluminosis operibus descriptæ extant plantæ, in
excepsidior colligerentur, quod excursionibus et visitandis
hortis botanicis inservire possit; et luculentissima plan-
tarum messis, Botanicorum solertia in dies crescens,
angusto quasi horreo' comprehenderetur. Quam ob rem
non solum eligenda erat typographo minutissima, eoque
elegantissima, libelli et characterum typographicorum
forma, verum etiam auctori elaborandum, ut, omissis
supervacaneis synonymis, amplisque vegetabilium descrip-
tionibus, quibus in ingentem molem evadere solent spissa
illa volumina, essentielles solum, quos vocant, exhibe-
rentur characteres tum generici, tum specifici, atque pauca
tantummodo laudarentur opera, in quibus icones inve-
niantur, aut majores præsto sint plantarum adumbrationes.

*

Quum vero haud raro sôlis ex phrasibus, ob earum brevitatem, non rite dignosci queant plantæ; non ex re fore putavi, si characteribus specificis aliquando subjicerentur observationes breviusculæ; aut, qui novissimis præsertim temporibus innotuere, stirpium virtutes tam medicæ quam physicæ, nec non usus œconomicus commemoraretur. Quod vero nec ubique, nec amplis verbis factum; quippe vetabat instituti nostri ratio.

Quantum vero fieri potuit, et per temporis huic operi perficiendo præscripti angustias licuit; definitum mihi fuit et propositum, in eo imprimis studere, ut, si non omnes, pleræque tamen cognitæ species, brevissimo coercerentur spatio. Quocirca non pauca consultanda erant opera, ex quibus summi LINNÆI *Species Plantarum*, ex curatione celeberr. WILDENOWII (cui plures observationes inde depromptas me debere, grata agnosco mente,) eo lubentius secutus sum, illudque opus, utpote locuples præ ceteris, allegavi, quo majorem ibi quisque synonymorum et descriptionum copiam pervolvere potest. Sed recentiora etiam bene multa scripta, quæ, si, vel novarum specierum, vel observationum quas continent

gazam, aut iconum elegantiam et fidem spectes, ditissima sunt, in usum meum conyerti.

Quanto stirpium, tum plane novarum, tum ex laudatis operibus haustarum numero, Synopsis nostram augere et ornare contigerit, quisque facile intelliget, qui ejus comparisonem ad alia vel maximi voluminis opera instituere velit. Monendum tamen est, nonnulla recentiora Botanicorum scripta, quæ sub libelli confectionem in lucem prodire, nimis sero, quod doleo, aut nondum in manus mihi pervenisse: quæcunque igitur vel novæ ibi extant species, aut quæ ex industria, nonnunquam hic sunt omissæ, accuratius adhuc requirentes examen, eas *Mantissa* exhibebit, ad finem operis proditura.

In ingenti e contrario vegetabilium numero, quo scientia botanica nunc superbit, nullus judex æquus gravi mihi, opinor, vertet vitio, si forsitan aliquæ species sub diverso aut eodem genere bis enumerentur, quarum nonnullæ inter *Emendanda* jam sunt adnotatæ. Etenim non unius hominis est, omnes examinare aut ex autopsia cognoscere plantas; sed plurimas fide auctorum adoptare necesse est, quarum descriptiones aut diffie-

rentiæ aliquando nimis breves sunt, aut, forte pro speciminum conditione ad quæ sunt compositæ, inter se differunt. A Botanicorum humanitate hinc in scientiæ emolumentum petimus, ut tales nobis indicent operis defectus et hallucinationes, communicatis simul, si fieri possit, plantis, ut novis ab iis descriptis.

A systemate sexuali, omnium artificialem ceteroquin optimo, in eo recedere coactus fui, ut classem *Polyadelphiam* et *Polygamiam*, cum Botanicorum ut credo consensu, supprimerem, quo plura genera vinculo naturali inter se connexa invicem magis approximarentur: ex. gr. ut unum exemplar omnium adducam; genera *Metrodiseros* e classe Polyandria, et *Melaleuca* ad *Polyadelphiam* relata, quæ tantummodo inter se filamentis simplicibus aut ramosis differunt. Classis *Polygamia* partium abortu nec ratione solida innixa, plura talia offert specimina.

Characteres genericos et específicos, ubi hoc necessarium videbatur, ex meis aliorumque observationibus emendavi et auxi. Nomina, sic dicta trivialia, rarissime mutavi, nisi hoc aut error postularet, ubi nempe planta

quædam a patria plane diversa est denominata, (ex. gr. *Cruzita hispanica* L., quæ in America crescit; *Bergia capensis*, planta indica; *Rumex Britannicus* (nomen videtur pharmacopæum) in Anglia nondum detectus, sed Americæ indigena; *Erica caffra*, ex Europa australi,) aut si nomen nimis sesquipedale et minus sonorum videretur. E contrario in parenthesi nomen quasi secundarium passim addidi, quo idea plantæ forte distinctior concipi possit.

Ex stirpibus jam cognitis necessarium aliquando esse ratus sum peculiaria constituere genera, præsertim si natura fructuum aliarumque florum partium hoc requireret. Melius autem judicavi, eas species (nonnullis forte tamen excipiendis) ab aliis leviter in caractere generico aberrantes, imprimis si genus minus amplum sit, sub divisione peculiari aut subgenere, quo etiam nonnulla Botanicorum recentiorum genera relata sunt, comprehendere, ne ultra necessitatem genera multiplicentur; ad quod ceteroquin ætas nostra nimis proclivis videtur. Quo etiam spectat nimia facilitas aut abusus, quod plantæ sæpe induantur nomine hominum obscu-

rorum, aut aliis in artibus vel litteris, in re vero botanica non aut vix versatorum; unde nuncupationis ratio nec amplius incitamentum, nec merces laboris æstumari poterit.

Ad finem cujusve classis species illae anormalae enumeratae sunt, quæ si solummodo partium frutificantium numeri rationem habeas, ibi quærendæ sunt. Hæ a LINNÆO aliisque auctoribus, in clavi ita dicta generum, etiam inveniuntur adnotatæ.

Varietates præcipuæ et subspecies non omissæ sunt. Speciebus obscuris, aut quoad sedem dubiis, vel accuratiori indagacioni subjiciendis; signa crucis seu asteriscum apposui.

Virorum meritissimorum conatus ac studium semper in eo collocatum fuit, ut methodus inveniatur, qua plantarum genera serie naturali in diversas disponantur tribus; quas facilius ob eorum multitudinem mente cõplecti et illorum diversitatem observare possimus. In systemate contra mere artificiali, a particulari plantarum parte, nec toto habitu simul considerato, composito, non raro genera immo et species in variis classibus, nec non ordi-

nibus, relationi, quæ inter ea obtinet, plane contrario, existunt dispersa.

Attamen negari non potest, in ipso systemate Linnæano, characteribus pluribus minusque variabilibus innitente, non solum plura genera, habitu naturali convenientia, juxta se invicem collocata, sed et integras classes, pauca genera intermixta si excipias, naturales esse, ex gr. *Didynamia*, *Tetradynamia*, *Monadelphica*, *Diadelphica*, *Syngenesia*, *Gynandria* prior ordo et *Cryptogamia*. Ubi nunc in prioribus classibus talium generum cohors occurrit, nomen familiæ s. ordinis naturalis plantarum cum suis characteribus succinctis in eorum gratiam anteposui, quibus methodus naturalis minus familiaris est. Hoc vero in *Hexandria* haud necessarium autumavi, cum plurima genera satis inter se congruant, et de eorum distributione aut potius limitibus auctores methodi naturalis adhuc dissentiant.

Ad hunc finem ill. A. L. DE JUSSIEU *Genera Plantarum*, opus vicissitudines in scientia sæpe obvias non facile subiturum, ut optimum secutus sum. Meum etiam est, celeberrimo ac humanissimo hujus libri auctori de

ejus in me beneficentia gratias reddere sincerrimas, quod herbarium suum, ut inter omnes constat, ditissimum, non raro perscrutari mihi permiserit.

Grata quoque mente laudanda est eorum virorum in me benevolentia, qui mecum aut observationes communicarunt aut novas plantas describendas concesserunt, vel rarioribus collectionem meam augere voluerunt; hi nomina sua singulis symbolis, mihi ab illis concessis, adscripta inventuri sunt.

C. H. PERSOON.

Dabam Parisiis, die 12 Martii, 1805.

SYNOPSIS SPECIERUM PLANTARUM.

CLASSIS PRIMA.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Scitamineæ (Gen. 1-16.) forte melius ad Gynadriam referenda, caule sunt herbaceo, petiolis vaginantibus tecto, foliis nervosis: junioribus convolutis, floribus spathaceis, filam. ad styli basin inserto. Stam. duo in Globba.

1. **CANNA.** Cor. 6-partita, erecta. Nect. bipartitum, revolutum. Styl. lanceolatus, corollae adnatus. Cal. 3-phyl. Caps. muricata.

1. *paniculata*, fol. ovatis, subtus lanatis argenteis; petalis interioribus brevioribus. Ruiz et Pavon. Flora Peruv. et Chilensis. vol. 1. p. 1. t. 1. f. 1. Hab. in Peruvia. Caps. obovata, cchinata. ¶

2. *Iridiflora*, fol. ovatis acuminatis, laciniiis tribus corollae interioribus majoribus. Flor. peruv. l. c. Hab. in Peruvia. Cor. laciniae 3 exteriores purpurasc. Caps. oblonga, maxima. Fol. subtus lanata. ¶

3. *indica*, foliis ovatis utrinque acuminatis costatis. C. fol. ovatis utrinque acuminatis nervosis. Willd. spec. plant. Lin. 1. p. 3. Knorr. del. hort. a t. C. 2. Rumph. amb. 5 p. 177. t. 71. t. 2. laciniiis corol. subaequalibus. Fl. Peruv. ¶

*. *Intea*, petalis interioribus erectis luteis, nectaris lacinia revoluta lineolis rubicundis irrorata, foliis ovato-ellipticis. Ait. hort. Kew. 1. p. 1. Hab. inter tropicos Asiae, Africae, Americae. ¶

4. *coccinea*, fol. ovatis nervosis, bracteis ovatis pulverulentis. Mill. dict. Ait. l. c. Omnino species distincta videtur, cum humilior sit et jam primo vere floreat. Fol. breviora et latiora. ¶

5. *angustifolia*, foliis lanceolatis petiolatis costatis. Willd. loc. cit. Pis. bras. 213. Hab. inter tropicos Americae, in umbrosis spongiosis. C. indica humilior et angustior. ¶

6. *glauca*, fol. lanceolatis glaucis subtus enerviis. Willd. Dill. elth. 69. t. 59. f. 69. Hab. in Carolinae aquosis. ¶

7. *junecea*, foliis linearibus nervosis. Retz. obs. fasc. 1. p. 9. n. 1. Hab. in China. Corolla parva obscure rufa. ¶

2. **HELLENIA.** Cor. limbus duplex, exterior subtrifidus. Nectar. diphyllum vel bifidum. Capsula trilocularis, coriacea, inflata, subglobosa. Calyx spathiformis, campanulatus bifidus.

1. *Allughas*, nectaris diphyllis, capsulis subspongiosis, foliis integerrimis. Willd. spec. pl. 1. p. 4. Hieritiera Allughas Retz. obs. fasc. 6. p. 17. tab. 1. Rheed. mal. 11. p. 29. t. 14. Hab. in Zeylona. Inflorescentia totius generis pauculata. ¶

2. *alba*, nectaris diphyllis, capsulis striatis, foliis integerrimis. W. Hieritiera alba. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. fasc. 3. p. 64. Hab. in China. ¶

3. *chinensis*, nectariis diphyllis, foliis ciliatis. W. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. Colitur in hortis Sincensium. \mathcal{T}

4. *aquatica*, nectariis monophyllis bifidis, foliis margine denticulatis. W. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. Habitat in Indiae uliginosis inter frutices. \mathcal{T}

3. **RENEALMIA.** *Cor.* trifida. *Nectar.* oblongum. *Cal.* monophyllus in 2 s. 3 dentes irregulares rumpens. *Anth.* sessilis, nectario opposita. *Bacca* carnosa.

1. *exaltata*. Willd. Sp. pl. 1. p. 6. Hab. in Surinamo. Arbor 20-pedalis. \mathcal{T}

4. **AMOMUM.** *Cal.* 3-fidus, inaequalis, cylindricus. *Cor.* 3-partita, inaequalis, patens. *Nect.* 2-labiatum, erectiusculum.

1. *sacemosum*, scapo spathis oblongis tecto, racemo composito Fl. peruv. 1. p. 2. t. 1. f. b. Copiose in Peruviae sylvia. Cannum refert. Caps. nigra leviter striata. Sem. acris oleosa. \mathcal{T}

2. *thyrsoidesum*, scapo spathis oblongo-ovatis vestito, spica conico-thyrsoides. Fl. peruv. l. c. t. 2. Cum perone crecit. Capsula magna ventricosa. Rad. tuberosa fasciculata. \mathcal{T}

3. *Zingiber*, scapo mediocri, spica ovata, foliis linearis-lanceolatis. Swartz obs. p. 2. Rumph. amb. 5. p. 156. t. 66 f. 1. Willd. S. P. 1. p. 6. \mathcal{T}

4. *Zerumbet*, scapo nudo, spica oblonga obtusa, squamis subrotundis, foliis ovato-lanceolatis. Hort. cliff. 3. Ehret. pict. t. 14. f. 1. Mill. dict. n. 2. ic. 17. t. 25. Blackw. Herb. t. 402. Hab. in India. \mathcal{T}

5. *Zedoaria*, scapo nudo, spica laxa truncata. Berg. mat. med. p. 4. Amomum latifolium. Lamarck encyclop. 1. p. 133. Petit. Gazoph. t. 23. f. 1. Rheed. mal. 11. p. 13. t. 7. Hab. in India. \mathcal{T}

6. *sylvestre*, scapo nudo, spica elongata, bracteis oblongis ventricosis, foliis lato-lanceolatis. Swartz prod. 11. Sloan. jam. 6. hist. 1. p. 165. t. 105. f. 2. Hab. in sylvia Jamaeae. \mathcal{T}

7. *Mioga*, scapo brevissimo, capsula ovata, foliis ensiformibus acutis. Thunb. Jap. 14. Kacupf. am. exot. 5. p. 826. Hab. juxta Nagasaki in Japonia. Proxime ad Amomum Cardamomum. \mathcal{T}

8. *angustifolium*, scapo nudo brevissimo, spica capitata, fol. linearis-lanceolatis. W. L. c. p. 8. Soumerrat it. tab. 137. Lamarck encyclop. 1. p. 132. Habitat in paludibus Insulae Madagascariae. Caulis 8-vel 10-pedalis. \mathcal{T}

9. *Cardamomum*, spica radicali sessili obovata, foliis obovato-ellipticis cuspidatis. A. scapo simplicissimo brevissimo, bracteis alternis laxis. L. Blackw. tab. 584. et 585. Rumph. amb. 5. p. 152. t. 65. f. 1. \mathcal{T}

10. *villosum*, scapo vaginato brevissimo, spica subrotunda, bracteis lanceolatis flore longioribus. Willd. l. c. A. villosum, scapo brevi reclinato; bracteis linearibus, fructu villosa. Loureiro coch. A. p. 4. Rumph. amb. 6. p. 137. t. 61. f. 2. Hab. in montosis udus Indiae. \mathcal{T}

11. *repens*, scapo ramoso decumbente, foliis lanceolatis. Soumerrat it. ed. grun. 2. p. 188. t. 136. Rheed. mal. 11. p. 9. t. 4-5. Hab. in montibus Gate Malabaricae. \mathcal{T}

12. *Granum Paradisi*, scapo ramoso laxo, foliis ovatis. Blackw. t. 385. Rheed. mal. 11. t. 6. Hab. in Madagascar, Guinea, Zeylona. \mathcal{T}

5. **HORNSTEDTIA.** *Cal.* bifidus. *Cor.* tubus longus filiformis, limbus duplex: exterior 3-partitus. *Nect.* tubulosum. *Capsula* trilobularis oblonga.

1. *Scyphus*, foliis subius tomentosis. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. Willd. S. P. p. 9. Hab. in nemorosis prope Malaccam. \mathcal{T}

2. *Leonurus*, foliis glabris ciliatis. Retz l. c. Hab. in sylvia Malaccae. \mathcal{T}

6. **HEDYCHIMUM.** *Cal.* 1-phyllus duplex, 5-partitus. *Styl.* longissimus. *Nect.* 2-phyllum.

1. *coronarum*. Willd. l. c. p. 10. Retz. fasc. 3. p. 73. n. 20. Rumph. amb. 5. p. 175. t. 69. f. 3. Lam. ill. gener. p. 7. n. 16. t. 1. f. 3. In India, Java. \mathcal{T}

7. **COSTUS.** *Cal.* 3-fidus gibbus. *Cor.* 3-partita, ringens. *Nectar.* 2-labiatum: labio inferiore maximo 3-loba. *Bacca*?

1. *arabicus*, foliis utrinque glabris, spica pauciflora, squamis apice foliaceis, summis festigatis. Willd. l. c. Blackw. t. 164. Merian. surin. 36. t. 36. In America calidiore. \mathcal{T}

2. *spicatus*, foliis utrinque glabris, spica multiflora subovata arcte imbricata: squa-

mis ovatis simplicibus. Swartz prod. 11. *Alpinia (spicata)* floribus spicatis. Murr. S. V. p. 51. Jacq. amer. p. 1. tab. 1. Moris. hist. 3. p. 251. s. 8. t. 14. f. 8. Hab. ad ripas inque montosis insularum Caribaeorum et in Brasiliâ. \mathcal{T}

3. *speciosus*, foliis subtus scricco-villosis. Smith. Act. Soc. Linn. Lond. 1. p. 249. Costus arabicus. Jacq. Icon. rar. vol. 1. tab. 1. *Amomum hirsutum*. Lamarck encyclop. 1. p. 134. tab. 3. Hab. in India orientali. \mathcal{T}

4. *echinatus*, spica radicali, capsulis echinatis globosis. *Amomum echinatum*. Willd. spec. pl. L. 1. p. 3. Globba uviformis Rumph. 6. p. 134. t. 61. f. 1. In Indiae sylvia. Planta obscura, forte distincti generis, cujus capsulam Rumphius l. c. ut haecam describit, quare eam hoc ad genus retuli. \mathcal{T}

5. *scaber*, thyrsu conico, bracteis ovatis adpressis, corol. semiclausis. Fl. peruv. 1. p. 2. t. 3. In sylvia Peruviana. Fol. subtus pubescentia, vaginae post eorum delapsam scabrae. Cor. alba. \mathcal{T}

6. *laevis*, thyrsu conico bracteis lanceolatis apice incurvis, cor. patentibus. Fl. peruv. p. 3. Cor. luteo-carnea. \mathcal{T}

7. *argenteus*, thyrsu oblongo, bracteis reflexis, cor. patentibus. Fl. peruv. p. 3. t. 4. Hab. cum priore in Peruviae nemoribus umbrosis humidis. Fol. pendula subtus argenteo-pubescentia. Cor. lutescens. \mathcal{T}

8. *Zerumbet*, spica (racemo simplici) recurva laxa. Zerumbet speciosum Wendlert. sert. hannov. fasc. 4. p. 3. t. 19. Flor. albido-rosae. Carina (Nect. lin.) maxima, margine undulata flava. In China. \mathcal{T}

8. *ALPINIA*. Cal. 3-dentatus aequalis tubulosus. Cor. 3-partitae qualis. Nect. 2-labiatum: labio inferiore patente.

1. *racemosa*, racemo terminali spicato, floribus alternis, nectarii labio trifido: foliis oblongis acuminatis Swartz obs. p. 5. Plum. ic. 10. t. 20. Sloan. jam. 61. hist. 1. p. 165. t. 105. f. 1. In sylvia depressis submontanis Americae californiae. \mathcal{T}

2. *Galanga*, racemo terminali laxo, floribus alternis, nectarii labio emarginato, foliis lanceolatis. Willd. Sp. p. 19. Rumph. amb. 5. p. 141. t. 63. In India orientali. \mathcal{T}

3. *comosa*, spica terminali comosa, bracteis flore longioribus coloratis, foliis oblongo-ovatis pubescentibus. W. Jacq.

Icon. rar. vol. 3. Ad Caracas in America. \mathcal{T}

4. *occidentalis*, racemo radicali composito erecto, nectario apice emarginato, capsulis trilocularibus, foliis lanceolato-ovatis glaberrimis. Swartz prod. 11. Hab. in sylvia Jamaicae et Domingu. \mathcal{T}

9. *MYROSMA*. Cor. 5-partita irregularis. Cal. duplex: exterior 3-phyllus, interior 2-partit. Caps. 3-gona 3-locul. polysperma.

1. *cannaeformis*. L. Willd. 1. p. 13. Hab. in Surinamo. \mathcal{T} (Phryso affinis.)

10. *MARANTA*. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-fida. Nect. 3-partitum, lacinia tertia superiori latere antherifero. Caps. 1-locul. 1-sperma.

1. *arundinacea*, culmo ramoso herbaceo, foliis ovato-lanceolatis subtus pilosiusculis. W. Sloan. jam. 22. h. 1. p. 253. 149. f. 2. Hab. in America caliore. \mathcal{T}

2. *Touchat*, culmo ramoso fruticoso, foliis ovatis glabris. W. Rumph. amb. 4. p. 2. t. 7. Hab. in sylvia Indiae, Cochinchinae. \mathcal{T}

3. *malaccensis*, culmo simplici, foliis oblongis petiolatis subtus sericeo pubescentibus. W. Rumph. amb. 5 p. 177. t. 71. f. 1. Hab. in Malacca. \mathcal{T}

4. *capitata*, caule simplici apice florifero, capitulo globoso depresso. Flor. peruv. 1. p. 3. t. 8. In Peruviae umbris humidis. Caps. 3-valv. 3-lombaris. Cor. lac. interne nectarium proprie repraesentant. l. c. \mathcal{T}

5. *lateralis*, caule simplici ad medium florifero, capitulo globoso. Flor. peruv. 1. p. 4. Cum priore. An satis distincta?

6. *comosa*, acaulis, scapo nudo spicato comoso, comae foliolis reflexis. W. Hab. in Surinamo. \mathcal{T}

11. *GLONBA*. Cal. superus, 3-fidus. Cor. aequalis, 3-fida, Caps. 3-locularis. Sem. plurima. Scam. 2.

1. *Marantina*, spica terminali erecta Mont. p. 170. Willd. Spec. Pl. L. 1. p. 153. In India orientali. Spica terminali, fl. remotis. \mathcal{T}

2. *nutans*, spica terminali pendula, fol. elliptico-lanceolatis Willd. l. c. Rumph. amb. 6. p. 140. t. 62-63. Cum priore.

3. *Japonica*, spica terminali cernua, fol. ensiformibus, Thunb. Flor. Jap. p. 23. In Japonia. \mathcal{T}

4. *uniformis*, spica laterali. Mart. p. 177. Rumph. amb. 6. p. 138. t. 69. f. 2 In India. \mathcal{T}

12. **CURCUMA.** *Cal. bifidus. Cor. 4-partita. Nect. 3-lobum. Anth. basi bicalcarata.*

1. *rotunda*, foliis lanceolatis ovatis; nervis lateralibus rarissimis. Willd. S. P. p. 14. Rheed. mal. 11. p. 19. t. 10. Hab. in India. \mathcal{T}

2. *longa*, foliis lanceolatis; nervis lateralibus numerosissimis. L. Mat. med. p. 35. Blackw. t. 366. Swartz. obs. p. 8. Amomum (*Curcuma*) scapo spathis laxis ex centro foliorum. Murr. S. V. p. 50. Jacq. hist. v. 3. t. 4. Rheed. mal. 2. p. 21. t. 10. In India. \mathcal{T}

13. **KAEMPFERIA.** *Cal. obsoletus. Cor. 6-partita: laciniis tribus majoribus patulis, unica bipartita. Stigma bilamellatum.*

1. *Galanga*, foliis ovatis sessilibus. Hort. cliff. 2. t. 3. Rumph. amb. 5. p. 173. t. 69. f. 2. Kaempf. amoen. got. 1. 502. Lam. ill. p. 7. Hab. in India. \mathcal{T}

2. *rotunda*, foliis lanceolatis petiolatis. Blackw. t. 599. Rheed. mal. 11. p. 17. t. 9. Hab. in India. \mathcal{T}

14. **THALIA.** *Cor. 5-petala: duo interiora minora. Nectar. lanceolatum concavum. Drupa nucce uniloculari. Cal. triphyllus.*

1. *geniculata*, corollis pentapetalis; nectario lanceolato. Plum. gen. 26. ic. 108. f. 1. Maregr. Bras. 53. Hab. in America meridionali. Canlis humanam staturam superans, levissimus, simplicissimus. Rachis geniculato-flexuosus. \mathcal{T}

2. *caynaeformis*, corollis hexapetalis; nectario liliato erecto. Boiss. prod. n. 3. Hab. in Mallicollo inter novas Hebrides.

15. **PHRYNUM.** *Cal. 3-phyllus. Petala 3, aequalia, tubo nectarii adnata. Nectarium 1-phyllum, tubo filiformi, limbo 4-partito. Caps. 3-locul. Nuc s 3.*

1. *capitatum.* Willd. sp. 1. p. 17. Pontederia (ovata) foliis ovatis, foribus capitatis. Spec. pl. 412. Rheed. mal. 11.

p. 67. t. 34. Hab. in Malabaricae, Cochinchinae, Chinae locis umbrosis humidis. \mathcal{T}

16. **PHYLIDRUM.** *Spatha 1-flora. Cal. o. Cor. 4-petala irregularis. Capsula 3-locul. polysperma.*

1. *lanuginosum.* Gaertn. sem. 1. p. 62. tab. 16. fig. 10. Lam. ill. gener. n. 32. t. 4. Hab. in locis humidis Cochinchinae et Chinae. Folia subulata crassa lanuginosa.

17. **CUCULLARIA.** *Cal. 4-partitus. Cor. 4-petala inaequalis calcarata. Filamentum petaliforme. Anthera loculis discretis.*

1. *excelsa.* Willd. sp. 1. p. 17. Vochisia. Lam. ill. p. 35. Aubl. gujan 1. p. 18. ab. 6. In sylvis Gujanae. Arbor. \mathcal{T}

18. **QUALEA.** *Cal. 4-partitus. Cor. dipetala. Bacca?*

1. *rosea*, petalo inferiore obtuso, foliis acuminatis. W. Aubl. guj. t. p. 5. tab. 1.

2. *caerulea*, petalis emarginatis, foliis acutis. W. Aubl. guj. 1. p. 7. tab. 2. Hab. uti prior, in sylvis Gujanae. \mathcal{T}

19. **LOPEZIA.** *Cal. 4-phyll. Cor. 5-petala inaequalis. Capsula 4-locul. 4-valvis polysperma.*

1. *racemosa*; caule herbaceo ramoso, foliis alternis ovato-lanceolatis serratis, floribus racemosis. Cavan. icon. 1. n. 16. t. 18. L. mexicana. Jacq. ic. v. 2. Willd. p. 2. Habitus Cereae. \odot

2. *hirsuta*, tenerior hirsuta. Jacq. coll. austr. suppl. p. 5. t. 15. f. 4. Crescit cum priore, qua multo minor et fragilior, prope Mexico. An mera varietas?

20. **USTERIA.** *Cal. 4-dentatus: lacinia unica reliquis multo majore. Cor. infundibuliformis 4-dentata. Caps. 1-locul. 2-sperma. Semina aristata.*

1. *guineensis.* Willd. in Aet. Socict. Berol. 10. p. 52. tab. 2. Monodynamis Iserti. Gmel. syn. veg. p. 10. Hab. in Guinea. \mathcal{T}

Obs. Non est Usteria Cavanillesii, quae ad classem Didynamiam pertinet; ac ab Jacquinio in ejus Horto Seboenbrunensi Maurandia denominata est.

21. **POLLICHIA.** *Cal. 1-phyllus 5-dentatus. Cor. o. Sem. 1. Recept.*

squamae baccatae, fructus includentes.

1. *campestris*. Aiton. Kewens. 1. p. 5. Hab. ad Cap. b. sp. Folia verticillata, lineari-lanceolata. Flores congesti in capitulum, axillis trium vel quatuor foliorum occupans. Ait.

22. *SALICORNIA*. *Calyx* ventricosus, integer. *Petala* 6. *Sem.* 1.

1. *herbacea*, herbacea patula, articulis apice compressis emarginato-bifidis, spicis axillaribus oppositis pedunculatis, squamis obtusis. W. Sp. P. 1. p. 23. Oed. Flor. dan. t. 303. Blackw. t. 598. Hab. in Europae litoribus maritimis, in Virginia. *Diandra*. ☉

2. *indica*, articulis clavatis, truncatis bifidentibus, spicis cylindricis terminalibus solitariis obtusis Willd. in Nov. act. soc. Berol. 2. t. 4. f. 2. Ad littora maris prope *Tranquebar*. Antecedenti affinis, a qua squamis truncatis, colore glauco virescente differt.

3. *perennans*, herbacea patula, articulis apice compressis emarginato-bifidis, spicis axillaribus ternis pedunculatis, squamis acutis, radice perenni. W. Salicor. herbacea Pall. it. 1. app. n. 89. t. D. fig. 1. Hab. in Sibiria ad Jaikum in paludibus siccioribus. ☉

4. *fruticosa*, caule erecto fruticoso, articulis ramulorum ancipitibus, squamis floralibus truncatis membranaceis. Willd. Gmel. sib. 3 p. 8. t. 1. f. 17 in Europae maritimis. ☉

5. *strobilacea*, caule prostrato fruticoso, articulis truncatis alternatim spiciferis, spicis nudis brevissimis oppositis. W. Pall. it. 1. app. n. 91. t. E. Buxb. cent. 1. p. 6. t. 10. f. 2. Hab. in praeruptis salsis Maris caspici. ☉

6. *virginica*, herbacea erecta, ramis simplicissimis. Lin. Hab. in Virginia.

7. *arabica*, foliis alternis vaginantibus obtusis dehiscentibus. Lin. Pall. it. 1. app. n. 92. t. D. f. 3. Moris. hist. 2. p. 610. f. 5 t. 33. f. 7. Hab. in Arabia. ☉

8. *foliata*, foliis linearibus alternis amplexicaulis-decurrentibus. Lin. suppl. 81. Pall. it. 1. app. n. 93. t. F. In Sibiria. Frutex lignosus. ☉

9. *amplexicaulis*, foliis cordatis amplexicaulis. Vahl. Symbol. 2 p. 1. Hab. ad littora lacus prope Bardo Tuncti. ☉

10. *caspica*, articulis cylindricis, spicis filiformibus. Lepech. it. 1. p. 254. Pall. it. 1.

app. n. 50. t. D. fig. 2. Hab. in squalidis maris Caspici et Meliac. ☉

23. *HIPFURIS*. *Calyx* (o. L.) obsoletus. *Petala* nulla. *Stigma* simplex. *Sem.* 1. inferum.

1. *vulgaris*, foliis octonis subulatis. Veill. act. par. 1719. t. 1. f. 3. Hab. in Europae fontibus, fossis aquosis, lacubus. ☉

2. *maritima*, foliis stellatis subsensis: submersis spatulatis; emersis ovatis obtusis. Hellen. Diss. in Usteri Dialect. opusc. 1. p. 11. tab. 1. Retz. obs. fasc. 3. p. 7. tab. 1. Hab. ad littora maris in Suecia, Finlandia circa Aboam. Fol. superiora 5-6. Hipp. *tetraphylla*. L. Suppl. ☉

24. *LACISTEMA*. Ament. *Anth.* remote 2-locularis. *Stigm.* 3 setacea. *Caps.* 1-locular. *Sem.* evalvis stipendula.

1. *myricoides*. Swartz prod. p. 12. Ejusd. Icon. fasc. 1. t. 1. Naematospermum lacvigatum. Richard in Act. Soc. hist. natur. p. 105. Piper aggregatum Berg. Act. helv. 7. p. 131. tab. 10. Hab. in fruticetis montium Jamaicae, inque Surinamo.

DIGYNIA.

25. *CORISPERMUM*. *Cal.* o. *Petala* 2. *Sem.* 1, ovale, nudum.

1. *hyssopifolium*, spicis terminalibus, foliis linearibus nervosis mucicis. Pall. ross. 2. p. 112. tab. 58. Buxb. cent. 3. p. 30. t. 55. Hab. in Europae locis arenosis. ☉

2. *squarrosus*, spicis axillaribus squarrosis, foliis lanceolato-acuminatis pungentibus nervosis. Pall. ross. 2. p. 113. t. 59. Buxb. cent. 3. p. 30. t. 56. Hab. ad Wolsain Tartariae, inque desertis Cosacorum. ☉

3. *orientale*, fol. linearibus angustis, summitatibus floriferis subpaniculatis pubescentibus. Lam. ill. n. 44. Hab. in Oriente.

26. *CALLITRICHE*. *Cal.* inferus, diphyllus. *Caps.* membranacea marginata. (Flor. nonnulli monoeici.)

1. *verna*, foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. Oed. dan. t. 129. Hab. in Europae fossis aquosis. Vere florens.

2. *aestivalis*, fol. petiolatis subrotundis fructu tetragono. Thuill. Fl. par. p. 2. Vaill. botan. p. 190. t. 32. f. 10. In aquis frigidis. Floret Julio, Augusto.

3. *intermedia*, foliis superioribus ovatis, caulinis linearibus apice bifidis. Schkuhr bot. Handb. t. 1. f. e. Hoffm. gazm. 2. Cum priore.

4. *autumnalis*, foliis omnibus linearibus, apice bifidis, floribus hermaphroditis. Loesel. pruss. 140. t. 38. In fossis aquosis autumnis.

5. *tenuifolia*, fol. omnibus linearibus apice integris acutis, fructu 4-gono. Autumnis prope Fontainebleau observata a Thuill., secundum quem fructus *C. vernalis* et *autumnalis* compressi sunt.

27. BLITUM. Cal. 3-fidus. Pet. o. Sem. 1, calyce baccato.

1. *capitatum*, capitellis spicatis terminalibus. Knorr. del. hort. 1. t. E. 3. B. fol. triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis nudis. Hort. cliff. 1. Hab. in Europa. (Tyrolia, Helvetia.) ☉

2. *virgatum*, capitellis sparsis lateralibus. B. fol. triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis foliosis. Hort. cliff. 495. Moris. hist. 3. p. 606. s. 5. t. 3a. f. 2. Hab. in Tartaria, Hispania, Gallia Narbonensi. ☉

28. MNJARUM. Involucr. 4-phyllum. Cal. 4-partitus, superus. Cor. o. Sem. 1.

1. *biflorum*, Lin. Suppl. p. 81. Forst. Com. Göting. 9. p. 19. t. 1. Ditoea Gaertn. Hab. in Nov. Zealand. et in Terra del Fuego. Minuartiae simile. ☞

29. CINNA. Cal. Gluma 2-valvis, uniflora. Cor. Gluma 2-valvis. Sem. 1.

1. *arundinacea*, glabra, panicula magna, multiflora capillari, valvula altera florali infra apicem eubaristata. Michaux. Flor. Carol. p. 38. Hab. in sinu Hudsonis ad Canadam. Ab Agrost. *Mexicana* omnino distincta!

30. JARAVA. Cal. Gluma 2-valvis, 1-flora. Cor. Gluma 1-valvis, pappo aristata.

1. *usitata*. J. ichu, foliis convolutis subulatis, spica paniculata. Fl. peruv. 1. p. 5. t. 6. f. b. Hab. in alpihus regni peruvian. Varius et frequens hujus graminis usus est, qui l. c. perlegi potest. An *Alopecurus* species?

Ob minorem staminum numerum hanc ad classem adhuc pertinerent nonnullae ex aliis generibus species.

M O N O G Y N I A.

Mangifera indica. *Tradescantia monandra*. *Valeriana rubra*, *angustifolia*, *Cal-citrata*. *Aphanes arvensis*. *Polycnemum monandrum*, *Boerhaavia diffusa*. -- *Scirpi* et *Cyperi* nonnullae species.

D I G Y N I A.

Lcercia monandra. *Retboella 1-andra* Cav. *Uniola latifolia* et *gracilis* Michaux.

C L A S S I S I I.

D I A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

31. SCHREBERA. *Cal.* 2-labiatus. *Cor.* 5-7-fida. *Caps.* pyriformis, 2-locularis; 2-valvis. *Sem.* 8-10, alata.

1. *Swietenicoides*. Roxb. Plants of the coast of Coromand. t. 101. Arbor exelsa. Schrebera *Schionoides* L. *Cuscutae* species est in *Myrica aethiopica* parasitica.

32. NYCTANTHES. *Cor.* hypocrateriformis: *Laciniae* emarginatae. *Caps.* bilocularis, marginata, bipartibilis.

1. *Arbor tristis*, caule tetragono, fol. ovatis acuminatis, pericarpis membranaeae compressis. Lam. illustr. p. 20 t. 6. Scabrita scabra. Syst. nat. ed. 12. p. 115. Rheed. mal. 1. p. 35. t. 21. Hab. in India. ¶

33. JASMINUM. *Cor.* hypocrateriformis, 5-8-fida. *Bacca* dioeca. *Semina* solitaria arillata.

* *Folii simplicibus.* (Mogorium Juss. ob octonarium laciniarum numerum.)

1. *Sambac*, foliis oppositis simplicibus ellipticis ovatis subcordatisque membranaeae opacis, ramulis petiolisque pubescentibus, lacinii calycinis subulatis. Aiton. Kew. 1. p. 8. Willd. Sp. pl. 1. p. 35. Lam. ill. t. 6. f. 1. Rumph. amb. 5. p. 52. t. 30. Hab. in India. Odor gratus. ¶

2. *undulatum*, foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus. Nyctanthus undulata. Sp. plant. p. 8. Rheed. 6. p. 97. 55. Hab. in Malabaria. ¶

3. *hirsutum*, petiolis pedunculisque villosis. Willd. l. c. 1. p. 36. N. hirsuta. Sp. plant. 2. p. 8. Hab. in India. ¶

4. *triflorum*, fol. (parvis) ovatis inferioribus obtusis; superioribus acuis, cymis trifloris. Lam. illustr. p. 23. t. 6. f. 2. sub Mogorio. Nyct. angustifolia. L. Rheed. 6. t. 53. In Malabaria. ¶

5. *acuminatum*, fol. ovatis acuminatis trinerviis, petiolis cirrhosis, dentibus calycinis setaceis. Lam. l. c. sub Mogorio. In insula Java. ¶

6. *trifoliatum*, fol. ternatis 1 foliolis ovatis, minoribus, calyce brevissimo. Lam. l. c. p. 27. cresc. In insula Mauritiana. ¶

7. *pubescens*, foliis oppositis ovatis cordatis utrinque pubescentibus. Willd. l. c. p. 37. Retz. Obs. bot. 5. p. 9. Hab. in Calcutta. ¶

8. *scandens*, foliis oppositis simplicibus ovato-oblongis attenuatis, paniculis brachiatis, lacinii calycinis setaceis reflexis. Vahl. symbol. 3. p. 2. Hab. in Bengalía. ¶

9. *elongatum*, foliis cordatis lanceolatis acutis elongatis minoribusque, ramis teretibus. Willd. Nyct. elongata. Lin. suppl. 28. Berg. Act. angl. 1772. p. 290. t. 11. Hab. in India orientali. ¶

10. *glaucom*, foliis oppositis simplicibus lanceolatis utridis, lacinii calycinis subulatis. Aiton. Kew. 1. p. 9. Jasm. ligustrifolium, foliis oppositis simplicibus lanceolatis crassiusculis. Lam. rck. encyclop. 3. p. 209. Nyctanthus glauca. Lin. suppl. 82. Hab. ad Cap. b. spci. ¶

11. *trinerve*, foliis oppositis simplicibus ovatis attenuatis trinerviis, pedunculis axillaribus subunifloris. Vahl. symbol. 3. p. 2. Hab. in Java. ¶

12. *lanceolatum*, fol. oppositis lanceolatis, pedunculis axillaribus terminalibusque unifloris. Fl. peruv. 1. p. b. Hab. in Peru, locis umbrosis. *Cor.* alba subpurpureus.

13. *australe*, fol. oppositis ovato-lanceolatis simplicibus. Forst. prod. n. 7. (simplicifolium.) Hab. in insulis Amicorum. h

** *Foliis ternatis.*

14. *angulare*, foliis oppositis ternatis: foliolis ovatis obtusis, ramulis angulatis petiolisque villosis, pedunculis axillaribus trifloris. Vahl. symbol. 3. p. 1. Hab. ad Cap. b. spei. h

15. *auriculatum*, foliis oppositis ternatis, ramulorum floriferorum simplicibus, calycibus angulatis ramisque teretibus pubescentibus. Vahl. symbol. 3. p. 1. Hab. in hortis idolotrorum Malabarici. h

16. *flexile*, glabrum, foliis oppositis ternatis, racemis axillaribus brachiatis, caule scandente, ramis teretibus. Vahl. symbol. 5. p. 1. Hab. in India orientali. h

17. *didymum*, glabrum, foliis oppositis ternatis, racemis ovato-lanceolatis, racemis axillaribus. Vahl. symbol. 3. p. 2. Hab. in Societatis insulis. h

18. *azoricum*, foliis oppositis ternatis: foliolis ovatis subcoriatisque undulatis, ramis glabris teretibus, corollae laciniis tubo aequalibus. Aiton Kew. 1. p. 9. Pluk. almag. 185. t. 303. f. 1. Hab. in insulis azoricis. Flor. albi, odorati. Fol. magna. h

19. *scuticatus*, foliis alternis ternatis simplicibusque: foliolis obovatis cuneiformibusque obtusis, ramis angulatis, laciniis calycinis subulatis. Aiton. Kewens. 1. p. 9. Jasm. luteum, vulgo dictum bacciferum. Bauh. pin. 298. Lam. illustr. n. 61. t. 7. f. 2. In Europa australi et toto Oriente. h

20. *humile*, foliis alternis acutis ternatis pinnatisque, ramis angulatis, laciniis calycinis brevissimis. Aiton. Kew. 1. p. 9. Knorr. del. hort. 1. tab. 1. Besl. cyst. aestriv. t. 40. f. 2. Fl. lucri. h

21. *odoratissimum*, foliis alternis obtusiusculis ternatis pinnatisque, ramis teretibus, laciniis calycinis brevissimis. Ait. Kew. 1. p. 10. Hab. in Madera. Flor. havi. h

** *Foliis pinnatis.*

22. *officinale*, foliis oppositis pinnatis: foliolis acuminatis, gemmulis cretiusculis. Aiton. Kew. 1. p. 10. J. foliis oppositis: foliolis distinctis. Syst. Veg. p. 54. Blackw. t. 13. Hab. in India, inque Helvetia. Flor. albi, odorati. h

23. *grandiflorum*, foliis oppositis pinnatis: foliolis obtusiusculis, gemmulis horizontalibus. Ait. Kew. 1. p. 10. J. fol. oppositis pinnatis: foliolis extimis confluentibus. Sp. pl. 2. p. 9. Mill. dict. n. 4. Merian.

surin. t. 46. Rheed. mal. 6. p. 97. t. 52. Hab. in India. Cor. alba, subtus rubra. h

34. *GALIPEA*. Cal. 4-5-connatis, 4-5-dentatus. Cor. hypocraterif. profunde 4-5-partita. Stam. 4: duo sterilia.

1. *trifoliata*. Aubl. gujen. n. 2. p. 662. t. 265. Hab. ad fluviorum ripas Gujanac. h

35. *LIGUSTRUM*. Cor. 4-fida. Bacca 4-sperma.

1. *vulgare*, foliis lanceolatis acutiusculis, panicula coarctata. Willd. arb. berol. p. 169. Hab. in collibus glaucosis, ad sepes. h

2. *japonicum*, fol. ovatis acuminatis, panicula divaricata. Willd. S. P. 1. p. 42. L. fol. ovatis acuminatis, panicula decomposita trichotoma. Thunb. jap. p. 17. t. 1. Hab. in Japonia. h

36. *PHILLYREA*. Cor. 4-fida: tubo brevissimo. Bacca 2-locularis: loculis 1-sperma: uno saepe abortivo.

1. *media*, foliis oblongo-lanceolatis integris serratisque. Ait. Kew. 1. p. 11. Willd. Sp. pl. 1. p. 42. Gaertn. de Fr. et Sem. 2. p. 71. t. 92. f. 5. Camer. epit. 50. Ic. Hab. in Europae australioris collibus. h

2. *angustifolia*, foliis linearilanceolatis integerrimis. Hort. cliff. 4. Lam. illustr. t. 8. f. 3. Cam. l. c. Hab. in Italia, Hispania et in Atlante. h

3. *latifolia*, foliis ovato-cordatis serratis. Hort. cliff. 4. Lam. illustr. t. 8. f. 2. Clus. hist. 51. ic. Hab. in Europa australi. Sempervivens. h

37. *OLEA*. Cor. 4-fida: laciniis subovatis. Drupa. 2-sperma: uno abortante.

1. *europaea*, foliis lanceolatis integerrimis, racemis axillaribus coarctatis. Ait. Ait. Kew. 1. p. 12. Lam. l. c. t. 8. f. 1. Gaertn. 2. p. 75. t. 93. f. 4. Willd. l. 1. p. 44-46. Hab. in Europa australi, inque Africa boreali. h

β *verrucosa*, fol. lanceolatis planis subulatis, ramis verrucosis. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 44. O. europaea. Thunb. prodr. 2. Ad Cap. bon. spci. h

2. *capensis*, foliis ovatis integerrimis, racemis paniculaeformibus divaricatis. Aiton. Kew. 1. p. 13. Burm. afr. 233. t. 81. f. 1. Hab. ad Cap. b. Spei. h

3. *americana*, foliis lanceolato-ellipticis integerrimis, racemis angustatis, bracteis omnibus persistentibus connatis parvis. Ait. Kew. 1. p. 14. Ligustrum lauri folio, fructu violaceo, baccis purpurcis. Catesb. 1. p. 61. t. 61. Secligm. Voegel. 3. t. 33. Hab. in Carolina. h

4. *cernua*, foliis oblongis lanceolatis obtusissimis, racemis axillaribus simplicibus, floribus cernuis. Vahl. symbol. 3. p. 3. Hab. in Madagascar. h

5. *apetala*, foliis ellipticis, floribus racemosis apetalis. Vahl. symbol. 3. p. 3. Hab. in Nova Zeelandia. h

6. *exceisa*, foliis ellipticis acutis, bracteis perfoliatis: infimis crathiliformibus, superioribus foliaceis magnis deciduis. Vahl. symbol. 3. p. 3. Hab. in Madera. h

7. *fragrans*, foliis lanceolatis serratis, pedunculis lateralibus aggregatis unifloris. Thunb. jap. 18. t. 2. Hab. in Cochinchina, China, Japonia. Flores ob odorem gratum ad potum Theae adhibentur ab incolis. h

8. *emarginata*, fol. obovatis retusis emarginatis, panicula pauciflora terminali. Lam. illustr. p. 29. t. 8. f. 2. Hab. in insula Madagascariae. Arbor 40-pedalis.

9. *chrysophylla*, fol. angusto-lanceolatis utrinque acutis subtus aureo-nitidis, paniculis laterilibus. Lam. ill. p. 27. In insula Maritima. h.

10. *lancea*, fol. lineari-lanceolatis utrinque acutis, panicula terminali, drupis oblongis acutis. Lam. l. c. In insula Franciae. h

39. ORNUS. *Cal.* 4-partitus. *Corol.* 4-partita: petalis longis ligulatis. *Filam.* longa. *Nux.* alata.

r. *europaea*. Fraxinus Ornus L. Mill. Illustr. fr. arbor. Hab. in Italia et Hispania. (Cavan.) Floribus, sequenti generi fere similibus, plane differt a *Fraxinis*.

39. CHIONANTHUS. *Cor.* 4-fida: laciniis longissimis. *Drupae* Nucleus striato-fibrillosus.

1. *virginica*, panicula terminali trifida, pedunculis trifloris, foliis acutis. Willd. Sp. pl. 1. p. 46. Lam. illustr. p. 30. t. 9. Hab. in America septentrionali. Variat corolla 4. 5. 6-fida et staminibus quatuor. h

2. *cotinifolia*, panicula terminali tri-
chotoma, pedunculis trifloris, foliis obtusis. Willd. l. c. p. 47. Arbuscula zeylanica, cotini foliis subtus lanugine villosis, floribus

albis cuculli modo laciniatis. Pluk. alm. 44. t. 241. f. 4. Hab. in Zeylona. h

3. *compacta*, paniculis triehotomis, ultimis floribus subcapitata, calycibus villosis, foliis lanceolato-oblongis, antheris acuminatis. Swartz prod. 13. Vahl. symbol. 2. p. 1. Jacq. Collect. 2. p. 110. t. 6. f. 1. *Ceranthus* Schreb. gen. Hab. in insulis Caribaeis. h

4. *zeylanica*, ramis paniculae axillaribus oppositis, floribus subsessilibus. Thoninia nutans. Lin. suppl. 89. Hab. in Zeylona. h

5. *guyanensis*, flor. corymbosis axillaribus, fol. alternis oppositisque ovato-oblongis. Mayepa guyanensis. Aubl. guaj. p. 8. t. 31. Flor. 4-andr. Schwarz. l. c. 2. Hab. in Guyana. Cort. albicans. a. h

6. *incrassata*, paniculis decussatis fastigiatisque, cor. laciniis incrassatis, fol. oblongis. Swartz prod. p. 13. In Jamaica. Flor. 2-andri S. in Schrad. Journ. 2. p. 23.

7. *ligustrina*, fol. lanceolatis, paniculis terminalibus, floribus erectis subtrapezatis. Richard. Thoninia Swartz prod. p. 15. Linociera Schreb. gen. pl. L. n. 1709. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 154. Hab. in Jamaica. h

40. SYRINGA. *Cor.* 4-fida. *Capsula* bilocularis.

1. *vulgaris*, fol. cordatis. L. Willd. p. 48. Lilac vulgaris. Lam. ill. p. 26. t. 1. Du Hamel. arb. 2. t. 138. Ad sepes et in sylvaticis. h

2. *dubia*, fol. ovato-attenuatis. S. chinensis Willd. Sp. pl. L. 1. p. 48. Etiam in Gallia, et. gr. prope Rouen et circa Parisios sponte quasi crescit. An e China ad Europam prius apportata? h

3. *persica*, foliis lanceolatis integris pinnatifidisque. Lin. Hort. cliff. 6. Mill. dict. t. 164. f. 2. Hab. in Persia. Nunc frequens in hortis colitur. h

4. *suspensa*, foliis ovatis serratis ternatisque. Thunb. jap. 19. t. 3. Hab. in Japonia. Calyx profundius divisus et corolla campanulata. Thunb. h

41. DIALIUM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* nullus. *Stamina* ad latus superius receptaculi.

1. *indum*, panicula simplici nutante. Hab. in India. h

2. *guinense*, panicula supradecomposita erecta. Willd. apud Roemer Archiv. 1. p. 31. t. 6. Hab. in Guinea. h

42. *PIMELEA*. *Cal.* nullus. *Cor.* 4-fida. *Stam.* fauci inserta. *Nux* corticata unilocularis.

1. *linifolia*, foliis linearis-lanceolatis latis, capitulis terminalibus involucreis, corolla extus villosa. Smith. Nov. Holl. 1. p. 31. tab. 11. Hab. in Nova Hollandia. *h*

2. *Gnidia*, foliis oblongo-lanceolatis acutis claberrimis, corolla extus villosa Willd. l. c. p. 58. *Passerina Gnidia*. Lin. suppl. 226. Hab. in Nova Zeelandia. *h*

3. *pilosa*, pilosa, foliis linearibus obtusis. W. *Passerina pilosa*. Lin. suppl. 226. Hab. in Nova Zeelandia. *h*

4. *prostrata*, pilosa, fol. ovatis sessilibus carnoia. Willd. p. 51. Lam. ill. p. 31. t. 9. f. 1. *Passerina prostrata*. Lin. suppl. 227. Hab. in Novae Zeelandia montibus aridis. *h*

43. *ERANTHEMUM*. *Cor.* 5-fida : tubo filiformi. *Antherae* extra tubum. *Stigma* simplex.

1. *capense*, foliis lanceolato-ovatis petiolatis. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 51-52. Herm. parad. 153. Hab. in Aethiopia. Habitus Chironiae.

2. *angustifolium*, foliis linearibus remotis patulis. Syst. Veg. p. 55. Lam. ill. 1. p. 60. t. 17. f. 1. Selago dubia. Spec. plant. 2. p. 877. Burm. afr. 130. t. 47. f. 3. Plukn. mant. 180. t. 445. f. 6. Hab. in Aethiopia. *h*

3. *parvifolium*, foliis ovato-linearibus imbricatis. Mant. p. 171. Berg. cap. 2. Lam. l. c. f. 2. Comm. smet. 2. 129. t. 60. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

4. *salsoloides*, fruticosum, foliis carnosius teretibus linearibus glaberrimis, racemis axillaribus calycibusque pubescentibus, tubo recurvo. Lin. suppl. 82. Hab. in Teneriffa prope St. Cruz. *h*

44. *FONTANESIA*. *Cor.* dipetala. *Cal.* 4-partitus, inferus. *Caps.* membranacea non dehiscens, 2-locularis : loculis monospermis.

1. *phillyreoides*. Billard. Icon. pl. Syr. Dec. 1. p. 9. t. 1. Duhamel arb. ed. nova. t. 5. Hab. in Syria inter Laodicam ad mare et montem Caspium. *h*

45. *CIRCAEA*. *Cor.* dipetala. *Cal.* 2-phyllus, superus. *Caps.* hispida bilocularis non dehiscens ; loculis monospermis.

1. *lutetiana*, caule erecto, racemis plu-

ribus, foliis ovatis. Oed. dan. 255. Lam. ill. 16. f. 1. Fol. pubescentia, etiam glabra. Kniph. orig. cent. 10. t. 22. Hab. in Europae et Americae borealis nemoribus. *h*

* *intermedia*, major, fol. cordatis, repando-denticulatis acuminatis cauleque simplici glabro, capsulis ovato-globosis. Schumacher Flor. Saelland. 1. p. 5. *Circaca lutetiana* Curt. Flor. Londini. In umbrosis humidis et in palustribus.

2. *alpina*, caule ramosissimo depresso, foliis cordatis dentatis nitidis glabris. Roth. germ. l. p. 13. Hab. ad montium radices in Europa. *h*

46. *VERONICA*. *Cor.* limbo 4-partito : lacinia infima angustiore. *Caps.* bilocularis.

* *Spicatae*.

1. *sibirica*, spicis terminalibus, foliis septenis verticillatis, caule subhirsuto. Gmel. sib. 3. p. 217. Amm. Fl. ruthen. t. 4. Willd. Sp. 1. p. 54. Hab. in Dauria. Stamina et pistillum corolla duplo longiora. *h*

2. *virginica*, spicis terminalibus, foliis quaternis quinisque. Pluk. alm. 383. t. 70. f. 2. Hab. in Virginia et Japonia. Flor. albi.

3. *spuria*, spicis terminalibus, foliis lanceolatis aequaliter serratis. Roth. germ. l. p. 2. II. p. 5. Gmel. it. 1. p. 169. t. 39. Barr. ic. 808. Hab. in Europa australiore, Sibiria, Thuringia. *h*

4. *maritima*, spicis terminalibus, foliis subcordato-lanceolatis, inaequaliter serratis. Roth. germ. l. p. 5. Oed. dan. 374. Knorr. del. hort. 2. tab. V. 2. Hab. in maritimis Europae maris apicis. Fol. ovata. Var. ut antecedens et sequens species, fol. oppositis ternis quaternisve, flore coccineo, cocculescente, incarnato, alboque. Willd. *h*

5. *longifolia*, spicis terminalibus, foliis lanceolatis acuminatis serratis in petiolum desinentibus. Roth. germ. l. p. 5. Sabbat. hort. rom. 2. t. 48. Hab. in Tartaria, Austria, Suecia. *h*

6. *incana*, spicis terminalibus, foliis oppositis crenatis obtusis cauleque erecto tomentoso. V. spicata lanuginosa et incana, floribus corollis. Amm. ruth. 30. Hab. in Ucraina, Samara. Cinerascens. *h*

7. *spicata*, spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis apice integerrimis caule ascendente simplicissimo. Oed. dan. t. 52. Hab. in sylvaticis. Variat spicis pluribus. *h*

8. *hybrida*, spicis terminalibus, foliis

ellipticis obtusis inaequaliter crenato-serratis, caule erectiusculo. Smith. Flor. brit. 1. p. 16. Willd. apud Schrad. Journ. de Bot. 1799. p. 288. t. 3. Antecedente major, spicis plurimis. In montosis Europae. \mathcal{T} .

9. *pinnata*, spica terminali, foliis linearibus pinnatifidis subsaeiculatis: laciniis filiformibus divaricatis. Aiton Kew. 1. p. 19. Laxmann in Act. Petrop. 1770. p. 553. t. 29. f. 1. Hab. in Siberia. \mathcal{T} .

10. *lacinata*, racemum subspicato terminali, foliis pinnatifidis lacinatis. Ait. Kew. 1. p. 19. Jughans. icon. rar. cent. 1. fig. 2. Hab. in Siberia. \mathcal{T} .

11. *incisa*, spicis terminalibus, foliis lanceolatis inciso-pinnatifidis glabris. Ait. Kew. 1. p. 19. Hab. in Siberia. Differt a praecedenti spicis nunquam solitariis semper aggregatis. \mathcal{T} .

12. *Cataractae*, racemis terminalibus flexuosis, caule suffruticoso, foliis lanceolatis serratis. Forst. prodr. n. 7. Hab. in Nova Zeelandia. \mathcal{T} .

13. *elliptica*, racemis lateralibus, caule fruticoso, foliis ellipticis integerrimis. Forst. prodr. n. 10. Hab. in Nova Zeelandia. \mathcal{T} .

14. *macrocarpa*, racemis subterminalibus erectis, foliis lanceolatis integerrimis glabris planis, caule fruticoso. Vahl symb. 3. p. 4. Hab. in Nova Zeelandia. \mathcal{T} .

15. *salicifolia*, racemis lateralibus nutantibus, foliis lanceolatis integerrimis, caule fruticoso. Vahl. symbol. 3. p. 4. Hab. in Nova Zeelandia. \mathcal{T} .

16. *parviflora*, racemis subterminalibus, foliis linearibus lanceolatis integerrimis glabris mucronatis, caule fruticoso. Vahl. symbol. 3. p. 4. Hab. in Nova Zeelandia. \mathcal{T} .

17. *officinalis*, spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis obovato-subrotundis pilosis annis, caule procumbente hirsuto. Willd. p. 59. Flor. succ. 2. n. 12. Oed. dan. t. 248. Hab. in Europae sylvestribus sterilibus. \mathcal{T} .

18. *Allionii*, spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis subrotundis nitidis rigidis, caule glabro repente. Smith Act. Soc. Lin. Lond. 1. p. 150. Allion. pedem 1. n. 265. t. 46. f. 3. Pluk. phyt. 233. f. 1. Hab. in alpinis Galliae australioris Italiae, Helvetiae. \mathcal{T} .

19. *Michauxii*, piloso, racemis lateralibus, flor. subglomeratis, fol. ovatis dentatis sessilibus. Lam. ill. p. 44. In Oriente. Pili alii glutinosi.

20. *decussata*, racemis axillaribus paucifloris, foliis ellipticis perennantibus integerrimis, caule fruticoso. Willd. arb. berol. p. 400. Moench. Weissenst. p. 137. Hebe magellanica. Jussieu. gen. Hab. in insulis Falklandiae inque freto Magellanico. \mathcal{T} .

* * *Corymboso-racemosae.*

21. *aphylla*, corymbo terminali, scapo nudo, caps. obcordatis. Bocc. musc. 2. p. 17. t. 1. et 9. Plukn. alm. 384. t. 114. f. 3. Segui. Ver. 241. t. 7. f. 2. Hab. in Alpibus Europae australioris inque Asia boreali. Singularis pilis articulatis ut Conservac. V. Kamtschatica. L. suppl. hujus tantum varietas. Willd. p. 60. V. subaeulis. Lam. ill. p. 49. n. 171. \mathcal{T} .

22. *nudicaulis*, corymbo terminali, scapo nudo, caps. ovatis integris. Lam. ill. p. 46. Hab. in Europae alpinis.

23. *bellidioides*, corymbo terminali, caule ascendente diphylo, foliis obtusis crenatis, calycibus hirsutis. V. caule simpliciter, foliis scabris serratis ovatis, spica pauciflora. Hall. helv. n. 543. t. 15. f. 1. Hab. in Pyrenaeis, alpinis Helvetiae imprimis Aquilegensibus. \mathcal{T} .

24. *gentianoides*, corymbo terminali, caule ascendente, foliis lanceolatis margine cartilagineis: inferioribus connatis vaginantibus. Vahl. symbol. 1. p. 1. Buxb. Cent. 1. p. 23. t. 35. Hab. in Cappadocia, Armenia. \mathcal{T} .

25. *Ponae*, racemo terminali, caule simplicissimo, foliis cordato-ovatis dentatis sessilibus. Willd. p. 51. V. *Ponae*, spica terminali, foliis cordato-ovatis sessilibus summis alternis. Gouan. illust. p. 1. t. 1. f. 1. Pluk. phytog. t. 253. f. 3. Hab. in montosis Pyrenaeorum inque monte Baldo. \mathcal{T} .

26. *fruticulosa*, corymbo terminali, foliis lanceolatis obtusiusculis subdentatis, calycinis foliolis acutis, caulibus fruticulosis. W. Hall. helv. n. 545. t. 16. Jacq. collect. 4. p. 299. tab. 5. Hab. in alpinis. Facies Ver. scrophulariac. \mathcal{T} .

27. *saxatilis*, corymbo terminali, foliis ellipticis obtusis integerrimis ciliatis, calycinis foliolis obtusis, caulibus fruticosis. Willd. V. *saxatilis*, corymbo terminali, fol. oppositis glabriusculis, pedunculis folia floralia superantibus. Lin. suppl. 81. Oed. dan. t. 342. Hab. in alpinis. Caules ramosi diffusi. Fl. magni, fauce rubra. \mathcal{T} .

28. *alpina*, corymbo terminali, foliis oppositis oblongo-lanceolatis acutis dentatis, calycibus bispidis. Oed. dan. t. 16. Fl. lapp. 7. t. 9. f. 4. Hab. in alpinis Europae. \mathcal{T} .

29. *integrifolia*, corymbo terminali, foliis oppositis ellipticis obtusis integerrimis, calycibus pilosis. Willd. p. 63. V. alpina. Krocker siles. n. 28 tab. 3. Hab. in alpidibus Salisburgensibus inque Sudetis. $\overline{\text{T}}$

30. *tenella*, foliis oblongis crenatis, caulibus repentibus, calycibusque villosis. Vahl. symbol. 3. p. 5. Allion. pedem. n. 272. t. 22. f. 1. Pluk. alm. 184. t. 233. f. 4. Hab. in Pyrenæis et alpidibus Pedemontanis. $\overline{\text{T}}$

31. *Beccabunga*, racemis lateralibus, ovis ovatis planis, caule repente. Oed. dan. 511. Curt. Fl. Lond. Hab. ad scaturigines vix congelandas. $\overline{\text{T}}$

32. *Anagallis*, racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. Fl. Dan. 503. Hab. in Europa ad fossas et in Oriente. $\overline{\text{T}}$

33. *scutellata*, racemis lateralibus alternis: pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. Oed. dan. 209. Hab. in Europæ inundatis. Racemi capillares, laxi, divaricati. $\overline{\text{T}}$

34. *Tencrium*, racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis dentatis obtusiusculis, caulibus ascendentibus. Rivin. t. 95. Hab. in Germ. Helvetia. (Scriemæ hujus et sequentis Veroniæ in herbario Linnaeano non inveniit Smith.) $\overline{\text{T}}$

35. *pilosa*, racemis axillaribus, foliis ovatis obtusis plicatis profunde dentatis, caule prostrato bifariam piloso. V. racemis subpicatis, foliis ovatis obtusis, plicatis, caule prostrato piloso. Sp. plant. 2. app. 1663? Hab. in Austria. Calyces sessiles, laciniis 2 exterioribus majoribus. Corollae albis-coerulescentes. W. $\overline{\text{T}}$

36. *prostrata*, racemis lateralibus, foliis linearilanceolatis serratis, caulibus prostratis. Pollieh. pal. n. 15. Riv. t. 95. Hab. in collibus. $\overline{\text{T}}$

37. *pectinata*, racemis lateralibus, foliis oblongis pectinato-serratis, caulibus prostratis. Mant. p. 24. Buxb. cent. 1. p. 25. t. 39. Hab. Constantinopoli. Tomentosa. $\overline{\text{T}}$

38. *montana*, racemis lateralibus elongatis filiformibus, foliis ovatis petiolatis obtusis grosse serratis, caule petiolisque hirtis. Lin. suppl. 83. Jacq. austr. t. 109. Flor. dan. t. 1201. In umbrosis humidis. Caulis repens. Calyces 4-fidi. Fructus orbiculati.

39. *Chamaedrys*, racemis lateralibus, foliis ovatis sessilibus rugosis dentatis, caule bifariam piloso. Oed. dan. 448. Hab. in Europæ pratis, ad sepes. $\overline{\text{T}}$

40. *pedunculata*, racemis lateralibus oppositis, fol. ovatis ineiso-serratis, incisuris basi subdentatis, pedicellis filiformibus, calyc. 4-fidis subaequalibus. De Bieberstein Tableau des provinces occident. de la mer Caspienne. Petersbourg, 1758. Buxb. cent. 1. t. 41. fig. 1. In sylvia umbrosis circa Kurt-Butak. $\overline{\text{T}}$

41. *orientalis*, racemis lateralibus, foliis pinnatifidis glabris acutis basi attenuatis, calycibus inaequalibus, pedicellis capillaribus bractea longioribus. Ait. Kew. 1. p. 23. Salisb. icon. 1. p. 7. tsh. 4. Hab. in Armenia, Iberia graminosis. Fol. latiuscula.

42. *multifida*, racemis lateralibus, foliis multipartitis, laciniis pinnatifidis, lobis decurrentibus, pedunculis brevibus, calyce glaberrimo, caule villosa. Willd. Sp. pl. 69. V. multifida, racemis lateralibus, fol. multipartitis laciniatis, caulibus erectis. Sp. plant. 17. Hab. in Siberia. Fol. elongata. $\overline{\text{T}}$

43. *austriaca*, racemis lateralibus, foliis pilosiusculis linearibus pinnatifidis, laciniis infimis longioribus divaricatis, calycibus pilosiusculis, pedunculis bractea brevioribus. Willd. p. 70. Jacq. aust. cent. 4. t. 329. Moris. hist. 2. s. 3. t. 23. f. 17. Hab. in Austria, Silesia, Carniola. Caulis et folia pilis minutissimis adpressis tecta. $\overline{\text{T}}$

44. *atlantica*, caule adscendente fruticoso, fol. pinnatifidis, racemis terminalibus. Def. Fl. atlant. 1. p. 13. V. rosea. Hab. in Atlante. Caul. filiformis. Corolla rosea.

45. *taurica*, racemis lateralibus, foliis pilosiusculis linearibus indivisis et pinnatifido-denticulatis, pedunculis bractea longioribus, calyce quadrifido glabro Willd. Sp. p. 70. Hab. in Tauria. Corolla rosea. $\overline{\text{T}}$

46. *urticaefolia*, racemis lateralibus, foliis cordatis sessilibus argute serratis acuminatis, caule stricto, foliolis calycinis quaternis. Ait. Kew. 1. p. 24. Lin. suppl. 83. Jacq. aust. 1. p. 37. t. 59. Hab. in Helvetia, Bithynia, Austria, Bavaria. $\overline{\text{T}}$

47. *latifolia*, racemis lateralibus, foliis cordatis sessilibus rugosis obtuse serratis, caule stricto, foliolis calycinis quinis. Ait. Kew. 1. p. 24. Jacq. austr. 1. p. 37. t. 60. Hab. in Austria, Germania. Fol. incisa. $\overline{\text{T}}$

48. *paniculata*, racemis lateralibus longissimis, foliis lanceolatis ternis serratis, caule adscendente. Pall. It. 1. p. 196. Hab. in Tartaria, Bohemia. Calyces 4-fidi. $\overline{\text{T}}$

*** *Pedunculis unifloris.*

49. *biloba*, floribus solitariis, foliis cor-

dato-lanceolatis dentatis, calycinis aequalibus ovatis acuminatis trinerviis. Smith. Act. Soc. Lin. Lond. 1. p. 193. V. floribus solitariis, foliis ovatis acutis serratis glabris, calycibus fructu bipartito majoribus Vahl. symbol. 1. p. 1. Buxb. cent. 1. p. 24. t. 36. Hab. inter Cappadociae segetes. \odot Affinis V. arvensi. Capsulae bipartitae.

50. *agrestis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisus pedunculo reflexo brevioribus. Fl. succ. 17. 20. Oed. dan. 1. 449. Hab. in Europae agris et arvis. Caul. procumbens, diffusus. \odot

51. *arvensis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisus pedunculo longioribus, caps. compressis subsessilibus. Oed. dan. 515. In arvis cultis. Var. caule ramoso diffuso: V. *polyanthos*. Thuill. In gram. nois, ad sepes, in agris. \odot

52. *scrpillifolia*, floribus solitariis subsapicata, fol. ovatis inferioribus creuatis, caule basi repente. L. Flor. dan. t. 492. In sylvaticis, pratis, locis subhumidis. Habitus fere Lysim. nummulariae.

53. *hederifolia*, floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis pedunculo brevioribus, calycinis ovatis. Willd. Hab. in ruderalis, hortis, agris. \odot

54. *rotundifolia*, floribus solitariis, fol. orbiculato-reniformibus crenatis, caule filiformi repente. Flor. Peruv. 1. p. 6. In Peruviae uliginosis. Flores interdum 5-fidi, et Stam. 4. vid. l. c. \odot

55. *Chamaepitys*, caule basi tenui ascendente, fol. sessilibus trifido-linearibus, flor. sessilibus minutis solitariis. V. *Chamaepityoides*. Hort. Par. Dumont Courset, Bot. cultivateur. 4. p. 39. In Europa. \odot

56. *filiformis*, floribus solitariis, foliis cordatis crenatis pedunculo brevioribus, calycinis lanceolatis, pedunculo filiformi longissimo. Smith Soc. Lin. Lond. 1. p. 195. Buxb. cent. 1. p. 25. t. 40. f. 1. Hab. in Oriente. \odot

57. *triphyllae*, floribus solitariis pedunculatis, foliis digitato-partitis, caule patulo. Oed. dan. t. 697. V. flor. solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus. Fl. succ. 19. 20. Veronica folio rutae. Riv. t. 56. Hab. in Europae agris. Ramosa. \odot

58. *verna*, floribus solitariis subsessilibus, foliis digitato-partitis summis indivisis, caule stritto. Willd. Oed. dan. t. 252. Hab. in Europae aridis apricis. Parvula, simplex. \odot

59. *digitata*, floribus solitariis sessilibus, foliis omnibus digitato-partitis, caule

stricto. Vahl. symbol. 1. p. 2. Hab. in agris Bohemae, Monspelii, Hispaniae. \odot

60. *acinifolia*, floribus pedunculatis solitariis, foliis ovatis glabris crenatis, caule erecto subpiloso, caps. compressis. Vaill. parisi. 201. t. 33. f. 3. \odot

61. *praecox*, foliis cordatis sessilibus, profunde dentatis, caule erecto hirsuto ramoso, pedunculis folia aequantibus, calycibus quadrifidis aequalibus. Schmitt bohem. 1. n. 41. V. *Ocimifolia*, flor. solitariis pedunculatis, caule erecto, foliis subtus rubris, flore caruleo. Thuill. Flor. paris. p. 10. Bore. Mus. t. 102. Hab. in agris cultis. Foliis incisus et hirsutus a priore et floribus pedunculatis a V. *arvensi* differt. \odot

62. *peregrina*, floribus solitariis sessilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis, caule erecto. Flor. dan. t. 407. Moris. hist. 2. p. 322. s. 3. t. 34. f. 19. n. 56. V. *Marilandica*. Murr. Comm. Goett. 1782. p. 11. tab. 3. In Europae et Amer. septent. arvis. \odot

63. *Bellardi*, floribus solitariis pedunculatis, foliis linearibus integerrimis hirtis flore longioribus, caule simplicissimo erecto. Willd. V. Bellardi hirsuta, caule erecto simplici toto florifero. Allion. pedem. 1. n. 282. t. 85. f. 1. n. 57. V. polygonoides Lam. ill. n. 165. Hab. in paucis Pedemontanis, et in Gallia. \odot

47. COLUMELIA. Cal. 5-partitus. Cor. rotata. Caps. didyma: valvulis duplicatis.

V. *arborescens*, foliis oblongis, floribus corymbosis. C. oblonga. Flora Peruv. 1. p. 28. t. 12 f. 2. Hab. in sylvis peruvianis.

2. *frutescens*, fol. obovatis serrato-dentatis integrisque, pedunculis subunifloris. C. obovata Fl. peruv. t. 12. f. b. In collibus aridis in Peru. Amarissima. Cor. lacinae patulae.

48. SARMIENTA. Cor. urceolata. Filam. 3 sterilia. Caps. 1-locularis, circumscissa.

1. *scandens*. Fewill. peruv. 3. p. 69. t. 43. sub Urceolaria. Sarmienta repens, fol. ovatis carnosius utrinque punctatis. Flor. Peruv. 1. p. 9. t. 7. f. b. In nemoribus peruvianis. Planta parasitica scandens.

49. PAEDEROTA. Cor. ringens 4-fida: sauce nuda. Cal. 5-partitus. Caps. bilocularis.

1. *Ageria*, foliis ovato-acuminatis,

corollarum galea bifida. Willd. Sp. pl. 1. p. 77. *Paederota lutea*. Lin. suppl. 84. Scop. Jacq. hort. 2. t. 121. Hab. in Carniolia, Italia. ☉

2. *Bonarota*, foliis subrotundo-ovatis, corollarum galea integra. W. Jacq. austr. 5. app. t. 19. *Paederota caerulea* Lin. suppl. 84. Mich. gen. 19. n. 1. t. 15. f. 1. (Var.) Hab. in alpihus Austriae, Carnioliae, Italiae. ☉

3. *minima*, foliis oblongis integris oppositis, floribus axillaribus oppositis, calycem dentibus intus hirsutis. Retz. obs. fasc. 5. p. 10. Hab. in India. Facies *Elatines Hydropiperis*. Retz. ☉

50. **WULFENIA**. *Cor.* ringens: labio superiore brevi integro; inferiore 3-partito, fauce barbata. *Cal.* 5-partitus. *Caps.* 2-locul.

1. *carinthiaca*. Jacq. miscell. 2 p. 62. tab. 8. fig. 1. Icon. rar. 1. t. 2. *Paederota Wulfenia*. Lamarck. encyclop. tab. 13. fig. 2. Hab. in summis alpihus Carinthiae solo pinguissimo. Folia radicalia obovata obtusa. Flores pedunculati, secundi, caerulei. ☉

51. **GLOBIFERA**. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-partita subbilabiata: lacinia superiore minore. *Filam.* incurva basi appendiculata. *Caps.* subglobosa polysperma.

1. *umbrosa*. Gmel. Syst. nat. Linn. 2. p. 32. *Micranthemum orbiculatum* Michaux For. Bor. Amer. 1. p. 10 t. 2. *Cal.* filiform. repentes. In ulis opacisque sylvarum Carolinae et Georgiae. Aug. floret.

52. **GRATIOLA**. *Cal.* 7-phyllus: exterior patulus. *Cor.* resupinata. *Filam.* 7. sterilia. *Caps.* 2-locular.

1. *officinalis*, fol. lanceolatis serratis, floribus pedunculatis. Oed. Flor. dan. t. 363. Willd. Spec. pl. 1. p. 102-106. Hab. in Europae humidiusculis. Erecta. ☉

β. *carolinensis*, caule ut plurimum simplicis, filamentis sterilibus nullis, capsula calyci subaequali. Michaux Flor. boreali-americana t. p. 6. G. *officinalis*. Hab. in Virginia et Carolina. Distincta?

2. *quadridentata*, fol. lanceolatis acutis. 4-dentatis: dentibus binis ad apicem longioribus, caps. calyce triplo brevioris. Michaux l. c. Hab. in Carol. inferiore.

3. *Anagallidea*, erecta glaberrima, caule 4-gono, fol. oblongo-ovalibus sub-

denticulatis flore brevioribus, calyce ebracteato. Mich. l. c. p. 7. Fol. obtusa. *Corol.* pallido-caerulescent. In humidis Carolinae.

4. *pilosa*, erecta ramosa pilosissima, fol. ovalibus subdentatis flore subsessili longioribus. Mich. l. c. C. peruviana traltheae. Hab. cum priore. *Caul.* utrinque linea prominula, pilis articulatis hirsutus. M.

5. *aromatica*, fol. lanceolatis serratis sessilibus, pedunculis unifloris, caulibus fistulosis suberectis. Lam. Encycl. Hab. in Malabar. *Tetrandra* L.

6. *Nonniera*, fol. oblongis integris, pedunculis unifloris fol. longioribus, caule declinato. Swartz. obs. p. 15 Jacq. obs. 1. p. 4. t. 1. Ehr. pict. 14. f. 2. Sloan. jam. 1. 125. f. 1. In agnoscis Antillarum et insulae Marchionis. Distincti generis? ☉

7. *repens*, fol. ovalis, caule repente calyce pentaphyllo, stylo bifido. Swartz procl. 174. Swartz Icon. p. 6. t. 3. Hab. in Jamaica, locis humidis. Differt a praecedente foliis tenuissimis nervosis. W.

8. *rotundifolia*, fol. ovatis trinerviis. Mont. 174. Rheed. mal. p. 111. t. 57. Hab. in Malabaricae arenosis.

9. *lucida*, caule ramoso diffuso radicante, fol. cordato-ovatis dentatis, pedunculis axillaribus fol. longioribus. Willd.

10. *veronicifolia*, caule repente, fol. ovato-lanceolatis acutis serratis, floribus terminalibus oppositis. Retz. obs. fasc. 4. p. 8. Pluk. mant. 167. t. 186. f. 2. Rumph. amb. 5. p. 160. t. 170. f. 2. Rheed. mal. p. 115. t. 57. Hab. in Indiae humidis. ☉

11. *hyssopioides*, fol. lanceolatis suberratis, articulo caulino brevioribus. Mart. 174. Pluk. a'm. 180. t. 193. f. 1. Roxb. 2. t. 128. Hab. in Tranquebariae et Comandellae agris oryzaceis. Caulis filiformis erectus, articulis fol. pluries longioribus.

12. *lobelioides*, caule subnudo stipulato, fol. oblongis integerrimis, panicula dichotoma, capsulis subglobosis. Retz. obs. bot. fasc. 4. p. 7. Prope Tranquebar. ☉

13. *trifida*, procumbens, fol. linearilanceolatis quaternis, apice dentatis, trifidisque, capsulis pilosis. Gratiola chamaedrifolia. Lamarck. encyclop. 3. p. 26. Rheed. mal. p. 165. t. 85. Hab. in Malabaricae arenosis. ☉

14. *virginica*, fol. lanceolatis obtusis subdentatis. Gron. virg. 6. Willd. sp. pl. Lin. p. 103. Hab. in Virginiae humidis.

15. *peruviana*, fol. ovato-lanceolatis serratis, floribus subsessilibus. Mill. dict. n. 3. F. Willd. peruv. 3. t. 7. Flor. peruv. p. 7. In Peru. Fol. submarina.

16. *grandiflora*, caulibus decumbentibus, fol. ovatis serratis, pedunculis oppositis, capsulis subulatis. Retz. obs. fasc. 4. p. 8. Hab. in India. Flor. magni.

17. *oppositifolia*, caule adscendente, fol. lanceolatis serratis, pedunculis oppositifoliis. Retz. obs. fasc. 5. p. 8. Hab. ad Tranquebar.

18. *pusilla*, caule simplicissimo, fol. ovatis crenatis acutis, peduncula axillariibus unifloris fol. longioribus. Willd. l. c. p. 105. In India ad scaturigines. Minutissima. ☉

53. BAEA. Cal. 4-5-partitus, (subtus in medio floris.) Cor. subringent. cymbiformis (labiis non inflatis.) Stam. incurva in medio corollae.

* BAEA. Juss. gen. pl. Caps. longo corniculata contorta, 2-locularis, 4-valvis.

1. *magellanica*, acaulis, fol. ovatis petiolatis integerrimis, scapo bifloro. Lam. encyclop. 1. p. 376. ill. t. 15. In rupibus humilibus freti Magellanici. Cor. caerulea. Lab. super. 3-dentatum; infer. planum 2-lobum. ☿

* JOVELLANAE. Flor. Peruv. Caps. ovato-conica, 2-sulca, 2-locularis, apice 2-valvis, valvulis bifidis.

2. *plantaginea*, acaulis, fol. ovatis serratis hirsutis, scapis unifloris. J. scapiflora Flor. peruv. 1. p. 13. t. 18. f. 6. Calceolaria plantaginea. Smith ic. ined. 1. p. 2. t. 2. Lam. encycl. 1. p. 550. In alpinis peruvianis, in America meridionali et ad fretum magellanicum. Cor. lutea. ☉

3. *punctata*, caulescens, pedunculis multifloris cymosis, fol. ovato oblongis duplicato-serratis. Flor. peruv. l. c. f. 1. In Peru, praesertim provinciae Concepti. Chili et Puchacay. Gaudet virt. depuratoria, in morbis veneris hinc utilissima. ☿

4. *alata*, caulescens, fol. oppositis ovato-acutis in petiolum alatum attenuatis, floribus paniculatis. Calceolaria petiolaris. Cav. hisp. 5. p. 30. t. 445. Hab. prope Guayaquil. Cor. bilabiata. Caul. herbaceus.

5. *violacea*, caule fruticoso, fol. oppositis ovatis dentatis, flor. terminalibus corymbosis. Cav. l. c. p. 31. t. 452. Cor.

campanulato-patens. In litore maris Talcahuani prope insulam Quiriquina. C.

6. *triandra*, fol. inciso-pinnatifidis, flor. triandris. Cav. hisp. 5. p. 32. t. 453. Hab. in Talcahuano. Caul. fruticosus. Conf. Flor. peruv. vol. 3. p. 21.

54. CALCEOLARIA. Cal. 4-partitus. Cor. 2-labiata: labium inferius maximum inflatum. Caps. ovata, 2-locularis, 2-valvis.

1. *pinnata*, fol. pinnatis pinnatifidisque. Willd. Sp. pl. 106. Flor. peruv. 1. p. 14. t. 29. f. p. 24. Crescit, uti pleraque species, quarum flores plerumque colore sunt luteo, Hab. in regno peruviano. ☉

2. *tripartita*, fol. tripartitis, pedunculis multifloris. Flor. peruv. 1. p. 14. t. 22. f. 2. Herbacea. In nemoribus.

3. *lobata*, caule erecto dichotomo, fol. cordatis 5-lobis. Cav. hisp. v. 5. p. 26. t. 443. f. 1. Hab. in siccis. Fol. tomentosa.

4. *tomentosa*, fol. cordato-triangularibus duplicato-serratis, subtus tomentosis, petiolis connatis. Flor. peruv. p. 25. t. 22. f. 6. Sequenti affinis. Crescit in umbrosis. ☉

5. *perfoliata*, fol. sagittatis, petiolis alatis perfoliatis. Flor. peruv. p. 15. t. 22. f. a. Smith ic. ined. p. 4. t. 4. In lapidosis. Viscosa. ☉

6. *corymbosa*, fol. radicalibus ovatis cordatisque petiolatis crenatis: caulibus semimplexicaulibus. Fl. peruv. p. 14. t. 20. f. b. In umbrosis urbis Concepcionis Chile et in montibus Cordillera. Hirsuta. Cor. lutea, lineis et punctis sanguineis variegata. Caul. simplex. ☉

7. *paralia*, fol. oblongo-ovatis tomentosis dentatis superioribus, connatis, radicalibus petiolatis, capsulis tomentosis. Cav. hisp. 5. p. 29. t. 447. Hab. prope oppidum chilense Parol.

8. *verticillata*, fol. verticillato-ternatis cordatis acutis serratis, pedunculis quadrifloris. Flor. peruv. 2. p. 27. Hab. in Cantae praeruptis. ☿

9. *bicolor*, hirsuta, fol. ternis oppositisque petiolatis venoso-rugosis biserratis, pedunculis multifloris dichotomo-umbellatis. Flor. peruv. p. 26. t. 25. f. b. In praeruptis. Cor. ad basin alba. ☿

10. *multiflora*, fol. verticillatis ternis subsessilibus serratis, flor. paniculatis. Cav. l. c. t. 449. In siccis. Affinis antecedenti. Cor. prope calicem angustissima est in hac et in tribus sequentibus speciebus.

11. *gemelliflora*, fol. petiolatis verticillatis ternis ovatis serratis, pedunculis ternis bifloris. Cav. hisp. 5. p. 30. t. 450. f. 1. Fol. glauca. Hab. in saxosis.

12. *terniflora*, fol. verticillatis ternis sublanco-latis serratis, pedunculis ternis trifloris. Cav. l. c. t. 450. f. 2. Caul. fusco-violaceus. Cum priore. An a *glauca* satis diversa?

13. *angustiflora*, fol. ovato-lanceolatis oppositis ternatisque venosis, pedunculis quadrifloris. Flor. peruv. p. 17. t. 28. f. 2. Fol. utrinque pubescentia. Cor. uti in 3 antecedentibus basi angustissima. Per totum fere annum floret in Cantae versuris. $\overline{\text{L}}$

14. *trifida*, fol. oppositis ternatisque coriatis et ovatis crenato-serratis, pedunculis trifidis umbellatis. Fl. peruv. p. 17. t. 26. f. b. Petioli connati. Febrifuga et antiseptica species. Hab. in Cheuchin locis umbratis prope aquas. $\overline{\text{L}}$

15. *virgata*, fol. oppositis ternatisque ovatis obtuse serratis, ramis flexuosis virgatis, pedunculis multifloris. Flor. peruv. p. 20. t. 31. f. a. *Melissae Calaminthae* habitu. Cor. parva punctis purpureis maculata. $\overline{\text{L}}$

16. *glauca*, fol. ternis lanceolatis serratis, pedunculis umbellatis 3-4-floris, corollis maculatis. Flor. peruv. p. 17. t. 27. f. c. Suffruticosa. Filam. basi lata. Hab. in Cantae circuito.

17. *uniflora*, fol. (saepè ternis) ovatis, pedunculis longis filiformibus unifloris. Flor. peruv. p. 16. t. 20. f. c. In umbratis Tarmae ad Curis. Flor. parvi. $\overline{\text{L}}$

18. *biflora*, fol. ovatis serratis crenatisque petiolatis, pedunculis geminis filiformibus unifloris. Flor. peruv. l. c. f. a. C. ovata. Smith fasc. 1. p. 3. t. 3. Copiose in arenosis altis Limaec. Caul. herbac. Fol. subius venosa.

19. *polyrrhisa*, fol. ovatis in petiolum alatum attenuatis, flor. umbellatis. Cav. p. 25. t. 441. Cor. punctis rubris variegata. In America meridionali.

20. *cana*, caule decumbente, fol. oppositis ovatis confertis crassis albo-lanatis, inferne attenuatis. Cav. hisp. 5. p. 27. t. 443. f. a. Rad. crassa. Caul. elongatus, nudus.

21. *racemosa*, fol. ovatis dentatis rugosis tomentosis, flor. terminalibus racemosis. Cav. p. 29. t. 448. Inter arbusta in Peru. Fol. opposita, prope basin numerosa.

22. *heterophylla*, fol. petiolatis ovatis

ellipticis subcordatisque serratis, pedunculis longissimis dichotomis. Flor. peruv. p. 16. t. 21. f. b. Hab. in Muna nemoribus. Hirsutissima, villis ferrugineis bifloribus. \odot

23. *cuneiformis*, fol. cuneiformibus ovatisque inciso-serratis. Flor. peruv. p. 19. t. 27. f. 6. Rami bracteati scabri ferruginei. Fol. masticata tineturam luteam praebent. In Cantae et Tarmae Alpibus. $\overline{\text{L}}$

24. *montana*, fol. radicalibus spathulatis. Cav. l. c. p. 27. t. 445. f. 1. Hab. in Cordillera chilensis.

25. *Fothergilli*, fol. spathulatis integerrimis, pedunculis scapitiformibus unifloris. Ait. hort. Kew. 1. p. 30. t. 1. Willd. Spec. pl. Linn. 1. p. 108. β *Cavanillei*, - fol. crenatis. Cav. p. 25. t. 442. f. 1. Hab. i insulis Falklandiae, β in Peru.

26. *flexuosa*, fol. cordatis crenatis pedunculis multifloris umbellatis. Flor. peruv. p. 19. t. 26. f. a. In praeruptis et aridis regni chilensis. Fol. superne, uti caulis, aspera, subius venosa. $\overline{\text{L}}$

27. *inflata*, caule laevi scandente, fol. ovatis acutis crenulatis, pedunculis inflexis 3-4-floris. Flor. peruv. p. 17. t. 25. f. a. Rami brachiatii. Petioli connati. Hab. cum priore. $\overline{\text{L}}$

28. *involuta*, fol. ovatis acutis serratis, corollis involutis calycem semitagentibus. Fl. peruv. p. 15. t. 23. f. a. In Panathuas nemoribus. $\overline{\text{L}}$

29. *bicrenata*, fol. ovatis bicrenatis subius tomentosis, corollis sulcatis. Fl. peruv. l. c. f. b. In Cuchero nemoribus. Cor. magna, quoad iconem, sulcata, subinvoluta, apice crenata.

30. *anomala*, cor. labio infsciore explanato apice crenato. C. *crenatiflora*, fol. ovatis, parce tomentosis, cor. 3-crenata. Cav. hisp. 5. p. 28. t. 446. Secundum figuram ab omnibus differt speciebus labio infscro non inflato s. calceiformi. In humidis St. Caroli de Chiloe inter montium radices et mare. An huius generis?

31. *oblonga*, caule erecto simplicissimo, fol. latis serratis, pedunculis trifidis, cor. intus punctatis. Fl. peruv. p. 15. t. 24. f. b. Rad. fasciculata. \odot

32. *punicea*, caule repente, fol. ovalibus serratis, cor. punicea. Fl. peruv. l. c. f. a. Rad. fasciculata fibrosa. Fol. superne glabra.

33. *viscosa*, fol. ovatis serratis viscosis. Fl. peruv. p. 18. t. 30. f. a. Planta suffruticosa, viscoso-resinosa, amara et, fol. tritis,

tritis, *Teucrium Narum* redolent. (loc. cit.) Hab. in Peruvia alpinis.

34. *dentata*, viscosa, fol. ovatis argute bidentatis. Fl. peruv. p. 18. t. 29. f. b. Fol. sapore amarissimo uti in cortice *peruviano* fere. Crescit in Conceptionis Chile sylvis, et in Paral vicinis. $\bar{\mathcal{U}}$

35. *deflexa*, fol. ovato-lanceolatis serrulatis, flor. terminalibus corymbosis, pedicellis 4-5-floris nutantibus. Flor. peruv. p. 18. t. 20. f. 6. Fol. deflexa. Cor. luteo-crocea. In humilis et inundata. $\bar{\mathcal{U}}$

36. *salviaefolia*, fol. lanceolatis bidentatis, petiolis connatis alatis, pedunculis dichotomis multifloris. *C. rufoa*. Fl. per. p. 19. t. 28. f. b. *Calceolaria salviaefolia* F. Will. peruv. 3. p. 13. t. 7. *C. integrifolia* Lin. Willd. spec. pl. p. 107. Cor. luteo-rosea. Fol. varia pro soli natura et plantae aetate. Cav. Hab. in *Conceptionis Chile* aridis et praeruptis. $\bar{\mathcal{U}}$

37. *salicifolia*, fol. lanceolatis serratis, pedunculis geminis terminalibus umbellatis dichotomisque. Flor. peruv. p. 18. t. 19. f. b. Caul. duplici cortice tectus; Rami subtetragoni: teneri viscoso-resinosi. Flor. magni. Hab. in Peruviae praeruptis et uliginosis. $\bar{\mathcal{U}}$

38. *sessilis*, fol. lanceolatis serratis semi-plexicaulis rugosis canescentibus. Flor. peruv. p. 18. pedunc. umbellati, longi. In locis aridis prope *Conceptionem Chile*.

39. *lanceolata*, parva, fol. lanceolatis integerrimis, pedunculis terminalibus multifloris solitariis. Cav. hisp. 6. p. 27. t. 444. f. 2. Lab. superius breve. Cresc. in America meridione, in insulis *Maclovianis*.

40. *pulverulenta*, fol. oblongo-lanceolatis dentato-serratis albidis, ramis canescente-pulverulentis. Fl. peruv. p. 18. Pedunc. axillares subquadrif. In Cantae praeruptis. $\bar{\mathcal{U}}$

41. *scabra*, fol. brevibus subovatis venoso-lineatis, caule aspero. Fl. peruv. p. 18. t. 29. f. a. Caul. 3-petal.; rami breves. Fol. margine revoluta. In praeruptis. $\bar{\mathcal{U}}$

42. *ferruginea*, fol. linearibus, margine revolutis subtus rufo-tomentosis, umbellis terminalibus bipis. Cav. p. 27. t. 445. f. 1. Fol. longa. Caul. durus, tomentosus. Hab. in inundatis in *Cordillera* mont. radicibus. Sequenti affinis.

43. *rosmarinifolia*, fol. linearib. integerrimis, margine revolutis, subtus tomentosis, caul. glabro Lam. encycl. meth. bot. 1. p. 556. Folia praesertim juniora viscosa, subtus albo-tomentosa. L. In Peru. An a praecedente satis diversa?

44. *alternifolia*, caule tomentoso, fol. linearibus alternis margine revolutis, sparsis, flor. pedunculatis, axillaribus trifloris. Cav. 1. c. p. 28. t. 445. f. 2. Fol. angustissima, enim floribus alternatim sparsis, caltus tomentosa. Cresc. in Regni peruviani siccis.

45. *pinifolia*, fol. confertis linearibus integris, margine revolutis subteretibus. Cav. 1. c. p. 26. t. 442. f. 2. Rad. crassa. Flor. terminales; pedunc. elongati, dichotomi. In monte *Cordillera*.

46. *alba*, fol. linearibus denticulatis, flor. racemoso-paniculatis. Flor. peruv. 1. p. 20. t. 27. f. 6. Planta suffruticosa, viscoso-resinosa, odore rosmarini. Fol. amara, ex axillis fasticulata habitu Pini. Flor. subthyrsoides. Frequens dicitur in collibus aridis *Rese* provinc. regn. *Chil.* $\bar{\mathcal{U}}$

Obs Botanicorum praesertim hispanicorum studio hujus generis species, quarum Linnaeo tantummodo 3 innoverunt, ad ingentem accreverunt numerum. Nonnullae tantummodo varietates videntur. Quamvis secundum icones, quae in opere *Cavanillesii* et in *Florae peruviana* et *chilensis* occurrunt, inter se collatas differant, posterioris operis (vid. vol. 3. p. xij) auctores de speciebus *Cavanillesii*, argumentis vero desiderandis, tamen pronunciant, plures easdem esse ab iis jam antea descriptas plantas.

55. *PINGUICULA*. Cor. ringens, calcarata. Cal. bilabiatus, 5-fidus. Caps. 1-locularis.

1. *Iusitanica*, scapo nutante pubescente, neetario conico-subulato, foliis reticulato-venosis, caps. globosa. Willd. spec. pl. p. 109. Sowerby engl. bot. 1. t. 145. Smith Fl. angl. 1. p. 26. *Pinguicula villora*. Lightf. scot. 1. p. 77. t. 6. f. 1. In Anglia, Lusitania et in Scotia. $\bar{\mathcal{U}}$

2. *vulgaris*, neetario conico recto longitudine petali, labio superiore bilobo, caps. ovata. Willd. 1. c. p. 110. Oed. dan. t. 61. In Europae uliginosis praesertim montosis. $\bar{\mathcal{U}}$

3. *grandiflora*, neetario subulato recto longitudine foris, labio superiore patente emarginato. Willd. Lamarck encyclop. 3. p. 21. tab. 14. fig. 3. In alpinis Galliae australior. Labium superius dilatatum emarginatum; inferius amplum trilobum. $\bar{\mathcal{U}}$

4. *elatior*, scapo pubescente, calyce glanduloso pubere, coroll. majusculae tubo inflato. Michx. Flor. p. 11. In palud. apricis Georg. et Carol. cor. smecthysteo rubens. Fol. ut in P. vulgari.

5. *campanulata*, scapo subvilloso, co-

rolla campanulata dentata, calcare recurvo-
Lamarck in Journ. d'Hist. nat. N. IX. p. 336.
t. 18. f. 1. Hab. in Carolina. Fl. flavus cre-
tus. Cal. villosus-pulverulentus. l.

6. *lutea*, scapo glabriusculo, cor. ma-
juscule : laciniis erenatis, calcare subfilifor-
mi tubum subaequante. Mich. l. c. In
pinetis Carol. infer. cor. lutea. Folia obo-
valia.

7. *alpestris*, nectario conico coroll. bre-
viore, labio superiore bilobato, interioris
laciniis lateralibus obtusis : intermedia
emarginata. Willd. in Nov. act. soc. Nat. 2.
t. 5. f. 1. (P. *purpurea*.) P. *alpina*. Schrank
primit. Salisb. n. 257. albus anliaburgen-
sibus. Flos recenti in statu *ochroleucus*.
Flörke in Hoppe Taschenb. 1800, purpu-
reus. Willd. l. c.

8. *alpina*, nectario conico gibbo adscen-
dente labio superiori emarginato, inferi-
ore laciniis truncatis. Willd. l. c. t. 5.
f. 3. Hab. in Europae Alpibus. Flos albus,
capsula rostrata. Sowerby engl. Bot. p. 145.

9. *involuta*, nectario conico longitudine
petali, scapo unifloro villosus, fol. ovatis
margine involutis. Flor. peruv. 1. p. 20.
t. 31. f. c. In altis frigidis et humidis regni
peruviani. Flos cernuus viol.

10. *villosa*, scapo strieto pubescente,
nectario subulato recto brevissimo, foliis
nervosis. Willd. spec. pl. l. p. 111. In.
Fl. Japon. p. 13. t. 12. f. 2. In Lappo-
nia et Siberia. P. *vulgari* sextuplo minor,
caps. compressa.

11. *acutifolia*, pusilla glabra, fol. crecto-
rosulacis sessilibus ovalibus acutissimis.
Mich. Flor. 1. p. 11. Circa lacus Mistassins.

12. *pumila*, scapo brevi glabro, co-
rolla oblongiuscula tubulata, calcare tubo
breviore. Mich. l. c. In humidis Georgiae.
Cor. parva, dilute violacea.

56. **UTRICULARIA**. Cal. 2-phyl-
lus aequalis. Cor. ringens calca-
rata. Caps. 1-locularis.

1. *grandiflora*, nectario subulato, fol.
ovatis integerrimis. U. *montana* Jacq.
Amer. pict. t. 8. U. *alpina* Lin. Willd.
spec. pl. 1. p. 111. Hab. in Martinicae
alpinis. Flos albus, maximus.

2. *unifolia*, scapo squamato unifloro,
calyce (maximo) corollato, fol. radicali
unico laucellato. Fl. peruv. 1. p. 20. t. 31.
f. b. In Punao montib. altis.

3. *furcata*, aphylla, scapo 2-4-floro
squamis totidem apice furcato. U. *aphylla*.
Fl. peruv. l. c. f. d. p. U. *tenuis*, scapo

sesquipollicem alto unifloro. Cav. icon. 5.
p. 24. t. 440. f. 2. vid. Ruiz in Flor. per-
vol. 4. p. xi. Hab. in regni peruviani
inundatis.

4. *cornuta*, aphylla, scapo rigido sum-
mitate bifloro, cor. labio inferiore am-
plissimo, calcare porrecto acuto. Michaux
Flor. amer. 1. p. 12. Hab. in Canada.

5. *setacea*, aphylla minuta, caule te-
nui setaceo 2-3 floro : floribus pedicellatis,
calcare longiusculo. Michaux. In udis Ca-
rolinae inferioris.

6. *hispida*, scapo filiformi paniculato in-
ferne hispido, fol. linearibus subulatis. Lam.
illustr. 1. p. 50. Hab. in Cayenna. Rich.

7. *foliosa*, nectario conico : fructibus
cernuis, radiculis utriculis destitutis. Lin.
Loess. iter. p. 231. Plum spec. 6. ic. 165.
f. 2. In America australi. Rad. repens.

8. *vulgaris*, nect. conico, labio supe-
riore integro palato aequali, fol. pinnato-
multifidis, laciniis capillaribus. Heyne in
Schrud. Journ. bot. 1800. p. 17. t. 6. f. A.
Hab. in aquis stagn. Utriculi foliis ad-
haerent. U.

9. *intermedia*, nect. conico, labio su-
periore integro palato duplo longiore,
fol. 3-partitis : lacini. capillaribus dichotomis.
Heyne l. c. p. 18. t. 5. U. *minor*.
Flor. dan. t. 128. Rarius in inundatis
Iunio. Germen subrotundo-ovatum.

10. *minor*, nect. carinato, labio su-
periore emarginato, palato aequali, fol.
tripartitis, laciniis capillaribus dichotomis.
Heyne l. c. p. 22. t. 6. f. B. Cum antee-
dentibus.

11. *obtusata*, nectario inflexo obtuso sub-
emarginato. Swartz. Flor. Ind. occid. 1.
p. 41. Hab. in rivulis Jamaicae. Flor.
parvi. Palat. sulcum : striis purpurasc.
capsula subrotunda.

12. *ceratophylla*, fol. ad superficiem
aquae aeno-verticillatis pinnatifidis : laci-
niis capillaceo-multipartitis, flor. subco-
rymbosis. Michaux l. c. p. 12. In stagnia
Carolinae inferioris.

13. *subulata*, nectario subulato. In Vir-
ginia. Flores albi.

14. *gibba*, nectario gibboso, scapo nunc
unifloro, nunc bifloro. Gron. virg. 12.
Cum priore.

15. *bifida*, scapo nudo bifido. Osb. it. 243.
t. 3. f. 2. In China.

16. *capillacea*, scapo nudo capillari
subtrifloro, floribus notantibus, capsula

subulata. Willd. l. c. p. 113. In Indiae locis acaturiginosis. Planta vix uncialis, radice nuda subramosa. \bar{L}

17. *caerulea*, scapo nudo, squamis alternis vagis subulatis. Fl. 7ecl. 23. Rheed. mal. 9. p. 137. t. 70. In Zeylona.

18. *stellaris*, verticillo utriculario bractearum ciliari. Lin. suppl. 86. In Indiae agris oryzaceis, in aquosis profundioribus. Corol. destitutae nectario: labio inferiori saecato.

57. **JUSTICIA.** *Cal.* simplex duplexve. *Cor.* 1-petala ringens aut subaequalis. *Caps.* ungue elastico dissiliens: *dissepimentum* contrarium adnatum. (Flor. bracteati.)

* *Calyce duplici. Monantherae.*

1. *fastuosa*, thyras terminalibus, floribus secundis, foliis lanceolato-ellipticis. Vahl. symbol. 2. p. 11. Willd. Sp. p. 79. Hab. in Tranquebaria. \bar{h}

2. *Forskælei*, thyras axillaribus terminalibusque, fol. ovatis acuminatis. Vahl. l. c. 2. p. 13. In Arabia felici et India. \bar{h}

3. *purpurea*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis lanceolatis glabris, ramis pulcherrimis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Rumph. amb. 6. p. 52. t. 22. f. 2. Hab. in China.

4. *verticillaris*, villosa, floribus axillaribus verticillatis, calycibus exterioribus muticis, foliis ovatis. Vahl. 3. p. 13. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *aristata*, villosa, floribus axillaribus verticillatis, calycibus exterioribus aristatis, fol. ovatis. V. 2. p. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *chinensis*, pedunculis axillaribus verticillatis trifloris, bracteis ovatis mucronatis basi coloratis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Burm. ind. 8. t. 4. f. 1. Hab. in China et Arabia felici, locis aquosis.

7. *triflora*, pedunculis axillaribus elongatis trifloris, bracteis lineari-lanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Hab. in montibus Arabiae felicis.

8. *serpens*, floribus axillaribus solitariis, caule repente. Vahl. 2. p. 2. In insula St. Mauritii. Variat foliis rotundioribus.

** *Calyce duplici. Diantherae.*

9. *sulcata*, spicis terminalibus, floribus verticillatis, foliis ovato-cordatis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Hab. in Arabia felici Perianthium exterius quadripartitum.

10. *malabarica*, paniculis axillaribus dichotomis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Justicia (ligulata) foliis ovatis acutis: floribus paniculatis bicalyculatis, lacinia dorsali majore. Cavan. icon. 1. p. 52. t. 71. *Dianthera malabarica*. Lin. suppl. 85. In graminosis Malabaricae, et Arabiae.

11. *bivalvis*, pedunculis axillaribus trifloris, pellicellis lateralibus bifloris, bracteis ovatis aristatis nervosis. Vahl. 2. p. 13. Sp. pl. 23. Rumph. amb. 6. p. 51. t. 22. f. 1. Hab. in Arabia et India. \bar{h}

12. *falcata*, floribus axillaribus subsessilibus, fol. ovato-lanceolatis. Willd. Sp. 83. *J. falcata*, dianthera fruticosa, fol. ovato-lanceolatis petiolatis, floribus bicalyculatis, labio superiore corollae longissimo. Lam. encyclop. 1. p. 622. Hab. in insula Mauritii. \bar{h}

*** *Calyce simplici, corollis bilabiatiss: labiis indivisis*

13. *sexangularis*, pedunculis trifloris, bracteis cuneiformibus, foliis ovatis Vahl. symbol. 1. p. 13. *J. annua* sexangulari caule, foliis Circæae conjugatis, flore miniat. Amm. herb. 274. Hab. in Vera cruce, Jamaica. \odot

14. *scorpioides*, fruticosa, fol. lanceolato-ovatis hirsutis sessilibus, spicis recurvatis. Lin. Sp. plant. 21. Banks Reliq. Hoopst. p. 3. t. 1. Hab. in Vera cruce. \bar{h}

15. *gangetica*, foliis ovatis, racemis simplicibus longis, floribus alternis secundis, bracteis obsoletis. Willd. 1. p. 83. Burm. ind. 9. tab. 4. fig. 2. Hab. in India.

16. *assurgens*, spicis axillaribus terminalibusque ramosis, floribus alternis, bracteis linearibus. Vahl. 2. p. 13. Justicia assurgens, fol. ovatis integerrimis, bract. subulatis, ramis hexagonis. Amoen. acad. 5. p. 391. Brown. Jam. 110. t. 2. f. 1. Hab. in Jamaica et in insula St.-Crucis.

17. *humilis*, herbacea assurgens, fol. ovali-lanceolatis, bract. minutissimis, flor. subbinis, capsula compressa pedunculata. Michx. Flor. 1. p. 8. In sylv. paludib. 2. Carolina ad Floridam. Basi repens.

18. *lineata*, herbacea, fol. ovatis acutis lineolis pellucidis, pedunculis terminalibus paniculatis, flor. spicatis. Flor. Per. 1. p. 9. t. 13. f. 2. In nemoros. ad Cuchero vicum.

**** *Calyce simplici, corollis bilabiatiss: labiis divisis. Monantherae.*

19. *hispida*, pedunculis terminalibus multifloris, calycinis foliolis et bracteis

lineari-subulatis ciliatis, foliis oblongo-lanceolatis, ramis hispidis-pubescentibus. Willd. p. 84. In Sierra Leona. Flores albi in corymbo brevi terminali.

20. *Ecbolium*, spicis terminalibus tetragonis, bracteis ovatis imbricatis ciliatis mucronatis, corollarum galea lineari reflexa Vahl. symbol. 2. p. 14. Burm. zeyl. 7. t. 4. f. In Arabia, Malabar, Zeylon. Anthera ad refracturam latius superiora. L. h

21. *tetragona*, spicis terminalibus tetragonis, bracteis ovatis quadratariam imbricatis carinatis ciliatis, foliis renatis glabris. Vahl. symbol. 3. p. 5. Hab. in Cajenna. h

22. *coccinea*, spicis terminalibus, foliis bracteisque ellipticis margine nudis, corollarum galea lanceolata apice reflexa. Vahl. symbol. 3. p. 6. J. *coccinea*, fruticosa, corollis bilabiatis; labio superiore indiviso, foliis bracteisque spicarum ellipticis acuminatis, antheris parallelis. Aiton Kew. 1. p. 26. Smith. icon. p. 8. In Cajenna ad ripas. h

23. *pulcherrima*, spicis terminalibus axillaribusque, bracteis ovatis imbricatis ciliatis muticis, corollarum galea lanceolata bifida erecta. Vahl. 2. p. 14. Jacq. amer. p. 6. t. 2. f. 4. Leon. rar. In America calidiore. h

24. *carthagenensis*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis oblongis imbricatis ciliatis. Vahl. 2. p. 14. Jacq. amer. 11. t. 5. In Carthagna, Martinica. h

25. *hirsuta*, spicis axillaribus terminalibusque tetragonis, bracteis ovatis imbricatis hirsutis, foliis dentatis. Vahl. symbol. 2. p. 3. Hab. in Java.

26. *sphaerosperma*, spicis axillaribus oppositis utrinque geminis, bracteis linearibus elongatis, seminibus globosis nudiis. Vahl. symbol. 2. p. 3. Hab. in Caribaris.

27. *Gendarussa*, spicis terminalibus foliosis, floribus verticillatis, foliis lanceolatis elongatis. Vahl. symb. 2. p. 14. Lin. suppl. 85. Gendarussa socra. Rumph. amb. 4. p. 20. t. 28. et p. 72. t. 29. In Zeylona, Java, Malabar. h

28. *procumbens*, spicis axillaribus terminalibusque, calycibus tetraphyllis ciliatis, bracteis longitudine calycis, foliis lanceolatis. Pluk. alm. 142. t. 56. f. 2. Hab. in Zeylona. h

29. *diffusa*, spicis axillaribus terminalibusque, calycibus tetraphyllis glabris, bracteis calyce brevioribus, foliis ellipticis. Willd. p. 87. Euphrasia sinica Parnetariae

foliis rubiae modo spicatis. Pluk. alm. 83. t. 392. f. 4. Hab. in India. h

30. *echinoides*, spicis axillaribus oppositis secundis ascendentibus linearibus hirsutis. Vahl. 2. p. 14. Euphrasiae affinis in-lia echinoides. Heron. lugh. 668. t. 66. In Malabar, Zeylona subimidis. h

31. *longifolia*, spicis axillaribus geminis oppositis secundis, foliis lanceolatis elongatis. Vahl. symbol. 2. p. 4. Hab. in insula Mahé.

32. *latifolia*, spicis terminalibus subramosis, floribus inferioribus verticillatis, foliis ovatis acuminatis. Vahl. symbol. 2. p. 4. Hab. in India orientali. h

33. *picta*, racemis axillaribus terminalibusque, floribus verticillatis, foliis ovatis pictis. Vahl. symbol. 2. p. 14. Justicia *picta* fruticosa, foliis lanceolato-ovatis pictis, corollis lauce inflatis. Sp. pl. 21. Rumph. amb. 4. p. 73. t. 10. Hab. in Asia. Foliorum drcus macula lucida. h

34. *nitida*, racemis terminalibus subramosis, floribus subverticillatis, foliis lanceolato-ellipticis utrinque attenuatis. Vahl. symbol. 2. p. 5. Swartz. prodr. 13. Hab. ad ripas torrentium insularum Martiniacae, St. Crucis, Guadelonpae. h

35. *rubra*, racemis terminalibus solitariis, bract. setaceis, fol. lanceolatis. Vahl. Eclog. amer. Fasc. 2. Hab. ad St. Northam. Fol. angustiora quam in J. *bracteolata* Jacq. h

36. *variegata*, spicis terminalibus axillaribusque simplicibus, floribus oppositis, calycibus hispidis, foliis ovatis sessilibus. Aubl. guj. 1. p. 12. t. 4. Hab. in Gujanac sylvis. h

37. *stricta*, racemis axillaribus bipartitis, floribus secundis, foliis lanceolato-ellipticis, filamentis glabris. Vahl. symbol. 2. p. 6. Hab. in Malabar.

38. *paniculata*, paniculis axillaribus terminalibusque dichotomis, floribus secundis, filamentis hirsutis, capsulis compressis, foliis lanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 5. Rheed. mal. 6. p. 106. tab. 56. Hab. in India orientali. Differt ab omnibus mihi notis, capsulis plano-compressis undique ejusdem latitudinis nec basi angustatis. V.

39. *nutans*, racemis terminalibus, apice nutantibus, floribus resupinatis, foliis dentatis. Vahl. symbol. 2. p. 6. Burm. ind. 10. tab. 5. fig. 1. Hab. in Java.

40. *nasuta*, foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pedunculis dichotomis, cor.

galea linear erecta. Sp. pl. 23. Rheed. mal. g. p. 135. t. 6. flab. in India h

41. *scandens*, pedunc. axillaribus trichotomis divaricatis, foliis ovatis acuminatis subrepandis, ramis villosis. Vahl. symb. 2. p. 7. In Malabar. Affinis *J. nasutae*. h

42. *ciliaris*, herbacea hirta, fol. lanceolatis, flor. oppositis sessilibus, bracteis calycibusque setaceis hispitis flore longioribus. Lin. suppl. 84. Jacq. hort. 2. p. 7. t. 104. ☉

**** *Calyce simplici, cor. bilabiatis, labiis divisis. Diantherae.*

43. *secunda*, racem. terminalibus compositis: racemulis secundis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis. Vahl. symbol. 2. p. 7. In insula Trinitatis.

44. *debilis*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis ovatis imbricatis ciliatis. Vahl. symbol. 2. p. 15. In Arabia felici. h

45. *violacea*, spicis terminalibus, bracteis lanceolatis imbricatis ciliatis, foliis lanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 15. Cum priore. h

46. *bracteolata*, racemo terminali, pedunculis trifloris, foliis utrinque attenuatis oblongis, caule tetragono, margine scabro. Willd. p. 91. Jacq. coll. 3. p. 253. Icon. rar. Ad Caracas in America. h

47. *Pohrii*, spicis terminalibus compositis imbricatis pubescentibus, bracteis ovatis, fol. ellipticis integerrimis. Vahl. symb. 3. p. 6. In Cayenna.

48. *polystachia*, spicis axillaribus oppositis secundis, bracteis ovatis hirsutis, fol. lanceolato-ovatis. Vahl. 2. p. 7. t. 26. In Cayenna.

49. *retusa*, spicis terminalibus, bracteis obovatis subretusis imbricatis, fol. ovatis acuminatis. Vahl. symb. 2. p. 8. In insula St. Crucis.

50. *flava*, spicis terminalibus, flor. geminis, bracteis lanceolatis obtusis, foliis lanceolato-oblongis. Vahl. symb. 2. p. 15. In Arabia felici. h

51. *pedunculata*, glabra, caul. herbaeis erectis, fol. erectis linearis-lanceolatis utrinque angustatis, spicis alternis longissime pedunculatis paucifloris. Michx. Flor. t. p. 7. Dianth. americana. L. In littoribus inundatis fluminum Ohio, Mississipi. etc.

52. *punctata*, spicis terminalibus, flor. remotis subverticillatis, bracteis lanceolatis

acuminatis, fol. lanceolato-ovatis. Vahl. 2. p. 15. flab. in Arabia felice.

53. *eustachiana*, spicis axillaribus terminalibusque, floribus inferne geminis, superne solitariis, bracteis cuneatis. Vahl. 2. p. 15. Jacq. amer. p. 4. t. 4. In insula St. Eustachii. Flor. saepe gemini, vel 3 intra involucrum 6-phyllum. V. h

54. *caracasica*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis acuminatis calyce brevioribus, foliis ovatis acuminatis undulatis pubescentibus. Willd. p. 93. Jacq. Collect. 4. p. 116. Icon. rar. flab. ad Caracas in America. h

55. *pectoralis*, panicula terminali dichotoma. Vahl. symbol. 2. p. 15. J. caule herbaceo ascendente, fol. lanceolato linearibus subpaniculatis. Swartz. prodr. 11. Jacq. amer. 3. t. 3. In Domingo, Martinica. h

56. *comata*, spicis terminalibus filiformibus, spiculis verticillatis. Vahl. symb. 2. p. 15. Antirrhinum minus angustifolium, flore dilute coerulesco. Sloan. jam. 49. hist. t. p. 160. t. 107. f. 2. In aquis et humidis Jamaicae. h

57. *undulata*, pedunc. terminalibus umbellatis simplicibus trifidisque, fol. lanceolatis undulatis. Vahl. 2. p. 8. Burm. ind. 12. tab. 5. f. 1. In Java, Malacca.

58. *frondosa*, umb. axillaribus compositis pedunculatis, pedunculis elongatis, bracteis obovatis rhombicis obtusis glabris. Vahl. 2. p. 8. In insula Otahiti.

59. *pubescens*, pedunc. axillaribus oppositis quadrifloris pedicellatis, bracteis ovato-subrotundis mucronatis pubescentibus. Vahl. symb. 2. p. 9. In Botantes insula australi. h

60. *cuspidata*, pedunc. axillaribus verticillatis subtrifloris pedicellatis, bracteis cuneatis aristatis, antheris geminis. Vahl. 2. p. 9. Forst. descr. 9. 22. In Arabia felici. Similis *chinensi* ut scire mera varietas: differt modo figura bractearum et numero ant.erarum. Vahl.

61. *lithospermifolia*, pedunc. axillaribus verticillatis unifloris, bracteis linearilanceolatis, foliis oblongis scabris. Willd. p. 95. Jacq. hort. Schoenbrun. flab. h

62. *biflora*, pedunc. axillaribus bifloris foliis ovatis aequantibus, bracteis subulatis. Vahl. 2. p. 9. In India orientali. h

63. *pauciflora*, flor. axillaribus scasilibus solitariis, fol. ovatis, caule erecto. Vahl. eclog. p. 1. In ins. St. Crucis.

64. *sessilis*, flor. axillaribus solitariis sessilibus, foliis ovatis crenatis. W. Sp. 93. Sp. plant. 1661. J. *sessilis*. Jacq. amer. 3. tab. 2. fig. 2. In insulae St. Eustachii sepius et fruticetis. h

***** *Calyce simplici; cor. ringentibus. Monantherae.*

65. *Adhatoda*, arborca, fol. lanceolato-ovatis, bracteis ovatis nervosis persistentibus, coroll. galea concava. Flor. tryl. 16. Herm. lugdb. 632. t. 64. Pluk. alm. 9. t. 173. f. 3. In Zeylona. h

66. *Betonica*, spicis terminalibus, bract. ovatis acuminat. venoso-reticulatis coloratis. Rheed. mal. 2. p. 126. t. 22. In India. h

67. *repens*, spic. axillaribus terminalibusque glabris, bract. dorsolibus bifariis margine membranaceis. Vahl. 2. p. 16. *Adhatoda* spicata, flosculos ex foliolis membranaceis. Burm. Zeyl. 7. t. 3. f. 2. In Zeylona. h

68. *sanguinolenta*, pedunc. axillaribus solitariis unifloris alternis, fol. oblongis, caule repente. Vahl. 2. p. 10. In umbrosis Zeylonae. Tota colore sanguineo. V.

***** *Calyce simplici, cor. ringentibus. Diantherae.*

69. *peruviana*, fol. ovatis acutis, spicis brevibus axillaribus et terminalibus, flor. tribracteatis. Cavan. Icon. 1. p. 17. t. 29. Lamarck. encyclop. 1. p. 626. In Lima. h

70. *Ryani*, pedunc. axillaribus terminalibusque oppositis trifloris, bracteis linearibus, fol. ovato-lanceolatis attenuatis. Vahl. Eclog. amer. Fasc. 1. p. In Montevideo legit Nyan. J. *peruviana* affinis. V.

71. *crinita*, pedunc. axillaribus alternis subquadrifloris pedicellatis, bracteis lanceolatis, ciliatis. Vahl. 2. p. 16. Thunb. Aet. Lín. Lond. 2. p. 338. Jap. 21. t. 4. In Japonia. ©

72. *trisulca*, pedunc. axillaribus subtrifloris, flor. sessilibus, foliis oblongis obtusis. Vahl. symbol. 2. p. 10. In Arabia felici. h

73. *hyssopifolia*, pedunc. axillaribus subunifloris, fol. lineari-lanceolatis obtusis. Vahl. symb. 2. p. 16. Just. fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, pedunculis trifloris ancipitibus, bracteis calyce brevioribus. Spec. plant. 21. Mill. diet. t. 13. Pluk. alm. 132. t. 280. f. 1. Habitat in Canariis. h

74. *periplocifolia*, florib. axillaribus

solitariis subsessilibus, fol. ovatis acuminatis. Willd. sp. 1. p. 98. Jacq. collect. supp. p. 5. t. 7. f. 2. Ad Carracas in America torrida. J. *peruviana* varietas.

75. *orchitoides*, pedunculis unifloris axillaribus, foliis lanceolatis rigidis utrinque acutis. Vahl. symbol. 2. p. 10. Lín. suppl. 85. Ad Cap. b. spei. h

76. *madurensis*, pedunculis axillaribus unifl., fol. oblongis dentatis. Vahl. 2. p. 17. Burm. ind. 9. t. 4. f. 3. Petiv. gazoph. t. 2. f. 8. In Madura. h

77. *cuneata*, flor. axillaribus solitariis sessilibus, fol. obovatis emarginatis. Vahl. symb. 2. p. 10. Ad Cap. b. spei. h

78. *tranquebariensis*, flor. axillaribus solitariis sessilibus, fol. obovatis, ramis incanis. Vahl. symb. 2. p. 17. Lín. suppl. 85. J. *parvifolia*. Lam. encyclop. 1. p. 620. In Tranquebaria. h

79. *odora*, flor. axillaribus sessilibus oppositis, foliis subrotundis, ramis glabris. Vahl. symb. 2. p. 11. Hab. in Arabia felici. Frutex cortice cinereo, ramosus.

***** *Calyce simplici, cor. subaequalibus.*

80. *infundibuliformis*, spicis terminalibus, foliis lanceolato-ovatis quaternis. Vahl. 2. p. 17. Rheed. mal. 9. 121. tab. 62. In India. Corolla speciosa alba. h

81. *sinnata*, pedunc. axillaribus trifidis, fol. linearib. sinuato-pinnatifidis. Vahl. 3. p. 11. Forst. prod. n. 13. In insula Tanna. Folia triplicaria vel ultra. h

82. *vincoides*, pedunculis axillaribus subunifloris, foliis ovatis, caule inermi. Willd. p. 100. Lam. encyclop. 1. p. 621. In Malagascaria. Planta ramis parum verrucosis. h

83. *spinosa*, pedunc. subunifloris, foliis (fasciculatis) oblongis, spicis axillaribus. Vahl. symb. 2. p. 17. Swartz obs. 12. Jacq. amer. 2. tab. 2. f. 1. In America meridionalis calcaris maritimis. h

84. *microphylla*, foliis aggregatis oblongis subcuneatisque, pedunc. unifloris longitudine foliorum, spinis axillaribus brevissimis rigidis. Vahl. erlog. amer. 2. Lam. encyclop. p. 37. Hab. in insula St. Crucis. h

85. *armata*, fruticosa aculeata; folii oblongi emarginati coriacis nitidis. Swartz prod. 1. p. 13. Ej. Flor. p. 28. In rupibus montium Jamaicae septent. Fl. cocciaci. Acul. gemini. An var. prioris? h

86. *acicularis*, fruticosa diffusa spi-

nota: spinis setaceis, flor. pedunculatis axillaribus solitariis. Swartz. l. c. p. 11. Fl. p. 29. Hab. in calcar. fruticetis Jamaic. austral. Flor. parvi albidii.

Obs. Willdenovium, praecunte Vahl. secutus sequentes species seorsim enumerare melius duxi, quam male collocare, cum auctores affinitatem cum jam cognitis speciebus haud adnotaverint.

* *Justicia*.

87. *spicata*, herbacea, fol. lanecolato-oblongis, apicis oblongo-ovatis, bracteis inflexis. Flor. peruv. l. p. 8. t. 9. f. a. In *Pogozo* nemoribus. Cor. longissima punicea. η

88. *mucronata*, fol. oblongo-ovatis dentato-spinosis. Fl. P. t. 10. f. b. In Peruviae nemoribus. Spica terminal. fere pedalis.

89. *longistaminea*, herbacea, fol. sessilibus oblongis utrinque acutissubrepandis, pedunculis dichotomis. Flor. p. 1. p. 8. t. 10. f. 2. In Pilluo nemoribus. Fl. purpurei.

90. *sericea*, fruticosa, fol. lanceolatis aericis, margine reflexis, pedunc. axillaribus solitariis. Flor. P. t. p. 9. t. 9. f. 8. Hab. in aridis et agrorum versuris peruvianis. Cor. magn. extus hirsuta coccinea. Ad pleuritidum usurpatur.

91. *racemosa*, herbacea, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. dichotomis, flor. racemosi. Fl. p. l. e. t. 11. f. b. In Peruviae nemoribus. Cor. punicea, 2-labiata. Υ

92. *tenuiflora*, herbacea, foliis lanceolatis, panicula terminali brachiata dichotomaque, flor. sessilibus. Fl. p. p. 9. t. 12. f. a. Ad Cuchero vicum in nemorosis. Cor. longiss. angusta 2-labiata. Υ

** *Dianthera*.

93. *multiflora*, herbacea, fol. oblongis, ped. ternis, 2-4-fidis, flor. 2-3 in singulis binis bracteis. Fl. p. 1. p. 10. t. 14. f. b. sub genere *dianthera* uti sequentes hujus operis species. In umbrosis Peruviae. Cor. ringens. Fol. edulia sunt. Rad. ad mundificandos dentes inservit. \odot

94. *repens*, suffruticosa, foliis ovatis acutis, pedunculis solitariis geminisque 4-5-fidis, flor. 2-3 in singulis binis bracteis. Flor. peruv. t. 15. f. b. In rupium fissuris Limae, etc. Bractee glandulosae. Flores rubri, passim lutei.

95. *acuminata*, herbacea hirsuta, fol. oblongo-lanceolatis acuminatis, verticillis subsessilibus multifloris, bracteis ciliatis.

Flor. p. t. f. 166. In Huannuci et Huaruae circuitu ad margines segetum per totum annum floret. Incolae mucilaginem plantae ad condiendum cili (*locro* nominati) genus extrahunt.

96. *cuspidata*, herbacea, hirsuta, fol. ovatis mucronatis, flor. verticillatis, bracteis ovatis ciliatis mucronatis. Fl. P. p. 11. t. 16. f. a. Crescit cum priore, cui similis. Faux dilatata.

97. *hirsuta*, herbacea, hirsutissima, fol. ovatis acutis, pedunculis geminis, flor. duobus in singulis binis bracteis. Fl. p. t. p. 11. t. 13. f. b. In Peruviae nemoribus. Folia tincturam caeruleam, uti *Indigofera Anil*, praestant. l. c.

98. *secundiflora*, herbacea, fol. lanceolato-oblongis obsolete crenatis, pedunculis solitariis polysachiiis, flor. secundis. Fl. p. p. 11. t. 15. f. a. Hab. in *Pogozo* nemoribus. Planta colorans.

Obs. Antherae in haec et a sequentibus specibus caudatae sunt.

99. *ciliata*, herbacea, fol. lanceolatis, flor. spicatis confertis, bracteis calycibusque ciliatis. Fl. p. p. 12. t. 14. f. a. Crescit cum priore. Cor. purpureo-violacea.

100. *appendiculata*, herbacea, foliis lanceolatis undulatis, basi appendiculatis, pedunculis solitariis ternisque 3-5-fidis parallelis. Flor. peruv. p. 12. t. 17. f. a. Hab. in isleriis cum a antecedentibus locis. Cor. purpurea, calyce duplo longior.

58. *ELYTRARIA*. *Cal.* coriaceus, 4-partitus: lac. antica fissa. *Cor.* 5-fida: laciniis subaequalibus. *Filam.* 2-castrata. *Stigmata* ligulata. *Caps.* oblonga, 2-locularis, 2-valvis: valvis semiseptiferis. (*Scapus radicalis bracteatus.*)

1. *carolinensis*, fol. superne integris, nervis sultus glabris. *El. virgata*. Michaux Flor. t. p. 9. t. 1. *Tubiflora* carolinensis. Gmel. S. N. L. 2. p. 27. Crescit in humilis Carolinae inferioris. Scapi longissimi.

2. *indica*, fol. crenatis, nervis subtus villosis. *Justicia* acaulis. Lin. Vahl. symb. 2. p. 3. Pluck. Amalth. t. 458. f. 1. In Tranquebaria.

3. *imbricata*, acaulis fol. lanceolatis integerrimis, squamis floriferis 3-dentatis. Vahl. Eclog. amer. 1. p. 1. et Icon. 2. 2. Antecedentis laeie. Rad. in summitate non lanata. V.

59. **SANCHEZIA.** *Cal.* 5-partitus : laciniae obtusae. *Cor.* tubulosa, lacin. aequales. *Filam.* 2 castrata. *Anth.* calcaratae. *Stigm.* 2-fidum. *Caps.* oblonga, 2-locular., 2-valvis. (*Flor. involucrat.*)

1. *hirsuta*, foliis ovatis utrinque acuminate, corol. hirsuta. *S. oblonga.* *Flor. peruv.* 1. p. 7. t. 8. f. b. In Peruviae stagnantibus et umbrosis. *Flor.* ut in sequente flavi.

2. *glabra*, fol. ovatis, coroll. glabra. *S. ovata.* *Flor. per. l. c. f. c.* Cum priore. *Pl.* herbacea uti prior.

60. **LYCOPUS.** *Cal.* tubulosus. *Cor.* tubulosa subaequalis : lacin. unica emarginata. *Stam.* distantia.

1. *exaltatus*, foliis basi pinnatifido-serratis. *Lin. suppl.* p. 87. In Italia et Hungaria. *Caule.* altissimus. *Cor.* 4-fida, rubro-punctata. $\overline{\text{T}}$

2. *vulgaris* (*europaeus* L.), foliis sinuato-serratis appendiculatis. *Hall. helv.* n. 220. *Curt. Flor. Lond. fasc.* 3. t. 2. *Fol.* subtus resinoso-punctata, menthis affinis. In lacubus, ad ripas; etiam in America. β . *Fol.* tenuis laciniosis. *Pluckn. alm.* t. 43. f. 1. $\overline{\text{T}}$

3. *virginicus*, fol. lato-lanceolatis serratis basi integra angustatis, calycibus brevissimis muticis. *Michaux Flor. carol.* p. 14. In Nova Anglia ad Carolinam. $\overline{\text{T}}$

4. *uniflorus*, pusillus, radice tuberosa, fol. ovalibus simplicib. obtusis sublentatis. *Michaux loc. cit.* Ad lacus St. Johan. et Mistassins. Axillae uniflorae.

61. **AMETHYSTEA.** *Cal.* campanulatus. *Cor.* tubulosa subbilabata : lacin. infima patentiore concava. *Stam.* approximata.

1. *corymbosa* (*caerulea* Lin.). *Ame-thystina montana*, fol. exiguis digitatis 3-fidis serratis, flosc. cum coma et caeruleo jaethinis. *Amman Flor. ruthen.* p. 70. *Hall. act. up.* 1742. p. 51. f. 1. In Sibiriae montosis. \odot

Obs. Nōmine generico jam colorem exprimente, illud specificum mutendum putavi.

62. **MONARDA.** *Cal.* cylindricus, striatus. *Cor.* ringens, lab. super-

periore lineari, filam. simplicia involvente.

1. *fastulosa*, flor. capitatis, fol. cordato-lanceolatis villosis, caule obtusangulo. *Hort. upt.* p. 12. *Mill. dict.* t. 122. f. 2. In Canada. $\overline{\text{T}}$

2. *oblongata*, foliis ovato-lanceolatis villosis planis. *Alt. Hort. Kew.* 1. p. 36. In Amer. boreali. Flores minores quam in No. 1.

3. *didyma*, (*coccinea*), fol. ovatis glabris, capitulis verticillatis, florib. subdidynamis, caule acutangulo. *Willd. S. pl.* 1. p. 125. *Mill. dict.* n. 2. et ic. 122. f. 1. *Trew. elect.* 32. t. 66. In Pennsylvania, Novoboraco, et in rivulis montium Carol. $\overline{\text{T}}$

4. *rugosa*, fol. ovato-lanceolatis cordatis glabris rugosis. *Aiton. Kew.* 1. p. 36. In America boreali. Flores albi. $\overline{\text{T}}$

5. *clinopodia*, flor. capitatis, foliis ovato-lanceolatis, basi rotundatis inaequalibus glabris. *Willd. l. c.* In Virginia. Flores in capitulum bracteis radiatum, pallidi. $\overline{\text{T}}$

6. *punctata*, floribus verticillatis, coroll. punctatis, bracteis coloratis. *Hort. ups.* 12. In Virginia, Florida. Corollae luteae punctis purpureis. *Cal.* apice barbatus. \odot

7. *allophylla*, fol. variis oblongis acute serratis, calycibus ad limbum barbatis, cor. elongatis gracilibus. *Michaux*, 1. p. 16. In America septentr. *Cor.* carnea.

8. *ciliata*, canescens, bracteis ciliatis, floribus verticillatis, corollis involu. ro longioribus. *Pluk. alm.* 10. t. 164. f. 3. *Moris. hist.* 3. p. 374. s. 11. t. 8. f. 6. In Virginiae montosis. *Cor.* parva alba.

63. **ROSMARINUS.** *Cor.* ringens, labio superiore bipartito. *Filam.* longa, curva, simplicia cum dente.

1. *officinalis.* Var. fol. utrinque virentib. et subtus canis. *Miller.*

64. **SALVIA.** *Cor.* ringens. *Filam.* transverse pedicello affixa.

1. *aegyptiaca*, foliis lanceolatis denticulatis, basi ciliatis, floribus pedunculatis. *Jacq. hort.* t. 108. *Willd. spec. pl.* p. 127. In Aegypto et insulis Canariensibus. *Flor.* parvi. Corolla alba. \odot

2. *dentata*, fol. linearis-oblongis dentatopinnatifidis, verticillis bifloris, lacinis calycinis obtusis. *Aiton. Kew.* 1. p. 37. Ad Cap. b. spei. $\overline{\text{h}}$

3. *cretica*, fol. linear-lanceolatis, flor. digynis, calycibus diphyllis. Willd. arb. berol. p. 35. *S. tenuifolia*. Riv. monop. t. 128. In Creta. h

4. *leucantha*, foliis linear-lanceolatis crenulatis rugosis, flor. verticillis spicatis, calycibus tomentosis. Willd. l. c. p. 129. Cavan. Icon. 1. p. 16. t. 24. In Mexico. Cal. violaceus. \mathcal{T}

5. *revoluta*, fol. linear-lanceolatis crenatis venosis, margine revolutis, florib. apicatis, verticillis secundis. Flor. peruv. 1. p. 28. t. 41. f. h. In praeruptis Cantae. Fl. Jan. et Febr. h

6. *angustifolia*, fol. lancrol.-oblongis, inferiorib. parce serratis, superioribus subintegris, verticillis 6-floris. Cavan. ic. 4. p. 9. t. 317. In Nova Hisp. \mathcal{T}

7. *acuminata*, fol. radicalibus cuneatis, caulinis linear-lanceolatis utrinque acuminatis, flor. paniculatis, caule altissimo. Venten. descript. p. 50. t. 50. In Carolina meridionali. Flor. cyanei. Styl. apice barbatus, ut in prior. \mathcal{T}

8. *nivea*, fol. lanceolatis integris albotomentosis, ramis divaricatis. Thunb. prodr. p. 56. Ad Cap. b. spci. h

9. *rigida*, fol. lanceolat. dentatis tomentosis, ramis erectis virgatis. Thunb. prodr. p. 56. Cum priore. h

10. *punctata*, caule stricto fragili, fol. ovato-lanceolatis serratis, cal. punctato. Fl. peruv. 1. p. 27. t. 39. f. b. In collib. altis Huancu. Focilla, ferruginea. h

11. *officinalis*, foliis lanceolato-ovatis crenulatis, verticillis paucifloris, calycibus mucronatis. Etlmg. Salv. n. 1. Blackw. t. 10. In Europa australi. Var. fol. auriculatis, angustis et eleganter purpurascensibus. h

12. *Clusii*, foliis ovato-lanceolatis integris crenulatis, superioribus ramulorum auriculatis ternatisque. Cav. descript. p. 16. Jacq. hort. Schoenbr. 2. p. 3*. t. 125. *S. pomifera*. Clus. hist. p. 343. In ins. Archipel.

13. *syplea*, tomentosa, foliis petiol. lanceolatis auriculatis rugosis, calyc. plicato-striatis obtusiusculis. Lam. ill. gen. p. 68. In Ocirnte. A sequente diversa h

14. *triloba*, tomentosa, fol. petiolatis rugosis trilobis, lobo intermedio producto oblongo; lateralibus ovatis obtusis. Lin. suppl. 88. *S. baccifera*. Filing. Salvia. n. 4. *S. quinquefolia*. Riv. monop. t. 131. In Creta, Syria. h

15. *pomifera*, fol. lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus obtusis. Tournef. cor. 10. lin. 1. p. 62. t. 24. Rivin monop. t. 125. Hab. in Graecia, Syria. Fol. callas ab insectis ortas proferit, unde nomen.

16. *urticifolia*, foliis ovato-oblongis, duplicato serratis, calycibus tridentatis, lacin. summa tridentata Gron. virg. 8 Moris. hist. 3. p. 345. S. 11. t. 13. f. 11. In Virginia, Florida. Fol. rhomboiden-ovalia, subius punctata. Michaux. Corollae minutae. \mathcal{T}

17. *occidentalis*, fol. ovatis serratis, spiciis laxis, bracteis cordatis subtrifloris. Swartz prod. n. 14; et Ej. Fl. 1. p. 43. In campestrib. Ind. occident. \odot

18. *polystachia*, caule 4-reno, liis ovato-acutis serratis, subius glaucis, spiciis numerosis terminalibus. Cavan. ic. 1. p. 17. t. 27. In imper. Mexicano. Coroll. parva Coroll. caerule. \mathcal{T}

19. *tiliaefolia*, foliis cordatis rugosis acutis, crenato-serratis, floribus spicatis. Cavan. description etc. p. 14. Vahl. symb. 3. p. 7. Hab. in Mexico. Differt à sequente lineis calycinis tantum pilosis, nec viscosis. Vahl.

20. *serotina*, fol. cordatis serratis mollioribus, floribus racemoso-spicatis; corollis vix calycem exsertentibus. Mant. 25. Jacq. Collect. 1. p. 140. Iron. rar. 1. t. 3. Ard. spec. 1. p. 10. t. 1. Hab. in Chilo. \odot

21. *chamaedryoides*, caule decumbente, fol. ovatis crenatis, subius tomentosis. Cav. Icon. 2. p. 77. t. 197. In nova Hispania caerule.

22. *procumbens*, fol. ovatis aut ellipticis, caule ramosissimo radicante, spiciis gracilibus assurgentibus. Fl. P. p. 27. t. 36. f. a. In verumis et rudertis Limae, etc. Cal. villis glanduliferis. Cor. albo-caerule. Ad obstructions usurpatur. \mathcal{T}

23. *tenella*, fol. cordatis, caule filiformi repente, spiciis ascendentibus. Swartz prod. 14. Icon. tab. 2. et Flora. p. 45. In montibus graminosis Jamaicae austral. \odot

24. *rhombifolia*, fol. rhombicis cordatisque serratis, spiciis terminalib. ternis, verticillis 4-8-floris. Flor. peruv. p. 26. t. 36. f. h. In Peruviae collibus arenosis. Cal. viscos. Cor. fance plica a.

25. *papilionacea*, fol. ovato-lanceolatis serratis, utrinque acutis, coroll. limbo 4-fido. Cav. iron. 4. p. 5. t. 319. In nov. Hisp. Laciniae lineares corollae in cruce ut plurimum expansae desiderantur in aliquo flore. C. \mathcal{T}

26. *viridis*, fol. oblongis crenatis, corollamur galea semiorbiculata, calycibus fructiferis reflexis. Jacq. mbe. 2. p. 366. Icon. rar. 1. tab. 4. (p. Desf. atlant. p. 60 t. 1. In Italia et circa Tuncum. An Var. sequens? ☉

27. *Horminum*, foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis. Horminum coma purpureo-violacea Tournef. inst. 178. Barr. obs. 256. ic. 1233. Lob. ic. 555. In Graecia, Apulia. Bract. rubrae et violac. ☉

28. *virgata*, fol. oblongis cordatis rugosis crenatis, pilis caulibus calycisque apice glandulosis. Aiton. Kewens. 1. p. 39. Jacq. hort. 1. p. 14. t. 37. In Armenia. ☞

29. *sylvestris*, fol. cordato-lanceolatis undulatis biserratis maculatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus. Scop. carn. ed. 2. n. 32. Jacq. aust. 3. p. 7. t. 212. In Austria, Bohemiae agrorum marginibus, vineis. ☞

30. *memorosa*, foliis cordato-lanceolatis planis subsinuatis, bracteis coloratis, corollae labio infimo reflexo. L. In Austria, Tartaria. Spicae ante florescentiam tetragonae. ☞

31. *syriaca*, fol. cordatis dentatis: inferioribus repandis, bracteis cordatis brevibus acutis, calycibus tomentosis. Sp. pl. 36. Baub. prodr. 124. t. 124. Statura S. praetensis. Corollae albae, parvae.

32. *viscosa*, fol. oblongis obtusis crenatis viscidis, floribus verticillatis, bracteis cordatis acutis. Jacq. ic. rar. 1. t. 5. misc. 2. p. 328. In Italia. ☞

33. *haematodes*, fol. cordato-ovatis rugosis tomentosis, calycibus hispidis, radice tuberosa. Horminum sylvestre maculatum tuberosum. Moris. hist. 3. p. 394. t. 11. t. 14. f. 15. In Italia, Italia. Caulis viscidus. Folia longissima obtusa. ☞

34. *pratensis*, foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexicanalibus, verticillis subnudis, corollis calca subviscosa. Bull. herb. t. 357. p. foliis in profundas lacinas incisus. Tournef. inst. 179. Ad margines viarum, ad sepes in pratis, per totam aestatem florens.

Y. *praecox*, minor, fol. radical. profunde sinuatis obtuse dentatis. S. pratensis minor. Savi Flor. pisan. 1. p. 22. Io Palazzetto et Migliarino crecit. Febe. et Mart. floret. 5 poll. modo alta, et cor. lab. super. glandul. destituta. Distincta spec. videtur.

35. *indica*, fol. cordatis lateralibus sublobatis: summis sessilibus, verticillis sub-

nudis remotissimis. Mant. 318. Jacq. hort. t. 78. Moris. hist. 3. a. 11. t. 13. f. 16. In India. Corolla magna, caerulea; Lab. sup. falcato compresso emarginato; L. inferiore trifido, intermedia magna sacenta biloba; fundo albiolo; lobis maculis violaceis, margine albo, mox luteo; laciniis lateralibus horizontalibus. lanceolatis porrect. replicatis; oleoque latum inferius praeprescat Fucum s. Apem. Linn. ☞

36. *dominica*, fol. cordatis obtusis crenatis subtomentosis, corollis calyce angustioribus. Mill. Swartz. obs. 18. t. 1 f. 1. In camp. et fruticibus Indiae occidentalis. Cal. uno latere viridi-rubens. ☞

37. *lyrata*, hirsuta, fol. variis: radical. lyrato-sinuosis, caul. simplicibus sublimphyllis, spica interrupta, cal. 5-spicentibus. Mich. Flor. amer. In Canada. Vere flor.

38. *Verbenaca*, fol. serratis sinuatis laeviusculis, corollis calyce angustioribus. Virid. cl. Horminum, Verbenacae laciniis, angustifolium. Triomfetti obs. 66. t. 66. In Europae et Orientis pascuis. Quoad folia variat. Desf. atlant. p. 71.

39. *runcinata*, scabra, foliis runcinato-pinnatifidis dentatis, floribus spicatis verticillatis. Lin. suppl. 89. Ad Cap. b. spei.

S. *clandestina*, fol. serratis pinnatifidis rugosis, spica obtusa, corollis calyce angustioribus. Sp. plant. 36. Barr. rar. 24. t. 220. In Italia, Africa. Calycis pilis glutinosus, labio superiore plicato. ☉

40. *austriaca*, foliis ovatis cordatisque erosu-sinuatis; radicalibus (terrae adpressis) petiolatis, caule subaphyllo, staminibus corolla duplo longioribus. Jacq. aust. 2. p. 8. t. 112. In Austria, Hungaria, Moldavia. ☞

41. *pyrenaica*, fol. obtusis erosu, staminibus corolla duplo longioribus. Roy. Hormin. pyrenaicum glutinosum Anguria folio. Herm. parad. 187. t. 187. In Pyrenaeis. Fol. lata, sinuata.

42. *disermas*, foliis cordato-oblongis erosu, staminibus corollam aequantibus. Sp. plant. Arduin spec. 1. p. 9. t. 1. Barr. ic. 187. In Syria. Odor gratus. ☞

* *rugosa*, foliis oblongo-lanceolatis erosu-crenatis rugosis pilosiusculis, staminibus corolla brevioribus. Aiton. Kewens. 1. p. 42. Ad Cap. b. spei. ☞

43. *nubia*, foliis oblongis subcordatis inaequaliter rugosis crenatis basi subauriculatis. Aiton. Murr. comm. goett. 1778. p. 50. t. 3. In Africa. ☞

44. *nitida*, foliis sinuatis angulatis crenato-dentatis, calycum denis. spinosis, angulis margineque faucis ciliatis. Murr. comment. goett. 1778. p. 88. t. 2. Jacq. hort. 3. t. 92. In Aegypto. $\overline{\text{T}}$

45. *americana*, fol. ovatis utrinque acuminate-serratis. Cavan. icon. 1. p. 16. t. 26. Willd. elth. 339. t. 254. f. 330. In Mexici humenibus. Cor. caerulea. h

46. *amethystina*, fol. cordatis acutis serratis subtus lanatis, verticillis nudis, calycibus trifidis, corollis pubescentibus. Smith. icon. ined. fasc. 2. p. 27. t. 27. In Nova Granada. h

47. *fulgens*, fol. cordatis acutis crenatis rugosis subtus tomentosis, verticillis nudis, calycibus trifidis, corollarum galea villosa. Willd. spec. pl. 1. p. 130. Cavan. icon. 1. p. 15. t. 21. In Mexico. $\overline{\text{T}}$

48. *acuminata*, fol. latis cordatis serratis acuminatis, flor. verticillatis, cor. longis glabris, bracteis rhomboidicis coloratis deciduis. Fl. per. 1. p. 24. t. 37. b. In praeruptis Cantae. Cor. incarnata. Viscosa, hirsuta. $\overline{\text{T}}$

49. *nodosa*, fol. cordatis, superioribus ovatis serratis, pedunculis axillaribus apice nodosis. Flor. peruv. s. p. 25. t. 41. f. 2. S. *formosa*, L'Héritier; *leonuroides*, Gloxin. In Peru. Cor. coccinea, galea hirsuta. h

50. *longiflora*, fol. cordatis acutissimis hierenatis, spicis longis nutantibus, cor. longissimis, cal. inflato bracteis coloratis. Fl. peruv. p. 23. t. 40. f. a. In praeruptis profundis Tarmae. Cor. color. laccae. h

51. *tubiflora*, fol. cordatis crenatis subpilis, calycibus trifidis, cor. longissimis tubulosis, staminibus exsertis. Smith. icon. ined. fasc. 2. p. 26. t. 26. Habit. Huauae in agro Limensi. Cor. coccinea. h

52. *tubifera*, fol. ovatis acutis serratis mollibus, floribus spicatis erectis, tubo longissimo. Cavan. icon. 1. p. 16. t. 25. S. *longiflora*. Willd. s. pl. p. 142. In Mexico. Cor. coccinea pubesc. lab. inf. reflexum. $\overline{\text{T}}$

53. *oppositiflora*, fol. ovatis crenatis rugosis, spicis terminalibus, flor. oppositis. Flor. per. p. 26. t. 43. f. a. Hab. in locis altis Tarmae. Cor. turgida, coccinea, cal. 4-plo longior. $\overline{\text{T}}$

54. *excisa*, foliis cordatis obtusis basi inaequalibus serratis, spicis nutantibus, flor. oppositis binis verticillatisque, cor. hirsuta lab. infer. concavo recto. Flor. per. p. 25. t. 36. f. b. In Peruviae montibus arenosis. Cor. coccinea.

55. *coccinea*, fol. cordatis acutis tomentosis serratis, corollis calyce duplo longioribus angustioribus. Ait. Kew. s. p. 43. Murr. comment. goett. 1778. p. 86. t. 1. Hab. in Florida juxta fluvios. h

56. *pseudococcinea*, fol. ovatis acutis serratis basi inaequalibus, caule piloso, corollis calyce duplo longioribus. Willd. l. c. foliis ovatis acutis serratis, utrinque villosis, racemo terminali verticillato, caul. piloso. Jacq. ic. rar. 2. tab. 209. Collect. 2. p. 302. In America calidiore. h

57. *plumosa*, fol. cordato-ovatis venosis, pedunc. 4-5-axillaribus, cor. tubulosa hirsuta, stylo plumoso. Flor. peruv. p. 267. t. 37. f. a. In Tarmae praeruptis. Cal. tubul. venosus. h

58. *integrifolia*, fol. ovatis integerrimis avenis subrepandis, spicis brevibus, cor. longis, staminibus exsertis. Fl. per. 1. p. 26. t. 45. f. b. In Peruv. juxta aquas thermal. Cheochin et ad rupes. Cor. croceo-lutea. h

59. *racemosa*, fol. cordatis acutis sublanecolatis serratis, racemis terminalibus compositis. Flor. per. p. 25. In versuris et ruderalis Huanaei. Primo vere floret. Cor. obscure caerulea. Fol. saepius purpureo aut livido maculata. h

60. *violacea*, hirsuta, foliis ovatis crenatis, flor. spicatis, verticillis 6-floris, cor. inferiore lato dependente. Fl. per. 26. t. 43. b. Cum priore. \odot

61. *hispanica*, foliis ovatis, petiolis utrinque mucronatis, spicis imbricatis 4-gonis, calycibus trifidis. Kniph. orig. t. 2. n. 78. Salhb. hort. rom. 3. t. 22. Ard. spec. 10. t. 2. In Italia et in Hispania. Spica tetragona. bracteis ovatis, longitudine calycum, ciliatis. Cor. parva caerulea.

62. *prismatica*, fol. ovato-acutis serratis, spicis primo prismaticis, inferne nudis, terminalibus. Car. descrip. p. 14. In Mexico. Cor. caerulea.

63. *circinata*, pilosa, fol. longe petiolatis cordatis crenatis, bract. ovato-acutis ciliatis, cal. lobis obtusis, cor. galea emarginata. Cav. icon. 4. p. 9. t. 318. In Mexico. Cor. caerulea. $\overline{\text{T}}$

64. *abyssinica*, fol. inferiorib. lyratis, summis cordatis, floribus verticillatis, calycibus mucronatis ciliatis. Jacq. ic. rar. s. tab. 6. In Africa. $\overline{\text{T}}$

65. *mitis*, fol. ovatis acutis serratis tomentosis, spicis terminalibus intermedia longiori aphylla, verticillis multifloris. Fl. peruv. p. 27. In Cantae praeruptis calidis. Vere. Styl. villosus. Sem. fulva, venosa. $\overline{\text{T}}$

66. *verticillata*, fol. cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollae labio inferiori incumbente. In Germania, Austria, Helvetia.

67. *napifolia*, foliis cordatis crenato-dentatis, inferioribus latis latis lyratisque, verticillis subnudis, labio superiore brevior. Aiton. Kewens. p. 44. Jacq. hort. a. p. 71. t. 152. In Italia, Gallia. \mathcal{T}

68. *glutinosa*, fol. cordato-sagittatis, serratis acutis, Horminum flore luto. Riv. t. 57. Moris. hist. 3. p. 364. t. 16. t. 13. f. 18. In Europae lutosi. Cor. falcata. \mathcal{T}

69. *triangularis*, herbacea, villosa-hispida, fol. triangularibus dentatis, per nulis patulis. Thunb. prod. p. 66. Ad Caput bonae spei.

70. *deltoides*, fol. deltoides crenatis, cal. tubulosus venosis, coroll. ventricosa. S. Neela. Cav. ic. 5. p. 33. t. 455. Habitat in fundo de Negla, in regno Mexic. Cor. coccinea. \mathcal{T}

71. *sagittata*, viscosa, hirsuta, foliis sagittatis crenatis acutis. Flor. per. s. p. 23. t. 35. f. a. In ruderatis Tarmae regni Per. Cor. obscure violacea. Semen corpori glandul. insidet. \mathcal{T}

72. *cuspidata*, fol. cordato-sagittatis inaequaliter serratis, spicis longis, verticillis multifloris remotis, calyc. cuspidatis. Flor. peruv. l. c. t. 40 f. b. In collibus prope Cheuchin. Apr. Maj.

73. *patens*, villosa, foliis subhastatis crenato serratis, flor. oppositis, cor. laciniat. med. latissima. Cav. ic. 5. p. 33. t. 454. In Novae Hisp. umbrosis.

74. *Barrelieri*, foliis inaequaliter dentatis acuminatis cordatis, basi angulato-hastatis, verticillis subnudis. Willd. l. c. p. 143-144. Faling. Salv. n. 46. Barr. rar. p. 236. t. 186. In Hispania. \mathcal{T}

75. *canariensis*, fol. hastato-triangularibus oblongis crenatis obtusis. Kniph. orig. cent. 6. t. 77. Pank. alm. 185. t. 301. f. 2. In Canariis. Petioli longi. Calyx 5-fidus, hispidus. \mathcal{H}

76. *aurita*, villosa herbacea, foliis ovatis dentatis auriculatis, flor. verticillato-spicatis. Lin. suppl. Ad Cap. b. spei.

77. *africana*, fol. subrotundis serratis, basi truncatis dentatis. Hort. Cliff. 13. Mill. dict. n. 11. ic. 150. t. 225. f. 1. 8. fol. cuneiformib. serratis subtus tomentosis. Thunb. prod. p. 66. Comm. hort. 2. p. 181. t. 91. In Cap. b. spei locis argillosis. \mathcal{H}

78. *aurea*, frutescens, fol. subrotundis integerrimis, basi truncatis dentatis, cal. campanulato 3-lobo. Eling. Salvia n. 9. Comm. hort. 2. p. 183. t. 92. Ad Cap. b. Spei juxta rivulos.

79. *colorata*, fol. ellipticis subintegerrimis tomentosis, calycis limbo membranaceo colorato. Mill. ic. 150. t. 225. f. 2. Moris. hist. 3. s. 11. t. 16. f. 61. Ad Cap. bonae spei arenosa, maris littora. Cal. campanulati laciniis rotundatis, sanguinei. \mathcal{H}

80. *acetabulosa*, fol. obovatis dentatis, calycibus campanulatis patentibus pilosis, caule fruticoso. Mant. 25. S. *syriaca*, cistiflorae foliis, acetabulis (calycibus) Moluccar. Moris. hist. 3. p. 369. In Oriente. \mathcal{H}

81. *paniculata*, fol. obovato-cuneiformibus denticulatis nudis, caule frutescente. Mant. 25 et 511. Thunb. prod. p. 66. S. minor aethiopica, fol. chamaeleagni-a-peris. Brey. cent. 169. t. 5. Moris. hist. 3. s. 11. t. 16. f. 2. Mill. ic. 150. t. 225. f. 1. Ad Cap. b. spei. \mathcal{H}

82. *spinosa*, fol. oblongis repandis, cal. spinosis, bracteis cordatis mucronatis concavis. Mant. 511. Jacq. ic. rar. 1. tab. 7. Moris. hist. 3. p. 392. s. 11. t. 16. f. 2. In Aegypto. Calyx fractus aribus, compressus, striatus, dentibus subulatis, ut in Hyosciamo pungentis. \mathcal{H}

83. *tineitana*, foliis cordatis crenato-dentatis, calycibus spinosis, bracteis integerrimis cordatis mucronatis concavis ciliatis. Willd. l. c. p. 1. Roib. Abb. p. 25. Riv. t. 62. In Africa b. vli. Planta foetilisissima. \mathcal{H}

84. *Sclarea*, fol. rugosis cordatis oblongis villosis serratis, bracteis floralibus calyce longioribus concavis acuminatis. Sclarea vulgaris. Blackw. t. 122. Lobel. ic. 556. In Syria, Italia. \mathcal{H}

85. *involuta*, foliis ovato-lanceolatis serratis, florib. spicatis terminatibus, bract. maximis coloratis. Cav. ic. a. P. t. 1. 105. In Mexico. Plan. a pulcherrima numero atque florum magnitudine, quarum spica terminatur bracteis in arolium dilate roscum complicatis. Cav. \mathcal{T}

86. *Aethiopsis*, fol. oblongis erosis lanatis, bracteis recurvatis subspinosis. Ja. q. austr. t. 211. In Africa, Gallia, Austria. Labium inferius antice cohaeret et saecum format. \mathcal{H}

87. *foetida*, fol. cordato-ovatis rugosis-villosis, flor. verticillato-spicatis, cal. fructiferis compressis. Desf. atl. p. 24. In agro tunetano. \mathcal{H}

87. *compressa*, fol. ovali-oblongis crenatis rugosis, flor. verticillato-paniculatis : summis sterilibus, cal. fructiferis compressis. Venten. descr. p. 59. t. 59. Hab. prope Mossoul in Bagdad. Stam. 4 : duo ster. Panic. contracta. ♂

88. *atlantica*, viscosa, fol. radicalibus cordatis lanatis sinuato-erosis, bracteis concavis mucronatis, flor. summis evanidis. S. *patula*. Desf. l. c. 25. Tota villosa, caul., rami et cal. glutin. ♂

89. *bicolor*, fol. cordato-oblongis multifidis hirsutis, verticillis omnibus fertilibus, bracteis reflexis calyce brevioribus, cor. lobo intermedio saeculo. Desf. atl. 1. p. 22. t. 2. Schousboe observ. ed. germ. Lips. p. 5. Jacq. Schönbr. 1. p. 4. t. 7. Inter segetes circa Flemsen. D. in rud-ratis urbis Tingidis. S. ♂

90. *algeriensis*, fol. integris, inferioribus ovatis in petiolum decurrentibus, cal. renato-spinosis nutantibus, bracteis reflexis. Desf. loc. cit. p. 23. t. 3. Prope Macene Algeriae. ♂

91. *crassifolia*, caule erecto, fol. crassis cordatis lobatis acutis, cor. lbb. inferiore brevior. Cavan. descr. p. 15. Habitat? Cor. caerulea.

92. *phlomisoides*, foliis lanceolatis sub-integris, caulique simplici lanato-viscoso. Vahl. symbol. 1. p. 7. Introduct. in Oxyet. arrag. 158. t. 4. Roemer script. pl. hisp. lusit. 10. t. 1. f. 1. Hab. in montibus circa Siguenzam Hispaniae.

93. *argentea*, fol. dentato-angulatis magnis crosis lanatis, vertic. summis sterilib., bracteis concavis. Boerb. lugdb. 1. p. 163. Media inter S. *Sclerocam* et *Aethiopsis*.

94. *pinnata*, fol. pinnatis : pinnis villosis crosis, cauma majore ovata. Edling. Salv. n. 14. Boerb. lugdb. 1. p. 167. t. 167. Cal. ovatus inflatus, corolla non falcata.

95. *japonica*, fol. bipinnatis glabris. Thunb. jap. p. 22. t. 5. Kacmpf. sinoc. fasc. 5. p. 887. In Japonia. S. *pinnatae* affinis. ♂

96. *incarnata*, foliis pinnatis serratis, caulibus procumbentibus hirsutis, bracteis lanceolatis longis. Moris. hist. 3. p. 391. t. 11. t. 13. t. 19. Pluk. alm. 196. t. 191. f. 6. W. In Oriente. Caules procumbentes. Flores verticillati magni carnei. Est. ♀

97. *rosaeifolia*, foliis pinnatis lucanis, foliolis serratis, caly. cib. ringentibus. Smith. icon. ined. fasc. 4. p. 5. t. 5. In Armenia. ♀

98. *scabiosae*, villosa, foliis subbipinnatis : pinnulis 2-3-partitis integris dentatisque. Lam. Journ. d'hist. nat. p. 44. t. 27. In Peru. ♀

99. *habitziana*, villosa, fol. pinnatis intercrimis : foliolis lanceolatis subaequalibus, superioribus geminatis. Willd. in Schrad. bot. Journ. 1. p. 289. t. 2. In Tauria. Fol. subtus incana. Cor. magna. Cal. campanul. W. ♀

100. *interrupta*, fol. interrupte pinnatis, caule erecto. Schousb. p. 6. t. 1. Cor. magna, caeruleo-alba, odorata. In Barlaria. ♀

101. *ceratophylla*, foliis rugosis pinnatifidisque lanatis : verticillis summis sterilibus. Lin. Kniph. cent. 6. t. 78. In Persia. ♂

102. *ceratophylloides*, fol. pinnatifidis rugosis villosis, caule paniculato ramosissimo. Arduin. spec. 2. p. 12. t. 12. β? S. *asperata*. Cav. ic. 6. p. 38-39. t. 558. In Sicilia, Aegypto. ♂

103. *Forskalei*, fol. lyrato-sauriculatis, caule subaphyllo, corolla calce scabellifida. S. *bifida*. Forsk. descr. p. 202. Habit. in Orient. Facies S. *nutans*. ♀

104. *nutans*, foliis cordatis inaequaliter basi excisis, caule subnudo, spicis ante florescentiam cernuis. Sp. pl. 39. Kniph. cent. 7. t. 79. Hall. Comment. goett. 1. p. 210. t. 11. In imperio Rutheno et in Hungaria. β. S. *nutans*, fol. oblongo-cordatis, caule simplicissimo subaphyllo, racem. florentibus pendulis. Plant. rarior. Hung. Dec. 7. p. 63. t. 62. Flor. maj. An β diversa? ♀

105. *COLLINSONIA*. Cor. inaequalis : labio inferiore margine multifido - capillari. Sem. 1, perfectum.

1. *canadensis*, foliis cordato-ovalibus calycis dentibus brevibus subulatis tubo subaequalibus. Michaux Flora 1. p. 17. Willd. Sp. pl. 1. p. 152. In Americae sylvis umbrosis. ♀

2. *tuberosa*, radice tuberosa, foliis ovalibus utrinque angustato-acutis, calycis dentibus setaceis tubo longioribus. Mich. 1. p. 17. In Carolinae umbrosis. Sept. 8. ♀

3. *scabra*, fol. ovatis subcordatis pilosiusculis, caule pilosiusculo scabrido. Ait. Kew. l. c. Habit. in Florida. ♀

66. MORINA. *Cor.* inaequalis. *Cal.* fructus 1-phyllus, dentatus; *Cal.* floris bifidus. *Sem.* 1, sub calyce floris.

1. *persica*. Linn. M. orientalis. carlinae folio. Tourn. cor. 48. it. 3. p. 132. t. 132. In Persia ad Hispahan. $\overline{\text{E}}$

67. SCIURIS. *Cal.* 5-fid. *Cor.* inaequalis: labio superiore trifido; inferiore bifido brevior. *Stam.* 5: 3 castrata, villosa. *Caps.* 5, coalitae.

1. *aromatica*. Willd. sp. pl. 1. p. 153. *Raputia aromatica*. Aubl. gujan. 2. p. 6. o. t. 272. Lam. illustr. 1. p. 32. t. 10. Habit. in sylvis Gujanac. Frutex bipedalis, ramis oppositis divaricatis. Folia ternata. Spicae axillares nutantes. Willd. $\overline{\text{h}}$

68. LITHOPHILA. *Cal.* infer., triphyllus. *Cor.* tripetala. *Nectar.* diphyllum. *Pericarp.* biloculare?

1. *muscoideus*. Swartz Fl. Ind. occid. 1. p. 48. Hab. in Navatae rupibus. Pl. minutissima.

69. MARGYROCARPUS. *Cal.* 4-5-partitus. *Cor.* o. *Stigm.* petatum. *Drupa* 1-sperma.

1. *setosus*. Flor. per. 1. p. 28. t. 8. f. 3. Hab. in Regni chilensis collibus aridis. Aest. Caul. procumb. ramosus. Fol. pinnata. $\overline{\text{h}}$

Obs. Hue etiam retulit *Empetrum* pinnatum. Lam. 2. *Ancistrum barbatum*. Fj. ill. gen. p. 77. Cl. Willdenow in Nov. act. Nat. curion. Berol. v. 2.

70. ANCISTRUM. *Cal.* 4-phyllus: aristis hamatis. *Cor.* o. *Stigma* multipartitum. *Drupa* exsucca, hispida, 1 locularis.

1. *Sanguisorbae*, caulib. decumbentibus, foliis obovatis aequaliter dentatis, subtus sericeo-pubescentibus, spicis globosis. Willd. spec. pl. 1. p. 154. A. *anserinae* fol. Lam. ill. p. 43. t. 12. f. 1. In Nova Zeelandia. Pet. brata. *Stigm.* peltell.

2. *repens*, caulibus repentibus, foliol. ovato-oblongis argute serratis lineatis, capitulis globosis. Venten. hort. cels. p. 6. t. 6. Habitat in Peru. Suffrutex. Pet. oblonga. *Stigma* cristatum.

3. *magellanicum*, foliol. ovato-incisopinnatifidis, spica capitato-globosa. Lam. l. c. f. 2. Hab. in freto Magell. $\overline{\text{p}}$. Au-

mile, foliol. latioribus serratis. *Poterium*. H. P. Lam. 1. c.

4. *lucidum*, caul. subdemersis, pedunc. scapiformibus, spicis ovatis, foliol. oblongis integerrimis acutis subsfasciculatis. Aiton. Kew. 1. p. 15. Hab. in insulis Falklandiae. *Stigmata* fasciculata, atrosanguinea. $\overline{\text{E}}$

5. *latebrosus*, caul. demersis, pedunc. scapiformibus, spicis elongatis, foliol. oblongis incisis villosis, fructibus undique armatis. Aiton. Kew. 1. p. 16. *Agrimonia decumbens*. Lin. suppl. 25:1. Ad Cap. b. spei. Folia radicalia. *Potentill.* *Anserinae*. $\overline{\text{E}}$

71. ARUNA. *Cal.* 5-partitus: laciniis reflexis. *Cor.* nulla. *Bacca* unilocularis, 1-vel 2-sperma.

1. *gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 16. t. 5. Habit. in sylvis desertis remotis Gujanac. Arbor ramis divaricatis.

D I G Y N I A.

72. ANTHOXANTHUM. *Cal.* Gluma bivalvis, uniflora. *Cor.* Gluma bivalvis, acuminata, aristata. *Sem.* 1.

1. *odoratum*, spica oblonga ovata, flosculis subpedunculatis arista longioribus. Fl. dan. t. 666. Schreb. gram. t. 5. Hab. in pratis, sylvis. $\overline{\text{E}}$

2. *indicum*, spica lineari, flosculis sessilibus arista longioribus. Flor. 1771. 25. Pluk. alm. 177. t. 119. f. 1. In India.

3. *crinitum*, panicula coarctata, aristis longissimis. Forst. prod. n. 18. Lin. suppl. 50. In Nova Zeelandia. Gramen altum.

4. *avenaceum*, spica secunda, calycib. pilosis, flosculis arista longa toria geniculata. Retz. obs. 3. p. 8. Hab. in Malabar. Facies Avenae. Gramen semipedale. Retz.

73. GUNNERA. *Ament.* thyrsoidum. *Cal.* superus, bidentatus. *Cor.* o. *Styl.* 2-partitus. *Drupa* 1-sperma, coronata.

1. *perpensa*, foliis cordatis laevibus. Lin. Syst. pl. ed. Reich. 4. p. 42. Pluk. alm. p. 68. t. 18. f. 12. *Perpensum* blitidispermum. Burm. profl. p. 26. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. radical. dentato-crenate. Scap. nudus. $\overline{\text{E}}$

2. *scabra*, foliis palmatis scabris. Fl. pe. 1. p. 29. t. 44. f. 2. G. *chilensis*. Lam. enc. cl. bot. 3. p. 61. Panke tinctoria. Molin. Chil. p. 150. t. 1. In palustrib. Chili.

3. *magellanica*, dioica, fol. reniformib. Lam. l. c. Hab. in freto Magellanico. Fol. radical. venosa crenata Tusul. *alpinae* fere. - Lamarckius putat hoc genus potius ad Classem dioeciam pertinere.

TRIGYNIA.

74. PIPER. *Spadix* amentiformis. Cal. o. Cor. o. Styl. brevissimus. *Stigm.* h. manifesta; aut (in *Peperomia*) punctum vel maculans 1-2 tantum sistentia. *Bacca* 1-sperma. (*Stamina* 2, 4, 5 et 6.)

1. *nigrum*, foliis ovatis subseptemnerviis glabris, petiolis simplicibus. Flor. zeyl. 26. Willd. sp. pl. Lin. p. 159. *P. aromaticum*. fol. ovatis acutis 5-nerviis glabris, petiol. simplicissimis, spicis inferne substerilibus. Lam. illustr. p. 79. t. 23. Blackw. t. 348. Hab. in India. h.

2. *sylvestre*, fol. subcordatis obliquis 5-nerviis, spic. fructiferis laxiusculis. Lam. l. c. In insul. Franciae, Malabar. Flor. dioici. L.

3. *Betle*, fol. ovatis oblongiusculis acuminatis septemnerviis, petiolis bidentatis. Burm. zeyl. 193. t. 82. f. 2. *Betela-codi*. Rheed. mal. p. 29. t. 15. Habitat in India. h.

4. *Cubeba*, foliis oblique ovatis s. oblongis venosis acutis, spica solitaria pedunculata oppositifolia, fructib. pedicellatis. Lin. suppl. 90. Hab. in Javæ et Guineæ sylv. Flor. dioici. Lam.

5. *capense*, fol. ovatis nervosis acuminatis: nervis villosis. Lin. suppl. 90. Ad Cap. l. spei. Distinguitur venis pagina inferiori villosis. L.

6. *Malabarica*, fol. ovatis acutiusculis subtus scabris: nervis quinque subtus elevatis. Rumph. amb. 5. p. 336. t. 116. f. 2. In India utraque.

7. *discolor*, foliis lato-ovatis quinque-nerviis glaberrimis, postice discoloribus, spicis laxioribus, fasciculis remotioribus. Swartz prod. 15. et Flor. s. p. 52. Gmel. in N. Comm. Petrop. v. 32. t. 30. Hab. in Jamaica, muntib. aliis.

8. *medium*, fol. ovatis acuminatis obliquis, basi subcordatis, quinque-nerviis, spicis axillaribus nutantibus. Will. loc. cit. p. 160. Jacq. Icon. rar. 1. t. 8. Collect. s. p. 141. Affine sequenti.

9. *Amalago*, fol. lanceolato-ovatis quinque-nerviis rugosis. Mill. dict. n. 3. Swartz

obs. p. 19. Sloan. hist. 1. p. 134. t. 87. f. 1. Pluk. alm. 2, 7. t. 215. f. 2. In fruticetis montosis Jamaicae et Hispaniolae. h.

10. *Siriboa*, foliis cordatis subseptemnerviis venosis. Rumph. amb. 5. p. 340. t. 117. f. 2. In India. h.

11. *excelsum*, foliis orbiculato-cordatis subseptemnerviis, pedunculis terminalibus solitariis bifidis, caule arborco. Forst. prodr. In Nova Zeelandia. h.

12. *longum*, fol. cordatis petiolatis sessilibusque. Blackw. t. 356. Rumph. amb. 5. p. 335. t. 116. f. 2. In India. h.

13. *methysticum*, fol. cordatis acuminatis multinerviis, spicis axillarib. solitariis brevissimis pedunculatis patentissimis. Forst. plant. escul. aust. p. 76. n. 50. In insulis Societatis, Americarum, et Sandwichiae. h.

14. *latifolium*, fol. orbiculato-cordatis novemnerviis, spicis axillaribus aggregatis pedunculatis. Forst. prod. n. 22. Lin. suppl. 91. Folia magna profunde cordata.

15. *decumanum*, fol. cordatis novemnerviis reticulatis. Jacq. Collect. 4. p. 528. Icon. rar. Plum. amer. 39. t. 76. Hab. in Martinica et ad Caracas. Affine nimis *P. reticulato*. h.

16. *ovatum*, fol. ovatis venosis multinerviis basi aequalibus, bacris pedicellatis distantibus, ramis laevibus. Vahl. Eclog. 1. t. 5. In insul. Trinit. h.

17. *Nhandi*, foliis cordatis novemnerviis venosis glabris attenuatis basi vix profundo. Vahl. l. c. (*P. caudatum*). Act. Soc. hist. nat. 1. p. 105. Ind. occid.

18. *reticulatum*, fol. cordatis septemnerviis reticulatis. Swartz. obs. p. 19. Plum. amer. 57. t. 75. Hab. in Martinica Brasiliæ et Hispaniolæ fruticetis. h.

19. *mite*, fol. cordatis-acutis 15-19-nerviis reticulatis, spicis longifol. subulatis erectis. Flor. peruv. l. p. 37. t. 48. f. 2. In sylv. Cuchero. Rami mites. h.

20. *Carpupija*, foliis cordatis acutis acuminatisque coriaceis, margine revolutis, spicis erectis. Fl. peruv. 1. 61. f. 6. Hab. cum priore. Arbor 3-orgyalis. Fol. fragrantissima, ad indigestiones ab incolis adhibentur, et laudati auctores iis ad animalia dissecta a blattis praeservanda uti sunt.

21. *obliquum*, fol. oblique cordatis obtusis, spicis longissimis dependentibus. Fl. peruv. l. c. f. 2. Hab. In Cuchero sylv. ad Caryumba terminum. Fol. subtus 15-15-nerviis.

22. *acutifolium*, fol. cordatis acutissimis, spicis erectis cylindricis brevibus. Fl. per. p. 38. t. 6. f. a. In Cuchero et Pozuzo sylvis. Fol. alternatum 13-17-nervia, subtus pubescentia. h

23. *angustifolium*, foliis coriatis lanceolatis acutis rugosis, spicis erectis foliorum longitudine. Fl. peruv. t. 57. f. a. In Peruvianis sylvis et ripis. Stigmata hispidula. Decoctum contra morbos renercos adhibetur. h

24. *granulosum*, fol. cordatis lanceolatis obliquis rugosis, supra scabris, nervis alternis, spicis uncinatis. Fl. peruv. t. 63. f. b. Hab. in Pillao nemoribus. Fol. bipalmaria, 13-17-nervia. Filam. articulata. Fol. odore grato.

25. *aduncum*, fol. oblongo-ovatis acuminatis basi inaequalibus venosis, spicis solitariis axillaribus uncinatis. Willd. l. c. p. 162. Jacq. Collect. 5. p. 6. Icon. rar. Hab. in Jamaica. h

26. *scabrum*, fol. lato-ovatis acuminatis obliquis rugosis scabris, spicis erectis. Swartz Flac. Ind. occid. 1. p. 54. In montosis Jamaicae temperatioris. Fol. fusco-viridis. h

27. *macrophyllum*, fol. elliptico-ovatis acuminatis glabris, basi inaequalibus venosis, petiolis appendiculatis, spicis axillaribus solitariis. Willd. p. 163. Swartz prod. p. 15. et Flor. 1. p. 54. In Jamaicae montibus petrosis. Sjcc. minus fragilis. S.

28. *microstachyum*, fol. oblongis laevibus acuminatis, basi aequalibus, subtus venosis, spicis breviter imbricatis. Vahl Eclog. aeneae. 2. Hab. in Cayenna. h

29. *rugosum*, fol. ovato-oblongis venosis glabris, basi subaequalibus subtus reticulatis (rugosis), ramis laevibus, petiolis simplicibus. Vahl Eclog. 1. t. 2. Hab. cum priore. h

30. *aequale*, fol. elliptico-lanceolatis venosis attenuatis, basi aequalibus glabris, ramis laevibus geniculatis. Vahl. l. c. t. 3. Crescit in Montserrat. h

31. *Charumaya*, arborescens, fol. ovatis acutis, spicis erectis. Flor. peruv. p. 15. t. 38. f. b. Hab. in Huasamansi nemoribus. Venaecule *charumaya* i. e. fluvii flagellum.

32. *gracile*, fol. ovato-lanceolatis acutis rugosis, spicis gracilibus erectis. Fl. per. t. 59. f. b. Hab. in Cuchero sylvis. Rami tenues hispiduli. h

33. *dichotomum*, foliis oblongo-lanceolatis, venis alternis, spicis cylindricis

fol. brevioribus. Flor. peruv. p. 35. t. 6a. f. b. In sylv. peruv. Fol. ejusdem usus ac n.º. 20. h

34. *lineatum*, fol. ovato-oblongis acutis lineatis subpatis spicis erectis. Fl. p. l. c. f. a. In Peru ad margines fluviorum.

35. *croatum*, fol. ovato-oblongis acutis utrinque rugosis supra asperis, spicis erectis foliorum tere longitudine. Fl. per. t. 55. f. a. In Pillao nemoribus. Stam. 4. h

36. *lanceolatum*, fol. lanceolatis acutis utrinque fusco-punctatis, spicis brevibus erectis. Fl. per. p. 36. t. 61. f. b. h

37. *bullatum*, hirsutum, foliis ovato-lanceolatis bullato-rugosis supra nitidis, nervis vagis. Lam. ill. p. 81. *P. rugosum*. Hab. in Cayenna. h

38. *angustifolium*, fol. linealibus utrinque acutis subaequalibus, nervis vagis, spicis minimis ovatis lateralibus. Lam. l. c. In Guiana. Spicae magnitud. grani tritici. h

39. *geniculatum*, fol. oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, caule ramisque geniculatis. Swartz prod. 15. et Ej. Flor. 1. p. 57. Hab. in Jamaica, sylvis lapideis. Caul. delisus. S. h

40. *praemorsum*, fol. lanceolato-ellipticis attenuatis glabris, basi altero latere brevioribus, spicis superne recurvatis. Vahl. l. c. Roth. Surin. p. 16. In Surinamo. h

41. *verrucosum*, arborescens, fol. oblongis acuminatis obliquis multinerviis venosis, glabris corinceis maximis, caule ramisque verrucosis. Swartz prod. 15. Sloan. cat. 25. list. 1. p. 135. t. 88. f. 1. In Jamaica, Gujana etc. Flor. spirales. h

42. *hirsutum*, fol. ovatis acuminatis obliquis rugosis geniculisque hirsutis, spicis erectis. Swartz. Flor. in occid. 1. p. 60. *P. hispidum*. Sw. Prod. p. 15. Pedunc. hispidi. h

43. *nitidum*, foliis lanceolato-ovatis, basi obliquis glabris nitidis. Swartz prod. 15. Flor. 1. p. 58. In Jamaicae umbrosis montosis. h

44. *pellucidum*, fol. cordatis petiolatis, caule herbaceo. Jacq. obs. 1. p. 16. Hort. cliff. 6. t. 4. Plum. amer. 54. t. 72. In America calidiorie ☉

45. *alpinum*, herbaceum, caule erecto simpliciusculo, foliis ovato-subrotundis acutis, subtus avenis, spicis axillariibus. Swartz prod. 15. Sw. Flor. 1. 6a. Hab. in Jamaica, summis alib. h

46. *hispidulum*, herbaceum, fol. subrotund. petiolatis tenuissimis, superne hirsutis, caule

caule erectiusculo. Swartz Flor. 63. Icon. tab. 4. Hab. in nemorosis humilis montium Jamaicae. Fl. caerulei. Pl. pusilla. ☉

47. *tenellum*, herbaceum, fol. distichis ovatis aveniis, margine ciliatis, spica ascendente, caul. simpliciter decumbente. Sw. Flora p. 65. In Jamaicae montib. supra truncos putridos.

48. *blandum*, foliis ternis lanceolatis acuminatis trinerviis ciliatis subius punctatis. Willd. p. 164. Jacq. collect. 3. p. 211. Icon. rar.

49. *curvatum*, fol. oblongis acuminatis laevibus subius punctatis nitidis, spicis brevibus curvatis. Flor. Per. p. 36. t. 64.

50. *obovatum*, fol. obovatis acuminatis utrinque attenuatis, spicis erectis, inferioribus incrassatis, superioribus tenuibus. Flor. Per. p. 36. t. 55. b. T.

51. *punctatum*, fol. oblongis acuminatis venosis utrinque punctatis, spic. foliis brevioribus. Flor. Per. t. 62. a. In Peruviae nemoribus. Stylus crassus.

52. *heteromallum*, foliis oblongis acuminatis glabris laevibus, spic. filiformibus secundis. *P. secundum*. Flor. Per. l. c. f. b. Spic. oppositifoliae.

53. *asperifolium*, fol. ovatis oblongisque acuminatis asperis, spic. junioribus curvatis, adultioribus erectis. Flor. Per. p. 37. t. 56. b. Hab. cum priore. Anth. cordato-reniformes.

54. *longifolium*, fol. oblongo-ovatis acuminatis utrinque nitidis venosis, spicis recurvatis. Flor. Per. l. c. t. 61. a. Stylus longus, stigm. erectiuscula. Hab. in nem. Pillao ad Icutanam. Fl. autumn. h.

55. *heterophyllum*, fol. ovalibus acuminatis venosis utrinque punctatis, spicis curvatis. Fl. Per. 34. t. 56. a. In Peruv. nemorib. Stigm. 3. h.

56. *callosum*, fol. ovalib. acuminatis basi callis duobus, spicis brevib. subciliatis. Flor. Per. p. 34. t. 53. a. Hab. in nemorib. Pillao. Styl. 1, longus, stigm. 2. Stam. 4. h.

57. *excavatum*, fol. ovatis acuminatis subrepandis, spic. cylindricis foliis duplo longiorib. Flor. Per. l. c. t. 54. f. b. In Cuchero nemorib. Fol. nervis supra excavatis. h.

58. *asperum*, fol. ovatis acutis rugosis, subius pubescentib., supra asperis, spicis erectis. *P. scabrum*. Flor. Peruv. 1. p. 34. t. 55. b. In nemorib. Spatha villosa. Stigm. 3, reflexa. h.

59. *unguiculatum*, fol. subcordatis 5-nerviis, acumine unguiculato basi utrinque revolutis, spic. erectis. Fl. Per. 34. t. 57. b. Crescit in Poguzo sylv. Stiam. 4, 5 et 6. Drupa 3-5-gona. Stigm. 10idem.

60. *amplexicaule*, subherbaceum, fol. lanceolato-ovatis amplexicaulibus nervosis carosis, caule erecto simpliciter. Swartz. prodr. 16. et Flor. p. 67. In India occidentali, Jamaica, in arborib. moribundis.

61. *pallidum*, foliis alternis obovatis, spicis solitariis. Forst. prodr. n. 24. Hab. in insulis Societatis.

62. *obtusifolium*, fol. obovatis enerviis subearnatis. Lam. ill. p. 81. Plum. amer. 53. t. 70. β. *P. clusiae-folium*. Jacq. coll. 3. p. 209. ic. rar. v. 2. In America calidior.

63. *retusum*, fol. obovatis retusis. Län. suppl. 91. Hab. ad Cap. bonae spci.

64. *glabellum*, herbaceum, fol. ovatis acuminatis, caule declinato radicante ramosissimo. Swartz prodr. 16. et Fl. p. 68. Hujus varietas simplex est: *P. scandens*. Swartz prodr. p. 16.

65. *serpens*, herbaceum, fol. subrotundo-acutis planis discoloribus, caule repente. Swartz prodr. 16. et Flora 69. Hab. in Jamaicae frigilior. sylvat. petrosis.

66. *cordifolium*, herbaceum, foliis obverse cordatis petiolatis plano-convexis carosis, caule repente. Swartz prodr. 16. In Jam. sylv. antiquis super arbores. Acre.

67. *obovatum*, foliis ternis petiolatis obovatis emarginatis glabris, caule repente. Vahl. Eclog. Fasc. 1. Hab. in Montserrat.

68. *nummularifolium*, herbaceum, fol. orbiculatis convexo-concavis, caule filiformi repente radicante. Swartz prodr. 16. Hab. in Jamaica, in ramis arborum.

69. *rotundifolium*, herbac., fol. subrotund. plan. carosis, caule filiformi repente. Sw. obs. 20. Jacq. obs. 1. p. 17. Plum. Am. 52. t. 69. Sloen. jam. 45. hist. 1. p. 137. In Americae calidioris montosis muscosis.

70. *peltatum*, fol. peltatis orbiculato-cordatis obtusis repandis, spicis umbellatis. L. Plum. amer. 56. t. 74. Hab. in Jamaica, Domingo. β ? *P. reniforme*, fol. cordato-reniformib. acuminatis 12-13-nerviis, pedunc. polystachiiis, spic. fasciculatis inaequalibus. *P. peltatum*. Flor. Peruv. 1. p. 38. t. 57. a. In Peruv. nemorib. ad Cuchero vicin. Spicae ad 20 usque ex pedune. communi. *A. peltato* L. diversum videtur.

71. *distachyon*, fol. ovatis acuminatis,

specie conjugatis, caule radicante. Swartz obs. 21. Plum. amer. 51. t. 67. Habit. in Americae calidioris montibus. $\overline{\text{T}}$

72. *umbellatum*, fol. orbiculato acuminatis venosis, specie umbellatis, caule erecto sulcato. Willd. f. c. p. 167. Swartz obs. 21. Jacq. collect. 2. p. 335. Plum. amer. 51. t. 73. In Indiae occidentalis ruderalis. $\overline{\text{h}}$

73. *trifolium*, fol. ternis subrotundis. Plum. amer. 52. 68. Hab. in America.

74. *pereskiaefolium*, fol. verticillatis ternis quaternive ellipticis glabris, spica terminali solitaria, caule maculato. Willd. l. c. Jacq. collect. 4. p. 126. Icon. rar. Hab. in insula Venetula. $\overline{\text{h}}$

75. *polystachyon*, fol. verticillatis rhombico-ovatis integerr. trinerviis pubescentib. Aiton. Kew. In Jamaica. $\overline{\text{T}}$

76. *quadrifolium*, fol. quat. cuneiformibus obovatis emarginatis subsessilibus, caule erecto. Swartz obs. 22. Plum. amer. t. 242. f. 3. In Americae meridionalis montibus nemorosis altissimis.

77. *verticillatum*, fol. verticillatis quaternis ellipticis obtusis trinerviis. Willd. l. c. p. 168. Amoen. acad. 5. p. 391. Syst. 3. p. 60. Hab. in Jamaica. \odot

78. *stellatum*, herbaceum, fol. verticillatis oblongis acuminatis trinerviis glabris, caule erecto. Swartz Flor. p. 74. Jacq. collect. 2. p. 212. Icon. rar. conf. Willd. l. c. Hab. in Jamaica, sylv. alpinum. $\overline{\text{T}}$

79. *reflexum*, fol. quaternis rhombeis carnosius reflexis patulisque, caule repente. Swartz obs. 23. Linn. suppl. 91. Habitat in India occidentali, ad Cap. bonae spei, et in insulis maris pacifici ad arborum truncos muscosos.

80. *pulchellum*, fol. quaternis subsessilibus oblongis enerviis integerrimis, specie terminalibus. Ait. Kew. 1. p. 50. Hab. in Jamaica. $\overline{\text{T}}$

81. *filiforme*, herbaceum, fol. linearib. oblongis obtusis 1 summis verticillatis, caule filiformi repente. Swartz prod. 16. Icon. t. 5. et Flor. p. 73. In Jamaicae montibus, in muscosis. Bacc. oblonga. stigm. villos. Sw.

PEPEROMIA. Cal. o. Cor. o. Stigma: punct. 1-2, in apice geminis; vid. Prodrum. Flor. peruv. p. 8.

Obs. Antiores operis laudati differentiam à *Piperibus* Linn. sequenti modo exhibent: differt spatulis ovatis minimis, staminibus

germine longioribus, et stigmatibus. Porro omnes sunt herbaceae, carnosae. Caules aut scapi cnoles erecti, scandentes aut repentes. Color ut plurimum ruber. — Forte nonnullae jam enumeratae species, praesertim herbaceae, huc quoque pertinent. Summam ob affinitatem, praesertim quoad habitum, Peperomias eum Piperibus adhuc conjungere melius duxi, usque dum ambarum divisionum species rite examinatae sint.

82. *scutellatum*, radice tuberosa, fol. peltatis scutellaeformibus. Peperom. *scutellaeformis*. Flor. Peruv. t. p. 29. t. 44. f. b. Hab. in Peruviae collib. ad Atiquipa.

83. *umbilicatum*, rad. tuberosa, fol. peltatis orbiculato-umbilicatis aveniis, scapo laxo. Fl. Per. p. 30. t. 45. b. In Lima collib. supra saxa.

84. *secundum*, fol. cordato-subrotundis, flor. paniculatis secundis. Fl. Per. l. c. f. a. In montib. Pillao.

85. *foliiflorum*, fol. umbellatis cordatis, basi floriferis, specie aggregatis flexuosis. Fl. Per. l. c. f. c. In Chincho montib. nemorosis, supra saxa et arbores.

86. *crystallinum*, fol. oblongis subtus punctato-excavatis, specie oppositifolis compressis. Flor. Per. p. 31. Habitat in collib. Lima. Olor Anisi.

87. *inaequalifolium*, fol. verticillatis obovatis: floralib. majoribus, specie terminalibus inaequalibus subquaternis. Flor. Per. t. p. 30. t. 46. a. In Peruviae locis saxosis et supra arbores, frequens.

88. *rhombicum*, fol. quaternis oblongo-rhombicis, specie terminalibus solitariis. Loc. cit. p. 31. f. b. Cresc. in sylvis prope Pillao.

89. *filiforme*, foliis verticillatis subrotundo-obovatis, specie terminalibus oblongis. Flor. Per. 31. t. 47. b. In Chincho nemoribus supra saxa et arb. Fl. aest.

90. *convexum*, fol. oppositis verticillatisque ovalibus subtus convexis 5-nerviis, specie terminalibus solitariis. Flor. Per. 31. t. 46. c. Cum priore.

91. *tetragonum*, fol. oblongis 5-nerviis acutis, specie terminalibus longissimis geminis. Flor. Per. l. c. t. 47. Caul. basi ramosus, punctatus.

92. *septemnerve*, fol. lanceolatis 7-nerviis coriaceis, specie subulatis fol. longioribus. l. c. f. c. Ad Poguzo.

93. *pubescens*, fol. ovatis 3-nerviis, subtus pubescentibus, specie ternis intermedia longissima. Flor. Per. p. 31. In Peruviae montib. umbrosis.

94. *alatum*, fol. lanceolatis 5-nerviis, caule alato, spic. subulatis. Fl. Per. 31. t. 48. b. In Poguzo nemorib.

95. *purpureum*, fol. ovatis acuminatis venosis, spic. laxis pendulis. l. c. p. 32. t. 49. b. Hab. in umbros. prop. Chinchao. Caul. apice divisus.

96. *pilosum*, fol. oblongo-lanceolatis acutis, basi inaequalib. pilosis, spic. solitariis axillarib. Flor. Per. 31. t. 50. a. In Poguzo sylvis, umbrosis.

97. *trinerve*, fol. ovalib. acutis trinerviis, spic. axillarib. solitariis, binis terminalib. erectis. Flor. Peruv. l. c. f. b. Cum priore crescit.

98. *obliquum*, fol. obovato-oblongis obliquis nervosis, spic. furcatis filiformib. Fl. Per. t. 51. c. Piper acuminatum. Lín. Plum. Amer. p. 54. t. 71. In Peru.

99. *acuminatum*, fol. obovatis acuminatis, spica filiformi acuta. Flor. Per. 32. t. 51. a. Petioli alati.

100. *striatum*, fol. ovato-oblongis acutis utrinque pubescentib. petiol. subtus striatis,

spic. compositis terminalib. Fl. Per. 32. t. 52. b. In Cuchero et Chinchao umbros.

101. *scandens*, fol. cordato-subrotundis, caule scandente, spicis axillarib. solitariis. Hab. cum anteced. Fol. avenia.

102. *dependens*, fol. cordatis 13-nerv. dependentib., spic. terminalib. subulatis. Flor. Per. p. 33. t. 48. a. In Poguzo umbrosis. Iodorum. Caul. radicans.

103. *emarginatum*, fol. obovatis emarginatis aveniis, peduncul. furcatis hispidatis. Flor. Per. l. c. t. 49. a. Supra saxa cum priore. Fol. basi carinata. Spic. longae, crassiusculae. Caul. teres, repens.

104. *variegatum*, fol. cordato-ovatis peltatis, spic. geminatis. Flor. Per. t. 52. f. a. *P. maculosum*. L. Plum. Amer. p. 60. t. 66. In montib. Yllo. Fol. subtus albida. Petioli macul. purpur. variegati.

105. *monostachyum*, fol. obovatis ovatisque, caule simplicissimo, spica 1, terminali. Flor. Per. p. 33. Hab. in montib. Chinchao, supra arbor. vetustarum truncos. Longitudine bipalmari.

M O N O G Y N I A.

Hemimeris *sabulosa*, *diffusa*, *montana*. Eignonia *Catalpa*, *longissima*. Poyclenum *sclerospermum*. Valeriana *Cornucop.* Boerhaavia *erecta*, *hirsuta*, *scandens*. L. Commelina *polygama*. Roth *Cellisia umbellul.* Schoenus *Mariscus* L. Sc. *Cladium* Sw. *seiacus*. Sw. Kyllinga *pumila*, et *Scirpa* adhuc nonnullae.

D I G Y N I A.

Crypsis *aculeata*, Holcus *odoratus*, Fenuca *diandra*, Saccharum *cylindricum*, Thunbergii. Agrostis *diandra*, Bromus *rigidus*, *diandrus Rothii*, etc.

C L A S S I S I I I .

T R I A N D R I A .

M O N O G Y N I A .

75. **BOERHAAVIA.** *Cal.* margo tubuloso-obconicus, integerrimus. *Cor.* 1-petala, campanulata, plicata. *Fruet.* tuberculatus. (*Stam.* 1, 2, 3, 4 et 10.)

1. *erecta*, caule tetragono glabro: internodiis viscosis, floribus corymboso-paniculatis. Willd. phytog. 1. n. 1. Jacq. hort. 1. 5 et 6. Pluk. alm. 349. t. 226. f. 7. Hab. in Vera Cruce, Jamaica, etc. $\bar{\tau}$

2. *adscendens*, fol. oblongo-ovatis subcarnosis, floribus paniculatis, pedunculis hispidis, caule adscendente. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 19. Hab. in Guinea.

3. *laxa*, fol. suborbiculato-cordatis obtusis, panicula laxa, assurgente, aphylla. *B. paniculata* Richard in Act. Soc. Nat. Paris. p. 105. Hab. in Cayenna. Basi decumbens.

4. *diffusa*, caule procumbente diffuso, fol. ovatis repandis, umbellulis pedunculatis lateralib. Lam. ill. gen. p. 10.

5. *hirsuta* L. pubescens, fructibus ciliatis. cfr. Swartz obs. bot. p. 11. et Lamarck l. c. secund. quem et *B. repens*. Lin. *B. diffusa* tantum varietas est. Hab. in Amer. austral. Jamaica, Peru. $\bar{\tau}$

6. *polymorpha*, diffusa prostrata, fol. plerisque acutis, capitulis sparsis fasciculatisque. Richard l. c. Hab. in Cayenna.

7. *plumbaginea*, fol. subcordatis, orbiculato-acutis subtus pubescentibus, floribus umbellatis. Willd. Cavan. ic. 2. n. 127. tab. 112. Hab. in Hispania ad radices Orcellitani montis. $\bar{\tau}$

8. *scandens*, caule erecto, floribus umbellatis diandris, fol. cordatis. Willd. phytog. 1. n. 4. Jacq. hort. 1. 4. Pluk.

alm. 381. t. 113. f. 7. Hab. in saxosis maritimis Jamaicae et in Peru? cfr. Flor. peruv. p. 4. ubi flos 3-andrus legitur. $\bar{\eta}$

9. *excelsa*, caule erecto, fol. inferioribus cordato-ovatis, summis ovatis, floribus umbellatis triandris. Willd. phytog. 1. p. 5. *Cor.* duplo major anteced. purpurea. W. $\bar{\eta}$

10. *repanda*, caule erecto, fol. cordatis repando-sinuatis, floribus umbellatis triandris. Willd. Sp. pl. p. 22. *Valeriana chinensis* Lin. Burm. ind. 15. tab. 6. fig. 3. In India, China.

11. *arborescens*, caule arborescente, fol. ovatis integerrimis villosis, flor. umbellatis subdecandris. Cav. description. etc. p. 6. Hab. in N. Hisp. in vicinit. Salvator. $\bar{\eta}$

12. *tetrandra*, caule repente, floribus tetrandris. Forst. prod. 2. Hab. in insulis Societatis.

76. **CALYMENIA.** *Cor.* infundibuliformis, plicata. *Nux* 1-sperma, calyce persistente ampliato membranaceo circumdata.

1. *viscosa*, floribus paniculatis fol. cordatis, staminib. corolla duplo longioribus. Flor. Peruv. 1. p. 46. Mirabilis viscosa Cav. ic. 1. p. 83. t. 19. *Oxybaphus* L'Herit. Monog. ic. Willd. Spec. 1. p. 185. Hab. in Peru. Orgyalis.

2. *ovata*, flor. dichotomo-corymbosis, fol. ovatis viscosis hirsutis, stam. corollae fere longitudine. Fl. per. 1. p. 45. t. 75. f. 6. Cum priore. 3-petalis. $\bar{\tau}$

3. *expansa*, flor. dichotomo-corymbosis, fol. ovatis subrepandis glatis, staminibus corollae longitudine. Fl. Per. 1. c. f. a. 6-petal. $\bar{\tau}$

4. *prostrata*, caule tereti articulado, flor.

subcorymbosis. fol. cordatis ovatisq., stam. corolla brevioribus. Fl. per. 1. p. 46. t. 75. f. c. In collib. peruvianis. Herbae. tripedalis.

5. *corymbosa*, caule 4-gono dichotomo, fol. corollatis. flor. corymbosis. Cav. ic. 4. p. 55. t. 379. Hab. in Nov. Hispania. Stam. cor. abbreviata. C. T.

6. *aggregata*, calycibus trifloris. Cav. loco cit. 5. p. 22. t. 437. Calyx bym aggregata. Dec. 7. p. 81. t. 11. Hab. in Nov. Hisp. in vicinis St. Augustini. Cal. villosus, semiquinquepartitus, globosus, non vero expansus in peltam uti in reliquis. C.

77. **VALERIANA.** Cal. o, aut margo minimus. Cor. 1-petala, subinfundibuliformis, 5-fida, basi hinc gibba, supera. Sem. 1. (Stam. 1, 2, 3 et 4. exserta.)

* *Valeriana.*

1. *rubra*, flor. monandris calcaratis, foliis lanceolatis integerrimis. Willd. Sp. pl. 1. p. 175. Hort. cliff. 15. Moris. hist. p. 102. s. 7. t. 14. f. 15. Hab. in Europae, Orientis ruderalis, et in Atlante. Var. flor. rubris et albis. T.

2. *angustifolia*, florib. monandris calcaratis, fol. linearibus integerrimis. Cav. ic. 4. p. 32. t. 353. Desf. Fl. atlant. 1. p. 29. Allion. pelem. n. 2. V. *monandra*. Villars delph. 2. p. 280. Moris. hist. 3. p. 102. s. 7. t. 14. fig. 16. Pluk. 319. t. 232. f. 3. In alpinis Europae, et in Barbaria. T.

3. *pilosa*, flor. triandris, fol. lanceol. connatis integerrimis, margine revolutis. Flor. Per. 1. p. 59. t. 66. f. a. Hab. in Tarmae locis frigidis. Flor. capitato-corymbosi. Canlis elongatis, subnudus. Plantag. albicantis habitu. C.

4. *connata*, flor. triandris, fol. lanceolatis integerrimis, spicis verticillatis. Fl. per. 1. e. t. 67. c. Cum priorc. Suffrutesc. Polyg. Persicariae habitus.

5. *Calcitrapa*, flor. monandris, foliis pinnatifidis. Mor. ups. 14. Moris. hist. 3. p. 102. s. 7. t. 14. f. 7. In Lusitania, Barbaria et Oriente. C.

6. *dioica*, flor. dioicis, fol. pinnatifidis subtus venosis, inferiorib. ovatis integerrimis. Flor. dan. t. 687. Roth. germ. II. p. 37. In Europae et Orientis uliginosis. Fl. corymbosi. T.

7. *brachiata*, fol. inferioribus lanceol. integerrimis, reliquis pinnatifidis laciniatis, panicula brachiata. V. *pinnatifida*. Flor. Peruv. 40. t. 69. b. Hab. in collib. altis

Limae. Suecosa. Rad. tuberosa, odore V. Phu. C.

8. *virgata*, fol. pinnatis, foliol. 2-3-fidis, laciniis linearibus, panicula subcorymbosa. Fl. Per. 1. e. t. 66. f. b. In Cantar praeruptis, in Peru. Tagos: minutae labitu. h

9. *capensis*, fol. pinnatis, foliol. ovatis dentatis. Thunb. profl. p. 7. Ad Cap. bonae spei. †

10. *globifera*, fol. pinnatis aequalib., foliol. angustis sinuato-dentatis, peduncul. radicalibus, flor. capitatis. Fl. per. 1. p. 43. t. 65. b. In Cantar et Tarmae alpinis. Rad. crassiuscula.

11. *sanguisorbae*, fol. imparipinnatis foliol. ovatis dentatis, flor. paucicollatis. Cav. ic. 5. p. 34. t. 456. Hab. in alpinis Cordillerar. Fl. Jan.

12. *decussata*, foliis imparipinnatis, foliol. lanceolatis, suprema majore, panic. divaricato-lichotoma. Fl. per. p. 42. t. c. f. b. In Huanacae locis petrosis. Ineana.

13. *paniculata*, fol. radicalib. indivisis cordatis acutis, caulinis pinnatis, panicula diffusa. Flor. per. 41. t. 70. f. a. In Peruviae uliginosis et petrosis. Villosa, radice odore foetido uti in V. Phu. Cor. subcalearata.

14. *hyalinorhiza*, fol. radical. subrotundis crenatis, caulinis pinnatifido-dentatis, panicula terminali. Flor. per. 41. t. 67. b. Hab. in arenosis coenent. Chili. Rad. tuberosa, hyalina, alba.

15. *chaerophylla*, fol. radical. subrhombis incis, caulinis imparipinnatis, foliol. laciniatis, stylo semitriphlo. V. *laciniata*. Flor. Per. 1. p. 42. t. 69. f. a. V. *chaerophyllodes*. Smith ic. ined. p. 51. t. 53. Boerhaavia Willd. Sp. 1. p. 22. Cresc. in collib. et nemorib. Limae et Chaney. C.

16. *Phu*, fol. caulinis pinnatis, radicalibus indivisis, caule laevi. Blaw. t. 250. In Akatia, Silesia, et in Peruviae collibus. T.

17. *officinalis*, fol. omnibus pinnatis, foliol. dentat. lanceolatis, caul. sulcato, Blaw. t. 271. Flor. dan. 570. In nemoribus paludosis, et in Peruvia. T.

18. *tripteris*, fol. dentatis: radicalibus cordatis, caulinis ternatis ovato-oblongis. Jacq. austr. t. 3. Pluk. alm. 380. t. 231. f. 8. Barrel. t. 742. In alpinis Helvetiae, Austriae. Involuera diphylla saepea. T.

19. *pauciflora*, caulib. simplicibus, fol. radicalibus pinnatis, caulinis trifoliatis, foliolis ovalib. serratis, panicula pauciflora.

Michaux Flor. 1. p. 18. In Americae bor. montosis.

20. *montana*, fol. ovato-oblongis dentatis, caule simplic. Jacq. Flor. aust. t. 269. Hall. Helv. n. 212. Habitat in Europae Alpibus. ☞

21. *celtica*, fol. ovato-oblongis obtusis integerrimis, caulibus linearibus. Jacq. collect. 1. p. 24. t. 1. Hall. Helv. n. 209. In alpib. Helvetiae, Austriae, Valesiae. Fl. verticillati. ☞

22. *tuberosa*, fol. radicalib. lanceolatis integerrimis, reliquis pinnatifidis. Ger. prov. 218. In Dalmatia, Sicilia, Gallo-provincia. ☞

23. *sarattis*, fol. subdentatis, radicalibus ovatis, caulibus linearibus lanceolatis. Jacq. Fl. austr. 3. t. 267. Clus. hist. 1. p. 56. bonae. Pluk. alm. 380. t. 232. f. 2. In alpib. Europae australioris. Rami brachiati. ☞

24. *elongata*, fol. radicalibus ovatis: caulibus cordatis sessilib. inciso-subdentatis, flor. racemosis. Jacq. austr. 3. t. 219. In alpibus Schneeberg Austriae inferioris. ☞

25. *pyrenatica*, foliis caulibus cordatis dentatis petiolatis: summis ternatis. Lin. Sp. plant. 46. Pluk. alm. t. 232. f. 1. In Pyrenaeis. Fol. maxima uti in Lunaria. ☞

26. *scandens*, fol. ternatis, caule scandente. Loefl. it. 235. Hab. in Cumana. †

27. *supina*, flor. 3-4-andris, fol. integris elliptis: radicalibus rosaceis obovatis. Wulf. in Jacq. Misc. 2. p. 114. t. 17. f. 2. Willd. Sp. pl. 1. p. 180. Ardnini Spec. 2. p. 13. t. 3. Habit. in Italiae et Austriae alpinis. Stam. regulariter 3. styl. simplex. Flor. corymbosi rubelli: singulus intra bracteolas (male involucrem nuncupatas), lineari-lanceol. sessilis. Wulf. ☞

* *Fedia*. Semina nuda aut dentibus coronata.

28. *villosa*, flor. tetrandris aequalibus, foliis inferioribus auriculatis, superiorib. dentatis villosis. Thunb. jap. 3a. t. 6. Willd. Sp. pl. Lin. 2. p. 181. Hab. in Japonia.

29. *polystachya*, flor. triandris, foliis pinnatis, spica composita verticillata. Smith. Icon. ined. 3. p. 51. t. 51. In agro Bonariensi, locis aquosis.

30. *sibirica*, flor. tetrandris aequalibus, foliis pinnatifidis, seminibus paleae ovali alnatis. Gmel. sib. 3. p. 123. t. 24. *Valeriana rupestris*. Pall. itin. 3. p. 215. In Sibiriae campis. Cor. lutea.

31. *ruthenica*, flor. tetrandris, foliis ovatis carnosius pinnatifido-dentatis, seminibus paleae ovali alnatis. Willd. 1. c. p. 181. *V. lutea humilis*. Amman ruth. 18. n. 25. t. 3. Hab. in Sibiria. ☞

32. *carnosa*, flor. triandris, fol. ovalibus dentatis carnosius glaucis. Smith. Icon. ined. fase. 3. p. 52. t. 52. In America meridion. ad fructum Magellanicum. ☞

33. *Cornucopiae*, flor. dian-drís ringentibus, fol. ovatis sessilibus. Kniph. origent. 10. n. 91. Sabbat. hort. rom. 2. t. 15. Hab. in Armenia, Mauritania, Sicilia, Hispaniae et regni Chilensis arvis et locis arenosis. Pelunculi incrassati. ☉

34. *serrata*, foliis lanceolato-spathulatis superne serratis, spicis verticillatis. Flor. per. 40. t. 68. c. In Peruviae subalpinis. Rad. crassa. Caul. plures. Sem. squamis coronata.

35. *coarctata*, fol. lanceolato-spathulatis integris, margine ciliato-denticulatis, spica coarctata (verticillis contiguis). Flor. per. 1. c. f. c. Rad. subfusiformis, ramosa, quar ut remelium specificum ad fracturas perhibetur. Fl. hyeme in Tarmae locis altis frigidis.

36. *echinata*, flor. triandris regular., fol. dentatis, fructu lineari tridentato: extimo majore recurvato. Colum. ceph. 1. p. 204. t. 206. Hab. in Italiae et Neapolit. umbrosis. Cor. infundibuliformis, regularis. Stigma trifidum. Pelunculi incrassati. ☉

37. *olitoria*, caul. dichotomo, fol. linearilanceolatis integerrimis, fructu nudo. Willd. 1. c. p. 182. *Valeriana Loeusta*. Lin. flor. succ. 32. 36. p. Folii summis dentatis. Intersegetes Europae et Barbariae. ☉

38. *dentata*, caule dichotomo, fol. lanceolatis, fructu tridentato: dentibus binis brevissimis. Willd. Hall. Helv. n. 215. Cum priore. Variat foliis subdentatis. W. ☉

39. *vesicaria*, caul. dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu inflato globoso. Willd. *V. eretica*, fructu vesicario. Tournef. cor. 6. Boerh. lugdb. 1. p. 75. t. 75. Hab. in Creta. Calyx infl., dentibus scissis 6. ☉

40. *coronata*, caul. dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu sexdentato. W. *Valerianella* semine Scabiosae stellatae. Colum. ceph. 1. 207. t. 209. In Lusitania. ☉

41. *discoidea*, caule dichotomo, fol. lanceolatis dentatis, fructu duodecimdentato, dentibus uncinatis. Moris. hist. 3. p. 104. t. 7. t. 16. f. 29. In Italia, Hispania. ☉

42. *radiata*, fol. spatulato-oblongis

subintegris, fructu pubescente sub-4-gono, capitulis involucreatis. Mich. Flor. 1. p. 18. *Valeriana Locusta radiata*. Sp. plant. 48. In apricis Carol. infer. \mathcal{T}

43. *pumila*, caule dichotomo, fol. imis dentatis, summis linearib. multifidis, Saur. monsp. 13. Thunb. Flor. par. p. 16. Hab. Monspelii et Parisiis. \odot

78. PHYLLACTIS. Flor. involucreati : *Involucrum* 1-phyllum, vaginans. *Cal.* margo minimus. *Cor.* trifida. *Sem.* 1. (Genitalia exserta.)

1. *rigida*, acaulis, radice crassa, fol. radiantibus brevibus lanceolatis-linearib. mucronatis. *Valeriana rigida* Flor. per. 1. p. 39. t. 65. f. c. Hab. in Tarmae provinc. alpihus. Fl. Octob., Novemb. Fol. vix disco longiora. \mathcal{T}

2. *tenuifolia*, acaulis; radice fusiformi, fol. radiantibus longis linearibus-subulatis gracilibus. *Valeriana tenuifolia*. Flor. per. 1. c. f. d. In Tarma et in Huachochiri provincis Peruv. Nov. Dec. \mathcal{T}

3. *spathulata*, caespitosa, fol. spathulatis. \mathcal{V} . *spathulata*, fol. spathulatis sublinearibusque obtusis, cor. 3-fidis, umbella sessili involucreata. Flor. per. 1. p. 40. t. 68. b. Hab. in Tarmae alpihus. \mathcal{T}

Obs. Duae praesertim priores species flores compositos mentientes, habitu à Valerianis nimis recedunt, ut cum iis conjungi possent.

79. TRIPTERELLA. *Cal.* 6-fidis, alato-angulosus, supra basin solidam tubulosus. *Cor.* nulla. *Stigm.* 3. *Caps.* 3-quetra, 3-locul. polysperma. (*Stam.* inclusa.)

1. *capitata*, setacea, fol. subulatis, florib. in capitulo terminali fasciculatis, calyce angulis subaptero. Michaux Flor. 1. p. 19. t. 3. Hab. in Carolinae et Cayennae udis. Simplex, subaphylla. An *Vogelia* Gmel. S. N. L. 2. p. 107?

80. OLAX. *Cal.* integer. *Cor.* infundibuliformis, 3-fida, Nectar. 4-phyllum.

1. *zeylanica*. Amoen. acad. 1. p. 187. Vahl. symb. 3 p. 7. In Zeylous. Arbor ramis saecis rugosis Visci.

81. MACROLOBIUM. *Cal.* duplex : exterior 2-phyllum, interior tur-

binatus oblique 4-fidus. *Petalum* 1. *Legum.* mono perumum. *Stam.* longa.

1. *bisfolium*, fol. binatis, foliol. ovatis acuminatis obliquis, legumine oblongo basi tricarinato. Willd. Sp. pl. 1. p. 186. *Vouapa bifolia*. Aubl. guj. 1. p. 25. t. 7. Lam. Illustr. p. 97. t. 26. In sylvis Cajennae, Gujanae ad ripas fluviorum. \mathcal{h}

2. *sphaerocarpum*, fol. binatis, foliol. ovatis acuminatis, reticulatis, legumine subrotundo compresso. Willd. 1. c. *Vouapa Simira*. Aubl. guj. 1. p. 27. t. 8. V. violacea Lam. 1. c. In sylvis Gujanae. \mathcal{h}

82. OUTEA. *Cal.* 5-dentatus bi-bracteatus. *Petala* 5 : superiore maximo, Filam. sterile recon-dente. *Legumen* pedicellatum. *Stam.* longissima.

1. *guianensis*. Aublet p. 29. t. 9. Lam. illustr. p. 97. t. 26. *Macrolobium* pinna-tum. Willd. Sp. pl. p. 186. Habitat in Guiana. Arb. fol. impari-pinnata. Flor. racemoso-apicatis.

83. TAPURA. *Cal.* campanulat. 6-partit. basi tribract. *Cor.* 5-pet. bilabiata. *Stigm.* 3, revoluta.

1. *gujanensis*. Aubl. t. 48. *Rohria petioliflora* In sylvis Gujanae. Fol. alterna acuminata integerrima venoso-reticulata. \mathcal{h}

84. RUMPHIA. *Cal.* 3-fidus. *Petala* 3. *Drupa* 3-locularis.

1. *amboinensis*. R. tiliaefolia Lam. ill. p. 96. t. 15. Rheed. mal. 4. p. 25. t. 11. In India. Arbor procera, Racemi axillares. \mathcal{h}

85. CNEORUM. *Cal.* 3-4-lentatus. *Petala* 3-4, aequalia. *Stam.* 3-4. *Drupa* 3-4-cocca.

1. *tricocon*, foliis glabris, florib. axillaribus. Lin. Lam. ill. p. 99. t. 27. Hab. in Gallia meridione, Hispan. et Barbar. Acris. Fol. lanceolata, semperviresc. \mathcal{h}

2. *pulverulentum*, fol. cinereo-pulverulentis floriferis, petalis staminibusque 4. Ventenat. Pl. du Jard. de Cels. p. 77. t. 77. Hab. in Teneriffa. Fl. aest. \mathcal{h}

86. COMOCLADIA. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-partita. *Drupa* oblonga : nucce biloba.

1. *integrifolia*, fol. pinnatis, foliolis petiolat. ovatis acumin. integerrimis. Willd.

Sp. pl. p. 187. Jacq. amer. 12. Sloan. jam. 184. hist. 2. p. 131. t. 222. f. 1. In America calidior. h

2. *dentata*, fol. pinnatis, foliol. petiolat. oblong. spinoso-dentat. basi cuneatis. Willd. l. c. p. 188. Jacq. amer. 13. t. 171. f. 4. In America meridionali. Arbor odore siccioris. h

3. *ilicifolia*, fol. pinnatis, foliol. sessilibus ovatis cidentatis basi subrotundis. Willd. l. c. p. 188. Swartz prod. et Flor. 75. Hex Dodonaea. Lin. Sp. Plant. 2. p. 180. Plum. gen. 20. icon. p. 108. t. 118. f. 1. In insulis Caribaeis et Antiquae petros. calcareis. Arb. Flores racemosi ut in Rhoe.

4. *angulosa*, fol. pinnatis: foliol. sessilibus subrotundis spinoso-dentatis. Willd. Lam. encycl. t. 27. f. 2. In America. h

87. *WILKICHIA*. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Caps. 2-locularis, polysperma.

1. *repens*. Hab. in Mexico. Mutis. Planta obscura videretur. Folia orbiculata, subpeltata, hirsuta, sulcus rubescentia. Flores parvi, rosei, calyce hirsuto. ☉

88. *ROTAIA*. Cal. tubulosus, 3-dentatus. Cor. o. Caps. 3-locularis, polysperma.

1. *verticillaris*, fol. verticillatis. Manti. 175. Hab. in India orientali. Fol. quaterna, rarius in ramis 5-8. Calyx capsulam obvestiens, membranaceus. ☉

89. *ORTEGIA*. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. apice 3-valvis, 1-locularis, polysperma. Sigm. 1 et 3.

1. *hispanica*, caule ramoso, pedunculis multifloris. Willd. Sp. 1. p. 190. Cav. ic. 1. p. 35. t. 17. Desf. atl. 1. p. 31. In Hispania et Barbaria. ☿

2. *dichotoma*, caule dichotomo, pedunc. unifloris. Willd. l. c. Allion. stirp. ped. 176. t. 4. f. 1. In Italia. Statura Galii. Affinis Polycarpo. ☿

90. *LOEFLINGIA*. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala, minima. Caps. supera, 1-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *hispanica*. foliis subulatis mucronatis basi setosis, floribus axillaribus sessilibus. Willd. Spec. pl. p. 191. Loeff. it. 113. t. 1. f. 2. Cavan. ic. 1. p. 64. t. 94.

In Hispaniae collibus apricis, et prope Mascas in Barb. Desf. Facies Scleranthi, ramis diffusis. ☉

2. *indica*, fol. oblongis, florib. axillaribus cymosis. Willd. l. c. Retz. obs. 4. p. 8. Pharnaceum depressum. Lin. Mant. alt. p. 564. Hab. in India orientali. Caul. numero: i prostrati simplices. Planta Mollugini similis.

91. *POLYCNEMUM*. Cal. 3-phyllus. Pet. 5, calyciformia. Sem. 1, subnudum. (Stam. 1, 2, 3 et 5.)

1. *monandrum*, monandrum, fol. linearib. acutis caule erecto. Willd. Sp. pl. 192. Pall. itin. 1. app. n. 94. tab. G. f. 1. In Sibiria, locis aridis subsalsis. ☿

2. *sclerospermum*, diandrum, fol. teretibus carnosius, caule erecto ramoso. Willd. l. c. Pall. itin. 3. app. n. 84. t. M. fig. a. E. c. In limosis salis Sibiriae. ☉

3. *arvense*, triandrum, fol. subulatis triquetris, caule diffuso. Willd. l. c. In Europae arvis. ☉

4. *salsum*, triandrum, fol. filiformibus carnosius vaginantibus, caule diffuso. Willd. l. c. P. triandrum. Pall. itin. 1. app. n. 95. tab. G. fig. 2. et H. fig. 1. Hab. in locis subsalsis Sibiriae.

5. *oppositifolium*, pentandrum, fol. oppositis carnosius semicylindricis, caule erecto. Willd. p. 193. Pal. itin. 1. app. 98. t. H. fig. 2. Hab. versus mare caspium. ☉

92. *HIPPOCRATEA*. Cal. 5-partitus. Petala 5, apice foveata. Caps. 3, compressae, bivalves: valvis carinatis. Sem. hinc alata.

1. *scandens*, fol. ovato-lanceolatis serratis, racemis corymbosis, capsulis obcorlatis. Lam. ill. gen. 1. p. 100. t. 28. l. 1. (H. obcordata.) Jacq. Am. t. 12. Hab. in Amer. australi. h

2. *ovata*, fol. ovalibus leviter dentatis, caps. ovatis. Lam. l. c. f. 2. H. volubilis. β. L. Willd. Sp. 1. p. 193. Plum. gen. 8. ic. 28. Cum priore. h

3. *comosa*, paniculis comosis, pedunc. multifidis capillaribus, fol. ovatis integris. Swartz Flor. Ind. occid. 1. p. 27. Plum. ic. 77. t. 88. f. a. b. H. multiflora. Lam. l. c. p. 101? Loeff. it. p. 314. In Hispaniolae interioris sylvis. Fl. Febr. Nuclei albi, subdulces. h

4. *verticillata*, flor. verticillatis. (C. senegalensis, fol. ovatis leviter dentatis,

ramulis punctatis, flor. verticillatis. Lam. ill. p. 101. h.

♂ *madagascariensis*, fol. ovatis acutis nitidis subintegerrimis, ramulis leprosis, flor. verticillatis. Lam. l. c.

5. *viridis*, scandens, corymbis dichotomis, fol. ovatis obtuse acuminatis. Flor. Per. t. p. 44. t. 74. f. a. In Andium nemorib. ad Poguza. h

6? *Anthodon*, flor. ciliato-dentatis. *Anthodon decussatum*, scandens, corymbis dichotomis, fol. oblongis laeviter serratis. Flor. Per. t. p. 45. t. 74. f. b. Cum priore.

93. **TONSELIA.** *Cal.* 5-partitus, *Petal* 5. *Nect.* urceolatum. *Bacca* 1-locut., 4-sperma.

1. *scandens*, fol. integerrimis acuminatis. Willd. l. c. p. 191. Vahl. symb. 2. p. 17. *Tontelea scandens*. Auhl. guj. t. p. 31. tab. 10. In Gujana et Insula Trinitatis. h

94. **FISSILIA.** *Cal.* urceolatus, integer. *Cor.* tubulosa, petalis 3, conniventibus: binis bifidis. *Stam.* 8: 5 sterilia. *Nux* 1-sperma, glandiformis.

1. *Psittacorum*. Lam. ill. p. 102. t. 28. Willd. Sp. pl. 194. In insula Bourbon. Pedunculi axillares uni- bi- vel triflori.

† **INDEX** (Gen. 95-112.) *Cor.* supera, tubulosa, 6-partita, rarius 6-petala, limboaequali aut subingente. *Caps.* infera, 3-locularis, 3-valvis, polysperma, in affinis supera. *Filam.* 3, in nonnullis connata. Flores spathacei. *Fol.* ut plurimum ensiformia. *Radix* fibrosa, tuberosa, plerumque bulbosa, perennis.

95. **CROCUS.** *Spatha* radicalis. *Cor.* infundibuliformis: tubo longissimo gracili. *Stigmata* profunde incisa, cristata (crocea).

1. *officinalis*, foliis linearibus mar-inc revolutis, stigmatibus exsertis: segmentis longissimis linearibus. Smith Flor. angl. 1. p. 39. Engl. bot. t. 343. *C. sativus*. Willd. Sp. 1. p. 194. Hab. in Oriente, nunc in hortis ob usum colitur.

2. *vernus*, fol. linearib. planis, stigm. incluso: segmentis incrassatis brevissimis. Smith. l. c. 40. Engl. bot. 1. 344. Curt. bot. mog. t. 45. Hab. in Europaeis alpinis, in pratis anglicis rarius et in Atlante. (Desf.)

3. *nudiflorus*, aphyllus, stigmatibus incluso trifido, segmentis capillaceo-multifidis. Smith loco citato. p. 41. *C. multifidus*. Ramond

in Bulletin des Sciences, n^o. 41. t. 8. f. 1. p. 129. Cresc. in Anglia, in Pyrenaeis et in Gallia circa Dav. autumnano flores, folia vere Colchici ad instar profert.

96. **GALAXIA.** *Spatha* (subradicalis) 1-valvis. *Cor.* infundibuliformis: tubo longo. *Filam.* connata. *Stigmata* 3, lobata-fimbriata. (Plantulae subcaules; flor. plerumque laevi.)

1. *ovata*, fol. ovatis margine cartilagineis glabris. Th. diss. acad. 1. p. 49-50. Jacq. coll. p. 137. Ic. rar. 2. t. 291. Willd. Sp. 3. p. 583. Lx. Lin. Suppl. p. 93. In Cap. bon. spei collibus, cum sequentibus. *Cor.* fava, passim et violacea.

2. *ciliata*, fol. elongatis ciliatis. *G. ovata*, fol. ovatis margine ciliatis, cor. longissimis arcuatis flavis. Andrew Reposit. t. 94.

3. *graminea*, foliis linearibus subulatis. Thunb. l. c. Fol. basi dilatata. Stigm. infundibuliforme, lacero-multifidum. Jacq. coll. 2. p. 341. t. 189. f. 3.

97. **ARISTEA.** *Cor.* (caerulea) tubo breviusculo. *Stigma* simplex, obtuso-subconcavum: *Scm.* compressa, scabrida.

1. *eriphora*, florib. pedunculatis, spathis villosis-lacris. *A. cyanea*. Aiton. Kew. 1. p. 67. Andrew t. 10. Willd. Spec. 223. *Lx. africana* L. Gramen eriphorum etc. Pluck. mant. 98. Hab. ut et sequentes species, quibus coroll. plus minusve cyanea est, ad Cap. b. Spci.

2. *spicata*, fol. ensiformibus, floribus spiratis confertis. *A. major*. Andrew t. 160. *Spatha* diphylla, parva. *Stigma* orbiculare, marginatum. Flor. sessilis.

3. *bracteata*, fol. linearibus distichis, caule subpaniculato, floribus pedunculatis bracteis latis inclusis. Moraea caerulea Thunb. diss. acad. 2. p. 286. n^o. 15. t. 2. f. 2. *Spathae* universales (bractee) naviculares, partial. ovatae. Th.

4. *spiralis*, scapo compresso articulado, fol. erectis, flor. ternis subsecundis. Thunb. Diss. n. 2. Diss. acad. 2. p. 283. *Cor.* albidocaerulea, intus basi macula cordata. *Stigma* truncatum, villosum. Th.

5. *fruticosa*, caule ramoso fol. imbricato. Thunb. diss. de Lx. t. 1. f. 3. Flor. caerulea, tubus filiformis. *Stigma* simplex Thunb. Hoc inter et sequens genus intermedia species videtur.

98. WITSENA. *Spatha* nulla? *Cor.* tubo ut plurimum longo, laciniisque rectis, inter folia disticha. *Stigm.* emarginatum, aut subtrifidum.

1. *Maura*, floribus discoloribus extus tomentosis. Thunb. Nov. gen. pl. afr. diss. ac 1. p. 33. *Antholyza* L. *Ixia disticha*. Lam. encycl. 3. p. 333. secundum quem (contra *Thunbergium*) *stigm. trifidum* et *germen inferum*, uti in confinis. In montosis nemorosis Cap. b. Sp. Coll. atrum, limbus luteus.

2. *magellanica*, cor. tubo brevissimo profunde partito. Tapeina Jussieu gen. pl. p. 59. *Ixia* Lam. l. c. *Moraea* Willd. Sp. Galaxia Cav. Diss. 6. t. 189. f. 4. In fretu Magellanico. Fol. minima. Flor. parvuli, subsessiles inter folia spatharum acmulo. Juss. An. uti et aequens, hujus generis?

3. *pyramidalis*, caule subramoso, fol. nearib. striatis distichis patentissimis: superioribus spathacris. Lam. enc. 3. p. 334. sub *Ixia*. Hab. in Mauritia. Tab. longissimo filiform., lacinia unica strictiore (ut in *Antholyza* nonnullis.) Stigmata 3-bifida. Lamarck.

99. ANTHOLYZA. *Cor.* (stipitata) longe tubulosa: tubo recurvo subcylindrico laciniae ovato-lanceolatae: supremæ fornicata longiore. *Spatha* bivalvis, ovata. (Genitalia exserta. Anth. saepius caeruleæ. Stigmata 3-6.)

1. *Cunonia*, cor. subpapilionacea, lacin. duabus externis latioribus adscendentibus. Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 222. Mill. ic. 75. t. 213. Decand. et Redouté Liliacées, t. 12. Cor. peculiari est structura, intus nectarifera, colore coccineo. Hab. cum caeteris specieb. ad Cap. bonae Spei.

2. *aethiopica*, fol. ensiformib. attenuatis, spica disticha. Thunb. prod. p. 7. Andrew. Bot. Repos. t. 210. *Spath.* foliola connivent. Cor. flavo-coccinea, lacin. lanceolatis: superiore genital. longiore.

3. *ringens*, fol. ensiformib. plicatis, flor. subsecundis, scapo colorato. Andrew. t. 3a. *Spath.* longior, patula. Cor. lacin. superiore genital. brevior. Scap. purpureæ.

4. *plicata* (hirta), fol. ensiformibus plicatis, spicis secundis, spathis ovatis villosis. Thunb. l. c. caule ramoso hirsuto, cor. ringente staminibus brevior. Lin. Suppl. p. 96.

5. *abbreviata*, fol. linearib. 4-gonis, spatha cor. tubum subaequante. Gladiolus *abbreviatus*. Andrew. t. 166. Cor. habitu præcedentium: lacin. breviusculæ, ovatae.

100. WATSONIA. *Cor.* recurvata tubuloso-cylindrica, aut (plerumque) tubuloso-dilatata, infundibuliformis: laciniis omnibus æqualibus strictis. (Spica disticha saepius, foliolis sparsis oblecta, Genitalia exserta.)

1. *tubulosa*, flor. distichis, cor. tubuloso-clavata: laciniis brevibus ovatis, spatha 2-valvi, fol. lanceolatis. Andrew. t. 174. Flor. geniculati rossi, alboque variegati. Cum sequentibus ad Cap. b. Spei.

2. *Jacquini*, flor. secundis, cor. tubulosa: lacin. rectis minutis ovatis, spatha trivalvi, fol. linearibus. Gladiolus *tubulosus*. Jacq. Coll. 4. p. 155. Ic. pl. rar. Flor. rubicundi *Aloen* rescentes.

3. *fulgens*, flor. distichis cernuis: saepe ampla, fol. lanceolatis longissimis. Andrew. t. 192. Flor. coecinei, lacin. subreflexæ; anth. caeruleæ. Fl. maio.

4. *lucens*, fol. basi filiformib. apice linearibus nervosis, spica oblonga disticha. Anthol. *Lucidor*. Lin. fl. Th. prod. p. 17. An hujus generis? Flor. oblongi, parum incurvati, lac. lanceolatis, subinaequales, cfr. Willd. Sp. 221.

5. *præcox*, fol. ensiformibus, apice linearibus cruciatis, flor. subsecundis parvis, Gladiolus. Andrew t. 38. Cor. rubra, subcampanulata, petal. non undulatis, sed semina marginata.

6. *revoluta*, cor. infundibulif., fol. linearibus revolutis. Gl. Watsonius. Thunb. Jacq. Coll. 3. p. 257. Fj. Ic. rar. 2. Pet. angusta. Fl. coccinei.

7. *humilis*, cor. infundibulif., fol. linearibus ensiformib. pilosis. Watsonia humilis. Mill. ic. t. 297. f. 2. Anth. *Merianella* L. Glad. Thunb. Willd. t. p. 214. Hab. in Cap. b. Sp. summis montib. Cor. hypocrateriformis, tubo purpurascens, lacin. flavis.

8. *Meriania*, cor. subinfundibulif., fol. ensiformibus glabris. Lin. Gladiolus Th. Jacq. ic. rar. 2. t. 230. Coll. 4. p. 159. Plantae Liliacées, t. 11. Flor. rubri. Cor. Polyanthus.

9. *marginata*, spica longissima, flor. alternis cernuis, fol. ensiformibus multinerviis marginatis. Thunb. diss. n. 20. Willd. 218, sub Gladiol. *Antholyza caryophyllæ* Houtt. Syst. Lin. t. 79. f. 3.

10. *iridifolia*, cor. cernuis, lacin. oblongis campanulatis, fol. ensiformib. spathisque distichis. Jacq. coll. 4. p. 451. Ic. rar. 2. Glad. *cardinalis*. Geuns et Schneev. ic. t. 27. Styl. ramosus.

11. *laccata*, cor. infundibulif. cernuis, lac. ovatis planis, fol. lineari-ensiformib. obliquis. Gladiolus. Jacq. l. c. 171. ic. rar. Cor. laccæ florentinæ colore. Jacq.

12. *palustris*, fol. lineari-ensiformib. scapo polystachio altissimo, spicis pendulis. *Iris pendula*. Thunb. Willd. Sp. 1. p. 204. Lin. Suppl. p. 91. Cresc. in locis udis prope Kromrivier ad Cap. h. Sp. Caul. teres ramosus, ramis filiformib. duris. Cor. campan. sanguin. pet. lanceolatis. Th.

13. *recurva*, fol. ensiformibus, flor. pendulis subaequalib. lanceolatis recurvis. Gladiol. Lin. mant. 28. Mill. ic. t. 235. f. 2.

14. *Hyacinthoides*, spica multiflora, flor. pedicellatis campanulatis suberectis, fol. falcatis brevibus. A. *spicata*. Andrew. t. 56. Cor. incarnata pallida, crassiuscula, lacinii ovatis, spatha rubro-marginata, vaginans: valvula altera linearis parva.

15. *amoena*, fol. ensiformi-linearibus glabris, caule ramoso, spathæ valvula inferiore apice bifida. Glad. *roseus* Jacq. Coll. Suppl. p. 22. ic. rar. t. 261. Willd. Spec. 1. p. 217. G. *amoenus*. Ehrh. Caul. flexuosus. Spatha scariosa, straminea cum rubore. Flor. spicati, secundi, inodori. Jacq.

♂ *rosea*. Gladiolus *roseus*, fol. lanceolatis tortis rubro-marginatis pubescentib. flor. roseis odoratissimis. Andrew. t. 11. Fl. maj., jun.

101. GLADIOLUS. Cor. tubulosa, varia, erectiuscula; laciniae ovato-lanceolatae, undulatae. Genitalia adscendentia, pistill. pone stamina versus laciniam superiorem. (Spatha 2-3-valvis, valvulae ut plurimum lanceolatae. magnæ. Stigm. 3. Sem. in multis alata.)

* Cor. *ringens*; laciniae inaequales. Tubus incrassatus, subincurvus.

1. *flexuosus*, cor. ringentis tubo spathæ duplo longiore, scapo flexuoso. Thunb. diss. de Glad. n.º. 2. t. 1. f. 1. Ejusd. diss. acad. 2. p. 160 et 161. et prod. p. 29. Crescit uti cactiæ fere omnes species ad Cap. h. mæ spei. Fol. tub. florescentia nulla. Cor. albo-incorn. Th.

2. *tristis*, cor. cernuis, tubi simplici,

fol. trinerv. bisulcis linearib. (Thunb. l. c.), fol. lineari-cruciatas, cor. campanulatis, spatha 3-valvi. Jacq. coll. 4. p. 157. ic. rar. Trew. t. 39. Numerosas hujus speciei varietates vid. ap. Thunb. diss. acad. p. 167-166. Flor. pauci odoratis. Cor. unicolor ochroleuca, incurva, laciniae planae. Jacq. *Antholysis* hinc valde affinis. Cor. lacin. summa latissima, subfornicata, infima angustissima. Thunb., quo cum Hebeis convenit.

3. *spiralis*, fol. linearibus spirilibus, cor. fauce infundibulif., lacin. punctatis, spatha bivalvi 1-diphylla. Gl. trius. ♂ Jacq. coll. 5. p. 10. ic. rar. Cor. leucophaea, lacin. 3 superior. parum latiores.

4. *pteryophyllus*, fol. linearib. quadrilatis, cor. infundibulif. subringente, spatha bivalvi. Glad. *tristis*, var. Lin. Jacq. coll. 4. p. 158. Scap. gracilis, superne inflexus, uniflor. plerumque, fol. vaginatus. Cor. triste caerulea, lacin. crispulæ, flavesc. cum adspersis punctis atropurpureis. Jacq.

5. *punctatus*, fol. lanceolato-linearib. planis basi vaginantib., scapo altioracemoso, cor. infundibuliformi compressula. Jacq. coll. 4. p. 160. ic. rar. t. 247. Cor. caerulea, sign. lacin. lutescentes. Fol. infimum maculis punctisque variegatum.

6. *gracilis*, fol. linearib. vaginantibus, cor. subringente, lac. obtusis, scapo flexuoso subulbifloro geniculato. Willd. sp. 1. p. 211. Jacq. coll. 2. p. 159. ic. rar. t. 276. Bulb. pili magnitudine. Flor. subcernui 1-2. Spatha 2-valvis, longa lanceolata. Cor. tub. albus, fauce violacea vel caerulea. Jacq.

7. *violaceus*, odoratus, cor. ringente, caule basi colorato punctato, fol. linearib. G. *ringens*. Andrew. G. fol. longissimis, lacin. infer. flavesc. t. 27. ♂ fol. caul. flexuosum ad dimidium adaequante, lacin. 3 infer. striato-punctatis. t. 227. Col. violaceo-purpurea. Odor violæ fortissimus. Species inter antecessorem et sequentem intermedia.

8. *brevifolius*, cor. subringente, spathis tubo brevioribus, flor. secundis, fol. linearib. convolutis vaginatis brevissimis. Willd. p. 213. Jacq. ic. rar. 2. t. 249. Collect. 4. 156. Hab. ad Cap. h. spei. Similis sequenti, sed foliis satis distinctis. W.

9. *communis*, cor. subringente, spathis tubo longioribus, flor. secundis, fol. ensiformibus nervosis. Willd. Fol. ensiformibus distantibus. Hort. cliff. 20. Bull. herb. ic. Roth. germ. 1. p. 18. Hab. in Europa australi et in Barbaria.

10. *carneus*, cor. subringente, fol. ensiformibus striatis glabris ad oras cartilagi-

neis, scapo flexuoso recto, florib. cernuis. Jacq. ic. rar. 2. t. 255. Collect. 2. p. 379. Andrew. t. 240. Burm prod. cap. 2. Hab. ad Cap. bonae Spei. T.

**** HIRSEA.** *Cor. tubo brevi, lacin. divaricatis, suprema lanceolata fornicata, laterales obovatae, 3 inferiores angustae, pendulae subunguiculatae.*

11. *formosus*, cor. divaricata ringente, lacioliis sublinearib. alternis crispis, foliis lanceolato-ensiformibus crispis ciliatis. G. striatus. Jacq. coll. suppl. p. 28. ic. rar. 2. t. 260. Willd. t. p. 210. Cor. tubus caeruleus, lacin. interior. undulato crispae, luteae basi rubicundae.

12. *alatus*, cor. divaricata ringente, lacin. summa falcata, fol. lineari-ensiformib. scapo ramoso. Jacq. coll. 4. p. 165. ic. t. 259. Willd. p. 216. Fol. linearia, longiss. Flor. odore corticis citri, tub. pallid. limb. cinerascit. Jacq.

13. *gateatus*, fol. ensiformib. obtusis, petalis lateralibus latissimis. L. Jacq. enll. 4. p. 167. ic. rar. t. 258. Cor. violaceo-pallens. β Andr. t. 122. lacin. summa rotundata. Cor. rubro-punicea, lacin. infer. sursum virescent.

14. *tabularis*, fol. lanceolatis nervosis, scapo aphylo, cor. tubo spatha aequali. G. montanus. Thumb. Diss. n. t. t. 1. f. 4. Willd. Sp. 1. p. 208. Hab. in monte Tabulari ad Cap. b. Sp. Fol. radical. linearia, longitudine fere scapi.

15. *orchidiflorus*, spica multiflora, flor. secundis, fol. lineari-lanceolat. Andr. t. 241. Hab. ? Cor. fusco-fuliginea; lac. inferior. luteo-maculata. Stigm. 6. Flor. mart.

16. *bicolor*, cor. ringente, spathis lacroaristatis. Thumb. Jacq. coll. Suppl. 25. ic. rar. t. 240. Cor. flavae, lacin. apice caeruleis.

**** LEMONIA.** *Cor. campanulata, tubo subbrevis parum incurvo, laciniis profundis subaequalibus ovatis.* (Pourret in act. Tolos. vol. 3. p. 13.)

17. *tenellus*, cor. subringente infundibuliformi, fol. linearibus convolutis. Jacq. ic. rar. 2. t. 248. Coll. 3. p. 255. Var. β flava. Coll. 4. p. 169. t. 3. f. 1. Cor. ochroleuca, cum linea sordide violacea, laciniar. saepe punctatae. Cor. in β flava cum striis fusciscentibus, fol. lanceolato-linearia.

18. *strictus*, foliis lineari-lanceolatis, tubo spatha aequali. Ait. Kew. t. p. 63. Willd. Sp. 220. Jacq. ic. rar. 2. t. 238. Var. cor. saturate caerulea aut pallide purpurasc.

19. *plicatus*, cor. ringente-subcampanulata, flor. subsecundis, spatha trivalvi, fol. ensiformibus plicatis hirsutis. Jacq. coll. 4. p. 155. Ic. rar. 2. t. 237. Thumb. diss. n. 24. Willd. Sp. 1. p. 220. Cor. subviolacea, lacin. superior curvata; inferiores reliquis paulo breviores, macula oblonga albida. Germ. hirsutum. Ixiom aut Antholyz. refert. Th.

* *nervosus*, fol. ensiformibus plicato-nervosis villosis, racemulis plurib. alternis, tubo spathis brevior. Lam. enc. 2. p. 724. Flor. majores. Spath. pubescens.

20. *hyalinus*, cor. ringente; lacin. planis, scapo stricto paucifloro. Willd. Sp. 1. p. 211. G. strictus Jacq. coll. 4. p. 179. ic. rar. 2. t. 242. Cor. tub. caeruleo, limb. pellucidus; lacin. summa latior albida cum reliquis flavescentib. striis punctisque purpurasc. Jacq.

21. *puniceus*, fol. linearibus, flor. horizontalib. secundis immaculatis, petal. inferioribus paulo longiorib. Lam. enc. 2. p. 727. Pluck. t. 187. f. 4. Bryn prod. t. 12. f. 1.

22. *crocatus*, fol. ensiformib., flor. alternis, cor. campanulata, lacin. ovatis, basi hyalinis. Wendl. obs. bot. p. 5. t. 4. Ixia crocata Lin. Willd. p. 205.

Obs. Ob stigma pone stamina incurva huc relata est haec species cui quoque forte associandae essent Ixia *deusta* et *squalida*. Ait.

23. *sulphureus*, cor. infundibuliformi campanulata, lacin. lanceol. obtusis, fol. ensiformib. margine villosis. Jacq. coll. 3. p. 254. ic. rar. Cor. tub. incurvus violaceus, lacin. sulphur. Stigm. dilatata.

24. *mucronatus*, cor. subringente campanulata, lacin. mucronatis, fol. ensiformib. villosis, spatha trivalvi villosa. Jacq. coll. 4. p. 162. Ic. rar. 2. t. 253. Cor. flavesce. lacin. cuneiformes; 3 superiores purpureo-violaceae. Stigm. incrassata.

25. *nanus*, fol. lanceolatis plicatis pilosis scapum multiflorum aequantib., spatha crassa 3-valvi. Andrew. t. 137. Spath. basi ventricosa, apice scariosa. Cor. caerulea, in medio macula linearis rubra. Pet. repanda, submarginata. Stigm. incrassata.

26. *grandiflorus*, fol. ensiformib., scapo subtrifloro, petalis aequalibus emarginatis. Andrew. t. 118. Cor. sordide purpurascens; anth. coerulea. Stigm. 6. An Westonica?

27. *campanulatus*, fol. lanceol. glabris scapo subtrifloro fol. longiore, cor. subcampanulata. Andrew. t. 187. Flor. maj. Flor. purpurascens, valde appeti.

28. *versicolor*, fol. linearì-cruciatìs, flor. magnis versicolorib., spatha tubo longior. Andrew. t. 19. Color floris durante anthesi valde variabilis. Andr.

29. *albidus*, cor. subringente, lacin. acutis: 3 inferioribus, apice conniventib., fol. ensiformib. glabris subobliquis. Jacq. ic. t. 256. Coll. suppl. p. 21. Fol. plura, disticha. Stigm. apice latescens, bilamellata. β . *blandus*, fol. linearì-lanceol. Ait. Kew. 1. p. Andrew. t. 59. Cor. alba: macula bina sanguinea.

30. *falcatus*, cor. limbo patente, fol. lanceolato-falcatis. Thunb. diss. n. 4. t. 1. f. 3. Lin. suppl. 96. Cor. caerulea. Ixiæ exsiccæ affinis. Thunb.

31. *biflorus*, cor. erectæ limbo campanulato, scapo bifloro, fol. linearibus. Thunb. diss. n. 5. Hab. ad fretum Magellanicum. Scapus totus vaginis foliorum tectus. Flor. termin. biui, coloris tritist. Th.

32. *dichotomus*, cor. erectæ limbo campanulato, scapo bis dichotomo quadrifloro, fol. linearibus. Thunb. diss. n. 6. Habitat? Spathaceum fol. lineare acutum sub dichotomis. Flores secundi erecti. Thunb. l. c. An hujus gen.?

**** Cor. tubo elongato substricto, infundibuliformi dilatato, spathis multo longiore: laciniae (inferiores) plerumque medio macula (rubra) varia distinctae, lanceolatae, patulae.

33. *cuspidatus*, fol. subcernuis, cor. subringente: lacinis lanceolatis, attenuatis, fol. lucari-ensiformibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 257. Coll. suppl. p. 17. Andrew. t. 147. Spath. vaginans, longa. Cor. rubicunda: macula subcordiformi.

34. *affinis*, fol. ensiformib., cor. infundibuliformi recta, lacin. undulato-crispis, spath. valvulis aequalib. G. *cuspidatus*. β . Andr. t. 219. Cor. flavesc.

35. *crispus*, cor. tubo subgracili longissimo: lacin. subaequalibus, superioribus obovatis, fol. crispis. Thunb. Jacq. coll. suppl. 27. β . Andrew. t. 142. Fl. Jul.

36. *paniculatus*, scapo ramossimo: ramis bifloris tubo stricto cylindrico, fol. ensiformibus undulatis. G. *polystachius*. Andrew. t. 66. Cor. lacin. patulae subaequales: unica macula arcuata rubra.

37. *angustus*, flor. secundis, cor. lacin. ovatis planis, fol. linearibus. L. Willd. l. c. p. 218. Mill. ic. 142. f. 2. Thunb. diss. n. 21. Cor. lacin. inferiores macula subrhomboidica.

38. *trimaculatus*, fol. linearì-lanceolatis, tubo curvo limbo vix longior, petalis 3 macula cordiformi inscriptis. Lamarck encycl. 2. p. 727. Gladiolus flor. patenti. externe carneis, interne candidis, stellæ maculisque purpureis insignitis, suprema lacinia maxima. Brey. prodr. p. 21. t. 7. f. 2. Anteced. affinis.

39. *bimaculatus*, fol. linearì-augustissimis, petal. superiorib. breviorib. patenti-reflexis, 3 inferiorib. sublinearibus. Lam. l. c. Mill. dict. t. 236. f. 1. Cor. albidorubra, patens.

40. *ventricosus*, fol. ensiformib. nervosis glabris submaculosis: cor. limbo ventricoso, stigm. lacinis dilatato-membraceis spathulatis. Lam. l. c. Cor. tubo infundibulif. spath. subaequalis, lacin. valde inaequales.

41. *resupinatus*, cor. subringente campanulato resupinato, fol. linearì-ensiformib. glabris, scapo ramoso. Jacq. ic. rar. 2. t. 247. Coll. suppl. p. 26. Cor. lacin. macul. longitudinali atro-purpurea, lateral. interdum fascia marginali, fulva. Stigm. incrassata. J.

42. *tubiflorus*, polystachyus, corollae limbo subcampanulato, tubo filiformi longissimo, spathis villosis, fol. linearì-ensiformibus hirtis. Willd. p. 219. Thunb. diss. n. 23. t. 2 f. 2. Lin. suppl. 96. Hab. ad Cap. b. Spri.

43. *tubatus*, polystachyus, cor. limbo sublabiato, tubo longissimo, spathis, foliisque oblongis plicatis hirsutis. W. Cor. tubo gracili longissimo, lacinis alternis mucronatis, fol. hirs. ensiformib. picatis hirsutis, spatha bivalvi. Jacq. ic. rar. 2. 264. Collect. suppl. 18. β . *ioniflorus*. Andrew. t. 5. Cor. purpurea. lacin. 3 in medio macula rubra, cordiformi. Ad Cap. bonae Spri. T.

44. *floribundus*, polystachyus, corollae limbo patenti subreflexo, spathis tubo longioribus, fol. lanceolatis ensiformibus nervosis glabris. Willd. Flor. erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 254. Collect. 4. p. 162. β ? *striatus* Andrew. t. 111.

45. *securiger*, fol. linearì-ensiformibus planis, cor. labio superiore trilaminato: laminis unguiformibus perpendicularibus, bract. obtusis. Ait. Kew. 1. p. 65. Ixiæ gladiolaris. Lam. enc. 3. p. 341. An potius Ixiæ? Cor. pallide fulva. Lacin. oblongo-ovatae, passim subemarginatae. Ait.

β ? *flavus*, fol. lanceolato-ensiformibus planis, cor. labio superiore trilaminato laminis unguiformibus perpendicularibus, bracteis acuminatis. Ait. p. 65. Willd. l. c. p. 218. Antecedenti affinis.

46. *spathaceus*, fol. ensiformib. plicatis hirsutis, spathis membranaceis aristatis glabris. Thunb. diss. n°. 25. Lin. suppl. p. 56. Flor. albi li, tubo cor. spathis multo longiore. Gl. plicato et tubifloro similis. Th.

47. *longiflorus*, cor. tubo gracili substricto, lacin. obtusis, fol. ensiformi-linearibus, scapo ramoso. Thunb. diss. n°. 22. Jacq. coll. suppl. 23. ic. rar. 2. t. 262. et 2. t. 263. Ixia Ait. Willd. 1. p. 201. Cor. albidoincarnata, striis purpureis. in fauce fascia flava, lacin. sublineares, quasi truncatae.

**** *Cor. tubo gracili subfiliformi, lacin. patulis subregularibus*. (Flor. parvuli, Ixias referentes. PEARSONIA. Pourret in Act. Tolos. 3. p. 15.)

48. *anceps*, cor. tubo filiformi, scapo ancipiti flexuoso, fol. ensiformibus, margine crispis glabris. Willd. p. 216. Jacq. ic. rar. 1. 269. Thunb. diss. n°. 17. t. 2. f. 3. Lam. enc. 2. p. 728.

49. *fissifolius*, cor. tubo filiformi, scapo ancipiti, fol. ovatis amplexicanalib., margine undulatis, subtus hirtis. Willd. Gl. tubo filiformi longissimo, florib. sessilib. axillaribus, fol. hirtulis, in superiore margine fissis, superiorib. quidem ad oppositum marginem usque, inferiorib. autem ad apicem indivisis. Jacq. ic. rar. 2. t. 208. Collect. 4. p. 164.

50. *silenoides*, cor. tubofiliformi, scapo complicitus, fol. lineari-ensiformibus planis striatis glabris. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 270. Collect. 4. 168. Pet. rubra, 3 infer. basi macul. flava.

51. *juncus*, polystachyus, flor. secundis, fol. lanceolatis. Thunb. diss. n°. 18. Gl. fol. lato-lanceolatis, culmo ramoso, floribus secundis, stylo scarpitito. Lin. suppl. 44. Flor. caerulea.

♀ ? *marmoratus*, fol. ensiformib. nervosis glabris maculosis, flor. distichis, stylo scarpitito. Lam. enc. 2. p. 727. Fl. violacei.

***** *Spica disticha, spathis imbricatis, flores parvi sessiles. Stigmata* ? (Micanthus.)

52. *alopecuroides*, cor. erectis, spica simplici imbricata, disticha, fol. linearibus. Ixia alopecuroides. L. suppl. p. 62. Glad. spicatus. Thunb. IX. spicata. Willd. sp. 1. p. 200. Spica. ovata. Hb. in Cap. bon. Sp. summis montibus.

53. *plantagineus*, spica imbricata disticha subramosa, fol. ensiformib. nervosis. Willd. l. c. Glad. alopecuroides. L. Phalangium spicatum. Houytnuyt syst. Lin. t. 80. f. d. Ixia plantagina. Ait. 1. p. 59. Hb. in

C. b. Sp. collibus, viis. Var. scapo simplici et ramoso, flor. albis et caeruleis. Thunb.

54. *rossicus*, flor. imbricatis secundis, fol. ensiformib. Gl. imbricatus. Lin. Willd. 212. ♀ ? *parviflorus*. Jacq. obs. bot. A. p. 2. t. 78. Georgi iter 1. p. 196. Habitat in Russia.

***** *AGLAEA. Cor. subcampanulato-bitabiata sessilis, 1. tubo vix ullo. Caps. triloba, retusa. Sem. subrotunda, mucronata. Spatha duplex, 2-valvis sub corolla, 2-3-valvis ad basin pedunculis.*

55. *gramineus*, cor. tubo brevissimo, lacinis lanceolatis, subaequalib. aristatis, scapo paniculato. Jacq. ic. rar. t. 236. Coll. 2. p. 203. Willd. 1. p. 227. Andrew. t. 62. Phalangium. Burm. prodr. u°. 3. Asphodelus Mill. Flor. pedunculati, gentini.

Obs. Eadem ratione ac Moraeae, quo accetii forma capsulae, a Gladiolis separari posset.

102. IXIA. *Spatha 2-3-valvis ovata, brevis. Cor. tubulosa: tubo subgracili cum genitalibus recto, lacinias hypocrateriformes, subellipticae, planae. Stigm. subfiliformia. (Filam. stylum includentia, in nonnullis conuata.)*

* *ROMULEA. Cor. campanulata sessilis, fol. linearia.*

1. *minuta*, scapis unifloris longitudine foliorum, fol. linearis-staccis. Willd. sp. 1. p. 196. Thunb. diss. n°. 2. t. 1. f. 1. Ad Cap. b. Spei (ui fere omnes species), lucis arenosis, inundatis. Cor. albidia, striis purpur.

2. *rosea*, scapo unifloro breviss. aphyllis. Syst. veg. 75. Mill. ic. 160. t. 240. Ait. Kew. 1. p. 56.

3. *chloroleuca*, scapo unifloro, fol. linearibus margine revolutis longissimis. Willd. l. c. Jacq. ic. rar. 2. 272. Collect. 4. p. 180. L.

4. *Bulbocodium (europaea)*, scapo 1-floro, fol. linearib. canaliculatis, cor. subcampanulata sessili. L. Jacq. ic. rar. 2. t. 271. Coll. 3. p. 265. Willd. sp. 1. p. 196. *Crocus* spatha diphyllo flori approximata. Lin. sp. pl. ed. 1. p. 36. Rontolca Mill. ic. t. 240. *Bulbocodium crocifolium*. Tournef. cor. p. 50. Hab. in Europa australi, Gallia, Italia, et in Barbarie. Stigm. G. Var. quoad magnitudinem, cor. caeruleam aut dilute purpuream, in fundo tantum aut ad medium usque croceam. Conf. Schousboe Ma-

roc. 1. p. 25. Ob cor. profunde partitam sessilem forte melius una cum Ixiis. n. 2, 3 et 5 ad Moraeas amandanda, aut omnes Moreae cum Ixiis coniungendae essent, quod omnino ulterius requirit examen.

β. *capensis*, flor. subnante, scapo folioso. Andrew. t. 170. An species diversa ab Europaea?

5. *cruciata*, scapo unifloro, fol. linearib. basi attenuatis quadricarinatis. Willd. l. c. p. 197. Jacq. ic. 2. t. 200. Collect. suppl. p. 16. Hab. in Cap. b. Spei.

6. *fragrans*, scapo simplici subbifloro, fol. linearibus. Willd. Jacq. ic. 2. t. 274. Collect. suppl. p. 9. Cor. immaeulata, lutea. Caps. subrotundo-ovata.

7. *humilis*, scapo ramoso, floribus secundis, fol. falcatis erectis. Thunb. diss. n. 4. In Cap. b. Spei.

** *Scapo hirsuto, foliis longiore.*

8. *pilosa*, fol. linearibus pilosis, florib. alternis. Lin. suppl. ga.

9. *hirta*, fol. ensiformibus hirtis, florib. secundis. Thunb. diss. n. 6 Ixia secunda. Jacq. ic. rar. 2. t. 277. Collect. 4. p. 180. In arenosis humidis Cap. b. Spei.

10. *secunda*, fol. elliptico-ensiformibus, scapo villososcapro. Thunb. diss. n. 7. Caulis ramoso erecto, floribus secundis, stigmatibus latis membranaceis. De la Roche diss. 17. Houttuyn n. 11. t. 78. f. 1. f. *scillaris*. L. Sp. pl. t. 52. f. Flor. sessiles, parvi, caerulei: tubo brevi, spathae foliola longa. Lam. enc. 3 p. 336.

*** *Scapo glabro foliis longiore, foliis crispis.*

11. *crispa*, fol. linearibus crispis, flor. spicatis alternis. Thunb. diss. n. 8. t. 2. f. 3. Lin. suppl. q1. Ad Cap. bonae Spei. Spatha hyalina. Tub. filiformis. Limb. lacin. obovatis oblongis.

12. *cinnamomea*, fol. lanceolatis crispis, flor. alternis. Thunb. diss. n. 2. t. 2. f. 1. Lin. suppl. ga. In collib. Leuwestaart Cap. b. Spei. Flos cinnamomi odore, praesertim vespere. Th.

13. *corymbosa*, fol. lanceolatis crispis, scapo ancipiti. Thunb. diss. n. 10. Jacq. ic. rar. 2. t. 288. Collect. 4. p. 179. Pluk. alm. 87. t. 25. f. 1. In sabulosis et ipsis viis Swartlandiae ad Cap. b. Spei. Flor. caerulei parvi. Planta palmaris.

14. *fastigiata*, fol. ensiformib. linguatis nervosis crispis, caule flexuoso ancipiti, flor. glomerato-fastigiatis. Lam. enc. 3.

p. 337. Ad C. b. Spei. Bulb. reticulatus. Cor. ex flavo purpurascens. L.

15. *heterophylla*, fol. radicalib. lineariformibus striatis planis, floralib. linearibus obtusis undulatis floribus aggregatis longioribus. Willd. l. c. p. 199. Galaxia plicata foliis plicatis. Jacq. ic. rar. t. 291. Collect. suppl. 30. Habitat in Cap. b. Spei. Ab omnibus foliis et inflorescentia distincta. Spatha univalvis. Cor. lactea: tub. longus, laciniis basi puncto nigro. Stamina libera Willd.

*** *Scapo glabro foliis longiore, foliis planis.*

16. *anemonaeiflora*, scapo unifloro, fol. lineariformibus, superne obliquis, longitudine scapi erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 273. Collect. suppl. 10. Ad Cap. b. Spei. Cor. limbus magnus planus. Fol. glauca. W.

17. *coelestina*, scapo unifloro, foliis lineariformibus, scapo multo brevioribus. W. Sp. pl. 200. Bartram. itin. Habitat in Carolina.

18. *linearis*, fol. linearib. angustissimis convexis, scapo simplici erecto. W. Thunb. diss. n. 11. In Cap. b. Spei.

19. *pusilla*, fol. sublinearibus costatis crassis, scapo bifloro. Andrew. t. 245. Floret April. Stigmata crassiuscula. Fl. caerulei.

20. *filiformis*, fol. ensiformibus acuminatis, scapo filiformi, spica nutante, tubo petalis brevior. Ventenat. descr. pl. p. 48. t. 48. Hab. ad C. b. Spei. Floret Majo. Tub. subincurvus.

21. *speciosa*, fol. linearibus costatis graminicis, scapo filiformi bifloro, cor. subcampanulatis. Andrew. t. 186. Fl. coccinei, tub. brevis, spath. 3-valvis.

22. *incarnata*, scapo simplici erecto, fol. ensiformibus ad oras revolutis, floribus secundis spicatis. Jacq. ic. 2. t. 281. Collect. suppl. 13.

23. *patens*, fol. ensiformibus glabris, racemo terminali, cor. campanulatis patulis, laciniis alternis angustioribus. Ait. Kewens. 1. p. 59.

24. *capillaris*, fol. linearibus, scapo polystachyo, spatibus scarioris. Thunb. diss. n. 12. t. 2. f. 2. Lin. suppl. ga. Hab. in arenosis humidis Cap. bonae Spei.

25. *flexuosa*, foliis linearibus, racemo flexuoso multifloro. Ait. Kew. 1. p. 58. Mill. ic. 156. f. 2.

26. *angusta*, fol. linearibus acutis,

²scapo flexuoso simplici, limbo subreflexo. Willd. sp. p. 202. Bulbo conico. Jacq. ic. rar. 2. t. 279. Collect. 4. p. 183.

27. *radiata*, fol. linearibus obtusis, scapo flexuoso geniculato simplici. limbo corollae patentis. Willd. p. 202. Bulbi conici basi plana excurrente in orbiculum dentato-radiatum. Jacq. ic. rar. 2. t. 280. Collect. suppl. 15. β lilia fistulosa. Andrew t. 59. Stigm. longissima incurva. Flor. pedicell.

28. *scillaris*, fol. linearibus, floribus secundis, rachide flexuosa. Houttuyn 11. t. 77. f. 2. afr. Lam. enc. p. 338.

29. *leucantha*, scapo polystachio erecto, foliis lineari-ensiformibus obliquis erectis striatulis, flor. secundis nutantibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 278. Collect. suppl. 11. In Cap. bonae Spei.

30. *polystachya*, fol. linearibus, scapo apicis pluribus. Sp. pl. 51. β . *incarnata*, flor. incarnatis; antheris connatis. Andrew t. 128. j. Cor. majore striata rubra, spath. valvula laevigata? Jacq. coll. suppl. t. 2. Petala alba. Inter stylum tripartitum stamina eriguntur, quasi styli exteriores essent.

31. *maculata*, fol. ensiformibus, scapo polystachyo, flor. alternis, cor. varicolorib. basi maculatis. Thunb. diss. n°. 19. Willd. p. 215. Fol. gladioli glabris, flor. corymbosis terminalibus. Mill. ic. 156. f. 1. I. *maculata*, fol. ensiformib. glabris, scapo duplo brevioribus, flor. alternis subspicatis, petalis basi obscuris ovatis concavis, stigm. bifidis. Andrew. t. 196. Spath. 3-valvis. Quoad colorem floris valde variat.

32. *capitata*, fol. lineari-ensiformibus, flor. majusculis subcapitatis, spatha polyphylla. Andrew t. 129, qui adhuc plures, forte distinctas, delineavit varietates; vid. tab. 23, 50, 129 et 232 ejus operis.

33. *viridiflora*, fol. li. caribus striatis, apice simplici longissima. Lam. ill. t. p. 112. I. *spicata* Andrew. t. 29. Ad Cap. b. Spei. Spina pedalis. Flor. virseunt, fundo nigricant.

34. *lancea*, fol. ensiformibus, flor. secundis, scapo simplici flexuoso. Thunb. diss. n°. 21. Jacq. ic. 2. t. 281. Collect. suppl. 13.

35. *pentandra*, fol. ensiformibus, flor. pentandris. Thunb. prod. 10. Staminibus curvis. Lin. suppl. 92. Hab. prope Groene Kloof in collibus. \dagger

36. *aulica*, flor. racemosis, bracteis integris, fol. ensiformibus. paniculis nervosis laevibus. Aiton. Kew. 1. p. 57.

37. *falcata*, scapo subpolystach. flexuoso, fol. ensiformib. striatis scapo brevioribus, rachis erecta. Jacq. ic. 2. t. 276. Collect. 4. p. 183. Lin. suppl. p. 92. In collibus Cap. b. Spei.

38. *excisa*, fol. ovatis, flor. secundis, scapo flexuoso. Thunb. diss. n°. 24. t. 1. f. 4. Lin. suppl. 92. Ad Cap. b. Spei. Cor. limbus violaceus. Var. glumis lanceolatis, floribus uno s. duplus. Th.

*** Eurydice, filamentis connatis.

39. *columnaris*, flor. subspicatis, filam. ultra medium tantum connatis. Andrew. t. 203. Cum sequentib. ad Cap. b. Spei.

40. *angustifolia*, fol. linearibus, flor. unicolorib. rubris, spatha trifida? Andrew fig. cit. et *versicolor*, petalis luteis basi nigrescentibus, spatha pluries incisa. Andr. t. 211.

β . *latifolia*, fol. lato-lanceolatis falcatis. Andr. t. 213. Flor. caeruleo-virescentes.

41. *grandiflora*, fol. linearibus longissimis, filam. totis connatis. Andrew. t. 250. Flor. violacei.

**** BELENCANDA. Cor. tubo subbrevis, apice dilatato, limbo inciso subcampanulato. Laciniae ovatae. Stam. in nonnullis subincurva, in tubi medio.

42. *chinensis*, cor. subhexapetala, canale flexuoso. Morea *chinensis*. Thunb. Willd. Sp. 1. p. 245. Rheed. hort. 11. t. 37. Sponta in Indiae arenosis crescit.

43. *deusta*, fol. lanceolatis nervosis, flor. alternis sessilibus, petalis obtusis; exterioribus basi nigro-maculatis. Ait. p. 60. Andrew. f. 134. Cor. crocea. Fl. major.

44. *squalida*, fol. lineari-lanceolatis, flor. alternis sessilibus, tubo bracteis longiore, pet. ovato-oblongis. Ait. 61. Cor. pallide lutea; venis obscuriorib.

45. *caerulea*, fol. oblongo-lanceol. villosis, spathis tubo brevioribus, limbo patentissimo. Jacq. ic. rar. 2. t. 204. Willd. p. 198. (I. *villosa*.) Coll. 3. p. 267.

46. *cyanea*, fol. oblongo-lanceolatis villosis, spathis tubo brevioribus, limbo patentissimo. Jacq. ic. rar. 2. t. 285. Coll. 3. p. 268. I. rubro-cyanea. Willd. sp. 1. p. 198.

47. *punicea*, fol. oblongis villosis, scapo ramoso, flor. secundis; petalis mucronatis. Willd. Jacq. ic. t. 287. Coll. suppl. p. 12.

48. *purpurea*, fol. ensiformibus subvillosis, vagis glabris, scapo ramoso, limbo patentissimo. Jacq. t. 286. Coll. 3. p. 268.

Obs.

Obs. In 4 hisce speciebus spatha 3-valvis est et folia plicata disticha.

48. *aristata*, fol. ensiformibus falcatis glabris, scapo subulifero, spathis laevis. Thunb. diss. n° 15. Andrew. t. 87. *3. uniflora*. Lin. mant. p. 27. Jacq. ic. t. 283. Cor. purpurea, magna.

49. *imbriata*, fol. ensiformibus, caule angulato flexuoso, spathis imbricato-laevis. Lam. enc. 3. p. 349. Mill. ic. t. 237. f. 1. et 2. Bel. *semi-flexuosa*. Mönch. meth. pl. suppl. p. 214. Cor. flava.

50. *bulbifera*, fol. linear-lanceolatis subfalcatis, spathis membranaceis setaceo-laevis. Thunb. Andr. t. 487. Mill. 1. 236. f. 2. Axillis bulbiferis, stam. lateralibus. Liu. am. acad. 4. p. 300. Cor. sulphurea. Spatha in Andrewii fig. tota integra picta.

103. *MORAEA*. Cor. hexapetala patentissima tubo subnullo. *Stigm.* 3-6, filiformia. *Caps.* oblonga. (*Flor.* marcescendo in spiram saepius convoluti. *Filam.* in nonnullis annuata et petala alterna minora.)

1. *lugens*, scapo ancipiti, petal. discoloribus alternis majorib. Lin. suppl. p. 99. M. *melaleuca*. Thunb. diss. n° 1. t. 1. f. 3. Ejusd. diss. acad. 2. p. 277. Willd. sp. 1. p. 240. Hab. (cum caeteris speciebus) ad Cap. b. spei, inter frutescentes. Pet. exteriora majora alba, interiora nigra.

2. *polyanthos*, scapo tereti, fol. flexuoso-erectis, petal. alternis minoribus. Thunb. n° 14. Lin. suppl. p. 99. *Stigm.* 6. Cor. caerulea, subregularis. Flor. in ultimis ramulis capillaribus. Th.

3. *collina*, scapo tereti, fol. dependente, lacin. cor. subaequalib. Thunb. n° 13. Jacq. ic. rar. 2. t. 226. *Sisyrinchium*. Cav. diss. bot. 6. p. 346. In collib. Cap. b. spei frequens. Cor. rubicunda.

4. *virgata*, fol. linearib. longissimis, scapo carnosissimo virgato, flor. solitariis. Jacq. coll. 3. p. 244. Ic. rar. 2. t. 223. Ixia Willd. 1. p. 202. *Stigm.* lacin. 6, involutae. Germen hincare.

5. *longifolia*, scapo tereti articulo flexuoso, fol. revolutis laxis. Thunb. diss. n° 12. Lin. suppl. (M. *flexuosa*.) Ixia longifolia. Jacq. hort. 3. p. 47. t. 60. Cor. lutea, tubo satis longo. *Stigm.* 6.

6. *elegans*, scapo tereti, fol. unico linear-ensiformi proeumbente, petal. eglandulosis. Jacq. hort. Schoenbr. 1. p. 6. t. 12.

Sisyrinchium. Willd. sp. 3. p. 577. Flos unicus, terminalis. magnus, flavus, in medio petal. exteriorum macula magna viridis.

7. *grandiflora*, scapo tereti simplici, petal. obovatis, fol. lanceolatis plicatis. Willd. sp. 3. p. 578. Cavan. diss. 6. p. 346. t. 192. f. 2. sub *Sisyrinchio*. Spatha 3-flora. Cor. lutea. Petala obtusissima. W.

8. *umbellata*, scapo tereti striato, spic. umbellato-paniculatis, involuer. dihyllis longissimis. Thunb. diss. n° 16. Flor. caerulei, in apicib. solitarii.

9. *crispa*, scapo tereti articulo, fol. convuluto crispo reflexo. Thunb. l. e. Flor. pauci, pedunculati, caerulei.

10. *pusilla*, scapo ancipiti, fol. distichis, flore subsolitario. Thunb. diss. n° 4. Thunb. prod. 11. Fol. radicalia linear-lanceolata subfalcata. Cor. caerulea, lacin. alternae angustiores.

11. *gladiata*, scapo folisque compressis, apice laterali solitaria, involuero duplo brevior. Thunb. diss. n° 8. Thunb. prod. 11. Ixia gladiata, stylis teribus. Lin. suppl. 93. Cor. flava, patens. Bractea ensiformis, corolla lutea extus rubra.

12. *aphylla*, scapo nudo folisque compressis, apice laterali solitaria, involuero multoties brevior. Thunb. diss. n° 9, t. 2. f. 1. Lin. suppl. 99. Cor. flava. Flores, ut in Junco, laterales.

13. *filiformis*, scapo folisque compressis subfiliformibus, flore solitico terminali. Thunb. diss. n° 10. tab. 1. f. 2. Lin. suppl. 100. In Cap. b. spei. Flores cum spathis referunt fl. Dianthi. Cor. lutea. Th.

104. *SISYRINCHIUM*. Cor. hexapetala. *Stam.* ut plurimum connata. *Germen* subrotundo-triquetrum, pedicellatum, extra spatham. (Petala in nonnullis aristata.)

1. *capitatum*, scapo ancipite, fol. ensiformibus plicatis, flor. capitatis, filam. liberis. *Moraea palmifolia* a. Thunb. n° 16. M. *plicata*. Swartz. Flor. Ind. occid. 1. p. 82. Willd. sp. pl. L. 1. p. 241. Plum. Amer. p. 35. t. 45. f. 2. Ixia americana. Aubl. Guian. p. 33. Ha. in Javanice pascuis montibus. Pet. alla, basi germiini contigua. Sw.

2. *racemosum*, scapo teretiusculo nudo, flor. racemosis acuminatis, fol. ensiformib. plicatis. Jacq. coll. 3. p. 192. Ic. pl. rar. 2. t. 227. (*Moraea palmifolia*) *Sisyrinch.* palmifolium. Willd. sp. 3. p. 579. Cav.

diss. 6. p. 348. t. 191. f. 1. Linn. Mant. 122. Ency. 370. Hab. in Brasilia. Flor. parvi albi.

3. *spathaceum*, scapo folliisque teretibus filiformibus, spicis lateralibus aggregatis. Thunb. diss. n.º 11. Fj. diss. aca. 2. p. 286. In coll. G. h. spei frequens. Pet. lutea, vix basi connata, filam. libera. Hujus loci *Borbaria indica*. L. afr. Willd. sp. pl. 1. p. 242.

4. *striatum*, scapo ancipiti ramo alato, fol. ensiformibus sulcatis scapo brevioribus, flor. terminalibus subumbellatis. *S. striatum* Smith, spicatum Cavan? et reticulatum Quor. Hab. in Mexico. Flor. subventricosi, flavescentes, subtus fusco-lineati. Canl. 2-pedalis. Bract. 1-phylla.

5. *mucronatum*, fol. scapisque simplicibus subsetaceis, spatha colorata: valva altera in mucronem longum desinente. Mich. Flor. 2. p. 33. Hab. in Pennsylvania. Fol. ima parte glumisque amethysticis.

6. *Bermudianum*, fol. ensiformibus, caule ancipiti ramo, spathis muticis, flor. brevioribus. Lam. enc. 1. p. 404. Cav. diss. 6. p. 346. t. 191. f. 1. Dill. Elth. t. 41. f. 48. Hab. in Bermudis.

7. *anceps*, scapo simplici alato, spathis inaequalibus, flores superantibus. Lam. enc. 1. p. 404. Cav. diss. 6. p. 345. t. 190. f. 2. Willd. sp. 3. p. 579. *S. gramineum*. Curtis bot. mag. t. 464. In Virginia et Canada. Petala aerulea, apice in medio, uti prioris, aristata.

8. *micranthum*, radice fibrosa, caule ancipiti, fol. canaliculatis, petalis linearibus. Cav. diss. 6. p. 345. t. 191. f. 2. In regno peruviano.

9? *ixioides*, fol. ensiformibus, distichis, panicula trichotoma, petalis exterioribus brevioribus. Forst. prodr. Moraeae. Thunb. n.º 7. Ferraria. Willd. 3. p. 582. In Nova Zeelandia. Pedunc. capillares, spathis longiores.

105. **TIGRIDIA**. Spatha bivalvis. Cor. campanulata, 6-petala: petala 3 interiora minora hastata (marginem nectariferam). *Filam.* connata. *Stigm.* 3, bifida. *Caps.* oblonga, angulata.

1. *Pavonia*. Moraeae Th. Ferraria L. Andrew. t. 178. Tigridia Juss. gen. Redoute Lilac. Hab. in Mexico. Cor. rubra fundo et petala, praesertim minora, guttato-variegata. Intra 6 horarum spatium corolla speciosa evanescit, fl. caesetis,

106. **FERRARIA**. *Spatha* 1-phylla. Cor. 6-petala: petal. inaequalibus undulato-crispis. *Filam.* connata. *Stigm.* lacinae penicillatae,

1. *minor*, caule simplici, flor. inodoris. Moraeae Ferraria Jacq. coll. 4. p. 141. Ferraria Ferraria Willd. sp. 3. p. 581. Hab. ad Cap. h. spei. Pet. unguis virescenti, intus stris atropurpureis. Pet. angustiora immaculata: latiora flavovirent., stris punctisque violaceis. Jacq.

2. *punctata* (*undulata* L.), caule ramo, fol. punctatis. Moraeae undulata. Thunb. n.º 21. Diss. acad. p. 298. Ferraria de Cult. flor. p. 168. t. 171. Iris stellata Barr. ic. Prope Leuvenstort C. h. spei. Col. subtus flavo-nigrescit, fasciis purpureis supra purpureo-fuscis, margine subolivaceis. Odor *Stapeliae* cadaveris muscas alliciens. Th.

107. **IRIS**. Cor. 6-petala: laciniis alternis reflexis. *Stylus* 6. *Stigm.* petaliformia. Stamina inaequalia.

* *Barbatae*, foliis ensiformibus.

1. *ciliata*, barbata, fol. ensiformibus ciliatis. Thunb. diss. de Irile. n.º 1; et ejusd. diss. acad. 2. p. 101. Willd. sp. pl. p. 224. In collibus Cap. h. spei.

2. *minuta*, barbata, foliis ensiformibus glabris, scapo unifloro, petalis oblongis acutis. Thunb. diss. n.º 2. Lin. suppl. 48. Hab. in monte Leuwestart ad Cap. h. spei. Flor. lutei, scap. vaginatus.

3. *pumila*, barbata, scapo unifloro, fol. ensiformibus glabris brevioribus, tubo exserto, petalis oblongis obtusis. Willd. l. c. Jacq. aust. t. 1. Lam. encycl. 3. p. 285. Hoffm. grina. ed. 2. p. 13. Hab. in Germaniae, Austriae, Galliae, Pannoniae collibus, muris. Flm. versicolore, plerumque purpureo-caerulei. Scap. fol. vaginantibus cinctus.

4. *lutescens*, barbata, scapo subunifloro, fol. ensiformibus glabris longiore, tubo spathis incluso, petalis oblongis obtusis. Willd. sp. p. 225. Lam. encycl. Hab. in Germaniae, Galliae montosis. Pumila. Cor. albido flavescent, laciniis exterioribus haud violaceo-reticulatis undulato-emarginatis. W.

5. *cristata*, barbata, barba cristata, scapo subunifloro longitudoae foliorum, geminis trigonis, petalis subaequalibus. Willd. sp. p. 225. Aiton. Kewens. t. p. 70. Hab. in America boreali, in montib. umbrosis Carolinae. Radix repens. Caulis vix digitalis

1-2-florus. Cor. laciniae fascia subtrifariam undulato-crenata. Michaux. p. 22.

6. *susiana*, barbata, fol. ensiformibus glabris, scapo unifloro, petalis rotundatis. Thunb. diss. n.º. 4. Decand. et Redouté Liliae. t. 18. 1. *susiana* flore maximo ex albo nigricante. Bauh. pin. 31. Hab. in Oriente.

7. *florentina*, barbata, fol. ensiformib. glabris, scapo subbifloro brevioribus, floribus sessilibus. Lam. ill. p. 121. Morison acet. 4. t. 5. f. 5. Hort. cyst. vern. 8. p. 4. f. 3. Cor. alba, lacin. latae, infer. vcnis pallide luteis pictae. Stigm. crenulata. Rad. odorata. Desf. Hab. in Europa austral. et in Barbaria.

* *alba*, barbata, caule multifloro fol. altiore, spatulis basi liliaceis, apice marginisque scariosis, cor. tubo germine longiore. Savi. Flor. Pisana. 1. p. 32. Lob. ic. 59. Hab. prope Pisani.

8. *flavissima*, barbata, fol. ensiformib. glabris, brevioribus scapo bifloro, germine obtusae trigono. W. Jacq. icon. rar. 3. t. 220. Collect. 4. p. 78. Gmel. sib. 1. p. 31. t. 5. f. 2. Hab. in Sibiriae locis subhumidis. Scap. basi tantum vaginatus.

9. *arenaria*, barbata, scapo bifloro toto vaginato fol. ensiformibus brevioribus, flor. superiore abortiente. Walldst. et Kitsh. Fl. rar. Hong. p. 57. t. 57. Pumila flava, scapus vix foliis longior. Pet. basi vcnis subviolacca.

10. *biflora*, barbata, fol. ensiformibus brevioribus, scapo subtrifloro, germine tereti. Thunb. diss. n.º. 6. Besl. cyst. vern. 114. Hab. in Lusitaniae rupibus et ad lacum Naïtal Sibiriae. Cor. violacca non emarginata. Floret quotannis bis.

11. *aphylla*, barbata, fol. ensiformib. glabris aequantibus scapo multifloro subnudo. Thunb. diss. n.º. 7. *J. nudicaulis*, corollis barbatis, scapis subternis nudis submultifloris vix longitudine foliorum, spatulis ventricosis viridibus. Lam. encyc. 3. p. 284. Habitat?

12. *variegata*, barbata, fol. ensiformib. glabris, aequantibus, scapo multifloro. Th. dict. n.º. 8. Curt. map. t. 16. Habitat in Hungaria. Cor. alba, apice porpurea, venis atro-purpureis, lacin. erectae flavae acutae; stigmata flava. Willd.

13. *squalens*, barbata, fol. ensiformib. glabris erectis brevioribus scapo multifloro, lacin. cor. deflexis replicatis, erectis emarginatis. Thunb. diss. n.º. 11. *J. variegata*.

Jacq. aust. 1. p. 7. t. 5. In Europa australi. Cor. lacin. erectae emarginatae luteae, stigmata sordide lutea. W.

14. *plicata*, barbata, caule multifloro foliis altiore, petalis undulato-plicatis erectis latioribus. Lam. ill. p. 121. Colitur in hortis. Pet. albo et violaceo variegata, basi venis obscure purpur. Odor flor. gratus.

15. *Swerthii*, barbata, caule trifloro fol. altiore, petalis undulatis replicatis subemarginatis. Lam. l. e. et encycl. 3. p. 126. Swert. florileg. t. 41. f. 1. In hort. colitur. Pet. alba, stigm. dilute purpur.

16. *japonica*, barbata, fol. ensiformib. falcatis glabris, brevioribus scapo compresso multifloro. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 327. Hab. in Japonia. Flores axillares. Corolla alba. Thunb.

17. *sambucina*, barbata, fol. ensiformibus glabris erectis, brevioribus scapo multiloro, lacin. corollae deflexis planis. Thunb. diss. n.º. 10. Jacq. 1. p. 1. t. 2. *J. latifolia germanica* sambuci odore. Bauh. pin. 31. Hab. in Europa australi. Similima *J. germanica*, sed deflexa petala saturatius violacca. Stigmata serrata.

18. *lurida*, barbata, fol. ensiformib. glabris erectis, brevioribus scapo multifloro, lacin. corollae exterioribus revolutis. Willd. l. e. p. 220. Ait. Kew. 1. p. 68. Hab. eum priore. Petala exteriora reflexa atro-purpurea, petala interiora, latina purpurascens; ungue squalide lutescente. Forte varietas *freco* sambucinae, sed incolorata. Ait.

19. *fimbriata*, fol. ensiformib. glabris brevioribus scapo multifloro, cor. patulis, stigm. fimbriato. Ventenat. descr. p. 9. t. 9. Hab. in China. Moraeis subaffinis. Corolla dilute caerulea; petal. margine denticulata.

20. *germanica*, barbata, fol. ensiformib. glabris falcatis, brevioribus scapo multifloro, tubo germine longiore. Thunb. diss. n.º. 9. Blackw. t. 69. Hort. germ. 1. p. 17. II. p. 41. In Europa australi. Versicolor. Rad. (sicca) odorata. Stigm. dentata. Petala interiora non emarginata.

* *pallide caerulea*, barbata, fol. ensiformib. glabris falcatis, brevioribus scapo multifloro, tubo longitudine germis. Willd. l. e. p. 120. *J. pallida*. Lam. enc. 3. p. 284. *J. dilute caerulea*, involucri albo. Tabern. ic. 647. Hab. in Italia, in monte Pisan. Savi.

Obs. Scapulum Willd. l. e. a *germanica* constanter distincta, et quod observationes

Dom. Courset (Bot. cult. 1. p. 518) tantum ejus varietas.

21. *compressa*, barbata, fol. ensiformib. glabris, caule paniculato compresso. Th. diss. n.º 13. Lin. suppl. 98. Hab. in interioribus regionibus Cap. b. spec. h.

22. *dichotoma*, barbata, fol. ensiformib. glabris, caule paniculato tereti. Thunb. diss. n.º 13. Lin. suppl. 97. Pall. it. 3. app. n.º 61. t. A. f. 2. Hab. in rupestribus apricis totius Dauriae. Refert Isiam. Flor. longe pedunculati, omnium congenerum minimi, dilute purpureascentes.

** *Barbatae, foliis linearibus.*

23. *tripetala*, barbata, fol. lineari scapo unifloro longiore, petalis alternis subulatis. Thunb. diss. n.º 14. Lin. suppl. 97. Jacq. ic. 2. t. 24. Collect. 3. p. 272. Hab. in Cap. b. spec. Var. florib. caeruleis, violaceis et carneis.

24. *tricuspis*, barbata, folio lineari scapo subbifloro longiore, petalis alternis trifidis. Thunb. diss. n.º 15. Lin. suppl. 98. Houtt. 11. t. 80. f. 1. Ad Cap. b. spec. Cor. albo, luteo et purpureo variegata.

*** *Imberbes, foliis ensiformibus.*

25. *plumaria*, barbata, fol. linearibus, scapo multifloro, stigmatib. multifidis. Th. diss. n.º 16. Moraea *tripetala*. L. suppl. p. 100. Willd. sp. p. 244. Ad Cap. b. spec.

26. *Northiana*, barbata, scapo foliisque falcatis linearibus, petalis exteriorib. pendulis, interiorib. suberectis apice revolutis. Moraea *Northiana* Andrew. t. 255. Hab. in Brasilia. Hab. Junci. Flor. 2. sub apice acapi foliiformis. Pet. exteriora alba, interiora flavo-caerulea.

27. *orientalis*, barbata, scapo tereti, fol. distichis linearibus deerescentib., flore subsolitario terminali. Thunb. diss. n.º 18. (M. *iridioides*) Willd. p. 244. Mill. ic. t. 239. f. 1. Iris *orientalis*. Till pisan. 89. t. 33. Hab. in Oriente, Constantiopol. Pet. interiora alba, immaculata, patentia. Stigm. caerulea. petaloidea; Th.

28. *Xiphium*, imberbis, fol. ensiformib. canaliculato-subulatis, scapo bifloro, petal. stigmatate fere angustioribus, germine tereti-trigono. Ehrh. Beitr. 7. p. 139. Iris *variabilis*. Jacq. collect. 2. p. 321. Besl. rev. t. 4. f. 2. t. 6. f. 2. t. 10. f. 1. Hab. in Hispania, Sibiria. Quoad color. variat.

29. *Xiphoides*, imberbis, fol. ensiformibus canaliculato-subulatis, scapo bifloro, petalis stigmatate latioribus, germine acute

angulato. Ehrh. Beitr. 7. p. 140. Iris *Xiphium*. Jacq. Collect. 3. p. 340. Besl. evst. aest. t. 7. f. 1. t. 8. f. 1. t. 9. f. 1. Hab. in Hispania.

30. *Pseud-Acorus (paludosa)*, imberbis, fol. ensiformibus, petalis alternis stigmatate minoribus. Thunb. diss. n.º 18. Fl. dan. t. 494. Roth. germ. 1. p. 17. II. p. 43. Acorus adulterinus. Bauh. pin. 34. Hab. in paludosis, aestate.

31. *foetida*, imberbis, fol. ensiformibus, scapo uniangulato. Thunb. diss. n.º 19. Cor. imberbis petalis interioribus patentissimis, caule uniangulato, fol. ensiformibus. L. Horæ clif. 19. Moric. S. 4. t. 5. f. 2. mala. Hort. evst. 8. f. 1. Hab. in Gallia, Aeglia, Hetruria, Hungaria et Barbaria. Cor. caeruleo-tristis. Petala exteriora, ungue subtus plicis rugoso. Fol. foetidiss., obscure viridia.

32. *virginica*, imberbis, fol. ensiformibus, scapo folioso ancipiti. Thunb. diss. n.º 20. Jacq. Collect. 2. p. 322. Cor. lacin. 3 fasciis mucido-tomentosa, caps. trigona: angulis sulcatis. Mich. Fl. amer. p. 22. Hab. in Virginiae et Carolinae palustribus.

33. *versicolor*, imberbis, fol. ensiformibus, scapo tereti flexuo, germ. inibus subrigonib. Thunb. diss. n.º 21. Curt. mag. t. 21. Hab. cum priore. Petala apice obscure violacea basi flavescens venis violaceis, interiora carnea. Stigmata alba. Willd.

34. *halophila*, imberbis, fol. ensiformibus, ra licalibus longissimis, scapo tereti, gemminibus hexagonib. Ait. Kew. p. 72. Pall. it. 3. app. 61. t. B. fig. 2. In Sibiriae locis depressis salis.

35. *ochroleuca*, imberbis, fol. ensiformibus depressis striatis, scapo subtereti, gemminibus hexagonib. Thunb. diss. n.º 22. Act. Petrop. 1781. t. p. 292. t. 8. Hab. in Oriente. Petala reflexa, basi dilatata venis obscuriorib., limbo flavo marginib. albo; crecta nivea, basi venis flavescens. Stigmata nivea. Affinis I. spuriae.

36. *spathacea*, imberbis, fol. ensiformibus rigidis, scapo tereti bifloro, spatulis longissimis. Thunb. diss. n.º 23. *Spathulata*. Lin. suppl. 99. In interioribus regionibus Cap. bonae spei.

37. *ramosa*, imberbis, fol. ensiformib., caule paniculato multifloro. Lin. suppl. 99. In Schwartlandiae arenosis ad Cap. b. spec.

38. *stylota*, acaulis imberbis, fol. ensiformibus, cor. lacinis subaequalibus tubo longissimo. Desf. 1 c. t. 5. I. *unguicularis*. Lam. ill. p. 124. In Algeria, in sepibus. Cor. caerulea. stigm. angusta.

*** *Imberbes*, *fol. linearibus*.

39. *scorpioides*, acaulis imberbis, fol. canaliculatis, cor. lacinii tribus erectis minimis: tubo longissimo. Desf. l. c. t. 6. l. *microptera*. Lam. l. c. Hab. in Algeriae humilis. Fl. hyeme. Stigm. maximum, profunde bifidum. D.

40. *juncea*, imberbis, bulbo tunicato, canle subbifloro, fol. subulatis canaliculatis, spatha diphylla acuta, cor. tubo elongato. De f. atl. p. 39. t. 4. Poir. iter. ed. germ. t. 1. (mala.) Hab. in collibus aridis in Atlante. Cor. lutea. Caps. longa. D.

41. *Sisyrinchium*, imberbis, fol. linearibus undulatis reflexis, scapo unifloro. Thunb. diss. n.º 25. Hab. in Hispania, Lusitania, Barbaria. Petala purpurea, macula lutea loco barbae. Bulli ex gemino bulbo altero alteri imposito.

42. *longifolia*, fol. linearibus canaliculatis longissimis glaucis, scapo multifloro. Andrew. Repos. t. 45. Hlab. in Cap. bonae spei. Flor. et Bulbi in autocolente. Fol. 3-petalis. Cor. macula lutea oblonga.

43. *verna* (*nana*), imberbis, fol. linearibus planis, scapo unifloro, lac. corollae alternis aquantibus. Thunb. diss. n.º 26. Pluk. alm. 124. t. 26. f. 6. Habitat in Virginia. Pusilla. Fol. lineari-glabra. Rad. fibrosa. Michaux p. 22.

44. *persica*, imberbis, fol. linearibus planis, scapo unifloro, petalis interioribus brevissimis patentissimis. Syst. veg. p. 79. Lam. III. t. 33. f. 3. Rudb. clys. 2. p. 10. f. 9. Hab. in Persia.

45. *angusta*, imberbis, folio filiformi lineari erecto glabro, scapo subunifloro, spathis obtusis. Thunb. diss. n.º 28. Hab. ad Cap. b. spei.

46. *setacea*, imberbis, fol. filiformi-lineari erecto glabro, scapo glabro subunifloro, spathis acutis membranaceis. Th. diss. n.º 29. t. 1. f. 2. l. *setifolia*. Lin. suppl. 55. Cum priore.

47. *tennifolia*, spatha biflora, folio longissimo filiformi, cor. tubo filiformi elongato. Lin. suppl. 97. Pall. it. 3. opp. n.º 66. tab. G. fig. 2. In arenosis Davuriae et ad Wolgam. Cor. pallide caerulea, odore caryophylleo fragrans.

48. *ventricosa*, imberbis, fol. linearib., scapo subbifloro, spathis ventricosis, tubo elongato, germine trigono. Willd. l. c. p. 236. Pallas itin. 3. app. n.º 62. t. B. f. 1. Cum priore. Cor. pallide caerulea. Germen lateribus sulco bipartitis. Pall.

49. *elegans*, imberbis, fol. gramineis attenuatis, scapo subbifloro, spatha ventricosa, germine trigono, stigm. crenatodentato. In hortis rarius obvenit. Caul. 2-petalis. Cor. magna elegans, lac. exter. flavesce. in medio macula lata fusca. Stigm. sulphur. margine caeruleo.

50. *graminea*, imberbis fol. linearibus scapo subbifloro ancipiti superantibus, germinibus hexagonis. Thunb. diss. n.º 31. Jacq. aust. t. 2. Hab. in Austria.

51. *ensata*, imberbis, fol. linearibus, scapo subbifloro tereti, germinibus hexagonis. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 328. l. *graminea*. Thunb. jap. 34. Habitat in Japonia.

52. *spuria*, imberbis, fol. linearibus, scapo subtrifloro tereti, germinibus hexagonis. Thunb. diss. n.º 32. l. *spatulata*, imberbis fol. ensiformib. caule sub breviorib. pet. majorib. spatulatis. Lam. enc. 3. p. 300? Jacq. aust. t. 4. Hab. in Germaniae, Galliae, Sibiriae et Hungariae pratis.

53. *orientalis*, imberbis, fol. linearib. scapo subbifloro tereti articulo, germinibus trigonis, corollis fusco-reticulatis. l. *sibirica*. Thunb. jap. 33. Hab. in Japonia. Spathae fol. similes.

54. *pratensis*, (*sibirica* L.) imberbis, fol. linearibus, scapo fistuloso subtrifloro tereti, germinibus trigonis. Thunb. diss. n.º 33. Lam. encycl. 3. p. 300. Jacq. aust. t. 3. Roth. germ. 1. p. 28. II. p. 43. Hab. in Germaniae, Austriae, Helvetiae, Galliae, Sibiriae pratis. Fol. plana subrecta, caule breviora.

* *odorata*, imberbis, fol. gramin. caule subaequantib. attenuato-pungentib., caule tereti bifloro, germine trigono, cor. venosis. In hortis quoque iam cultam inveni. Caul. subarticul. Flor. obscure caerulei; pet. exteriora medio lin. fusca, intus crispia. Odor gratus.

55. *maritimaensis*, fol. linearibus, pet. foveolis glandulosis, germinibus trigonis. Thunb. diss. n.º 34. Jacq. amer. 7. t. 7. Niphon flore ex luteo nigricante. Plum. spec. 8. ic. 260. t. 261. f. 1. Hab. in Martinnica.

56. *crispa*, imberbis, fol. linearib. crispis. Thunb. diss. n.º 36. In collib. Cap. b. spei.

57. *pavonia*, imberbis, folio lineari glabro, scapo subunifloro. Thunb. Jacq. Coll. suppl. p. 8. Hab. ad Cap. b. spei. Caulis submentosus. Flos aurantiacus aut albus, macula baseos caerulea. Filia. connata.

58. *papilionacea*, imberbis, fol. linearibus reflexis latis. Thunb. diss. n.º 37.

t. 2. f. 1. Jacq. Collect. suppl. p. 159. t. 3. f. 2. * Hab. ad Cap. b. spei.

59. *fugax*, imberbis, scapo tereti, fol. radicalib. lanceolato-linearib. canaliculatis, flor. terminalibus, stigmatib. erectis profunde bifidis. Moraea *fugax*. Andrew. t. 83. Ad Cap. b. spei. Rad. bulbosa, fol. interiora sublinearia. Flos *fugax*, 3 tantum horas durans.

60. *edulis*, imberbis, folio lineari pendulo glabro, scapo glabro multifloro. Th. diss. n.º 38. Moraea *fugax*. Syst. veg. 93. Jacq. Hort. 3. t. 20. Io campis arenosis Cap. b. spei.

61. *tristis*, imberbis, fol. linearibus glabris, scapo hirsuto ramoso. Thunb. diss. n.º 39. Moraea *sordescens*. Jacq. ic. rar. 2. t. 225. Ad Cap. b. spei.

62. *polystachya*, imberbis, fol. linearib. planis, scapo glabro ramoso. Thunb. diss. n.º 41. I. *lacera*, spathis laetris. Lam. ill. 125. Cum prioribus.

63. *viscaria*, imberb., fol. linearibus planis, petalis patentibus, caule viscoso. Lio. suppl. 98. In Cap. b. spei locis arenosis ad Saldahna bay. Odor bituminosus.

64. *bituminosa*, imberbis, fol. linearib. spiritalibus, scapo viscoso. Thunb. diss. n.º 43. t. 2. f. 2. Petalis reflexis. Lio. suppl. 98. Ad Cap. b. spei. An varietas?

**** *Imberbes, foliis tetragonis.*

65. *tuberosa*, imberbis, fol. tetragonis. Thunb. diss. n.º 43. Moris. hist. 2. p. 348. t. 4. t. 5. f. 1. Hermodactylus. Tournef. cor. 50. In Arabia, Oriente.

108. MARICA. Cor. 6-petala, sup. peria : laciniis interioribus minoribus. Stylus crassus. Stigma petaloideum, trifidum : laciniis indivisis acutis. Spatha magna flor. involvens.

1. *paludosa*, Willd. Sp. 246. Cipura paludosa. Aub. guj. t. p. 38. t. 13. Lam. ill. p. 107. t. 30. Hab. in pratis humidis Gujanæ. Folia graminea. Flores albi vel caerulei, spathis cincti. W.

109. DILATRIS. Cor. 6-petala sup. peria birsuta. Filam. tertium reliquis minus. Stigma simplex. Caps. globosa, coronata, infera, trilocularis.

1. *corymbosa*, petalis ovatis, panicula hirsuta. Thunb. Act. Societ. Berol. 4. p. 46.

Berg. cap. 9. t. 3. f. 5. Dilatris *umbellata*, petalis ovatis, corymbo fastigiato hirsuto. Lio. suppl. 101. In sabulosis Cap. bonæ spei. Corollæ atropurpureæ, petalis connexæ. Stam. 3, longitudine petalorum. Stigma trigonum. Mant. 17.

2. *lxioides*, panicula ovata villosa, petalis ovalibus externe barbatis, stam. corolla longioribus. Lam. ill. p. 127. Hab. ad Cap. b. spei.

3. *viscosa*, petalis linearibus, panicula villosa-viscida. Thunb. prod. 10. Thunb. l. cit. 4. p. 48. Lam. ill. t. 34. In monte tabulari Cap. b. spei. 75

4. *paniculata*, petalis lanceolatis, caule paucifloro. Thunb. l. c. 4. p. 51. Hab. in arenosis Cap. b. spei. Flor. purpureo-flavescens. 75

5. *Heritiera*, fol. angustis irideis erectis, panicula sulcorymbosa, petalis 3 linearibus, 3 alternis interiorib. lanceolat. *Heritiera* Gmelini. Mich. Flor. amer. 1. p. 2. Her. tinctorum. Bull. des Sp. n.º 19. Hab. in Carolinae virginis. Cal. rubens. Cor. subcampanulata, tomentosa. Stigm. subtrilobum. Caps. 3-quetra. M.

110. WACHENDORFIA. Cor. 6-petala, inaequalis, infera. Caps. trilocularis, sup. peria.

1. *thyrsiflora*, scapo subimplied, panicula coarctata, fol. ensiformibus quinque-nerviis plicatis glabris. Th. prod. 12. Lam. ill. 1. p. 127. Burma. monogr. 2. f. 2. Ad Cap. b. spei, cum sequentibus omnibus.

2. *paniculata*, scapo polystachyo, panicula patente, fol. ensiformibus trinerviis plicatis glabris. Th. prod. 12. Smith. ic. piet. 1. p. 5. t. 5. Lam. ill. t. 34. f. 1. Erythraeulbus hellebori albi plicatis foliis. Pluk. mant. 70.

3. *hirsuta*, scapo polystachyo, panicula patente, fol. ensiformibus trinerviis plicatis villosis. Th. prod. 12.

4. *tenella*, scapo subpolystachyo, panicula patente, fol. linearibus trinerviis glabris. Th. prod. p. 12.

5. *graminea*, scapo polystachyo, panicula patente, fol. ensiformib. canaliculatis glabris. Th. prod. 12.

111. XIPHIIDIUM. Cor. 6-petala, aequalis. Stam. recta. Caps. sup. peria, 3-locul., polysperma. Spatha 2. cal. 0.

1. *album*, fol. glabris, petalis linearib.

lanceolatis. Willd. Sp. 248. X. floribundum. Swartz profl. 17. et Flor. 1. p. 80. In Cumana, Amer. meridionali.

2. *caeruleum*, fol. hirsutis, pet. ovatis. Willd. l. c. X. *caeruleum*, florib. paniculatis, flore et fol. pilosis. Aubl. guj. 1. p. 33. t. 11. In pratis Gujanac.

112. **COMMELINA.** Cor. 6-petala. Nect. 3, cruciata, filam. propriis inserta. Caps. subglobosa, 3-locularis.

* *Dipetalae*, ob duo petala majora.

1. *communis*, corollis inaequalibus, fol. ovato-lanceol. acutis, caule repente glabro. Hort. ups. p. 18. Willd. sp. pl. 1. p. 249. Dill. elth. 93. t. 78. f. 89. Habitat in America. ☉

2. *polygama*, cor. inaequalibus diandris hermaphroditis et unaculis, ramis prostratis radicanlibus. Roth. catal. bot. 1. p. 1. et 2. p. 1. Kacmpf. amoen. 889. Hab. in Japonia.

3. *cayennensis*, procumbens, fol. ovato-lanceolatis acutis glabris, vaginis ciliatis, necariis bilobis. Richard in Act. Soc. Lin. Paris. p. 106. In Cayenna.

4. *pilosa*, pumila diffusa, fol. lanceolatis, vaginis involucrique pilosis. Rich. l. c. Hab. cum priore.

5. *africana*, cor. inaequalibus luteis, fol. lanceolatis glabris, caule decumbente. Hab. in Aethiopia.

6. *bengalensis*, cor. inaequalibus, fol. ovatis obtusis, caule repente. Murr. composit. 1779. p. 18. t. 5. Pluk. alm. t. 27. f. 3. In Bengala.

7. *erecta*, cor. inaequalibus, fol. ovato-lanceolatis, caule erecto scabro simplicissimo Dill. elth. 94. p. 77. t. 88. Hab. in Virginia.

8. *virginica*, cor. subaequalibus, fol. lanceolatis subpetiolatis ore barbatis, caulibus erectis. Lin. Hab. in Virginia. Fol. supra retrorsum scabra: vaginis nervosis, ore barbatis pilis ferrugineis. ☿

9. *longifolia*, caule stricto pubescente, fol. lanceolatis longissimis: vaginis rufobarbatis, pet. ternis subaequalib. Michaux Flora p. 23. In umbrosis sylvar. Virginiae et Carol. Jalis. Sem. compressa subelliptica.

10. *angustifolia*, assurgens, debilis, fol. linear-lanceolatis acutis planis, petalis duobus. Mich. l. c. p. 24. In Carolinae

campestrib. Majo. Sem. cylindrica. Eract. subcordatae.

10. *longicaulis*, cor. subaequalibus, fol. linear-lanceolatis sessilibus, vaginis ciliatis, caule decumbente. Willd. l. c. p. 251. pedicellis geminis filiformib. geniculatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 296. Collect. 3. p. 234. Hab. in humidis ad Caracas. ☿

11. *mollis*, cor. subaequalibus, foliis petiolatis ovatis pubescentibus, caule repente. Willd. Jacq. ic. rar. 2. p. 293. Collect. 3. p. 235. Cum priore. ☿

12. *vaginata*, cor. aequalibus, fol. linearibus, flor. diandris involucre vaginatis. Mant. 177. Pluk. alm. t. 274. f. 3. In India orientali. Pedunc. terminati involucre convoluti. Corpuscula linearia. Antherae flavae, nigromaculatae. ☉

13. *nudiflora*, cor. aequalibus, pedunc. capillaribus, fol. linearibus, involucre nullo, flor. diandris. Mant. 177. Pluk. alm. 135. t. 27. f. 4. In Indiae orientalis arid. graminosis. Flor. mutantes. Corpuscula deltoidica. ☉

14. *cucullata*, cor. aequalibus, foliis ovatis, involucre cucullat. turbinatis. Mant. p. 176. Lam. enc. 1. p. C. *nervosa*. Burm. ind. 18. t. 7. f. 3. cfr. Loureiro Flor. Cochinchin. 1. p. 39. In India orientali. Involucre margine laterali coalita. Flores minuti.

15. *japonica*, fol. ovato-lanceolat. undulatis, caule erecto angulato piloso, flor. paniculatis. Th. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 33a. In Japonia.

16. *bracteolata*, cor. aequalibus, fol. lanceolato-linearib. undulatis suberectis, pedunc. paniculatis bracteolis semivaginalibus. Lam. ill. gen. 1. p. 129. Habitat in India.

17. *spirata*, cor. aequalibus, fol. lanceolatis, flor. paniculatis, pistillo convoluti. Mant. 2. p. 176. In India orientali ad rivulos et locis humentibus. ☉

18. *hispida*, cor. aequalibus, fol. ovato-lanceolatis obtusis hispida, pedunc. subquinq. floris. Flor. per. 2. p. 43. l. 74. f. 2. Hab. in collibus provinc. Cananac. Stigma. subcapitatum. ☉

19. *fasciculata*, cor. aequalibus, fol. lanceolatis acutis, vaginis ciliatis, caule assurgente, rad. fasciculata. Flor. per. 44. t. 72. b. In collib. et arvis Linae. Pct. interiora caerulea, exteriora breviora, albid. ☿

20. *nervosa*, cor. subaequalibus, fol. lan-

ecolatis 16-nerviis: vaginis lirsutis, caule erecto. Fl. per. l. c. Hab. in umbrosis ad Cuchero vicum peruvianum.

21. *gracilis*, cor. aequalibus, fol. ovatis acutis, margine scabris: vagin. longis ciliatis, caul. repente. Fl. per. l. c. t. 72. f. a. Cresc. in Peruv. cultis et humidis. Pet. exteriora albidia.

22. *serrulata*, pedunc. axillarib. sub-solitariis multifloris, fol. lanceolatis marginatis serrulato-scaberrimis, vagin. ciliatis. Vahl. eclog. amer. fasc. 2. In Cayenna.

113. CALLISIA. Cal. 3-phyllus. Pet. 2. Anth. geminae. Stigm. penicilliformia. Caps. compressa, 2-locularis. Nect. o.

1. *repens*, flor. axillaribus subsessilib. caule laevi, fol. glabris. Lam. enc. p. 563. ill. gen. t. 35. f. 1. Hapalanthus Jacq. amer. pict. p. 12. t. 12. Hab. in Amer. meridionali, locis udis.

2. *ciliata*, fol. cordatis vaginantibus denticulato-ciliatis, vaginis subtrifloris. C. *repens*. Flor. per. 1. p. 45. t. 73. f. b. Habitat ad urbem Huancac in Peruv. in fruticetis.

3. *umbellata*, caul. sursum pedunculisque villosis, florib. umbellulatis diandris. Lam. ill. p. 130. t. 35. f. 2. In America meridionali observata a cl. Richard.

114. LEPTANTHUS. Spatha 1-flora, hinc delibescens. Cor. tubo luto, o gracili: limbo sexpartito. Stam. laciniis inserta. Anther. lineares, aut bifformes triangulares. Caps. intra spatham, coronata, 3-locularis, polysperma, angulis delibescens.

* *Antherae uniformes lineares, filamenta aequalia.*

1. *ovalis*, foliis ovalibus petiolatis. Michaux Flor. am. bor. 1. p. 25. t. 5. f. 1. Hab. in paludib. Illinoensib. Flos ex imo petioli erumpit.

2. *graminea*, fol. linearibus, caul. stultante dichotomo. Mich. l. c. Cresc. in flumine Ohio. Potam. *graminei* habitus.

** *HEPTANTHERA. Filam. longitudine inaequalia, antherae bifformes.*

3. *peruviana*, fol. lato-reniformibus, spatha subquadriflora. H. *reniformis*. Fl. per. 1. p. 43. t. 71. f. a. In Peru. Caul. repens. ¶

4. *virginica*, fol. orbiculato-reniformib. spatha 3-flora. Michaux l. c. t. p. 25. In Pennsylvania, Virginia.

115. SYENA. Cal. 3-phyllus. Petala 3. Antherae oblongae. Caps. 1-locularis, 3-valvis.

1. *Aviaticilla*. Willd. sp. p. 254. Mayaca fluviatilis. Aub. guj. 1. p. 42. t. 15. M. Aubletii Michaux. In rivulis Gujanae, et in Carolina. Planta muscosa. Fol. capillacea verticillata. Flor. axillares albi. W.

116. XYRIS. Glumae bi-alves in capitulum. Cor. 3-petala, aequalis. Caps. supera, 1-locularis, 3-valvis.

1. *indica*, fol. ensiformibus scapum vaginantibus, capitulo globoso, squamis subrotundis. Willd. phyt. 1. p. 2. n. 6. Vahl symbol. 2. p. 7. Pluk. alm. 170. t. 416. f. 4. Moris. hist. 3. p. 229. t. 8. t. 9. f. 28. In India. ¶

2. *pauciflora*, fol. linearibus subulatis scap. vaginantibus, capitulo oblongo, squamis ovatis obtusis. Willd. l. c. n. 7. t. 1. f. 1. In Malabar. ¶

3. *americana*, fol. triquetris linearibus subulatis basi distinctis, capitulo oblongo, squamis lanceolatis acutis. Willd. sp. pl. 1. p. 255. Aubl. gujan. 1. p. 40. t. 14. In America calidore. Flor. caerulei. ¶

4. *capensis*, fol. linearibus brevissimis, capitulo ovato acuto, squamis obtusis. W. l. c. Thunb. prod. 12. Hab. ad Cap. bonae spei. ¶

5. *subulata*, fol. divicibus subulatis, scapo 1-2-phyllus, spica 2-3-flora. Flor. per. 1. p. 46. t. 71. b. Habitat in Peruviae montosis humidis.

6. *brevifolia*, fol. subulato-gladatis, scapo teretiusculo, capitulo globoso. Michaux Flor. p. 23. In pratis udis Georgiae inferioris.

7. *anceps*, fol. linearib. obtusiusculis, scapo apice dilatato ancipiti, capit. squamis rotundatis. X. Jupicini. Mich. l. c. Cresc. a Marilandia ad Floridam.

† FLORES GRAMMACEAE. 1.) *Scirpoides* Caules cylindrici aut triquetri, farcti, enodati, rarius articulati. Flor. apicali, squamis a. paleis imbricati, monogyni, stigm. 2-3: filam. numero et situ variant, ut plurimum tria. Sem. unicum, nudum, basi involuicello setulae lanace-palae-ariliformi aut nullo cinctum. Huc quoque per-

vinerent *Carices*, quae vero ob staminum situm ad classem monoclam a Linnaeo relectae sunt.

117. KYLLINGIA. *Spica* (Amentum I.) subrotunda aut oblonga sessilis, aut umbellata constans ex spiculis subimbricatis: *Cal.* 2-valvis: valvula inaequali, 1-flor. *Cor.* 2-valvis, cal. major. Sem. triquetrum. (Stam. 1-3. Stigm. 2-3.)

1. *monocephala*, culmo filiformi triquetro, capitulo globooso sessili, involuero triphylo longissimo. Lin. suppl. 104. Rottb. gram. p. 13. t. 4. f. 4. Willd. sp. pl. 256. Schoenus coloratus. Lin. ? Rumph. amb. 6. p. 8. t. 3. f. 2 ? In humilis Indiae orientalis et Americae. $\overline{\Gamma}$

2. *brevifolia*, culmo setoso mono-phylo, involuero triphylo brevi, capitulo terminali sessili, Rottb. loc. cit. f. 3. In India orientali.

3. *pumila*, involuero triphylo plano, flor. diandris. Michx. Flor. amer. 1. p. 29. In Shavaniensium regione ad amnem Scioto. Styl. bifidus uti in sequente.

4. *maculata*, involuero triphylo patentissimo, capitulis 3 glomerato-sessilibus, monandris. Michaux l. c. Habb. in Carolina. Sequenti affinis dicitur.

5. *opularis*, spicis umbellatis globoso-ovoidis, glumis lanceolatis, valvulis exterioribus ovalibus, stylo 3-fido. Michaux l. c. In Georgia, et Carolina.

6. *nivea*, capitulis terminalibus subternis glomeratis sessilib. Lin. suppl. 104. Rottb. 6. (K. triceps.) L. Schoen. niveus Scheuchz. Agrost. 401. t. 9. f. 11. Plul. phytoz. t. 197. f. 7. In humidis Americae et Indiae orientalis. Gramen laevissimum. Capitula terminalia (lateralibus approximatis) ovatum sessile niveum. Stylus semibifidus. L. $\overline{\Gamma}$

7. *panicca*, umb. terminali spicis sessilibus pedunculatisque cylindricis imbricatis, involuero universi subtetraphyllo, partiali nullo. Lin. suppl. 105. Rottb. l. c. f. 1. In India, Oriente.

8. *filiformis*, umb. terminali simplici, spicis sessilibus pedunculatisque ovatis, spiculis ovatis acutis, involuero triphylo, partiali nullo. Swartz prodr. 20. Ej. Flor. p. 121. In Hispaniulae. Jamaicae camp. gremiosis. Fol. lineari-convoluta. Invol. 3-phyll.

9. *umbellata*, umb. terminali, spicis

sessilibus pedunculatisque cylindricis squarosis, involuero universi polyphylo, partiali triphylo. Lin. suppl. 105. Rottb. l. c. f. 2. Scirpus cyperoides. Lin. Mant. 181. Rheed. mal. 17. p. 119. t. 61. β . Kyllingia *sumatrensis*, involuero partiali nullo. Retz. obs. 4. p. 13. In India orientali, β . in Sumatra.

10. *cyperina*, culmo triquetro striato basi folioso, umb. simplici, spicis strictis sessilibus, involuero universi polyphylo longissimo, partiali nullo. Retz. obs. 6. p. 21. In India orientali. Fol. culmo duplo fere longiora.

11. *incompleta*, culmo triquetro folioso, umb. composita, involuero universi et partiali polyphylo, calyce univalvi. Willd. l. c. p. 258. Jacq. ic. rar. 2. t. 300. Collect. 4. p. 101. Habb. cum priore.

Obs. An ad hoc genus quoque pertinet *Carex hermaphrodita*. Jacq. ?

118. MAPANIA. Involuer. magnum triphyllum. Flor. capitata. *Cal.* 6-valvis, imbricatus, dentatus. *Cor.* o. Semen involucello (perispermio) 6 paleaceo involutum. Richard.

1. *sylvatica*. Aubl. gujan. 2. 47. t. 17. Willd. sp. 1. p. 258. Habitat in sylvis ad Gujanac. Culm. basi squamis vel foliis imbricatis lanceolatis vestitus. Kyllingiam fere refert. W. $\overline{\Gamma}$

119. REMIREA. Spiculæ in capitulum congestæ. *Cal.* 2-valvis. *Cor.* 2-valvis, cal. minor; palea interna. (s. nectar. Schreb.) Semen non dimittente. Filam. longiss. ma.

1. *maritima*. Aubl. Guj. 1. p. 44. t. 16. Lam. 1. p. 184. t. 117. Megia Schreb. Willd. Sp. 1. p. 311. Habb. in arenosis maritimis Gujanæ et Cayennæ. Radix s. stirps repens. Culm. foliosis.

120. DICHROMA. Spica ovata s. capitata involucrata. Squamæ (paleæ) multæ utrambracæ subcongestim imbricatæ. Styl. setaceus; Stigm. 2. Sem. nudum, rugulosum, apice tuberculo lunatum cincto, (Fol. floralia s. involucrum basi discolora ut plurimum allieantia.)

1. *leucocephalum* (glabra), erecta glabella, capitulo involueroque inferne can-

didis. Michaux Flora. 1. p. 37. Hab. in Carolina et Georgia.

2. *ciliatum*, involuero foliisque basi ciliatis, spiculis oblongis attenuatis. Schoenus stellatus. Swartz prodr. p. 19. Willd. sp. 1. p. 264. Spica compacta alba, fol. ad spicam partim albis partim viridibus. Sloan hist. 1. p. 119. t. 78. f. 1. Hab. in Florida et insul. Caribaeis. Kyll. *triceps* refert. Sw. $\overline{\text{T}}$

3. *reptans*, humilis reptans, fol. serrolatis glabris, involucri subtriphylo breviusculo. Richard in Act. Soc. Paris. 1. p. 106. sub Scirpo. Hab. in Cajenna.

Obs. Forte nonnulli Schoeni auctor. Scirpus radiatus Thunb. Willd. 1. p. 289, et Cyperus leucocephalus. Retz. obs. 5. p. 11. huc quoque pertinent.

121. **SCHOENUS.** Spicul. subconvolutae, acutae. Squamae fasciculatim congestae, exteriores steriles, nitidae. Cor. o. Sem. 1, subrotundum nudum, aut setis cinctum. (Stam. 2-3.)

* Culmo tereti.

1. *Mariscus*, culmo tereti folioso, fol. margine dorsoque aculeatis. Flor. succ. p. 35. Jacq. collect. 3. p. 72. Willd. sp. pl. 1. p. 259. Schenck. gram. 375. t. 8. f. 7-11. Moris. hist. 3. p. 237. s. 8. t. 11. f. 24. Hab. in Europae paludibus. β . *effusus*. Juw. Flor. Ind. occid. 1. p. 98. Cresc. in insularibus maritimis prope Vera Cruz.

2. *funceus*, culmo tereti subnudo, umbella sessili laterali. Willd. phytog. 1. p. 2. n. 9. g. t. 1. f. 4. In Guinea. $\overline{\text{T}}$

3. *mucronatus*, culmo tereti nudo, spiculis ovatis fasciculatis, involucri subhexaphyllo patente, fol. cymalenticatis. Syst. veg. p. 81. Schousboe Maroc. 2. p. 28. Cyperus aegyptiacus. Glorin. obs. bot. p. 20. t. 3. Moris. hist. 3. p. 227. s. 8. t. 9. f. 6. In Europae australioris et Barbariae maritimis.

Obs. Gramen quoad sedem dubium, non male quoque ad Scirpum S. Mariscum Hall. referri posset.

4. *pilosus*, culmo tereti, vaginis pilosis, flor. fasciculatis. Willd. Phytog. 1. p. 3. n. 10. t. 1. f. 3. In Guinea. $\overline{\text{T}}$

5. *stiformis*, culmo tereti capillari, capitulo oblongo, involucri triphylo. Thunb. prod. 16. S. *indicus*. Lam. enc. Plukn. amalth. 113. t. 1. 416. f. In Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

6. *striatus*, culm. tereti, capitulo ovato, involucri triphylo. Thunb. prod. 16. Ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

7. *Capitellum*, culmo tereti, capitulo ovato, involucri diphylo. Thunb. prod. 16. Ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

8. *scariosus*, radice bulbosa, scapis teretibus, canaliculatis, fol. setaceis rigidis, spica cylindrica terminali, squam. margin. scariosis. Rottb. gram. 46. t. 16. f. 2. (Scirp. bulbosus). Willd. sp. 1. p. 261. Thunb. prodr. In India orientali et Cap. b. spei. Facies Scirpi palustris. Fol. radicalia copiosa coarctata subuliformia, basi membrana lata alba. $\overline{\text{T}}$

9. *nigricans*, culmo tereti nudo, capitulo ovato, involucri diphylli ovati valvula altera subula longa terminata. Moris. hist. 3. p. 233. s. 8. t. 10. f. 28. Hab. in paludibus et maritimis. Var. culmo fol. longiore aut iis brevior. $\overline{\text{T}}$

10. *ferrugineus*, culm. tereti nudo, involucri valvula majore lanceolata spicam aequante. Moris. hist. 3. p. 254. s. 8. t. 12. f. 40. In Gotlandiae, Helvet. paludibus. $\overline{\text{T}}$

11. *fuscus*, culmo teretiusculo aggregato stricto foliisque canaliculatis setaceis, flor. fasciculatis, involucri (bractea) diphylo longissimo. Willd. sp. 1. p. 262. S. *setaceus*. Thunb. Flor. Paris. ed. 2. p. 19. Hab. in paludosis. A. S. *albo* differt praeter colorema fuscum flor. acutis et bract. his quadruplo longioribus; has species vero inter se non differre affirmat cl. Smith. Fl. Brit. 1. p. 46.

12. *rufus*, culmo tereti nudo, spica subdisticha involucri 1-phylo obtuso longiore, spiculis paucifloris, fol. canaliculatis. Smith l. c. p. 45. Light. Scot. t. 24. f. 2. Hab. in Scotiae paludibus. Rad. repens. Sem. setosum.

13. *tristachyus*, culm. tereti articulo lacri, capitulis tribus terminalibus. Thunb. prod. 16. Ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

14. *cuspidatus*, culm. teretibus subnudis, panic. lineari, bract. annularib. obliquis brevissimis, mucrone longissimo terminat. Rottb. 66. t. 18. f. 3. Ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

15. *aristatus*, culmo tereti aphylo, spicis aggregatis, involucri monophyllo, glumis cuspidatis. Thunb. prod. 16. Ad C. b. spei. $\overline{\text{T}}$

16. *compars*, culmo tereti aphylo, spicis aggregatis, involucri brevioribus, glumis acutis. Thunb. prod. 16. Rottb. p. 65. t. 18. f. 4. Ad Cap. b. spei. Spiculae binae in singulo rachaeos denti sessiles.

17. *flexuosus*, culmo tereti folioso, spicis paniculatis, glumis mucronatis. Th. prod. 16. β ? *involucratus*, panicula foliosa nutante, spicis congestis aristatis sub-

distichis, fasciculis gemellis nectariferis. Rottb. 64. t. 19. f. 1. Ad Cap. b. spei. ¶

18. *capillaceus*, culmo tereti folioso, apicis subracemosis, glumis cuspidatis, fol. capillaribus. In Cap. b. spei. ¶

19. *ustulatus*, culmo tereti folioso, apicis peduncul. pendulis oblongis aristatis. Mant. 178. Rottb. 61. t. 18. f. 1? Ad Cap. bonae spei. Folia caulina pauca. ¶

20. *thermalis*, culmo tereti folioso, apic. peduncul. alternis aristatis: singula composita spiculis plurimis per totidem bracteas interstinctis. Rottb. p. 61. t. 18. f. 2. Willd. sp. 1. p. 267. Ad aquas calidas Cap. b. sp. Spic. turgidae, glum. mucrone longo.

21. *spicatus*, culm. tereti capillari, capitulis spicatis involucriatis. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

22. *Bobartiae*, culm. compresso, capitulo terminali, involucrio pentaphyllo. Retz. obs. 4. p. 9. In Zeylona. ¶

23. *hirsutus*, pedunc. axillaribus terminalibusque, pedicellis racemosis trispicatis. Vahl. Elog. 1. Hab. in America meridionali.

24. *bulbosus*, scapis folisque setaceis basi alatis, capitulis glomeratis, per bracteas setaceas interstinctis. Willd. 1. p. 264. Ad Cap. b. spei Radix bulbosa. Folia numerosa, setacea, basi interstincta ramentis membranaceis; albis. Faecis Junci bulbosi. An hujus generis?

25. *inanis*, culm. tereti aphylo, apicis paniculatis, glumis acutis. Thunb. prod. 16. In Cap. b. spei. ¶

* * Culmo triquetro.

26. *cephalotes*, culm. folioso triquetro: involucrio tetraphyllo longissimo, reflexo, capitulo oblongo terminali. Rottb. 61. t. 20. In Surinamo. A Scirpo cephalote distinctus. Willd. sp. 1. p. 265. Habitus recedit. ¶

27. *cyperoides*, culm. triquetro folioso, umbella terminali, spiculis glomeratis. Swartz prod. 19. Fj. Flor. p. 110 Jacq. icon. rar. 1. t. 10? Collect. 1. p. 113? In Jamaicae austral. montib. Stigm. cirrhosa. Setae 2. Sw. ¶

28. *cymosus*, culm. triquetro folioso, umbella terminali composita, spiculis ovatis striatis glomeratis. Willd. sp. pl. 265. In America boreali. Fol. linearis cypripina numerosa. Spic. minutae, tres semper glomeratae sessiles. Involuc. universale polypbyllum inaequale. W. ¶

29. *glomeratus*, culm. triquetro folioso, flor. fasciculatis, fol. planis, pedunculis lateralibus geminis. L. Willd. p. 266. Swartz obs. 20. In Jamaica et America boreali. Sem. basi setis cinctum.

30. *Cladium*, culm. obtuse triquetro folioso laevi, fol. antrorsum aculeatis panic. diffusis, spiculis unifloris sessilibus diandris. Swartz prod. 19. Ejusd. Flor. 1. p. 97. Cladium culmo notoso, flor. quasi umbellatis, umbellis gradatim assurgentibus. Brown. jam. 114. In humidis Jamaicae. ¶

31. *Restioides*, culm. inferne compresso - anticipibus glaberrimis, flor. paniculatis, vaginis apice lanceolatis. Swartz prod. 19. et Flora. p. 104. In India occidentali. A caeteris differt labium.

32. *corymbosus*, culm. folioso triquetro, pedunc. corymbosis, inferib. alternis distantibus, superiorib. confertis. Swartz pr. 1. 19. et Flora Ind. occid. 1. p. 99. Willd. p. 266. Rottb. 68. t. 21. f. 1. (S. surinamensis.) Scirpus *corymbosus* Lin. Willd. sp. 1. p. 308. Fol. vaginae ventricosae, uno latere mucrone obtuso, altero fol. longissimo linearis instructae. R. Hab. in utraque India, in montosis.

33. *rugosus*, culm. triquetro folioso, pedunc. corymbosis distantibus, apicul. ovatis acutis, scm. undulato-rugosis. Vahl. Elog. Amer. 2. Hab. in Amer. meridionali. Anteced. affinis.

34. *polyphyllus*, culm. triquetro folioso, fol. carinatis, dorso marginibusque scabris, apicis decompositis axillarib. Vahl. l. c. Hab. in Montserrat. S. Marisco similis.

35. *polycephala*, culm. triquetro folioso, pedunc. axillaribus et terminalib. capitulis plurimis globosis: intermedio sessili. S. triiceps. Vahl. l. c. S. Holoschoenoides Rich. in Act. Soc. nat. Paris. 1. p. 206. Hab. in Amer. meridionali et Cajenna. Capst. ad 10-12.

36. *laevis*, culm. trigono folioso, capitulis lateralibus, glumis mucronatis, apicis ovatis. Thunb. prod. 17. Ad Cap. b. spei.

37. *lanceus*, culm. trigono folioso, apicis paniculatis lateralib. glumis spiculisque lanceolatis. Thunb. prod. 17. Ad Cap. b. spei.

38. *albus*, culm. subtriquetro folioso, flor. fasciculatis, fol. setaceis, involucrio flor. subaequali aut nullo. Fl. sucrc. 34. Fl. dan. 320. Rottb. germ. II. p. 49. Hab. in Europae et Americae paludibus lufosis. ¶

39. *sparsus*, culm. folioso triquetro, paniculis multifloris, spiculis sparsis, ovatis, minutis, seminae transverse ruguloso. Michaux Flora t. p. 35. Hab. in umbrosis Carolinae. Styl. bifidus.

40. *longirostris*, culm. triquetro, umb. foliosis, spicul. fasciculatis, summe compresso: mucrone longissimo. Michaux. l. c. In Virginia et Carolina. Fol. lata. Setulae perispermicae 6, subulatae.

41. *inexpensus*, culm. obsolete triquetro, paniculae remotae ramulis approximato-erectis, spiculis fusiformib. Michaux. l. c. Sem. suboblongum, mucrone brevi, setula 6. Panic. contracta.

42. *rariflora*, culm. fol. setaceis, paniculis paucifloris; spiculis ovatis, turgidis, sem. obovato rugoso. Michaux. l. c. Panic. parvulae, spicul. pedicellatae.

43. *capitatus*, culm. triquetro, capitul. alternis, spicul. oblongis, semine stipitato, setulis retrorsum muricatis. Michaux. p. 36. Fol. angusta. Capit. interdum geminata. Sem. obovatum. M.

44. *ciliaris*, fol. linearib. obtusiusculis, bracteis ciliatis, semine lentiformi. Michaux. l. c. Hab. in Florida. Flor. fascic. terminales. Setulae brevissimae sursum hispidulae. Spic. dorso pubescentes.

45. *distans*, flor. fascicul. subcapitatis lateralibus; spiculis remotis, ovatis glabris, sem. lentiformi setul. longitudine. Michaux l. c. Hab. in Carolina.

46. *fascicularis*, flor. fascicul. lateralibus et terminali, bract. brevibus; spic. oblongis; squamis mucronatis, setulis semine laevi duplo longioribus. Mich. l. c. p. 37. Hab. in Carolina.

47. *gracilis*, culm. triquetro folioso longissimo filiformi, spicis lateralibus pedunculatis tereti-linearib. Swartz prod. 19. Ej. Flora p. 109. In Jamaica.

48. *setaceus*, culm. triquetro debili, fol. alternis distantib. setaceis, spiculis aggregatis, flosc. diandris. Swartz, prod. 20. Willd. sp. 268. Rothb. 62. t. 21. f. 2. *Tridodon* Richard ob. sem. 3-dentata, glumas aristatas et stam. 2. In pratis Jamaicae et Surinami.

49. *pusillus*, culm. triquetro nudo filiformi, spicul. terminalib. subs fasciculatis sessilib. foliolo subjecto, spicam aequante. Swartz, prod. 20. Ej. Icon. fasc. 1. p. 7. tab. 6. et Fl. p. 112. In graminosis montium Jamaicae australis. Sem. scabrum.

122. CYPERUS. *Glumæ* paleaceae distiche imbricatae. Cor. 6. Sem. 1, undum. Spicula compressa.

* *Culmo tereti.*

1. *minimus*, culm. capillari spica solitaria geminaeque, involucri monophyllo. Thunb. prol. 18. Willd. sp. 1. p. 269. Scirpus setaceus A. Reub. gram. 47. t. 15. f. 4. Pluk. 176. t. 300. f. 4. 5. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 120. t. 79. f. 3. In Jamaica, Africa.

2. *setaceus*, culm. setaceis striato-angulosis nudis, spica terminali subquadriflora nuda. Retz obs. 5. p. 10. In graminosis humiliusculis Calcuttae.

3. *arenarius*, culm. compresso nudo, spicis capituli glomeratis sessilibus, involucri submonophyllo. Retz. obs. 4. p. 9. Pluk. atlas. 178. t. 300. f. 7. In arena mobili Indiae orientalis. T.

4. *prolifer*, culm. tereti, capitulo globoso prolifero. Thunb. prod. 18. Rothb. p. 55. t. 17. f. 2. In Cap. b. spei. T.

5. *effusus*, culm. tereti subligneo; umb. rara, spicis conglomeratis, involucri subulato triphylo. Rothb. p. 22. t. 12. f. 3. Ad Meccam in Arabia.

6. *articulatus*, culm. tereti nudo articulato Sp. pl. 66. Rothb. p. 26. Vahl. symbol. p. 7. C. niloticus, Forsk. Sloan. jam. 36. p. 121. t. 81. f. 1. In Jamaicae, Aegypti, Indiae rivulis. T.

7. *marginatus*, culm. tereti aphylo, umb. composita, spicul. oblongis brunocis. Thunb. prod. 12. In Cap. b. spei. T.

8. *complanatus*, culm. compresso plano nudo, umb. composita involucri diphylo, partiali brevissimo polyphylo, foliolis setaceis laevi membranaceis. Willd. spec. 1. p. 270. Scirpus complanatus Ritz. obs. 5. p. 14? Hab. in Java. Spiculae brunneae. Singulare gramin. culmo foliaceo lato compresso. W. T.

9. *texilis*, culm. tereti, umb. decomposita, involucri dodecaphylo laevi breviori spiculis oblongis. Thunb. prod. 18. In Cap. b. spei. rivulis. T.

10. *compactus*, culm. tereti folioso, umb. decomposita, involucri pentaphyllo, spiculis congestis subspiralibus. Retz. obs. 5. p. 10. Hab. in China.

11. *atropurpureus*, culm. tereti subfolioso retrorsum scabro, fol. subulatis canaliculatis. C. *striatus*, Flor. peruv. 1. p.

47. Hab. in collib. aridis *Tarsoe* oppidi. Glum. ovatae, atropurpureae. Fol. vaginantis, ad medium inferne margine ciliata. Flor. sine hyemis.

**** Culmo triquetro, spiculis simplicibus.**

12. *distachyos*, culm. triquetro filiformi basi folioso, spicis binis sessilibus involucri brevioribus. Willd. l. c. p. 272. Hab. in Italia. Culmus basi folio unico gramineo angusto instructus. W.

13. *triflorus*, culm. triquetro nudo, umbel. tristachya, intermedia sessili, spiculis laevigatis. Mant. 180. Schoenus cyperoides. Retz. obs. 4. p. 8. In pascuis aridis Indiae. Involuc. diphyllum.

***** Culmo triquetro, umbella glomerata sessili.**

14. *nanus*, culm. triquetro setaceo, umb. sessili capitata involuc. diphylo, glumis nervosis. Willd. l. c. Pluk. t. 417. f. 8. Hab. in Guinea.

15. *filiformis*, culm. triquetro nudo filiformi, fol. setaceis, spicis terminalibus sessilib. conferis tereti-subulatis. Swartz. prodr. 20. Ej. Flor. p. 120. In Jamaicae austral. nemorosis.

16. *dubius*, culm. setaceo triquetro, capitulo terminali, involucri tetraphyllo longissimo. Rottb. 20. t. 4. f. 5. Willd. p. 273. Cyperus leucocephalus. Retz. obs. 5. p. 11. In Malabar.

17. *capitatus*, culm. subanguloso striato medio folioso, capitulo terminali triphylo, spicis sessilib. Retz. obs. 4. p. 9. Hab. in India?

18. *niveus*, culm. triquetro filiformi nudo, umb. terminali sessili diphylla. spicis compressis lanceolatis. Retz. obs. 5. p. 12. In nemorosis ad Midnapour, Tschandrancona Indiae. T.

19. *pannonicus*, cespitosus, culm. obsoleto triquetro prostrato, spicis subquaternis subovatis sessilib. Ait. Kew. 1. p. 79. glumis lateralibus aphacelatis Lin. suppl. 103. Jacq. aust. 5. p. 29. app. t. 6. In Austria, Hungaria. ©

20. *junciformis*, culmo subtereti, spiculis aggregatis; spatha diphylla: foliolo altero spiculis brevior. Desf. atl. t. 7. f. 1. Cavan. ic. 3. p. 2. t. 203. f. 1. Hab. in Barbaria et Hispania. Spiculae nigrae. Cav.

21. *mucronatus*, culm. nudo vaginato triquetro, involucri monophyllo stricto, spicis lateralib. sessilib. Rottb. p. 19. t. 8. f. 4. Vahl. symbol. 1. p. 7. Hab. in Arabia,

India. Culmus, inferne teres est. Spiculae saepe 4, 6, 8. Vahl.

22. *laevigatus*, culm. trigono, capitulo glomerato globoso obliquo, involucri diphylo, glumis obtusis. Thunb. prod. 18. Rottb. 19. t. 15. f. 1. A. L. Cap. b. spei. Involuc. foliolis plano-canaliculatis longis, majore erecto, inferiore paulo. Folia nulla in florentie gramine adsunt, vidi tamen squamas unciales emarcescentes lineares. Willd. T.

23. *ornithopus*, culm. cespitosus incurvis, umb. sessili subterminali, spic. teretibus sublinearib., involuc. 3-phylo longissimo. Hab. in paludosis exsiccatis ad St. Doming. Spic. acuminatae: squam. subamplexantes.

24. *squarrosus*, culm. triquetro nudo, umb. tetraphylla glomerata, spiculis ovatis, glumis mucronatis. Willd. p. 274. Cyperus (squarrosus) culmo triquetro nudo, umbella foliosa glomerata, spicis striatis squarrosis. Amoen. acad. 4. p. 303. Cyperus pygmaeus. Rottb. 20. t. 14. f. 4 et 5. Hab. in India. Involuc. 3-4-phyllum.

25. *pygmaeus*, culmo triquetro folioso, capitulo globoso, involucri 6-7-phylo: foliol. 3 longissimis. Cavan. ic. 6. p. 65. t. 568. f. 2. Hab. in Mauritania juxta flum: Sebae.

26. *nitens*, culm. triquetris basi foliosis, umb. subsimplicibus, involucri triphylo, flor. monandris. Retz. obs. 5. p. 13. Willd. Sp. 1. p. 275. Hab. in India.

27. *fascicularis*, culm. triquetro, involucri polyphylo, spicis linear. lanceolatis corymbosis confertissimis. Rottb. 30. t. 11. f. 1. Desf. Atl. p. 44. Lam. Ill. t. 38. f. 2. Cyperus polystachyos. Willd. Sp. 1. p. 275. Pluk. mant. 97. t. 416. f. 6. Hab. in India, ad Cap. b. spei et in Barbar. T.

28. *conglomeratus*, culm. antriquetris fol. fasciculatis semiteretib. s. canaliculatis breviorib. capitulo paniculato terminali triphylo. Rottb. 21. t. 15. f. 7. Hab. in Arabia. Fol. tenuius, margine punctis scabra, vagina atropurpurea. R.

29. *cruentus*, culm. triquetro, involucri polyphylo longo, umb. simplici, spicis conglomeratis, florcul. sulcato-punctatis. Rottb. p. 21. t. 5. f. 1. Vahl. symbol. 1. p. 8. Cyperus globosus. Forsk. p. 15. Hab. in Arabia. Spic. lineis et Ochreae punct. cruentis distinctae. T.

***** Culm. 3-quetro, spic. umbellato-capitatis sessilib., et pedunculatis.**

30. *aristatus*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spic. cylindraceo-spicatis,

glumis subulatis uncinato-mucronatis, Willd. p. 275. Rottb. 23. t. 6. f. 1. Scirpus intricatus. Lin. Mant. 182. In Ind. orientali et Cap. b. spec. Fol. graminacea laevia. Involucro triphyllum. Umb. spicis saepius pedunculatis, quatuor sessilib. Spicae ovatae cylindricae obtusae.

31. *Luzulae*, culm. triquetro, umb. simplici, spiculis ovatis capitato-spicatis, involucri polyphylo. W. p. 276. Rottb. t. 13. f. 3. Sloan. jaim. t. 29. f. 1. In Amer. calidiore.

32. *congolensis*, culm. triquetro folioso, umb. simplici, spicul. compactis obtusis comitis. Richard in Act. Soc. Lin. Paris. p. 106. Hab. in Cayenna. Afria. antecolenti.

33. *confertus*, culm. triquetro nudo, umb. simplici foliosa, spiculis ovatis conglomeratis, glumis apice recurvis acuminatis. Swartz. Flor. Ind. Occid. 1. p. 115. In Jamaica australi. Involuc. 3-phyll. longissimum. $\text{\textcircled{E}}$

34. *Brisaens*, culm. triquetro, fol. angustis, umbellulis confertis aphyllis, spicul. oblongo-ovatis obtusis. Richard in Act. Soc. Lin. Paris. p. 106. Hab. in Amer. merid. Spiculae subbrizaeformis.

35. *viscosus*, culm. subcompresso basi viscoso, fol. asperis, umb. foliosa composita, spiculis subconglobatis obtusis. Ait. Kew. p. 70 Swartz Flor. Ind. occid. 1. p. 113. Hab. in in arenosis, subhumidis Jamaica australi. Hujus loci est Cyp. elegans, Rottb. gram. p. 34. t. 6. f. 1. secundum Vahl Eclog. Amer. fasc. 2. Forte non diversus est a Cyp. odorato. L.

36. *ligularis*, culm. triquetro, umb. composita, flor. pedunculatis, spiculis paucifloris spicatis, glumis obtuse mucronatis, involucri polyphylo longissimo. Willd. p. 275. C. ligularis, culmo triquetro nudo, umbel. spicul. capitatis oblongis sessilibus, involucri longissimis serrato-asperis. Lin. Amoen. acad. 5. p. 391. Rottb. 35. t. 11. f. 2. Hab. in Jamaica et ad C. b. sp.

37. *cinnaomeneus*, culm. triquetro folioso, umbell. spicul. capitatis ovatis pedunculatis sessilibusque, involucri pentaphyllo serrulato-scabro. Retz obs. 4. p. 10. Var. prioris?

38. *alopecuroides*, culm. triquetro, umb. supradecomposita, spicis digitatis oblongis, spicul. confertissimis imbricatis erectis. Rottb. 18. t. 8. f. 2. C. glomeratus. L. Willd. 277. calopescuroides, culmo trigono, umb. decomposita involucri polyphylo serrato breviori, spicul. cylindricis. Thunb. prodr. p. 18. Hab. in Arabia felici, India et Cyp. b. spec. Planta speciosa. $\text{\textcircled{E}}$

39. *imbricatus*, culm. triquetro nudo, umb. decomposita, umbellularum radiis imbricatis, involucri hexaphylli foliis tribus longissimis, tribus brevissimis. Retz obs. 5. p. 12. In India.

* * * * Culmo triquetro, umbella composita et decomposita, spiculis divaricatis.

40. *maderaspatanus*, culm. triquetro, umb. composita, spiculis linearibus, glumis lanceolatis uncinato-mucronatis, involucri triphylo longissimo lanceolato. W. l. c. p. 278. Cyperus squarrosus. Rottb. 25. t. 6. f. 3. Pluk. analit. 14. t. 397. f. 2. Hab. in India. Parvulus. $\text{\textcircled{C}}$

41. *castaneus*, culm. triquetro, umb. composita, spiculis linearib. multifloris, glumis obtusis recurvato-mucronatis, involucri triphylo longissimo convuluto-setaceo. Willd. 278. Hab. in India.

42. *elegans*, culm. triquetro, umbell. subradistis, spiculis subternis linearib. squamis obcordatis substantib. mucronatis patulis, involucri planis. Vahl. Eclog. 2. Lin. Willd. spec. p. 278. Sloan. jaim. 1. p. 117. t. 75. f. 1. Hab. in Jamaicae paludosis.

43. *scopellatus*, umb. subhexaphyllis, radiis alternis confertis ramosis, fasciculatis aphyllis, spiculis linearib. lanceolatis. Vahl. Eclog. 2. Richard in Act. Soc. hist. nat. Paris. 1. p. 106. Hab. in Martinica.

44. *surinamensis*, culm. triquetro, umb. decomposita, spicul. ovatis, glumis acuminatis imbricatis, involucri triphylo W. p. 279. Rottb. 35. t. 6. f. 5. Hab. in Surinamo.

45. *avidus*, culm. triquetro striato, umb. composita triphylla, spicis lanceolatis, monandris. Retz. obs. 5. p. 13. In India.

46. *avescens*, culm. triquetro nudo, umb. sub composita triphylla, spicis confertis lanceolatis, glumis obtusis. Willd. p. 279. Roth. germ. II. p. 50. Desf. Atl. 1. p. 46. Moris. hist. 3. p. 239. s. 8. t. 11. f. 37. Hab. in Europae et Barbariae paludosis. $\text{\textcircled{C}}$

47. *fuscus*, culmo triquetro, umb. composita, triphylla, spicis linearibus confertis glumis acutis imbricatis. Willd. 280. Flor. lan. t. 179. Leers. herb. t. 1. f. 2. Roth. germ. II. p. 50. Hall. helv. n. 1349. Moris. hist. 3. p. 239. s. 8. t. 9. f. 38. Hab. cum priore. culm. subfasciatus. $\text{\textcircled{C}}$

48. *viridis*, culmo triquetro, umb. composita triphylla, spicis linearibus confertis, glumis acutis patulis. Willd. sp. 2. p. 280. Cyperus viridis, Krock. silas. n. 69.

t. 13. Hab. in montosis Silesiae et circa Argentoratum. Culm. subrigidus. ☉

49. *difformis*, culm. triquetro nudo, umb. diphylla simplici trifida, spicis cuspidatis, intermedia sessilib. Amoen. 4. p. 302. Rothb. 24. t. 9. f. 2. Pluk. alm. t. 192. f. 3. Hab. in India. Spicae numerosae, squamis ovatis concavis obtusis, latere scariosis.

50. *jemicus*, culm. triquetro seminudo basi bulboso, involucro diphylo, umb. subsimplici, spiculis linearibus. Retz. obs. 4. p. 11. Rothb. 25. t. 8. f. 1. In Arabia felici, in regione Jeminae inque graminosis Zelonae. ☿

51. *strigosus*, culm. triquetro nudo, umb. subsimplici, involucr. 4-phylo, spiculis linearib. confertissimis horizontalibus. Lin. Sp. plant. 63. Rothb. 40. t. 11. f. 3. Sloan. hist. 1. p. 116. t. 24. f. 2. 3. In Jamaicae, Virginiae paludibus, inque India. Radix sulcotunda.

52. *tenuis*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spiculis subulatis confertis horizontali-reflexis, involucr. polyphylo foliol. lineari-setaceis. Swartz. Flor. 1. p. 119. In Jamaicae occident. gramin. montosis.

53. *tuberosus*, culm. triquetro basi folioso, involucro triphylo, umb. composita, spicis lanceolatis teretiusculis. Rothb. p. 28. t. 7. f. 1. In India.

54. *pumilus*, culm. folioso triquetro, involucro tetraphyllo, umb. composita, spicis alternis ovato-lanceolatis nitidis. Rothb. 29. t. 9. f. 4. 5. Cyper. pumilus. L. Sp. plant. 67. Amoen. acad. 4. p. 302. Hab. in India. In β involucr. 2-phyllum dicitur.

55. *stoloniferus*, culm. nudo triquetro, umb. composita involucrata, spiculis lanceolatis. Retz. obs. 4. Hab. in India. ☿

56. *compressus*, culm. triquetro nudo, umb. universali triphylla, glumis mucronatis, lateribus membranaceis. Sp. 68. Rothb. 27. t. 9. f. 3. Sloan. hist. 1. p. 117. t. 76. f. 1. Hab. in pratis Jamaicae et Amer. septentr. Spicae radii 4, longe pedunculati, umb. media sessili.

57. *pulcher*, culm. trigono, umb. decomposita involucro subhexaphyllo breviori, spiculis ovatis Thunb. prod. 16. Hab. in Cap. b. spci

58. *monandrus*, culm. inferne folioso obtuse triangulo, umb. polystachia decomposita, spicis lanceolatis confertis sessilib. flor. monandris. Roth. catal. 1. p. 3. C. v. getus. Willd. Sp. 1. p. 281. A. n. videtur praecedenti. An varietas C. glabri? W.

59. *albidus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, pedunculis corymbosis, involucro polyphylo longissimo. Retz. obs. 6. p. 21. Hab. in India.

60. *hexastachyos*, culm. triquetro nudo fol. gramineis linearibus molliusculis glaucis, umb. simplici saecula, spicis linearibus alternis subnatis. Rothb. 28. t. 14. f. 2. Sw. Fl. ind. occid. 1. p. 117. Hab. in India et Jamaica. C. rotundus. L. sp. pl. ed. 1. diversus est. Sw. ☿

61. *Hydra*, culm. triquetro laevigato, umb. simplici sessili et 1-2 pedunculatis, spicul. linearib. fol. radical. recurvatis, radice repente tuberosa. Michaux. 1. p. 27. Hab. in cult. Amer. boreal. spic. castaneae. Planta tuberib. facillime renascens maximo agris damno. M. Praecedenti affinis.

62. *tetrastachyos*, culm. triquetro, involucr. sub-4-phyll. corymbo breviori, spic. sulquaternis arcuatis, acutis. Desfont. atl. 1. p. 45. t. 8. Hab. in Algeria ad ripas flum. Taddah. An prioris varietas?

63. *glaber*, culm. triquetro nudo laevi, umb. triphylla, flor. glomeratis, inferiorib. brachiatis, fol. glabris. Lin. Mani. 179. Segn. suppl. 66. t. 2. f. 1. Allom. pedem. p. 116. in Veronae et Pelemon. humilibus. Culm. palmaris. Involucr. triphyllum culmo longius, praeter 3 foliola subulata brevis.

64. *brunneus*, culm. triquetro nudo, fol. lato-linearib. planis, umb. 8-phylla, spic. subsessilib. glumis striatis. Swartz. l. c. p. 116. Hab. in Ind. occident. Setae 2, latiusculae ad latera germinis. Sw.

65. *odoratus*, culm. triquetro nudo, umb. decomposita simpliciter foliata, pedicellis distiche spicatis. Lin. Sp. pl. 68. Rothb. p. 38. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 1. In America ad fluviorum ripas. ☿

66. *esculentus*, culm. triquetro nudo, umb. foliata, radicem tuberibus ovatis, tenuis imbricatis. Morist. hist. 3. p. 236. t. 8. t. 11. f. 10. Desf. atl. 1. p. 43. Villars Dauph. 1. p. 116. Monspeli, in Italia, Orientis et Barbaria. ☿

67. *tenuiflorus*, culm. triquetro, fol. linearibus, umb. decomposita, spiculis linearib. acutis angustissimis. Rothb. gram. 30. t. 14. f. 1. Jacq. ic. rar. 2. t. 256. Collect. 3. p. 150.

68. *badius*, culm. triquetro nudo, fol. serrulatis, corymbo terminali, spicul. lineari-subulatis confertis, involucr. pedunculis longiore. Desfont. Atl. 1. p. 45. t. 7. f. 2. Ad ripas rivulor. Algeriae. Involucra. 4-5

Phyll. Spicul. ferrugineae. Affinis *C. tenuiflora*. Rothb. ¶

69. *pallescens*, culm. triquetro basi folioso, pedunc. supradecompositis, spiculis linearibus subulatis rectis distinctis, involucri sub-4-phyllis umb. brevior. Desf. l. c. t. 9. Hab. ad lacuum ripas prope la Calle. Spic. primo albidis deinde pallide rufac. ¶

70. *Pangoroi*, culm. triquetro basi folioso, involucri triphyllis, umb. universaliter decomposita: partialibus subulatis. Retz. obs. 4. p. 10. Rothb. 31. t. 7. f. 3.

71. *flavicomus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, involucri longissimo sub-5-phyllis. Michaux. l. c. In Carolina. Umb. ramuli ab ipsa basi floriferi, spiculae patentae, flavae oblongae 7-florae. M.

72. *virens*, culm. triquetro, umb. composita subnuda, involucri polyphyllis longissimo peduncul. s. ramis divaricato-ramosis. Michaux. l. c. In Carolina. Majusculus. Spicul. fasciculatae, virentes ovatae planae. M.

73. *strigosus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, involucri longissimo, spic. teretiusculis, patentissimis. Mich. l. c. Cum priore.

74. *lanceus*, culm. trigono folioso, umb. composita, involucri duplo brevior, spicul. oblongis. Thunb. prod. 18. C. denudatus. Linn. suppl. 108? Hab. in Cap. b. spei.

75. *longus*, culm. triquetro folioso, umb. foliosa supradecomposita, pedunculis nudis, spicis alternis linearibus Jacq. icon. rar. 2. t. 267. Collect. 3. p. 191. C. odoratus radice longa. Morit. hist. 3. p. 217. s. 8. t. 11. f. 13. Hab. ad rivulos Europ. austral. Spic. brunneae, nitulae.

76. *fastigiatus*, culm. triquetro, umb. decomposita, pedunculis longissimis filiformibus subquinquefidis, spicis plurimis linearibus sparsis. Rothb. 32. t. 7. f. 2. Burm. ind. 20. t. 8. f. 2. Hab. in India. ¶

77. *canaliculatus*, culm. triquetro canaliculato nudo, umb. decomposita, pedunculis racemosis, involucri polyphyllis longissimo. Retz. obs. 6. p. 20. Hab. in India orientali.

78. *Monti*, culm. triquetro, umb. decomposita paniculata, spiculis ovatis florcul. distinctis, involucri hexaphyllo. Willd. p. 266. Linn. suppl. 102. Rothb. 31. serotinus C. serotinus odoratus, radice longa, paniculae locustis laevis ferrugineis compactis. Mont. gram. 12. t. 1. f. 12. In maritimis Italiae et Tergesti. ¶

79. *niger*, culm. triquetro nudo glabro, fol. ensiformibus. umb. foliosa, pedunc. plurimis longis, spicis laevis nigricantibus. Flor. Per. t. p. 47. Hab. in inundatis Prov. Cercado et Chancay. ☉

80. *Iria*, culm. triquetro seminudo, umb. foliosa decomposita, spiculis alternis, granis distinctis. Rothb. gram. 41. Willd. l. c. p. 286. Pluk. alm. 179. t. 1. f. 7. Iria s. Palari. Reed. mal. 12. p. 105. t. 56. Hab. in India. Distinctus spicul. linearibus, flor. dentium pectinis instar, parum distantibus. W.

81. *Santonici*, culm. triquetro, umb. supradecomposita verticillata paniculata. Willd. p. 287. Rothb. 41. t. 9. f. 1. Hab. in India.

82. *corymbosus*, involucri polyphyllis, umb. supradecomposita, pedunc. filiformibus corymbosis strictis. Rothb. gram. 42. t. 7. f. 4. Cyperus, culmo trigono aphyllis, umb. decomposita involucri brevior, spicis linearibus. Thunb. prod. 18. Hab. in Asia et Cap. b. spei.

83. *racemosus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, pedunc. ramosis racemosisque, involucri polyphyllis longo. Retz. obs. 6. p. 20. In India orientali.

84. *Haspan*, culm. triquetro folioso, umb. supradecomposita, spiculis umbellato-sessilibus. Rothb. 36. t. 6. f. 2. Pluk. alm. 179. t. 192. f. 2. Hab. in India, Aethiopia. ¶

85. *elatus*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa supradecomposita, spicis sessilibus digitalibus imbricatis, spiculis subulatis. Amoen. acad. 3. p. 301. in Hab. India. Gramma magnum. Involucri universale polyphyllum longissimum, partialis spicis breviora. Spicae longitudine digiti, ferrugineae, imbricatae ex spiculis teneris distichis. L.

86. *distans*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa supradecomposita, spicis alternis, filiformibus, Rosc. distantibus. Linn. suppl. 103. Jacq. ic. rar. 2. t. 269. Collect. 3. p. 189. Cyperus elatus. Rothb. gram. 37. t. 10. Hab. in insulis Coribacis. ¶

87. *diphyllus*, culm. subtriquetro diphyllis, umb. supradecomposita, spiculis teretiusculis subpinatis. Retz. obs. 5. p. 11. Hab. in Indiae orientalis rivulis.

88. *Papyrus*, culm. triquetro nudo, umb. involucri longiore, involucri triphyllis setucis longioribus, spiculis ternis. Syst. veg. 67. Rothb. gram. 39. Mich. gen. 44. t. 19. Papyrus. Bruce itin. 5. p. 1. t. 1. In fluviis Calabriae, Siciliae, Syriae, Aegypti. Involucri 8-phyllum umbella brevius:

Brevius: foliis exterioribus 4 latoribus. 4 pedes et ultra altum. In caldariis colitur. Spic. tenerae.

89. *flabelliformis*, culmo sulcato triquetro: involucri polyphylo, foliol. alternis, lanceol. longissim. pedunc. axillariibus umbellato-corymbiferis, spicul. 4-6 ovaris. Rottb. 42. t. 12. f. 2 In Arabia felici. Caul. crass. contortus. Fol. floral. pedalia.

90. *alternifolius*, culm. triquetro, fol. alternis, in summo culmi conferis, umb. axillariib. compositis, spic. linearibus, Willd. Sp. 1. p. 289. Jacq. Ic. rar. 2. t. 298. Coll. 2. p. 306. In insula Madagascar. Culmi nudi, apice fol. alteris conferis eaeiformibus gaudet. Pedicelli aliquot e basi spicae, apice fereutes spicam similem.

† 111. *Spica simplex*, squamis subdistiche imbricatis summis congestis; iafinis aristatis. *Stem.* 1. *Stigm.* 2. Sem muticum. (Richard.)

91. *caribaeus* caespite laxo, squamis binis infimis aristatis. Rich. Cyperus *monostachyos*. Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 271. excl. syn. Rottb. Sloan. jem. 1. p. 120. t. 72. f. 2. Hab. in pascuis aridis Amer.

92. *indicus* caespite stricto, squamis pluribus aristatis. Rich. Cyperus *monostachyus*. Rottb. gram. p. 18. t. 13. f. 3. Hab. in India orientali.

127. **DULICHIUM.** Spicae subracemose, ex axillis foliorum. Spiculae lineari-lanceolatae subcompressae: squamae subdistichae emplexanti-appressae. *Stylus* longissimus, bifidus. Germ. setulae retrorsum asperae. (Richard. Pleuranthus. Mst.)

1. *spathaceum*, culm. triquetro folioso, spiculis patulis, suberectis. Pleuranthus *floribundus*. Rich. Cyperus *spathaceus*, raccois axillariibus. Willd. Spec. pl. 1. p. 289. Schoenus *spathaceus*. L. Scirpus *spathaceus*. Michaux. Hab. in Virginia.

2. *canadense*, racemis simplicibus pedunculatis, spiculis paucis erectis subdecussatis. Richard. Michaux. Hab. in Canada.

123. **SCIRPUS.** Glumae paleaceae s. squamae undique imbricatae. Cor. o. Sem. 1, undum aut villis s. setulis brevioribus cinctum.

* *Monostachyi.*

1. *mutatus*, culmo triquetro nudo,

spica cylindrica terminali. Amoen. acad. 5. p. 392. Willd. Sp. pl. 1. p. 210. Hab. in Jamaica. Similimus S. geniculato, sed triquetus, molliusculus, nec articulatus. T

2. *spiralis*, culm. aggregatis subnudiis triquetris, spica cylindrica terminali, flos. cuneiformibus truncatis spiraliiter dispositis. Rottb. gram. p. 45. t. 75. f. 1. Hab. in India. T

3. *articulatus*, culm. fistuloso tereti nudiusculo subarticulato, capitulo glomerato laterali. Sp. plant. 70. Vahl. symbol. 1. p. 8. Rheed. mal. 19. p. 135. t. 71. In Malabarinae aquosis arenosis. Spicae laterales in capitulum semiverticillatum collectae. L.

4. *plantagineus*, culm. tereti ventricoso nudo, spica cylindrico-subulata terminali. Swartz. Flor. p. 123. Retz. obs. 5. p. 14. Rottb. gram. 45. t. 15. f. 2. Hab. in India et Jamaicae inundat. argillosis.

5. *nutans*, culmo compresso subtetragono nudo, spica ovata solitaria terminali nutante. Retz. obs. 4. p. 12. In uliginosis Malacca. T

6. *quadrangulus*, aphyllus, culm. tetraquetro nudo stricto, spica cylindrica, squamis rotundato-obtusis. Michaux. Flor. 1. p. 30. Hab. in Carolina.

7. *tuberculosis*, culmo nudo, spicis turgidis ovatis, semine tuberculo terminato. Mich. l. c. cum priore.

8. *capillaceus*, minutus, enlum. foliisque capillacis, spica oblongo-ovata acuta. Mich. l. c. Hab. in Nova Anglia. Aenus S. aciculari dicitur. Spic. squamae partae, oblongae, castaneae. M.

9. *palustris*, culm. tereti nudo, spica ovato-oblonga subtereti, glumis acutis, rad. repente. Flor. dan. t. 273. Leers. t. 3. f. 3. Hoffm. germ. ed. 2. p. 21. Smith. Flor. brit. p. 48. Hab. in fossis.

10. *multicaulis*, culm. tereti basi vaginata, spica ovata terminali: glum. obtusis aequalib. radice fibroso. Smith. Flor. brit. t. p. 48. Flor. dan. t. 167. Rel. Rudb. 28. f. 2. Rupp. Flor. Jen. ed. Hall. p. 319. Hab. in paludosis turfosis Angl. Daniae et Germaniae rarius. Spic. ferruginea ad basin saepius vivipara. Flor. Julio. S.

β ? *intermedius*, aphyllus, spica oblongo-ovata subacuta, bract. rotundatis, glumis obtusiusculis castaneis. Thuill. Flor. Paris. ed. 2. p. 21. Hab. in paludibus prope Raiucy non procul a Parisiis. Fl. Maio.

11. *reptans*, radice (stirpe) reptante, culm. caespitosis: plurius sterilib. recur-

vatis, spic. oblonga: squamis lanceolatis acutissimis. Thuillier. l. c. p. 22. Hab. ad ripas Sequanae.

12. *geniculatus*, culmo tereti nudo, spica oblonga terminali. Rothb. gram. p. 41. Sloan. jam. 37. hist. 1. p. 122. t. 75. f. 2. et t. 81. f. 3. Hab. in Jamaica.

13. *caespitosus*, aphyllus, culmo tereti sulcato rigido basi vaginato multiplicisquamato, spica terminali glumis exterioribus maximis. Smith. l. c. t. 2. p. 48 Roth. Catal. 2. p. 7. Hab. in ericetis turiosis, moorosis. Glum. inaequale ovali oblongae: majore spicam aequante Roth.

14. *Bacothryon*, aphyllus, culmo striato tereti, basi vaginato, squamis radicilib. subnullis, spica terminali, gluma exteriorib. longiore. S. *pauciflorus*. Smith. l. c. p. 52. Lightf. 1078. Lin. suppl. p. 103. S. *Halleri*. Villars delph. 2. p. 188. Hab. in palustrib. montosis. Stam. 3 longa, villosa. Hoffm. Glumae obtusiusculae membranaceae: altera majore spica brevior.

15. *turgidus*, caespitosus, culm. confertis nudis, spica turgide ovata: squamis ovalibus obtusis. Thuill. l. c. p. 22. Hab. in paludosis prope Meudon: etiam prope Argentoratun (Strasbourg) crescit. Spicae subrotundae fere.

16. *campestris*, culm. striato nudo, spica terminali calycem bilabem vix superante, glumis oblongis membranaceis obtusis subaequalibus. Roth. Catal. 1. p. 5. et V. 2. p. 2. Hoffm. germ. ed. 2. p. 22. Flor. dan. t. 167. Scheuchz. t. 7. f. 19. Hab. in ducatu Obdenburgensi et lo Franconiz. Culm. 2-5, setacei fol. longior. Styl. 3-fidus. Sem. triquet. $\overline{\text{f}}$

17. *capitatus*, culm. tereti nudo setiformi, spica subglobosa terminali, stylo trifido. Sp. pl. 70. *Scaribaeus*, culmis fasciculatis setaceis sulcatis triquetris, spica minima ovata terminali. Rothb. p. 46. t. 15. f. 3. In Virginia inque insulis Caribaeis. $\overline{\text{f}}$

18. *ovatus*, culm. subcompresso nudo filiformi, spica ovata terminali nuda, floribus diandris, stylo bifido. Rothb. Catal. 1. p. 5. Willd. Sp. 1. p. 104. Scirpus capitatus plur. auctorum. Moris. hist. 3. p. 211. f. 8. t. 10. f. 34. Hab. in Germaniae humidis. Setae 6. $\overline{\text{f}}$

19. *atropurpureus*, culm. setaceis teretibus fasciculatis, spicis terminalibus ovatis solitariis, flor. 1-andris. Retz. obs. 5. p. 14. Hab. in uliginosis Indiae.

20. *polytrichoides*, culm. compresso

setaceis, spicis terminalib. solitariis subnutantibus 1-andris. Retz. obs. 4. p. 11. Rumph. amb. 6. p. 17. t. 7. f. 1. Hab. in pascuis depressis subulis Zeylonae.

21. *acicularis*, culm. quadrangulo nudo setiformi, spica terminali ovata bivalvi, seminibus nudis. Lin. Flor. dan. t. 287. Moris. 2. 8. t. 10. f. 37. Hab. in humidis inundatis ericetis, etiam in Amer. $\overline{\text{f}}$

22. *Auitans*, culm. teretibus nudis alternis, caule folioso saeci lo. Sebeuch. t. 7. f. 20. Moris. hist. 3. p. 230. 2. 8. t. 10. f. 31. Pluk. alm. t. 35. f. 1. β . *stolonifer*, culmo canaliculato, basi folioso, spica terminali bivalvi subdiflora. Roth. in Usteri Neu. Bot. Annal. 4. p. 30. Hab. in udus. An styl. 3 fidus in β ?

23. *compressus*, culmo teretiusculo nudo, spica compressa ex spiculis pluribus ambistichis composita, involucri monophyllo. S. Garicis Retz. Willd. Sp. p. 292. Schoenus compressus L. Leert. 2. t. 1. f. 1. Hab. in pratis, et turiosis. Sem. basi setis cinctum.

** Culmo tereti *polystachyo*.

24. *fragrans*, culmo tereti striato nudo, spicis ovatis pedunculatis inaequalibus, terminalib. umbellatis. Flor. Peruv. 1. p. 47. Hab. in nemorum runcationib. Pillao. Rad. fascie. fibrosa odoratissima. Fol. setacea, pubescentia. Stigm. 3.

25. *glomeratus*, culm. nudo teretiusculo, umb. glomerata, involucri diphylo brevi, floribus diandris. Retz. obs. 4. p. 11. Hab. ad agrorum margines Zeylonae. $\overline{\text{f}}$

26. *arvensis* culmis compressis striatis, umb. simplicibus, involucri monophyllo brevi. Retz. obs. 4. p. 11. Hab. in Zeylonsa arvis.

27. *truncatus*, culm. tereti, capit. glomerato-globo, involucri diphylo, lobis linearibus. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. spci, cum 4 sequentibus.

28. *laciniatus*, culm. tereti, capit. triangulari, glumis ovatis, involucri diphylo. Thunb. prod. 17.

29. *membranaceus*, culm. tereti, capit. angulato, glumis ovatis membranaceis, involucri triphylo. Thunb. prod. 17.

30. *pilosus*, culm. compresso, capit. ovato, glumis lanceolatis ciliatis, involucri tetraphyllo. Thunb. prod. 18.

31. *Histrix*, culm. capillari, capit. subdistachyo, glumis acuminatis squarrosis,

involucro monophyllo. Thunb. prodr. 17. Hab. in Cap. b. spei.

32. *domingensis*, culm. tereti nudo altissimo, flor. corymbosis, pedicellis umbellatis simplicibusque, spic. teretiusculis, involucro corymbum aequante. Hab. in St. Domingo. Culm. 4-dripedalis et ultra, pro ratione tenuis. Fol. radicalia canaliculata laevissima, basi spadicea; spic. brunneae oblongae, squam. obtusis.

33. *lacustris*, culm. tereti elongato nudo, spicis ovatis sessilib. pedunculatisque terminalib. L. Willd. Sp. v. p. 26. Mich. Flor. Amer. t. p. 131. β . minor involucr. rigidioribus pungentib. Roth. germ. p. 57. Flor. dan. t. 454. Hab. in Europa, Canada et Barbaria, aquis stagnantib. Caul. sursum attenuatus, 2-3 pedalis.

34. *Holoschoenus*, culm. elongato tereti nudo, spicis subglobosis pluribus glomeratis pedunc. sessilibusque, involucr. diphyll. inaequali mucronato Pluk. Phyt. t. 40. f. 4. Roth. Beiträge p. 86. Scheuch. t. 8. f. 2, 3, 4 et 5. Hab. in Europa australi, et in paludib. Algeriae.

35. *australis*, culm. tereti nudo, capit. laterali sessili, bractea reflexa, fol. canaliculatis. Syst. Veg. 85. Pluk. Phyt. t. 40. f. 5. Obs. cl. Roth. l. c. et Smith Flor. brit. v. p. 53. hunc et sequentem pro varietate prioris habent. Culmi laevres, vix pedales.

36. *romanus*, culm. tereti nudo, capitulo laterali sessili conglobato, bractea reflexa. Jacq. aust. 5. p. 21. t. 448. Scheuch. gram. 373. t. 8. f. 6. Hab. in Galloprovincia, Sibiria et Romae. Obs. Huic culmi filii crassitie; Sc. holoschoeni vero crassi ut in S. lacustri et apice pungentes. Lin.

37. *nodosus*, culmo compresso nullo, capitulo glomerato mucronato. Roth. gram. 52. t. 8. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei.

38. *radiatus*, culm. tereti, capitulo hemisphaerico, involucr. polyphyllo. Thunb. prodr. 18. Schoenus radiatus. Lin. suppl. 101. Hab. ad Cap. b. spei. Culmus aphyllus palmatis striatus. Folia linearia canaliculata. Semina absque pappo.

39. *setaceus*, culm. nudo folisque setaceis, spic. laterali. subgeminis sessilibus. Flor. dan. t. 317. Leers herborn. n. 35. t. 1. f. 6. Hab. in uliginosis. Plant. tenera, minuta. Spicul. non terminal. uti vult Linnaeus, sed sub apice culmi laterales. Sem. nuda.

40. *supinus*, culm. tereti nudo, spicis sessilibus in medio culmo glomeratis. Dalib.

paris. 16. Roth. germ. II. p. 53. fol. rotundoterebibus. Tournef. inst. 528. Hab. in Gallia et in Marchia.

41. *natans*, culm. compresso foliose flexuoso-erecto, spic. 2-lateralibus. Thunb. prodr. 17. Hab. in aquis Cap. b. spei.

42. *vaginatus*, culm. filiformi, capit. lateralibus aeternis involucro brevioribus. Thunb. prodr. 17. Hab. ad Cap. b. spei.

43. *tristachyos*, culmo capillari capit. tristachio laterali, glumis integris, involucro diphylo. Thunb. prodr. 17. Lin. suppl. 101. Roth. 48. t. 13. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. An involucr. potius 1-phyllum?

44. *uncinatus*, pilosus, culm. tereti folioso, spicis in capitulum conglomeratis terminalibus axillaribusque. Willd. Sp. p. 300. Pluk. 178. t. 190. f. 7. Hab. in India. Culm. biuncialis. Squamae mucronatae uncinatae elevato-nervosae. W.

45. *aristatus*, culm. striato tereti folioso, panic. terminali diphylla, spicul. ovatis squarrosae-echinatis. Willd. l. c. Scripus pilosus. Retz. obs. 6. p. 19. Hab. in India.

46. *autumnalis*, culm. ancipiti nudo, umb. decomposita, spiculis ovatis. Mant. 180. Hab. in Virginia et Jamaica. Culmi palmares, compressi, altero latere subratinati. Facies Junci pilosi.

47. *diphyllus*, culm. semicylindricus striatis diphyllis, umb. composita involucro diphylo longiore. Retz. obs. 5. p. 15. Hab. in Tranquebaria.

48. *fastigiatus*, culm. filiformi, capitulo convexo compresso, glumis eximie mucronatis, involucro nullo. Thunb. prodr. 18. Hab. in Cap. b. spei.

49. *globulosus*, culm. compresso nudo, panic. terminali, spicula unica sessili, pedunculatis pluribus globosis Retz. p. 19. obs. 6. Hab. in India.

50. *globiferus*, culm. nudo tereti, umb. terminali composita, capitulis globosis, ex spiculis pluribus arcte congestis. Lin. suppl. 104. Hab. in Tenariffa. Culm. aphyllus, terminatus spatha. Pedunc. terminati globulis ex spicis brevissimis congestis. Hi circa basin emittunt novos radios globiferos, iterum similiter dividendos, unde inflorescentia ex umb. basi proliferis constat. Lin.

51. *capillaris*, culm. nudo folisque capillaribus, spicis pedunculatis ternis, intermediis sessili. Mant. 321. Burm. Zool. 108. t. 47. f. 2. Folioli. setaceum sub umb. spicis longius.

*** *Culmo triquetro, panicula nuda.*

53. *trispicatus*, culm. angulato nudo, spicis ternis sessilibus nudis. Lin. suppl. 103. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. h. sp. Folia vix ulla, nisi squamae ferruginae radicales. Involucrum polyphyllum, foliis subulatis brevissimis.

53. *lateralis*, culm. triquetro nudis, spicis subternis lateralibus, involucrio monophyllo brevi. Retz. obs. 4. p. 12. et 5. p. 16. Hab. in Zeylona.

54. *triqueter*, culm. triquetro nudo, spicis lateralib. subsessilibus pedunculatisque, mucronem rectum aequantibus. Lin. Mant. 29. Willd. Sp. p. 302.

Q. S. *trigonus*, culm. trigono nudo, spicis lateralib. ovatis fasciculatis sessilib. pedunculatisque, mucrone erecto. Roth. Beyträge z. P. 60. S. *triqueter* Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 302. Hab. in Europa australi ad paludes. Gluma calycina corollas aequans. Ro h.

β. S. *triqueter* (triangularis), culm. triquetro nudo, spicis lateralib. sessilib. ovali-acuminatis, mucrone erecto Roth. l. c. p. 60. S. *mucronatus*. Roth. Flor. germ. Pollich. Cress. cum priore. Spicae duplo acutiores quam praecedentis. Gluma corollis duplo fere major. Roth.

55. *mucronatus* (*tricarinatus*), culm. triangulo acuminato, spic. lateralib. ovatis sessilib. mucrone horizontali. Roth. l. c. Willd. Sp. l. c. Hab. varius in stagnis. Omnib. in paribus crassior a antecedentibus. Caul. mollis, semen nigrum. Michx. gen. p. 47.

56. *americanus*, culm. acute triquetro nudo, spiculis sessilibus conglomeratis, oblongo-ovatis mucrone brevioribus. S. *triqueter*. Michaux Flora 1. p. 30. Hab. in Carolina inferiore. Ab Europaeo diversus videtur. Spiculae majores.

57. *dichotomus*, culm. triquetro nudo, umbella decomposita, spicis ovatis, dichotomis sessilib. L. Flor. 1751. 40. Roth. Pluk. alm. 170. t. 119. f. 3. Hab. in India, Arabia et Aegypto.

58. *annuus*, culmo triquetro nudo multifloro, involucrio diphylo, umbel. simplici spicis solitariis peduncul. intermedia sessilib. Allion. Pedem. 2. p. 277. t. 88. f. 5. Desfont. Atl. 1. p. 51. Hab. in Helvetia, Podemontano et Barbariac agris. Culm. plures ex una radice. Spic. ovato-acuminatae, unica in centro umb. sedet. A.

59. *echinatus*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spicis ovatis. Fl. zeyl. 38.

Pluk. alm. 179. t. 51. f. 4. Hab. in India utraque.

60. *retrofractus*, culm. triquetro, umb. simplici, spicarum fasciculis retrofractis. Sp. pl. Pluk. phyt. 415. f. 4. In Virginia. T.

61. *ferrugineus*, culm. triquetro subnudo, involucris longitudine paniculae ciliatis. Willd. Sp. 1. p. 304. Schoenus polymorphus. Roth. gram. 67. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 36. t. 77. f. 2. Hab. in Jamaicae paludibus et in siccis. T.

62. *pubescens*, fol. radical. angustis, umbel. terminali sparsa spicul. crassiusculis ovatis, squamis subpubescentib. ovalibus. Michx. Flora. p. 31. Hab. in Carolina et Georgia.

63. *castaneus*, fol. radicalib. angustis, erectis, culmo subtereti aristato, umbel. terminali bracteis involucriata, spicul. subrotundo-ovatis, squamis suborbiculatis. Michaux. l. c. Squamae nitentes, badiae. Hab. in Florida.

64. *Michauxii*, fol. radical. planis, culm. nudo subarcepti, umb. composita laxa, spicul. oblongo-ovatis: squamis lanceolatis, carina prominente discoloris in mucronem desinente. S. mucronulatus. Michx. p. 32. Hab. in Carolina montib. Sem. nudum. Styl. trifidus.

65. *spadicus*, culm. semitereti nudo retrorsum scabro, umbel. composita, spic. oblongis dichotomis sessilib. involucri brevibus. Vahl. Eclor. Lin. Willd. Sp. 1. p. 305. Hab. in America meridionali, Jamaicae fluvii.

66. *miliaceus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, spicis subglobosis parvis intermediis sessilib. involucrio setaceo. Sp. pl. 5. Retz. obs. 5. p. 16. Roth. p. 57. t. 5. f. 2. Hab. in India Pedunc. dichotomi. Culm. tenuis. Spicae pedunculatae, at solitariae sessiles in ramificationibus umbellae, minutissimae ut semina Milii. Lin.

* *Bengalensis*, culm. tenui nudo, umb. supradecomposita, involucrio tetraphyllo, spicul. intermediis sessilib. ovatis (minutis): squamis concavo-carinatis mucronatis. Communicatus a cl. Richard, qui cum ex Bengalica accepit. An diversa species?

67. *maritimus* (*riparius*), culm. triquetro, paucis. conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia subulata, involucrio polyphylo Hab. in lacub. et fossis. 2-3 pedalis.

β. *macrostachyus*, culm. acute triquetro folioso, bracteis plurib. longissimis,

spic. sessilib. pedunculatisque crassis ovatis squamis subaristatis. Michaux Flora. p. 32. Hab. in Carol. paludib. salis.

68. *compactus*, minor, spiculis omnibus sessilib. squamis trifidis, involuero diphylo. Kroecker Flor. Siles. t. 15. Flor. dan. t. 937. Hab. in uliginosis subaristatis. Tam ob locum, quam parvitatem ab antecedente diversus.

69. *grossus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, spicis petiolatis, involuero triphylo lanceolato-subulato longissimo. Lin. Suppl. 104. Hab. in India. Culmus crystallis. Involucrum foliol. unico longissimo. Simillimus S. miliaceo, sed magnitudine diversus. L.

70. *Luzulae*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa prolifera, spiculis subrotundis. Lin. Pluk. mant. 97. t. 437. f. 3. Hab. in India. Involucrum universale polyphyllum 1 fol. casiformib. umb. longioribus; partialia vix ulla. Capit. subrotunda, glomerata ex spiculis subrotundis.

71. *syriacus*, culm. triquetro folioso, umb. foliacea, pedunc. nudis supradecompositis dichotomis, spicis confertis. Flor. dan. t. 307. Leers t. 5. f. 4. Michaux, Flor. t. p. 33. *β. radicans*, culm. triquetro folioso, umb. foliacea, culmis scirpiformibus apice radicanlibus. Schkuhr, Hoffm. germ. p. 26. Hab. in sylvarum foris. G.

72. *aestivalis*, culm. depressis triquetris nullis, umb. compositis involucribus, flor. monandris. Retz. obs. 4. p. 12. Hab. in fundo flaviorum exsiccatorum Zeylone. G.

73. *squarrosus*, culm. triquetro nudo folisque setaceis, spicis ternis semilibus ovatis squarrosis. Mant. 181. Rottb. p. 49. t. 17. f. 5. Hab. in Ind. orientali. Involuer. diphyllum; spicae squam. subulatis; cuneatis, basi nodosis, valde imbricatis.

74. *dipsaceus*, culm. setaceis triquetris, umb. simplicib. capitulis oblongis squarrosis, flosc. subulatis recurvis diandris, germine echinato. Rottb. gram. 56. t. 32. f. 1. t. Hab. in India. Parvus. Involuer. 3-4 phyllum.

75. *junciformis*, culm. nudo filiformi subtrigono, paniculae spiculis sessilibus pedunculatisque, involuero diphylo. Retz. obs. 6. p. 19. Hab. in China.

76. *melchianus*, culm. triquetro, capitulo globoso, involuer. polyphylo longo. Lin. Bot. Annal. 3. p. 20. t. 2. Desf. atl. 1. p. 51. Till. pis. 51. t. 25. f. 5. Buxb. cent. 1. p. 34. t. 55. f. t. Hab. in Europa Aegypto et in Marocco.

77. *ciliaris*, culm. triquetro folioso, umb. sparsis, squamis calycinis aristis ciliatis. Mant. 182. Rottb. t. 17. f. 1. S. *pubescens*. Desf. Atlant. 3. p. 52. Schousboe Maroc. cul. germ. p. 19. Hab. in India orientali et in Barbacia. Culmi palmares laxi. Spicae ovatae, hirtae pilis raris. Involueri loco nepe foliola 1. scu 2. parva.

***** Culmo triquetro, Capitulo terminati.

78. *kottentottus*, culm. triquetro folioso, capitulo globoso, squam. lanceolatis hirtis. Lin. Mant. 182. Thunb. prod. 18. Ad Cap. b. spci locis paludosis. Folia caulina, 3, remotissima. Involuerum capituli triphyllum.

79. *antarcticus*, culm. triquetro nudo folisque filiformib. capitulo globoso, involuer. 1-phylo. Mant. 181. Thunb. prod. 17. Scirpus barbatus, vaginis suboppositis ora superiori barbatis. Rottb. gram. 52. t. 17. f. 4? Pluk. alm. 179. t. 299. f. 3. Hab. ad Cap. b. spci et in Guinca. Spicae ovatae, trifariam imbricatae triquetrae.

80. *argenteus*, culm. setaceis triquetris, involuer. tetraphyllo longissimo, spic. cylindricis plurimis in capitulum glomeratis. Rottb. p. 51. t. 17. f. 6. Rheed. mal. 12. p. 108. Hab. in India.

* 81. *monander*, culm. triquetro, involuer. triphylo longo, capitulo sessili glomerato, flosc. monandris. Rottb. p. 50. t. 14. f. 3. Hab. in India. Spic. ovato-teretia.

82. *cephalotes*, culm. triquetro nudo, capitulo ovato squarroso, involuer. triphylo longo. Lin. Willd. Sp. 1. p. 311. Houttuyt t. 88. f. 3. Hab. in India.

124. TRICHOPHORUM. Spicul. subovatis, squamis undique imbricatis. Sem. setulae capilliformes (nec lanam densam referentes) denum longe exsertae numero definito sex. (Genus intermedium inter Scirpum et Eriophorum.)

1. *cyperinum*, culmo triquetro folioso, panicula decomposita, spiculis confertis ovatis. Scirpus Eriophorum. Michaux Flor. 1. p. 33. Eriophorum cyperinum Lin. Willd. Spec. 1. p. 313. Hab. in Amer. boreali. Gram. altum.

2? *lineatum*, culm. folioso paniculato, spicul. ovato-oblongis; squamis lanceolatis subaristatis. Scirp. lineatus. Michaux. 1. c. Hab. in Carolina. Priori sub-simile.

3. *alpinum*, parvum, culm. nudo angulato spicato. Erioph. alpinum. Lin. Flor. dan. t. 620. Sowerb. engl. bot. t. 311. Hab. in Europae subalpinis.

β *hudsonianum*, majus, culm. nudo triquetro, fol. canaliculato - setaceis. Michaux. p. 34. Hab. ad sinum Hudsonis.

125. ERIOPHORUM. Glumæ paleaceæ undique imbricatæ. Sem. lana densa longissima cinctum.

* *Monostachya*.

1. *vaginatum*, culmis vaginatis teretibus, foliis triquetro - canaliculatis, spica ovata. Roth. N. Bot. Beyträge, t. p. 65. Willd. Spec. t. p. 312. Flor. dan. t. 236. Hab. in montosis uliginosis. Glum. acuminatæ.

2. *Scheuchzeri*, culm. basi vaginatis teretibus, fol. teretibus - canaliculatis, spica rotunda. Roth. l. c. Scheuchz. Agrost. app. t. 7. E. capitatum. Hoffm. Flor. germ. c. l. 2. p. 26. Hab. in alpinis, rhaeticis et Solisburg. Glum. obtusæ.

** *Polystachia*, culm. foliosis teretibus.

3. *virginicum*, fol. angustis planis, spicis pluribus sessilibus. Willd. l. c. p. 311. Roth. l. c. p. 66. Hab. a Canada ad Carolinam. Flor. dioandri. Læva fulvescens. Mich.

4. *vulgare*, (polystachyum L.) fol. planis mucrone triquetro, spicis pedunculatis nutantibus involucri subaequantibus. Leers herb. t. 1. f. 5. Engl. bot. t. 561. Cresc. in paludosis. Involucr. basi membranaceo-dilatatum, 2-3-phyllum.

5. *angustifolium*, fol. canaliculato-triquetris, spicis pedunculatis, seminibus. Roth. l. c. p. 64. E. polystachyon Huds. Curt. Flor. lond. t. 9. Involucr. 3-phyll. foliol. linearia: unico spicis multo longiore. Cum priore; etiam in America crescit.

6. *gracile*, fol. triquetris sursum canaliculatis, spicis pedunculatis, sem. linearibus, involucri panicula uplo brevior. Roth. p. 65. Ejusd. Cat. 2. append. E. triquetrum. Hoppe. Hab. in Palatinatu et alpinis salisburgensibus.

126. VAGINARIA. Spica ovata squamis undique imbricatis. Stigm. 3. Seminibus involucrium (Perispermium) alternatim tripaleaceum et trisetum.

γ. *Richardi*, Fuirena scirpoides, culmo aphylo vaginato, spica unica:

squamis lanceolato-spathulatis. Michaux, Flor. p. 38. Hab. in Florida. Obs. Characteres hujus sequentiumque, ab eo constitutorum generum, concinnavit celeb. Richard.

127. FUIRENA. Squamæ mucronatæ in spiculis undique imbricatæ. Sem. involucrium latum, paleaceforme. sæpius aristatum.

1. *umbellata*, umbellis compositis, spicis oblongis aggregatis sessilibus, fol. lanceolatis. Vahl. Eclog. Amer. 2. Roth. gram. p. 70. t. 19. f. 3. F. paniculata. Lin. suppl. p. 105. Hab. in utraque India.

2. *obtusiflora*, umb. subcompositis, spic. cylindricis utrinque obtusis squarrosis. Vahl. l. c. In Amer. meridionali. Fol. glabra? An a sequente diversa?

3. *squarrosa*, fol. ciliatis, spic. squarrosis, squamis petiolato-spathulatis. Michaux. Flor. t. p. 37-38. Hab. in Georgia et Carolinae paludosis. Squamæ mucrones longi strigososquarrosi.

4. *canescens*, subtomentoso-canescens; spicul. glomeratis, squamis mucrone erecto. Richard. Hab. in Africa.

128. HYLOXYTRUM. Spicula squamis undique imbricatis. Sem. involucrium glumam 2-4-valvem mentiens. Stam. 2-3. Stigm. 1-2.

1. *latifolium*, maximum glabrum, fol. latis trinerviis, corymbo decomposito. Hab. in India. Stam. 2. Rich.

2. *senegalense*, spicul. pluribus capitatum congestis, squamis subacuminatis. Hab. in Senegal. Stam. 2. Stigm. 3. Rich.

3. *gracile*, fol. angustis, caule debili, spicul. 3. sessilibus subglobozo-ovatis, squamis spathulatis. Richard. Stam. 2. Stigm. 2.

129. DIPLASIA. Spica squamis undique imbricatis. Involucrium glumam 4-valvem mentiens. Stam. 7. Stigm. 2.

1. *Karatæfolia*, fol. longissimis carina margineque aculeatis, umb. decomposita. Io Gujana. Fol. Bromeliæ Karatæ. Richard.

130. LEPIRONIA. Spicul. squamis orbiculatis cartilagineis. Sem. involucrium 16-paleaceum. Stam. 4-6.

1. *mucronata*. Hab. in Madagascar.

Aphylla. Culm. nodosus infra apicem 1-stachyus. Spica ovato-oblonga. Rich.

2-valvis, 2-florus. Cor. 2-valvis, mutica. Styl. 2-fidus.

131. *CHRYSITRIX*. Spica imbricata squamis coriaceis setaceis. Stam. multa, inter singulas squamas singula.

1. *capensis*, Lin. fl. gen. gram. p. 27. f. 1. 2. Hab. ad. Cap. b. spei. Spica lateralis. An antecedens hujus generis?

** GRAMINA. Flor. glutacei, 3-andri.

Rad. fibrosa. *Culmi* ut plurimum fistulosi, articulati, simplices aut basi ramosi. *Fol.* linearia, vaginantis, vagina latere fissili, apice membrana albida distincta, quae *ligula* aut stipula nuncupatur. *Flor.* spicati, racemosi, plerumque paniculati, varissime foliis involucri (ut in priore familia); nonnulli saepius abortivi; alii polygami; pauci monoici. *Stam.* in plurimis tria (qualia gramina hac in serie solummodo enumerantur), in nonnullis sex (vid. *Glas. Hexandriam*), aut plura. *Styl.* communiter duo, in quibusdam 1. plerumque tamen bifidus. In unico tantummodo gramine signata tria observata sunt. Glumae interiores in multis semen maturum incrustant et cum eo indurantur.

MONOGYNIA.

132. *LYGEUM*. Flores intra spatham convolutam gemini. *Cal.* basi in tubum 2-locularem villosum conerescens, 2-valvis.

1. *Spartum*. Lin. Willd. Sp. 1. p. 316. Richard in Act. Soc. Hist. nat. Paris. p. 28. t. 3. Hab. in Hispania. T. Flor omnium graminum maximis, interdum 3 intra involucrium. Styl. longus.

133. *CORNUCOPIÆ*. *Involuer.* cyathiforme. *Cal.* 1-phyllus, 2-partitus. Cor. 1-valvis, superne hinc fissi. Styl. brevis; Stigm. 2. (raro 1.) longissima. (Richard.)

1. *cucullatum*, spica mutica, involucrio arenato. Lin. Smith spicil. bot. t. 14. Willd. l. c. p. 329. Hab. in Oriente. ©

2. *alopeuroides*, spica aristata. Lin. Mant. p. 29. Hab. in Italia. Similis *Alopec. pratensis*, vagina supremi fol. ventricosa. *Involuer.* hemisphaericum integerrimum. Lin.

134. *CENCHRUS*. *Involuer.* laciniatum, echinatum 3-4-florum. *Cal.*

1. *tappaceus*, paniculae patentis ramis simplicissimis, cor. retrorsum hispidis, cal. trivalvibus bifloris Lin. Willd. Spec. 1. p. 315. Hab. in India. Fol. cordato-lanceolata. Involucro o? Hujus generis non videtur. An *Panicum*?

2. *capitatus*, spica ovata simplici. Col. eccl. b. 1. p. 330 t. 338. f. 1. Barr. rar. t. 28. f. 1. *Echinaria capitata*. Desf. atl. 2. p. 385. Hab. in Gallia, Italia et Barbaria. ©

3. *echinatus*, spica oblonga conglomerata, involucrio subgloboso 10-partito. Schreb. gram. 9. t. 23. f. 1. Cav. ic. 5. p. 39. t. 462. Pluk. alm. 177. t. 92. f. 3. Hab. in America et Barbar. arvis.

4. *tribuloides*, spica glomerata, glumis femineis globosis muricato-spinosis hirsutis. L. Michaux Fl. 1. p. 61. Sloan. jam. 30. hist. 1. p. 108. t. 65. f. 1. Moris. hist. 3. p. 135. s. 8. t. 5. f. 4. Hab. in Virginia maritimis. ©

5. *caliculatus*, culmo simplici erecto, spica glomerata, involucrio polyphylo setaceo. Cav. l. c. t. 463. Hab. in Anicor. insula Bahao. Fl. aestate. *Involuc.* foliola subduo-decim setulis rigulis, tomentosa, apice glabra. C.

6. *spinifex*, culmo ramoso, fol. brevibus cordato-lanceolatis, involucrio integerrimo echinato. Cav. ic. 5. p. 38. t. 461. Hab. in regno chilensi, et in Montevideo. Flor. januario.

7. *rufescens*, fol. clabris, spica elongata, involucrio confertis setiformibus (rufescentib.) inferne villosis, cal. sub-2-floro. Desf. atl. 2. p. 388. Hab. in arciosis prop. Mascar.

8. *hordeiformis*, fol. retrorsum asperis, involucrio setosis flore 4-plo longioribus, inferne (albis) villosis, cal. 1-2-floro. Desf. l. c. (*C. asperifolius*). Willd. sp. p. 318. *Alopecurus hordeiformis*. Lin. Hab. in Asia et Africa.

9. *geniculatus*, racemo spicato simplici, flor. involucrio polyphylo scabro, culmo geniculato. Thunb. prod. 24. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *purpurascens*, racemo spicato simplici, floculis circumvallatis arsis longissimis, culmo erecto. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 329. Willd. l. c. In Japonia. Arist. purpureae.

11. *frutescens*, capit. lateralibus sessilibus, fol. mucronatis, caule fruticoso.

Lin. Alpin. exot. t. 104. Hab. in Armenia. η

135. PENNISETUM, *Involucr.* multisetum. *Cal.* 2-valvis, 2-floris: flut. altero hermaphrodito; altero masculo (rarius neutro) utroque sessili. (Flor. spicati polygami. In plerisque speciebus involucr. heterochaeton, setisque nonnullis inferne plumosis.)

1. *typhoideum*, fol. latis glabris, spica crassa cylindrica, involucri pedicellatis pennatis. *Holcus spicatus* L. Pluk. alm. t. 3a. f. 4. Hab. in India. Styl. villosus. \odot

2. *setosum*, fol. basi villosis, spic. subsessili imbricata, involucri sessilibus: setis nonnullis longissimis, stylo bifido. *Cenchrus setosus* Swartz. Flor. Ind. occid. 1. p. 211. secundum quem *Panicum polystachium* L. eadem species est. Hab. in Ind. occid. solo erecto.

3. *cenchrus*, culm. geniculato, involucri alternis dupla flor. longitudine: setarum una subulato-pilacea longiore. *Cenchr. ciliaris* L. Gisecke ic. t. 23. Desf. atl. 2. p. 387. Hab. ad Cap. bon. sp. et Barbariae arenosis. Fol. villosa. \odot

4. *orientale*, fol. subsetaceo-subulatis, involucri sparsa stipitata: setis parvis flore longioribus plumosis. *Cenchrus orientalis* Willd. (ined.) Hab. in Oriente.

5. *violaceum*, caul. ramoso, fol. vaginisque pilosis, spic. cylindrica, involucri sessilibus flor. sequantibus simplicibus. *Panicum violaceum* Lam. ill. gen. 1. p. 369. Hab. in Senegal.

Obs. Characterem hujus generis, nec non specierum differentias communicavit clar. Richard. Ob affinitatem cum *P. setoso* forte hac quoque referendus *Alopecurus indicus* L.

136. SESLERIA. *Cal.* 2-5 floris. *Cor.* 2-valvis, apice dentata. *Stigm.* subglandulosa. (Flor. spicati, saepius caerulei basi involucriati.)

1. *caerulea* (*calcaria*), spica ovato-oblonga, fol. planis, involucri integro. *Cynosurus caeruleus* L. Willd. Sp. 1. p. 414. Arduin. spec. 2. p. 18. t. 6. Hab. praesertim in montosis calcareis, et in pascuis.

2. *sphaerocephala*, spica globota (albida), involucri ovatis subdentatis, cor. acuminatis. Hoffm. germ. ed. 2. p. 49.

sub *Cynosuro*, Hab. in Germaniae subalpina. Carinth. Tyrol.

3. *microcephala*, involucri subdentato, cor. aristatis, spicis subrotundis. Hoffm. l. c. Cynos. sphaerocephalus. Willd. ap. Jacq. Misc. 2. p. 71. Hab. cum priore.

4. *disticha*, involucri nullo, spica disticha. *Poa disticha* Wulf. Jacq. ic. v. 1. t. 19. Fol. setacea. In Carinthia, etiam in Pyrenaeis crescit.

137. LIMNETIS. *Spica* lateriflora: flexculis subbifariam imbricatis. *Cal.* 2-valvis: valv. 1. minore. *Cor.* 2-valvis, mutica, compressa, carinata. *Styl.* longus. Nect. 0. (Flor. paniculati, stricti.)

1. *pungens*, fol. convolutis pungentibus, spicis paucis appressis pubescentibus, cal. carinis inermibus. *Dactylis stricta* Smith. Flor. Brit. Engl. bot. t. 380? *Spartina stricta* Roth N. Beyträge p. 101. Hab. in Gallia et Anglia, ad littora maris.

2. *juncea*, fol. distichis breviusculis setaceo-convolutis, spicis paucis remotis paucis, cal. acuminatis carinis asperis. *Trachynotia juncea* Michaux. Flor. 1. p. 64. Hab. in siccis maritimis Carolinae Georgiae.

3. *cynosuroides*, subglauca, fol. longissimis, spic. plurimis alternis secundis, cal. subaristato-acuminato: carinis aculeatis. *Dact. cynosuroides* Lin. Hab. in Amer. boreali.

4. *polystachia*, fol. latis, spicis pluribus undique versis longis linearibus: carinis aculeatis. *Trachynotia* Michaux l. c. Hab. in inundatis maritimis Nov. Angliae.

Obs. Horum graminum ad oras maris crescentium, unde nomen inditum, differentias observationibus cl. Richardi debeo.

138. NARDUS. *Cal.* 1-floris, 1-valvis. *Cor.* 1-valvis, inclusa. *Stigm.* 1. (Spica flor. alternis sessilibus.)

1. *stricta*, spica setacea recta, flor. secundis. Flor. dan. t. 1022. Willd. spec. 1. p. 314. Schreb. aram. t. 7. Lectr. t. 1. f. 7. Hab. in arenosis et collibus aridis. Var. magnitudine. \mathcal{E}

2. *aristata*, spica setacea, calic. aristatis, (Lin.) corollis binis inaequaliter pedunculatis aristatis, squamula suffultis. Vill. delph. 2. p. 58. t. 2. Boeck. mus. 2. p. 74.

.57. *Hab.* in Europa australi. Spica subente tenuissime pilosa.

3. *ciliaris*, spica incurva ciliata. *Hab.* in India. Folia graminea plana. Spica dimidiata. *Lin.*

139. **ORYZOPSIS.** *Cal.* 1-florus, 2-valvis, laxus, obovalis. *Cor.* coriacea, subtereti-ovata, 2-valvis: valv. exteriori apice aristata. *Nect.* 2-paleaceum lineare. (*Richard.*)

1. *asperifolia*, culm. subnudo, fol. subpungentibus asperis. *Michaux Flor.* 1. p. 51. t. 9. *Hab.* per tractus montium a Sinu Hudsonis ad Quebec.

D I G Y N I A.

140. **MATRELLA.** *Cal.* o. *Cor.* cartilaginea s. indurata, compressa, mutica; 2-valvis: valv. demum connatae?

1. *juncea.* *Agrostis Matrella.* *Lin.* *Willd.* sp. pl. 1. p. 36; ? *A. juncea.* *Lam.* ill. gen. t. 41. f. 2. *Hab.* in Malabaricae maritimis. Flor. subnantes, 10-12 in rachi alternatim sessiles. Fol. disticha, pungentia.

141. **MUHLENBERGIA.** *Cal.* minutissimus, 1-2-valvis. *Cor.* 2-valvis, basi pilosa: valv. exteriori apice aristata. (*Flor. paniculati.*)

1. *diffusa*, culmo debili ramoso foliisque glabris; panicula coarctata, cal. 1-valvi. *Richard.* *Roth.* N. bot. Beyträge 1. p. 66. *Dilepyrum minutiflorum* *Michaux.* *Flor. amer. bor.* 1. p. 40. *Hab.* in apricis et pratis region. Kentucky in Amer. bor.

2. *aristata*, culmo firmo subsimplici foliisque pubescentibus, panicula laxa, cal. 2-valvi, arista longissima. *Richard.* *Michaux l. c. M. erecta*, culmo erecto, fol. lanceolatis; ligula oblonga barbata, panic. laxa. *Roth.* l. c. p. 97. *Hab.* in umbrosis Georgiae et Carolinae. *T.*

142. **TRICHODIUM.** *Cal.* 2-valvis; valvul. subaequalibus acutis: carina spinulosa. *Cor.* brevior, 1-valvis mutica. *Stigm.* subsessilia hispida. (*Flor. paniculati.*) *Richard.*

1. *laxiflorum*, culm. erectis, fol. angustis breviusculis: vagina subaspera. *Michaux Flor. amer. bor.* 1. p. 40. *Hab.* in pratis sinu Hudsonis.

ebanx Flor. amer. bor. 1. p. 43. t. 8. *Cornucopiae hyemalis*, *Walter.* *Hab.* in humilis et pratis sinu Hudsonis. *♂.*

2. *decumbens*, culm. decumbentib. fol. patulis: vagina laevi. *Michaux l. c. C. perennans.* *Walt.* *Agrostis anomala* *Willd.* *Sp.* 1. p. 370. *Hab.* in Virginiae maritimis, ad ripas. *♂.*

143. **LEERSIA.** *Cal.* o. *Cor.* 2-valvis, clausa: valvul. compresso-navicularibus, muticis.

1. *Oryzoides*, panicula effusa, spiculis triandris patulis, glumis oblongo-ovalibus, carina ciliatis. *Willd.* *Sp.* 1. p. 125. *Swartz prod.* 21. *Michaux.* p. 39. *Phalaris oryzoides.* *Lin.* *Schreb. gram.* 6. t. 22. B. L. virginica. *Willd. l. c.* *Hab.* in paludosis et ad margines fluvior. passim; etiam in America. *Gram. asperum.*

2. *lenticularis*, panic. ramis subsolitariis, spicul. imbricatis, glumis orbiculatis ciliatis majusculis. *Michaux s. p.* 39. *Hab.* in paludosis Illinoisib. in Amer. boreali.

3. *monandra*, panicula effusa, spicis remotis laxis, spiculis secundis subrotundis monandris, glumis laevibus. *Swartz prod.* 21. *cf. Fl.* p. 130. *Hab.* in Jamaicae nemorib. cretaceis. *Vere.*

4. *hexandra*, panic. effusa, spiculis alternis hexandris, glumis sublaevibus. *Swartz prod.* 21. *Stigm.* pallide purpurea. *Hab.* in Jamaicae aquis.

144. **ZOYDIA.** *Cal.* 1-valvis, carinatus. *Cor.* 1-valvis, membranacea.

1. *pungens.* *Willd.* in *Nov. Act. Nat. cur. Berol.* v. 3. *Hab.* in Malabaricae maritimis. *Nardum* refert.

145. **MILIUM.** *Cal.* 2-valvis, 1-florus, ventricosus. *Cor.* 2-valvis, brevissima. *Stigm.* panicillata, S. villosa.

1. *nigricans*, flor. paniculatis confertis, valvulis calycinis nitidis nigrescentibus, fol. ensiformibus longissimis. *Flor. per.* 1. p. 47. *Colitur* in Pillao, Cuchero ubi Maiz de Guinea audit. E seminib. torrefactis Peruviani farinam preparant, ex qua potum et cibum conficiunt.

2. *capensis*, panic. capillari, calyceib. acuminatis, cor. ariua terminali incurva. *Lin. mant.* p. 185. *Willd.* *Sp.* 1. p. 358.

Hab. ad Cap. L. spei Cul. palmares. Fol. angusta subius pilosa.

3. *punctatum*, panic. ramis simplicissimis, flor. alteenis geminis secundis. Amoen. acad. 5. p. 392. Hab. in Jamaicae graminosis, udis.

4. *lentigerum*, panicula subspicata, flor. aristatis. Schreb. gram. 15. t. 23. f. 3. Vahl. symbol. 2. p. 18. Agrostis australis. Lin. Mant. 30. Gouan. hort. 39. t. 1. f. 2. Alopecurus ventricosus. Huds. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 6. Hab. Monspelii, in Anglia et Aegypto.

5. *compressum*, spicis subternis, flos. alternis muticis rachii adpressis, culmo medio articulato-compresso, pedunc. longissimis. Swartz prod. 24. Fl. p. 181. Hab. in Jamaica et India occidentali. Sem. compressum. S. ¶

6. *digitatum*, spicis digitatis subquaternis subsessilib., flos. muticis appressis secundis, fol. margine cartilagin. o-seeratis. Swartz. Flor. p. 181.

7. *cimicinum*, racemis digitatis, calye. valv. exteriori ciliata. Mant. 184. Panicum Retz. Obs. 3. p. 9. Hab. in Malaharia. Flor. cum semine lapsi ob cilia cimicem quamdam referunt. Lam. enc. 1. p. 59. n. 19. In Jamaica, pratis aridis. ©

8. *panicum*, spicis subdigitatis alternis patentibus filiformibus; flosculis secundis muticis pedicellatis trigonis. Swartz Flor. p. 179. Hab. in Jamaica. Distinctum a M. cimicino. L.

9. *effusum*, flor. verticillato-paniculatis dispersis muticis. Lin. Flor. dan. t. 143. Lecc. t. 8. f. 7. Hab. in nemoribus. ¶

10. *confertum*, asperum, panicula coarctata, flor. coloratis muticis. Mill. dict. n. 4. Hab. in Helvetia et Gallia. Distincta species.

11. *globosum*, panic. patula, glumis muticis, pedicellis cingulo luteo. Thunb. jap. p. 49. Hab. in Japonia.

12. *caerulescens*, flos. paniculatis aristatis, aristis gluma breviorib. Schousb. maroc. 1. p. 34. Desf. atlant. 1. p. 66. t. 12. In fissuris rupium Atlantis et cieca urbem St. Crucis.

13. *paradoxum*, flor. paniculatis aristatis. Schreb. gram. t. 28. f. 2. Agrostis. Sauv. Monsp. 45. Hab. in Gallia meridionali, Carniola. Panicula alba. Semen nigrum.

14. *villosum*, panicula laxa, flos. muticis, calycibus lanatis. Swartz prod. 24. Andropogon insulare. Liu. Amoen. acad.

5. p. 419. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 43. t. 14. f. 2. Hab. in Jamaica. ©

15. *ramosum*, culmo ramoso, flor. paniculatis sublinatis hirsutis. Retz. obs. 6. p. 22. Hab. in India orientali.

146. AGROSTIS. Cal. 2-valvis, unilobus, valv. acutis. Cor. 2-valvis. Stigm. longitudinaliter hispida, s. plumosa. (Flosc. patentes.)

* Aristatae.

1. *Spica venti*, petalo exteriori arista recta arista longissima, panicula patula. L. Willd. Sp. 1. p. 361. Leers herb. t. 4. f. 1. Hab. in segetes. ©

2. *interrupta*, petalo exteriori aristato, panic. attenuata coarctata interrupta. Voill. 88. t. 71. f. 4. (bona.) Hab. in Europa australiori. Virescens. Aestae longiusculae.

3. *spicaeformis*, panic. spicaeformi, flos. linearibus; arista altera receptaculo inserta geniculata longiori, altera infra apicem corollae rectis, cor. hirsutis. Lin. suppl. p. 108. Hab. in Teneriffa.

4. *hirsuta*, panic. subspicata, culmo folisque hirsutis, cor. dorso aristatis, apice bifidis. Lin. suppl. 108. Cresc. cum priore.

5. *miliacea*, petalo exteriori arista terminali recta medioeri, flor. ovatis laevibus. Gouan. illustr. 3. Hab. in Hispania, Gallia et Sibiria. ¶

6. *bromoides*, panic. simplici angustata, cor. pubescente; arista recta calyce longiore. Mant. 30. Gouan. illustr. 3. t. 1. f. 3. Hab. Monspelii. Coe. arista recta, scabra, calyce duplo triplo longior ut in Bromis. L.

7. *arundinacea*, panic. oblonga, petalo exteriori deorsum villosa, basi aristato, arista torta calyce longiore. Lin. Calamagrostis arundinacea. Roth. germ. 1. 33. II. 89. Hab. in rupestris, sylvestris, glaucosis juniperetis. Pallescent. ¶

8. *Calamagrostis*, panic. inersata, petalo exteriori toto lanato apice aristato, culmo ramoso. Hab. in Helvetiae, Veronae alpinis. Panic. densa.

9. *serotina*, panic. flosculis oblongis mucronatis, culmo obiecto fol. brevissimis. L. Mant. 30. Segu. ver. 3. p. 146. t. 3. f. 2. Hab. Veronae. Fol. brevia, vix articulis longiora, patentia.

10. *rubra*, panic. primo contracta; florente patentissima, petalo exteriori glabro, arista terminali tortili recurva.

Roth. germ. 1. 31. II. 81. Hab. in Anglia, Suecia vulgaris. Panic. rubescens.

15. *stricta*, panic. elongata stricta, cor. calyce minoribus, arista c. basi petali, toruli, flore longiore. Willd. Sp. 1. p. 366. Hab. in America boreali. Affinis præcelsæ. Fol. plana angusta linearia. Ligula lacera. Cor. tenra membranacea. W.

16. *ovata*, petalo exteriore ante apicem aristato; panic. ovata coarctata spiciformi. Forst. prodr. n. 40. Hab. in nova Zelandia.

17. *canina*, calycib. ovatis coloratis, arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. Leers. t. 4. f. 2. Smith brit. 78. Hab. in pascuis graminosis. Arista setacea alba, medio notata geniculo fusco. L.

18. *alpina*, fol. setaceis, panicula coarctata, calycib. hispidiusculis coloratis; petalo exteriore truncato, arista dorsali geniculata. Leysser. halens. n. 67. ed. 2. p. 34. Schreb. gram. prodr. 22. t. 4. f. 1. Hab. in albis inque montibus Saxonie. ☉

19. *rupestris*, fol. filiformi-setaceis, panicula patula, calycib. hispidiusculis patentibus coloratis, petalo exteriore arista dorsali geniculata flore duplo longiore. Willd. p. 369. Allion. pedem. n. 2161. Hab. in Helvetia, Bohemia, Italia rupestris. Floresculi stramineo-fusci nec violacei. W. ☉

20. *setacea*, cal. lanceolatis, cor. basi aristata; arista geniculata, fol. radicalibus setaceis. Smith. brit. p. 79. Curt. Flor. lond. 1. 12. Agr. alpina. Withering. Hab. in Anglia cricetis aridis. Fol. glaucescentia.

21. *littoralis*, cal. lincari-lanceolatis aristatis, cor. nulla, arista subterminali recta, culm. decumbentibus. Smith. Fl. brit. 1. p. 78. Withering Flor. t. 23. Hab. in littoribus marinis lutosi. Flor. angusto.

22. *compressa*, panic. coarctata, calycib. aequalibus laevib. cor. infra apicem brevissime aristatis. Willd. A. dubia, cal. aequalibus laevib. cor. infra apicem mucronatis, fol. setaceis. Leers herb. t. 4. f. 4. Hab. in Germania.

23. *vinealis*, calycib. coloratis, petalor. arista dorsali longitudine fere calycis, culmis ascendens. Schreb. spicil. 37. n. 977. Hoffm. germ. 35. Hab. Lipsiae in agris, collib. passim. Var. flos. mutici. Priori affinis ☉

☉? *gigantea*, panic. parte superiore patentissima, calycibus hispidis, petalo teriore glabro, dorso superne subaristato,

culmo erecto. Roth. Fl. germ. 1. p. 31. Willd. l. c. Crescit ad ripas fluviorum. ☉

* * Muticæ.

24. *capillaris*, panic. capillari patente flexuosa, calycib. subulatis aequalibus glabris coloratis muticis. Smith. ic. ined. fasc. 3. p. 54. t. 54. Willd. l. c. Agrostis capillaris. Lin. Sp. plant. ed. 2. p. 91. Hab. in Lapponia albis, etiam in Lusitania secundum Swartz in bot. Journ. 2. p. 22.

25. *vulgaris*, panic. patente, ramulis divaricatis capillaribus, cal. aequalibus, petalo interiore duplo breviori recto. Smith brit. 1. p. 79. Hoffm. germ. ed. 2. p. 36. A. hispida. Willd. Spec. 1. p. 370. A. capillaris Auctorum. Leers. t. 4. f. 3.

☉. *pumila*. Lin., minor, culm. fasciculatis, sem. usilagine corruptis inclusis. Lightf. Scot. ic. in titulo. v. 2.

☉. *sylvatica*, panic. coarctata, cal. aequalibus virgineis cor. brevioribus, tomentosis (ustilago) duplo longioribus. Lin. vid. Steinbach in Naturforscher (promtuarium germanic.) Fac. p. 233. t. 5. Smith. l. c.

26. *stolonifera*, panic. coarctata, culm. ramoso repente, flor. congestis, cal. aequalibus lanceolatis pubescentibus. Smith. l. c. Martin Flor. rustica t. 120.

☉? *coarctata*, panic. contracta, cal. subaequalibus, cor. brevioribus obtusis hispidulis; fol. angustis Hoffm. l. c. 37.

☉. *dulcis*, panic. densa breviuscula interrupta, flor. fasciculatis subsessilibus.

☉. *gracilis*, caespitosa, culm. gracili subdecumbente, panic. in spicam cylindricam coarctata, flos. glabris subnullis. Hab. in arvis, pratib. sylvaticis, collibus. Obs. An recensitæ varietates huc aut ad *albam* pertinent, aut distinctæ species sint, determinare hæcenus nequeo. var. ☉ sub nomine Agr. dulcis *Sibthorpii* hinc inde colitur, etiam e Silesia habeo. In var. ☉, quam circa Lugdunum Gallorum collegi, glumæ glaberrimæ sunt, sed pedicelli subincrassati hispiduli ut vere in *A. alba*.

27. *pyramidata*, panic. patente parva pyramidata, cal. cor. longioribus vaginis ore pilosis. Lam. Ill. gen. p. 161. Hab. in Amer. meridionali.

28. *barbata*, panic. contracta subplacata, cal. inaequalibus, vaginis barbatis. A. littoralis Lam. Ill. p. 161. Hab. in Amer. meridional. Rich.

glumis subnatis uncinato-mucronatis. Willd. p. 275. Rottb. 23. t. 6. f. 1. Scirpus intricatus. Lin. Mant. 182. In Ind. orientali et Cap. b. spei. Fol. graminia laeria. Involuc. triphyllum. Umb. spicae saepius pedunculatis, quarumque sessilib. Spicae ovatae cylindricae obtusae.

31. *Luzulae*, culm. triquetro, umb. simplici, spiculis ovatis capitato-spicatis, involucri polyphylo. W. p. 276. Rottb. t. 13. f. 3. Sloan. jam. t. 29. f. 1. In Amer. calidiore.

32. *conoides*, culm. triquetro folioso, umb. simplici, spicul. compactis obtuse conicis. Richard in Act. soc. Lin. Paris. p. 106. Hab. in Cayenna. Affin. antecedenti.

33. *confertus*, culm. triquetro nudo, umb. simplici foliosa, spiculis ovatis conglomeratis, glumis apice recurvis acuminate. Swartz. Flor. Ind. Occid. 1. p. 115. In Jamaica australi. Involuc. 3-phyll. longissimum. T.

34. *Brianeus*, culm. triquetro, fol. angustis, umbellulis confertis aphyllis, spiculis oblongo-ovatis obtusis. Richard in Act. Soc. Lin. Paris. p. 106. Hab. in Amer. meridion. Spiculae subbrizaeformes.

35. *viscosus*, culm. subcompresso basi viscoso, fol. asperis, umb. foliosa composita, spiculis subconglobatis obtusis. Ait. Kew. p. 70 Swartz Flor. Ind. occid. 1. p. 113. Hab. in in arenosis, subhumidis Jamaica australi. Hujus loci est Cyp. elegans. Rottb. gram. p. 34. t. 6. f. 1. secundum Vahl Eclog. Amer. fasc. 2. Forte non diversus est a Cyp. odorato. L.

36. *ligularis*, culm. triquetro, umb. composita, flor. pedunculatis, spiculis paucifloris spicatis, glumis obtuse mucronatis, involucri polyphylo longissimo. Willd. p. 277. C. ligularis, culmo triquetro nudo, umbell. spiculis capitatis oblongis sessilibus, involucri longissimis serrato-asperis. Lin. Moen. acad. 5. p. 391. Rottb. 35. t. 11. f. 2. Hab. in Jamaica et ad C. b. sp.

37. *cinnamomeus*, culm. triquetro folioso, umbell. spiculis capitatis ovatis pedunculatis sessilibusque, involucri pentaphyllo serrulato-scabro. Retz obs. 4. p. 10. Var. prior?

38. *alopeuroides*, culm. triquetro, umb. supradecomposita, spicae digitatis oblongis, spicul. confertissimis imbricatis erectis. Rottb. 18. t. 8. f. 2. C. glomeratus. L. Willd. 277. calopeturoides, culmo trigono, umb. decomposita involucri polyphylo serrato breviori, spiculis cylindricis. Thonb. prodr. p. 18. Hab. in Arabia felici, India et Cap. b. spei. Planta speciosa. T.

39. *imbricatus*, culm. triquetro nudo, umb. decomposita, umbellularum radiis imbricatis, involucri hexaphylli foliis tribus longissimis, tribus brevissimis. Retz obs. 5. p. 12. In India.

* * * * * Culmo triquetro, umbella composita et decomposita, spiculis divaricatis.

40. *maderaspatanus*, culm. triquetro, umb. composita, spiculis linearibus, glumis lanceolatis uncinato-muricatis, involucri triphylo longissimo lanceolato. W. l. c. p. 278. Cyperus squarrosus. Rottb. 25. t. 6. f. 3. Pluk. amalib. 114. t. 397. f. 2. Hab. in India. Parvulus. C.

41. *castaneus*, culm. triquetro, umb. composita, spiculis linearib. multifloris, glumis obtusis recurvato-mucronatis, involucri triphylo longissimo convoluta-setaceo. Willd. 278. Hab. in India.

42. *elegans*, culm. triquetro, umbell. subradiatis, spiculis subernis linearib. squamis obcordatis substantib. mucronatis patulis, involucri planis. Vahl. Eclog. 2. Lin. Willd. spec. p. 278. Sloan. jam. 1 p. 117. t. 75. f. 1. Hab. in Jamaicae paludosis.

43. *scopellatus*, umb. subhexaphyllis, radiis alternis confertis ramosis, fasciculatis aphyllis, spiculis linearibus lanceolatis. Vahl. Eclog. 2. Richard in Act. Soc. hist. nat. Paris. 1. p. 106. Hab. in Martinica.

44. *surinamensis*, culm. triquetro, umb. decomposita, spiculis ovatis, glumis acuminate imbricatis, involucri triphylo W. p. 279. Rottb. 35. t. 6. f. 5. Hab. in Surinamo.

45. *flavidus*, culm. triquetro striato, umb. composita triphylla, spiculis lanceolatis, monandris. Retz. obs. 5. p. 13. In India.

46. *flavescens*, culm. triquet. nudo, umb. umb. composita triphylla, spiculis confertis lanceolatis, glumis obtusis. Willd. p. 279. Rottb. germ. II. p. 50. Desf. Ath. 1. p. 46. Moris. hist. 3. p. 239. s. 8. t. 17. f. 37. Hab. in Europae et Barbariae paludosis. C.

47. *fuscus*, culmo triquetro, umb. composita, triphylla, spiculis linearibus confertis glumis acutis imbricatis. Willd. 280. Flor. dan. t. 179. Icaea. herb. t. 1. f. 2. Rottb. germ. II. p. 50. Hall. helv. n. 1349. Moris hist. 3. p. 239. s. 8. t. 9. f. 38. Hab. cum priore. culm. sublaecidus. C.

48. *viridis*, culmo triquetro, umb. composita triphylla, spiculis linearibus confertis, glumis acutis patulis. Willd. sp. 1. p. 280. Cyperus viridis. Krock. silas. n. 69,

t. 13. Hab. in montosis Silesiae et circa Argentoratum. Culm. subrigidus. ☉

49. *difformis*, culm. triquetro nudo, umb. diphylla simplici trifida, spicis cuspidatis, intermedia sessili. Amoen. 4. p. 302. Rottb. a. 4. t. 9. f. 2. Pluk. alm. t. 192. f. 3. Hab. in India. Spicae numerosae, squamis ovatis concavis obtusis, latere scariosis.

50. *jemicus*, culm. triquetro scmiundo basi bulboso, involuero diphylo, umb. subsimplici, spiculis linearibus. Retz. obs. 4. p. 17. Rottb. 25. t. 8. f. 1. In Arabia felici, in regione Jemeni inque graminosis Zeilonae. ☿

51. *strigosus*, culm. triquetro nudo, umb. subsimplici, involucri 4-phylo, spiculis linearib. confertissimis horizontalibus. Lin. Sp. plant. 69. Rottb. 40. t. 11. f. 3. Sloan. hist. 7. p. 116. t. 74. f. 2. In Jamaicae, Virginiae paludibus, inque India. Radix sulcata.

52. *tenuis*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spiculis subulatis confertis horizontali-reflexis, involucri polyphylo foliol. linearis-setaceis. Swartz. Flor. 1. p. 119. In Jamaicae occident. gramin. montosis.

53. *tuberosus*, culm. triquetro basi folioso, involuero triphylo, umb. composita, spicis lanceolatis teretiusculis. Rottb. p. 28. t. 7. f. 1. In India.

54. *pumilus*, culm. folioso triquetro, involuero tetraphyllo, umb. composita, spicis alternis ovato-lanceolatis nitidis. Rottb. 29. t. 9. f. 4. ☿ Cyper. pumilus. L. Sp. plant. 67. Amoen. cent. 4. p. 302. Hab. in India. In ☿ involucri 2-phyllum dicitur.

55. *stoloniferus*, culm. nudo triquetro, umb. composita involucriata, spiculis lanceolatis. Retz. obs. 4. Hab. in India. ☿

56. *compressus*, culm. triquetro nudo, umb. universali triphylla, glumis mucronatis, lateribus membranaceis. Sp. 68. Rottb. 27. t. 9. f. 3. Sloan. hist. 1. p. 117. t. 76. f. 1. Hab. in pratis Jamaicae et Amer. septentr. Spicae radii 4, longe pedunculati, umb. media scissili.

57. *pulcher*, culm. trigono, umb. decomposita involucri subhexaphyllo brevioris, spiculis ovatis Thunb. prod. 18. Hab. in Cap. b. spci

58. *monandrus*, culm. inferne folioso obtuse triangulo, umb. polystachia decomposita, spicis lanceolatis confertis sessilib. flor. monandria. Roth. catal. 1. p. 3. C. vegetus. Willd. Sp. 1. p. 283. Affinis videtur praecedenti. An varietas C. glabri? W.

59. *albidus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, pedunculis corymbosis, involucri polyphylo longissimo. Retz. obs. 6. p. 21. Hab. in India.

60. *hexastachyos*, culm. triquetro nudo fol. graminis linearibus molliusculis glaucis, umb. simplici flaccida, spicis linearibus alternis subsessilib. Rottb. 28. t. 14. f. 2. Sw. Fl. ind. oecil. 1. p. 117. Hab. in India et Jamaica. C. rotundus. L. sp. pl. ed. 1. diversus est. Sw. ☿

61. *Hydra*, culm. triquetro laevigato, umb. simplici sessili et 1-2 pedunculatis, spicul. linearib. fol. radical. recurvatis, radice repente umbrosa. Michaux. 1. p. 27. Hab. in cult. Amer. boreal. spic. causticae. Planta tuberib. facillime renascens maximo agris damno. M. Praecedenti affinis.

62. *tetrastachyos*, culm. triquetro, involucri sul-4-phyll. corymbo brevioris, spicul. quaternis arcuatis, acutis. Desfont. atl. 1. p. 45. t. 8. Hab. in Algeria ad ripas flum. Taddab. An prioris varietas?

63. *glaber*, culm. triquetro nudo laevi, umb. triphylla, flor. glomeratis, inferiorib. brachiatis, fol. glabris. Lin. Mant. 179. Segn. suppl. 66. t. 2. f. 1. Allion. pedem. p. Hab. in Veronae et Pedemont. humectibus. Culm. palmaris. Involucri triphyllum culmo longius, praeter 3 foliola cubulata brevia.

64. *brunneus*, culm. triquetro nudo, fol. lato-linearib. planis, umb. 8-phylla, spic. subsessilibus: glumis striatis. Swartz. l. c. p. 116. Hab. in Ind. occident. Setae 2, latiusculae ad latera germinis. Sw.

65. *odoratus*, culm. triquetro nudo, umb. decomposita simpliciter foliosa, pedicellis distiche spicatis. Lin. Sp. pl. 68. Rottb. p. 38. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 1. In America ad fluviorum ripas. ☿

66. *esculentus*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa, radicem tuberibus ovatis, tenuis imbricatis. Morist. hist. 3. p. 216. t. 8. t. 11. f. 10. Desf. atl. 1. p. 43. Villars Dauph. 1. p. Hab. Mouspelli, in Italia, Oriente et Barbaria. ☿

67. *tenuiflorus*, culm. triquetro, fol. linearibus, umb. decomposita, spiculis linearib. acutis angustissimis. Rottb. gram. 30. t. 14. f. 1. Jacq. ic. rar. 2. t. 266. Collect. 3. p. 150.

68. *badius*, culm. triquetro nudo, fol. serrulatis, corymbo terminali, spicul. linearis-subulatis concavis, involucri pedunculis longiore. Desfont. Atl. 1. p. 45. t. 7. f. 2. Ad, ripas rivulor. Algeriae. Involucri. 4-5

Phyll. Spicul. ferrugineae. Affinis *C. tenuiflora*. Rottb. ¶

69. *pallescens*, culm. triquetro basi folioso, pedunc. supradecompositis, spiculis lineari-subulsiis rectis distinctis, involucri sub-3-phylla umb. brevior. Desf. l. c. t. 9. Hab. ad lacum ripas prope la Calle. Spic. primo albidæ deinde pallide rufæ. ¶

70. *Pangorci*, culm. triquetro basi folioso, involucri triphylo, umb. universali decomposita: partialibus subulsiis. Retz. obs. 4. p. 10. Rottb. 31. t. 7. f. 3.

71. *flavicomus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, involucri longissimo sub-5-phylo. Michaux. l. c. In Carolina. Umb. ramuli ab ipsa basi floriferi, spiculae patentæ, flavae oblongae 7-florae. M.

72. *virens*, culm. triquetro, umb. composita subnuda, involucri polyphylo longissimo peduncul. s. ramis divaricato-ramosis. Michaux. l. c. In Carolina. Majusculus. Spicul. fasciculatae, virentes ovatae planae. M.

73. *strigosus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, involucri longissimo, spic. teretiusculis, patentissimis. Mich. l. c. Cum priore.

74. *lanceus*, culm. trigono folioso, umb. composita, involucri duplo brevior, spicul. oblongis. Thunb. prod. 18. C. denudatus. Linn. suppl. 108? Hab. in Cap. b. spei.

75. *longus*, culm. triquetro folioso, umb. foliosa supradecomposita, pedunculis nudis, spicis alternis linearib. Jacq. icon. rar. 2. t. 297. Collect. 3. p. 191. C. odoratus radice longe. Morit. hist. 3. p. 237. s. 8. t. 11. f. 13. Hab. ad rivulos Europ. austral. Spic. brunneae, nitidae.

76. *fastigiatus*, culm. triquetro, umb. decomposita, pedunculis longissimis filiformib. subquinq. fidiis, spicis plurimis linearib. sparsis. Rottb. 32. t. 7. f. 2. Burm. ind. 20. t. 8. l. 2. Hab. in India. ¶

77. *canaliculatus*, culm. triquetro canaliculato nudo, umb. decomposita, pedunculis racemosis, involucri polyphylo longissimo. Retz. obs. 6. p. 20. Hab. in India orientali.

78. *Monti*, culm. triquetro, umb. decomposita paniculata, spiculis ovatis florcul. distinctis, involucri hexaphyllo. Willd. p. 286. Linn. suppl. 102. Rottb. 31. serotinus C. serotinus odoratus, radice longa, panicula e locustis laeis ferrugineis compactis. Mont. gram. 12. t. 1. f. 12. In mariis Italiae et Tergesti. ¶

79. *niger*, culm. triquetro nudo glabro, fol. ensiformib. umb. foliosa, pedunc. plurimis longis, spicis laeis nigricantibus. Flor. Per. 1. p. 47. Hab. in inundatis Prov. Cercado et Chancay. ☉

80. *Iria*, culm. triquetro seminudo, umb. foliosa decomposita, spiculis alternis, granis distinctis. Rottb. gram. 41. Willd. l. c. p. 286. Pluk. alm. 171. t. 1. f. 7. Iria s. Baleri. Reed. mal. 12. p. 105. t. 56. Hab. in India. Distinctus spicul. linearibus, flor. dentium pectinis instar, parum distantibus. W.

81. *Santonici*, culm. triquetro, umb. supradecomposita verticillata paniculata. Willd. p. 287. Rottb. 41. t. 9. f. 1. Hab. in India.

82. *corymbosus*, involucri polyphylo, umb. supradecomposita, pedunc. filiformibus corymbosis strictis. Rottb. gram. 42. t. 7. f. 4. Cyperus, culmo trigono apophyllo, umb. decomposita involucri brevior, spicis linearib. Thunb. prod. 18. Hab. in Asia et Cap. b. spei.

83. *racemosus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, pedunc. ramosis racemosisque, involucri polyphylo longo. Retz. obs. 6. p. 20. In India orientali.

84. *Haipan*, culm. triquetro folioso, umb. supradecomposita, spiculis umbellato-sessilibus. Rottb. 36. t. 6. f. 2. Pluk. alm. 179. t. 192. f. 2. Hab. in India, Aethiopia. ¶

85. *elatus*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa supradecomposita, spicis sessilib. digitalibus imbricatis, spiculis subulatis. Amoen. acad. 3. p. 301. In Hab. India. Gramea magnum. Involucri. universale polyphyllum longissimum, partialia spicis breviora. Spicae longitudine digiti, ferrugineae, imbricatae ex spiculis teneris distichis. L.

86. *distans*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa supradecomposita, spicis alternis, filiformibus, fasc. distinctis. Linn. suppl. 103. Jacq. ic. rar. 2. t. 299. Collect. 3. p. 189. Cyperus elatus. Rottb. gram. 37. t. 10. Hab. in insulis Caribaeis. ¶

87. *diphyllus*, culm. subtriquetro diphylo, umb. supradecomposita, spiculis teretiusculis subpinatis. Retz. obs. 5. p. 11. Hab. in Indiae orientali rivulis.

88. *Papyrus*, culm. triquetro nudo, umb. involucri longiore, involucriis triphyllis setacis longioribus, spiculis ternis. Syst. veg. 97. Rottb. gram. 32. Mich. gen. 44. t. 19. Papyrus. Bruce itin. 5. p. 1. t. 1. In fluviis Calabriae, Siciliae, Syriae, Aegypti. Involucri. 8-phyllum umbella brevius:

Brevius: foliolis exterioribus 4 latioribus. 4 pedes et ultra altum. In caldariis colitur. Spic. tenerae.

89. *Abelliformis*, culmo sulcato triquetro: involucri polyphyllis, foliol. alternis, lanceol. longissim. pedunc. axillaribus umbellato-corymbiferis, spicul. 4-6 ovatis. Rottb. 42. t. 12. f. 2 In Arabia felici. Caul. crass. contortus. Fol. floral. pedalia.

90. *alternifolius*, culm. triquetro, fol. alternis, in summo culmi confertis, umb. axillarib. compositis, spic. linearibus. Willd. Sp. t. p. 289. Jacq. Ic. rar. 2. t. 298. Coll. 2. p. 306. In insula Madagascar. Culmi nudi, spice fol. alternis confertis ensiformibus gaudet. Pedicelli alii quot e basi spicae, spice ferrentes spicam similem.

† 131A. *Spica simplex*, squamis sublistiche imbricatis summis congestis; infimis aristatis. Stam. 1. Stigm. 2. Sem mutuum. (Richard.)

91. *caribaeus* caespite laxo, squamis binis infimis aristatis. Rich. Cyperus monostachyos. Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 271. excl. syn. Rottb. Sloan. Jam. 1. p. 220. t. 73. f. 2. Hab. in pascuis aridis Amer.

92. *indicus* caespite stricto, squamis pluribus aristatis. Rich. Cyperus monostachyos. Rottb. gram. p. 18. t. 13. f. 3. Hab. in India orientali.

127. **DULICHUUM**. Spicae subracemose, ex axillis foliorum. Spicule lineari-lineolatae subcompressae: squamulae subdistichae amplexanti-appressae. Stylus longissimus, bifidus. Germ. setulae retrorsum asperae. (Richard. Pleuranthus. Mst.)

1. *spathaceum*, culm. triquetro folioso, apiculis patulis, subdichloris. Pleuranthus floribundus. Rich. Cyperus spathaceus, racemis axillaribus. Willd. Spec. pl. 1. p. 289. Schoenus spathaceus. L. Scirpus spathaceus. Michaux. Hab. in Virginia.

2. *canadense*, racemis simplicibus pedunculatis, spiculis paucis erectis subdecussatis. Richard. Michaux. Hab. in Canada.

123. **SCIRPUS**. Glumae paleaceae s. squamulae undique imbricatae. Cor. o. Sem. 1, undum aut villis s. setulis brevioribus cinctum.

* *Monostachyi*.

1. *mutatus*, culmo triquetro nudo,

spica cylindrica terminali. Amoen. acad. 5. p. 391. Willd. Sp. pl. 1. p. 200. Hab. in Jamaica. Simillimus S. aciculato, sed triquetus, molliusculus, nec articulatus. T.

2. *spiralis*, culm. aggregatis subnudis triquetris, spica cylindrica terminali, floce. cuneiformibus truncatis q. traliter dispositis. Rottb. gram. p. 45. t. 75. f. 1. Hab. in India. T.

3. *articulatus*, culm. fistuloso tereti nodi- diusculo subarticulato, capitulo glomerato laterali. Sp. plant. 70. Vahl. symbol. 2. p. 8. Rheed. mal. 12. p. 135. t. 71. In Malabarina aquositate arenosis, spicae laterales in capitulum semiverticillatum collectae. L.

4. *plantagineus*, culm. tereti ventricoso nudo, spica cylindrico-subulata terminali. Swartz. Flor. p. 123. Retz. obs. 5. p. 14. Rottb. gram. 45. t. 15. f. 2. Hab. in India et Jamaica inundat. argillosis.

5. *nutans*, culmo compresso subtetragono nudo, spica ovata solitaria terminali nutante. Retz. obs. 4. p. 12. In uliginosis Malaccas. T.

6. *quadrangulus*, aphyllus, culm. tetraquetro nudo stricto, spica cylindrica, squamis rotundato-obtusis. Michaux. Flor. 1. p. 30. Hab. in Carolina.

7. *tuberculosis*, culmo nudo, spicis tur- gulis ovatis, semine tuberculo terminato. Mich. l. c. cum priore.

8. *capillaceus*, minutus, culm. foliis- que capillaceis, spica oblongo-ovata acuta. Mich. l. c. Hab. in Nova Anglia. Aeniss S. aciculari dicitur. Spic. squamulae patulae, oblongae, caespitae. M.

9. *pulstris*, culm. tereti nudo, spica ovato-oblonga subtereti, glumis acutis, rad. repente. Flor. dan. t. 273. Lers. t. 1. f. 3. Hoffm. germ. ed. 2. p. 21. Smith. Flor. brit. p. 48. Hab. in fossis.

10. *multicaulis*, culm. tereti basi vagi- nato, spica ovata terminali: glum. obtusis aequalib. radice fibrosa. Smith. Flor. brit. 2. p. 48. Flor. dan. t. 167. Rel. Rudb. 28. f. 2. Rupp. Flor. Jen. ed. Hall. p. 319. Hab. in paludosis turfosis Angl., Daniae et Germaniae rarius. Spic. ferruginea ad basin sae- pius vivipara. Flor. Julio. S.

β ? *intermedius*, aphyllus, spica oblon- go-ovata subacuta, bract. rotundatis, glumis obtusiusculis caespitosis. Thuill. Flor. Paris. ed. 2. p. 21. Hab. in paludibus propa Raincy non procul a Parisiis. Fl. Maio.

11. *reptans*, radice (stirpe) reptante, culm. caespitosus: plurimis sterilib. recur-

E

vatis, spic. oblonga: squamis lanceolatis acutissimis. Thuillier. l. c. p. 22. Hab. ad ripas Sequanae.

12. *geniculatus*, culmo tereti nudo, spica oblonga terminali. Rothb. gram. p. 44. Sloan. jsm. 37. hist. 1. p. 122. t. 75. f. 2. et t. 81. f. 3. Hab. in Jamaica.

13. *caespitosus*, aphyllus, culmo tereti sulcato rigido basi vaginato multiplici-squamoso, spica terminali glumis exterioribus maximis. Smith. l. c. t. 1. p. 48 Rothb. Catal. 1. p. 7. Hab. in ericetis tuesotis, montosis. Glum. inaequales ovali oblongae: majore spicam aequante Roth.

14. *Baeothryon*, aphyllus, culmo striato tereti, basi vaginato, squamis radicalibus subnullis, spica terminali, gluma exterioribus longiore. S. *pauciflorus*, Smith. l. c. p. 50. Lightf. 1078. Lin. suppl. p. 103. S. *Huffert*. Villars delph. 2. p. 188. Hab. in palustribus montosis. Stach. 3 longa, villosa. Hoffm. Glumae obtusiusculae membranaceae: alcea majore spica brevior.

15. *turgidus*, caespitosus, culm. confertis nudis, spica turgide ovata: squamis ovalibus obtusis. Thuill. l. c. p. 22. Hab. in paludosis prope Meudon: etiam prope Argentoratum (Strasburg) crescit. Spicae subeotundae fere.

16. *campestris*, culm. striato nudo, spica terminali calycem bilabrem vix superante, glumis oblongis membranaceis obtusis subaequalibus. Roth. Catal. t. p. 5. et V. 2. p. 2. Hoffm. germ. ed. 2. p. 22. Flor. dan. t. 167. Scheuchz. t. 7. f. 19. Hab. in silvatu Oldenburgensi et in Franconia. Culm. 2-5, setacei fol. longior. Styl. 3-fidus. Sem. triquetri. $\bar{\Gamma}$

17. *capitatus*, culm. tereti nudo setiformi, spica subglobosa terminali, stylo trifido. Sp. pl. 70. *Scarihaeus*, culmis fasciculatis setaceis sulcatis triquetris, spica minima ovata terminali. Rothb. p. 46. t. 15. f. 3. In Virginia inque insulis Caribaeis. $\bar{\Gamma}$

18. *ovatus*, culm. subcompresso nudo filiformi, spica ovata terminali nuda, floribus diandris, stylo bifido. Rothb. Catal. f. p. 5. Willd. Sp. 1. p. 108. Scirpus capitatus plur. auctorum. Moris. hist. 3. p. 233. f. 8. t. 10. f. 34. Hab. in Germaniae humidis. Setae 6. $\bar{\Gamma}$

19. *atropurpureus*, culm. setaceis teretibus fasciculatis, spicis terminalibus ovatis solitariis, flor. 1-andris. Retz. obs. 5. p. 14. Hab. in uliginosis Indiae.

20. *polytrichoides*, culm. compresso

setaceis, spicis terminalibus solitariis subnatis 1-andris. Retz. obs. 4. p. 11. Rumph. amb. 6. p. 17. t. 7. f. 1. Hab. in pascuis depressis subulis Zeylonae.

21. *acicularis*, culm. quadrangulo nudo setiformi, spica terminali ovata bivalvi, seminibus nudis. Lin. Flor. dan. t. 287. Moris. s. 8. t. 10. f. 34. Hab. in humidis inundatis ericetis, etiam in Amer. $\bar{\Gamma}$

22. *Aitans*, culm. teretibus nudis alternis, caule folioso flacido. Scheuchz. t. 7. f. 20. Moris. hist. 3. p. 230. s. 8. t. 10. f. 31. Pluk. alm. t. 35. f. 1. β . *stolonifer*, culmo canaliculato, basi folioso, spica terminali bivalvi subbiflora. Roth. in Usteei Neu. Bot. Annal. 4. p. 30. Hab. in udibus. An styl. 3 fidus in β ?

23. *compressus*, culmo teretiusculo nudo, spica compressa ex spiculis pluribus subdistichis composita, involucri monophyllo. S. Carici Retz. Willd. Sp. p. 299. Schoenus compressus L. Leers. t. 1. f. 1. Hab. in pratis, et turfosis. Sem. basi setis cinctum.

** Culmo tereti polystachyo.

24. *fragrans*, culmo tereti striato nudo, spicis ovatis pedunculatis inaequalibus, terminalibus umbellatis. Flor. Peetr. 1. p. 47. Hab. in nemoribus runcationibus. Pillao. Rad. fascie filiformi odoratissima. Fol. setacea, pubescentia. Silgm. 3.

25. *glomeratus*, culm. nudo teretiusculo, umb. glomerata, involucri diphylo brevi, floribus diandris. Retz. obs. 4. p. 11. Hab. ad agrorum margines Zeylonae. $\bar{\Gamma}$

26. *arvensis*, culmis compressis striatis, umb. simplicibus, involucri monophyllo brevi. Retz. obs. 4. p. 11. Hab. in Zeylonaee arvis.

27. *truncatus*, culm. tereti, capit. glomerato-globoso, involucri diphylo, totius linearibus. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. b. spei, cum 4 sequentibus.

28. *laciniatus*, culm. tereti, capit. triangulari, glumis ovatis, involucri diphylo. Thunb. prod. 17.

29. *membranaceus*, culm. tereti, capit. angulato, glumis ovatis membranaceis, involucri triphylo. Thunb. prod. 17.

30. *pilosus*, culm. compresso, capit. ovato, glumis lanceolatis ciliatis, involucri tetraphyllo. Thunb. prod. 18.

31. *Histrix*, culm. capillari, capit. subdistachyo, glumis acuminatis squarosis,

involucro monophyllo. Thunb. prod. 17. Hab. in Cap. b. spei.

32. *Domingensis*, culm. tereti nudo altissimo, flor. corymbosis, pellicillis umbellatis singulisque, spic. teretibusculis, involucro corymbum aequante. Hab. in St. Domingo. Culm. 3-dipetalis et ultra, pro ratione tenuis. Fol. radicalia canaliculata laevissima, basi spadicca; spic. brunneae oblongae, squam. obtusis.

33. *lacustris*, culm. tereti elongato nudo, spicis ovatis sessilib. pedunculatisque terminalib. L. Willd. Sp. v. p. 26. Michx. Flor. Amer. t. 1. p. 131. β . minor involuc. rigidioribus pungentib. Roth. germ. p. 57. Flor. dan. t. 454. Hab. in Europa, Canada et Barbaria, aquis stagnantib. Caul. sursum attenuatus, 2-3 pedalis.

34. *Holoschoenus*, culm. elongato tereti nudo, spicissuloglobosis pluribus glomeratis polunc. sessilibusque, involuc. diphyll. Inaequali mucronato Pluk. Phyt. t. 40. f. 4. Roth. Beiträge p. 86. Scheuch. t. 8. f. 2, 3, 4 et 5. Hab. in Europa australi, et in paludib. Algeriae.

35. *australis*, culm. tereti nudo, capit. laterali sessili, bractea reflexa, fol. canaliculata. Sys. Veg. 83. Pluk. Phyt. t. 40. f. 5. Obs. cl. Roth. l. c. et Smith Flor. brit. t. 1. p. 53. hunc et sequentem pro varietate prioris habent. Culmi laeves, vix pedales.

36. *romanus*, culm. tereti nudo, capitulo laterali sessili conglobato, bractea reflexa. Jacq. aust. 5. p. 21. t. 418. Scheuch. gram. 373. t. 8. f. 6. Hab. in Galloprovincia, Sibiria et Romae. Obs. Huic culmi filii crassitie; Sc. holoschoeni vero crassi ut in S. lacustri et apice pungentes. Lin.

37. *nodosus*, culmo compresso nullo, capitulo glomerato mucronato. Roth. gram. 52. t. 8. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei.

38. *radiatus*, culm. tereti, capitulo hemisphaerico, involuc. polyphyllo. Thunb. prod. 18. Schoenus radiatus. Lin. suppl. 101. Hab. ad Cap. b. spei. Culmus aphyllus palmaris striatus. Folia fincaria canaliculata. Semina absque pappo.

39. *setaceus*, culm. nudo folisque setaceis, spic. laterali. subgemmis sessilibus. Flor. dan. t. 312. Leers herborn. n. 35. t. 1. f. 6. Hab. in uliginosis. Plant. tenera, minuta. Spicul. non terminal. uti vult Linnaeos, sed sub apice culmi laterales. Sem. nuda.

40. *supinus*, culm. tereti nudo, spicis sessilib. in medio culmo glomeratis. Dulib.

paris. 16. Roth. germ. II. p. 53. fol. rotundioribus. Tournef. inst. 528. Hab. in Gallia et in Marchia.

41. *natus*, culm. compresso foliose flexuoso-erecto, spic. 2-lateralibus. Thunb. prod. 17. Hab. in aquis Cap. b. spei.

42. *vaginatus*, culm. filiformi, capit. lateralibus alternis involucro brevioribus. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. b. spei.

43. *tristachyos*, culmo capillari capit. tristachio laterali, glumis integris, involucro diphyll. Thunb. prod. 17. Lin. suppl. 101. Roth. 48. t. 13. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. An involuc. potius 1-phyllum?

44. *uncinatus*, pilosus, culm. tereti folioso, spicis in capitulum conglomeratis terminalibus axillaribusque. Willd. Sp. p. 300. Pluk. 178. t. 190. f. 7. Hab. in India. Culm. biuncialis. Squamae mucronatae oncinatae elevato-nervosae. W.

45. *aristatus*, culm. striato tereti folioso, panic. terminali diphylla, spicul. ovatis squarrosis echinatis. Willd. l. c. Scirpus pilosus. Retz. obs. 6. p. 19. Hab. in India.

46. *autumnalis*, culm. ancipiti nudo, umb. decomposita, spiculis ovatis. Mant. 180. Hab. in Virginia et Jamaica. Culmi palmares, compressi, altero latere subcarnati. Facies Juuici pilosi.

47. *diphyllus*, culm. semicylindricis striatis diphyllis, umb. composita involucro diphyll. longiore. Retz. obs. 5. p. 15. Hab. in Tranquebaria.

48. *fastigiatus*, culm. filiformi, capitulo convexo compresso, glumis cymis mucronatis, involucro nullo. Thunb. prod. 18. Hab. in Cap. b. spei.

49. *globulosus*, culm. compresso nudo, panic. terminali, spicula unica sessili pedunculatis pluribus globosis Retz. p. 19. obs. 6. Hab. in India.

50. *globiferus*, culm. nudo tereti, umb. terminali composita, capitulis globosis, ex spiculis pluribus arcu congestis. Lin. suppl. 104. Hab. in Tenariffa. Culm. aphyllus, terminatus spathe. Pedunc. terminati globulis ex spicis brevissimis congestis. Hi circa basin emittunt novos radios globulosos, iterum similiter dividendos, unda inflorescentia ex umb. basi proliferis constat. Lin.

51. *capillaris*, culm. nudo folisque capillaribus, spicis pedunculatis tenuis, intermedio sessili. Mant. 321. Eurm. Zexl. 109. t. 47. f. 2. Foliol. setaceum sub umb. spicis longius.

*** *Culmo triquetro, panicula nuda.*

52. *trispicatus*, culm. angulato nudo, spicis term. palibus ternis sessilibus nudis. Lin. suppl. vol. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. b. spci. Folia viv. nulla, nisi squamæ ferrugineæ radicales. Involucrum Polyphyllum, foliis sobolatis brevissimis.

53. *lateralis*, culm. triquetris nudis, spicis subternis lateralibus, involuero monophyllo brevi. Retz. obs. 4. p. 12. et 5. p. 16. Hab. in Zeylona.

54. *triqueter*, culm. triquetro nudo, spicis lateralib. subsessilibus pedunculatisque, mucronem rectum aequantibus. Lin. Mant. 29. Willd. Sp. p. 302.

α. *S. trigonus*, culm. trigono nudo, spicis lateralib. ovatis fasciculatis sessilib. pedunculatisque, mucrone erecto. Roth. Beyträge 2. P. 60. *S. triquetra* Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 302. Hab. in Europa australi ad paludes. Gluma calycina corollas aequans. Roth.

β. *S. triquetra* (triangularis), culm. triquetro nudo, spicis lateralib. sessilib. ovali-acuminatis, mucrone erecto Roth. l. c. p. 61. *S. mucronatus*. Roth. Flor. germ. Pollieh. Cres. cum priore. Spicae duplo acutiores quam praecedentis. Gluma corollis duplo fere majore. Roth.

55. *mucronatus* (*tricarinatus*), culm. triangulo acuminato, spicis lateralib. ovatis sessilib. mucrone horizontali. Roth. l. c. Willd. Sp. l. c. Hab. variis stagnis. Omnib. in partibus crassiora antecedentibus. Caul. mollis, semen nigrum. Michx. gen. p. 47.

56. *americanus*, culm. acute triquetro nudo, spiculis sessilibus conglomeratis, oblongo-ovatis mucrone brevioribus. *S. triquetra*. Michx. Flora 1. p. 30. Hab. in Carolina infriore. Ab Europaeo diversus videtur. Spiculae majores.

57. *dichotomus*, culm. triquetro nudo, tumbella decomposita, spicis ovatis, dichotomiae sessilib. L. Flor. zeyl. 4n. Rothb. Pluk. alm. 170. t. 119. f. 3. Hab. in India, Arabia et Aegypto.

58. *annuus*, culmo triquetro nudo multifloro, involuero diphylo, umbel. simplici spicis solitariis peduncul. intermedia sessili Allion. Pedem. 2. p. 277. t. 88. f. 5. Desfont. Atl. 1. p. 51. Hab. in Helvetia, Pedemontano et Barlariae agris. Culm. plures ex una radice. Spic. ovato-acuminatae, unica in centro umb. sedet. A.

59. *echinatus*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spicis ovatis. Fl. zeyl. 38.

Pluk. alm. 179. t. 51. f. 4. Hab. in India utraque.

60. *retrofractus*, culm. triquetro, umb. simplici; spicarum floeculis retrofractis. Sp. pl. Pluk. phyt. 415. L. 4. in Virginia. T

61. *ferrugineus*, culm. triquetro subnudo, involucri longitudine paniculae ciliatis. Willd. Sp. 1. p. 304. Schoenus polymorphus. Rothb. gram. 67. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 36. t. 77. f. 2. Hab. in Jamaicae paludibus et in siccis. T

62. *pubescens*, fol. radical. angustis, umbel. terminali sparsa spicul. crassiusculis ovatis, squamis subpubescentib. ovalibus. Michx. Flora. p. 31. Hab. in Carolina et Georgia.

63. *castaneus*, fol. radicalib. angustis, erectis, culmo subtereti striato, umbel. terminali bracteis involucreta, spicul. subrotundo-ovatis, squamis suborbiculatis. Michx. l. c. Squamæ nitentes, badiae. Hab. in Florida.

64. *Michauxii*, fol. radical. planis, culm. nudo subacutis, umb. composita laxa, spicul. oblongo-ovatis: squamis lanceolatis, carina prominente discoloris in mucronem desinente. *S. mucronulatus*. Michx. p. 32. Hab. in Carolina montib. Sem. nudum. Styl. trifidus.

65. *spadiceus*, culm. semitereti nudo retrorsum scabro, umbel. composita, spic. oblongis dichotomis sessilib. involucre brevibus. Vahl. Eclog. Lin. Willd. Sp. 1. p. 305. Hab. in America meridionali, Jamaicae fluvius.

66. *miliaceus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, spicis anaglobosis parvis intermediis sessilib. involucre setaceo. Sp. pl. 75. Retz. obs. 5. p. 16. Rothb. p. 57. t. 5. f. 2. Hab. in India Pedunc. dichotomi. Culm. tenuis. Spicae pedunculatae, et solitariae sessiles in ramificationibus umbellae, minutissimae ut semina Milii. Lin.

* *bengalensis*, culm. tenoi nudo, umb. supradecomposita, involucre tetraphyllo, spicul. intermediis sessilib. ovatis (minutis): squamis concavo-carinatis mucronatis. Communis a cl. Richard, qui eum ex Bengaliam accepit. An diversa species?

67. *maritimus* (*riparius*), culm. triquetro, panic. conglobata foliaceis, spicularum squamis trifidis: intermedia subulata, involucre polyphylo Hab. in lacub. et fossis. 2-3 pedalis.

β. *macrostachyus*, culm. acute triquetro folioso, bracteis plurib. longissimis,

spic. sessilib. pedunculatisque crassis ovatis squamis subulatis. Michaux Flora. p. 32. Hab. in Carol. paludib. salis.

68. *compactus* (minor, spiculis omnibus sessilib. squamis trifidis, involuero diphylo. Kroecker Flor. Siles. t. 1. 15. Flor. dan. t. 937. Hab. in uliginosis subarcticis. Tam ob locum, quam parvitatem ab antecedente diversus.

69. *grossus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, spicis pellicellatis, involuero triphylo lanceolato-subulato longissimo. Lin. Suppl. 1. 101. Hab. in India. Culmus orygalis. Involucrum foliol. unico longissimo. Simillimus S. miliaceo, sed magnitudine diversus. L.

70. *Lusulae*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa prolifera, spiculis subrotundis. Lin. Pluk. mant. 97. t. 417. f. 3. Hab. in India. Involucrum universale polyphyllum 1 fol. ensiformib. umb. longioribus; partialia vitula. Capit. subrotunda, glomerata ex spiculis subrotundis.

71. *sylvaticus*, culm. triquetro folioso, umb. foliacea, pedunc. nudis supradecompositis dichotomis, spicis confertis. Flor. dan. t. 307. Lævers. t. 1. f. 4. Michaux, Flor. t. p. 33. *β. radicans*, culm. triquetro folioso, umb. foliacea, culmis sterilibus deflexis apice radicanibus. Schkuhr. Hoffm. germ. p. 26. Hab. in sylvarum fossis. T.

72. *aestivalis*, culm. depressis triquetris nudis, umb. compositis involucriatis, flor. monandris. Retz. obs. 4. p. 12. Hab. in fundo Buviurum essiccatorum Zeylonae. T.

73. *squarrosus*, culm. triquetro nudo foliosis setacis, spicis ternis sessilibus ovatis squarrosis. Mant. 181. Rottb. p. 49. t. 17. f. 5. Hab. in Ind. orientali. Involucr. diphyllum; spicae squam. subulatis, exstautibus, basi nodosis, valde imbricatis.

74. *dipsaceus*, culm. setacis triquetris, umb. simplici, capitulis oblongis squarrosis, flosc. subulatis recurvis diandris, germine echinato. Rottb. gram. 56. t. 12. f. 1. Hab. in India. Parvus. Involucr. 3-4 phyllum.

76. *funciformis*, culm. nudo filiformi subtrigono, paniculae spiculis sessilibus pedunculatisque, involuero diphylo. Retz. obs. 6. p. 19. Hab. in China.

76. *michelianus*, culm. triquetro, capitulo globoso, involucr. polyphylo longo. Lin. Bot. Annal. 1. p. 20. t. 2. Desf. atl. 1. p. 51. Till. pis. 55. t. 21. f. 5. Burth. cent. 1. p. 34. t. 55. f. 1. Hab. in Europa Aegypto et in Marocco.

77. *ciliaris*, culm. triquetro folioso, umb. sparsis, squamis calycinis aristis ciliatis. Mant. 182. Rottb. t. 17. f. 1. S. *pumbescens*. Desf. Atlant. 1. p. 52. Schousboe Maroc. ed. germ. p. 19. Hab. in India orientali et in Barbaria. Culmi palmares laxi. Spicae ovatae, hirtae pilis raris. Involucris locosaepe foliola 1. seu 2. parva.

***** Culmo triquetro, Capitulo terminali.

78. *hottentottus*, culm. triquetro folioso, capitulo globoso, squam. lanceolatis hirtis. Lin. Mant. 182. Thunb. prod. 18. Ad Cap. h. spci locis paludosis. Folia canina, 3, remotissima. Involucrum capituli triphyllum.

79. *antarcticus*, culm. triquetro nudo foliosis filiformib. capitulo globoso, involucr. triphylo. Mant. 181. Thunb. prod. 17. Scirpus barbatus, vaginis suboppositis ora superiori barbatis. Rottb. gram. 52. t. 17. f. 4? Pluk. alm. 175. t. 209. f. 3. Hab. ad Cap. h. spci et in Guinea. Spicae ovatae, trifariam imbricatae triquetrae.

80. *argenteus*, culm. setacis triquetris, involucr. tetraphyllo longissimo, spic. cylindricis plurimis in capitulum glomeratis. Rottb. p. 51. t. 17. f. 6. Rheed. mal. 12. p. 101. Hab. in India.

* 81. *monander*, culm. triquetro, involucr. triphylo longo, capitulo sessili glomerato, flosc. monandris. Rottb. p. 50. t. 14. f. 3. Hab. in India. Spic. ovato-teretes.

82. *cephalotes*, culm. triquetro nudo, capitulo ovato squarroso, involucr. triphylo longo. Lin. Willd. Sp. 1. p. 311. Houttuyn t. 88. f. 3. Hab. in India.

124. TRICHOPIHORUM. Spicul. subovatae, squamis undique imbricatis. Sem. setulae capilliformes (nec lanam densam referentes) denum longe exsertae numero definito sex. (Genus intermedium inter Scirpum et Eriophorum.)

1. *cyperinum*, culmo triquetro folioso, panicula decomposita, spiculis confertis ovatis, Scirpus Eriophorum. Michaux Flor. t. p. 31. Eriophorum cyperinum Lin. Willd. Spec. 1. p. 313. Hab. in Amer. boreali. Gram. altum.

2? *lineatum*, culm. folioso paniculato, spicul. ovato-oblongis; squamis lanceolatis subcarinatis. Scirp. lineatus. Michaux. l. c. Hab. in Carolina. Priori sub-simile.

3. *alpinum*, parvum, culm. nudo angulato spicato. Erioph. alpinum. Lin. Flor. dan. t. 620. Sowerb. engl. bot. t. 311. Hab. in Europae subalpinis.

♂ *hudsonianum*, majus, culm. nudo triquetro, fol. canaliculato - setaceis. Michaux. p. 34. Hab. ad sinum Hudsonis.

125. ERIOPHORUM. Glumæ paleaceæ undique imbricatæ. Sem. lana densa longissima cinctum.

* *Monostachya*.

1. *vaginatum*, culmis vaginatis teretibus, foliis triquetro - canaliculatis, spica ovata. Roth. N. Bot. Beyträge, 1. p. 45. Willd. Spec. 1. p. 312. Flor. dan. t. 236. Hab. in montosis uliginosis. Glum. acuminatæ.

2. *Scheuchzeri*, culm. basi vaginatis teretibus, fol. teretibus - canaliculatis, spica rotunda. Roth. l. c. Scheuchz. A. zoot. app. t. 7. E. capitatum. Hoffm. Flor. germ. ed. 2. p. 26. Hab. in albis rhaclicis et Salisburg. Glum. obtusæ.

** *Polystachia*, culm. foliosis teretibus.

3. *virginicum*, fol. angustia planis, apicis pluribus sessilibus. Willd. l. c. p. 313. Roth. l. c. p. 66. Hab. a Canada ad Carolinam. Flor. diantri Lana fulvescens. Mich.

4. *vulgare*, (polystachyum L.) fol. planis mucrone triquetro, spicis pedunculatis nutantibus involucrium subaequantibus. Leers herb. t. 1. f. 5. Engl. bot. t. 563. Cresc. in paludosis. Involuer. basi membranaceo-dilatatum, 2-3-phyllum.

5. *angustifolium*, fol. canaliculato-triquetris, spicis pedunculatis, seminibus ovalis. Roth l. c. p. 65. E. *polystachyon* Huds. Curt. Flor. lond. t. 9. Involuer. 3-phyll. foliol. linearia: unico spicis multo longiore. Cum prior; etiam in America crescit.

6 *gracile*, fol. triquetris sursum canaliculatis, spicis pedunculatis, sem. linearibus, involucrio panicula uplo brevior. Roth. p. 65. Ejusd. Cat. 2. append. E. triquetrum. Hoppe. Hab. in Palatinatu et alpi. salisburgensib.

126. VAGINARIA. Spica ovata squamis undique imbricatis. Stigm. 3. Seminibus involucrium (Perispermium) alternatim tripaleaceum et trisetum.

1. *Richardi*, Fuirena *scirpoidea*, culmo aphylo vaginato, spica unica:

squamis lanceolato-spathulatis. Michaux; Flor. p. 38. Hab. in Florida. Obs. Characteres hujus sequentiumque, ab eo constitutorum generum, concinnavit celeb. Richard.

127. FUIRENA. Squamæ mucronatæ in spiculis undique imbricatæ. Sem. involucrium latum, paleaceiforme. sæpius aristatum.

3. *umbellata*, umbellis compositis, spicis oblongis aggregatis sessilibus, fol. lanceolatis. Vahl. Eclog. Amer. 2. Roth. gram. p. 70. t. 19. f. 3. F. *paniculata*. Lin. suppl. p. 105. Hab. in utraque India.

2. *obtusiflora*, umb. subcompositis, spic. cylindricis utrinque obtusis squarrosis. Vahl. l. c. In Amer. meridionali. Fol. glabra? An a sequente diversa?

3. *squarrosa*, fol. ciliatis, spic. squarrosis, squamis petiolato-spathulatis. Michaux. Flor. 1. p. 37-38. Hab. in Georgia et Carolinae paludosis. Squamæ mucrones longi strigoso-squarrosi.

4. *canescens*, subinermis canescens; spicul. glomeratis, squamis mucrone erecto. Richard. Hab. in Africa.

128. HYTOLYTRUM. Spicula squamis undique imbricatis. Sem. involucrium glumam 3-4-valvem mentiens. Stam. 2-3. Stigm. 1-2.

1. *latifolium*, maximum glabrum, fol. lais trinerviis, corymbo decomposito. Hab. in India. Stam. 2. Rich.

2. *senegalense*, spicul. pluribus cespitatum congestis, squamis subacuminatis. Hab. in Senegal. Stam. 2. Stigm. 3. Rich.

3. *gracile*, fol. angustis, caule debili, spicul. 3. sessilibus subgloboso-ovatis, squamis spathulatis. Richard. Stam. 1. Stigm. 2.

129. DIPLASIA. Spica squamis undique imbricatis. Involucrium glumam 4-valvem mentiens. Stam. 7. Stigm. 2.

1. *Karataefolia*, fol. longissimis carina marginibus aculeatis, umb. decomposita. In Gujana. Fol. Bromeliac Karatas. Richard.

130. LEPIRONIA. Spicul. squamis orbiculatis cartilagineis. Sem. involucrium 16-paleaceum. Stam. 4-6.

1. *mucronata*. Hab. in Madagascar.

Aphylla. Culm. nodosus infra apicem 1-stachyus. Spica ovato-oblonga. Rich.

131. CHRYSITRIX. Spica imbricata squamis coriaceis setaceis. Stam. multa, inter singulas squamas singula.

1. *capensis*, Lin. fl. gen. gram. p. 27. f. 1. 2. Hab. ad. Cap. b. spec. Spica lateralis. An antecedens hujus generis?

** GRAMINA. Flor. glutacei, 3-andri.

Rad. fibrosa. Culmi ut plurimum fistulosi, articulati, simplices aut basi ramosi. Fol. linearia, vaginantia, vagina latere fissili, apice membrana albida distincta, quae ligula aut stipula nuncupatur. Flor. spicati, racemosi, plerumque paniculati, rarissime foliis involucri (ut in priore familia); nonnulli saepius abortivi; alii polygami; pauci monoci. Stam. in plurimis tria (qualia gramina hac in serie solummodo enumerantur), in nonnullis sex (vid. Clas. Hexandrium), aut plura. Styl. communiter duo, in quibusdam 1. plerumque tamen bifidus. In unico tantummodo gramine stigmata tria observata sunt. Glumae inferiores in raulis semen maturum incrustant et cum eo indurantur.

MONOGYNIA.

132. LYGEUM. Flores intra spatham convolutam gemini. Cal. basi in tubum 2-locularem villosum conerescens, 2-valvis.

1. *Spartum*, Lin. Willd. Sp. 1. p. 316. Richard in Act. Soc. Hist. nat. Paris. p. 28. t. 3. Hab. in Hispania. Tr. Flor. omnium graminum maximi, interdum 3 intra involucrium. Styl. longus.

133. CORNUCOPIE. Involuer. cyathiforme. Cal. 1-phyllus, 2-partitus. Cor. 1-valvis, superne hinc fissi. Styl. brevis; Stigm. 2. (raro 1.) longissima. (Richard.)

1. *cucullatum*, spica mutica, involucrio arcuato. Lin. Smith specil. bot. t. 14. Willd. l. c. p. 319. Hab. in Oriente. ©

2. *alopecurioides*, spica aristata. Lin. Mant. p. 29. Hab. in Italia. Similis *Alopec. pratensis*, vagina supremi fol. ventricosa. Involuer. hemisphaericum integerrimum. Lin.

134. CENCHRUS. Involuer. laciniatum, echinatum 3-4-florum. Cal.

2-valvis, 2-florum. Cor. 2-valvis, mutica. Styl. 2-fidus.

1. *tappaceus*, paniculae patens ramis simplicissimis, cor. retrorsum hispida, cal. trivalvis bifloris Lin. Willd. Spec. 1. p. 315. Hab. in India. Fol. cordato-lanceolata. Involuer. 0? Hujus generis non videtur. An Panicum?

2. *capitatus*, spica ovata simplici. Col. ecph. 1. p. 340 t. 338. f. 1. Barr. rar. t. 28. f. 1. *Echinaria capitata*. Desf. atl. 2. p. 385. Hab. in Gallia, Italia et Barbaria. ©

3. *echinatus*, spica oblonga conglomerata, involuer. subgloboso 10-partito. Schreb. gram. 9. t. 23. f. 1. Cav. ic. 5. p. 39. t. 462. Pluk. alm. 177. t. 92. f. 3. Hab. in Americae et Barbar. arvis.

4. *tribuloides*, spica glomerata, glumis femineis globosis mucronato-spinosis hirsutis. L. Michaux Fl. 1. p. 61. Sloan. jam. 30. hist. 1. p. 108. t. 65. f. 1. Moric. hist. 3. p. 135. s. 8. t. 5. f. 4. Hab. in Virginiae maritimis. ©

5. *caliculatus*, culm. simplici erecto, spica glomerata, involucrio polyphylo setaceo. Cav. l. c. t. 463. Hab. in Americor. insula Bahae. Fl. aequale. Involuer. foliola subduodecim seculis rigilis, tomentosa, apice glabra. C.

6. *spinifex*, culmo ramoso, fol. brevibus cordato-lanceolatis, involuer. integerrimo echinato. Cav. ic. 5. p. 38. t. 461. Hab. in regno chileusi, et in Montevideo. Flor. januario.

7. *rufescens*, fol. clabris, spica elongata, involuer. confertis sciformibus (rufescentib.) inferne villosis, cal. sub-2-floro. Desf. atl. 2. p. 388. Hab. in arciosis prop. Mascar.

8. *hordeiformis*, fol. retrorsum asperis, involuer. setosis flore 4-plo longioribus, inferne (albis) villosis, cal. 1-2-floro. Desf. l. c. (*C. asperifolius*). Willd. sp. p. 318. *Alopecurus hordeiformis*, Lin. Hab. in Asia et Africa.

9. *geniculatus*, racemo spicato simplici, flor. involucrio polyphylo scabro, culmo geniculato. Thunb. prod. 24. Hab. ad Cap. b. spel.

10. *purpurascens*, racemo spicato simplici, flosculis circumvallatis arsis longissimis, culmo erecto. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 329. Willd. l. c. in Japonia. Arist. purpureae.

11. *frutescens*, capit. lateralibus sessilibus, fol. mucronatis, caule fruticoso.

Hab. ad Cap. b. spei Cul. palmares. Fol. angusta subulso pilosa.

3. *punctatum*, panic. ramis simplicissimis, flor. alternis geminis secundis. Amoen. acad. 5. p. 39a. Hab. in Jamaicae graminosis, udis.

4. *lentigerum*, panicula subspicata, flor. aristati. Schreb. gram. 14. t. 23. f. 3. Vahl. symbol. 2. p. 18. Agrostis australis. Lin. Mant. 30. Gouan. hort. 36. t. 1. f. 2. Alopecurus ventricosus. Hud. Pluk. alm. 377. t. 33. f. 6. Hab. Montpellier, in Anglia et Aegypto.

5. *compressum*, spicis subternis, flos. alternis muticis rachis adpressis, culmo medio articulo-compresso, pedunc. longissimis. Swartz prod. 24. Fl. p. 183. Hab. in Jamaica et India occidentali. Sem. compressum. S. T.

6. *digitatum*, spicis digitatis subquaternis subsessilib., flos. muticis appressis secundis. fol. margine cartilagin. o-serratis. Swartz. Flor. p. 181.

7. *cimicinum*, racemis digitatis, calyce. valv. exteriori ciliato. Mant. 184. Panicum Retz. Obs. 3. p. 9. Hab. in Malabar. Flor. cum semine lapsi ob cilia cimicem quamdam referunt. Lam. enc. 1. p. 59. n. 19. In Jamaica, pravis arborib. C.

8. *panicum*, spicis subdigitatis alternis patentibus filiformibus; flosculis secundis muticis pedicellatis trigonis. Swartz Flor. p. 179. Hab. in Jamaica. Distinctum a M. cimicino. L.

9. *effusum*, flor. verticillato-paniculatis dispersis muticis. Lin. Flor. dan. t. 1543. Leers. 1. 8. f. 7. Hab. in nemoribus. T.

10. *confertum*, asperum, panicula coarctata, flor. coloratis muticis. Mill. dict. n. 4. Hab. in Helvetia et Gallia. Distincta species.

11. *globosum*, panic. patula, glumis muticis, pedicellis cingulo luteo. Thunb. Jap. p. 49. Hab. in Japonia.

12. *caerulescens*, flor. paniculatis aristatis, aristas gluma breviorib. Schousb. maroc. 1. p. 34. Desf. atlant. 1. p. 66. t. 12. In fissuris rupium Atlantis et circa urbem St. Crucis.

13. *paradoxum*, flor. paniculatis aristatis. Schreb. gram. t. 28. f. 2. Agrostis-Sauv. Monyp. 45. Hab. in Gallia meridionali, Carniola. Panicula alba. Semen nigrum.

14. *villosum*, panicula laxa, flos. muticis, calycibus lanatis. Swartz prod. 24. Andropogon insulare. Lin. Amoen. acad.

5. p. 412. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 43. t. 14. f. 2. Hab. in Jamaica. C.

15. *ramosum*, culmo ramoso, flor. paniculatis sublanatis hirsutis. Retz. obs. 6. p. 22. Hab. in India orientali.

146. AGROSTIS. Cal. 2-valvis, unilobus, valv. acutis. Cor. 2-valvis. Stigm. longitudinaliter hispida, s. plumosa. (Flosc. patententes.)

* Aristatae.

1. *Spica venti*, petalo exteriori arista recta striata longissima, panicula patula. L. Willd. Sp. 1. p. 361. Leers herb. t. 4. f. 1. Hab. inter segetes. C.

2. *interrupta*, petalo exteriori aristato, panic. attenuata coarctata interrupta. Vaill. 88. t. 71. f. 4. (bona.) Hab. in Europa australiori. Virescens. Aristae longiusculae.

3. *spicaeformis*, panic. spicaeformi, flosc. liaristatis; arista alicui receptaculo inserta geniculata longiori, altera infra apicem corollae rectis, cor. hirsutis. Lin. suppl. p. 108. Hab. in Teneriffa.

4. *hirsuta*, panic. subspicata, culmo folisque hirsutis, cor. dorso aristatis, apice bifidis. Lin. suppl. 108. Cresc. cum priore.

5. *miliacea*, petalo exteriori arista terminali recta mediocri, flor. ovatis lac-vibus. Gouan. illustr. 3. Hab. in Hispania, Gallia et Sibiria. T.

6. *bromoides*, panic. simplici angustata, cor. pubescente; arista recta calyce longiore. Mant. 30. Gouan. illustr. 3. t. 1. f. 3. Hab. Montpellier. Cor. arista recta, scabra, calyce duplo triplove longior ut in Bromis. L.

7. *arundinacea*, panic. oblonga, petalo exteriori deorsum villosa, basi aristato, arista torta calyce longiore. Lin. Calamagrostis arundinacea. Roth. germ. t. 33. II. 89. Hab. in rupestrib. sylvis, glaucosis juniperetis. Pallescens. T.

8. *Calamagrostis*, panic. incrassata, petalo exteriori lato lanato apice aristato, culmo ramoso. Hab. in Helvetiae, Veronae alpinis. Panic. densa.

9. *serotina*, panic. flosculis oblongis mucronatis, culmo obiecto fol. brevissimis. L. Mant. 30. Segu. ver. 3. p. 146. t. 3. f. 2. Hab. Veronae. Fol. brevia, vix articulis longiora, patentia.

10. *rubra*, panic. primo contracta; flore patente, petalo exteriori glabro, arista terminali tortili recurva.

Roth. germ. 1. 31. II. 81. Hab. in Anglia, Sinecia vulgaris. Panic. rubescens.

11. *stricta*, panic. elongata stricta, cor. calyce minoribus, arista e basi petali, torilli, flore longiore. Willd. Sp. 1. p. 366. Hab. in America boreali. Affinis praecedenti. Fol. plana angusta linearia. Ligula lacera. Cor. tenera membranacea. W.

12. *ovata*, petalo exteriori ante apicem aristato; panic. ovata coarctata spiciformi. Forst prod. n. 40. Hab. in nova Zeelandia.

13. *canina*, calycib. ovalis coloratis, arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. Leers. t. 4. f. 2. Smith brit. 78. Hab. in pascuis graminosis. Arista setacea alba, medio notata geniculo fusco. L.

14. *alpina*, fol. setaceis, panicula coarctata, calycib. hispidiusculis coloratis; petalo exteriori truncato, arista dorsali geniculata. Leyser. halens. n. 67. ed. 2. p. 34. Scheuch. gram. prod. 22. t. 4. f. 1. Hab. in alpidibus inque montibus Saxoniae. ☉

15. *rupestris*, fol. filiformi-setacea, panicula patula, calycib. hispidiusculis patentibus coloratis, petalo exteriori arista dorsali geniculata flore duplo longiore. Willd. p. 368. Allion. pedem. n. 2161. Hab. in Helvetiae, Bohemiae, Italiae rupestris. Floresculi stramineo-fusci nec violacei. W. ☉

16. *setacea*, cal. lanceolatis, cor. basi aristata; arista geniculata, fol. radicalibus setaceis. Smith. brit. p. 79. Curt. Flor. lond. t. 12. Agr. alpina. Withering. Hab. in Angliae ericetis aridis. Fol. glaucescentia.

17. *littoralis*, cal. lineari-lanceolatis aristatis, cor. nuda, arista subterminali recta, culm. decumbentibus. Smith. Fl. brit. 1. p. 78. Withering Flor. t. 23. Hab. in littoribus marinis lutosi. Flor. Augusto.

18. *compressa*, panic. coarctata, calycib. aequalibus laevib. cor. infra apicem brevissime aristatis. Willd. A. dubia, cal. aequalibus laevib. cor. infra apicem mucronatis, fol. setaceis. Leers herb. t. 4. f. 4. Hab. in Germania.

19. *vinetis*, calycib. coloratis, petalor. arista dorsali longitudine fere calycis, culmis ascendentibus. Schreb. apicil. 37. n. 977. Hoffm. germ. 35. Hab. Lipsiae in agris, collib. panum. Var. flosc. muticis. Priori affinis ☉

☉ ? *gigantea*, panic. parte superiore patentissima, calycibus hispidis, petalo teriore glabro, dorso superne subaristato,

culmo erecto. Roth. Fl. germ. I. p. 31. Willd. l. c. Crescit ad ripas fluviorum. ☉

* * Muticae.

20. *capillaris*, panic. capillari patente flexuosa, calycib. subulatis aequalibus glabris coloratis muticis. Smith. ic. ined. fasc. 3. p. 54. t. 52. Willd. l. c. Agrostis capillaris. Lin. Sp. plant. ed. 2. p. 91. Hab. in Lapponiae alpidibus, etiam in Lusitania secundum Swartz in bot. Journ. 2. p. 22.

21. *vulgaris*, panic. patente, ramulis divaricatis capillarib., cal. aequalibus, petalo interiori duplo brevioris retuso. Smith brit. 1. p. 79. Hoffm. germ. ed. 2. p. 36. A. hispida. Willd. Spec. 1. p. 370. Ag. capillaris Auctorum. Leers. t. 4. f. 3.

☉ *pumila*. Lin., minor, culm. fasciculatis, sem. usitagine corruptis inclusis. Lightf. Scot. ic. in titulo. v. 2.

☉ *sylvatica*, panic. coarctata, cal. aequalibus; virgineis cor. brevioribus, toecundatis (ustilago) duplo longioribus. Lin. vid. Steinbuch im Naturforscher (promtuarium germanic.) Fasc. p. 233. t. 5. Smith. l. c.

22. *stolonifera*, panic. coarctata, culm. ramoso repente, flor. congestis, cal. aequalibus lanceolatis pubescentibus. Smith. l. c. Martin Flor. rustica t. 120.

☉ ? *coarctata*, panic. contracta, cal. subaequalibus, cor. brevioribus obtusis hispidulis; fol. angustis Hoffm. l. c. 37.

☉ *dulcis*, panic. densa breviuscula interrupta, flor. fasciculatis subsessilibus.

☉ *gracilis*, caespitosa, culm. gracili subdecumbente, panic. in spicam cylindricam coarctata, flosc. glabris subnullis. Hab. in arvis, pratis, sylvaticis, collibus. Obs. An recensitas varietates hinc aut ad *albam* pertineant, aut distinctae species sint, determinare haecenus nequeo. var. ☉ sub nomine Agr. dulcis *Sibthorpii* hinc inde collitur, etiam e Sicilia habro. In var. ☉, quam circa Lugdunum Gallorum collegi, glumae glaberrimae sunt, sed pollicelli subincrassati hispiduli ut vere in A. *alba*.

23. *pyramidata*, panic. patente parva pyramidata, cal. cor. longioribus vaginis ore pilosis. Lam. Ill. gen. p. 161. Hab. in Amer. meridionali.

24. *barbata*, panic. contracta subspicata, cal. inaequalibus, vaginis barbatis. A. littoralis Lam. ill. p. 161. Hab. in Amer. meridional. Rich.

P. senegalensis, ramis panicula longioribus. Lam. l. c. In Senegal.

25. *alba*, panicula laxa, calycibus muticis aequalibus, culmo repente.

A. palustris, panic. coarctata mutica, cal. aequalibus hispidiusculis, culm. repente. Hud. angl. 27. Flor. opaci subpurpureae. denum pallescunt.

P. verticillata, panic. subinterrupta, flor. fasciculatis subaequilibus nitidis, glum. muticis. Villars Dauph. 2. p. 74. Flor. virescunt. Cisteris specieb. europaeis major. Hab. in pratis humilibus.

26. *diandra*, panic. elongata contracta, floribus subulatis muticis diandris, foliis convolutis. Retz. obs. 5. p. 19. Hab. in India.

27. *ciliata*, panicula mutica, gluma calycina angulata ciliata. Thunb. jap. 49. Hab. in Japonia.

28. *capensis*, panicula spicata cylindrica mutica, culmo nutante. Willd. A. spicata. Thunb. prod. 19. Hab. ad Cap. b. spci.

29. *pungens*, panic. contracta spicaeformi, fol. involutis rigidis pungentib. superioribus oblique oppositis, culmo ramoso. Schreb. gram. 2. p. 46. t. 2. f. 3. Lam. enc. 1. p. 59. A. Vir. indica Lin. Willd. sp. 1. p. 373. Hab. in maritimis Hispaniae, Galliae australis, etiam in America, Africa et Oriente. \bar{L}

30. *spicata*, panic. spicata, fol. involutis rigidis, in geniculis coarctatis, ramis infractis. Vahl. symbol 1. p. 9. A. virginica sarmentis repentibus fol. convolutis ciliatis. Forst. descript. p. 20. Hab. in Arabiae desertis. \bar{L}

31. *maritima*, panic. spicata, ramulis brevissimis, cal. muticis laevibus aequalib. fol. involutis. Lam. ill. p. 161. enc. 1. p. 61. In arenosis maritimis prope Narbonne. Spic. fere ut in Poa cristata L. Hab. in desertis arenosis Arabiae. \bar{h}

32. *mexicana*, panicula oblonga congesta, cal. corollaeque acuminatis subaequalib. muticis, radice tuberosa. Hab. in America calidior. Corollae. basi pilosae. Aristae nullae. Facies Cinnae. \bar{L}

33. *corumandolina*, panic. ovata patente, pedunc. simplicibus, flor. secundis muticis, cal. aequalib. acutis nitidis. Retz. obs. 4. p. 19. Vahl. symbol. 1. p. 10. Hab. in aridulis duris Malabaricae, Arabiae.

34. *tenacissima*, panic. contracta

filiformi, flor. muticis linearibus valvulis parallelis. Lin. suppl. 107. Hab. in India orientali. Radix dura caespitosa, culmis pluribus. Panic. filiformis, floribus adpressis.

35. *purpurascens*, panic. coarctata elongata, ramis adpressis erectis, flosc. inaequalibus acuminatis. Swartz prod. 25. c. Flor. p. 185. Hab. in Jamaica. Facies Aerae caespitosae. Sw. Sequenti affinis.

36. *indica*, panic. contracta spicaeformi longissima, fol. vaginantibus spicam subaequantib. Sloan. jans. 35. hist. 1. p. 115. t. 73. f. 1. A. elongata. Lam. ill. p. 162. Hab. in Indiae occidentalis subhumidulis. Panic. oblonga viridis e racemis lateralibus alternis, rachis approximatis. Lin.

37. *procera*, panic. pedunculis racemosis erectiusculis, flor. hirsutis muticis lanceolatis. Retz. obs. 4. p. 19. Hab. in graminosis subhumidulis Malabaricae.

38. *linearis*, spic. subquaternis digitatis, flosc. unilaceralibus alternis adpressis muticis. Retz. obs. 4. p. 19. Hab. in India ad vias tempore pulviscos.

39. *lenta*, spic. subternis umbellatis, flosc. muticis oblongis acutis, valvulis cal. subaequalibus, fol. vaginisque glabris. Ait. Kew. 1. p. 46. Hab. in India. \odot

40. *stellata*, spic. quaternis umbellatis, flosc. muticis ovalis compressis, valvulis cal. inaequalibus, fol. vaginisque glabris. Willd. p. 376. Hab. in Insula St. Helena. Spicae quaternae basi folio involutae. W.

41. *STURMIA*. Cal. 2-valvis: valv. aequalibus truncatis. Cor. minor, 2-valvis ovata lanuginosa, mutica. (Spica filiformis, flor. alternis sessilibus.)

1. *verna*. Agrostis minima. L. Willd. Spec. 1. p. 372. Hoppe in Sturm. Flor. germ. icon. Hab. in Europ. australis agris, ruderalis; Vere.

42. *AIRA*. Cal. nitens, 2-valvis, 2-flores. Cor. 2-valvis, mutica aut basi aristata.

* Muticae.

1. *arundinacea*, panicula oblonga secunda mutica imbricata, foliis planis. Sp. pl. 95. Willd. Sp. 1. p. 376. Hab. in Oriente.

2. *minuta*, panicula laxa subfastigiata ramosissima, flosc. muticis. Loefl. it. 117. Schreb. gram. 1. 21. f. 2. Hab. in Hisp.

3. *aqualica*, panic. patente, flor. muticis lacubus cal. longiorib., fol. planis l. Poa siroi es. Koeler. Vall. paris. 89. t. 17. f. 7. Obs. An ob affinitatem cum Poa distantante ad Poas amandanda? Hab. in aquosis.

4. *caerulea*, panicul. coarctata, flor. conico-cylindricis. Melica. Lin. Leers. t. 4. f. 7. Molinia caerulea. Koeler gram. p. 145. Hab. in pratis, pascuis sylvisque udis. Habitus arundinaceus, var. praesertim major sylvatica. Culm. fere enodus. Forc. distincti generis. Interdum flosc. incompleti rudimentum adest.

5. *melicoides*, panic. subracematim coarctata, flor. majusculis linear-lanceolatis muticis basi villosis: rudimento flosculi pedicellato. Michaux l. c. Hab. in Canada.

Obs. Ex secundi flosculi basi nascitur pedicellus elongatus villosus flor. rudimento vix perceptibili terminatus Mich. l. c.

6. *obtusata*, panic. oblonga racemosa, fol. angustis, cal. valv. altera linear; altera obovati, flor. muticis apice compressis, Michaux Flor. p. 62. Hab. in Carolinae aridis.

7. *involutrata*, panic. patente, basi setaceo-involucrata, flor. muticis longitudine cal., fol. convolutis. Willd. l. c. Cavan. ic. t. p. 33. n. 48. tab. 44. f. 1. Hab. in collibus sterilibus Hispaniae. ☉

•• Aristatae.

8. *subspicata*, fol. planis, panic. spicata flosc. medio aristatis: arista reflexa laeviore. Lin. Planta adhuc dubia, forte Koeleriae generis? Hab. in Helvetiae, Lapponiae alpidibus. ☿

9. *caespitosa*, fol. planis nervosis, panic. patente, petalis basi villosis aristatisque: arista recta brevi. Lin. Leers t. 4. f. 8. Hab. in Europae pratis. Panic. nitens. Fol. scabro, plicata. ☿

10. *ambigua*, fol. subsetaceis, panic. ampla pyramidata, glum. flavescentibus, petalis basi brevistaratis villosisque. Mich. p. 61. Hab. circa lacus Mistassins.

11. *flexuosa*, fol. setaceis, culmis subnatis, panic. divaricata, pedunc. flexuosis l. Flor. dan. 157. Leers. t. 3. f. 1. Scheuch. gram. t. 6. f. 1. Hab. in arenosis.

12. *montana*, fol. setaceis, panic. coarctata flosc. basi pilosis aristatis: arista tortili longiore. Leers t. 5. f. 2. Hab. in montosis. An prioris junior planta?

13. *alpina*, fol. subulatis, panic. dense

flosc. basi pilosis aristatis: arista brevissima. Scheuch. gram. 222. Hab. in alpidibus.

14. *antarctica*, fol. planis, panic. composita patente, calycib. trifloris, flosc. medio aristatis, arista elongata rectiuscula. Forst. prod. 41. Hab. in Nova Zeelandia. An Avena?

15. *canescens*, fol. setaceis: summo spatheo paniculam inferne involvente, aristis clavatis cal. brevioribus. Hab. in arenosis, Panicula deflorata e vagina exit. Fol. glauca.

16. *articulata*, paniculata, e. l. flosculo longiore acuto, arista clavata medio nodosa e basi glumae prodeunte. Desf. Atl. t. p. 70. t. 13. Prope Mascara in arvis. Fol. glauca lata: spica convoluta. D.

17. *chinensis*, fol. setaceis, panicula erecta, flosc. aristatis villosis. Retz. obs. 3. p. 10. Hab. in China.

18. *praecox*, fol. setaceis: vaginis angulatis, flor. subspic. flosculis basi aristatis. Flor. dan. t. 383. Smith angl. t. p. 87. Hab. in campis arenosis et sylvaticis. Flosc. basi nudis, dorso aristatis. Smith.

19. *caryophyllea*, fol. setaceis, panic. divaricata trichotoma, flor. aristatis distantibus. Leers t. 7. f. 7. Hall. helv. n. 1482. Hab. in Angliae, Germaniae, Galliae glaucosis. ☉

20. *setacea*, fol. setaceis, panic. diffusa, flosc. basi pilosis: inferiore mutico, superiore arista brevi. Retz. obs. 3. p. 10.

21. MELICA. Panic. spicae aut racemiformis. Cal. coloratus, 2-valvis, 2-florus: glum. laxae, chartae membranaceae, inaequales. Cor. 2-valvis, ventricosa, minor. Rudim. floris.

1. *ciliata*, spicata, flosculi inferioris petalo ciliato l. Hab. in collibus sterilib. saxosis. Pallescens. ☿

2. *decumbens*, corol. hirsutis, flosc. racemosis nutantibus, culmo decumbente. Thunb. prod. 21. Ad cap. 6. Sp.

3. *racemosa*, corol. hirsutis, racemis cernuis, culmo erecto. Thunb. prod. 21.

4. *nutans*, cal. bifloro, petalis imberbibus, panicula nutante simplici. Schreb. gram. 62 t. 6. f. 2. M. montana. Lam. enc. Hab. in Europae frigidioris sylvaticis montosis. Flor. subscandis majusculi pedicellis breviusculis. Cor. subsulcata. Cum sequente ut plurimum confunditur.

5. *uniflora*, panic. suberecta divisa cal. unifloro. Retz. obs. 1. p. 10. Willd. Spec. 1. p. 383. M. Lobelii, panic. ramosa, fol. vaginis acuminata oppositifolia, radice repente. Villars delph. 2. p. 90. 1. 3. f. 3. Passum cum priore, cui similis. T.

6. *minuta*, culmo ramoso, fol. setaceis, petalis imberbibus. Lin. Mant. 32. Hab. in Italia. Racemi simplices, capillares, pauciflori. Cal. livalvis ovatus, flosculis dimidio brevior. Planta dubia.

7. *setacea*, flor. racemosis, fol. setaceis subuliculis, petalis subbarbatis. Hab. in Gallis prope Beaucuire. Fol. laevia.

8. *aspera*, fol. angustis conniventibus, panic. patente pyramidata, glumis imberbibus. Desf. Atl. 1. p. 71. Barrel. t. 95. f. 1. Hab. in fissuris rupium in Atlant. Vag. striata. Flor. racemosis, unilaterales. Cal. 3-florus. Desf.

9. *pyramidalis*, panic. patente pyramidata, glumis variis, fol. latiusculis subconvolutis. Lam. ill. p. 179. Morison sec. 8. t. 7. f. 1. Hab. in Barbaria, et Europa australi. B. Cor. subvillosis. Gmel. sib. 1. t. 19. f. 1.

10. *laxiflora*, panic. ramis divaricatis capillarib. multifloris, cor. altera ciliata. Cav. ic. 5. p. 48. t. 473. f. 2. Hab. in regno Chilensis.

11. *glabra*, tota glabra. panic. erecta laxa; ramis simplicibus paucifloris, flor. glumis imberbibus. Michaux Flor. p. 64. Mori. hist. 3. s. 8. t. 7. f. 51. In Virginia et Florida.

12. *papilionacea*, calycis valvula inferiore maxima colorata, petalo exteriori subciliato. L. Mant. 11. in Brasiliana. Ard. spec. 2. p. 17. 1. 6. f. 1. 2. Hab. in Brasilia. Forte una ex sequentibus huc pertinet.

13. *aurantiaca*, panic. subspicata, cal. valvula exteriori maxima aurantia. Cav. ic. 5. p. 46. t. 472. f. 1. Lam. enc. 4. p. 70. Hab. in vicinis Montevideo in Amer. Fol. subvillosa.

14. *violacea*, panic. subspicata secunda, cor. violaceis ciliatis, calyc. valvula exteriori argentea apice denticulata. Cav. l. c. Hab. in regno Chilensi. Priori affinis.

15. *rigida*, panic. subspicata secunda, cal. corollis aequali; barum valv. altera ciliata. Cav. ic. 5. p. 47. t. 473. f. 1. Creac. in Montevideo. Fol. superioris vagina spatulaeformis; ligula multifida. Cav.

16. *altissima*, panic. coarctata spicaeformi, petal. imberbibus. Willd. spec.

p. 385. Gmel. sib. 1. p. 98. t. 20. Hab. in Sibiria. Flos. majusculi oblongi pallidi.

17. *interrupta*, spica elongata interrupta flosculis oblongis linearibus coloratis imberbibus. In hortis subinde colitur.

150. *HOLCUS*. Flor. (polygami) paniculati. Cal. 2-florus, 2-valvis, (opacus, nervosus). Cor. minor: valv. altera aristata. Nectar. lineare, 2-partitum. Stigm. subsessilia.

1. *lanatus*, glumis villosis mucronatis, flor. masculi arista iacurva, fol. vagina tumida villosa. Lin. Leers t. 2. f. 6. Schreb. gram. 1. 20 f. 1. Hab. ubique in pratis. Rad. fibrosa. Glumae calycinae mucrone longiusculo distinctae.

2. *mollis*, subglabra, r. l. repente, glum. nudiusculis, arista geniculata exserta. Lin. Smith. angl. 1. p. 89. Schreb. l. c. f. 2. Curt. Lond. ic. Hab. in arvis et nemorosis. Panic. subflavescentes demum. Flor. omnes hermaphroditi.

Obs. Reliquas Linnæi species, quarum descriptiones videntur apud Reichard, Syst. pl. 4. p. 307-309, omisi, cum nesciam an jure sub hoc militent genere: forte pleraque Airæ sunt. *Sorghis* species vide infra.

151. *PHALARIS*. Cal. 1-florus, 2-valvis: valvulis subovatis dorso membranaceo-carinatis, ant. lanceolatis, aequalibus, nervosis. Cor. inclusa, 2-valvis, basi pilosa (sæpius.)

1. *arundinacea*, panicula oblonga ventricosa coarctata, glumis acuminatis. Lin. Arundo colorata. Ait. Willd. Spec. 1. p. 457. Hab. in praes. humidis et ad ripas. In hortis colitur var. fol. lineis albis pictis. Semina nitida. Holcum refert.

2. *canariensis*, panic. spiciformi ovata, glumis calycinis navicularibus integris, cor. 1-valvi: valvulis exterioribus lanceolatis glabris, interioribus villosis. Act. Kew. 1. p. 85. Willd. Sp. 1. p. 386. Schreb. t. 10 f. 2. Hab. in Canariis inter segetes, hinc inde in Europa colitur. ☉

3. *aquatica*, spica cylindrica glum. navicularibus denticulatis, cor. 3-valvi: valvulis interiorib. villosis; exteriori minutula subulata. Act. L. c. p. 86. Ph. minor. Retz Obs. 3. p. 8. Barr. rar. t. 700. f. 1. Hab. in Aegypto et ad Tiberim.

4. *saliva*, spica cylindrica, glumis es-

rinatis glabris margine membranaceis. *P. Bellardi*, Willd. in N. Act. berol. v. 3. *P. Bulbosa*, Lin. Hab. in Italia, Oriente et etiam his in locis quasi sponte. Pro avicularum canariensium nutrimento in nonnullis regionibus colitur, et in Europam deportatur, cfr. Desf. Atl. t. p. Rud. in paucissimis bulbosa seu fibrosa.

5. *tuberosa*, spica mutica subcylindrica glumis apice crenatis, culmo basi globoso-tuberoso. *Ph. bulbosa*, Cav. ic. t. p. 46. t. 64. Hab. in Hispania. Culm. basi bulbis saepe tribus globosis, concatenatis. C.

6. *capensis*, panic. spicata ovata, glum. integris, culmo geniculato decumbente. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spci.

7. *arenaria*, spica obovata, glumis cal. integerrimis ciliatis vagin. ventricosa. Phleum spica ovata ciliata, canic. ramo. L. in. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 8. Crypsis. Desf. Atlant. t. p. 61. Hab. in Europae et Barbar. arenosis. Cal. cor. multo major: glumis lanceolatis. ☉

8. *alpina*, panic. cylindrica spiciformi, glumis calycinis mucronatis carinatis. dorso ciliatis. Willd. l. c. Hab. in alpinis.

9. *paradoxa*, panic. mutica oblonga spiciformi, glumis calycinis navicularibus unidentatis, corolla bivalvi glabra, foec. infimis praemortuis. Ait. l. c. Linn. fil. dec. 35. t. 18. Schreb. gram. t. 12. *Ph. praemorsa*. Lam. ill. p. 164. Hab. in Oriente et Lusitania.

10. *eruciformis*, panicul. secunda lineari, cal. 1-2 foris. Lin. Cynosurus eruciformis. Ait. Willd. Sp. t. p. 412. Barr. rar. t. 29. Gmel. sib. t. t. 29. Hab. in Europa australi, Sibiria et ad fretum Hudsonis.

11. *villosa*, panic. multiflora stricta, flor. obovatis villis. Michaux Flor. p. 43. In sylvis Carolinae, habitu recedit.

152. **CRYPISIS**, *Cal.* 2-valvis, *Cor.* 2-valvis, longior. *Stam.* 2-3. Spica folior. vagina involucreta; seu flor. in capitulum foliatum congestis.

1. *aculeata*, caule ramosissimo, spic. capitato-hemisphaericois, fol. vaginantibus brevibus pungentibus cinctis. Willd. Spec. p. 158. Lam. ill. gen. t. p. 166. t. 42. f. 2. Anthoxant. aculeatum. L. Moris. hist. 3. p. 195. s. 8. t. 5. f. 3. Hab. in Europae australis locis petrosis glareosis, etiam in Barbaria. ☉

2. *Schoenoides*, spic. ovatis vagina fo-

lissae cinctis, caul. romoso procumbente. Lam. l. c. f. 1. Phleum schoenoides. L. Jacq. Fl. austr. app. 4. 7. *Spartina phleoides*. Roth N. Bot. Beytr. 3. p. 101. Hab. in Italia, Gall. australi, Hisp. et Smyrnae Antecedente dimidio fere major. ☉

153. **PHLEUM**, *Cal.* (induratus) 2-valvis: valv. linearibus, apice retuso seu carina prominente utrinque bicuspidato. *Cor.* inclusa. (Flor. spicati.)

* *Spica composita.*

1. *Phalaris*, spica composita cylindrica, glumis ciliatis cernatis mollioribus. *Phalaris phleoides* L. Flor. dan. t. 511. Engl. bot. t. 459. Hab. in versuris agrorum. Cal. minus retuso et teneriore Phalaridi affine. ☉

2. *asperum*, spica composita cylindrica, cal. gibbo aequo. Villars dauph. s. p. 61. t. 2. f. 4. *Ph. viride*. Allioni. Phalaris. Retz. Willd. Sp. t. p. 328. Hab. in Europa australi. Cal. subcartilagineus, fere glaber. ☉

3. *dentatum*, spic. subpaniculata cylindrica, glumis serratis, culm. geniculato. Thunb. prod. p. 19. Lin. suppl. p. 106. sub Phalar. Hab. ad Cap. b. spci. Glum. carina cartilaginea dentata: dentib. globosis. ☉

** *Spica simplicis.*

4. *pratense*, spica cylindrica ciliata elongata, culmo erecto. Lin. Leers. Herb. t. 3. f. 1. Schreb. gram. t. 14. Hab. in pratis, ad versuras. ☉

5. *alpinum*, spica villota ovato-cylindrica. L. P. spica ovatis hirsutis, locustis longe hieornilis. Hall. helv. n. 1529. Hab. in alpinis. Spica nigrescens s. atro-purpurea.

6. *Gerardi*, spica subrotunda, glumis ciliatis, culmo simplici, vaginis ventricosis. Gerard prov. 78. n. 4. Jacq. ic. rar. 2. t. 301. Hab. in summis alpinis Europae austral. Stylus uniens? cfr. Jacq. ic. 301

7. *nodosum*, spica subcylindrica parva, culm. ascendente, fol. pliquis radice bulbosa. Flor. dan. t. 380. Leers. t. 3. f. 2. Gram. nodosum, spica parva, Baul. Hab. in collib. graminosis. Spica glabra.

154. **ALOPHURUS**, Spica. *Cal.* 2-valvis, *Cor.* 1-valvis, basi aristata, ant. mutica.

1. *bulbosus*, culmo erecto, spica cylindrica, radice bulbosa. Gouan. monyp. 37. Willd. Sp. t. p. 356. A culmo erecto,

spica simplicissima attenuata, glum. calycinis distinctis (nec basi connatis.) Smith Flor. brit. 1. p. 73. Barr. ic. Gr. f. 1. Hab. in Galliae, Angliae pratis. ¶

2. *pratensis*, culmo erecto, glumis villosis, cor. muticis. Hab. in Europae pratis. ¶

3. *capensis*, spica cylindrica, glumis glabris muticis. Thuub. prod. 19. Hab. ad Cap. b. spei.

4. *antarcticus*, culm. erecto, spica ovata; glumis hirsutis, cor. aristatis: aristis cal-longioribus. Vahl. symbol. 2. p. 18. Hab. ad fretum Magellanicum.

5. *agrestis*, culm. erecto, spica cylindrica (purpurascens) glum. laevib. J. cars t. 2. f. 5. Schreb. gram. 140. t. 19. f. 2. Hab. in agris. ¶

6. *subaristatus*, culm. erecto, glumis ovalibus obtusis, aristis vix exsertis. Mich. Flor. amer. 1. p. 43. Hab. in Canadae paludosis.

7. *geniculatus*, culm. spicato infracto, cor. muticis. Leers t. 2. f. 7. Roth. germ. 2. p. 78. Hab. in uliginosis ¶

8. *echinatus*, panic. spicata ovata, glum. punctatis ciliatis, culmo geniculato. Thuub. prod. 19. Hab. in Cap. b. spei.

9. *utriculata*, spica ovata, valv. calycinis compressis subcallosis, carina pilosis, aristis articulat. fol. vag. superne utriculata. Phalaris utriculata. Lin. Scop. delic. insubr. t. 12. Tozzetta pratensis. Savi in act. ital. v. 8. p. 477. Hab. in Anglia; praescriptum vero in Italia in pratis Mediolanensibus et Ticinensibus quae Marzittae vocantur. Scop. An distincti generis cum sequente?

10. *ventricosa*, elongata, spica cylindrica, glumis villosis, cor. aristatis, vagina ventricosa. Hab. in Gallia. Phal. *utriculata* quorundam. Cor. uniglumis uti in prior. A. *pratensi* affinis.

155. POLYPOGON. Cal. 2-valvis, aristatus, uniflorus. Cor. 2-valvis: valvula exteriore aristata.

1. *monspeliense*, (*crinitum*), panicula coarctata subspicata, calycib. subpubescentibus margine ciliatis. Willd. in Act. nov. Soc. Nat. Berolin. vol. 3. Def. atl. 1. p. 67. Alopecurus Lin. Phleum crinitum. Schreb. gram. t. 20. f. 3. Smith. Flor. brit. 1. p. 71. β. *panicum*. Alop. *panicum*, minor, glumis villosis Lin.

cyst. veg. Barrel Ic. t. 115. f. 1. Hab. in Galliae et Angliae maritimis.

2. *maritimum*, panicula coarctata subspicata ovata, cal. hirsutis margine ciliatis, culmo geniculato. Willd. l. c. Hab. ad oras maris circa Rochelle. Bonpland.

3. *vaginatum*, panic. coarctata subspicata ovata, val. villosis, vaginis inflatis. Willd. l. c. Alopecurus. Pallas in Nov. Act. Petropol. 10. p. 304. Cresc. in Tauria, locis siccis.

4. *fasciculatum*, panic. subracemosa, cal. valvula exteriore longissime aristata, interiore mucronata. Willd. l. c. (P. *subspicatum*). Chacurus fasciculatus. Link in Schrad. Bot. Journ. 1793. 2. p. 313. Crescit in Extremadura Hispaniae, in agis.

156. CHRYSURUS. Flor. spicato-racemosi. Spiculae bifformes: steriles pendulae muticae multivalves ad basim fertilium involverum mentientes; *fertilium* Cal. 2-valvis, 2-3-florus. Cor. 2-valvis: valvula exteriore longe aristata.

1. *Cynosuroides*. Cynosurus aureus. Lin. Willd. 1. p. 418. Koeler gram. p. 377. Barr. rar. t. 4. Hab. in Europa australi ad rupes, Barbaria et in Oriente. Spic. densa, flavo-vireos.

157. PANICUM. Inflorescentia varia. Cor. 3-valvis: valvula tertia dorsali minima. Cor. 2-valvis.

* Spicata.

1. *polystachyon*, spicis teretibus, involucellis unifloris fasciculato-setosis, culmis erectis superne ramosis. Lin. Willd. Sp. p. 333. Hab. in India et Aegypto. P. *glauco* similis. Stigm. sanguinea. ¶

2. *purpureum*, spic. tereti, involucl. 1-2-setis inaequalib. flosculo majoribus 1-floris, culmo tereti ramoso. Flor. Per. 1. p. 48. Hab. in praeruptis Tarmae. Stigm. plumos., purpureum.

3. *sericeum*, spica tereti, involucl. setaceis villosis unifloris longitudine flosculorum, fol. planis. Ait. Kew. 1. p. 88. In Ind. occidentali, ☉

4. *verticillatum*, spica verticillata, racemulis quaternis, involucl. unifloris bisetis, culm. diffusis L. Roth. germ. 2. p. 69. Curt. Lond. ic. Hab. in Europa australi et Oriente. ☉

5. *helvolum*,

5. *helvolum*, spica tereti, involuclis anifloris fasciculato-setosis, seminibus nervosis. Lin. suppl. 107. Hab. in India orientali. Simillimum *P. glaucum*. Culm. scapidalis, ramosus. Folia versus basin pilis albis, patentibus. ☉

6. *glaucum*, culm. basi decumbente, spica subovata tereti, involucl. iifloris fasciculato-pilosis, seminibus undulato-rugosis. Leers. 1. 2. f. 2. Schreb. gram. t. 23. *P. elongatum*, culm. longiore erecto. Hab. in agris post incasem frequens; etiam in India. *P. ex America*. Pedunc. sulcatus, spica lutescens. ☉

7. *viride*, spica cylindrica, involuclis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. Leers. t. 2. f. 2. Flor. dan. t. 852. Cum priore.

8. *germanicum*, spica composita coarctata, spiculis glomeratis, involuclis setaceis flor. longioribus, rachi hirsuta. Willd. spica composita ovata, setis brevioribus, pedunculo hirsuto. Roth. germ. I. p. 27. II. p. 71. Hab. in Europa australi. ☉

9. *italicum*, spica composita basi interrupta nutante, spiculis glomeratis, involuclis setaceis, flore multo longioribus, rachi tomentosa. Willd. Sp. 1. p. 336. Rumph. amb. 5. t. 75. f. 2. Hab. in Indiis et Europ. australl.

10. *setosum*, spica composita, spiculis paniculato-fasciculatis, setis flosculis immixtis longissimis, pedunculis subglabris. Swartz prod. 22. Flor. ind. occid. p. 139. Hab. in Jamaicae montosis fruticetis.

11. *lanceolatum*, spic. alternis, calyc. valvula extima ciliata aristata, fol. lanceol. Retz. obs. 3. p. 17. Hab. in India.

12. *stagninum*, spic. secundis alternis, calycib. bifloris aristatis hispulis. Retz. obs. 5. p. 17. Hab. in stagnis Indiae orientalis.

13. *Crus corvi*, spic. alternis secundis spiculis subdivisis, glumis subaristatis hispulis, rachi trigona. Sp. plant. 84. Hab. in Indiis. Sequentie tenacius. Aristae longae.

14. *Crus galli*, spic. alternis conjugatisque secundis; spiculis subdivisis, glumis aristatis hispulis, rachi quinquangulati. Leers berborn. n. 41. t. 2. f. 3. Curt. lond. ic. Hab. in Europae, et Virginiae cultis. Var. aristis subnullis. ☉

15. *muricatum*, humifusum, glumis targilis, muricato-hispulis. Michaux Flor. p. 47. Hab. in Canada ad ripas. Cenchrum refert.

16. *setigerum*, spic. remotis, flosc. secundis, racheos dentibus setigeris. Hab. in China.

17. *colomum*, spic. alternis secundis muticis ovatis scabris, rachi teretiuscula. Lin. Vahl. symbol. 1. p. 9. Pluck. alm. 174. t. 189. f. 5. Ehren. pict. t. 3. f. 3. Hab. in India cultis. Spiculae subsessiles absque fasciculis pilosis. ☉

18. *fluitans*, spic. alternis sessilibus secundis, valv. calycina tercia minuta. Willd. Sp. p. 338. Retz. obs. 3. p. 8. et 5. p. 13. Vahl. symbol. 1. p. 8. Pluk. Am. 110. t. 417. f. 7. In Madagascar, Arabia, India.

19. *brizoides*, spic. alternis sessilibus secundis, valv. calycinis binis corolla multo brevioribus retusis tercia longitudine corollae. Willd. L. c. Retz. obs. 5. p. 18. Pluck. alm. 174. t. 191. f. 1. Hab. in India. Obs. An. cum priore potius ad Digitarias pertinet?

20. *paspalodes*, spic. alternis muticis appressis sessilibus, glum. ovatis mucronatis glaberrimis. Pan. Brizoides. Lam. l. c. Hab. in India.

21. *granulare*, spic. alternis muticis, erectis sessilibus, glum. laevibus subglobosis, culm. ramoso. Lam. ill. gen. p. 170. Hab. in Insula Franciae.

22. *flavidum*, culm. folioso, spiculis remotis sessilibus appressis secundis paucifloris. Retz. obs. 4. p. 15. Hab. in Zeylona Antecedenti affine.

23. *dimidiatum*, spic. dimidiato-secunda, spiculis quinquelloris, rachi excavatae alterae appressis. Retz. obs. 6. p. 23. Lin. Syst. vez. 13. p. 50. Burm. ind. 25. t. 8. f. 5. Hab. in India. Spiculae flosculis 5 cal. singuli flosculi lanceolatus: valvula extima minuta obtusa L.

24. *pilosum*, spic. paniculatis alternis secundis, spiculis geminis, altero minore, acuminatis laevibus, rachi compressa pilosa, culmo divaricato geniculato. Swartz. prod. 22. Ej. Flor. p. 141. In Jamaicae paucis sylvis.

25. *molle*, spic. paniculatis alternis secundis patentibus, spiculis approximatis pedicellatis secundis muticis, culm. ascendente, fol. villosis. Swartz. flor. p. 143. In pratis Jamaicae fertilioribus. Culmi quasi succulenti. Sw.

26. *fasciculatum*, spic. paniculatis alternis erectis subfastigiatis, spiculis secundis subrotundis. Swartz. prod. 22. Ej. Flor. p. 145. Hab. in Jamaica, gramin. deprexis

*** *Culmo triquetro, panicula nuda.*

52. *trispicatus*, culm. angulato nudo, spicis ternis ocalibus ternis sessilibus nudis. Lin. suppl. 101. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. b. sp. ei. Folia vix ulla, nisi squamae ferrugineae radicales. Involucrum polyphyllum, foliis subulatis brevissimis.

53. *lateralis*, culm. triquetris nudis, spicis subternis lateralibus, involuero monophyllo brevi. Retz. obs. 4. p. 12. et 5. p. 16. Hab. in Zeylona.

54. *triqueter*, culm. triquetro nudo, spicis lateralib. subsessilibus pedunculatisque, mucronem rectum aequantibus. Lin. Mant. 29. Willd. Sp. p. 302.

α. *S. trigonus*, culm. trigono nudo, spicis lateralib. ovatis fasciculatis sessilib. pedunculatisque, mucrone erecto. Roth. Beiträge 2. P. 60. *S. triquetter* Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 302. Hab. in Europa australi ad paludes. Gluma calycina corollas aequans. Ro L.

β. *S. triquetter* (triangularis), culm. triquetro nudo, spicis lateralib. sessilib. ovali-acuminatis, mucrone erecto Roth. l. c. p. 61. *S. mucronatus*. Roth. Flor. germ. Pollich. Cresc. cum priore. Spicae duplo acutiores quam praecedentis. Gluma corollis duplo fere major. Roth.

55. *mucronatus* (*tricarinatus*), culm. triangulo acuminato, spic. lateralib. ovatis sessilib. mucrone horizontali. Roth. l. c. Willd. Sp. l. c. Hab. variis in stagnis. Omnib. in partibus crassior a antecedentibus. Caul. mollis, semen nigrum. Micheli gen. p. 47.

56. *americanus*, culm. acute triquetro nudo, spiculis sessilibus conglomeratis, oblongo-ovatis mucrone brevioribus. *S. triquetter*. Michaux Flora 1. p. 30. Hab. in Carolina inferiore. Ab Europaeo diversus videtur. Spiculae majores.

57. *dichotomus*, culm. triquetro nudo, umbella decomposita, spicis ovatis, dichotomis sessilib. L. Flor. zeyl. 40. Roth. Pluk. alm. 170. t. 119. f. 3. Hab. in India, Arabia et Aegypto.

58. *annuus*, culmo triquetro nudo multifloro, involucro diphylo, umbel. simplici spicis solitariis peduncul. intermedia sessili Allion. Pedem. 2. p. 275. t. 88. f. 5. Desfont. Atl. 1. p. 51. Hab. in Helvetia, Pedemontano et Barbariae agris. Culm. plures ex una radice. Spic. ovato-acuminatae, unica in centro umb. sedet. A.

59. *echinata*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spicis ovatis. Fl. zeyl. 38.

Pluk. alm. 179. t. 91. f. 4. Hab. in India utraque.

60. *retrofractus*, culm. triquetro, umb. simplici; spicarum roseulis retrofractis. Sp. pl. Pluk. phyt. 415. f. 4. In Virginia. T.

61. *ferrugineus*, culm. triquetro subnudo, involucri longitudine paniculae ciliatus. Willd. Sp. 3. p. 104. Schoenus polymorphus. Roth. gram. 67. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 36. t. 77. f. 2. Hab. in Jamaicae paludibus et in siccis. T.

62. *pubescens*, fol. radical. angustis, umbel. terminali sparsa spicul. crassiusculis ovatis, squamis subpubescentib. ovalibus. Mich. Flora. p. 31. Hab. in Carolina et Georgia.

63. *castaneus*, fol. radicalib. angustis, erectis, culmo subtereti striato, umbel. terminali bracteis involucriata, spicul. subrotundo-ovatis, squamis suborbiculatis. Michaux. l. c. Squamae nitentes, laevae. Hab. in Florida.

64. *Michauxii*, fol. radical. planis, culm. nudo subaequali, umb. composita laxa, spicul. oblongo-ovatis; squamis lanceolatis, carina prominente discolori in mucronem desinente. *S. mucronulatus*. Mich. p. 32. Hab. in Carolina montib. Sem. nudum. Styl. trifidus.

65. *spadiceus*, culm. semitereti nudo retrorsum scabro, umbel. composita, spic. oblongis dichotomis sessilib. involuc. brevibus. Vahl. Eclog. Lin. Willd. Sp. 1. p. 305. Hab. in America meridionali, Jamaicae fluvio.

66. *millaceus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, spicis subglobois parvis intermediis sessilib. involucro setato. Sp. pl. 75. Retz. obs. 5. p. 16. Roth. p. 57. t. 5. f. 2. Hab. in India Pedunc. dichotomi. Culm. tenuis. Spicae pedunculatae, ut solitariae sessiles in ramificationibus umbellae, minutissimae ut semina Millii. Lin.

* *bengalensis*, culm. tenui nudo, umb. supradecomposita, involucro tetraphyllo, spicul. intermediis sessilib. ovatis (minutis); squamis concavo-carinatis mucronatis. Communicatus a cl. Richard, qui eum ex Bengalica accepit. An diversa species?

67. *maritimus* (*riparius*), culm. triquetro, pauc. conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis; intermedia subulata, involucro triplyphyllo Hab. in lacub. et fossis. 2-3 pedalis.

β. *macrostachyus*, culm. acute triquetro folioso, bracteis plurib. longissimis,

spic. sessilib. pedunculatisque crassis ovatis squamis subaristatis. Michaux Flora. p. 32. Hab. in Carol. paludib. salis.

68. *compactus*, minor, spiculis omnibus sessilib. squamis trifidis, involucri diphyllo. Kroecker Flor. Siles. t. 1. Flor. dan. t. 937. Hab. in uliginosis subarsicatis. Tamen ob locum, quam parvitatem ab antecedente diversus.

69. *grossus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, spicis pedicellatis, involucri triphylo lanceolato-subulato longissimo. Lin. supp. l. 101. Hab. in India. Culmus oryxis. Involuerum foliol. unico longissimo. Staminibus S. miliaceo, sed magnitudine diversus. L.

70. *Lusulae*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa prolifera, spiculis subrotundis. Lin. Pluk. mant. 97. t. 417. f. 3. Hab. in India. Involuerum universale polyphyllum 1 fol. cnsiformib. umb. longioribus; partialia vix ulla. Capit. subrotunda, glomerata ex spiculis subrotundis.

71. *sylvaticus*, culm. triquetro folioso, umb. foliaceo, pedunc. nudis supradecompositis dichotomis, spicis confertis. Flor. dan. t. 307. Leers t. 1. f. 4. Michaux, Flor. t. 1. p. 33. *β. radicans*, culm. triquetro folioso, umb. foliaceo, culmis sterilibus deBexis apice radicanibus. Schkuhr. Hoffm. germ. p. 26. Hab. in sylvarum fossis. T.

72. *aestivalis*, culm. depressis triquetris nudis, umb. compositis involucriatis. Bor. monandris. Retz. obs. 4. p. 12. Hab. in fundo fluviorum exsiccatorum Zeylonae. T.

73. *squarrosus*, culm. triquetro nudo foliisque setacris, spicis ternis sessilibus ovatis squarrosis. Mant. 181. Rottb. p. 49. t. 17. f. 5. Hab. in Ind. orientali. Involuer. diphylum; spicae squam. subulatis, exstantibus, basi nodosis, valde imbricatis.

74. *dipsaceus*, culm. setaceis triquetris, umb. simplicis, capitulis oblongis squarrosis, flosc. subulatis recurvis diandris, germine eebinato. Rottb. gram. 56. t. 12. f. 1. Hab. in India. Parvus. Involuer. 3-4 phyllo.

75. *junceiformis*, culm. nudo filiformi subtrigono, paniculae apiculis sessilibus pedunculatisque, involucri diphyllo. Retz. obs. 6. p. 19. Hab. in China.

76. *michelianus*, culm. triquetro, capitulo globoso, involucri polyphylo longo. Lin. Bot. Annal. t. 1. p. 20. t. 2. Desf. atl. t. p. 51. Till. pis. 51. t. 21. f. 5. Burb. cent. t. p. 31. t. 55. f. 1. Hab. in Europa Aegypto et in Marocco.

77. *ciliaris*, culm. triquetro folioso, umb. sparsis, squamis calycinis aristis ciliatis. Mant. 182. Rottb. t. 17. f. 1. S. pubescens. Desf. Atlant. t. p. 52. Schousboe Maroc. ed. germ. p. 19. Hab. in India orientali et in Barbaris. Culmi palmares laxi. Spicae ovatae, hirtae pilis raris. Involueri loco saepe foliola 1. seu 2. parva.

**** Culmo triquetro, Capitulo terminali.

78. *tomentosus*, culm. triquetro folioso, capitulo globoso, squam. lanceolatis hirtis. Lin. Mant. 182. Thunb. prod. 18. Ad Cap. b. spei locis paludosis. Folia caulina, 3, remotissima. Involuerum capituli triphyllum.

79. *antarcticus*, culm. triquetro nudo foliisque filiformib. capitulo globoso, involuer. 1-phylo. Mant. 181. Thunb. prod. 17. Scirpus barbatus, vaginis suboppositis ora superiori barbatis. Rottb. gram. 52. t. 17. f. 4? Pluk. alm. 179. t. 299. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei et in Guinea. Spicae ovatae, trifariam imbricatae triquetrae.

80. *argenteus*, culm. setaceis triquetris, involuer. tetraphyllo longissimo, spic. cylindricis plurimis in capitulum glomeratis. Rottb. p. 51. t. 17. f. 6. Rheed. zool. 12. p. 101. Hab. in India.

* 81. *monander*, culm. triquetro, involuer. triphylo longo, capitulo sessili glomerato, flosc. monandris. Rottb. p. 50. t. 14. f. 3. Hab. in India. Spic. ovato-teretes.

82. *cephalotes*, culm. triquetro nudo, capitulo ovato squarroso, involuer. triphylo longo. Lin. Willd. Sp. t. p. 311. Houtt. t. 88. f. 3. Hab. in India.

124. TRICHOPIHORUM. Spicul. subovatis, squamis undique imbricatis. Sem. setulae capilliformes (nec lanam deusam referentes) denum longe exsertae numero definito sex. (Genus intermedium inter Scirpum et Eriophorum.)

1. *cyperinum*, culmo triquetro folioso, panicula decomposita, spiculis confertis ovatis. Scirpus Eriophorum. Michaux Flora. t. p. 31. Eriophorum cyperinum Lin. Willd. Spec. t. p. 313. Hab. in Amer. boreali. Gram. altum.

2? *lineatum*, culm. folioso paniculato, spicul. ovato-oblongis; squamis lanceolatis subcarinatis. Scirp. lineatus. Michaux. l. c. Hab. in Carolina. Priori simile.

3. *alpinum*, parvum, culm. nudo angulato spicato. Erioph. alpinum. Lén. Flor. dan. t. 620. Sowerb. engl. bot. t. 311. Hab. in Europae subalpinis.

♂ *hudsonianum*, majus, culm. nudo triquetris, fol. canaliculato - setaceis. Michx. Flor. dan. t. 34. Hab. ad sinum Hudsonis.

125. ERIOPHORUM. Glumae paleaceae undique imbricatae. Sem. lana densa longissima cinctum.

* *Monostachya*.

1. *vaginatum*, culmis vaginatis teretibus, foliis triquetris - canaliculatis, spica ovata. Roth. N. Bot. Beyträge, t. p. 65. Willd. Spec. t. p. 312. Flor. dan. t. 236. Hab. in montosis uliginosis. Glum. acuminatae.

2. *Scheuchzeri*, culm. basi vaginatis teretibus, fol. tereti - canaliculatis, spica rotunda. Roth. l. e. Schenck. Agrost. app. t. 7. F. capitatum. Hoffm. Flor. germ. ed. 2. p. 26. Hab. in alpih. rhaeticis et Salisburg. Glum. obtusae.

** *Polystachia*, culm. foliosis teretibus.

3. *virginicum*, fol. angustis planis, spica pluribus sessilibus. Willd. l. c. p. 311. Roth. l. c. p. 96. Hab. a Canada ad Carolinam. Flor. diandri Lana fulvaceus. Michx.

4. *vulgare*, (polystachyum L.) fol. planis mucrone triquetris, spica pedunculata nutantib. involucrum subaequantib. Leers herb. t. 1. f. 5. Engl. bot. t. 561. Crese. in paludosis. Involucr. basi membranaceo-dilatatum, 2-3-phyllum.

5. *angustifolium*, fol. canaliculato-tri-quetris, spica pedunculata, seminib. ovatis. Roth. l. c. p. 94. E. *polystachyon* Huds. Cur. Flor. lond. t. 9. Involucr. 3-phyll. foliol. linearis: unico spica multo longiore. Cum priore; etiam in America crescit.

6. *gracile*, fol. triquetris sursum canaliculatis, spica pedunculata, sem. linearibus, involucrum panicula uplo brevior. Roth. p. 95. Ejusd. Cat. 2. append. E. triquetrum. Hoppe. Hab. in Palaestina et alpih. salisburgensib.

126. VAGINARIA. Spica ovata squamis undique imbricatis. Stigm. 3. Seminibus involucrellum (Perispermium) alternatim tripaleaceum et trisetum.

1. *Richardi*, *Fuirena scirpoidea*, nimo aphylo vaginato, spica unica:

squamis lanceolato - spatulatis. Michx. Flor. p. 38. Hab. in Florida. Obs. Characteres hujus sequentiumque, ab eo constitutorum generum, coniecit celeb. Richard.

127. FUIRENA. Squamae mucronatae in spinulas nudique imbricatae. Sem. involucrellum latum, paleaeforme. saepius aristatum.

1. *umbellata*, umbellis compositis, spica oblongis aggregatis sessilibus, fol. lanceolatis. Vahl. Eclog. Amer. 2. Roth. gram. p. 70. t. 19. f. 3. F. *paniculata*. Lén. suppl. p. 105. Hab. in utraque India.

2. *obtusiflora*, umb. subcompositis, spica cylindricis utrinque obtusis squarrosis. Vahl. l. e. In Amer. meridionali. Fol. glabra? An a sequente diversa?

3. *squarrosa*, fol. ciliatis, spica squarrosa, squamis petiolato-spatulatis. Michx. Flor. t. p. 37-38. Hab. in Georgia et Carolinae paludosis. Squamae mucrones longi strigoso-squarrosi.

4. *canescens*, submentoso-canescens; spicul. glomeratis, squamis mucrone erecto. Richard. Hab. in Africa.

128. HYPOXYTRUM. Spicula squamis undique imbricatis. Sem. involucrellum glumam 3-4-valvem mentiens. Stam. 2-3. Stigm. 1-2.

1. *latifolium*, maximum glabrum, fol. latis trinerviis, corymbo decomposito. Hab. in India. Stam. 2. Rich.

2. *senegalense*, spicul. pluribus espatulatis congestis, squamis subacuminatis. Hab. in Senegal. Stam. 2. Stigm. 3. Rich.

3. *gracile*, fol. angustis, caule debili, spicul. 3. sessilibus subgloboso-ovatis, squamis spatulatis. Richard. Stam. 1. Stigm. 2.

129. DIPLASIA. Spica squamis undique imbricatis. Involucrellum glumam 4-valvem mentiens. Stam. 7. Stigm. 2.

1. *Karataefolia*, fol. longissimis carina margineque aculeatis, umb. decomposita. In Gujana. Fol. Bromeliae Karatas. Richard.

130. LEPIRONIA. Spicul. squamis orbiculatis cartilagineis. Sem. involucrellum 16-paleaceum. Stam. 4-6.

1. *mucronata*. Hab. in Madagascar.

Aphylla. Culm. nodosus infra apicem 1-stachyus. Spica ovato-oblonga. Rich.

131. *CHRYSITRIX*. Spica imbricata squamis coriaceis setaceis. Stam. multa, inter singulas squamas singula.

1. *capensis*, Lin. fl. gen. gram. p. 27. f. 1. 2. Hab. ad. Cap. h. spci. Spica lateralis. An antecessens hujus generis?

** GRAMINA. Flor. glumacei, 3-andri.

Rad. fibrosa. *Culmi* ut plurimum fistulosi, articulati, simplices aut basi ramosi. *Fol.* linearia, vaginantia, vagina latere fissili, apice membrana albidula distincta, quae *ligula* aut stipula nuncupatur. *Flor.* apicati, racemosi, plecumque paniculati, rarissime foliis involucriati (uti in priore familia); nonnulli saepius abortivi; alii polygami; pauci monolci. *Stam.* in plurimis tria (qualia gramina hac in serie solummodo enumerantur), in nonnullis sex (vid. Clas. Hexandriam), aut plura. *Styl.* communitee duo, in quibusdam 1. plerumque tamen bifidus. In unico tantummodo gramine tria observata sunt. Glumae interiores in multis semen maturum incrustant et cum eo indurantur.

MONOGYNIA.

132. *LYGEUM*. Flores intra spatham convolutam gemini. *Cal.* basi in tubum 2-locularem villosum conerescens, 2-valvis.

1. *Spartum*. Lin. Willd. Sp. 1. p. 316. Richard in Act. Soc. Hist. nat. Paris. p. 28. t. 3. Hab. in Hispania. *Fl.* Flor. omnium graminum maximi, interdum 3 intra involucrium. *Styl.* longus.

133. *CORNUCOPIE*. *Involuer.* cyathiforme. *Cal.* 1-phyllus, 2-partitus. *Cor.* 1-valvis, superne hinc fissi. *Styl.* brevis; *Stigm.* 2. (raro 1.) longissima. (Richard.)

1. *cucullatum*, spica mutica, involucrio arenato. Lin. Smith spici. bot. t. 14. Willd. l. c. p. 319. Hab. in Oriente. ☉

2. *alopecuroides*, spica aristata. Lin. Mant. p. 29. Hab. in Italia. Similis *Alopec. pratensis*, vagina supremi fol. venarum. *Involuer.* hemisphaericum integerrimum. Lin.

134. *CENCHRUS*. *Involuer.* laciniatum, echinatum 3-4-florum. *Cal.*

2-valvis, 2-florum. *Cor.* 2-valvis, mutica. *Styl.* 2-fidus.

1. *lappaceus*, paniculae patentia ramis simplicissimis, cor. retrorsum hispidis, cal. trivalvibus bifloris Lin. Willd. Sp. 1. p. 315. Hab. in India. Fol. cordato-lanceolata. *Involuer.* o? Hujus generis non videtur. An Panicum?

2. *capitatus*, spica ovata simplici. Col. ceph. 1. p. 340 t. 338. f. 1. Barr. car. t. 28. f. 1. *Echinaria capitata*. Desf. atl. 2. p. 385. Hab. in Gallia, Italia et Barbaria. ☉

3. *echinatus*, spica oblonga conglomerata, involuer. subgloboso 10-partito. Schreb. gram. 9. t. 21. f. 1. Cav. ic. 5. p. 39. t. 462. Pluk. alm. 177. t. 92. f. 3. Hab. in America et Barbaria arvis.

4. *tribuloides*, spica glomerata, glumis femineis globosis muricato-spinosis hirsutis. L. Michaux Fl. 1. p. 61. Sloan. jam. 30. hist. 1. p. 108. t. 65. f. 1. Moris. hist. 3. p. 175. s. 8. t. 5. f. 4. Hab. in Virginia maritimis. ☉

5. *caliculatus*, culm. simplici erecto, spica glomerata, involucrio polyphylo setaceo. Cav. l. c. t. 463. Hab. in Americ. insula Bahao. *Fl.* aenata. *Involuer.* foliola subduodecim setulis rigidis, tomentosa, apice glabra. C.

6. *spinifex*, culmo ramoso, fol. brevibus cordato-lanceolatis, involuer. integerrimo ciliato. Cav. ic. 5. p. 38. t. 461. Hab. in regno chilensi, et in Montevideo. Flor. januario.

7. *rufescens*, fol. glabris, spica elongata, involuer. confertis scitiformibus (rufescentibus) inferne villosis, cal. sub-2-floro. Desf. atl. 2. p. 383. Hab. in arenosis prope Mascar.

8. *hordeiformis*, fol. retrorsum asperis, involuer. setosis flore 4-plex longioribus, inferne (albis) villosis, cal. 1-2-floro. Desf. l. c. (C. *asperifolius*). Willd. sp. p. 318. *Alopecurus hordeiformis*. Lin. Hab. in Asia et Africa.

9. *geniculatus*, racemo spicato simplici, flor. involucrio polyphylo scabro, culmo geniculato. Thunb. prod. 24. Hab. ad Cap. b. spci.

10. *purpurascens*, racemo spicato simplici, flosculis eicemvallatis aristis longissimis, culmo erecto. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 329. Willd. l. c. in Japonia. Acist. purpureae.

11. *frutescens*, capit. lateralibus sessilibus, fol. mucronatis, caule fruticoso.

Lin. Alpin. exot. t. 104. Hab. in Armenia. *h*

135. PENNISETUM. *Involucr.* multisetum. *Cal.* 2-valvis, 2-floris: flor. altero hermaphrodito; altero masculo (rarius neutro) utroque sessili. (Flor. spicati polygami. In plerisque speciebus involucr. heterochaeton, setisque nonnullis inferne plumosis.)

1. *typhoideum*, fol. latis glaucis, spica crassa cylindrica, involucri pellicellatis pennatis. *Holcus spicatus* L. Pluk. alm. t. 32. f. 4. Hab. in India. Styl. villosus. *o*

2. *setosum*, fol. basi villosis, spic. subsessili imbricata, involucr. sessilibus: setis nonnullis longissimis, stylo bifido. *Cenchrus setosus* Swartz. Flor. Ind. occid. t. p. 211. secundum quem *Panicum polystachium* L. eadem species est. Hab. in Ind. occid. solo erecto.

3. *cenchrroides*, culm. geniculato, involucr. alternis dupla flor. longitudine: setarum una subulato-paleacea longiore. *Cenchr. ciliaris* L. Giseke ic. t. 23. Desf. atl. 2. p. 387. Hab. ad Cap. bon. sp. et Barbariae arenosis. Fol. villosa. *o*

4. *orientale*, fol. subsetaceo-subulatis, involucr. sparso stipitato: setis parvis flore longioribus plumosis. *Cenchrus orientalis* Willd. (ined.) Hab. in Oriente.

5. *violaceum*, caul. ramoso, fol. vaginisque pilosis, spic. cylindrica, involucr. sessilibus flor. sequantibus simplicibus. *Panicum violaceum* Lam. ill. gen. 2. p. 369. Hab. in Senegal.

Obs. Characterem hujus generis, nec non specierum differentias communicavit clar. Richard. Ob affinitatem cum *P. setoso* forte huc quoque referendus *Alopecurus indicus* L.

136. SESLERIA. *Cal.* 2-5-floris. *Cor.* 2-valvis, apice dentata. *Stigm.* subglandulosa. (Flor. spicati, saepius caerulei basi involucrati.)

1. *caerulea* (*calcaria*), spica orato-oblonga, fol. planis, involucri integro. *Cynosurus caeruleus* L. Willd. Sp. 1. p. 414. Arduin. spec. 2. p. 18. t. 6. Hab. praesertim in montosis calcareis, et in pascuis.

2. *sphaerocephala*, spica globosa (albida), involucr. ovatis subdentatis, cor. acuminatis. Hoffm. germ. cd. 2. p. 49.

sub *Cynosuro*, Hab. in Germaniae subalpina. Carinth. Tyrol.

3. *microcephala*, involucr. subdentato, cor. aristatis, spicis subrotundis. Hoffm. l. c. *Cynos. sphaerocephalus* Wülf. sp. Jacq. Misc. 2. p. 71. Hab. cum priore.

4. *disticha*, involucr. nullo, spica disticha. *Poa disticha* Wulf. Jacq. ic. v. 1. t. 19. Fol. setacea. In Cariothia, etiam in Pyrenaeis crecit.

137. LIMNETIS. *Spica* lateriflora: flosculis subbifariam imbricatis. *Cal.* 2-valvis: valv. 1. minore. *Cor.* 2-valvis, mutica, compressa, carinata. *Styl.* longus. Nees. o. (Flor. paniculati, stricti.)

1. *pungens*, fol. convolutis pungentibus, spicis paucis appressis pubescentibus, cal. carinis inermibus. *Dactylis stricta* Smith. Flor. Brit. Engl. bot. t. 380? *Spartina stricta* Roth N. Beyträge p. 101. Hab. in Gallia et Anglia, ad litora maris.

2. *juncea*, fol. disticha breviusculis setaceo-convolutis, spicis paucis remotis patulis, cal. acuminati carinis asperis. *Trachynotia juncea* Michaux. Flor. 1. p. 64. Hab. in siccis maritimis Carolinae Georgiae.

3. *cynosuroides*, subglauca, fol. longissimis, spic. plurimis alternis secundis, cal. subaristato-acuminato: carinis aculeatis. *Dact. cynosuroides* Lin. Hab. in Amer. boreali.

4. *polystachia*, fol. latis, spicis plurib. undique versis longis linearibus: carinis aculeatis. *Trachynotia* Michaux l. c. Hab. in inundatis maritimis Nov. Angliae.

Obs. Horum graminum ad oras maris crescentium, unde nomen inditum differentias observationibus cl. Richardi debeo.

138. NARDUS. *Cal.* 1-florus, 1-valvis. *Cor.* 1-valvis, inclusa. *Stigm.* 1. (Spica flor. alternis sessilibus.)

1. *stricta*, spica setacea recta, flor. secundis. Flor. dan. t. 1022. Willd. spec. 1. p. 314. Schreb. aram. t. 7. Leers t. 1. f. 7. Hab. in arenosis et collibus aridis. Var. magnitudine. *u*

2. *aristata*, spica setacea, calic. aristatis, (Lin.) corollis binis inaequaliter pedunculatis aristatis, squamula suffultis. Vill. delph. 2. p. 53. t. 2. Boec. mus. 2. p. 74.

37. Hab. in Europa australi. Spica subente tenuissime pilosa.

3. *ciliaris*, spica incurva ciliata. Hab. in India. Folia graminea plana. Spica dimidiata. Lin.

139. **ORYZOPSIS**. *Cal.* 1-florus, 2-valvis, laxus, obovalis. *Cor.* coriacea, subtereti-ovata, 2-valvis: valv. exteriori apice aristata. Nect. 2-paleaceum liacare. (Richard.)

1. *asperifolia*, culm. subnudo, fol. subpungentibus asperis. Michaux Flor. 1. p. 51. t. 9. Hab. per tractus montium a Sinu Hudsonis ad Quebec.

DIGYNIA.

140. **MATRELLIA**. *Cal.* o. *Cor.* cartilaginea s. indurata, compressa, mutica, 2-valvis: valv. demum connata?

1. *junceae*. *Agrostis Matrella*. Lin. Willd. sp. pl. 1. p. 36? A. *juncæ*. Lam. ill. gen. 1. 41. f. 2. Hab. in Malabaræ maritimis. Flor. subnantes, 10-12 in rachi alternatim sessiles. Fol. disticha, pungentia.

141. **MUHLEBERGIA**. *Cal.* minutissimus, 1-2-valvis. *Cor.* 2-valvis, basi pilosa: valv. exteriori apice aristata. (Flor. paniculati.)

1. *diffusa*, culmo debili ramoso foliisque glabris: panicula cuarctata, cal. 1-valvi. Richard. Roth, N. bot. Beiträge 1. p. 66. *Dilepyrum minutiflorum* Michaux. Flor. amer. bor. 1. p. 40. Hab. in aprieis et pratis region. Kentucky in Amer. bor.

2. *aristata*, culmo firmo subsimplici folisque pubescentibus, panicula laxa, cal. 2-valvi, arista longissima. Richard. Michaux l. c. M. *erecta*, culmo erecto, fol. lanecolatis; ligula oblonga barbata, panic. laxa. Roth. l. c. p. 97. Hab. in umbrosis Georgiæ et Carolinæ. T

142. **TRICHODIU** V. *Cal.* 2-valvis; valvul. subæqualibus acutis: carina spinulosa. *Cor.* brevior, 1-valvis mutica. *Stigm.* subcassilia hispidula. (Flor. paniculati.) Richard.

1. *laxiflorum*, culm. erectis, fol. angustis breviusculis: vagina subaspera. Mi-

chaux Flor. amer. bor. 1. p. 42. t. 8. *Cornucopieæ hymenialis*, Walter. Hab. in humilis et pratis sinus Hudsonis. ♂.

2. *decumbens*, culm. decumbentib. fol. patulis: vagina laevi. Michaux l. c. C. pereunans. Walt. *Agrostis anomala* Willd. Sp. 1. p. 370. Hab. in Virginiæ maritimis, ad ripas. ♂

143. **LEERSIA**. *Cal.* o. *Cor.* 2-valvis, clausa: valvul. compresso-navicularibus, muticis.

1. *Oryzoides*, panicula effusa, spiculis triandris patulis, glumis oblongo-ovalibus, carina ciliatis. Willd. Sp. 1. p. 125. Swartz prod. 11. Michaux, p. 39. *Phalaris oryzoides*. Lin. Schreb. gram. 6. t. 22. B. L. virginica. Willd. l. c. Hab. in paludosis et ad margines fluvior. passim; etiam in America. Gram. asperum.

2. *lenticularis*, panic. ramis subsolitariis, spicul. imbricatis, glumis orbiculatis ciliatis majusculis. Michaux 1. p. 39. Hab. in paludosis Illinoensib. in Amer. boreali.

3. *monandra*, panicula effusa, spicis remotis laxis, spiculis secundis subrotundis monandris, glumis laevibus. Swartz. prod. 21. f. 1. p. 130. Hab. in Jamaicæ nemorib. cretaceis. Vere.

4. *hexandra*, panic. effusa, spiculis alternis besandris, glumis sublaevibus. Swartz. prod. 21. Stigm. pallide purpurea. Hab. in Jamaicæ aquis.

144. **ZOYDIA**. *Cal.* 1-valvis, carinatus. *Cor.* 1-valvis, membranacea.

1. *pungens*. Willd. in Nov. Act. Nat. cur. Berol. v. 3. Hab. in Malabaræ maritimis. Nardum refert.

145. **MILIUM**. *Cal.* 2-valvis, 1-flores, ventricosus. *Cor.* 2-valvis, brevissima. *Stigm.* penicillata, S. villosa.

1. *nigricans*, flor. panicularis confertis, valvulis calycinis nudiis nigrescentibus, fol. ensiformibus longissimis. Flor. per. 1. p. 47. Collitur in Pillao, Cuchero ubi Maiz de Guinea audit. E seminib. torrefactis Peruviani farinam præparant, ex qua potum et cibum conficiunt.

2. *capensis*, panic. capillari, calycib. acuminatis, cor. arist. terminali incurva. Lin. mant. p. 185. Willd. Sp. 1. p. 358.

Hab. ad Cap. 5. spei Cul. palmares. Fol. angusta subtus pilosa.

3. *punctatum*, panic. ramis simplicissimis, flur. alternis geminis secundis. Amoen. acad. 5. p. 39. Hab. in Jamaicae graminosis, udis.

4. *lentigerum*, panicula subspicata, flor. aristatis. Schreb. gram. 1. 1. 21. f. 3. Vahl. symbol. 2. p. 18. Agrostis australis. Lin. Mant. 30. Gouan. hort. 39. t. 1. f. 2. Alopecurus ventricosus. Huds. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 6. Hab. Monspelii, in Anglia et Aegypto.

5. *compressum*, spicis subternis, flos. alternis muticis rachi adpressis, culmo medio articulato-compresso, pedunc. longissimis. Swartz prod. 24. Fl. p. 183. Hab. in Jamaica et India occidentali. Sem. compressum. S. T.

6. *digitatum*, spicis digitatis subquaternis subsevilib., flos. muticis appressis secundis, fol. margine cartilagineo-serratis. Swartz. Flor. p. 181.

7. *cimicinum*, racemis digitatis, calyc. valv. exteriori ciliatis. Mant. 183. Panicum Retz. Obs. 3. p. 9. Hab. in Malabar. Flor. cum semine lapsi ob cilia cimicem quamdam referunt. Lam. enc. t. 1. p. 59. n. 19. In Jamaica, pratis arborib. ©

8. *panicum*, spicis subdigitatis alternis patentibus filiformibus; flosculis secundis muticis pellicellatis trizonis. Swartz Flor. p. 179. Hab. in Jamaica. Distinctum a M. cimicino. L.

9. *effusum*, flor. verticillato-paniculatis dispersis muticis. Lin. Flor. dan. t. 1143. Leers. t. 8. f. 7. Hab. in nemoribus. T.

10. *confertum*, asperum, panicula coarctata, flor. coloratis muticis. Mill. dict. n. 4. Hab. in Helvetia et Gallia. Distincta species.

11. *globosum*, panic. patula, glumis muticis, pellicellis cingulo luteo. Thunb. jap. p. 49. Hab. in Japooia.

12. *caerulescens*, flor. paniculatis aristatis, aristis gluma breviorib. Schousb. maroc. t. p. 34. Desf. atlant. t. p. 66. t. 12. In fissuris rupium Atlantis et circa urbem St. Crucis.

13. *paradoxum*, flor. paniculatis aristatis. Schreb. gram. t. 28. f. 2. Agrostis. Sauv. Monop. 45. Hab. in Gallia meridionali, Carniola. Panicula alba. Semen nigrum.

14. *villosum*, panicula laxa, flos. muticis, calycibus lanatis. Swartz prod. 24. Andropogon insularis. Liu. Amoen. acad.

5. p. 412. Sloan. jam. 35. hist. t. p. 43. t. 14. f. 2. Hab. in Jamaica. ©

15. *ramosum*, culmo ramoso, flor. paniculatis subternis hirsutis. Retz. obs. 6. p. 22. Hab. in India orientali.

146. AGROSTIS. Cal. 2-valvis, multiflorus, valv. acutis. Cor. 2-valvis. Stigm. longitudinaliter hispida, s. plumosa. (Flos. patentibus.)

* *Aristatae.*

1. *Spica venti*, petalo exteriori arista recta subita longissima, panicula patula. L. Willd. Sp. t. p. 361. Leers herb. t. 4. f. 5. Hab. inter segetes. ©

2. *interrupta*, petalo exteriori aristato, panic. attenuata coarctata interrupta. Voill. 88. t. 71. f. 4. (bona.) Hab. in Europa australiori. Virescens. Aristae longiusculae.

3. *spiciformis*, panic. spiciformi, flos. aristatis: arista altera receptaculo inserta geniculata longiori, altera infra apicem corollae rectis, cor. hirsutis. Lin. suppl. p. 108. Hab. in Teneriffa.

4. *hirsuta*, panic. subspicata, culmo folisque hirsutis, cor. dorso aristatis, spic. bifidis. Lin. suppl. 108. Cresc. cum priore.

5. *miliacea*, petalo exteriori arista terminali recta medioeri, flor. ovatis lacubus. Gouan. illustr. 3. Hab. in Hispania, Gallia et Sibiria. T.

6. *bromoides*, panic. simplici angustata, cor. pubescente: arista recta calyce longiore. Mant. 30. Gouan. illustr. 3. t. 1. f. 4. Hab. Monspelii. Cor. arista recta, scabra, calyce duplo triplove longior ut in Bromis. L.

7. *arundinacea*, panic. oblonga, petalo exteriori deorsum villosa, basi aristato, arista torta calyce longiore. Lin. Calamagrostis arundinacea. Roth. germ. t. 33. II. 89. Hab. in rupestrib. sylvestribus, glareosis iuniperetis. Pallescens. T.

8. *Calamagrostis*, panic. incrassata, petalo exteriori toto lanato apice aristato, culmo ramoso. Hab. in Helvetiae, Veronae alpinis. Panic. densa.

9. *serotina*, panic. flosculis oblongis mucronatis, culmo obiecto fol. brevissimis. L. Mant. 30. Segu. ver. 3. p. 146. t. 3. f. 2. Hab. Veronae. Fol. brevia, vix articulis longiora, patentia.

10. *rubra*, panic. primo contracta: flor. patente, petalo exteriori glabro, arista terminali toruli recurva.

Roth. germ. t. 3. II. 81. Hab. in Anglia, Suecia vulgaris. Panic. rubescens.

12. *stricta*, panic. elongata stricta, cor. calyce minoribus, arista e basi petali, toruli, flore longiore. Willd. Sp. t. p. 366. Hab. in America boreali. Aenis praecedenti. Foli. plana angusta linearia. Ligula lacera. Cor. tenera membranacea. W.

13. *ovata*, petalo exteriore ante apicem aristato; panic. ovata coarctata spiciformi. Forst prod. n. 40. Hab. in nova Zeelandia.

14. *canina*, calycib. ovatis coloratis, arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. Leers. t. 4. f. 2. Smith brit. 78. Hab. in pascuis graminosis. Arista setacea alba, medio notata geniculo fusco. L.

15. *alpina*, fol. setaceis, panicula coarctata, calycib. hispidiusculis coloratis; petalo exteriore truncato, arista dorsali geniculata. Leyser. halens. n. 67. ed. 2. p. 34. Scheuch. gram. prod. 29. t. 4. f. 1. Hab. in albis inque montibus Saxoniae. ☉

16. *rupestris*, fol. filiformi-setaceis, panicula patula, calycib. hispidiusculis patentibus coloratis, petalo exteriore arista dorsali geniculata flore duplo longiore. Willd. p. 108. Allion. pedem. n. 464. Hab. in Helvetiae, Bohemiae, Italiae rupestris. Flosculi stramineo-fusci nec violacei. W. ☉

17. *setacea*, cal. lanceolatis, cor. basi aristata; arista geniculata, fol. radicalibus setaceis. Smith. brit. p. 79. Curt. Flor. lond. t. 12. Agr. alpina. Withering. Hab. in Angliae ericetis aridis. Fol. glaucescentia.

18. *littoralis*, cal. linearis-lanceolatis aristatis, cor. nulla, arista subterminali recta, culm. decumbentibus. Smith. Fl. brit. t. p. 78. Withering Flor. t. 23. Hab. in littoribus marinis lutosi. Flor. Augusto.

19. *compressa*, panic. coarctata, calycib. aequalibus laevib. cor. infra apicem brevissime aristatis. Willd. A. dubia, cal. aequalibus. laevib. cor. infra apicem mucronatis, fol. setaceis. Leers herb. t. 4. f. 4. Hab. in Germania.

20. *vinealis*, calycib. coloratis, petalor. arista dorsali longitudine fere calycis, culmis adscendentibus. Schreb. spicil. 37. n. 977. Hoffm. germ. 35. Hab. Lipsiae in agris, collib. passim. Var. flosc. muticis. Priori affinis ☉

☉ ? *gigantea*, panic. parte superiore patentissima, calycibus hispidis, petalo teriore glabro, dorso superne subaristato,

culmo erecto. Roth. Fl. germ. l. p. 31. Willd. l. c. Crescit ad ripas fluviorum. ☉

* * Muticae.

21. *capillaris*, panic. capillari patente flexuosa, calycib. subulatis aequalibus glabris coloratis muticis. Smith. ic. ined. fasc. 3. p. 54. t. 52. Willd. l. c. Agrostis capillaris. Lin. Sp. plant. ed. 2. p. 91. Hab. in Lapponiae albis, etiam in Lantania secundum Swartz in bot. Journ. 2. p. 22.

22. *vulgaris*, panic. patente, ramulis divaricatis capillaribus, cal. aequalibus, petalo interiore duplo breviori retuso. Smith brit. t. p. 79. Hoffm. germ. ed. 2. p. 36. A. hispida. Willd. Spec. 1. p. 370. A. capillaris Auctorum. Leers. t. 4. f. 3.

☉ *p. pumila*. Lin., minor, culm. fasciculatus, sem. usilagine corruptis inclusis. Lightf. Scot. ic. in titulo. v. 2.

☉ *sylvatica*, panic. coarctata, cal. aequalibus; virginis cor. brevioribus, foecundatis (usilago) duplo longioribus. Lin. vid. Steinbuch im Naturforscher (promtuarium germanie.) Fasc. p. 233. t. 5. Smith. l. c.

23. *stolonifera*, panic. coarctata, culm. ramoso repente, flor. congestis, cal. aequalibus lanceolatis pubescentibus. Smith. l. c. Martin Flor. rustica t. 120.

☉ ? *coarctata*, panic. contracta, cal. subaequalibus, cor. brevioribus obtusis hispidulis; fol. angustis Hoffm. l. c. 37.

☉ *dulcis*, panic. densa breviuscula interrupta, flor. fasciculatis subsessilibus.

☉ *gracilis*, caespitosa, culm. gracili subdecumbente, panic. in spicam cylindricam coarctata, flosc. glabris subnullis. Hab. in arvis, pratis, sylvaticis, collibus. Obs. An recensitae varietates huc aut ad *albam* pertinent, aut distinctae species sint, determinare haecenus nequeo. var. ☉ sub nomine Agr. dulcis *Sibthorpii* hinc inde colitur, etiam e Silesia habro. In var. ☉, quam circa Lugdunum Gallorum collegi, glumae glaberrimae sunt, sed pellicelli subinerassati hispiduli ut vere in A. *alba*.

24. *pyramidata*, panic. patente parva pyramidata, cal. cor. longioribus vaginis ore pilosis. Lam. Ill. gen. p. 161. Hab. in Amer. meridionali.

25. *barbata*, panic. contracta subspicata, cal. inaequalibus, vaginis barbatis. A. littoralis Lam. ill. p. 161. Hab. in Amer. meridional. Rich.

P. senegalensis, ramis panicula longioribus. Lam. l. c. in Senegal.

25. *alba*, panicula laxa, calycibus muticis aequalibus, culmo repente.

A. palustris, panic. coarctata mutica, cal. aequalibus hispidiusculis, culm. repente. Huds. angl. 2^a. Flor. opaci subpurpureo. demum pallescent.

P. verticillata, panic. subinterrupta, flor. fasciculatis subsessilibus nitidis, glum. muticis. Villars. Dauph. 2. p. 74. Flor. vireunt. Caeteris specieb. europaeis major. Hab. in pratis humilis.

26. *diandra*, panic. elongata contracta, floribus subulatis muticis diandris, foliis convolutis. Retz. obs. 5. p. 19. Hab. in India.

27. *ciliata*, panicula mutica, gluma calycina angulata ciliata. Thunb. jap. 49. Hab. in Japonia.

28. *capensis*, panicula spicata cylindrica mutica, culmo nutante. Willd. A. spicata. Thunb. prod. 19. Hab. ad Cap. b. spici.

29. *pungens*, panic. contracta spicaeformis, fol. involutis rigidis pungentib. superioribus oblique oppositis, culmo ramoso. Schreb. gram. 2. p. 36. t. 2^a. f. 3. Lam. enc. 1. p. 59. A. Virginica Lin. Willd. sp. 1. p. 373. Hab. in maritimis Hispaniae, Galliae australis, etiam in America, Africa et Orienta. $\overline{\text{T}}$

30. *spicata*, panic. spicata, fol. involutis rigida, in geniculis coarctatis, ramis infraetis. Vahl. symbol. 1. p. 9. A. virginica armentis repentibus fol. convolutis ciliatis. Forsk. descript. p. 20. Hab. in Arabia desertis. $\overline{\text{T}}$

31. *maritima*, panic. spicata, ramulis brevissimis, cal. muticis laevibus aequalib. fol. involutis. Lam. ill. p. 161. enc. 1. p. 61. In arenosis maritimis prope Narbonne. Spic. fere ut in Poa cristata L. Hab. in desertis arenosis Arabiae. $\overline{\text{h}}$

32. *mexicana*, panicula oblonga congesta, cal. corollaeque acuminatis subaequalib. muticis, radice tuberosa. Hab. in America calidiora. Corollae. basi pilosae. Aristae nullae. Facies Cinnac. $\overline{\text{T}}$

33. *corumandellina*, panic. ovata patente, pedunc. simplicibus, flor. secundis muticis, cal. aequalib. acutis nitidis. Retz. obs. 4. p. 19. Vahl. symbol. 1. p. 10. Hab. in aridulis duris Malabaricae, Arabiae.

34. *tenacissima*, panic. contractata

filiformi, flor. muticis linearibus valvulis parallelis. Lin. suppl. 107. Hab. in India orientali. Radix dura caespitosa, culmis pluribus. Panic. filiformis, floribus adpressis.

35. *purpurascens*, panic. coarctata elongata, ramis adpressis erectis, flosc. inaequalibus acuminatis. Swartz. prod. 25. et Flor. p. 185. Hab. in Jamaica. Facies Airc. caespitosae. Sw. Sequenti affinis.

36. *indica*, panic. contracta spicaeformis longissima, fol. vaginantibus spicam subaequantibus. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 115. t. 73. f. 1. A. elongata. Lam. ill. p. 162. Hab. in Indiae occidentalis subhumidis. Panic. oblonga viridis c. racemis laterilib. alternis, rachis appressatis. Lin.

37. *procera*, panic. pedunculis racemosis erectiusculis, flor. hirsutis muticis lanceolatis. Retz. obs. 4. p. 19. Hab. in graminosis subhumilis Malabaricae.

38. *linearis*, spic. subquaternis digitatis, flosc. unilaterialibus alternis adpressis muticis. Retz. obs. 4. p. 19. Hab. in India ad vias tempore pulvisco.

39. *lenta*, spic. subternis umbellatis, flosc. muticis oblongis acutis, valvulis cal. subaequalibus, fol. vaginisque glabris. Ait. Kew. 1. p. 16. Hab. in India. \odot

40. *stellata*, spic. quaternis umbellatis, flosc. muticis ovatis compressis, valvulis cal. inaequalibus, fol. vaginisque glabris. Willd. p. 376. Hab. in Insula St. Helenae. Spicae quaternae basi folio involutae. W.

147. **STURMIA**, Cal. 2-valvis: valv. aequalibus truncatis. Cor. minor, 2-valvis ovata lanuginosa, mutica. (Spica filiformis, flor. alternis sessilibus.)

1. *verna*. Agrostis minima. L. Willd. Spec. 1. p. 372. Hoppe in Sturm. Flor. germ. icon. Hab. in Europ. australis agris, ruderalis; Vcre.

148. **AIRA**, Cal. nitens, 2-valvis, 2-florus. Cor. 2-valvis, mutica aut basi aristata.

* Muticae.

1. *arundinacea*, panicula oblonga secunda mutica imbricata, foliis planis. Sp. pl. 95. Willd. Sp. 1. p. 376. Hab. in Oriente.

2. *minuta*, panicula laxa subfastigiata ramosissima, flosc. muticis. Loebl. it. 117. Schreb. gram. 1. 21. f. 2. Hab. in Hiisp.

3. *aquatica*, panic. patente, flor. muticis laevibus cal. longiorib., fol. planis l. Poa siroi. cs. Koeler. Vall. parisi. 89. t. 17. f. 7. Obs. An ob affinitatem cum Poa distante ad Poa aman-lunda? Hab. in agrositis.

4. *caerulea*, panicul. coarctata, flor. conico-cylindricis. Melice. Lin. Leers. t. 4. f. 7. Molinia caerulea. Koeler gram. p. 145. Hab. in pratis, pascuis sylvisque udis. Habitat arundinaceus, var. praesertim major sylvatica. Culm. fere cno-lus. Forte distincti generis. Interdum flosc. incompleti rudimentum adest.

5. *melicoides*, panic. subracematim coarctata, flor. majusculis linearilanceolatis muticis basi villosis: rudimento flosculi pedicellato. Michaux l. c. Hab. in Canada.

Obs. Ex secundi flosculi basi nascitur pedicellus elongatus villosus floris rudimento vix perceptibili terminatus Mich. l. c.

6. *obtusata*, panic. oblonga racemosa, fol. angustis, cal. valv. altera linearilanceolata, altera obovali, flor. muticis apice compressis, Michaux Flor. p. 62. Hab. in Carolinae aridis.

7. *involutrata*, panic. patente, basi setaceo-involucrata, flor. muticis longitudine cal., fol. convolutis. Willd. l. c. Cavan. ic. t. p. 33. n. 48. tab. 44. f. 1. Hab. in collibus sterilibus Hispaniae. ☉

* * Aristatae.

8. *subspicata*, fol. planis, panic. spirata flosc. medio aristatis: arista reflexa laeviore. Linn. Planta adhuc dubia, forte Koeleriae generis? Hab. in Helvetiae, Lapponiae alpinis. ☿

9. *cespitosa*, fol. planis nervosis, panic. patente, petalis basi villosis aristisque: arista recta brevi. Linn. Leers t. 4. f. 8. Hab. in Europae pratis. Panic. nitens. Fol. scabra, plicata. ☿

10. *ambigua*, fol. subsetaccis, panic. ampla pyramidata, glum. sarracenticibus, petalis basi brevilaristatis villosisque. Mich. p. 61. Hab. circa lacus Mistassina.

11. *flexuosa*, fol. setaccis, culmis subnudis, panic. divaricata, pedunc. flexuosis l. Flor. dan. 157. Leers. t. 5. f. 1. Schuch. gram. t. 6. f. 1. Hab. in arenosis.

12. *montana*, fol. setaccis, panic. coarctata flosc. basi pilosis aristatis: arista tortili longiore. Leers t. 5. f. 2. Hab. in montosis. An prioris junior planta?

13. *alpina*, fol. subulatis, panic. densa

flosc. basi pilosis aristatis: arista brevif. Schuch. gram. 222. Hab. in alpinis.

14. *antarctica*, fol. planis, panic. composita patente, calycib. trifloris, flosc. medio aristatis, arista elongata rectiuscula. Forst. prod. 41. Hab. in Nova Zeelandia. An Avena?

15. *canescens*, fol. setaccis: summo spatheo paniculam inferne involvente, aristis clavatis cal. brevioribus. Hab. in arenosis, Panicula deflorata et vagina exit. Fol. glauca.

16. *articulata*, paniculata, cal. flosculo longiore acuto, arista clava nodosa et basi glumae prodeunte. Desf. Atl. t. p. 70. t. 13. Prope Mascara in arvis. Fol. glauca lata: spica convoluta. D.

17. *chinensis*, fol. setaccis, panicula erecta, flosc. aristatis villosis. Retz. obs. 3. p. 10. Hab. in China.

18. *praecox*, fol. setaccis: vaginis angulatis, flor. subspic. flosculis basi aristatis. Flor. dan. t. 383. Smith angl. t. p. 87. Hab. in campis arenosis et sylvaticis. Flosc. basi nudis, dorso aristatis. Smith.

19. *caryophyllea*, fol. setaccis, panic. divaricata trichotoma, flor. aristatis distantibus. Leers t. 7. f. 7. Hall. helv. n. 1482. Hab. in Angliac, Germaniae, Galliac glaucosis. ☉

20. *setacea*, fol. setaccis, panic. diffusa, flosc. basi pilosis: inferiore mutico, superiore arista brevi. Retz. obs. 3. p. 10.

149. MELICA. Panic. spicae antice reniformis. Cal. coloratus, 2-valvis, 2-flores: glum. laxae, obtusae membranaceae, inaequales. Cor. 2 valvis, ventricosa, minor. Rudim. floris.

1. *ciliata*, spicata, flosculi inferioris petalo ciliato l. Hab. in collibus sterilib. saxosis. Palleseens. ☿

2. *decumbens*, corol. hirsutis, flor. racemosis nutantibus, culmo decumbente. Thunb. prod. 21. Ad cap. 6. Sp.

3. *racemosa*, corol. hirsutis, racemis cernuis, culmo erecto. Thunb. prod. 21.

4. *nutans*, cal. bifloro, petalis imberbibus, panicula nutante simplici. Schreb. gram. 62 t. 6. f. 2. M. montana. Lam. enc. Hab. in Europae frigidioris sylvaticis montosis. Flor. subsecundi majusculi pedicellis breviusculis, Cor. subsulcata. Cum sequente ut plurimum confunditur.

5. *uniflora*, panic. suberecta divisa cal. uniflora. Retz. obs. 1. p. 10. Willd. Spec. 1. p. 383. M. Lobelii, panic. ramosa, fol. vaginis acuminata oppositifolia, radice, racem. Villars delph. 2. p. 50. t. 3. f. 3. Passum cum priore, cui similis. ¶

6. *minuta*, culmo ramoso, fol. setaceis, petalis imberbibus. Lin. Man. 32. Hab. in Italia. Racemi simpliciter, capillares, pauciflori. Cal. bivalvis ovatus, flosculis dimidio brevior. Planta subia.

7. *setacea*, flor. racemosis, fol. setaceis subdistichis, petalis subhauratis. Hab. in Gallia prope Beaucaire. Fol. laevia.

8. *aspera*, fol. angustis conniventibus, panic. patente pyramidalata, glumis imberbibus. Desf. Atl. 1. p. 71. Barrcl. 1. 95. f. 1. Hab. in fœcis rupium in Atlant. Vag. striata. Flor. racemosi, unilaterales. Cal. 3-florus. Desf.

9. *pyramidalis*, panic. patente pyramidalata, glumis variis, fol. latiusculis subconvolutis. Lam. ill. p. 175. Morison sec. 8. t. 7. f. 1. Hab. in Barbaria, et Europa australi. B. Cor. subvillosa, Gmel. sib. 1. t. 19. f. 1.

10. *laxiflora*, panic. ramis divaricatis capillarib. multifloris, cor. altera ciliata. Cav. ic. 5. p. 48. t. 473. f. 2. Hab. in regno Chilensis.

11. *glabra*, tota glabra. panic. erecta laxa: ramis simplicibus paucifloris, flor. glumis imberbibus. Michaux Flor. p. 67. Moris. hist. 3. s. 8. t. 7. f. 51. In Virginia et Florida.

12. *papilionacea*, calycis valvula inferiore maxima colorata, petalo exteriore subciliato. L. Mont. 31. in brasiliana. Art. spec. 2. p. 17. t. 6. f. 1. 2. Hab. in Brasilia. Forte una ex sequentibus huc pertinet.

13. *aurantiaca*, panic. subspicata, anl. valvula exteriore maxima aurantia. Cav. ic. 5. p. 46. t. 472. f. 1. Lam. enc. 4. p. 70. Hab. in vicinis Montevideo in Amer. Fol. subvillosa.

14. *violacea*, panic. subspicata secunda, cor. violaceis ciliatis, calyc. valvula exteriore argentea apice denticulata. Cav. l. c. Hab. in regno Chilens. Priori affinis.

15. *rigida*, panic. subspicata secunda: cal. corollis aequali: harum valv. altera ciliata. Cav. ic. 5. p. 47. t. 472. f. 1. Cresc. in Montevideo. Vol. superioris vagina spatheiformis; ligula multifida. Cav.

16. *altissima*, panic. coarctata spiciformi, petal. imberbibus. Willd. spec.

p. 385. Gmel. sibir. 1. p. 98. t. 20. Hab. in Sibiria. Flos. majusculi oblongi pallidi.

¶. *interrupta*, spica elongata interrupta flosculis oblongis linearibus coloratis imberbibus. In hortis subinde colitur.

150. *HOLCUS*. Flor. (polygamu) paniculati. Cal. 2-torus, 2-valvis, (opacus, nervosus). Cor. minor: valv. altera aristata. Nectar. lineare, 2-partitum. Stigm. subsessilia.

1. *lanatus*, glumis villosis mucronatis, flor. masculi arista incurva, fol. vagina tumida villosa. Lin. Leers t. 7. f. 6. Schreb. gram. 1. 20 f. 1. Hab. ubique in pratis. Rad. fibrosa. Glumae calycinac mucrone longiusculo distinctae.

2. *mollis*, subglabris, rali repente, glum. nudiusculus, arista geniculata exserta. Lin. Smith. angl. 1. p. 89. Schreb. l. c. f. 2. Curt. Lond. ic. Hab. in arvis et nemorosis. Panic. subflavescentes demum. Flor. omnes hermaphroditi.

Obs. Reliquas Linnæi species, quarum descriptiones vide apud Reichard, Syn. pl. 4. p. 307-309, omisi, cum nesciam an jure sub hoc militent genere: forte pleraque Aïræ sunt. *Sorghis* species vide infra.

151. *PHALARIS*. Cal. 1-florus, 2-valvis: valvulis subovatis dorso membranaceo-carinatis, aut lanceolatis, aequalibus, nervosis. Cor. inclusa, 2-valvis, basi pilosa (sæpius.)

1. *arundinacea*, panicula oblonga ventricosa coarctata, glumis acuminatis. Lin. Arundo colorata. Aiton. Willd. Spec. 1. p. 457. Hab. in pra-is-humidis et ad ripas. In hortis colitur var. fol. lineis albis pictis. Semina nitida. Holum refert.

2. *canariensis*, panic. spiciformi ovata, glumis calycinis navicularibus integris, cor. 3-valvi: valvulis exterioribus lanceolatis glabris, interioribus villosis. Aet. Kaw. 1. p. 85. Willd. Sp. 1. p. 326. Schreb. t. 10 f. 2. Hab. in Canariis inter segetes, hinc inde in Europa colitur. ☉

3. *aquatica*, spica cylindrica glum. navicularibus denticulatis, cor. 3-valvi: valvulis interiorib. villosis: exteriore minuta subulata. Aet. l. c. p. 86. Ph. minor. Retz Obs. 3. p. 8. Harr. rar. t. 700. f. 1. Hab. in Aegypto et ad Tiberim.

4. *saliva*, spica cylindrica, glumis co-

rinatis glabris margine membranaceis. P. *Bellardi*, Willd. in N. Act. berol. v. 3. p. P. *Bulbosa*, Lin. Hab. in Italia, Oriente et etiam his in locis quasi sponte. Pro avicularum canariensium nutrimento in nonnullis regionibus colitur, et in Europam deportatur, cfr. Desf. Atl. t. p. Rod. in paucissimis bulbosa seu fibrosa.

5. *tuberosa*, spica mutica subcylindrica glumis apice crenatis, culmo basi globoso-tuberoso. Ph. *bulbosa*, Cav. ic. t. p. 46. t. 64. Hab. in Hispania. Culm. basi bulbis saepe tribus globosis, concatenatis. C.

6. *capensis*, panic. spicata ovata, glum. integris, culmo geniculato decumbente. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spei.

7. *arenaria*, spica obovata, glumis cal. integerrimis ciliatis, vagin. ventricosa. Phleum spica ovata ciliata, caule ramoso. J. in. Pluk. alm. 177. t. 31. f. 8. Crypsis. Desf. Atlant. t. p. 61. Hab. in Europae et Barbar. arenosis. Cal. cor. multo major: glumis lanceolatis. ☉

8. *alpina*, panic. cylindrica spiciformi, glumis calycinis mucronatis carinatis dorso ciliatis. Willd. l. c. Hab. in alpinis.

9. *paradoxa*, panic. mutica oblonga spiciformi, glumis calycinis navicularibus unidentatis, corolla bivalvi glabra, flosc. infimis praenatis. Alt. l. c. Linn. fl. dec. 35. t. 18. Schreb. gram. t. 12. Ph. praemorsa. Lam. ill. p. 164. Hab. in Oriente et Lusitania.

10. *eruciformis*, panicul. secunda linearis, cal. 1-2 floris. Lin. Cynosurus eruciformis. Ait. Willd. Sp. t. p. 412. Barr. rar. t. 29. Gmel. sib. t. 29. Hab. in Europa australi, Sibiria et ad fretum Hudsonis.

11. *villosa*, panic. multiflora stricta, flor. obovatis villosis. Michaux Flor. p. 45. In sylvis Carolinae. Habitu recedit.

152. **CRYPISIS**, Cal. 2-valvis, Cor. 2-valvis, longior. Stam. 2-3. Spica folior. vagina involucreta; seu flor. in capitulum foliatum congestis.

1. *aculeata*, caule ramosissimo, spic. capitulo - hemisphaericis, fol. vaginantibus brevibus pungentibus cinctis. Willd. Spec. p. 158. Lam. ill. gen. t. p. 166. t. 42. f. 2. Anthoxanth. aculeatum. L. Moris. hist. 3. p. 195. a. 8. t. 5. f. 3. Hph. in Europae australi locis petrosis glareosis, etiam in Barbaria. ☉

2. *Schopenoides*, spic. ovatis vagina fo-

liacea cinctis, caul. romoso procumbente. Lam. l. c. f. 1. Phleum schopenoides. L. Jacq. Fl. austr. app. t. 7. Spartina phleoides. Roth N. Bot. Beytr. 3. p. 101. Hab. in Italia, Gall. australi, Hisp. et Smyrnae Antecedente dimidio fere major. ☉

153. **PHLEUM**, Cal. (induratus) 2-valvis: valv. linearibus, apice retuso seu carina prominente utrinque bicuspidato. Cor. inclusa. (Flor. spicati.)

* *Spica composita.*

1. *Phalaris*, spica composita cylindrica, glumis ciliatis carinatis mollioribus. Phalaris *phleoides* L. Flor. dan. t. 511. Engl. bot. t. 459. Hab. in versuris egrorum. Cal. minus retuso et teneriore Phalaridis affine. ☉

2. *asperum*, spica composita cylindrica, cal. gibbo aspero. Viliars dauph. a. p. 61. t. 2. f. 4. Ph. *viride*. Allioni. Phalaris. Retz. Willd. Sp. t. p. 328. Hab. in Europa australi. Cal. subcartilagineus, fere glaber. ☉

3. *dentatum*, spic. subpaniculata cylindrica, glumis serratis, culm. geniculato. Thunb. prod. p. 19. Lin. suppl. p. 106. sub Phalar. Hab. ad Cap. b. spei. Glum. carina cartilaginea dentata: dentib. globosis. ☉

** *Spica simplicis.*

4. *pratense*, spica cylindrica ciliata elongata, culmo erecto. Lin. Leers. Herb. t. 3. f. 1. Schreb. gram. t. 14. Hab. in pratis, ad versuras. ☉

5. *alpinum*, spica villosa ovato-cylindrica. L. P. spicis ovatis hirsutis, locustis longe bicornibus. Hall. helv. n. 1529. Hab. in alpinis. Spica nigrescens s. atro-purpurea.

6. *Gerardi*, spica subrotunda, glumis ciliatis, culmo simplici, vaginis ventricosis. Gerard prov. 78. n. 4. Jacq. ic. rar. a. t. 301. Hab. in summis alpinis Europae austral. Stylus unicus? cfr. Jacq. ic. 301.

7. *nodosum*, spica subcylindrica parva, culm. ascendente, fol. obliquis radice bulbosa. Flor. dan. t. 380. Leers t. 3. f. 2. Gram. nodosum, spica parva, Bauh. Hab. in collib. graminosis. Spica glabra.

154. **ALOPECURUS**, Spica. Cal. 2-valvis, Cor. 1-valvis, basi aristata, aut mutica.

1. *bulbosus*, culmo erecto, spica cylindrica, radice bulbosa. Gouan. monsp. 37. Willd. Sp. t. p. 356. A culmo erecto,

spica simplicissima attenuata, glum. calycinis distinctis (nec basi connatis.) Smith Flor. brit. 1. p. 73. Barr. ic. 69. f. 1. Hab. io Galliae, Angliae pratis. $\overline{\text{L}}$

2. *pratensis*, culmo erecto, glumis villosis, cor. muticis. Hab. in Europae pratis. $\overline{\text{L}}$

3. *capensis*, spica cylindrica, glumis glabris muticis. Thunb. prod. 19. Hab. ad Cap. b. spei.

4. *antarcticus*, culm. erecto, spica ovata; glumis hirsutis, cor. aristatis; aristis cal-longioribus. Vahl. symbol. 2. p. 18. Hab. ad fretum Magellanicum.

5. *agrestis*, culm. erecto, spica cylindrica (purpurascens) glum. lacvib. Leers t. 2. f. 5. Schreb. gram. 140. t. 19. f. 2. Hab. in agris. $\overline{\text{L}}$

6. *subaristatus*, culm. erecto, glumis ovalibus obtusis, aristis vix exsertis. Mich. Flor. amer. 1. p. 43. Hab. in Caoudae paludosis.

7. *geniculatus*, culm. spicato iofracto, cor. muticis. Leers t. 2. f. 7. Roth. germ. 2. p. 78. Hab. in uliginosis $\overline{\text{L}}$

8. *echinatus*, panic. spicata ovata, glum. punctatis ciliatis, culmo geniculato. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spei.

9. *utriculata*, spica ovata, valv. calycinis compressis subcallois, carina pilosis, arista articulata, fol. vag. superne utriculata. Phalaris utriculata. Län. Scop. delic. insubr. t. 12. Tozzettia pratensis. Savi in act. ital. v. 8. p. 477. Hab. in Anglia; praesertim vero in Italia in pratis Mediolanensib. et Ticinensibus quae Maritiae vocantur. Scop. Ao distincti generis cum sequente?

10. *ventricosa*, elongata, spica cylindrica, glumis villosis, cor. aristatis, vagina ventricosa. Hab. in Gallia. Phal. *utriculata* quorumdam. Cor. uoiglumis uti in priore. A. *pratensi* affinis.

155. POLYPOGON. Cal. 2-valvis, aristatus, uniflorus. Cor. 2-valvis: valvula exteriori aristata.

1. *monspeliense*, (*crinitum*), panicula coarctata subspicata, calycib. subpubescentibus margine ciliatis. Willd. in Act. nov. Soc. Nat. Berolin. vol. 3. Desf. atl. 1. p. 67. Alopecurus Lin. Phleum crinitum. Schreb. gram. t. 20. f. 3. Smith. Flor. brit. 1. p. 71. β . *panicum*. Alop. *panicus*, minor, glumis villosis Län.

cyst. veg. Barr. ic. t. 115. f. 1. Hab. in Galliae et Aegliae maritimis.

2. *maritimum*, panicula coarctata subspicata ovata, cal. hirsutis margine ciliatis, culmo geniculato. Willd. l. c. Hab. ad oras maris circa Rochelle. Bompload.

3. *vaginatum*, panic. coarctata subspicata ovata, val. villosis, vaginis inflatis. Willd. l. c. Alopecurus. Pallas in Nov. Act. Petropol. 10. p. 304. Cresc. in Tauria, locis siccis.

4. *fasciculatum*, panic. subracemosa, cal. valvula exteriori longissime aristata, posteriore mucronata. Willd. l. c. (P. *subspicatum*). Cincturus fasciculatus. Link in Schrad. Bot. Journ. 1793. 2. p. 313. Crescit in Extremadura Hispaniae, in agris.

156. CHRYSURUS. Flor. spicato-racemosi. Spiculae biformes: steriles pendulae muticae multivalves ad basin fertilium involu-crum mentientes; *fertilius Cal.* 2-valvis, 2-3-florus. Cor. 2-valvis: valvula exteriori longe aristata.

1. *Cynosuroides*. Cynosurus aureus. Lio. Willd. 1. p. 418. Koeler gram. p. 377. Barr. rar. t. 4. Hab. in Europa australi ad rupes, Barbaria et in Oriente. Spic. densa, flavo-vireos.

157. PANICUM. Inflorescentia varia. Cor. 3-valvis: valvula tertia dorsali minima. Cor. 2-valvis.

* *Spicata.*

1. *polystachyon*, spicis teretibus, involu-cellis unifloris fasciculato-setosis, culmis erectis superne ramosis. Län. Willd. Sp. p. 333. Hab. io India et Aegypto. P. *glauco* similis. Stigm. sanguinea. \odot

2. *purpureum*, spic. tereti, involu-cr. 1-2-setis inaequalib. flosculo maioribus 1-floris, culmo tereti ramoso. Flor. Per. 1. p. 48. Hab. in praeruptis Tormae. Stigm. plumos., purpureum.

3. *sericeum*, spica tereti, involu-cr. setaceis villosis unifloris longitudine flosculo-rum, fol. planis. Ait. Kew. 1. p. 88. In Iod. occidentali. \odot

4. *verticillatum*, spica verticillata, racemulis quaternis, involu-cr. unifloris bisetis, culm. diffusis L. Roth. germ. 2. p. 69. Curt. Lood. ic. Hab. in Europa australi et Oriente. \odot

5. *helvolum*,

5. *helvolum*, spica tereti, involuclis unifloris fasciculato-setosis, seminibus nervosis. Lin. suppl. 107. Hab. in India orientali. Simillimum *P. glauco*. Culm. seepedalis, ramosus. Folia versus basin pilis albis, patentibus. ☉

6. *glaucom*, culm. basi decumbente, spica subovata tereti, involuc. 1 floris fasciculato-pilosis, seminibus undulato-rugosis. Leers. t. 2. f. 2. Schreb. gram. t. 25. *p. elongatum*, culm. longiore erecto. Hab. in agris post messem frequens; etiam in India. *p. ex America*. Pedunc. sulcatus, spica lutescens. ☉

7. *viride*, spica cylindrica, involuclis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. Leers. t. 2. f. 2. Flor. dan. t. 852. Cum priore.

8. *germanicum*, spica composita coarctata, spiculis glomeratis, involuclis setaceis flore longioribus, rachi hirsuta. Willd. spica composita ovata, setis brevioribus, pedunculo hirsuto. Roth. germ. I. p. 27. II. p. 71. Hab. in Europa australi. ☉

9. *italicum*, spica composita basi interrupta nutante, spiculis glomeratis, involuclis setaceis, flore multo longioribus, rachi tomentosa. Willd. Sp. t. p. 336. Rumph. amb. 5. t. 75. f. 2. Hab. in Indiis et Europ. australi.

10. *setosum*, spica composita, spiculis paniculato-fasciculatis, setis flosculis immixtis longissimis, pedunculis subglabris. Swartz prod. 22. Flor. ind. occid. p. 139. Hab. in Jamaicae montosis fruticetis.

11. *lanceolatum*, spic. alternis, calyc. valvula extima ciliata aristata, fol. lanceol. Retz. obs. 5. p. 17. Hab. in India.

12. *stagninum*, spic. secundis alternis, calycib. bifloris aristatis hispidis. Retz. obs. 5. p. 17. Hab. in stagnis Indiae orientalis.

13. *Crus corvi*, spic. alternis secundis spiculis subdivisis, glumis subaristatis hispidis, rachi trigona. Sp. plant. 84. Hab. in Indiis. Sequentie tenacius. Aristae longae.

14. *Crus galli*, spic. alternis conjugatisque secundis; spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulari. Leers herb. n. 41. t. 2. f. 3. Curt. lond. ic. Hab. in Europae, et Virginiae cultis. Var. aristis subnullis. ☉

15. *muricatum*, humifusum, glumis tergidis, muricato-hispidis. Michaux Flor. p. 47. Hab. in Canada ad ripas. Cenchrum refert.

16. *setigerum*, spic. remotis, flosc. secundis, racheos dentibus setigeris. Hab. in China.

17. *colonom*, spic. alternis secundis muticis ovatis scabris, rachi teretiuscula. Lin. Vahl. symbol. 1. p. 9. Pluck. alm. 174. t. 189. f. 5. Ehret. pict. t. 3. f. 3. Hab. in Indiae cultis. Spiculae subsessiles absque fasciculis pilosis. ☉

18. *Auitans*, spic. alternis sessilibus secundis, valv. calycina tertia minuta. Willd. Sp. p. 338. Retz. obs. 3. p. 8. et 5. p. 23. Vahl. symbol. 1. p. 8. Pluck. Alm. 110. t. 417. f. 7. In Madagascar, Arabia, India.

19. *brizoides*, spic. alternis sessilibus secundis, valv. calycinis limbo corolla multo brevioribus retusis tertia longitudine corollae. Willd. l. c. Retz. obs. 5. p. 18. Pluck. alm. 174. t. 197. f. 1. Hab. in India. Obs. An. cum priore potius ad Digitarias pertinet?

20. *paspalodes*, spic. alternis muticis appressis sessilibus, glum. ovatis mucronatis glaberrimis. Pan. Brizoides. Lam. l. c. Hab. in India.

21. *granulare*, spic. alternis muticis erectis sessilibus, glum. laevibus subglobosis, culm. ramoso. Lam. ill. gen. p. 170. Hab. in Insula Franciae.

22. *Avidum*, culm. folioso, spicul. remotis sessilibus appressis secundis paucifloris. Retz. obs. 4. p. 15. Hab. in Zeylona Antecedenti affine.

23. *dimidiatum*, spic. dimidiato-secunda, spiculis quinquelloris, rachi excavatae alterne appressis. Retz. obs. 6. p. 23. Lin. Syst. vez. 13. p. 50. Burm. ind. 25. t. 8. f. 5. Hab. in India. Spiculae florentis 5 cal. singuli flosculi lanceolatus: valvula extima minuta obtusa L.

24. *pilosum*, spic. paniculatis alternis secundis, spiculis geminis, altero minore, acuminatis laevibus, rachi compressa pilosa, culmo divaricato geniculato. Swartz. prod. 22. Ej. Flor. p. 141. In Jamaicae pascuis sylvestris.

25. *molle*, spic. paniculatis alternis secundis patentibus, spiculis approximatis pedicellatis secundis muticis, culm. adscendente, fol. villosis. Swartz. fide. p. 143. In pratis Jamaicae fertiliorib. Culmi quasi succulenti. Sw.

26. *fasciculatum*, spic. paniculatis alternis erectis subfastigiatis, spiculis secundis subrotundis. Swartz. prod. 22. Ej. Flor. p. 145. Hab. in Jamaica, gramin. depressis

27. *scabrum*, spic. alternis, crassis secundis scabris, glumis aristatis hispidis, rachi tuberculata. Lam. ill. p. 171. Hab. in Senegal.

28. *barbatum*, spic. alternis subdivisis, glumis glabris aristatis subaristatis, rachi vaginisque fol. barbatis. Lam. l. c. In Insula Franciae.

29. *pyramidalis*, spic. alternis numerosis pyramidalis, glumis mucicis sublaevibus, fol. glaucis. Lam. l. c. Hab. in Senegal et in America occident.

30. *plicatum*, spic. alternis remotis mucicis brevibus, cor. rugosis, fol. plicato-sulcatis. Lam. l. c. In Insul. Franciae?

31. *chartagenense*, spic. paniculatis, fol. brevioribus, spiculis secundis ovatis acutis, culm. prostrato-ramosis, vag. pubescentibus. Swartz. Flor. t. p. 148. Hab. in America meridionali, Chartagena. $\frac{1}{2}$

32. *conglomeratum*, spic. secunda subovata flosc. obtusis. Mant. 524. *indicum* racemo spicato simplici, culmo filiformi repente ramosissimo. Mant. 184. Retz. obs. 3. p. 9. Hab. ad villas et plateas Indiae orientalis. Racem. terminalis, pedunculatus, subapicatus, folio brevior, stigm. plumos, magnitudine totius floris.

33. *interruptum*, spic. simplici interrupta, spiculis bifloris pedicellatis nudis. Will. sp. p. 341. *P. caudatum*. Thunb. prod. 19? Hab. in Indiae stagnis. Nodi culmi nigri. Fol. longa linearia. Spica simplicissima, pedalis. Pedunc. uniflor. Willd.

**** Spic. composita, spicul. compressis secundis.**

34. *hirtellum* (undulatifolium), culm. repente, foliis latiusculis undulatis, spica composita, spicul. appressis alternis, cal. geminis; valv. omnibus aristatis; extima longissima. Lin. Amaen. acut. 5. p. 391. Wulf. et Jacq. Coll. t. p. 263-264. Allion. pedem. 2. p. 270. *P. undulatifolium*. Arduin. spec. 2. t. 4. Hab. in India, Austria. infer. et Italia.

35. *setarium*, spic. alternis brevissimis subtrifloris sessilibus, cal. aristatis; extima singulissima. Lam. ill. p. 170. In Ainer. meridionali.

36. *bromoides*, spic. alternis sessilibus, cal. aristatis, involu. setosis; fol. brevibus. Lam. l. c. Hab. in Insul. Franciae.

37. *cespitosum*, spic. alternis erectis, spicul. secundis ovatis, culm. subramoso repente, ramis diffusis filiformibus, fol. ovato-

lanceolatis. Sw. Flor. Ind. occid. t. p. 146. Hab. in pascuis siciorib. Jamaicae.

38. *foliaceum*, spic. secundis alternis longis sessilibus, flor. distichis geminis remotis, cal. aristatis. Lam. ill. p. 170. In India.

39. *compositum*, culm. repente, spica composita, spiculis linearibus secundis flosc. geminis remotis, calycibus aristatis. L. Willd. sp. p. 346. Fl. zeyl. 42. Houttuyn. t. 90. f. 1. Hab. in Zeylona. Spiculae 4. s. 5. alterae, rachi adpressae, unilaterales.

40. *elatum*, culmo erecto, spica composita, spiculis oblongis sparsis adpressis, flosculis confertis, calycibus mucronato-aristatis. Linn. suppl. 107. Hab. in Malabaria. ☉ Spiculae 12 in omni latere racheos, nec secundae.

***** Paniculata.**

41. *dichotomum*, paniculis simplicibus, culmo ramoso dichotomo. L. Gron. Habit. in Virginia. Refert arbusculum.

42. *ramosum*, panicula ramis simplicibus, flor. subternis; inferiore subessili, culmo ramoso. Mant. 29. Hab. in utraque India. Fol. margine fauceque ciliata.

43. *deustum*, panicula patente, flor. solitariis, glumis glabris apice purpureis. Thunb. prod. 19. Hab. ad Cap. b. spei.

44. *coloratum*, panic. patente, staminibus pistillisque coloratis, culmo ramoso; ram. filiformibus. Mant. 30. Jacq. Misc. v. 2. p. 365. Icon. rar. 2. t. 12. Hab. Cairi. Antherae crocaeae et Pistilla saturate violaceae.

45. *repens*, panic. virgata fol. divaricatis, culm. basi repente. L. Willd. p. 347. Cav. ic. t. 110. Desf. Atl. 1. p. 60. In India Barbaria et Hispania. ☉ Fol. inferiora, undique canlim vaginis pubesc. vestientia patentissima.

46. *numidianum*, culm. erecto, flor. paniculato-racemosis secundis geminis; altero sessili. Desf. l. c. t. 11. Lam. ill. n. 902. Hab. rope la Calle in arenis humidis.

47. *ischaemoides*, panic. erecta contracta, calycibus bifloris polygamis acutis, culmo simplici, fol. distichis rigilib. Retz. obs. 4. p. 17. Hab. in Malabaricae locis udis.

48. *remotum*, panic. ramis triquetris, flosc. subgeminatis, altero pedicellato, culmo ramoso tetragono-compresso. Retz. l. c. In India orientali.

49. *aristatum*, culmo repente radican-

te, panic. ramis indivisis, flosc. binis scissilibus aristatis. Retz. l. c. Hab. in China.

50. *Milium* (*miliaceum*, L.), panic. laxa flaccida, fol. vaginis hirtis, glumis mucronatis nervosis. Hab. in India; nunc ubique colitur. ☉

51. *Jaeva*, panic. laxa subflaccida, glum. oblongis lacvibus, fol. vaginis glabris. Lam. ill. gen. t. p. 172. Hab. ad St. Domingo. Cal. interlum 4 valvis.

52. *miliare*, panic. laxa subflaccida, glum. subconfertis acutis striatis, vaginis glabris. Lam. l. c. p. 173. In India.

53. *antidotale*, panic. nutante, calycib. bifloris polygamis acutis, culmo erecto ramosissimo. Retz. obs. 4. p. 17.

54. *notatum*, panic. patente: axillis notatis, fol. lanceolatis ciliatis. Retz. obs. 4. p. 18. In Sumatra.

55. *muricatum*, panic. patente, flor. solitariis muricatis, culmo radicante adscendente. Retz. l. c. Hab. in India.

56. *capillare*, panic. capillari ramosissima patente, flor. minutis; perluce strictis, calyc. acuminatis lacvibus, vaginis hirsutissimis. Retz. obs. 3. p. 9. Liu. Syst. veg. 106. Michaux Flor. p. 48. Habit. in Virginia, Pennsylvania, Jamaica. Simile Poae capillari, sed totum hirsutum. ☉

57. *capillaceum* (*flamentosum*), panic. capillacea patente, glumis obtusis minimis, fol. latis basi vaginisque ciliatis. Lam. ill. p. 173. Sloan. t. 72. f. 3. Cal. 1-florus. Lam.

58. *tenellum*, glaberrimum, panicul. parva patente, alum. obtusis curvatis, culm. ramoso filiformi. Lam. l. c. Hab. in Sierra Leona. Cal. valv. aequales. Lam.

59. *flexuosum*, panic. capillari patente, pedunculis flexuosis, calycibus ovatis, geniculorum barba reflexa. Retz. l. c. Hab. in India. Var. glabra. Retz. obs. 4. p. 16.

60. *grossarium*, panic. ramis simplicibus, flor. geminis pedicello altero brevissimo, altero longitudine floris, culm. erecto. Moen. acad. 5. p. 362. Hab. in Jamaica.

61. *maximum*, panic. ramis simplicibus pedunculis capillaceis adpressis bi-vel trifloris, fol. lineari-lanceolatis, culmo erecto. Jac. ic. rar. 1. t. 13. Collect. 1. p. 76. Hab. in Insula Guadeloupe. Stigm. plumosa purpurea. ☉

62. *hirsutum*, panic. composita capillari patente, culm. vaginisque setoso-hirsutis, fol. lanceolatis acuminatis nervosis striatis. Sw. Flor. Ind. occident. l. p. 173.

Hab. in Jamaicae et Hispaniolae graminosis. Priori affine.

63. *jumentorum*, panic. composita capillari patente, flo-c. polygamis, ramis racemosis, nodis articularum hirsutis. P. *polygamum*. Swartz. prodr. p. 24. Frequens ad animalia domestica nutrienda in Amer. meridionali colitur. Genuinus locus natalis est Africa septentr. unde ab incolis *Guinea* - *Gras* nuncupatur. A. P. maximo. Jacq. diversum.

64. *nemorosum*, panic. simplici, ramis distantibus erectis flosc. remotis sparsis ovatis acuminatis; culmo decumbente geniculato, vaginis colloque pilosis. Sw. prodr. 22. In Jamaica, Dominica, nemorib. mootosis.

65. *acuminatum*, panic. simplicibus. fol. brevioribus, ramis capillaribus diffusis, spiculis remotis obovatis, culmo decumbente geniculato ramoso, fol. lanceolato-subulatis erectis, vaginis villosis. Swartz. prodr. 21. ej. Pl. p. 150. In Jamaicae montosis, campis arenosis. Stigm. villosa atropurpurea.

66. *rigens*, panic. simplici rigida patente, culmo ramoso decumbente, fol. horizontalibus scabris. Swartz. l. c. Ej. Flor. p. 154. Hab. in Jamaica.

67. *fuscum*, panic. simplici, ramis erectis, flosc. secundis geminis, altero brevius, pedicellato, cumulo erecto sub-diviso, fol. lato-lanceolatis. Swartz. l. c. Ej. Flor. p. 156. Hab. in Jamaicae graminosis uliginosis. P. carthagenensi simile. S.

68. *laxum*, panic. simplici nutante, ramis capillaribus, spiculis approximatis alternis adpressis, culmo simplici filiformi flaccido, fol. lineari-lanceolatis. Swartz. l. c. Ej. Flor. p. 157. Hab. in Jamaica, nemorib. aridis. Sub fine anni flor. Sw.

69. *latifolium*, panic. racemis lateralibus, simplicibus, fol. ovato-lanceolatis collo pilosis. Moen. s. 8. t. 5. f. 4. Hab. in America boreali, in pratis sylvaticis. ☉

70. *flavescens*, panic. simplici erecta stricta, ramis subfastigiatis, infimis oppositis, spiculis approximatis secundis, pedicellis bifloris. Swartz. Flor. p. 158. In Jamaicae austral. arid. Varius.

71. *diffusum*, panic. simpliciusculo capillari patente, spiculis distantibus, culmo decumbente simplici, fol. linearibus, collo pilosis. Swartz. 21. Flor. p. 160. Hab. in Jamaicae graminosis siccis. Vulgar. P. *repenti*. affinis. L. S.

72. *Oryzoides*, panic. subsimplici, ramis

erectis, flosc. remotiusculis ovatis acutis, culmo erecto indiviso, fol. lato-lanceolatis basi rotundatis, vaginis sulcato-striatis. Sw. Flor. p. 169. In Jamaica, nemoros. montosis. Spiculae maximae.

73. *clandestinum*, racemis occultis in foliorum vaginis. Hab. in Pennsylvania. Tr

74. *arborescens*, panic. ramosissima, fol. ovato-oblongis acuminatis. Lin. Habit. in India. H

75. *glutinosum*, panic. composita patente, ramis flexuosis, glum. ovatis viscosis, majusculis, culm. subramoso. Lam. ill. gen. p. 174. t. 43. f. 3. fol. lato-lanceolatis Swartz. Flor. Ind. occid. 1. p. 174. Hab. in Amer. meridion.

76. *curvatum*, panic. racemosa, glumis curvatis obtusis nervosis Lin. Syn. Nat. 12. p. 730. Hab. in India orientali. Culmi filiformes, folia lanceolata. Fructuscentes calyces evadere triplo majores, multisulcati, purpurascens. L.

77. *virgatum*, panic. virgata, glumis acuminatis laevibus : extima debiciente, fol. longissimis planis. Sp. pl. 87. Michaux p. 48. Habit. in Virginia ad ripas fluviorum. Tr Gramen altissimum.

78. *patens*, panic. oblonga flexuosa capillari patente, calycib. bifloris, fol. linearilanceolatis, culm. radicante. Habit. in India.

79. *trigonum*, panic. erecta, pedunc. bifloris, calycib. obtusis hispidis unifloris, seminibus trigonis. Retz. obs. 3. p. 9. P. patens. Burm. ind. 26. t. 10. f. 2. Hab. in Ind.

80. *patens*, panic. composita ovata, ramis confertis erectis, spiculis ovatis subulatis, culm. subdiviso geniculato, fol. ovato-lanceolatis, vaginis collo margineque ciliatis. Swartz. prod. 23. Flor. p. 164. Apluda Zeugites. Aubl. gujan. 2. p. 333. In Jamaicae nemorosis. Fol. basi obliqua.

81. *anceps*, panic. interrupte racemosis, fol. longis : vagin. pilosis ancipitibus. Michaux l. c. In Carolinae herbosis humidis sylvaticis.

82. *scoparium*, villosa, fol. lanceolatis, panic. erecta ramosissima, pedunc. setaceis, glumis turgidis pubescentibus. Michaux p. 49. Hab. cum priore, in apricis caespitosis. ©

83. *pubescens*, ramosissimum foliosum, subpubescens, fol. lanceolatis ciliatis, panic. minimis nudis, flor. subglobosis. Michaux. In herbosis sylvarum Carolinae.

84. *nitidum*, panic. capillari ramosissima, flor. minutis ovatis obtusis, fol. lanceolato-linearibus remotis. Michaux l. c. In Pennsylvania et Carolina.

85. *barbatum*, parvulum, culm. gracili subramoso : nodis barbatis, fol. lanceolato-linearibus, panic. capillari parvula. Mich. Cum priore.

86. *ramulosum*, parvum, culm. gracili ramuloso geniculisque glabris, panic. parva capillari, flor. ovatis obtusis minutis, fol. subtus pilis sparsis ciliatis. Mich. l. c. p. 50.

87. *melicarium*, caul. debili, fol. angustis, panic. contracta, glum. membranacea lanceolatis subaequalibus, rudimento flosculi stipitato. Michaux l. c. In Georgia et Carolina.

88. *lanatum*, panic. composita erecta glabra, spiculis ovatis, culmo ramoso, fol. ovato-lanceolatis pubescentibus, vaginis lanuginoso-hirsutis. Swartz. prod. 24. et Fl. p. 168. Hab. in Jamaicae subalpinis.

89. *arundinaceum*, panic. composita patente, ramis strictis capillaribus, spiculis subrotundis, culm. geniculato, fol. lanceolatis acuminatis rigidis. Swartz prod. 24. Hab. in Jamaica.

90. *radicans*, paniculatum, culmo ramoso radicante, fol. basi vaginisque longitudinaliter ciliatis. Retz. obs. 4. p. 18. Hab. in China.

91. *trichodes*, panic. ramosissima patente, ramis ramulisque subdivisis capillaribus, culmo declinato geniculato, foliis ovato-lanceolatis glaberrimis. Swartz Flor. p. 176. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 86. 115. t. 72. f. 3. Pluck. alm. 176. t. 189. f. 4. P. brevifolium. Lin. Willd. Sp. p. 353. cfr. Sw. l. c. p. 178. Hab. in Jamaicae Hispaniolae subalpinis.

92. *divaricatum*, panic. brevibus muticis, culmo ramosissimo divaricatissimo : pelliculis bifloris : alicro brevior. Amoen. acad. 5. p. 392. Hab. in Jamaica.

158. DIGITARIA. Cal. 2-3-valvis, concavus : valvula extima minutissima, aut o secunda variabili, intima longitudine corollae. Cor. 2-valvis, oblongo-ovata, teres mutica. Styli longissimi. Nectar. fissum. Spicae digitatae, lineares : flor. geminatis : altero subsessili. (Richard.)

1. *sanguinalis*, culm. repentibus, flor. imbricatis, vaginis folisque papilloso-pilo-

sis. Panic. sanguinale. Lin. Willd. Sp. 1. p. 34a. Schreb. gram. t. 16. Leers t. 2. f. 6. Curt. Lond. ic. Hab. in Europa australi et Amer. ☉

Obs. Var. fol. longis et brevibus sub-lanceolatis. Vix specie discreta est Panicum filiforme, quod idem videtur esse ac Panic. debile. Desf. Atl. t. 1. p. 59.

2. *humifusa*, ramosissima effusa tota glabra, spicis paucioribus subalternis. Hab. in arenosis circa Parisios. Rich. Priori similis, sed specie diversa.

3. *appressa*, spicis pluribus sessilibus alternis culmo adpressis, flor. ovatis acuminatis bifariis. Lam. ill. t. 1. p. 176. sub Paspalo. Hab. in Amer. meridion.

4. *pilosa*, culm. erectis, fol. vaginisque villosis, spic. plurib. setaceis. Michx. Flor. Amer. bor. 1. p. 45. Syntherisma villosa Walter. Hab. in sabulosis sylvarum Carolinae.

5. *serotina*, culm. decumbente, fol. vaginisque villosis, spic. pluribus setaceis, flor. binis minutis pedicellatis. Michaux p. 46. Syntherisma Walter. Gmel. Syst. N. Lin. 2. p. 154. Hab. in Carolinae graminosis humidis.

6. *umbrosa*, spicis subquaternis remotis, flosc. geminis inaequaliter pedicellatis, culm. repente staccato. Retz. obs. 4. p. 16. Hab. in Indiae graminosis umbrosis. ☿

7. *ciliaris*, spicis subdigitatis approximatis erectis filiternis, rachi flexuosa, dentibus bifloris, flor. pedicellatis, valvula exteriore ciliata, culmo foliisque pilosis. Willd. Sp. 1. p. 344. sub Panico. Retz. obs. 4. p. 16. Hoffm. germ. 2. p. 31. Hab. in Java et China. ☉

8. *linearis*, spicis digitatis subquaternis linearibus, flosc. solitariis secundis muticis. Burm. ind. 25. t. 10. f. 3. (Panicum.) Hab. in Indiis. Culmi prostrati, laeves, ramosi.

9. *distachya*, spicis subternis secundis laevibus, fol. planis, brevibus margine scabris. Lin. Mant. p. 138. Lam. ill. t. 43. f. 2. In India orientali. Facies Pasp. distichi. Spic. saepius 3 et 4. Retz.

10. *paspalodes*, culm. repentibus, fol. vagin. collo villosis, spic. geminis basi subvillosis, rachi latiuscula. Michaux Flor. 1. p. 76. Hab. in Amer. bor. pascuis aridis.

11. *longiflora*, spic. duabus sessilibus erectis, flosc. ovali-oblongis, culm. ascendente ramoso. Willd. Sp. 1. p. 332. Retz. obs. 4. p. 18. Sub Paspalo. Hab. in Malabarica ad agrorum margines.

159. CYNODON. Cal. 2-valvis, patens, lanceolatus. Cor. major, 2-valvis: valv. exteriore maxima ovoides. Nect. truncatum. Spica digitata, florib. unica serie imbricatis, solitarii. (Richard.)

1. *Dactylon* (sarmentosum), spicis digitatis patensibus, basi interiore villosis, flor. solitariis, sarmentis repentibus. Lin. Monti ic. 99. Wither arrang. t. 21. sub Panico. Hab. in arenosis, etiam maritimis. Ex radice dura perenni sarmenta exeri longissima fol. vaginis cincta.

160. TRACHYS. Spic. digitata: flosc. in rachi membranacea 1-laterales; pedicellis pinnatis Bract. 5. involucri ovatum cartilagineum. Cal. 1-florus, 2-valvis. Cor. 2-valvis.

1. *mucronata*. Cenchrus mucronatus. L. Panicum squarrosum. Retz. obs. 4. p. 15 et fasc. 5. t. 1. Willd. spec. 1. p. 545. Hab. in Malabarica arenosis. Involuc. Retzii est pedicell. ramosus et cal. exterior, qui in Panicis minimus esse debet, revera involucri speciei. Flor. indurati. ☉

161. LAPPAGO. Cal. subtrivalvis muricatus. Cor. 2-valvis, resupinata.

1. *racemosa*. Willd. sp. 1. p. 484. Cenchrus racemosus. Lin. Tragus. Hall. Schreb. gram. t. 41. Hab. in Europa australi, Arabia et utraque India. Spiculae semina Cauliculis referunt. ☉

162. CERESIA. Flosc. laterales bifarii sub Rachi lata membranacea cymbiformi. Cal. 2-valvis, 1-florus, lanatus.

1. *elegans*. Paspalum membranaceum. Lam. ill. gen. p. 177. t. 43. f. 2. Hab. in Peru. Rachis tenuis subhyalina, fuscescens. Anth. bifurcatae.

163. PASPALUM. Cal. 2-valvis, aequalis orbiculatus. Cor. ejusdem magnitudinis. Stigm. penicilliformia. Flor. 1-laterales.

1. *dissectum*, spicis alternis, rachi membranacea, floribus alternis apice pilosis. Lin. Willd. Sp. 1. p. 340. Pluck. mant. 64. t. 356. Houttuyn. t. 89. f. 2. Hab. in America calidiore. Gramen prostratum foliorum vaginis fere spathaceis. L. ☉

2. *serobiculatum*, spicis alternis, rachi membranacea, floribus alternis, calycibus multinerviis exilis serobicularis. Mant. ag. Houttuyn L. t. 89. f. 3. Hab. in India orientali. Culmi erecti, basi hirsuti, vaginopurpurascens, margine ciliata. $\overline{\text{T}}$

3. *villosum*, spicis alternis secundis, rachi hirsuta, flor. villosis duplici ordine, alternis secundis. Thunb. jap. 45. t. 8. Paspalum distichum. Houttuyn tab. 89. f. 4.

4. *vulgatum*, spicul. paniculatis alternis basi villosis flor. geminis. Syst. Veg. 29. Jacq. Collect. 1. par. 112. Gaertn. de fruct. 2. p. 1. t. 80 f. 1. Sloan. jam. 34. hist. 1. p. 112. t. 69. f. 1. Hab. in Jamaica. $\overline{\text{T}}$

5. *floridanum*, erectum, fol. inferioribus pilosis, vaginis longissimis, spicis erectis, glum. hirsutis suborbiculatis majusculis. Michx. Flor. 1. p. 44. Hab. in Florida et Georgia.

6. *plicatum*, erectum glabrum, spic. pluribus alternis erectis. glum. subhirsutis ovatis (subrufescentibus), valv. plana margine plicatula. Michx. l. c. p. 45.

7. *strictum*, paniculato-polystachium, spicis approximatis, vaginis longis hirsutis, ligula villosa. Hab. in Insul. Antill. et ad St. Domingo. Geom. magnam.

8. *paniculatum*, spicis paniculatis verticillato-aggregatis. Sp. pl. 81. Sloan. jam. 34. hist. 1. p. 115. t. 72. f. 2. Hab. in Jamaica. \odot

9. *stoloniferum*, spicis numerosis subverticillatis, rachi undulata, flor. alternis secundis, glumis plicato-crispis, esule geniculato, stolonifero. Willd. Sp. p. 331. P. *purpureum*. Flor. Per. 1. p. 48. Milium *latifolium* Cav. ic. 3. p. 37. t. 274. P. *racemosum*. Jacq. ic. t. 302. Praetantissim. hoc psidium s. onte inter segetes Limae etc. crescit, ibique tee per annum mittit, quapropter in Europa propagari meretur. In locis calidis et maritimis per totum fere annum floret. Pl. Pee.

10. *repens*, spicis paniculatis subverticillatis nutantibus, culmo repente. Berg. Act. helv. 7. p. 129. t. 7. Habit. in Surinamo. $\overline{\text{T}}$

11. *hirsutum*, spicis alternis subbinatis, rachi membranacea, calycibus multinerviis laevibus, fol. pellicellisque hirsutis. Retz. obs. 2. p. 7. Hab. in China.

12. *Kora*, spic. alternis subbinatis, rachi membranacea, calycibus subrotundis quinquenerviis, culmo folisque glabris. Habit. in India.

13. *distichum*, spic. duabus erectiusculis

subgonis, altera sessili, florulis oblongis glabris, culmo adscendente, fol. planis? Sw. obs. 35. t. 2. f. 1. Hab. in Jamaicae graminosis subhumilis. Fol. involuto-subulata. \odot

14. *conjugatum*, spic. duabus horizontalibus conjugatis, spicul. ovatis culmo erecto fol. involutis. Swartz prod. 21. Bergius Act. helv. 7. p. 129. t. 8. P. tenue. Gaertn. Hab. in Jamaica, Surinamo.

15. *vaginatum*, spic. duabus, spiculis bifariis acuminatis, culm. ramoso geniculato, geniculis vaginatis. Swartz prod. 21. Ej. Flor. 1. p. 135. Hab. in Jamaica.

16. *filiforme*, spica solitaria linearisecunda, spiculis ovatis compressis, culm. folisque filiformibus. Swartz prod. 22. Ej. Flor. p. 136. Hab. in Jamaicae campis. Vulgae.

17. *decumbens*, spica unica secunda, pedunculis longissimis, spicul. s. alternis orbiculato-acuminatis glabris, culmo procumbente. Swartz prod. 22. Flor. 1. p. 136. Hab. in Jamaicae campis apricis montosis.

164. **CYNOSURUS**. Cal. 2-valvis, multiflorus; Recept. proprium unilaterale, foliaceum, s. spiculæ bracteis subjectæ.

1. *eristatus*, bracteis pinnatifidis. Schreber. Geom. 69. t. 8. f. 1. Willd. Sp. p. 411. Hab. in Europae pratis. $\overline{\text{T}}$

2. *effusus*, panic. laxa, bract. lanceolatis acutis, fol. planis. Link in Bot. Journ. 2. p. 315. Hab. in Lusitaniae pratis.

3. *echinatus*, bracteis pinnato-paleaceis aristatis. Hab. in Europa australiori, Orient. \odot Racemus glomeratus, secundus.

4. *paniculatus*, spica composita ovata, calyc. multifloro, gluma altera mucronata, corollis basi pilosis. Thunb. prod. 23. Hab. in Cap. b. spei.

5. *Lima*, spica secunda, calycis gluma interioris spiculis subjecta. Loeft. it. 41. Cavan. ic. 1. p. 62. t. 91. Desf. Atl. t. 19. Habit. in Hispania et Barbaria.

6. *retroflexus*, spica composita, spicul. aggregatis, calycibus bifloris aristatis, flore. nautica. Vahl symbol. 2. p. 20. Habit. in India orientali.

7. *Uniolæ*, spica solitaria disticho-arcuata, cal. multifloro mucronato, cor. basi villosa. Thunb. prod. 23. ebracteatus, spica secunda, spiculis bifloris alternantibus compressis ovatis carinatis obliquis. Lin. suppl. 110. Hab. ad Cap. b. spei. Facies Uniolæ,

sed calyx bivalvis, nec multivalvis. Spica linearis. L.

Obs. An hujus generis una cum sequentibus?

8. *filiformis*, spica solitaria disticha, calycib. subulatis triloris, flosculo sterili mutico. Vahl. symbol. 2. p. 20. Hab. in Ind.

9. *monostachya*, spica terminali, calyc. subulatis subtriloris, flosculis aristatis unilaterialibus. Vahl. l. c. Cum priore.

10. *focicifolius*, spicis linearibus rectis, fol. conduplicatis, margine alterne barbatis. Vahl. symbol. 1. p. 10. Forsk. descr. 21. n. 73. Hab. in Arabia.

11. *elegans*, panic. ovata laxa, flor. fasciculatis, cal. valva altera aristata, bracteis scitiformibus. Desf. Atl. 1. p. 82. t. 17. Hab. in Algeria.

165. **ELEUSINE.** Spicæ digitatæ. Flor. secundi, mutici. *Cal.* multiflorus. *Cor.* 2-valvis mutica. (Flor. omnia hermaphroditi.)

1. *corocana*, spicis incurvatis, culmo compresso erecto lareto, fol. suboppositis. Lin. sub Cynosuro. Schreb. gram. 2. p. 71. t. 35. Gaertn. 1. p. 8. t. 1. 65. 2. Rumpb. t. 76. f. 2. Hab. in aren. ad maris littora in Ind. ©

2. *aegyptia*, spic. quaternis obtusis patentibus dimidiatis, cal. mucronatis, caul. repente. Lin. Willd. spec. 1. p. 416. E. *cruciata*. Lam. ill. t. 48. f. 2. Cum priore in Barbaria et in Aegypto. Spic. cruciatum dispositæ. ©

3. *indica*, spic. digitatis strictis, spicul. subsexfloris, fol. vaginis compressis, collo pilosis. Michaux. Flor. 1. p. 64. Cynosurus indicus. Lin. Hab. in India e America bor.

4. *mucronata*, spic. numerosis filiformibus paucicatis, spicul. minutissimis, cal. mucronato quadrifloro, flor. mutica. Mich. l. c. Hab. in cultis Illinoensibus.

5. *domingensis*, panic. ramoso-digitata, ramis simplicibus, spiculis subquinguesloris, flosc. aristatis. Jacq. ic. rar. 1. t. 22. Mich. 2. p. 363. Hab. in Jamaica, St Domingo. An cum sequente hujus generis?

6? *virgata*, spicis alternis gracilib., spiculis purpurascensibus subsexfloris aristatis: floscul. ultimis submuticis. Lam. ill. gen. p. 189. sub Festuca. Cynosurus. Lin. Willd. Sp. 1. p. 417. Sloan. Jam. 1. t. 70. f. 2.

7. *filiformis*, panic. ramosissima coarctata: ramis simplicibus filiformibus spiculis alternis (purpurascensibus) 2-4. floris mu-

ticis, vaginis subpilosis. Hab. in Americ. meridion. Pili in vaginis e glandulis sub lente percipiendis proveniunt.

166. **CHLORIS.** Polygama. Spica ut plurimum digitata unilateralis. *Cal.* 2-valvis, 2-6-florus (flor. dissimilibus); valv. carinatae muticæ aut aristatæ.

1. *monostachya*, spica unica, spicul. subsexfloris, florib. aristatis margine barbatis, glum. calycis ceteriore scrobilato-glandulosa dorso aristata. Michaux. Flor. amer. 1. p. 59. Hab. in sylv. Carol. inferioris. Sapor piperinus.

2? *villosa*, monostachya, culmo compresso, flor. dense spicatis, glumis cor. villosis, flor. omnibus aristatis. Tetrapogon villosum Desf. Atl. 2. p. 389. t. 255. In arena prope Cassam.

3. *falcata*, spica subsolitaria falcata, calyc. quadrifloro, glumis cor. margine carinaque ciliato-villosis Swartz in Nov. Act. Soc. Berol. 3. p. 159. t. 1. f. 1. Cynos. falcatus. Willd. sp. 1. p. 411. Hab. ad Cap. b. sp. 1. E

4. *cruciata*, spic. subquaternis cruciatis, flosc. acuminatis. Swartz Prodr. p. 25. et Ejusd. Flor. 1. p. 142. Agrostis cruciata. L. Hab. in Jamaicae campis aridis

5. *petraea*, spicis 4-6 articis erectis, flosculis imbricatis subglabris muticis, glum. calycis exteriori aristata, culm. compresso. Swartz Flor. 1. p. 154. Cynos. paspaloides. Vahl. symb. 1. p. 21. t. 27. Cresc. in Jamaica. littorib. petraeis etiam ad Cap. b. sp.

6. *mucronata*, culm. repente, spic. plerumque 4: rachis triangulari mucronata, spic. subquadifloris, glum. exteriori aristata. Michaux. Flor. l. c. Pluck. t. 300. f. 8. Cresc. in Carol. infer. cultis. ©

7. *ciliata*, spiculis digitatis subquaternis erectiusculis, glum. coroll. interioribus margine ciliatis. Swartz Flor. 1. p. 197. Andropogon pubescens. Ait. Hab. in arid. Antillarum, Jamaicae. ©

8. *penicillata*, spic. digitatis, cal. 4-floris dorso aristatis, petal. exterioribus hermaphroditiis aristatis, penicillis barbatis. Vahl symb. 2. p. 21. sub Cynosuro. Hab. in India orientali.

9. *polydactyla*, spic. plurimis fasciculatus laxis, glum. interioribus ciliato-villosis. Swartz l. c. p. 159. Androp. polydactyl. Lin. Sloan. Jam. p. 33. Hist. 1. p. 111. t. 65. f. 2. In Amer. australioris collib. gramin.

10. *barbata*, spic. plurimis fasciculatis laxiusculis, glum. barbatis masculinis ventricosis aristatis. Sw. p. 200. Androp. barbatum. L.

11. *radiata*, spic. plurimis fasciculatis erectiusculis, flosc. subulatis glabris. Swartz p. 201. Agrostis radiata et Androp. fasciculatum. L. Cresc. frequens in Indiae orient. culis.

12. *virgata*, spic. plurimis fasciculatis erectis, glum. exteriore aristata, interiore gibbosa ciliata; aristis longioribus. Swartz p. 203. Hab. in Antigua. Cal. distichis aristatis a priore differt. S.

13. *curtipendula*, culm. ascendente racemoso, spicul. plurimis brevibus distichis pendulis. Mich. Flor. 1. p. 59. In aridis regionis Illinoisensis. Habitus recedit festucoides.

167. **DACTYLIS.** Cal. 2 valvis, compressus; altera valvula majore carinata. Spic. aggregatae et capitatae.

1. *cespitosa*, panicula ovata coarctata, undique spiculis imbricata. Forst. Comm. goett. vol. 9. p. 22. Willd. 1. p. 407. Hab. in Novi Anni iussulis.

2. *glomerata*, panic. secunda glomerata. Schreb. gram. 1. 8. f. 2. Leca. t. 3. Hab. in ruderalis, et sylvia.

3. *littoralis*, panic. spicata, culmo repente, fol. ramorum sterilibus distichis: vaginis pilosis. Willd. 1. c. 408. Pos. littoralis. Vahl. symbol. 2. p. 19. Gouan. mansp. 470. Pluck. Alm. 1. 33. f. 3. Hab. in maris littora Tergesti, Galliae australis, Hispan. et Sissaeae Tunesi. Calycis valvulae sunt carinatae, inaequales, undecimflorae. W. T.

4. *laevis*, panic. coarctata, glum. laevibus. Thunb. prod. 22. D. capitata. Lin. sup. 110. Cap. b. spei. T.

5. *spicata*, panic. spicata cylindracea basi interrupta, corol. apice aristata. Willd. in N. Act. Berol. v. 3. Pluck. phytog. t. 190. f. 6. In agris oryzaceis Malabaricae crescit.

6. *villosa*, panic. spicata, glumis villosis. Thunb. prod. 22. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *serrata*, panicula coarctata, glumis carina serrulatis. Thunb. prod. 22. Ad Cap. b. spei.

8. *ciliaris*, spic. capitata secunda, calycibus trifloris, caule repente. Mant. 185. Thunb. prod. p. 22. Canles articulati, radiculis longis albis. Hab. ad Cap. b. spei.

9. *hispida*, panicula spicata ovata nuda, calyce hispido, geniculis barbatis. Thunb. prolr. 22. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *lagopoides*, spica subrotunda, cor. basi margineque villosa, pedunc. glabro, fol. margine hispidis culm. basi ramoso. Willd. in N. Act. Berol. 3. Lin. mant. p. 557. Burm. Ind. t. 12. f. 2. Hab. in Malabarica c. sequente.

11. *brevifolia*, spica globosa secunda, cor. pilosiusculis, pedunc. pubescente, fol. convolutis rigidis, culm. decumbente ramoso. Willd. 1. c. et Ejusd. sp. 1. p. 410.

12. *repens*, culm. repente, ramis fasciculatis, fol. villosis anbulatis rigidis, flor. spicato-capitatis secundis. Desf. Atlant. 1. p. 79. Hab. ad maris littora in deserto. T.

13. *pungens*, culm. erecto superne nudo, spicul. terminalibus acutibus in capitulum congestis, involucri squamoso. Desf. 1. c. p. 80. t. 16. Sestertia celinata. Lam. ill. t. 147. f. 2. Hab. in arenis prope Mascara. Involuc. squamulis plurib. ovatis. Styl. 2. barbati. Desf. ©

168. **POA.** Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula ovata mutica; valvulis margine scariosis (discoloribus.)

1. *aquatica*, altissima, panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. Lin. Willd. sp. 1. p. 385. glumis nervosis obtusis. Moric. hist. 3. p. 201. s. 8. t. 6. f. 25. Hab. ad ripas fluviorum.

2. *domingensis*, alta, panic. ramosissima subcoarctata, spiculis parvulis 4-floris, fol. lanceolatis longissimis. Hab. in arenosis maritimis ad St. Domingo. (Poiteau). 4-pedalis. Fol. basi subplicata.

3. *maritima*, panic. subsecunda disticha subcoarctata, spicul. 5-floris, floscul. obtusiusculis obsolete quinquenerviis, radice repente, fol. involutis. Smith. Brit. 1. r. 97. Flor. dan. t. 251. Willd. sp. 366. Hab. in arenosis maritimi.

4. *distans*, panic. ramosa effusa, spicul. 5-floris, floscul. obtusiusculis distantibus obsolete 5-nerviis nitidis, fol. planiusculis. Lin. Willd. 1. c. 1. p. 401. Smith. g6. P. salina. Poll. P. arenaria. Lam. Aira aquatica. Schreb. Huds. P. retroflexa Curt. Hab. in pratis, locis salinis et ruderalis maritimis.

5. *divaricata*, panic. divaricata, pedicellis incrassatis, spicul. quadrifloris, fol. filiformib. Gouan. illustr. 4. t. 2. f. 1. Willd. 402. Hab. Monspelii et Marpurgi.

6. *bulbosa*, panic. subovata, spiculis 4-flor. subcordatis pubescentibus; glumis interioribus margine villosis ciliatis, culm. subnudo basi tuberoso. Gramen vernum, radice acaulis. Vaill. Bot. Paris. t. 17. f. 8. P. trivialis Koeler. Hab. primo vere, in graminosis colliculis; colore plerumque fusco-rubente.

7. *crispa*, elatior, spiculis glabris in foliola cornuta excrecentibus. Thuill. Paris. p. 45. Moris. t. 5. f. 14. Vill. delph. 2. p. 131. In sylvaticis, ad saepe. Primo intuitu a priore diversa videtur.

8. *alpina*, panic. subovata, spicul. 6-floris cordatis, culmo basi crassiusculo, radice densa fibrosa. P. *alpina*, spic. 3-floris apice retusis, valv. corol. exteriorib. ovatis pilosis interiorib. ciliatis. Braun. Flor. Salzbu. p. 67. Hab. in montosis, subalpinis. Var. quoque spicul. in folia excrec. seu viviparis.

9. *laxa*, panic. contracta subracemosa, spiculis trifloris, basi dorsoque pubescentibus, radice repente. Willd. p. 386. Haenke auct. p. 118. Scheuchz. it. VI. p. 457. t. 6. f. 16. Hab. in alpinis Europ. Priori affinis.

10. *hirta*, panic. patula virgata, calycib. subtrifloris angulatis, vaginis punctato-ciliatis. Willd. 307. Hab. in Japonia.

11. *trivialis*, panic. subdiffusa, spicul. trifloris basi pubescentibus, culmo scabro subhispido, ligula longa. Curt. Lond. ic. P. pratensis Leysser. P. dubia, vaginis foliisque subtus scabris. Leers. t. 6. f. 5. P. palustris quorumd. P. scabra. Ehrh. Hab. in pascuis, ruderalis et humilis. Spic. atrovirentes. Fol. subtus scabra, passim cum vagin. lacviseula.

12. *angustifolia*, panic. diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti laevi, fol. radicalib. filiformi-involutis. Lin. Willd. p. 387. Flor. suec. 77. 81. Pollich. pal. Leers. t. 6. f. 1. Hoffm. germ. p. 43-44. Poa glabra. Ehrh. Hab. ad agrorum versus et in muris, et pratis. Fol. caul. breve, latiusculum. ¶

13. *pratensis*, panic. diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti glabro, ligula brevi truncata, fol. planis. Curt. Lond. ic. Hab. in pratis et sylvaticis. Spic. 4-8-florae glum. 5-nerviis villosis connexis. Smith, secundum quem antecedens hujus tantum varietas est.

14. *cilianensis*, panic. elongata ramosa flexuosa, spicul. quadrifloris glabris. Willd. l. c. p. 388. Allion. pedem. n. 2207. t. 91. f. 2. Barr. obs. 3. t. 743. In Italia. ¶

15. *caesia*, panic. diffusa, spic. ovatis quinquefloris, glum. lanceolatis subsericeis

libris, stipulis brevissimis obtusis. Smith. l. c. p. 103. P. *glauca*. Wither. arrang. p. 118. Hab. in Scotiae montosis. Herb. caesia; vag. striata, subscabra. S. ¶

16. *flexuosa*, panic. flexuosa, spic. trifloris, glumis ovatis basi villosis connexis, ligula lanceolata canlinorum passim lacera. Smith l. c. p. 107. In Alpi. scoticis. Glauca. Fol. supra scabra. S.

17. *variegata*, fol. involutis, panicula oblonga contracta, spicul. 3-4-floris teretiusculis purpureo-maculosis. Lam. ill. 1. p. 182. P. cinerea Villars. Hab. in Arveniae et Delphinat. subalpinis. Fol. intus cinerea. V

18. *hydrophila*, panic. subattenuata, spicul. parvis subtrifloris apice lutescentibus, ligula elongata. Cresc. in aquosis. Huc pertinet P. *crocea*. Michaux et P. *palustris* quorumd. Fol. subscabra.

19. *debilis*, fol. longo-linesibus, panic. debili multiflora spicul. 3-4-flor. parvulis albidis viridulis. Thuill. Flor. Paris. Hab. in pratis. Uti et antecedens P. *memoralis* affinis.

20. *palustris*, panic. diffusa, spicul. subtrifloris pubescentibus, fol. planis demum involutis subtus scabris. Hoffm. germ. ed. 2. p. 43. Willd. sp. 1. p. 391. P. trivialis. Leers. t. 6. f. 2. Cresc. in humidis ad ripas. Gramen dubium. Spicul. apicaliceo-purpureo, apice flavae. H.

21. *biflora*, panic. densa. cal. subbifloris glabris, culmo adscendente. Retz. obs. 5. p. 59. Hab. in India.

22. *memoralis*, panic. attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culm. tenuis, fol. patentibus, ligula brevissima. Leers. t. 5. f. 3. In nemorosis, ad rupes umbrasas.

23. *contracta*, panic. contracta, floscul. lanceolatis trifloris nudis sessilibus, fol. filiformibus. Retz. obs. 3. p. 17. Hab. in India.

24. *filiformis*, panic. patenti, spiculis acutis quadrifloris, fol. filiformibus. Thunb. prod. 21. Hab. in Cap. b. spic.

25. *lineata*, panic. debili pendula spicul. subquadrifloris, floscul. substantibus glabris manifeste striatis. P. *striata*. Michaux. Flor. t. p. 69. Hab. in Amer. boreali. Glumae fere ut in P. ciliari L. transversae, obtusae.

26. *striata*, panic. diffusa capillari, spic. glabris subquinqueflor. cor. exquidite striatis. Lam. ill. gen. 1. p. 181. Hab. in Virginia. Cal. brevis. Cor. majuscula ovata.

27. *nervata*, panic. stricta, spiculis glabris quinquefloris nervosis. Willd. sp. 1. p. 389. Hab. in America boreali. Pauc. fere

semipedalis, ramis capillaceis ramosis adpressis. W.

27. *trincervata*, panic. diffusa, spiculis subquinquefloris acutissimis scabris: corollae gluma exteriori trinervi, interiori binervi. Sebra-L. spicil. p. 3. Willd. l. c. Ehrh. Beib. 6. p. 131. Poa sylvatica. Polk. palat. n. 27. Roth. germ. l. p. 43. II. p. 117. Hab. in sylvaticis. L.

28. *sudetica*, panic. erecto-patente, spic. trifloris claberrimis mucronatis, culm. erecto compresso, vaginis laxis ancipitibus. Haenke sudet. p. 120. P. quadripedalis. Ehrh. Hab. in montibus Silesiae. Gramen altum quadripedale, fol. laevia, culm. ancipiti, spiculis laete viridibus. W.

♀ *atrata*, fol. planis latiusculis obtusis, culmo laevi compresso. panic. diffusa, spic. ovatis subquinquefloris atrovirescentibus. P. sylvatica. Villars delph. 2. p. 128? Hab. in montosis, subalpinis pratis. Culm. basi arundineus.

29. *anceps*, panic. diffusa, spiculis quinquefloris, acutis, basi pubescentibus, culmo ancipiti. Forst. prod. n. 43. Hab. in nova Zeelandia.

30. *annua*, parvula, fol. margine subundulatis, panic. diffusa angulis rectis, sciculis obtusis, culm. obliquo compresso. Leers. t. 6. f. 1. Hab. ad vias, locis irrigatis vulgaris. ☉

31. *flava*, panic. diffusa, spiculis ovato-oblongis nitidis. Sp. pl. 109. Hab. in Virginia.

32. *compressa*, panic. secunda coarctata, culm. adscendente compresso, flor. 3-4 angulosis basi villo connatis. Smith. brit. t. p. 59. Lin. Willd. sp. 1. p. 397. Cresc. in inuris, pascuis, et agrorum versuris.

33. *barbata*, panic. patula capillari, spiculis sexfloris oblongis, glumis glabris cavinatis, genicul. barbatis. Thunb. jap. 50. t. 10. Willd. 1. p. 391. Hab. in Japonia. ☉

34. *pilosa*, panic. patente stricta: ramificationibus primariis pilosis. Sp. plant. 100. Hab. in Italia, Carniola.

35. *glutinosa*, panic. patente stricta, spiculis subnovemfloris hirsutiusculis glutinosis, culm. simplici, fol. subpilosius Swartz. prodr. 26. et Flor. p. 214. Sloan. hist. 114. t. 71. f. 2. Hab. in Jamaica.

36. *prolifera*, panic. patente stricta, spiculis multifloris, (18-20.) culmo ramosissimo nullo, ad nodos prolifero. Sw. prodr. 27. et Ej. Flor. p. 216. Hab. in insulis Caribaeis, Guadeloupe. Genicula junioris plantulae originib. quasi prolifera. Sw.

37. *thermalis*, panic. conferta ovata, spiculis undecimfloris distichis ovatis, basi pubescentibus. Willd. sp. p. 392. (P. *baedensis*.) Hab. in rupibus ad thermas Baedenses in Austria inferiori.

38. *amabilis*, panic. patente, spiculis octodecimfloris linearibus. L. Fl. zeyl. 46. P. *rubens*. Lam. ill. t. 45. f. 2. ? Hab. in India.

39. *Eragrostis*, panic. patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris (9-15), glumis trinerviis. Sp. pl. 100. Schreb. gram. 2. p. 81. t. 38. Hab. in Helvetia, Italia, Barbaria et Sibiria. Vag. scutulis coronata. An. P. *ferruginea*. Thunb. jap. p. 50. Willd. 1. p. 388. nra varietas?

40. *brizoides*, panic. racemosa, spicul. ovatis compressis 8-9-floris, culm. compresso. Lin. suppl. Briza capensis. Thunb. Willd. p. 404. Hab. in Cap. bon. sp.

41. *cyathoides*, panicul. composita stricta pyramidali, pedunc. patentissimis, spiculis dependentibus distichis. Retz. obs. 4. p. 20. Uniola bipinnata panic. subspicata, racemis pinnatis, subus imbricatis L. Sp. pl. 104. Briza bipinnata. Auct. acad. 4. p. 450. Hab. in Aegypti et Indiae aridis. Gramen speciosissimum.

42. *unioloides*, panic. erectiuscula, spiculis subdecemfloris ovatis, calye inferioribus multivalvibus. Retz. obs. 5. p. 19. Hab. in India. An potius Uniola?

43. *cyperoides*, panic. spicato-glomeratis spiculis 11-floris, culmo ramoio, foliis subulatis. Thunb. prod. 22. Hab. in Cap. b. sp. 1.

44. *racemosa*, panic. coarctata, spiculis ovatis novemfloris, pedunculis brevissimis. Thunb. prod. 21. Hab. ad Cap. b. sp. 1.

45. *verticillata*, panic. patente capillari flexuosa, spiculis undecimfloris lineari-subulatis. Willd. sp. 1. p. 393. Cav. ic. 1. p. 63. t. 93. In Hispania.

46. *megastachya*, panic. patente, pedicel. subsolitariis, spiculis lanceolatis 5-20-floris, seminib. reticulato-rugosis. Koeler. Gram. p. 181. Briza Eragrostis. Lin. Poa Eragrostis. Cav. ic. t. 92. Schreb. gram. t. 38. Hab. in Europae et Barbariae agris et arenosis.

47. *atrovirens*, tota glabra, culmo erecto, panic. patente, spic. planis linearibus 8-10-floris, fol. subrigidis. Desf. Atl. 1. p. 73. t. 17. In arvis incultis prope la Calle in Atlante. ☉

48. *hypnoides*, spicul. linearibus sub-
sessilibus confertis longissimis sub 40-floris,
culm. brevissimo moso. Lam. ill. t. p. 185.
Hab. in Auger. metition.

49. *aspera*, panic. patente ramosissima,
pedunc. aspris, spicul. 10-floris vaginis an-
tice hirsutis. Lam. l. c. Jacq. hort. 3. t. 56.

50. *tremula*, ramosissima capillari pa-
tente, spicul. linearibus glabris sub 30-flor-
is. Lam. l. c. Hab. in Senegal.

51. *madagascariensis*, panic. ramosa
laxa patentissima, spic. subro-floris, vagin-
nudis, culm. simplice. Lam. l. c. Hab. ad
Madagascar.

52. *subsecunda*, panic. oblonga laxa,
spicul. linearibus acutis multifloris, latera-
libus extror. um versis. Lam. ill. p. 184.
Hab. in China. Spiculae glabrae, 15-30-
florae. L.

53. *pectinacea*, panic. laxa pyramidata,
spicul. linearibus subro-floris, rachi de-
mum valvul. interiorib. persistentibus pec-
tinata. Mich. Flor. Am. bor. 1. p. 69. Hab.
in arvis Illinoisibus. Spiculae 7-13-florae.

54. *elegans*, panic. elongata angustata
interrupta, spic. subdecemfloris, cor. valvis
intus carinatis. Lam. Poiret. Hab. in Por-
torico.

55. *reptans*, culm. reptante, panic. coar-
ctata, spic. 6-10-floris sublinearib. fol. disti-
chis anconvolutis, 2. r. dioicis. Mich. Flor.
1. p. 69. 1. 1. Ad ripas regionis Illinoisis.
Spiculae facminae majores.

56. *abyssinica*, panic. capillari laxa
erecta, spicul. quadrifloris laevibus lineari-
lanccolatis, fol. glabris subconvolutis. Ait.
Kew. 1. p. 100. Jacq. ic. rar. 1. tab. 17. Co-
litur in Abyssinia. ☉

57. *hirsuta*, culmo crasso simplic. va-
gina hirsuta, panic. ramosissima capillari,
spicul. 5-floris. Michaux. p. 68. In Carolina
inferiore. Habitus Panici capillaris.

58. *malabarica*, panic. ramis simplicis-
simis, florib. sessilibus, seminibus distan-
tibus, culmo repente. L. Willd. l. c. Sp. pl.
100. Hab. in Indiae arenosis.

59. *tenella*, panic. oblonga capillari sub-
verticillata, flor. sexfloris minutissimis nu-
tantibus. (P) P. Japonica. Thunb. jap. 51.
Pluck. alm. 176. t. 300. f. 2. Burm. zeyl. 110.
t. 47. f. 3. Rumph. amb. 6. t. 4. f. 3. Hab.
in India. Panicula ad pedunculorum basin
fasciculos gerit e pilis longis 3-16 candidis-
simis. Retz. ☉

60. *nutans*, panic. contracta apice nu-
tante, spicul. decemfloris, valvulis reversis.
Retz. obs. 4. p. 19. Hab. in India ad agro-
rum margines.

61. *punctata*, panic. diffusa, spiculis
duodecimfloris. florib. diaptan. laevibus,
puncto intus fusco. Lin. suppl. 109. Hab. in
Malabar. Spiculae 12-14 florae. Flosculi
diaphani, cum puncto intus fusco, et atri
viridi utrinque. L.

62. *spinosa*, paniculae ramis alternis
compressis spinescentibus, spiculis alternis
pedunculatis 10-floris, culmo ramoso Willd.
p. 197. Thunb. prod. 22. Festuca spinosa,
frutescens, ramis ramulisque spinosis, pe-
dicellis aculeatis. Lin. suppl. 121. Hab. in
Cap. b. spri. Tj

63. *sarmentosa*, panicula coarctata, spi-
culis lance. l. decemflor., culmo sarmentoso.
Thunb. prod. 21. Hab. ad Cap. b. spri. Tj

64. *amboinensis*, panic. coarctata secun-
da, culmo irriti. L. Mant. p. 557. Retz. obs.
bot. 4. p. 20. Rumph. amb. 6. p. 10. t. 7. f. 3?
Hab. in India. Antecedenti similis.

65. *viscosa*, panic. oblonga patente, spi-
culis inferioribus trifloris, superioribus 12-
floris, culm. rigidis, demum viscosis. Retz.
obs. 4. p. 20. In Malabar. aridib. Tj

66. *peruviana*, panic. spicata, spiculis
quinquefloris ovatis, fol. culmisque procum-
bentibus hirsutis. Willd. p. 409. Jacq. ic. rar.
1. t. 18. Collect. 1. p. 107. Hab. in Peru. ☉

67. *glomerata*, panic. spicata glomerata,
spicul. quadrifloris, corollis ciliatis. Thunb.
prod. 22. Hab. in Cap. b. spri.

68. *ciliaris*, panic. contracta, glum-
rum valvulis interioribus pilosis - ciliatis,
apice mucronatis. L. Syst. Veg. 99. Jacq.
Coll. 2. p. 138. In India occidentali. Spicula
demum purpurascens: glumis membrana-
ceis laxis. Koeleria affinis.

69. *plumosa*, panic. diffusa, cal. 6-floris,
valv. coroll. interioribus linearibus recur-
vis dorso ciliatis. Retz. obs. 4. p. 20. Hab. in
India. Flosc. cum seminibus pellucidis. R.

70. *panicca*, panic. ramis subbinatis re-
motis filiformibus, cal. 2-floris vaginis
punctato-pilosis. Retz. obs. 3. p. 11. In In-
dia. Panic. pedalis tenuissima. Flor. pedicel-
latis. R.

71. *chinensis*, panic. ramis simplicis-
simis, flor. sessilibus, culm. erecto. Burm.
ind. t. 11. f. 3. P. sessilis. Lam. ill. p. 185.
Hab. in Ind. Vulg. quoque in Amer. insulis.

72. *bifaria*, spic. sessilibus distichis, in-

ferioribus remotis erectis superioribus appropinquantibus recurvatis. Vahl. symb. 2. p. 19. In Ind. orientali.

73. *bromoides*, subspicata, spicul. lanceolatis 25-floris, inferioribus breviter pedicellatis, superioribus sessilibus, fol. bifariis involutis. Vahl. symb. 3. p. 10. Hab. in Lima?

74. *sicula*, spica disticha compressa, spicul. lanceolatis oblongis sessilibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 303. Triticum unioloide. Willd. sp. 1. p. 488. Scop. delie. 1. 11. Hab. in Italia et Barbariae maritimis.

75. *loliacea*, spica simpliciter secunda, flosculis ovatis, culm. cespitoso. Huds. Triticum. Smith. brit. 1. p. 150. Engl. bot. 1. 221. Hab. in arenosis maritimis.

Obs. Non vera Poa est, quod valet de prioribus et aequae vilius quoque, nec bene ad Triticum pertinet. Forte distincti generis, si characteres modo sufficienter.

76. *subverticillata*, panic. laxa basi verticillata, pedicellis elongatis, spicul. variis subquinquefloris, cal. crassiusculis subangulatis obtusis. Lam. ill. 1. p. 183. (P. *laxa*.) Hab. in Virginia. Triticum maritimo L. affinis videtur.

77. *rigida*, panic. lanceolata distichosecunda coarctata glabra: rachi tereti, spic. 7-floris, floscul. teretibus enerviis. Smith. brit. p. 99. Lin. Willd. Curt. Lond. ic. Hab. in maris, arenosis. ☉ Var. rachi subuliflori, an distincta?

78. *procumbens*, panic. lanceolata secunda coarctata scabra: rachi tereti, spic. subquinquefloris, floscul. obtusiusculis nervosis. Smith. 1. c. Curt. Lond. ic. Sowerb. engl. bot. 1. 532. P. *rupestris*. Wither. arrae. 1. 26. In Angliae ruderalis, maritima. ☉

169. *BRIZA*. Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula disticha: valvulis ventricosis cordatis, obtusis: interiore minuta.

1. *minor*, spiculis triangulis, calyce flosculis (?) longiore. Scheuchz. gram. 205. t. 4. f. 9. Hab. in Europa et ad Cap. b. spei. Glum. margine inflexae. ☉

2. *virens*, spic. ovatis, calyce floscul. (?) aequali. Sp. pl. Hab. in Oriente, Hispania et ad Cap. b. spei. ☉

3. *canadensis*, erecta longifolia, panic. laxa, spicul. erectis 4-10-floris, cal. parvulo, cor. valv. castiore ovali acuta. Michaux. Flor. p. 11. Hab. in Canada. Spicul. virescent.

4. *media*, spicul. ovatis, calyce flosculis (?) brevior. Flor. dan. 1. 258. Leers. t. 7. f. 2. Hab. in pratis, sylvia. Var. spicul. purpureiscentibus et albidis. ☉

5. *geniculata*, spicul. ovatis, calyce floscul. brevior. culmo geniculato. Thunb. prod. 21. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *erecta*, panic. subsimplici, spicul. ovatis: rectis subnovemfloris, cor. acutiusculis laevibus. Lam. ill. 1. p. 187. Hab. in Montevideo. Glum. albidae.

7. *rubra*, panic. subsimplici, spicul. cordato-ovalibus erectis 9-floris, glum. margine rubris. Lam. 1. c. Hab. in India. Cor. subpubescens.

8. *maxima*, spic. cordatis. flosculis septendecim. L. Lam. ill. 1. 45. f. 2. Hab. in Italia, Lusitania, Cap. b. spei, India. Cal. spadiceus. ☉

170. *UNIOLA*. Spiculæ multifloræ, planæ ancipites, ovatae: Cal. multiglumis. Cor. 2-valvis, mutica: valv. interiore minore, intra anteriorem recumbente. Stam. 1-3. Appendices 2, subbicornes ad basin germinis. Stigm. longa, muricata.

1. *latifolia*, fol. latis planis, panic. laxa, cal. trivalvi, spiculis longe pedicellatis, flor. monandris. Michaux. Flor. Amer. bor. 1. p. 20. Hab. in Amer. montibus Alleghensis. In hortis sub nomine U. *paniculatae* colitur.

2. *maritima*, fol. convolutis, panic. longa, spiculis subsessilibus, cal. multivalvi, flor. 3-andris. Michaux. 1. c. p. 71. U. *paniculata*. Lin. Will. spec. 1. p. 406. Hab. in Virginiae littoribus arenosis.

171. *FESTUCA*. Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula oblonga, teretiuscula aut divergens, mutica aut arista terminali instructa.

* Spica simpliciter.

1. *loliacea*, spic. elongata, spiculis alternis sessilibus muticis. Huds. Smith. brit. 1. p. 112. Curt. Lond. ic. F. *elongata*. Ehrh. F. Phoenix. Thuill. Hab. in pratis et pascuis humidis. An potius Lolium? quod refert; sed cal. 2-valvis, quod etiam passim obtinet in L. temulentis.

2. *monostachya*, culm. filiformi, fol. ciliatis, spicula unica terminali longe aristata. Desf. Atl. p. 92. t. 24. f. 2. Hab. in arvis prope La Calle.

3. *cynosuroides*, spicul. breviter petiolatis secundis compressis aristatis. Def. l. c. p. 88. t. 21. In arenosis prope Casam. ☉

Obs. Ob affinitatem cum *Festuca ovina* huc forte melius collocandum esset *Triticum tenellum*.

** *Panicula plus minuse ramosa secunda coarctata.*

4. *magellanica*, panic. secunda stricta subspicata, spicul. violaceo-fuscis aristatis subsexfloris, fol. radicalibus setaceis. Lam. ill. 1. p. 189. Hab. in fretu Magellanico.

5. *capillata*, panic. angusta subsecunda, spicul. subfloris aristatis, culm. laevi uniformi, fol. capillaribus. Lam. l. c. p. 190. Hab. in umbrosis et nemoribus. *F. ovinae* affinis. †

6. *tenuifolia*, panic. subsecunda coarctata muica, culm. 4-gono spice subtomentoso, fol. capillaribus. Hoffm. germ. p. 51. Leers. t. 8. f. 4. In collibus et sterilibus.

7. *ovina*, cespitosa, panicula secunda coarctata, floscul. teretiusculis basi clabris, culmo tetragono glabro, fol. omnibus setaceis scabris. Smith. brit. 1. p. 113. Willd. Sp. 1. p. 410. Leers. t. 8. fig. 3. Habitat in collibus aridis, eulam in sylvaticis. Rad. fibrosa nigrescens.

8. *vivipara*, panic. secunda coarctata, floscul. compresso-carinatis muticis calyocque subpubescentibus, culm. 4-gono, fol. actacis larvibus. Smith. l. c. Raj. synopsis. t. 22. f. 1. Scheuchz. prodr. t. 1. f. 2. Hab. in subalpinis. In hortis vivipara manet S. An *F. ovinae* tantum varietas?

9. *rubra*, panic. secunda, flos. teretiusculis aristatis, fol. linearib. aequalibus supra pubescentibus, radice late repente. Smith. l. c. p. 116. Stilling fl. Misc. t. 9. Habit. in pascuis, montosis, sylvaticis, etiam in arenosis maritimis, ubi radiceis flagellis longissime per arcuam mobilem extensis. Sm.

Obs. *F. rubra* Auct. diversa videtur.

10. *duriuscula*, panic. secunda diffusa, floscul. aristatis, culm. tereti, fol. caulinis planis, radice fibrosa. Smith. l. c. p. 115. Leers. t. 8. f. 2. Engl. bot. t. 450. *β dumentorum*, flosculis mollissime pubescentibus. Lin. Flor. dan. t. 700. Hab. in pratis et pascuis decioribus *β* in dumetis. Videtur *F. rubra* plurium auctorum.

11. *glauca*, panic. secunda subspiciformi, spic. laevibus subquinq. floris subaristatis, fol. glaucis rigidis subulatis. Lam. ill.

1. p. 190. t. 46. f. 3. Hab. in Europ. australiori; in hortis ad latera areolarum etiam colitur.

12. *cinerea*, fol. subulatis recurvis, panic. subsecunda, spicul. subhirsutis aristatis 5-floris. Villars delph. 2. p. 98. Hab. in montosis Galliae austral. An a priori satis diversa?

13. *varia*, fol. setaceis duriusculis, panicula collecta, spiculis teretibus subquadri-floris subaristatis. Vill. delph. 2. p. 102. (*F. pumila*). Willd. sp. 420. *F. varia*. Jacq. Collect. 2. p. 94. Hab. in alpinis Delphinatus, Helvetiae, Styriae. *?*

14. *amethystina*, panicul. flexuosa, spiculis secundis inelinais submuticis, fol. setaceis. Lin. Gramen montanum, panicul. heteromalla spadicea et velut amethystina. Scheuchz. gram. 276. Habit. in montosis. Species dubia.

15. *reptatrix*, panic. ramis simplicibus, spiculis subsessilibus, fol. involuto-filiform. Sp. pl. 103. Willd. p. 421. Hab. in Arabia, Palaestina. Radix longissime reptans sub terra, vestita latis foliorum rudimentis. *?*

16. *heterophylla*, fol. radicalibus straccis, caulinis planis latoribus, panic. rara secunda, spiculis subsexfloris lanceolatis glabris aristatis. Jacq. Collect. 2. p. 93. Vaill. bot. Paris. t. 19. f. 6. *F. nemorum*. Lcysa. Hab. in sylvaticis. *?*

17. *Myurus*, panicula spicata longa nutante calyceibus minutissimis muticis, flor. scabris: aristis longis, fol. setaceis. Leers. t. 3. f. 5. Gramen murorum, spica longissima. Moris. s. 8. t. 7. f. 43. Habit. in pratis arvis, muris. ☉

18. *alopocurus*, racemo subspicato, spicul. alternis distichis aristatis, cor. villosa-ciliatis. Schousb. M. roc. 1. p. 281. Hab. in arenosis prope Tingidem. In planta culta racem. transit in paniculam secundam. Roth.

19. *bromoides*, panic. erecta secunda latiuscula, spiculis laevibus, flos. longissime aristatis. Lam. ill. p. 189. t. 46. f. 4. Willd. sp. 1. p. 419. *F. panic. secunda erecta*, flos. subulatis aristatis apice scabris, fol. setaceis vagina brevioribus. Smith. brit. 1. p. 117. Pluck. Phyt. t. 31. f. 10. *Bromus dertonensis*. Allioni. B. *ambiguus* Cyreni. Hal. in muris et arenosis. Valv. interior margin pubescens. An *F. ciuroides*. Roth. Willd. 1. p. 423. eadem species?

20. *uniglumis*, panic. secunda erecta subsimplici, flos. subulatis compressis arista-

tis, cal. valvula altera brevissima. Smith. p. 118. Raj. Syn. 1. 17. f. 2. Lolium Bromoides, Huels. Stipa membranacea Linn. ? Hab. in Angliae arenosis maritimis. Fol. lanceolata subinvoluta striata.

21. *ciliata*, culm. ascendente, fol. subconvolutis, spic. racemosa, cal. valva altera minima: corollinae exteriori margine ciliata. Link. in Schrad. Journ. 2. p. 315. Hab. in Lusitaniae littore arenoso fluv. Douro, et in Gallia meridionali.

22. *Halleri*, minuta, fol. setaceis duris, panic. stricta, spicul. teretibus hirsutis, longius aristatis. Vill. del. h. 2. p. 103. Hall. Helv. n^o. 1441. Allion. pedem. 2245. Cresc. in subalpinit. Culm. 2-3. unc. longus. Spic. griseae. V.

23. *montana*, panic. secunda depauperata, spicul. solitariae quadriflorae hirsutae, fol. linearib. rigidis pilosis. Savi. Pis. 1. p. 118. Hab. in monte Pisano. $\overline{\text{L}}$

24. *stipoides*, panic. erecta secunda, spicul. subquinguefloris, glum. breviter aristatis, pedicellis ensiformibus. Desf. atl. 1. p. 91. Bromus stipoides. Linn. Mant. p. 657. Barrel. 1. 76. f. 1. Hab. in Majorca et prope Mascar. Aristae ex apice. \odot

25. *rubens*, panic. fasciculata secunda, spicis subsessilibus villosis rubescentibus aristis rectis elongatis. Brom. rubens. Linn. Hab. in Hispania.

Obs. Aristas in hac et antecedente specie terminales observavi. Forte Br. *rubens*. Cav. ic. 1. p. 34. t. 45. f. 2. est Brom. *scorpiarius* L., species albus dulcis.

26. *scabra*, panic. secunda coarctata, spiculis compressis sexfloris flosc. scabris. Vahl. symb. 2. p. 21. Hab. ad Cap. b. spci.

*** Panicula aequali.

27. *fusca*, panic. erecta ramosa, spiculis sessilibus cernatis muticis, fol. involutis. Linn. Sp. pl. 109. An. F. fascicularis. Lam. ? Hab. in Palestina. Culmus altus. Spiculae erectae longae, flosc. 16. s. 24. L.

28. *decumbens*, panic. erecta, spiculis subovatis muticis, calyc. floscul. majore, culmo basi decumbente. L. Fl. suec. p. 92. q3. Leers. t. 7. f. 5. Bromus decumbens. Koel. gram. p. 242. An potius Bromus ? Valv. corollinae enim margine versus basin villatae. Hab. in sylvaticis, pascuis. $\overline{\text{L}}$

29. *pauciflora*, panic. patula, spiculis subquadrifloris aristatis scabris, fol. villosis. Thunb. jap. 52. Hab. in Japonia.

30. *elatior*, panic. secunda suberecta,

spiculis obtusiusculis: exterioribus teretibus. Leers. t. 8. f. 6. Hab. in pratis fertilissimis. Est F. *elatior* plurium auctorum.

31. *spadicea*, panic. contracta subcuncta, spicul. compressis, quadrifloris muticis (coloratis), fol. linearib. denum convolutis. Smith. in Act. Lin. 1. p. 113. Willd. Sp. 1. p. 423. Hab. in Galliae montosis. Cal. valv. altera minor.

32. *arundinacea*, panic. erecta stricta, spic. oblongis erectis 4-floris brevissimae aristatis. Hoffm. germ. Schreb. spicil. p. 57. Hab. in humilibus ad margines rivulorum. Hujus loci. F. *elatior* Curtis. Smith. brit. 1. p. 124 ?

33. *caerulescens*, fol. hinc striatis rigidis, panic. secunda coarctata, spicul. subtrifloris, glumis acutis muticis. Desf. Atl. 1. p. 87. Hab. in Algeriae arvis.

34. *gigantea*, panic. secunda nutante ramosa laxa, floscul. lanceolatis ventricosis aristatis, fol. ensiformibus laevib. Smith. l. c. p. 120. Br. *giganteus*. Linn. Hab. in sylvis umbris humi linsculis. Glum. interior non pectinato-ciliata ut in Bromis. S. $\overline{\text{L}}$

35. *poaeformis*, fol. longissimis, panic. ramosissima pallida, spiculis oblongis subduodecimfloris obtusis muticis. F. Poaeoides. Thuill. Paris. p. 51. Hab. in sylvaticis siccis. Spic. primo subteretes ut in F. lolloides.

36. *poaeoides (americana)*, glaberrima, culm. geniculate subbinodi, panicul. subconferta: ramis inferioribus simplicibus, spiculis oblongis 9-10-floris muticis. Michaux. p. 67. Hab. ad ripas fluv. St. Laurentii.

37. *polystachya*, panic. erecta coarctata, ramis s. pedicellis simplicibus: spiculis tenuibus unilateralibus 8-10-floris, fol. longissimis glabris. Michaux. p. 66. In America boreali.

38. *calamaria*, panic. secunda erecta ramosissima coarctata, flosc. parvis oblongis angularis muticis, fol. ensiformib. striatis. Smith. brit. 121. Hab. in sylvat. subalpina Scotiae. Spic. virescent 3-5-florae. Culm. teres, vag. longae. $\overline{\text{L}}$

39. *Auitans*, culmo ascendente, panic. ramosa ramis patentibus, spiculis subsessilibus a-pressis teretibus muticis. Schreb. gram. 37. t. 1. Leers. t. 8. f. 5. Poa Auitana. Smith. brit. 1. p. 95. Glum. margine scariosae s. coloratae ut in Pois. Hab. in fossis et paludibus. $\overline{\text{L}}$

40. *divaricata*, culm. basi geniculate

spicul. teretibus elongatis muticis paniculato-dichotomis. Desf. Alt. 1 p. 99. t. 22. Hab. in Barbariae arenosis maritimis.

41. *miseria*, panic. coarctata, glum. aristis scabris, culmo geniculato, fol. ensiformibus. Thunb. jap. 52. Hab. in Japonia.

42. *indica*, panic. contracta erecta, spiculis compressis subaristatis subsessilibus. Retz. obs. 4. p. 21. Willd. p. 427. Rheed. mal. 12. p. 75. t. 45. Hab. in India, in agris oryzaceis. Colore coerulescenti-viridi e longinquo dignoscitur. R.

43. *calycina*, panic. coarctata, spiculis linearibus, calyce flosculis longiore, fol. basi barbatis. L. Cavan. ic. 1. p. 33. t. 46. f. 2. Lam. ill. 191. t. 46. f. 5. Hab. in Hispania. P. pilosa quorundam.

44. *pungens*, spica glomerata ovata, spicul. sexfloris teretibus lanuginosis, fol. involutis rigidis. Vahl. symbol. p. 10. t. 2. F. mucronata. Forst. descr. 22. n°. 74. Hab. in Arabia. ¶

45. *phalaroides*, spica brevi densa lobata secunda, spicul. 2-3-floris hirsutis breviter aristatis. Lam. ill. 1. p. 160. Hab. in Gallia australi. An potius Dactylis?

172. **BROMUS.** *Cal.* 2-valvis, multiflorus. Spicula oblonga, disticha: arista infra apicem saepius bifidum, (glum. interior pectinato-ciliata. Smith.)

1. *secalinus*, panicula nutante, spiculis ovatis glabris compressis glumis nudis distinctis, aristis subulatis brevioribus flexuosis rectis. Lin. Willd. sp. 1. p. 428. B. vicius. Weigel, obs. p. 4. t. 1. f. 2. Hab. in agris inter segetes. Arist. subobsoletae. ☉

2. *multiflorus*, panic. patente, spiculis pubescentib. lanceolatis compressis, glumis nudis marginatis imbricatis, aristis capillaribus aequalibus rectis. Roth. germ. I. 47. Weigel obs. bot. p. 2. t. 1. f. 1. Lectr. herb. t. 13. f. 2. Scheuchz. gram. t. 5. f. 9. Inter segetes: priore rarior observatur.

3. *mollis*, panic. erecta coarctata, pedunculis ramosis, spic. ovatis (subturgidis) pubescentibus: glumis ellipticis, vaginis foliisque mollissime villosis. Lin. Smith. brit. 1. p. 126. Ubique frequens. Fol. pilis longis distincta, quo sequentes varietates? quoque conveniunt.

¶ *leptostachys*, caespitosus, panic. stricta pedunc. simplicibus, spic. ovato-linearibus glaberrimis subquincifloris, glumiv. nervosis aristisque purpurascens, vag. folisque pilosis. Hab. in pratis et sylvaticis.

Obs. An huc pertinet Br. pratensis Ehrh? cui spicul. quoque glabrae nitidae, nno latere subsopadiccae et pedic. simplices sunt.

¶ *conglomeratus*, caespitosus, spicul. ovatis 8-floris in capitulum conglomeratis vaginisque tomentosis. Prope Montpellier lectus a Cl. Thibaud. Pedalis. Glum. minus latae.

4. *erectus*, elongatus, panic. stricta, pedunc. simplicibus, flosce coloratis aristatis hirtis, fol. radicalib. angustis pilosis. Smith. brit. 1. p. 131. B. pratensis. Lam. B. perennis. Villars. B. agrestis. Allion. B. oryensis. Poll. In Europ. australioris pratis frequens. B. incermi similis. Spiculae saepe quasi truncatae apparent fusco-purpureae, divergentes ut in Festucis, quibus valde affinis. ¶

5. *racemosus*, panic. erectiuscula diffusa, pedunc. simplicibus, spicul. ovatis sexfloris, floscul. imbricatis depressis nervosis glabris. Smith. Brit. 1. p. 128. Moris. 2. 8. t. 7. f. 19. Hab. in Angliae et Galliae pascuis, sylvaticis. Spicul. viridi alboque vittatae. Sm.

6. *canadensis*, panic. laxa capillari pendula, spiculis subsessilibus compressis, flosce. valva exteriori breviter aristata margine villosa. Michaux, Flor. 1. p. 63. Hab. in Canada.

7. *pectinatus*, panic. patente, spiculis ovatis glabris, corollae valvula inferiore ciliata mutica. Thunb. prod. 22. Hab. in Cap. b. spci.

8. *lanceolatus*, panicul. ramosa erecta patente, spiculis lanceolatis glabris subcompressis, aristis floralibus rectis, seminalibus refractis. Roth. Cat. 1. p. 18. Hab. locis aridis circa mare Caspium. ☉

9. *squarrosus*, panic. nutante, spiculis ovatis: aristis in spica matura divaricatis, pedunc. simplicibus. Scheuchz. gram. t. 5. f. 11. Hab. in Europ. australi. ☉

10. *japonicus*, panic. patente ramosa, spiculis oblongis glabris, aristis divaricatis. Thunb. jap. p. 52. t. 11. Hab. in Japonia. ☉

11. *alopecurus*, fol. villosis, panicula coarctata erecta, spicul. 15-floris subsessilibus pubescentibus, aristis basi coarctatis. Desf. Atl. 1. p. 95. t. 25. B. (contortus). Poir. iter. Hab. prope la Calle. ☉

12. *macrostachys*, culmo basi geniculato, spic. maximis teretibus glabris. aristis rigis patentibus. Desf. l. c. p. 96. t. 19. f. 2. In Aislone prope Flemsen. Spicul. maximae, glabrae inferiores nutantes. ☉

13. *turgidus*, panic. ramosa stricta, spic.

turgidis 6-floris subvillosis, aristis divaricatis subscrratis. B. *squarrosus*, var. β . Lam. ill. Buxb. Cent. 5. t. 38. f. 1? Hab. ...

14. *simplex*, panic. simplici, spicul. sessilibus 8-10-floris glabris aristis subdorsalibus divaricatis, vaginis villosis. Hab. ...

15. *purgans*, panic. nutante crispa, fol. utrinque nudis: vaginis pilosis, glumis villosis. Sp. pl. 113. Willd. sp. p. 431. Hab. in Canada. Kalm. T. Folia latitudine arundinis, supra fere nuda. L.

16. *catharticus*, panicul. patente erecta subsimplici, spiculis lato-lanceolatis striatis scabris, aristis brevibus rectis. Vahl. symb. 2. p. 22. Few. peruv. 705. t. 1. Hab. in Lima. Differt a priore vaginis non ciliatis.

17. *inermis*, panic. erecta, spiculis subteretibus subulatis nudis submuticis. Roth. germ. I. p. 48. Schreb. gram. t. 13. Speciosa. Schreb. spicil. p. 59. Hab. in Germania, Helvetia. T.

18. *asper*, panic. ramosa nutante scabriscula, spiculis linearibus subteretibus decemfloris pilosis aristatis, culmo folisque hirtis. Aiton. Kew. 1. p. 109. B. *ramosus*. Lin. Syst. veg. ed. 13. p. 102. Nec Mant. p. 34. B. *hirtus*. Curt. lond. fasc. 2. t. 8. Hab. in sylvis, ad sapes. Pili sparsi, deorsum spectant. σ

19. *verticillatus*, panic. aperta pedunculis horizontalibus verticillatis, elongatis simplicibus ramosisque. Cav. ic. 6. p. 66. t. 560. Hab. in Regn. Aragonensis agris. Cal. 12-florus. C. Br. *sterili* affinis.

20. *pallens*, panic. erecta subcontracta, pedunc. inaequalibus, spicul. 5-floris: aristis capillarib. longissimis. Cav. l. c. p. 66. t. 561. f. 1. Hab. in Manilae vicinias.

21. *littorens*, panic. erectiuscula scabra, spiculis oblongis subquadrifloris (4-6) glabris muticis. Retz. scand. ed. 2. n. 140. B. *arundinaceus*, panicul. erecta contracta, spic. oblongis scabris subaristatis paucifloris. Roth. Flor. germ. 2. p. 141. Gmel. fib. 1. p. 110. n. 44. t. 21. Schenezh. gram. 266. t. 5 f. 8. Hab. in Suecia, Pomerania, Helvetia, Sibiria. T. Maximus omnium.

22. *ciliatus*, panic. nutante, fol. utrinque vaginisque subpilosis, glumis ciliatis. L. Hab. in Canada. Culmi tenues.

23. *arvensis*, panic. nutante, spiculis ovato-oblongis glabris. Weigel. obs. p. 6. t. 1. f. 3. Leers. t. 11. f. 3. B. *versicolor*. Pollich. Palat. n. 109. Hab. ad versuras agrorum. Ant. puniceae. Spic. purpureascentes viridis. \odot

24. *sterilis*, panic. patula subsimplici pendula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. Leers. t. 11. f. 4. Hab. in agris, sylvis, ad vias. Pedicelli asperi. \odot

25. *lectorum*, panicula nutante ramosa, spiculis pubescentibus linearibus. Leers. t. 10. f. 2. Hab. in collibus siccis, tectis et inris. Panic. debilis, a minimo vento mobilis. σ

26. *geniculatus*, panic. erecta, flosc. distantibus, pedunculis angulatis, culmo genu procumbente. Mant. p. 33. Schreb. gram. 2. p. 60. t. 31. Hab. in Lusitania. \odot

27. *rigens*, panic. spicata: spiculis subsessilibus erectis pubescentibus subquadrifloris. Mant. 33. Hab. in Lusitania. Vaginas totum culmum tegentes.

28. *scoparius*, panic. fasciculata, spic. subsessilibus glabris, aristis patulis. Amoen. acad. 4. p. 266. Conf. Cav. ic. 6. p. 65. t. 589. f. 2. Hab. in Hispania.

29. *madritensis*, pubescens, panic. patula subsecunda, spic. linearibus retrorsum scaberrimis, aristis longissimis scabris. Vahl. symbol. 2. p. 21. Cav. ic. 6. p. 67. B. panicula rariore patulo-erecta, spic. linearibus, intermediis geminis, pedicellis superne incrassatis. Lin. Amoen. acad. 4. p. 265. B. *diandrus*, flosc. lanceolatis nervosis diandris. Smith. Flor. brit. 1. p. 135. B. *rigidus*. Roth. Catal. 1. p. 17. B. *maximus*. Desf. Atl. t. 26. Hab. in Anglia, et in subulnis Maritimi, et in regno Valentino. \odot

* *Culmo s. panic. simplici.*

30. *gracilis*, villosus, spica simplici gracili, spicul. alternis sessilibus teretiusculis longius aristatis. Weig. obs. p. 15. B. *sylvaticus*. Smith. brit. 1. p. 136. In nemorib. Vagin. et fol. magis lanata.

31. *pinnatus*, glaber, spic. simplici disticha, spicul. alternis subsessilibus teretibus longis subaristatis, culm. nodis pubescentibus. Lin. Willd. sp. 1. p. 438. Triticum Hall. Festuca Kohl. Hab. in graminosis sylvaticis.

32. *longifolius*, culm. basi ramoso, fol. involuto-subulatis culmum aequantibus, spicul. teretibus recurvatis. Schousb. Marroc. ed. germ. p. 31. In Barbaria.

33. *retusa*, caespitosa, culm. elongato simplici, fol. subulatis breviusculis, spic. teretibus submuticis, glum. apice retuso-mucronatis. Hab. in Gall. meridionali, in maritimis. B. *ramosus* L. Willd. sp. 1. p. 437? B. *caespitosus*. Desf. Atl. 1. p. 91?

34. *distachyos*, spiculis ut plurimum dugbus

duabus erectis alternis. Lin. Festuca ciliata. Gouan. Hab. in Europa australi et Oriente. Var. spicul. 1. a et 3. b. *polytachyos*. Lam. ill. 1. p. 195.

Obs. Quae hac in subdivisione enumeratae species eodem jure ad Festucas aut ad Triticea amandari possent. Valvula interior pectinato - ciliata certius Bromi indicium praebet, quam aristae insertio, dicit cl. Sm. (Flor. Brit. 1. p. 137), quae in his terminalis est.

173. KOELERIA. Cal. multiflorus; 2-valvis, compresso - carinatus. Cor. 2-valvis, brevi-aristata: glumis nervosis. (Spica composita ex spiculis compressis, saepius pubescentibus subsessilibus.)

1. *gracilis*, spica basi interrupta elongata subramosa, spicul. bifloris nitidis muticis. Poa nitida. Lam. ill. 1. p. 182. Poa cristata. Krock. sil. ic. An Aira subspicata. L. ? Hab. in sylvaticis. Fol. angusta, dein convoluta.

2. *cristata*, spica laxiuscula, spiculis divergentibus 3-4-floris subaristatis rugulosis carina subciliatis. Poa cristata auctorum. Fol. plana vag. et culm. apice pubescens.

3. *graniflora*, spiculis magnis dilatatis. Ex Helvetia. Richard.

4. *pectinata*, panic. spicata nitida, glum. patulis pectinatis subquinguefloris, culm. superne villosus. Lam. 1. c.

5. *pyramidata*, panic. pyramidalis, glum. brevibus nitidis muticis trifloris, vagin. villosa-pubescentibus. Lam. 1. c. p. 183.

6. *tuberosa*, spica elongata densa, spic. 2-floris subciliatis, culm. basi tuberoso, fol. linearibus. Aira vallisiana Allioni? Aira cristata. Smith. brit. 1. p. 81. etiam hujus loci. Hab. in Italia, Anglia et Helvetia.

7. *setacea*, rad. tuberosa, fol. brevibus duris setaceis, spica cylindrica, cal. 2-floro subovali obtusiusculo incerni glabro, cor. subarista. Richard. Hab. in Pyreneis. An mera varietas?

8. *Phleoides*, spic. cylindrica, spicul. 5-6 floris aristatis, glumis sublancoatis nervosis hirsutis exasperatis. Festuca. Villars. Dauph. 2. p. 95. Avena pumila. Lam. ? videtur. Poa cristata. Linnæus. Hab. in Gallia meridionali et in Barbaria.

9. *villosa*, vagin. suburgli foliisque pubescentibus, vag. ovata, spicul. 2-floris villosa-hispidis. Phalaris pubescens. Poirer. Aira pubescens. Vahl. symb. 3. p. 9. Desf.

Atl. 2. p. 446. Hab. in Europa et Barbaria ad maris litora.

174. TRisetum. Cal. 2-3-florus, acuminatus, carinatus. Cor. aristis 2 terminalibus subdentiformibus (glum. apice setoso-bifidis), 1 dorsali recta nec contorta, flosc. ut plurimum, glabris. (Spicula compressæ, pallescentes.)

1. *striatum*, panicula tenui, pedicellis brevibus incrassatis, cal. glumis nervosis, 2-3-floris striatis, floscul. basi villosis. Avena striata. Lam. ill. 1. p. 200. *β. A. dubia*. Leers, tenuis. Willd. 1. p. 448. *γ. hirta*, fol. hirsutis. A. triaristata. Villars. Iluc quoque pertinere videtur Bromus triflorus. L. Cir. Koel. gram. p. ... Hab. in Europa austr.

2. *villosum*, panic. trichotoma, cul. bifloris, cor. (triaristatis), aristis lateralibus basi villosis brevioribus. Thunb. prod. p. 29. Avena triset. Hab. cum sequente ad Cap. b. spei.

3. *nudum*, panicula trichotoma, cal. 2-floris, aristis nudis: intermedia longiore. Av. pallida. Thunb.

4. *nitidum*, panic. spicata, glumis membranaceis nitidis villosis (triaristatis) Desf. Atl. 1. p. 102, 1. 31. f. 2. In arcensis prope Mascari. Spicul. majusculæ.

5. *luteum*, panic. patente, cal. 2-floris subulatis, cor. nudis triaristatis: arista intermedia flexuosa. Lân. suppl. p. 112. In insula Martinica.

6. *parviflorum*, fol. pubescentibus, panic. laxa, cal. 2-3-floris, arista brevi setiformi infra glumae apicem. Desf. 1. c. 103. t. 32. Hab. inter segetes in Atlantic.

7. *pratense*, panic. subcontracta, spic. nitidis, vagin. longis striatis glabris, fol. superne villosis. Av. *flavescens*. L. Leers. 1. 10. f. 5. In pratis frequens. An Bromus bifidus. Thunb. jap. hujus quoque loci.

8. *panicum* (lytanicum), panic. contracta, vaginis hirsutis. Link. in Schrad. bot. journ. 8. p. 314. Hab. in Lusit. Sequen. affine.

9. *hispanicum*, panic. subsipiciformi vaginis foliisque subpilosis. Av. Loelligia. L. A. panicea. Lam. ill. p. ... non multum differt. Habitat in Hispania.

10. *pisanum*, panic. ex spicis densis composita, spicul. subquadrifloris, fol. sublancoatis vaginisque pilosis. Av. neglecta. Savi. Flor. Pis. 1. p. 132. t. 1. f. 4. Hab. in campis prope Pisam frequens. Communicatum a cl. auctore.

10. *ovatum*, spica ovata densa, spicul. 3-5-floris, fol. villosis brevibus. Cav. ic. 6. p. 67. t. 591. f. 2. sub Bromo. Cresc. in Hispaniae collibus. Spic. saepius quoque globosa, pallide viridis.

11? *Aristidoides*, panic. trichotoma, aul. bifloris, cor. bifidis aristatis. Thunb. prodr. 22. sub Avena. Ad Cap. b. spei.

Obs. Nonnullae generis *Avenae* species ex. gr. *Av. pennsylvanica*, lupulina et purpurea huc quoque pertinere videntur, quas ulterius examen hinc merentur.

175. **LAGURUS.** *Cal.* 2-valvis, 1-florus: aristis villosis. *Cor.* gluma exterior aristis 2 terminalibus, tertia dorsali retorta.

1. *ovatus*, spica ovata villosa. L. Schreb. gram. t. 19. f. 3. Smith. brit. 1. p. 143. *Alopecurus*. Moris. 1. 8. t. 4. f. 1. Habit. in Europ. austral. campis arcuosis.

176. **PAPPOPHORUM.** *Cal.* 2-valvis, 2-florus. *Cor.* 2-valvis, multiaristata.

1. *alopecuroides*, Vahl. symbol. 3. p. 10. t. 51. *Saccharum pappiferum*. Rich. Lam. ill. 1. p. 159. Hab. in Americo. Folia convoluta-subulata.

177. **ARISTIDA.** *Cal.* bivalvis, uniflorus. *Cor.* 1-valvis: aristis tribus terminalibus.

1. *adscensionis*, panicula ramosa, spicis sparsis. L. Willd. sp. 1. p. 458. *Aristida paniculata*. Sloan. jem. 35. hist. 1. p. 16. f. 2. f. 56. Hab. in Jamaica australis locis sabulosis et insula Adscensionis.

2. *americana*, panic. simplici, cor. bivalvibus, altera aristis dorsalibus, altera terminalibus. Swartz. obs. 41. t. 2. f. 2. Lin. Amoen. ar. l. 5. p. 393. Hab. in Amer. calidioris sabulosis.

3. *gigantea*, panic. elongata effusa secunda, aristis subaequalibus rectis. Lin. suppl. 113. Hab. in Teneriffa. Gram. altissimum, glaberrimum.

4. *Nystrix*, panic. divaricata patentissima, flosc. simplicissimis glabris, aristis rectis divaricatis. Linn. supp. 111. Pluck. alm. 174. t. 191. f. 3. Habit. in Malabar et ad Cap. b. spei. Gramen repens stolonisferum.

5. *pallens*, panic. pauciflora, pellicell. alternis bifloris approximatis, aristis capillaribus longissimis. Cavan. icon. 5. p. 43.

1. 468. f. 2. Habit. in regno Chilensi. Fol. filiformia.

6. *vestita*, panic. trichotoma patenti, aristis aequalibus glabris, calyce inaequali. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spei.

7. *dichotoma*, cespitosa, culm. dichotomis sulapicatis, arista contorta gluma brevior: lateralibus brevissimis. Michx. Flor. 1. p. 41. Hab. in Carolinae superioris glareosis.

8. *stricta*, culm. foliisque pubescentibus strictis, racemo in spicam elongatam coarctato, aristis gluma longioribus. Michx. l. c. In Carol. infer. Var. fol. planiusc. et convolutis.

9. *oligantha*, culm. stricto subramoso, fol. convuluto-filiformibus, flor. distantibus solitariis. Michaux. l. c. Hab. in pratis liliocensibus. Fol. longissima.

10. *rigida*, panic. contracta, fol. rigidis acuminatis glabris culmo parallelis, aristarum media duplo longiore. Cav. icon. 5. p. 44. t. 469. f. 2. Hab. in insul. Philippicis.

11. *vagans*, panic. ramis divaricatis panicifloris, cor. calyce longiore, aristis brevibus: media productiore, fol. subulatis. Cav. 5. p. 45. t. 471. f. 2. Hab. in Nov. Hollandia.

12. *laxa*, panic. laxa: pedicellis nudis elongatis bifidis, spicis terminalibus, aristis lateralibus brevissimis. Cav. l. c. t. 470. Hab. prope Montevideo. Arista glum. longior basi contorta.

13. *Luzonensis*, culm. ramoso, panic. contracta, spiculis alternatim pluribus; aristis subaequalibus. Cav. l. c. t. 470. f. 1. Hab. in ins. Philippica Luzow. Cor. margine involuta et in maturis in cylindrum convoluta punctisque fuscis variegata. C.

14. *ternipes*, panic. coarctata longissima: ramulis alternatim ternis capillaribus; aristis 2 lateralibus brevibus. Cav. l. c. p. 46. Fol. convolutum subulatum. †

15. *murina*, panic. densa spicaeformis: ramis alternatim binis subquinquefloris, calycibus violaceis. Cav. l. c. p. 44. t. 469. f. 1. Hab. in Mandanoo insula. Hordeum refert Palmaris.

16. *caerulescens*, panic. coarctata elongata arcuata subsecunda interrupta, arista laevibus subaequalib. fol. glabr. Deaf. Atl. 1. p. 109. Habit. in arvis prope Kerwan. ‡

17. *elatior*, caule ramoso altissimo, panic. elongata, cal. violaceis, aristis aequalibus. Cav. ic. 6. p. 65. t. 589. f. 1. In Hispanias aridis prope mare Malacitanum, etiam in regno Valentino.

18. *arundinacea*, paniculata, arista in-

termedia longiore levi. Lin. Mant. p. 186. In India. Arist. subcurvata; ad hujus basin utrinque arista minuta vix manifesta. L.

19. *depressa*, culm. trifido-ramosis decumbentibus, aristis scabriusculis. Retz. obs. 4. p. 22. In Malabarica sterilibus.

20. *setacea*, culm. stricto simplici, aristis scabriusculis. Retz. l. c. † Cor. basi lanata uti in praecedente. An ambae species satis distinctae?

21. *interrupta*, panic. ramis interruptis, fol. vaginantibus subulato-longissimis, aristis ciliatis. Cav. ic. 5. p. 45. t. 471. f. 2. Hab. in Mexico.

22. *lanata*, arista intermedia longiore lanata, culmis villosis. Vahl. symbol. 1. p. 17. t. 3. Lam. ill. t. 41. f. 1. *lanata*, panicula ramosa, arista medio lanata. Forsk. descr. 25. n. 87. Hab. in Armenia, et in regno Tunetano. Desf. p. 109. Aristis lanatis refert Stipam pennatam.

23. *capensis*, panicul. trichotoma patente, aristis omnibus villosis. Thunb. prod. 19. *Avena capensis*. Lin. suppl. 112. Hab. ad Cap. b. spei.

24. *pungens*, culm. fruticoso, fol. subulatis rigidis; panic. laxa, aristis plumosis. Desf. Atl. 1. p. 109. t. 35. Hab. in Barbariae arenis humidis. h

178. *STIPA. Cal. 2-valvis, 1-florus. Cor. brevior, 2-valvis; valv. involutis truncatis. Arista terminalis, basi contorta, decidua, longissima.*

1. *pennata*, foliis filiformibus, aristis plumosis basi glabris. L. Willd. sp. 1. p. 440. Lam. ill. 1. t. 41. f. 1. Hab. in Germania et Suecia. T.

2. *barbata*, fol. rigidis striatis, aristis longissimis totis barbatis. Desf. Atl. 1. p. 97. t. 27. Hab. in Barbariae collibus. T.

3. *humilis*, Cor. panic. spicatis vagina subinclusis, aristis pennatis. Cav. ic. 5. p. 41. t. 408. f. 2. In Americ. meridionali. Arista medio pilis longis barbata.

4. *tortilis*, panic. spicatis basi involuta, cal. interiore villosa, aristis tortilibus. Desf. l. c. p. 99. t. 31. f. 1. Hab. in arvis. Flos. decidui vestimentis adhaerent cuumque pungunt viatorum damno. D ©

5. *juncea*, fol. convolutis filiformibus, panic. laxa elongata, aristis longis pubescentibus. Desf. Atl. 1. p. 98. t. 28. p. *Stipa juncea*, aristis nudis rectis, cal. semine

longioribus. Lin. Willd. sp. 1. p. 440. Hab. in collibus aridis. T.

6. *capitata*, aristis nudis curvatis, calycibus semine longioribus, fol. intus pubescentibus. Lin. Hab. in Germania, Galia. An Var. prioris? T.

7. *tenacissima*, aristis basi pilosis, panicula subspicata, fol. filiformibus. Amoen. acal. 4. p. 266. Desf. l. c. p. 99. t. 50. Hab. in Hispaniae et Barbariae collibus arenosis. Panic. flavesce. T.

8. *capensis*, aristis basi pilosis, paniculata, foliis ensiformibus. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spei. T.

9. *spicata*, aristis basi pilosis, racemo spicato secundo. Thunb. prod. 20. Linn. suppl. 111. Hab. ad Cap. b. spei. T.

10. *bicolor*, aristis nudis, seminibus obovatis basi barbatis. Vahl. symbol. p. 24. Cav. ic. 5. p. 42. t. 466. f. 2? Hab. in Brasiliae monte Video.

11. *eminens*, aristis nudis, seminibus tomentosis, fol. striatis. Cav. l. c. t. 467. f. 1. Hab. in Mexico. Panic. laxa, pedalis. C.

12. *virginica*, panic. pauciflora, calyc. majusculis, cor. stipitata stipite barbato. Mich. Flor. 1. p. 55. Hab. in sylv. Virginiae et Carol. superioris. Arista crassa, longissima. Stipa avenacea. Walt. St. barbata. Michaux.

13. *sibirica*, paniculata, aristis nudis cal. duplo longioribus, seminibus lanatis. Lam. ill. 1. p. 158. *Avena sibirica* Lin. Hab. in Sibiria.

14. *Aristella*, aristis nudis rectis cal. subduplo longioribus, germinibus laxatis. Lin. Hab. Mompellii prope Foulon. T.

15. *avenacea*, aristis nudis, calycibus semen aequantibus. Sp. pl. 116. Andropogon folio superiore spathaceo, peduncul. lateralibus oppositis unifloris, aristis flexuosis. Gron. Virg. 138. Hab. in Virginia.

16. *parviflora*, fol. radicalibus rigidulis filiformibus, panicula diffusa, aristis medio capillaribus. Desf. p. 98. t. 29. In Barbariae collibus aridis. T.

179. *AVENA. Cal. 2-valvis, multiflorus; arista dorsali, contorta. (Glumae membranaceae subfulculosae.)*

1. *stipiformis*, panic. calycib. bifloris, aristis semine duplo longioribus, culmo ramoso. Lin. Mant. p. 34. Willd. sp. 1. p. 444. Hab. ad Cap. b. spei. Culmi saepe reclinati, geniculis fuscis. Ramus etiam florifer. L.

2. *pennsylvanica*, panic. attenuata, cal. bifloris, seminib. villosis, aristis calyce duplo longioribus. Lin. Sp. l. 117. Hab. in Pennsylvania. ☉

3. *brevis*, paniculata, calycib. subtrifloris, seminib. brevibus obtusis, apice bilentatis, aristis dorsali scabra. Roth. germ. l. 40. Hab. inter argetes dueatus Bremensis.

4. *alba*, paniculata, calyc. bifloris, corol. pilosis, altera aristata. Vahl. symb. 2. p. 24. Hab. in regno Tunetana. Fol. glauca. Petala villis candidissimis ad basin pilosa. Vahl.

5. *strigosa*, panic. oblonga contracta secunda, flos. cernuis apice biaristatis, dorso arista geniculata. Schreb. spicil. 52. Retz. obs. 1. p. 11. Hab. inter segetes. ☉ An Tristum?

6. *orientalis*, panic. coarctata secunda, spiculis bifloris horizontalibus parall. seminibus laevibus. Schreb. spicil. 52. A. racemosa. Thuil. Paris. p. 59. Hab. in cultis.

7. *sativa*, paniculata, calycib. dispersis, seminibus laevibus altero aristato. Originem habet ex insula Juan Fernandez versus Chili. l. Var. flor. muticis et seminibus nigris. ☉

8. *Forskalei*, paniculata, calycib. trifloris cor. hirsutis aristatis, culmo ramoso, fol. involutis rigidis. Vahl. symbol. 2. p. 25. Avena pennsylvanica. Forsk. 23. n°. 81. Hab. in Aegypto.

9. *nuda*, paniculata, calyc. trifloris receptaculo calycem excedente, petalis dorso aristatis; tertio flos. mutico. l. Sp. pl. 118. Hall. comm. nov. Goett. VI. p. 19. t. 2. et 4. Moris. 8. t. 7. f. 4. Hab. ? Affinis A. sativae, sed semina decorticata decidunt. ☉

10. *fatua*, paniculata, calyc. trifloris, flosculis patulis omnibus aristatis basi que hirtis. Schreber. gram. 109. t. 15. Habit. in agris inter segetes. ☉ Gram. altum. Flos. barba lutesc.

11. *sterilis*, panicul. cal. 5-floris, flos. pilosis; interioribus muticis. Lin. Pet. Gar. t. 38. f. 7. In Europa austr. Var. prioris? ☉

12. *elephantina*, panic. composita, cal. quadrifloris corol. pilosis bifidis aristatis. Thunb. prod. 23. Hab. in Cap. b. spic.

13. *sequitertia*, paniculata, cal. subtrifloris, flos. omnibus aristatis, receptaculis barbatis. L. Mant. 34. Scheuchz. gram. 100. t. 4 f. 1. Hab. passim in agris. Flor. pilosi videntur, sed pili omnes insident pedicellis s. receptaculis intra calycem. L.

14. *elutior*, panic. subcontracta nutante,

glumis bifloris; flos. hermaphrodito submutico; masculo aristato, culm. geniculis alabris, radice repente. Willd. in N. Aet. Soc. Berol. v. 2. Schreb. gram. 1. t. 1. Leers. t. 10 f. 4. Holc. *avenaceus* quorund. In pratis et pomariis frequens. ☉

15. *bulbosa*, panic. verticillata, glumis bifloris polygamis, cernic. pubescentibus, radice notosa bulbosa. Willd. l. c. A. praecatoria. Thuill. Hab. passim in agris et arenosis. An varietas?

16. *sempervirens*, panic. subpatula, cal. trifloris hermaphroditis basi lanatis, fol. rigidis subinvolutis intus striatis. Villars. Delph. 2. p. 140. t. 5. Hab. in montosis apricis Delphinatus. ☉ *striata*, fol. longissimis intus striatis, cal. 2-floro. Lam. ill. Gen. Cresc. cum priore et in H. P. colitur.

17. *pullens*, panic. ramis erectis, cal. bifloris, cor. hirsutis, fol. setaceis. Link. in Bot. Journ. 2. p. 314. Hab. in Lusitania. A. *elatior* minor dicitur.

18. *setacea*, fol. setaceis, vagin. lanuginosis, panic. purpurascens, flos. majusculis, cal. 3-floris, aristis nigris recurvis. Villars. ed. 1. 44. t. 5. A. *subulata*. Lam. ill. 201. A. *aurata*. Allioni. Habitat. in Helvetiae, Italiae et Gall. meridion. alpinis.

19. *odorata*, glum. trifloris acuminatis, flos. diandris, arista inclusa recurva. Hof. germ. ed. 2. p. 58. Holc. odoratus. L. Flor. dan. t. 661. Savastana hirta. Schrank. Flor. bav. r. p. 33. In pratis pascuis montosis Europae australioris.

20. *redolens*, fol. involutis, glum. 3-floris, flos. lateralibus mascul. aristatis margine pilosis. Vahl. symb. bot. 2. p. 102. Sub Holco. Hab. in Terra del Fuego.

21. *palustris*, fol. planis linearibus, panic. confertiuscula, glum. 2-floris flos. glabris; altero mutico. altero ad apicem tenuissime aristato. Michaux, Flor. p. 72. In Gergor. et Carol. paludosis.

22. *pratensis*, panic. erecta, cal. subquinquefloris, recept. pilosis, fol. involutis serrulatis glabris. Smith. brit. p. 141. Leers. tab. g. f. 1. Hab. in pratis et pascuis. Spic. majus. purpureo-argenti. ut in sequente.

23. *pubescens*, panic. erecta subtriplici, cal. subtrifloris, recept. barbatis, fol. planis vaginisque pubescentibus. Smith. l. c. p. 140. Leers. f. 2. In pratis, collibus et fruticetis.

☉ *montana*, fol. caespitosus planis subbiruntis rigidis, panic. erecta ramosa, spicul. pedunculatis subtrifloris. Vill. delph. 2. p. 151. Hab. in pratis montosis. ☉

24. *versicolor*, subspicata, calyc. subquinquefloris, rachi pilosa. Willd. sp. 1. p. 452. Panic. spicata flavescens, spiculis sexfloris distinctis, rachi hirsuta, pedunc. longitudine spicularum. Vill. delph. 2. p. 142. t. 4. f. 5. Avena Schenckeri. Allion. pedem. 225p. Schenck. u. alp. 6. p. 455. t. 19. Hab. in Alpibus.

25. *distichophylla*, panic. subspicata, calyc. trifloris, flosculi basi pilosis, culmo basi ramoso, fol. distichis. Willd. sp. 452. A. culmis basi ramosis, foliis fasciculatis distiche patentibus, paniculae spiculi binatis trifloris. Villars. 1. c. p. 144. t. 4. f. 4. Hab. in alpinis Helvetiae. Delphinatus. T.

26. *pumila*, flor. paniculato - spicatis, spicul. sub 4-floris, glum. dorso ciliatis aristam setiformem aequantibus. Desf. Atl. 1. p. 103. Hab. in Barbariae arenosis.

27. *hispida*, spic. racemosa (simplice) cal. 1-floris piloso-hispidis. Thunb. prodr. p. 22. Willd. sp. 1. p. 451. Av. *capensis*. Burm? Ad Cap. b. Spei. Vag. pilosa.

28. *mollis*, tota mollissime pubescens, panic. racemoso spicata, cal. 2-floris. Michaux, p. 72. Hab. in Canada.

29. *lupulina*, panic. coarctata ovata, cal. 3-4 floris lanceolatis, cor. villosis, gluma exteriori bisubulata, arist. intermedia reflexa, vagin. tomentosa. Lin. suppl. 113. Thunb. prodr. p. 21. Hab. ad Cap. b. spei. Panic. lutca, arete coarctata in figuram Coni lupulini.

30. *purpurea*, glaberrima, panicula coarctata, calyc. quadrifloris, cor. villosis aristatis, culmo decumbente. Lin. supp. 112. Cum priore. Glum. calycinae purpureae. Flor. lanugine alba vestiti.

31. *antarctica*, panic. coarctata, calyc. quadrifloris, cor. bifidis aristatis. Thunb. prod. 22. Hab. in Cap. b. spei.

32. *striata*, panic. coarctata rariflora, glum. 5-flora, flos. subimberbibus, valv. exteriori striata, dorso longe aristata, sem. nudo. Michaux, Flora p. 73. Hab. per iracundis montium a sinu Hudsonis ad Canadum.

33. *glumosa*, panicul. rariflora, gluma calyc. flos. 6 longiore, cor. valv. exteriori ex apice licorni aristata. Michaux. For. p. 72. Avena spicata. Lin. Willd. 1. p. 453. Hab. in Pensylv. et Carol. In floresc. revera panicula nec spica. Arist. basi spiralis. T.

34. *calycina*, spicata, gluma flos. 5 aequantibus. A. *calycina*, fol. planis basi pilosis, panic. simplici spicul. 5-floris longitudine calycis. Vill. delph. 3. p. 148. t. 9. f. 9. Hab. in Delphinatu. Spic. secundae. C

35. *fragilis*, spicata, spica fragili articulata, cal. 4-floris flosculo longioribus. Lin. Mant. p. 126. Schreb. gram. t. 24. f. 3. Hab. in Europa australi. Triticum non male refert. C

36. *bromoides*, subspicata, spiculis pluribus subconvolutis - teretibus 8-floris, aristis divaricatis. Lin. Monti. prodr. 1. 66. In Helvetia, Monspelii, et in Algeriae colibus. T.

180. SORGHUM. Flor. polygami, paniculati. Flos. gemini: altero hermaphrodito sessili, altero postico pedicellato masculino neutro.

Hermaphr. Cal. 2-valvis. Cor. 3-valvis: valv. secunda aristata, tertia nectaria villosa connectens. Cor. in masc. mutica. Sem. majuscula.

1. *vulgare*, panic. coarctata ovali matrescente cernua, seminib. nudis utrinque subcompressis. Holo. Sorghum. Lin. H. Dora. Micg. in Act. Helv. 8. t. 4. f. 3. Hab. in India. Sem. alba, puncto umbilicali nigro.

2. *bicolor*, glumis glabris nigris, seminibus globosis albis aristatis. Lin. Micg. 1. c. p. 129. t. 4. f. 4. Gaertn. de sem. 2. p. 3. Hab. in Persia.

3. *robens*, glumis glabris dilute castaneis semine dimidio brevioribus, seminibus nudis obovatis reptantibus. Gaertn. J. c. Besl. Eyst. Autumn. II. 1. 13. f. 17 In Africa.

4. *saccharatum*, panic. subverticillata patentissima, sem. ellipticis glumis villosis peristematibus tectis. Micg. 1. c. p. 119. t. 4. f. 17 Altiudo humana. Fol. Sacchari, linea longitudinali alba. Lin.

5. *halapense*, panic. sparsa, glumis oblongis glabris, flor. hermaphroditis lanceolatis muticis, foemineo aristato. Lin. Schreb. gram. p. 129. t. 18. Micg. 1. c. f. 2. In Syria et Mauritania. Sem. obl. naga, complanata. Fol. acuminato-setacea.

6. *nitidum*, glumis 1-floris villosis, flor. omnibus muticis, culm. geniculis barbatis. Vahl. symb. p. 112. Sub Holco. Hab. in India.

181. MEGIA. *Stigmata* tria. Flor. polygami paniculati. Cal. multifloris, 2-valvis, brevis, inaequalis: Cor. 2-valvis (mutica). *Appendices* bini, lato-lanceolati,

acuti, plani in utroque flore.
Sem. nudum, maximum.

1. *macrosperma*. Arundinaria *macrosperma*, altissima glabra, fol. lineari-lanceolatis subdistichis. Michaux. Flor. amer. 1. p. 74. Ad ripas flum. Mississippi. Martio florens. Habitus Bambusis aut Nasti. Ab omnibus hucusque cognitis graminibus tum stigon. 3, tum semine grandi sane differt.

182. TRICHODON. Cal. 2-valvis, 1-florus. Cor. 2-valvis, cal. dupli major: interque nudus. Germen lana cinctum.

1. *Karka*. Roth. Catal. 2. p. 2-3. Arundo *karka*. Retz. obs. 4. p. 21. Vulgare in India orientali, ubi ad tecta adhibetur.

Obs. In Saccharo Calyx, in Arundine Corolla, in Trichodon Germen tantummodo lana est cinctum.

183. ARUNDO. Cal. 2-valvis, 1-multiflorus, glaber. Cor. lana (longa) cincta.

1. *Donax*, cal. quinqueflor. panic. diffusa, culmo subrutoso. L. Willd. sp. 1. p. 451. Hab. in Europa australi et Barbaria, Carniolia, collibus calidis. Gram. alium. Var. fol. pictis.

2. *mauritanica*, culmo fruticoso, flor. paniculatis, cal. 1-3-floris, glum. exteriore subaristata. Desf. atl. 1. p. 106. A. micranthus. Lam. Monti prolr. t. d. f. Hab. in Algeria. Priori affinis sed tenerior, hortis sepiendis inservit. h

3. *festucoides*, spicul. compressis subquadrifloris, glumis mucronatis, fol. asperis striatis. Desf. Atl. I. p. 168. t. 74. A. biflora. Lam. A. mauritanica. Poiret. A. tenax. Vahl? Hab. in Barbariae collibus incultis, ubi densissimo caespite crescit. T

4. *Phragmites*, calycib. quinquefloris panicula laxa. Hab. in Europae et Barbariae lacubus, fluviis. T.

5. *bisaria*, culmo erecto folioso, fol. bifariis, panic. coarctata, calycib. trifloris. Retz. Hab. in fossis Indiae orientalis.

6. *benghalensis*, calycib. bifloris, paniculae erectae pedicellis trifloris. Retz. obs. 5. p. 20. Hab. in Bengala. Culmi alti inanes crassi foliosi. R.

7. *sagittalis*, altissima, cal. 2-floro; panic. densa nutante, fol. lanceolatis longissimis serrulato-aculeatis. Saccharum sa-

gitatum. Aublet Guian. 1. p. ... Hab. in Gujana et St-Domingo. Gram. altissimum.

8. *conspicua*, calycib. unifloris, panic. erecto-patente, petali exterioris arista reflexa longissima. Forst. prod. n°. 48. Hab. in Nova Zeelandia.

9. *Epigejos*, calycib. unifloris, panicula erecta, fol. subius glabris lanceolatis. L. Smith. brit. 1. p. 147. Hab. in collibus aridis. T. Flos. minus papposi.

10. *stricta*, cal. 1-floris, cor. lanceolatis glabris: exterioris arista dorsali erecta, panic. coarctata spiciformi, culm. simplici. Timm. in Roth. N. Beytr. 1. p. 118. Hab. prope Mecklenburg. T

11. *Calamagrostis*, cal. unifloris laevibus, cor. lanuginosis, culmo ramoso, fol. linearibus. Smith. l. c. Engl. bot. t. 403. Flor. Dan. t. 280. Hab. in uliginosis.

12. *bicolor*, panic. coarctata elongata, cal. 2-floro: flos. altero sterili, alium subaristatis. Desf. l. c. p. 107. t. 33. Hab. prope la Calle. T

13. *arenaria*, cal. 1-floris cor. longioribus, panic. spicata, flor. erectis muticis, fol. involutis pinguibus. Lin. Smith. brit. 1. p. 148. Flor. dan. t. 917. Moris. sect. 8. t. 4. f. 16. An hujus generis? Phal. *arundinaceae* affinis. Ligula lanceolata, quae in Ph. arundinacea brevissima. In arenosis maritim.

184. SACCHARUM. Flor. omnes hermaphroditi. Cal. lanugine longa involucreatus, 2-valvis. Cor. 1-2-valvis, mutica, ant. aristata. Stam. 1-3.

1. *Teneriffae*, foliis subulatis planis, flor. paniculatis muticis, involucreo piloso nullo, calyce villosissimo. Lin. suppl. p. 106. Willd. sp. 1. p. 320. Hab. in Teneriffa.

2. *japonicum*, racemis fasciculatis, petalis ciliatis: exterioribus aristatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 328. S. polydactylon. Thunb. jap. p. 42. Houttuyn. t. 89. f. 1. Hab. in Japonia.

3. *spontanum*, fol. convolutis, panicula effusa: spicis capillaribus simplicibus, flor. remotis involucreatis geminatis: altero pedunculato. Lin. suppl. 106. Hab. in Malabaricae agnoscis. T. Culmi 1-2-pedales.

4. *officinarium*, flor. paniculatis geminatis: altero sessili, altero pedicellato, cor. 1-valvi mutica. Lin. Hort. cliff. p. 26. Rumph. amb. 5. p. 286. t. 74. f. 1. In utraque India. S. *violaceum*, fusco-violaceum, culm. nodis magis approximatis. Hab. in

India. Ulterius examinandum, et determinandum gramen.

5. *arundinaceum*, paniculae confertae pedunculis divisis, flosc. geminis sessili pedicellatoque, coroll. trivalvibus polygamis. Retz. obs. fasc. 4. p. 14. n°. 34. Habit. prope Tranquebar. Styli nigrescentes. Culmi ad tectorum stratum adhibeantur. Retz.

6. *polystachyon*, flor. paniculatis, spicis filiformibus longissimis fastigiatis, flosc. remotiusculis. Swartz. prod. 21. Ejusl. Flor. p. 127. In insula St. Christophori, Ind. occid. Rachis filiformis.

7. *benghalense*, panic. confertae pedunculis divisis, flosc. geminis sessili pedicellatoque, coroll. bivalvibus hermaphroditis. Retz. obs. fasc. 5. p. 16. Hab. in Bengal. A priori differt cor. bivalvibus, et stigm. fusco-flavescentibus. Retz.

8. *repens*, panic. patula, flosc. geminatis sessilibus aristatis, fol. planis, vaginis pilosis. Willd. p. 322. Hab. in Guinea. Culm. ped. lis simplex. Panic. patens, magnitudine Holci lanati. W.

9. *Ravennae*, panic. laxa rachi lanata, flor. aristatis. Andropogon Ravennae. Lin. Spec. p. 1481. A. farcta alpinum Ravennae. Zanoni. hist. 1. p. 64. t. 24. Moris. 4. 8. t. 8. f. 32. Hab. in Italia.

*** IMPERATA: spic. cylindrica, flor. 2-andris.

10. *cylindricum (europaeum)*, panic. spicata cylindrica sericea, ramulis brevissimis composita, flor. muticis diandris, fol. convolutis. Lamark. encyc. 1. p. 588. t. 40. f. 2. Lagurus cylindricus. Lin. S. Sica. Cav. ic. 3. t. 2. S. Thunbergii. Willd. 1. p. 323? Imperata arundinacea. Cyrill. ic. rar. 2. fasc. 2. t. 11. Hab. Mospellii, in Italia, Africa, Hispania et Barbaria. Habitu a Saccharis recedit. Spica nivea lanata. T.

11. *Koenigii (indum)*, panic. spicata cylindrica, flor. diandris, culmo geniculis barbatis, fol. planis. Retz. obs. 5. p. 16. Hab. in India.

*** ERIANTHUS. Cal. gluma hivalvis, mutica, valvis lineari-oblongis canaliculatis, basi villis densis involucreta. Cor. hivalvis: valva interiore longe aristata. 1-andra,

12. *giganteum*, vaginis lanatis, gluma villis brevioribus, valvis exterioribus villosis. Mich. Flor. Boreas. Amer. p. 55. Anthoxanthum giganteum. Walt. Gram. 6-9-pedale. Hab. in Carolinae humidis.

13. *brevibarbe*, vaginis collo subvillosis,

gluma villis longiore, valvis acutissimis nudis. Michaux. 1. c. In collib. Tenuasce et Carolinae.

185. FEROTIS. Cal. nullus. Cor. bivalvis: valvulae aequales aristatae, lanugine involucreta.

1. *latifolia*, culmo simplici, fol. andralis, geniculis glabris. Willd. Sp. 1. p. 324. Saccharum spicatum. Flor. spicatis, fol. undulatis. Lin. Sp. pl. 79. Thunb. prodr. p. 207. Pluck. alm. 177. t. 199. f. 1. Rheed. mal. 12. t. 62. p. Burmanni, foliis planis lanceol. Willd. 1. c. Burm. ind. tab. 9. f. 3. Hab. in Indiae petrosis, et ad Cap. b. spec. O.

2. *polystachya*, culmo ramoso, fol. planis, geniculis barbatis. Willd. 1. c. Saccharum panicum, floribus spicatis aristatis, culmo ramoso polystachyo. Lam. encyc. 1. p. 588. t. 40. f. 3. Hab. in India.

186. ANDROPOGON. Flor. polygami, geminati: altero hermaphroditico sessili; altero masculino s. rarius neutro pedicellato mutico.

HERMAPH. Cal. 2-valvis, 1-floris. Cor. 3-valvis: valv. secundaria minore aristata, tertia minima minuta. Stam. 1-3. Recept. s. rachis plerumque villosa. Involucr.: villi fasciculus ad basin spicularum, in nonnullis fol. cymbiforme.

1. *filiforme*, spica simplici imbricata 1 seriebus binis florum aristatorum sessilium; binis pedicellatorum muticorum, cal. univalvibus. A. serratum. Retz. obs. bot. 5. p. 27. Cresc. ad oras flum. in Bengal. Arista longa.

2. *crinitum*, spic. solitaria hirsuta, aristis nudis geniculatis longissimis. Thunb. Flor. jap. p. 40. Hab. in Japonia.

3. *caricorum*, spica solitaria imbricata, seminibus hirsutis, aristis nudis contortis. Lin. Rumph. amb. t. 7. f. 2. A. Hab. in India. Gram. 4-5-pedale.

4. *divaricatum*, spica oblonga, flor. lanatis remotis divaricatis, arista flexuosa nuda. L. Reich. syst. 4. p. 299. Lagurus. Gron. Virg. p. 135. In Virginia.

5. *Gryllus*, panic. pedunc. simplicissima trifloris, flosc. hermaphroditico aristato ciliato basi barbato. Lin. Amoen. 4. p. 332. Festuca utriculis lanugine flavescentibus. Benth. pta. Hab. in Europ. australi et in Barbaria.

6. *serratum*, panic. laxa, flosculo altero sessili, altero pedicellato, pedicellis lirsutis. Thunb. jap. 41. Hab. in Japonia.

7. *cotuliferum*, panic. patula villosa, arista tortili nuda, pedicellis incrassatis pateriformibus. Thunb. l. c. Hab. in Japonia.

8. *avenaceum*, fol. asperis, panic. oblonga subaeoarcata, flor. breviusculis villosis; arista contorta Michaux. Flor. 1. p. 58. Hab. in pratis Illinoensib. in America.

9. *saccharoides*, panic. ramis simplicibus, flosc. geminatis: hermaphrodito aristato sessili, altero mutico tabescente, pedicellis rachibusque lanatis. Swartz prodr. p. 26. et ejusd. Flor. 1. p. 205. Hab. in siccis montosis Jamaicae australis. Vag. nodi villosi.

10. *fastigiatum*, panic. spicis solitariis, pedunc. elongatis subfastigiatis, rachi laxata, floscul. utrisque lanatis. Swartz. l. c. p. 207. Crescit cum priore. Glum. calycinae purpurascunt. Sw.

11. *Nardus*, panic. ramis supradecompositis proliferis. Lin. Flor. Zeyl. p. 45. (*sub Laguro*). Rumph. amb. 4. p. 22. t. 6? Hab. in India. Rad. odorata carminativa. Culm. arundinacei, alti. An *Nardus* iudica officinarum? Vid. Lam. encycl. 2. 3?5.

12. *glaucum*, invol. cymbiformi, panic. foliaceis, involuclis calycibusque bifloris, flor. sessilius cal. trivalvibus. Retz. obs. bot. 5. p. 20. Hab. in India. Anthistirii affine.

13. *lanigerum*, fol. convolutis, spicul. lanuginosis vagina cinctis, cal. exteriori nullo, flor. hermaphrodito aristato. Desf. Atl. 2. p. 379. In montib. prope Cassam. Styl. 1. Rachis villosa. D. An hujus generis?

14. *macrourum*, fol. vaginis villosis, panic. lateralibus fasciculato-polynachyis, flor. 1-andris. Michaux. p. 56. In Carolinae humidis.

15. *dissitiflorum*, vagin. glabris, culm. stricto, spicul. lateralibus dissitis, flor. 1-andris. Michaux. Cum priore sed in sylvis. Involucr. etiam cymbiforme.

Obs. Utraque species a Waltero ad *Cinam* relata.

16. *scoparium*, vagin. villosis, panic. elongata stricta, spicul. simplicibus 3-andris, flosc. neutro aristato. Michaux. l. c. Hab. in aridis sylvarum Carolinae.

17. *cymbarium*, panic. sparsa, bracteis cymbiformibus, flor. transversis aristatis ternis. Mart. 30. Hab. in India orientali.

Culmi orgiales, farti. Bractea triflora, cymbiformis.

18. *distachyum*, spicis linis terminalibus, culmo indiviso. Ger. prov. 106. t. 3. f. 2. Jacq. Coll. 1. p. 165-166. Ic. rar. Desf. Atl. 1. p. 377. Schuechn. gram. p. 95. Boec. sicc. 20. t. 11. Hab. in collibus Algeriae, Siciliae, Galliae. Fol. vaginantia Aristae spicae accumbunt, in sicca planta recedunt. Jacq.

19. *Schoenanthus*, panic. spicis conjugatis ovato-oblongis, rachi pubescente, flosc. sessilibus, arista tortuosa. Rumph. amb. 5. t. 72. Ventenat. Descr. 88. Hab. in Indiae maritimis. In hortis colitur ob odorem gratum. Spiculae post anthesin reflexae pendulae.

20. *incurvatum*, spicis filiformibus subdigitatis, flor. geminatis: fominco pedicellato aristato; masc. sessili mutico, cal. 1-valvibus. Retz. obs. bot. 5. p. 21. Hab. in Tranquebaria juxta Eumina. Arista longa torta partim fusca, partim albida. R.

21. *binatum*, spicis geminatis lanatis, cal. valvula altera acuminata; altera truncata 3-dentata, petalo majore aristato. Retz. l. c. Culm. filiformis. Raeheos dente lanugine flava fasciculata. Species ulterius examinanda.

22. *virginicum*, panic. spicis conjugatis pedunculis simplicibus, rachi lanata, flosc. muticis: masculo tabescente. Sloan. hist. 1. p. 110. t. 68. f. 2. Hab. in America.

23. *bicorne*, paniculae spicis conjugatis, pedunculis ramosissimis, rachi lanata, flosc. arista caduca: masculo tabescente. Forsk. aegypt. cent. 6. p. 173. Sloan. 1. list. p. 42. t. 15. Hab. in Brasilia, Jamaica.

24. *hirtum*, panic. spicis conjugatis calycibus lirsutis. L. Roy. Lugd. B. 53. Pluck. alm. 175. t. 92. f. 1. Boec. Mus. 315. t. 8. f. 1. In Lusitania, Sicilia, Smyrnae, et Algeriae collib. Pedunculi hirti, uti et rachis et glumae.

25. *muticum*, spicis digitatis subternis: flosc. alternis sessilibus muticis. Hab. ad Cap. b. spci. Petala contraria calyci, colorata, tenera. Aristae nullae. L.

26. *Ischaemum*, spicis digitatis plurimis, flosc. sessilibus: aristato muticoque, pedicellis lanatis. Hab. in Europae australioris aridis, collibus et arvis.

27. *provinciale*, spicis pluribus, fasciculatis lacribus, floscul. alternis subsessilibus secundis aristatis. Retz. obs. 3. p. 43. An provinciale, spicis digitatis, floscul. alternatim geminis, masculo mutico peduncu-

enlato. Ger. prov. p. 107. t. 4. Hab. in Gal-
lia meridionali.

28. *undulatum*, spic. digitatis plurimis,
flosc. obtusis sessilibus aristatis pedicellatis
muticis, geniculi barbati. Vahl. symb. p.
109. In Ind. orientali. Ligula membranacea
nuda.

29. *pertusum*, spicis digitatis, glumis
valvula pertusa. Lin. Mant. p. 301. Sub
Holco. Hab. in Ind. orient., ad Madagascar.
Petal. exterius in flore masculo non pertu-
sum. Spic. 5. L.

30. *muricatum*, panic. contracta, spic.
atrietis verticillatis, cal. muricatis muticis.
Retz. obs. 3. p. 43. A. squarrosus, Linn.
suppl. 433? In India. Radix ob odorem gra-
tuum usitatissima apud incolas.

31. *ambiguum*, panic. coarctata, ramis
aetacea, cal. 1-floro, cor. imberbi longe
aristata. Mich. For. 1. p. 58. In Carolinae
sabulosis.

Obs. Haec antecedensque species, quo
Phalaris hispida. Thunb. Flor. jap. p. 44.
pertinere videtur, aliud ad genus forte
amandanda.

187. ANTHISTRIA. Flor. polygami
fasciculati in panicula laxa. *Masc.*
4, sessiles, verticillati, *Neutri* 2,
pedicellati, 3-valves, mutici. *Her-
maphr.* centralis, 2-valvis. Arista
tortilis e fundo corollae.

1. *imberbis*, culmo ramoso, glumis im-
berbibus. Desfont. in Journ. de Physiq. vol.
40. p. 292. t. 1. A. *imberbis*; fol. involu-
crisque nudis. Retz. obs. 3. p. 11?

2. *ciliata*, glumis barbato-glandulosis,
vaginis glabris. Desf. l. c. Andropogon *nu-
tans* et 4-valve. Lin. Hab. in Virginia et
Jamaica.

3. *barbata*, glumis vaginisque barbato-
glandulosis. Desf. l. c. t. 2. Gaertn. dessem. 2.
p. 465, t. 175. Androp. *ciliatum* panic. cer-
nua, cal. exteriori multifido ciliato, aris-
tis tortosis pilosis. Thunb. jap. p. 40. In Ind.
Japonia. An prioris varietas?

4. *prostrata*, culmis ramotissimis radi-
cantibus prostratis, fol. laevibus margine
seabris. Androp. *prostratum*. Lin. Mant.
p. 304. Hab. in India orientali.

5. *glauca*, culmo ramoso compresso,
glumis imberbibus, arista inferne villosa
geniculata. Desf. Atlant. 2. p. 380 t. 254.
Supra *paleacea*. Poir. iter. 2. p. 107. Habit.
in collib. arenosis in Barbaria.

6. *gigantea*, culmo altissimo arundina-
ceo, fol. canaliculatis, calycibus pilosissi-
mis, flor. panic. Cav. icon. 5. p. 36. t. 458.
Hab. in ins. Philippica Luxon. Colm. 10-
pedalis. Arista o. An hujus generis?

Obs. Forte nonnullae species ex affini ge-
nere Andropogon huc quoque pertinent.

188. APLUDA. Flor. polygami. *In-
volucr.* 2-phyllum: foliol. 1
majus parum distans. *Cal.* 4-
florus, cartilagineus, b lamella-
tus s. 2-valvis: valv. anteriore
truncata. *Flosc.* inferiores ge-
mini: altero *hermaphrodito*,
altero *femineo*; prioris cor. 1-
valvis, navicularis, striata, 3-
dentata dente intermedio aris-
tata. *Stigm.* crassa hirsuta. *Flosc.*
superiores *masculi*, valv. trun-
catae insistentes (vid. Gaertn. de
Sem. et fruct. plant. 2. p. 466.
t. 175.)

1. *mutica*, foliis lanceolatis, flosc. om-
nibus muticis. Lin. syst. pl. ed. Reich. 4.
p. 311. Culmi longissimi, debiles, glabri,
geniculis tumidis. Panicula angusta, lateri-
bus exiens ex vaginis foliorum minorum
uti Andropogon.

2. *aristata*, foliis lanceolatis, flosculis
masculis muticis: sessili arista terminali.
Amen. acad. 4. p. 303 Scheuch. gram. 118-
119. t. 3. f. 2. Hab. in India.

3. *Zeugites*, fol. ovatis flosc. masculis
muticis: sessili arista terminali. Amoen.
acad. 6. p. 412. Zeugites arundinaceus ramo-
sus minor rufescens, panicula sparsa termi-
nali. Brown. jam. 341. t. 4. f. 3. Hab. in
Jamaica.

189. ISCHEMUM. Flor. polygami.
Hermaphrod. *Cal.* 2-florus, 2-
valvis: valv. subaequalibus car-
tilagineis: exteriore subovata
gibba apice bifida. *Cor.* minor
2-valvis: valv. exteriore ven-
triciosa, mutica aut aristata,
bifida. *Neetar.* foliolis 2, spa-
thulatis, truncato-emarginatis.
Masc. Flor. idem sed. mutici.
Flor. spicati, geminati. *Schreb.*

1. *muticum*, floribus muticis. Lin. Retz.
obs. bot. 6. p. 34. Ital. in India. Fol. in hac
et sequentib. lanceolata. \overline{L}

2. *imberbe*, floscul. nudis, cal. sessilis valvula exteriori utrinque binodulosa, corollaeque arista tortili elongata. Retz. l. c. p. 35. J. aristatum. Lin. Hab. in China. h

3. *barbatum*, cal. bifloris, basi barbatis, margineque ciliatis; sessilis margine utrinque binodulosa, arista torta geniculata. Retz. l. c. Hab. in Java. Spic. racheos dentes ciliato-barbati.

4. *ciliare*, culm. decumbente, cal. bifloris, pellicellis ciliatis, flore utroque foemineo, arista torta geniculata. Retz. l. c. p. 36. Hab. in China. Culm. genicula pilosa.

190. MANISURIS. Flor. polygami spicati. *Hermaphr. Cal.* 1-florus, 2-valvis: valv. inaequales, variae. *Cor.* 2-valvis, inclusa. Masculi et neutri *Cal.* regulatis s. uniformis.

1. *granularis*, spicis pluribus, flor. hermaphroditis valvula exteriori orbiculari punctato-calloso. Cencilis granularia. Lin. Swartz. Flor. 1. p. 186. Gaertn. de Sem. 2. p. 468. t. 175. Roxb. Corom. 2. fasc. 1. p. 11. t. 118. Panicum clandestinum Lin.? Hab. in siccis Jamaicae et in Indiae fruticetis.

2. *Myurus*, spicis solitariis, flor. hermaphr. valv. late marginatae laevi. Lin. Mant. p. 100. Roxb. l. c. t. 117. In Indiae siccis et arenosis. Valv. apice lateribusque emarginatae.

191. POMMEREULLA. *Cal.* 2-valvis, subdistans, 4-florus, (Involucr. Lin.) *Cor.* 2-valvis: valv. altera major, 5-dentata: dente intermedio aristato. *Styl.* 2. Spica unilateralis? (Ex Roxburgh Plant. coromand. vol. 2. Fasc. 2. t. 131.)

1. *Cornucopiae*. Lin. suppl. p. 105. Willd. sp. 1. p. 319. Hab. in Indiae fruticetis et locis incolis. Stipa repens. Culm. brevis foliosus. Spic. vaginae fol. partim inclusa. Linnaeus (filius) perperam hoc genus ad 2-andriam 1-gyniam retulit.

192. ROTTBOELLA. Flor. polygami. *Rachis* articulata teretiuscula, in pluribus filiformis. *Cal.* ovato-lanceolatus planus uni-vel bivalvis. *Cor.* minor, 2-valvis. *Flosc.* alterni in rachi flexuosa.

1. *incurvata*, spica tereti subulata in-

curvata, gluma bipartita subulata adpressa. Willd. sp. 1. p. 461. Lin. suppl. 114. Flor. Dan. t. 938. Cav. ic. t. 217. Aegilops incurvata. Lin. Moris. hist. 3. s. 8. t. 2. f. 8. Hab. in Europae maritimis.

2. *filiformis*, spica recta subcompressa subulata, gluma calycina ensiformi adpressa, bipartita obtusa. Roth. Catal. bot. 1. p. 21. Ejusd. N. Beitr. p. 120. Barr. ic. 1164. t. 117. f. 1. Hab. in Europa australi. T

3. *biflora*, spic. tereti subulata erecta, cal. 2-floris 2-valvibus, glumis obtusis adpressis, margine scariosis. Roth. N. Bot. Beitr. 1. p. 121. Hab. in Hungaria. Ligula longa. C

4. *monandra*, spic. tereti subulata erecta, glum. calycina 1-valvi integra, flosc. aristatis. Roth. l. c. floribus disjunctis. Cav. ic. n.º. 41. t. 39. f. 1. Hab. circa Madritum. C

5. *setacea*, spica setacea secunda subincurva. Roxb. Corom. 2. p. 18. t. 132. Nardus indica. Lin. In Indiae vallibus. Cor. hirsuta.

6. *fasciculata*, spic. axillaribus aggregatis arcuatis, flor. 4-fariam dispositis. Desf. Atl. 1. p. 110. t. 36. Cresc. ad laeuum ripae prope la Calle in Barbar. T

7. *repens*, spica tereti subulata, gluma calycina univalvi indivisa. Forst. prod. n.º. 151. Hab. in insulis maris pacifici.

8. *laevis*, pedunc. longissimis, spica flosculis binatis lateralibus, calycibus ovatis impunctatis laevibus. Retz. obs. 3. p. 11. Hab. in Tranquebaria.

9. *Thomaea*, minuta, spica simplici subulata, fol. pilosis brevior, culmo vaginis tecto. Willd. 1. p. 465. (R. pilosa). Roxb. Coromand. 2. t. 132. Hab. in Malabar et Tranquebaria.

10. *compressa*, spica compressa subulata, gluma calycina lanceolata plana indivisa. Lin. suppl. 114. Retz. obs. 3. p. 12. R. *Tripsacoides*. Lam. ill. p. 205. t. 48. f. 1. B? Hab. in Indiis.

11. *hirsuta*, spica subulata hirsuta, flosc. hermaphroditis patentibus, sterilibus pedicellatis adpressis. Vahl. symb. 1. p. 11. Hab. in Aegypto. T

12. *Coelorachis*, spica tereti unilateralis, flosc. geminis, altero pedicellato, calyce bivalvi. Forst. prod. n.º. 49. Hab. in insula Tanna. An sequentis varietas?

13. *dimidiata*, culm. decumbentibus, spica dimidiata compressa lineari, latera exteriori aggregato-flosculosa, interiori

laevi nudo. Lin. suppl. 114. Mich. 1. p. 60. Hab. in utriusque Indiae arenosis et maritim.

14. *exaltata*, spica tereti-filiformi unidigne fasciculosa, glumis ovatis obtusis, vaginis punctato-hirsutis. Lin. suppl. 114. Hab. in India. Gramen alium culmo facto. Vaginae sulcatae punctatae, punctis elevatis, seta terminatis.

15. *corymbosa*, spicis aggregatis lateralibus filiformibus, flos. bifloris patentibus, fol. basi ciliatis. Lin. suppl. 114. R. punctata. Retz. obs. 3. p. 12. Aegilops exaltata. Lin. Hab. in Malabar ad fossa agrorum.

16. *muricata*, spicis teretibus pluribus longe pedunculatis, cal. ciliato-aculeatis, neutris bifidis. Retz. obs. 3. p. 12. Hab. in India orientali.

17. *sanguinea*, panic. spicis aristatis alternis simplicibus pedunculatis, bract. laterali ciliata. Retz. l. c. p. 25. Habit. in China.

193. *COLLADEA*. Flor. spicati, rachis flexuosa. Cal. 2-4-partitus: laciniis subovatis basi sinu (dentate) distinctis, 2-floris. Cor. 2-valvis, cal. brevior, mutica aut aristata.

1. *distachya*, aristata. Colla dea culm. ramoso, fol. cordatis lanceolatis acutissimis; vaginis cymbaeformibus. Cav. ic. 5. p. 37. t. 460. Hab. in humidis insulae Mindanae in America. Arista tortilis prope germin inserta. C.

2. *monostachya*, mutica. Tripsacum hermaphroditum. Lin. Dec. pl. t. 9. Hab. in Jamaica.

Obs. A Tripsaco tam ob habitum, quam ob flum. calycinas partitas omnino diversa.

194. *AEGILOPS*. Cal. subtriflorus, coriaceus latissimus multiaristatus, aristis rigidis divergentibus. Cor. 2-valvis: valva exteriore ovata, aristis 2-3 terminata. Flor. polygami et hermaphroditi spicati.

1. *ovata*, spica brevi ovata, cal. omnibus 3-4-aristatis. Lin. Gaertn. 2. t. 175. Moris. s. 8. t. 7. f. 10. Hab. in Europa meridionali et in Barbaria. Glauca. Rach. compressa. ©

β? *geniculata*, culm. elongato, geniculato, fol. villosis, glumis 4-aristatis. Roth. Beobacht. p. 45.

2. *caudata*, spica elongata, cal. muticis: terminali aristis a longissimis recedentibus. Lam. enc. 2. p. 346. Cal. omnibus 2-aristatis. Lin. Hab. in Candia.

3. *truncatilis*, spic. elongata, cal. in ceteris 2-aristatis. Schreb. gram. t. 10. f. 1. Crescit in locis aridis cum priore. Aristae 2-3, longissimae. Cal. villosus. ©

4. *squarrosa*, subincratis: spica subulata aristis longiore. Schreb. gram. 2. t. 27. f. 4. Borb. cent. 1. t. 50. f. 3. Habit. in Oriente et prope Mascari. Cal. 1-3 aristatus: aristae breves. Rachis nodosa. T

195. *ELYMUS*. Flor. spicati. Cal. involucriformis 4-phyllus lateralibus, bivalvis, aggregato-ternus multiflorus.

1. *arenarius*, spica erecta arcta, calycibus tomentosis flosculis longioribus, fol. pungentibus. Willd. Sp. 1. 467. Habit. ad Europae littora marina, inque arena mobili. Fol. arundinacea glauca involuto-mucronata. Ligula exigua. T

2. *geniculatus*, spica inflexo-pendula laxa, cal. setaceis patulis, spiculis longioribus, fol. mucronato-pungentibus. Smith. brit. 1. p. 151. Amoen. Acad. 7. t. 2. f. 5. With. arrang. 1. t. 2. f. 26. Hab. in Angliae littorib. maritimis. Priore alior. T

3. *giganteus*, spica erecta arcta, spiculis senis sexfloris villosis, cal. subulatis glabris, spiculis longioribus. Vahl. symbol. 6. p. 10. E. racemosus. Lam. Hab. in Graecia. Spica stricta, viridipallens.

4. *sibiricus*, spica pendula arcta, spiculis binatis calyce longioribus. Schreb. gram. t. 21. f. 1. Om. l. sibir. t. p. 323. t. 28. Hab. in Siberia. Var. Spic. 3. T

5. *tener*, spica pendula, flosculis geminis. Lin. suppl. 114. Hab. in Siberia. Culmus bipolialis geniculis rubris. Aristas saepe flexuosas.

6. *canadensis*, spica nutante patula, spiculis inferioribus ternatis: superioribus binatis. Moris. s. 8. t. 10. f. 2. Hab. in Canada. β? Elymus philadelphicus? L.

7. *virginicus*, spica erecta, spiculis trifloris, involucri striato. Sp. pl. 123. Habit. in Virginia. Spic. basi fol. vagina inclusa?

8. *striatus*, spica erecta, spiculis bifloris pubescentibus, involucri striato brevioribus. Willd. sp. t. p. 470. Hab. in America bor.

9. *europaeus*, spica erecta: spiculis bifloris aristatis, involucri laevi aequalibus.

Hordeum cylindricum. Murr. prodr. p. 43. *H. sylvaticum*. Huds. Involucr. G-phyllosum ut in *Hordeis*. Hab. in sylvis umbrosis.

1. *Caput Medusae*, spiculis bifloris, involucri setacis pat. nissimis. Schreb. gram. t. 24. f. 2. Hab. in Lusitania et Hispaniae maritimis.

11. *Hystrix*, spica erecta, spiculis patentibus involucri destitutis. Lin. In Oriente. *Asperella Hystrix*. Humbold.

106. HORDEUM. Flor. spicati.

Cal. 1-2-florus hexaphyllus involucriformis: folialis per paria digestis, setaceis. *Flores*. terni intermedio sessili, lateralibus stipitatis (sepius sterilibus). *Cor.* stipitata, 2-valvis acuta: exteriore aristata.

1. *vulgare*, (*sativum*) flore. omnibus hermaphroditis aristatis: ordinibus duobus erectioribus. Lin. Willd. spec. 1. p. 472. *β. caeruleum*, seminibus decoratis. Habitu, circa Margam in Sicilia. L. Var. sem. nigris. ☉

2. *hexastichon*, flore. omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus exsiccatis posit. Viborg. cereal. 30. t. 2. ☉

3. *distichon*, flore. lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus imbricatis. Viborg. t. 3. Moris. s. 8. t. 6. f. 1. Hab. ad Samaram, Tartariae fluvium. ☉

4. *Zoocriton*, flore. lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus patentibus corticatis. Viborg. t. 4. ☉

5. *strictum*, floscul. lateralib. masculis muticis, involucri aristatis scabris glabris, radice bulbosa. Schousb. Maroc. Desf. atl. 1. p. 113. t. 37. Cresc. in camp. aridis regni tunetani. Sequenti valde affine. ☉

6. *bulbosum*, flore. omnibus fertilibus ternis aristatis, involucri setacis basi ciliatis. Amoen. acal. 4. p. 301. Bar. in. 172. f. 2. Moris. s. 8. t. 6. f. 7. Hab. in Italia, Oriente. ☉

7. *maritimum*, flore. lateralibus masculis aristatis, involucri intermedii ciliatis lanceolatis. Flor. dan. t. 69. Ubique vulgare. ☉

8. *pratense*, flore. lateralib. masculis brevius aristatis dorso hirsutis. Involucr. scabris hirsutis. Roth. N. bot. Beyr. 1. p. 124. Smith. brit. 156. *H. maritimum*. Roth. germ. t. 1. p. 51. Engl. bot. t. 409. *Hord. nodosum* Lin. Hab. in pratis et pascuis.

9. *secalinum*, flore. lateralibus neutris brevius aristatis; dorso glabris, involucri setacis scabris. Roth. l. c. 125. Willd. spec. 1. p. 475. Gramen spicatum secalinum minus. Scheuchz. gram. 17. n. 3. Monti gram. p. 60 f. 66. Hab. in Europae pratis, minus frequens. +

10. *maritimum*, flore. lateralibus masculis, brevius aristatis, dorso glabris, floscul. lateralium foliolo interiore semi-ovato. Roth. Beyr. p. 127. Smith. l. c. Flor. dan. t. 610. *H. maritimum*, flosculis omnibus aristatis, lateralibus masculis, involucri scabris, interioribus masculorum semilanceolatis. Vahl. symbol. 3. p. 25. Cresc. in pascuis et arenosis maritimis. ☉

11. *rigidum*, flosculis lateralibus spuris aristatis, involucri lateralis foliolo altero margine exteriori alato. Roth. Catal. p. 24. Monti gram. f. 93. Hab. in Ducatu Oldenburgensi. Involucri intermedia scabra nec ciliata. R

12. *Hystrix*, floscul. lateralibus masculis brevius aristatis dorso glabris, involucri omnibus setacis scabris rigidis patentibus, spica ovata subcompressa. Roth. N. Beyr. Ejusd. Cat. 1. p. 25. In Hispania. ☉

13. *jubatum*, aristis involucrique setacis longissimis. Sp. pl. 126. *Elymus crinitus*. Schreb. gram. 15. t. 24. f. 3. Buxb. cent. 1. p. 33. t. 52. f. 1. Hab. Smyrnae. ☉

107. SECALE. *Cal.* oppositus, 2-valvis, aut multiflorus, solitarius: glum. linearilanceolatis, laevib. aut utrinque canaliculatis.

1. *cereale*, glumarum ciliis scabris, squamis calycinis angustis minoribus. Hab. in Creta. Spic. passim ramosa. ☉

2. *villosum*, glumarum ciliis villosis, squamis calycinis cuneiformibus. L. Willd. sp. 1. p. 471. Buxb. cent. 5. p. 21. t. 47. Hab. in Europa australi, et in Oriente. ☉

3. *orientale*, glumis hirsutis, squamis calycinis subulatis. Willd. in N. Act. Ber. 2. t. 4. f. 3. Hab. ad Archipelagum.

4. *oreticum*, glumis extrorsum ciliatis. Sp. pl. 125. Hab. in Creta.

5. *pungens*, spica subovata glumis subpaulis scabris pungentibus. Hab. An *Triticum quarrosus*, spica ovali squarrosa, spiculis distinctis, calycibus trifloris patentissimis, valvul. calycinis corollinisque linearilanceolatis scabris rigidis. Roth. N. Bot. Beyr. 1. p. 128-129. (Hab. in Aegypto). Verum in meo gramine cal. 4-6-florus est: s. descriptio Rothii ceterum

convenit. Glumae sub lente ad marginem aequalitae.

6. *prostratum*, spicula unica ovata compressa bifaria, glumis glabris aristato-mucronatis. Triticum. Lin. suppl. 114. Willd. spec. 1. p. 480. Jacq. hort. 3. p. 540. t. 19. f. 4. Agropogon triticeum. Gaertn. Hab. in desertis Caspiae. Calyceis forma cum prioribus convenit, hinc hujus potius loci.

7. *pumilum*, spica ovata, glumis subaristatis: calyceis bisulcatis. Lin. suppl. p. 115. sub Tritico. Hab. in Sibiria. Auctis distinctum?

198. **TRITICUM**. Cal. bivalvis, solitarius, multiflorus. Flos obtusiusculus, glumis muticis aut interrupte aristatis. Spicula breviuscula e latere plano rachi approximatae.

1. *sativum*, a *aestivum*. calyce quadrifloro ventricosus glabro imbricato aristato. Lin. Willd. sp. 1. p. 476. Hab. apud Basilios in campis. ☉

2. *hybernium*, calyc. quadrifloro ventricosus levi imbricato submutico. Lin. Blakw. t. 40. f. 1. 2. 3. ☉

Obs. Locus natalis genuinus hujus et specierum 3-5 sequentium adhuc incertus est.

3. *durum*, culm. sareto, glumis pubescentibus aristatis, semirigibus duris. Desf. atl. 1. p. 114. T. *sativum*. Lam. enc. 2. p. 557. Hab. in Barbaria, ubi frequens colitur praestans hoc gramen.

4. *compositum*, spica composita, spiculis confertis aristatis. Lin. suppl. 115. Moris. hist. 3. p. 175. s. 8. t. 1. f. 7. Hab. in Aegypto. Seritur Neapoli. ☉

5. *polonicum*, calyc. bifloro nudo, flos. longissime aristatis, rachos dentibus barbatis. Moris. s. 8. t. 1. f. 8.

6. *turgidum*, calyc. quadrifloro ventricosus villosus imbricato obtuso. Syst. Veg. 108. Moris. l. c. t. 1. f. 14. Hab. Etiam varietas prioris videtur.

7. *Spelta*, calyc. quadrifloro truncato, flosculis aristatis hermaphroditis: intermedio neutro. T. flor. quaternis, duobus secundis glumis adherentibus. Hall. helv. n°. 1424. Moris. t. 6. f. 1. ☉

8. *monocotum*, calyc. subrifloro: primo aristato: intermedio sterili. T. spica disticha, flor. ternis, sterili unico, glumis tridentatis, florali aristato. Hall. helv. n°. 1425. Moris. t. 6. f. 2. ☉

9. *hispanicum*, calyc. sexfloro flosculis secundis apice aristatis. Mant. 325. (T. *maritimum*). Willd. sp. 1. p. 475. Hab. in Hispania. ☉

10. *juncum*, cal. truncatis 5-floris muticis, fol. involuto-mucronato-pungentibus. Smith. brit. l. p. 157. Roth. N. bot. Beyr. p. 157. Schousb. maroc. pag. 52. Hab. in arcosis maritimis. Rad. repens articulata. Fol. superne pubescentia. Schousb. T.

11. *pungens*, glaucum, radice repente. fol. demum tubulato-convolutis pungentibus, glum. acuminatis muticis: carina submucronata. Triticum *juncum* Auct. T. repens. Y Smith. l. c. p. 159.

12. *repens*, cal. subulatis multinerviis 5-floris, flos. acuminatis, fol. planis, radice repente nodosa. Smith. l. c. Willd. 1. p. 481. In cultis, ad saepes. Var. Spicul. aristatis.

13. *glaucum*, totum amoene glaucum, fol. planis, spiculis majoribus aristatis aut muticis. Lam. ill. 1. p. Cresc. cum antecedente.

14. *multiflorum*, altum totum viride, spicul. 8-floris subaristatis. In sylva Meudon observata a cl. Richard. Spic. fere spithamea. Fol. lata.

15. *capillare*, spicul. subrifloris, basi in pedicello flosculoso-villosis, arsis capillaribus glumis duplo fere longioribus. Passim in pratis procoit. Tener. sequenti affinis.

16. *caninum*, cal. acuminatis: subquinq. nerviis 4-floris, floscul. aristatis, fol. planis, radice fibrosa. Smith. p. 159. *Elymus caninus*, spica nutante arcta, spicul. rectis involuto desutatis: infimis geminis. Lin. Willd. spec. 1. p. 469. Moris. s. 8. t. 1. f. 2. Hab. ad saepes, in sylvaticis.

17. *vaginans*, fol. vagina subventricosa spicam basi includente, spicul. 3-floris aristatis. Ex Americ. meridionali hoc gramen habeo.

18. *distichum*, calyc. quadrifloro glabro mutico, flor. distichis, fol. filiformibus. Thunb. prod. 23. Hab. ad Cap. h. spei.

19. *cristatum*, spicul. ovatis 6-8-floris muticis in spicam subtetragonam imbricatis. An *Fromus cristatus*? L. Willd. Sp. 1. p. 439.

20. *fragile*, spica tetragona, cal. 6-floris muticis subacutis, cor. obtusissimis, fol. radicalib. planis tomentosis, culmic. demum involutis, caule fragili. Roth. N. bot. Beyr. p. 138. Pluckn. alm. t. 33. f. 4. Hab. Vagin. infimacdensissime tomentosae. R. T.

13. *nigricans*, spica 4-gona, glumis margine villosis (nigrescentibus), aristis longis. In Normandiac maritimis observavit cl. Bory. Secale aut Hordeum refert, spica subtergula.

14. *caudatum*, spica parva, aristis longissimis 4-plo brevior. Schuechz. gram. 1. f. 4. ic. optima. Miit Dn. Schleicher, qui speciem hanc distinctam in Helvetia invenit, praeter Schuechzerum a nemine descriptam. Glum. cal. brevius aristatae, corollinae vero aristae 2. unc. fere longae sunt.

15. *maritimum*, humile, ealycib. multifloris, floscul. mucronatis, spica basi ramosa L. Vahl. sym. ol. 2. p. 96. Festuca lanecolata. Forsk. descr. 22. Boeck. mus. 2. p. 133. p. 45. Hab. in Galliae et Angliae maritimis. Fol. longitudine culmi vaginis purpureascentibus. L.

16. *lolioides*, spica elongata attenuata, apicul. ovatis distantibus; inferioribus pedunculatis. Lectum in cinctis prope Mans. Spica ultra spitham. longa, basi subcomposita. Color viridis.

17. *tenellum*, calyce subquadrifloro, flosculis muticis, acutis, fol. setaceis. Sp. pl. 127. Hab. in Helvetia, Gallia.

199. *LOLIUM*. Cal. 1-phyllus, fixus, multiflorus. Spica simplex.

1. *perenne*, spica mutica, spiculis compressis multifloris. Leers. herb. t. 12. f. 1. Ubique vulgare.

2. *cristatum*, spiculis in capitulum distiche aggregatis; Scheuchz. Agrost? 2. Passim eum prior.

3. *ramosum*, spica ramosa. Leers. l. c.

4. *tenue*, spica mutica tereti; spiculis trifloris. L. Sp. pl. 123. Hab. in Gallia, Germania et Helvetia. Var. prioris?

5. *temulentum*, spica aristata, spiculis compressis subscafloris cal. aequantibus. Lam. ill. p. 206. t. 48. f. 2. Culm. superno scabro. Sm. Flor. brit. 1. p. 150. Leers. t. 12. f. 2. H. h. in Europae agris. Cal. passim 2-glumis. ©

6. *multiflorum*, spica breviter aristata, spiculis compressis subocto-secundifloris, cal. triplo longioribus. Lam. l. c. Hab. passim inter segetes.

7. *compositum*, altissimum, racemo longissimo inferne composito, spicul. numerosis 16-20-floris subaristatis. Thuill. Paris. p. 62. In agris passim.

8. *arvense*, spica submutica; spicul. longitudine calycis, flore, ellipticis, culm.

glaberrimo. Smith. Flor. brit. 1. p. 150. Morison, s. 8. t. 2. f. 1. Hab. in Anglia et Scotiae et Germaniae agris. L. *temulento* minus et totum glabrum. Huc. L. *remotum*. Schrank. An diversum a L. *multifloro*?

9. *maximum*, calyce longitudine spiculae multiflorae compressae, flosculis summis aristatis. Willd. sp. 1. p. 462. Hab. in Jansica au varietas prioris?

200. *THAREA*. Flor. laterales, polygami; inferiores hermaphroditi. *Rachis* membranacea demum involuta, decidua. Cal. 2-florus, 2-valvis. Cor. 2-valvis, ovata, mutica.

1. *sarmentosa*. Culm. repens. Fol. disticha, tomentosa. Hab. in Madagascar arenos., ubi speculare hocce gramen ob spiculam, quae demum uti in *Arach. hypogaea* terram intrat, cum numerosis rarioribus aliis plantis observatum a Dom. Aubert du Petit-Thouars necumque eum character generico benevole communicatum.

201. *SPINIFEX*. Flor. polygami. Cal. biflorus, 2-valvis; valvulis rachi parallelis. Cor. 2-valvis, mutica.

1. *squarrosus*. Frutescens, fol. spinoscentibus. Moris. s. 8. t. 8. f. 11. Hab. in India. Spica fere uti in *Triticum*.

TRIGYNIA.

202. *ERIOCAULON*. Cal. communis; capitulum imbricatum. Petala 3-6 aequalia. Stamina supra germen. Caps. 3-locularis.

1. *triangulare*, culmo triangulari, foliis ensiformibus, capitulo ovato. Willd. Sp. pl. p. 485. Brey. cent. t. 50. Moris. hist. 3. p. 253. s. 8. t. 16. f. 17. Hab. in Brasilia.

2. *quinquangulare*, culmo quinquangulati, fol. ensiformibus, calyce universaliter pentaphyllo. Pluck. Alm. 366. t. 221. f. 7. Hab. in India. h

3. *sexangulare*, culmo sexangulari, fol. ensiformibus. Burm. ind. t. 9. f. 4. Hab. in India.

4. *setaceum*, culmo sexangulari, fol. setaceis. Rheed. mal. 12. t. 63. Hab. in India.

5. *decangulare*, culmo decangulari, fol. ensiformibus. Pluck. amsh. t. 409. f. 5. Hab. in Americae septentrionalis paludibus.

6. *pubescens*, scapo subvillosa, fol. ensiformibus pubescentibus maximis, capitulo plano tomentoso. Lam. ill. gen. 1. p. 213. Hab. in India, Madagascar.

β? *compressum*, enlm. compresso tenuiter striato, cal. argenteo, capitulo superne plano tomentoso. Lam. l. c. Hab. in Carolina.

7. *fasciculatum*, surculo brevi folioso, fol. patentibus, scapis plurimis fasciculatis pilosis. Lam. ill. p. 214. t. 50. Hab. in Guiana.

8. *repens*, caule decumbente folioso, fol. ensiformibus recurvatis, scapis axillaribus solitariis. Willd. l. c. Lamark. encyc. 3. p. 264. t. 50. f. 2. Hab. in insula Bourboniae.

9. *umbellatum*, caule nudo umbellifero, involucri polyphylo, radiis inaequalibus longissimis. Lam. l. c. t. 50. f. 4. Hab. in Guiana.

203. MONTIA. Cal. 2-phyllus. Cor. 1-petala, irregularis. Caps. 1-locularis, 3-valvis.

1. *fontana*. α. *repens*, caule repente, fol. ovatis. β. *erecta*, caule erecto fol. lanceolatis. Hab. ad scaturigines. ☉

204. PROSERPINACA. Cal. 3-partitus, superus. Cor. o. Nux tri-locularis.

1. *palustris*, α. fol. lineari-lanceolatis limis inciso-serratis. β. fol. omnibus pectinato-pinnatifidis. Michaux, Flor. p. 26. Truxis, Mitch. Hab. in Virginiae paludibus.

205. HOLOSTEUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. unilocularis, subcylindracea, apice dehiscent.

1. *cordatum*, foliis subcordatis. Lin. Willd. Sp. 1. p. 469. Herm. parad. ss. t. 15. Hab. in Jamaica et Surinamo.

2. *diandrum*, caulibus procumbentibus rigidiorebus, fol. subrotundis, flor. diandris. Swartz, prod. 27.

3. *succulentum*, fol. ellipticis carnosiss. Amon. acal. 3. p. 21. Hab. in Novoboraco.

4. *hirsutum*, foliis orbiculatis hirsutis. Amon. acal. 3. p. 21. Hab. in Malabar.

5. *umbellatum*, flor. umbellatis, petalis dentatis. Flor. dan. t. 1204. Hab. in arvis, graminosis. Vere. Tota glauca.

206. KOENIGIA. Cal. 3-phyllus. Cor. nulla. Sem. 1. ovatum, nudum.

1. *islandica*. Flor. dan. t. 418. Lam. ill. gen. 1. 51. Hab. in Islandia. Facie Polycarpi. Caulis subsucculentus. Stipulae vaginales intrafoliaceae. Fol. quaterna. L.

207. POLYCARPON. Cal. 5-phyllus. Petala 5, minima, ovata. Caps. ovata, 1-locularis, 3-valvis.

1. *tetraphyllum*, caule ramoso prostrato, foliis quaternis. Holosteum tetraphyllum. Thunb. prod. 24. Hab. in Italia, Hispaniae, Istriae, Gal. Narbonensis vinctis. ☉

* *diphyllum*, fol. oppositis orbiculatis. Cavan. Diss. 2. p. 40. t. 151. f. 1. Hab. prope oppidum Puig, in Hispania. An praecedens var?

2? *stipulifidum*, erectum ramosissimum ramis setaceis, fol. spatulatis flor. terminalibus fasciculatis, stipulis setaceo-multifidis. *Stipulicida* setacea. Michaux, Flor. 1. p. 26. Hab. in Carolinae aridis sabulosis. Monogynum et diandrum.

Obs. An potius distinctum genus? cui adnumeranda Holosteum *cordatum* L. et *diandrum* Swartz? quamvis capsula ovata 3-valvi conveniunt cum Polycarpi.

208. DONATIA. Cal. 3-phyllus. Cor. polypetala. Caps. 3-locular. infera.

1. *fascicularis*, Forst. char. gen. 5. t. 5. Willd. sp. 1. p. 491. Polycarpon *magellanicum*. Lin. suppl. 115. Hab. in Terra del Fuego, in rupestribus humidis, caespites densissimas formans.

209. MOLLUGO. Cal. 3-phyllus. Cor. o. Caps. 3-locularis, trivalvis.

1. *oppositifolia*, foliis oppositis lanceolatis, ramis alternis, pedunculis lateralibus confertis unilobis. Pluck. alm. 21. t. 75. f. 6. Hab. in Zeylona.

2. *stricta*, fol. subquaternis lanceolatis, flor. paniculatis nutantibus, caule erecto angulato. Pluck. phyt. 21. t. 256. f. 2. Burm. zeyl. 31. t. 5. f. 1. Hab. in Africa. ☉

3. *hirta*, fol. quaternis obovatis villosis, caule decumbente. Willd. l. c. Thunb. pr. 24. Hab. ad Cap. b. spec. ☉

4. *pentaphylla*, fol. quinis obovatis aequalibus, florib. paniculatis. In Zeylona.

5. *verticillata*, fol. verticillatis cuneiformibus acutis, caule subdiviso decumbente, pedunc. unifloris. Pluck. mant. 9. t. 332. f. 5. Ehret. pict. t. 6. f. 3. Hab. in Virginia, in cultis. ☉

6. *radiata*, caulib. procumbentibus radiatis, fol. obovatis acuminatis. Flor. peruv. t. p. 48. Hab. in inundatis locis Conceptionis, Chile. Caul. plures.

210. MINUARTIA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 1-locularis, 3-valvis. Semina nonnulla.

1. *dichotoma*, floribus confertis dichotomis. Loefl. it. 121. t. 1. f. 5. Willd. sp. 1. p. 492. Hab. in Hispania. ☉

2. *campestris*, flor. terminalibus alternis bractea longioribus. Act. Storch. 1758. t. 1. f. 3. Hab. in Hispaniae collibus planis. ☉

3. *montana*, flor. lateralibus alternis bractea brevioribus. Loefl. it. 122. t. 1. f. 4. Hab. cum priore.

211. QUERIA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 1-locularis. Sem. 1.

1. *hispanica*, floribus confertis. Willd. p. 493. Q. bracteis patulis hamatis. Loefl. it. 48. Hab. in Hispania.

2. *canadensis*, flor. solitariis, caule dichotomo. Hab. in Canada, Virginia. Folia utrinque punctis fuscis. L. T.

3. *trichotoma*, flor. racemosis, caule trichotomo. Thunb. Act. Soc. Lio. Lood. 2.

p. 529. Rubia. Thunb. jap. p. 357. n°. 44. Hab. in Japonia. An hujus generis?

212. LECHEA. Cal. 3-phyllus. Petala 3, linearia. Caps. 3-locularis, 3-valvis. valvulis totidem interioribus. Sem. 1.

1. *major, villosa*, fol. ovato-lanceolatis, flor. lateralibus vagis (fasciculatis) Amoen. acad. 3. p. 11. t. 1. f. 4. Lam. Ill. t. 52. f. 2. Menandra foliis alternis. Gron. virg. 2. p. 20. Hab. in Canadae et Carolinae aridis.

2. *minor*, fol. lineari-lanceolatis, florib. paniculatis. Amoen. acad. 3. p. 10. Lam. Ill. t. 52. f. 1. Hab. in Canada, sylvis glaucosis. T.

* *thymifolia*, caul. erecto subaspero, ramis paniculatis, flor. foliato-fasciculatis. Michaux, Flor. 1. p. 77. Habit. in Carolinae aprica. An a priore diversa?

3. *racemosa*, pubescens caul. erecto paniculato-racemuloso, fol. linearibus acutis ciliatis, racemulis sparsis nudis. Michaux, l. c. Menandra ramis ternis. Gronov. Virg. p. 21. In Virginia.

4. *tenuifolia*, humilis, caul. assurgentibus patulis, fol. subulato-linearibus, flor. alternis solitariis. Michaux, l. c. Habit. in collib. sabulosis juxta amnem Santee. Caps. majusculae.

5. *verticillata*, fol. oblongo-ovatis serrulatis, flor. verticillatis, caule hispido. Willd. sp. 1. p. 495. In India orientali. Habitu Spermacocae. W. T.

M O N O G Y N I A.

Galium trifidum. Pontederia limosa. Nareissus triandrus. Laurus triandra. Amaranthi nonnulli. Fagariae quaedam. Hirtella triandra. Juncus conglomeratus, effusus. Tradescantia multiflora. Sw. livina brasiliensis.

D I G Y N I A.

Chenopodium triandrum. Elrhariae species (gram.) etc.

T R I G Y N I A.

Moraea 2. Ixia gladiata Lin. Elatine triandra. Xanthoxyl. Species. Tillaea muscosa. Alsine.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

213. *PROTEA*. Cor. 4-fida s. 4-petala. *Anth.* lineares, insertae petalis infra apicem. *Cal.* proprius; (communis imbricatus). *Nux* 1-sperma, supera.

* *Pinnatæ : foliis pinnatis filiformibus.*

1. *decumbens*, foliis trifidis filiformibus, caule decumbente. Thunb. prod. 25. et Diss. acad. 2. Willd. Sp. pl. p. 58. Fol. simpliciter trifida secunda. Th.

Obs. In campis arenosis Cap. b. spei, ubi paucis speciebus exceptis, omnes sequentes crescunt, quae h. sunt.

2. *florida*, fol. trifidis filiformibus, caule erecto, capitulis solitariis bracteis obvallatis. Thunb. Diss. n.º. 2. t. 1. f. 1. In Cap. b. spei montibus : Frausche Hock.

3. *cyanoides*, fol. trifido-pinnatis filiformibus, caule erecto, capitulis solitariis nudis. Thunb. L. Mant. 188. Pinck. mant. t. 345. f. 6. Cor. intus purpurascens, extus tota lanata pilis longis densisque albis. Th.

4. *patula*, fol. trifido-pinnatis filiformibus, caule erecto, capitulis aggregatis. Cor. nereo-tomentosae.

5. *pulchella*, fol. bipinnatis globosis filiformibus, capitulis terminalibus clavatis aggregatis aphyllis bracteatis. Willd. l. c. p. 50. Sert. Hannov. 1, succ. 2. p. 15. t. 7. Cav. ic. t. 550. Hab. in Nova Hollandia. Distincta capitulis verticillato-aggregatis in ramorum apice. W.

6. *sphaerocephala*, fol. bipinnatis filiformibus, pedunc. capitulis brevioribus, squamis calycinis ovatis basi villosis. Th.

7. *tridactylides*, fol. bipinnatis : pinnulis linearicuculiformibus : ultima trifida,

strobiliis sphaericis solitariis terminalibus. Cav. ic. 6. t. 538. Hab. cum 2 sequentibus in N. Hollandiae sinu botanico, prope Jackson.

8. *acutifera*, fol. pinnatis : pinnulis oppositis, strobiliis sphaeroidis, cor. 1-petalis. Cav. l. c. p. 33. t. 539. Cor. flava uti in priore.

9. *dichotoma*, ramis dichotomis, fol. bipinnatis filiformibus glabris, strobiliis in dichotomia solitariis concis subsessilibus. Cav. l. c. 34. t. 551.

10. *Serraria*, fol. multifidis filiformibus hirtis, pedunc. capitulis longioribus, squamis calycinis ovato-lanceolatis hirtis. Th. *Serraria* foliis tenuissime divisis, floribus rubris apetalis. Burm. afr. p. 204. t. 99. f. 1. Var. f. l. glabris.

11. *tritermata*, fol. bipinnatis filiformibus glabris, pedunculis capitulis longioribus, squamis calycinis lanceolatis hirtis. Thunb. Canl. superne sexuosus sesquipetalis. Cor. lanata pilis argenteis. Th.

12. *glomerata*, fol. bipinnatis filiformibus, pedunculo communi elongato nudo, pedicellis capitulis longioribus. Thunb. Andrew. t. 264. Capitulum hemisphaericum.

13. *phylicoides*, fol. bipinnatis filiformibus, capitulis terminalibus solitariis lanatis. Thunb.

14. *Lagopus*, fol. bipinnatis filiformibus, capitulis spicatis aggregatis villosis. Thunb. Andrew. t. 243. Spic. villo densissimo albo distinctae.

15. *spicata*, fol. bipinnatis filiformibus, capitulis spicatis distinctis. Thunb. Andr. t. 234. Folia filiformia bipinnata pinnae 3 oppositae, apicis glandula oblonga flavesc. Th.

16. *Sceptrum*, fol. inferioribus bipinna-

tis, superioribus trifidis integrisque. Thunb. Protea Scriptum Gustavianum. Sparm. Act. holm. ann. 1777. p. 55. t. 1. Hab. in summis montibus Hottentotts Holland.

**** Dentatae: foliis dentatis callosis.**

17. *crinita*, fol. quinquedentatis glabris, caule erecto, capitulis subternis terminalibus. Thunb. P. *crinitiflora*. Lin. suppl. 117.

18. *Monocarpa*, fol. quinquedentatis glabris, caule erecto, capitulo terminali. Th. Pluck. alm. 212. t. 200. f. 2. Boerh. Lugd. B. 2. p. 156.

Obs. Var. caule glabro et villosa, fol. 7-dentatis, 5-dentatis, 3-dentatis et indivisis, Th.

19. *elliptica*, fol. ellipticis tridentatis glabris, caule erecto, capitulo terminali. Thunb. Cor. longae hirsutae. Th.

20. *Hypophylla*, fol. tridentatis glabris secundis, caule decumbente, capitulo terminali. Thunb. Boerh. Lugd. B. 2. t. 198. Hab. in campis sabulosis.

21. *cucullata*, fol. tridentatis glabris, capitulis lateralibus. Thunb. Boerh. l. c. t. 206. Hab. in campis arceosis, ad rivulos Cap. b. spci. Caulis nodulosus, tomentosus. Flor. flavescent.

22. *tomentosa*, fol. tridentatis tomentos. Thunb. Tota incano-tomentosa.

23. *heterophylla*, fol. tridentatis integrisque, caule decumbente. Thunb.

***** Acerosae: foliis filiformibus subulatis.**

24. *pinifolia*, fol. filiformibus, florib. racemosis calyculatis glabris. Thunb. Andrew. t. 76. In locis montosis.

25. *racemosa*, fol. filiformibus, flor. racemosis calyculatis tomentos. Thunb.

Obs. Haec est unica hucusque nota species calyce unifloro; qua nota optime a P. *caudata* et *incurva* distinguitur. Thunb.

26. *incurva*, fol. filiformibus incurvis glabris, racemosis capitulis spicatis tomentos, cal. 4-floro. Thunb. t. 3. f. 2.

27. *caudata*, fol. filiformibus hirtis, capitulis subsistentibus spicatis. Thunb. t. 2. f. 3. Cal. communis 4-phyllus 2-florus, raro uni-vel triflorus.

28. *bracteata*, fol. filiformi-canalicul. capitulo terminali, bracteis multifidis. Th. Diss. t. 1. f. 2. Boerh. Lugd. B. t. 193. Caulis pedalis simplex.

29. *comosa*, fol. inferioribus filiformibus, superioribus lanceolatis, capitulo terminali. Thunb. Caul. a foliorum casu nodulosus.

30. *purpurea*, fol. linearibus recurvatis, capitulis terminalibus cernuis, caule decumbente. Cor. ferruginae minutae. Th.

31. *prolifera*, fol. linearibus subulatis adpressis, caule prolifero. Thunb. Hab. in summis montibus Hottentotts Holland.

32. *corymbosa*, fol. linearibus subulatis adpressis, ramulis verticillatis subfastigiatis. Thunb. Diss. t. 2. fig. 1. P. *bruniales*. Lin. suppl. 117. Hab. in campis sabulosis Cap. b. spci. Caulis quadrupedalis, ramis subverticillato-aggregatis subfastigiatis. T.

33. *rosacea*, fol. linearibus subulatis, capitulo terminali, calyce colorato. Thunb. (P. *nana*). P. *rosacea*, flor. solitariis, radio calycino colorato patenti; fol. subulatis. L. Mant. 180. Petiv. gazoph. p. 40. t. 25. f. 7. Hab. in montibus Roo de Sand Cap. b. spci. Calicis squamae interiores purpureo-coloratae. Cor. linea aurea extus tecta. Rosam resercentibus floribus statim noxatur. Thunb.

34. *lanata*, fol. triquetris adpressis, capitulo terminali lanato. Thunb. Diss. t. 3. fig. 1. Cor. pilis argenteis tota lanata et barbata. Th.

***** Lineares: foliis linearibus.**

35. *torta*, fol. linearibus obliquis callosis. Thunb. prod. 26. Fol. medio latiora, torta, cartilagine apice subfusca. Wendl. Hort. Berrenb. p. 11. t. 1. 7.

36. *alba*, fol. linearibus scirceo-tomentosis. Thunb. Tota argenteo-tomentosa.

****** Lanceolatae: foliis ellipticis et lanceolatis.**

37. *aulacea*, fol. linearibus - spatulatis glabris, flor. racemosis calyculatis. Willd. Sp. t. p. 520. Thunb. Diss. t. 1. a. f. 2. Hab. in montibus Platte Kloof Cap. b. spci. Caul. 3-vel 4-pedalis. Antherae medio petali insertae spirales albae. Th.

38. *umbellata*, fol. linearibus spatulatis glabris, capitulis terminalibus, bracteis multifidis. Willd. l. c. Andrew. t. 248. Hab. in summitate montis tabularis. Nomen minus aptum. Caul. bipedalis.

39. *linearis*, fol. spatulatis glabris, capitulo terminali tomentoso. Willd. Th. Diss. t. 4. f. 2. In arenosis ad. Parl et Drakenstein. Caul. quadrupedalis ramosus. Cor. tubus compressus.

40. *cinerea*, fol. linearis-cuneiformibus sericeis, capitulo terminali sericeo. Ait. Kew. t. p. 127. Willd. Sp. p. 521. Caul. bipedalis ramis verticillatis.

41. *Scolymus*, fol. lanceolatis acutis, capitulo terminali rotundolobato. Th. Boerh. t. 192. In ericeis montis Tigridis, C. h. sp. Cor. purpurea. Th. Cor. flavo-virens, dipetala quasi, e quibus unum discedit. Sert. hannov. t. 20.

42. *abyssinica*, fol. lanceolatis basi attenuatis obtusis, capitulo terminali hemisphaerico. Willd. p. 522. Bruce it. 3. app. p. 52. cum icone. Hab. prope Lamalmon in Abyssinia. Caulis 9-pedalis.

43. *mellifera*, fol. lanceolato-ellipticis, capituloque terminali oblongo glabris. Th. Wendl. Hort. Herrenhus. t. 13. *P. repens*, flor. solitariis i radio calycino lanceolato striato resinoso, fol. lanceolatis. L. Mant. 139. Boerh. t. 187. Caul. arboreus orgyalis, ramosus. Capit. magnus ovato-oblongum viscosum.

44. *repens*, fol. lanceolato-ellipticis capituloque ovato glabris, caule decumbente brevissimo. Thunb. Boerh. t. 190. Caul. vix palmaris. Th.

45. *plumosa*, fol. lanceolato-cuneiformibus incanis, capitulo terminali oblongo, petalis inferne glabris, superne pilosis i pilis longissimis. Aiton Kew. t. p. 127.

46. *obliqua*, fol. ellipticis glabris callosis obliquis, capitulo caulino terminali. Th. Caul. bipedalis. Fol. glan-tula terminali obliqua. *β. arcuata*, fol. spatulatis arcuatis laevibus, ramis glabris proliferis, capitulis solitariis. Lam. ill. 234.

47. *parviflora*, fol. ellipticis obtusis callosis obliquis, capitulis terminalibus ramulorum glabris. Thunb. Diss. t. 4. f. 1. Caul. ramosissimus ramis virgatis filiformibus. Th.

48. *pallens*, fol. lanceolatis basi attenuatis glabris acutis callosis, capitulo terminali involucreto, involucro longo pallido. Hort. Herrenhus. t. 19. Thunb. prod. 27. *P. pallens*, flor. ovatis involucreto epaleatis laevibus, fol. linearibus. L. Mant. 193. Boerh. t. 203. Ad Cap. b. ap. in collibus arenosis. Caul. pedalis ramis divaricatis simplicibus.

Obs. Est mas Proteae conferae auctoritate Massonii. Willd. p. 525.

49. *confiera*, fol. lanceolatis basi attenuatis glabris acutis callosis, capitulo terminali involucreto, involucro longo acuto concolore. Thunb. Hort. Herrenhus. t. 20

50. *Levisanus*, fol. obovatis obtuse acuminatis imbricatis glabris, caule piloso, capitulo involucro obtuso longiore. Willd. Sp. p. 546. Thunb. prod. 27. *Levisanus capensis* serpyllifolius. Petiv. gatoph. 9. t. 5. f. 7. W. ndl. Hort. Herrenh. t. 1. Hab. in campis arenosis. Caul. pedalis; capit. flavum.

51. *strobilina*, fol. elliptico-oblongis retuso-callosis capituloque terminali glabris. Thunb. Sert. hannov. t. p. 7. tab. 1.

52. *imbricata*, fol. lanceolatis glabris striatis imbricatis, capitulo terminali. Th. Diss. t. 5. f. 2. Wendl. Hort. Herrenh. t. 14. Capitula in ramis terminalia. Cor. extus lana flavescens tota tecta. Th.

53. *sericea*, fol. lanceolatis sericeis, ramis filiformibus, caule decumbente. Th. Cor. luteo-tomentosa. Th.

54. *salicna*, fol. lanceolatis sericis, caule fruticoso, capitulis oblongis involucreto. Thunb. Pluck. Mant. t. 229. f. 4.

55. *argentea*, fol. lanceolatis argenteo-tomentosis ciliatis, caule arboroso, capitulis globosis. Thunb. Folia nitidissima argentea.

***** *Oblongae: foliis oblongis, ovatis.*

56. *acaulis*, fol. oblongis capituloque globoso glabris, caule decumbente brevissimo. Thunb. Boerh. t. 191.

57. *myrtifolia*, fol. oblongis glabris, capitulis terminalibus aggregatis. Caul. tripedalis. Fol. apice glandulosa, basi obliqua.

58. *grandiflora*, fol. oblongis venosis capituloque hemisphaerico glabris, caule arboroso. Thunb.

59. *glabra*, fol. oblongis aveniis capituloque hemisphaerico glabris, caule fruticoso. Thunb.

60. *formosa*, fol. lanceolatis pubescentibus, caule villosa, capitulo hemisphaerico, (aurantio.) Andrew. t. 17.

61. *speciosa*, fol. oblongis glabris, capitulo oblongo, squamis calycinis apice barbatis. Thunb. Andrew. t. 103. *β. nigra* calyce interiorib. apice incurvatis barbatis nigris. Capit. obovatum. Squam. calyciniae: rubrae, sub apice villo longo nigro barbatae. i *γ rubra*. Andr. t. 250. *δ. latifolia*, fol. ovatis rubro-marginatis, squamis calycinis apice incurvis incarnatis. Andrew. t. 110. Capit. rotundum. An diversa species?

62. *longifolia*, fol. sublinearibus basi angustis subliquis, squamis calycinis interioribus lanceolatis erectis, capitulo longo cylindrico. Andrew. t. 132.

♂ *ferruginoso-purpurea*, capitulo subgloboso. Andrew. t. 133.

♀ *turbinata*, capit. turbinato. Andrew. t. 144. Flor. plumis atropurpureis. A.

63. *Totta*, fol. ovatis glabris callosis capitulo ovato, corol. cylindricis hirtis. Th.

* *venosa*, fol. ovatis nudis venosis imbricatis, ramis villosis, capitulis pluribus subterminalibus. Lam. ill. p. 234.

64. *longiflora*, fol. ovato-ellipticis nudis imbricatis subsessilibus, ramis villosis, capitulo oblongo. Lam. l. c. Boerh. t. 193?

65. *chamaelea*, fol. lanceolatis oliv. incutis basi attenuata nudis, capit. terminalibus glabris involucratis. Lam. p. 237. Breyer. cent. t. 9?

66. *hirta*, fol. ovatis glabris, florib. lateral. Th. Boerh. t. 194. Hab. in campis infra Tasselberg. Caul. villosus tripedalis.

67. *pubera*, fol. ovatis capitulisque terminalibus tomentosis. Thunb. Hab. in summis montibus Hottentotis Holland. Fol. elliptica, breviuscula. Caulis bipedalis. Var. fol. ovatis et oblongis. Thunb.

68. *divaricata*, fol. ovatis hirtis, capitulis terminalibus, ramis divaricatis. Th. P. dichotoma. Lam. Caul. pedalis, flexuosus. Capit. fol. obvallatum.

***** *Rotundatae*: fol. subrotundis.

69. *spathulata*, fol. spatulatis subcucullatis glabris. Thunb. Diss. t. 5. f. 3.

* *concaea*, fol. ovalib. concavis imbricatis subsessilibus, ramis villosiusculis, capitulis aggregatis. Lam. ill. gen. p. 234.

70. *Cynaroides*, fol. subrotundis petiolatis glabris. Thunb. Boerh. t. 134. Hab. ad Cap. b. spei in summitatibus montium. Caul. ramosus simplex vix pedalis. Capit. magnitudine fere capitis infantis.

71. *cordata*, fol. cordatis. Thunb. Hab. in montibus Hottentotis Holland. Caulis decumbens, striatus, spithameus. Fol. subrotunda, inferiora palmaria. Th.

214. LAMBERTIA. Perianthium commune imbricatum, squamis interioribus longioribus, 1-florum. Cor. 4-fida, laciniis revolutis

staminiferis. Caps. tricornis, 1-locularis, disperma.

1. *formosa*. Frutex ramis virgatis, fol. tenuis. Cav. ic. 6. p. 32. t. 547. Smith. act. Soc. Lin. 4. t. 20. Andrew. t. 69. Protea neetarina. Ser. Hannov. p. 5. t. 21. Hab. in N. Hollandia. Cor. coccinea.

215. CONOSPERMUM. Cal. o. Cor. 1-petala ringens, staminifera: labium superius fornicatum; inferius trifidum. Stigm. obtusum. Sem. 1. nudum, pappo coronatum. Smith. in act. soc. Linn. v. 4.

1. *Smithii*. Hab. in Australasia. Frutex. Plures species hujus generis existere videntur, quarum descriptio a cl. autore expectanda est.

216. BANKSIA. Infloresc. strobiliformis, solitaria. Cor. 4-petala. Stamina limbo inserta. Caps. 2-valv. 2-sperma, interjecto seminibus dissepimento sensibifido. Sem. alata.

1. *serrata*, foliis linearibus in petiolum attenuatis aequaliter serratis, apice truncatis cum mucrone. Lin. suppl. 126. Cav. ic. 6. t. 540. Andrew. t. 82. Willd. Sp. t. 535. Banksia conclütera. Gaert. sem. 1. p. 222. t. 48. f. 1. Hab. in Nova Hollandia, ubi omnes formosae hujus generis species crescunt, quae h. sunt.

2. *dentata*, fol. oblongis in petiolum attenuatis curvis flexuosis dentatis: dentibus spinula terminatis, subtus albis. Lin. suppl. p. 127. Weill. Hort. Herrenhus. t. 8.

3. *integrifolia*, fol. cuneiformibus integerrimis, subtus tomentoso-albis. Cav. ic. 6. t. 546. Banksia spicata. Gaert. sem. 1. p. 221. t. 48. f. 2.

4. *praemorsa*, fol. cuneatis praemorsis serratis, subtus albo-punctatis, flor. cythereae purpureae. Andrew. t. 258. Spica orata maxima.

5. *microstachia*, fol. lanceolato-linearibus serrato-spinosis subtus tomentosis albis, (flor. tomentosis luteo-croceis). Cavan. ic. 6. p. 28. t. 541. An ab antecedente satis diversa?

6. *oblongifolia*, fol. oblongis serratis, subtus tomentosis, caule arbutae. Cav. l. c. t. 542. Rami villosi. Spica elliptica. Cor. luteo-aurea. Fol. ovato-lanceolata. C.

7. *Robur*, fol. ovato-oblongis serrato-spinosis sparsis, subtus ferrugineo-tomeosis. Cav. l. c. p. 29. t. 543. Cresc. in Bosny-Bay. Fol. sinuato-serrata, Querc. similia.

8. *salicifolia*, fol. aparsis oblongis integerrimis, apice breviter mucronatis. Cav. l. c. p. 31. Frutex orcealis, ramis tomentosis. Fol. subtus primo ferruginea, dein alba. Cav.

9. *marginata*, fol. linearibus truncatis margine revolutis, caps. compressis. Cav. l. c. p. 29. t. 544. Frut. 4-5-petalis. Fol. subtus albo-tomentosa. C.

10. *oleaeifolia*, fol. verticillatis sublanco-latis integerrimis subtus tomentosis albis. Cav. 6. p. 30. t. 545.

11. *spinulosa*, fol. linearibus revolutis mucronulatis, apicem versus denticulato-spinosis. Smith. Nov. Holl. 1. p. 13. t. 4. Cav. ic. 6. p. 25. t. 537.

12. *ericaeifolia*, fol. approximatis acero-als truncato-emarginatis glabris. Lin. suppl. p. 227. Cav. l. c. t. 538. Fol. hujus minima

217. **HAKEA**. Flor. distincti. *Cal.* communis imbricatus polyphyllus: squamis deciduis (Gemma?). *Cor.* 4-petala: petalis linearibus apice concavis ibique staminiferis. Germen pedicellatum, basi glandulosum. *Caps.* lignosa, 2-valvis, 2-sperma. *Sem.* 2, alata.

1. *pugioniformis*, caule fruticoso, fol. alternis teretibus mucronatis, capsulis pugioniformibus. Cav. ic. 6. p. 24. t. 533. Hakea glabra. Sert. Hannov. p. 27. t. 17. Hab. in sinu Botanico, in Nov. Hollandia cum reliquis speciebus.

2. *gibbosa*, caule fruticoso, fol. sparsis numerosis teretibus, caps. ovatis gibbosis rugosis. Cav. t. 534. Banksia gibbosa. White. it. p. 224. ic.

3. *dactyloides*, fol. alternis ovato-lanceolatis rigidis trinerviis, caps. globoso-ovatis scabris. Cav. Mc. p. 25. t. 535. Banksia dactyloides. Gaertn. t. 47.

4. *pyriformis*, caul. arboreo, fol. lanceolatis oppositis, flor. spicatis oppositis capsulis pyriformibus. Cav. p. 25-26. t. 536. Banksia Gaertn. l. c. l. 1. White, p. 224. Caps. pubescentes.

Obs. Genus vix a *Banksia* diversum, flor. forma et fol. integerrimis ab ea distinctum, eique nomen *Couchium* quoque im-

positum est a cel. Smith. in Act. Soc. Lin. v. 4.

218. **BRABEJUM**. Polygamum. *Amentum* squamis ovatis obtusis. *Cor.* 4-partita: laciniis revolutis, basi staminiferis. *Drupa* sicca subrotunda, villosa, 1-sperma.

1. *stellulifolium*. Lin. Syst. pl. ed. Reich. 4. p. 327. Lam. coc. t. 847. Pluck. alm. t. 265. f. 3. Hab. ad Cap. b. sp. Fol. laecolata, subsinuata, Myricaeformia. h

219. **RUPALA**. *Cal.* o. *Petala* 4 basi coherentia, *Stamina* medio petalorum inserta. *Pericarp.* 1-lo ul. monospermum?

1. *montana*, fol. ovatis petiolatis. Willd. Sp. 1. p. 536. Hab. io insula Cajenoa. h

2. *sessilifolia*, fol. cuneato-oblongis sessilibus. Willd. Richard, in Act. Soc. Illis. Nat. Paris. 1. p. 106. Hab. eum priore. h

Obs. An forsas Embothrii species? cum flores conveniaot et fructus igoosus sit.

220. **EMBOTHRIUM**. *Cal.* o. *Cor.* tetrapetala. *Stamina* limbo petalorum inserta. *Folliculus* polyspermus. *Sem.* alata, imbricata.

1. *speciosissimum*, fol. obovatis obtusis dentatis, corymbo capitato involuacro. Willd. Sp. 1. p. 538. Emb. fol. obovatis obtusis Inaequaliter serratis, spica subcapitata, involuero polyphylo. Smith. Nov. Holl. 1. p. 19. t. 7. Hab. in Nova Hollandia. h

2. *corcineum*, fol. ellipticis integerrimis, racemo terminali coarctato. Willd. l. c. E. *emarginatum*. Flor. Peruv. 1. p. 62. t. 95. Ad tretum Magellanicum et in Terra del Fuego. h

3. *grandiflorum*, fol. ovatis integerrimis, racemis elongatis, corollis fissis quadrilobis. Willd. l. c. p. 538. Lam. encyclop. 2. p. 351. Hab. in Peru. †

4. *umbellatum*, fol. oblongis integerrimis avenis, umbellis axillaribus pedunculatis. Willd. p. 538. Lin. suppl. 228. (p? *stellignum*. Andrew. t. 215. Hab. in Nova Caledonia. h

5. *lanceolatum*, fol. lanceolato-linearibus integerrimis. Flor. Per. 1. p. 62. t. 96. Hab. in colibus et montibus creclis in A. Chilensi.

6. *obliquum*, fol. ovatis serratis glabris, petalis apice obliquis. Fl. Per. p. 61. t. 97. Hab. eum priore. Frutex 2-orgyalis. Pedicelli villosi.

β? *hirsutum*, fol. cordato-ovalibus subdentatis, racemulis brevibus, pedunculis ramisque villosis. Lam. ill. p. 245. Hab. in Peru.

7. *monospermum*, fol. ovatis serratis lanuginosis, folliculis monospermis. Fl. Per. l. c. t. 98. Arbor triorgyalis, quae in Peruviae montib. creseit.

8. *pinnatum*, fol. simplicibus pinnatisque. Fl. Per. l. c. t. 99. f. a. Hab. in Munna, rivieratis et versuris. Arb. 4-orgyalis, vere florens.

9. *sericeum*, fol. ternis lanceolatis integerrimis, margine revolutis subtus sericeis, racemo terminali coarctato, folliculo tuberculato glabro. Willd. p. 519. Smith. Nov. Hol. t. p. 24. t. 9. E. cythoides. Cav. ic. 4. p. 50. t. 386. f. 2. Hab. in Nova Hollandia. h Var. foliis : β. E. *linearifolium*. Cav. t. 386. f. 1.

10. *filifolium*, fol. tripinnatifidis : laciniis decurrentibus acutis, flor. spicatis geminatis pedicellatis. Smith. l. c. p. 21. t. 8. E. herbaceum. Cavan. ic. 4. p. 58. t. 384.

221. GUEVINA. Cal. o. Cor. 4-petala : petalis apice concavis, tribus revolutis. Stam. cavitatibus petalorum insidentis. *Drupa monosperma*.

1. *Avellana*. Molin. Chil. p. 398. Quadria *heterophylla*, fol. pinnatis bipinnatisque, racemis longis simplicibus. Flor. Peruv. t. p. 63. t. 99. f. 6. Hab. in sylvaticis Regn. Chilensis. Arbor 6-orgyalis, utilissima. — Nuclei sapore grati.

222. PERSOONIA. Cal. o. Cor. primo conica, quadrifida, laciniis revolutis, basin versus staminiferis. *Glandulae* 4 ad basin germinis. *Drupa monosperma*.

1. *laurina*, foliis ovatis coriaceis, flor. subracemosis tomentosis.

2. *salicina*, fol. oblongis lato-lanceolatis, flor. racemosis.

3. *lanceolata*, fol. lanceolatis, flor. sparsis. Andrew. t. 74. Linkia laevis. Cav. ic. 4. p. 61. t. 389?

4. *linearis*, fol. linearibus subvillosis? Andrew. t. 77. Flor. flavi uti in antecedente.

5. *hirsuta*, villosa-hirsuta, fol. linearibus margine revolutis.

Obs. Cel. Smith, vir tam animi candore, quam cognitione in Histor. naturali venerabilis, in Act. Soc. Linnaeanae, v. 4, hoc genus constituit ejusque species mecum benevole communicavit, quae omnes frutices sistunt, foliis alternis et fructibus edulibus distinctos quintamque orbis partem, nempe Australiam s. Novam Hollandiam, incolunt.

223. GLOBULARIA. Cal. communis imbricatus; proprius tubulatus, interius. Cor labio superiore 2-partito : inferiore tripartito. *Receptac.* paleaceum. (Flor. aggregati.)

1. *longifolia*, caul. fruticoso, foliis omnibus linear-lanceolatis integerrimis capitulis axillaribus. Ait. Kew. t. p. 110. Willd. sp. t. p. 519. Sloan. jam. 124. hist. t. p. 19. t. 5. f. 3. Hab. in Madera. h.

2. *Alypum*, caul. fruticoso, fol. lanceolatis tridentatis integrisque, capitulis terminalibus. Ait. Kew. t. p. 111. Lam. encycl. 2. p. 724. *Alypum monspeliensium*, s. Frutex terribilis. Bauh. hist. t. p. 598. Hab. in Europae meridionalis sylvis ad rupes et saxosa. h.

3. *bisnagarica*, caul. fruticoso, fol. radicalibus euneiformibus retusis; caulinis lanceolatis. L. Sp. pl. 139. Hab. in Bisnagariae sylvis. h.

4. *linifolia*, caul. herbaceo, folioso, fol. radicalibus spatulatis rigidis apice tridentatis, caulinis angustis linear-lanceolatis acuminatis. Lam. encycl. 2. p. 722. G. caespitosa. Ortega. Hab. in Hispania. h.

5. *vulgaris*, caul. herbaceo-fol. radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis. Hab. in apricis, montosis, subalpinis.

6. *spinosa*, fol. radicalibus crenato-aculeatis, caulinis integerrimis mucronatis. Lam. encycl. 2. p. 722. In Granadae montibus. h.

7. *cordifolia*, caule subnudo fol. euneiformibus tridentatis : dente intermedio minimi. L. Mill. Lam. ill. gen. t. 56. f. 2. Moris. t. 6. t. 15. f. ult. Hab. in Pannonia, Austria, Helvetia, Pyrenaeis. h.

8. *nana*, scapis nudis brevissimis : fol. ovato-spatulatis integerrimis. Lam. encycl. 2. p. 723. In Gall. australi, Pyrenaeis.

9. *nudicaulis*, caule nudo, fol. integerrimis lanceolatis. Moris. t. 6. t. 15. f. 4.

Hab. in Pyrenæis et Austriæ, Helvetiæ montibus. $\overline{\text{K}}$

10. *orientalis*, caule subnudo, capitulis alternis sessilibus, fol. lanceolato-ovatis integris. Hab. in Natolia. $\overline{\text{K}}$

224. **CEPHALANTHUS.** *Cal.* communis o: proprius superus, infundibuliformis. *Recept.* globosum, pilosum. *Capr.* 2-4-partibilibus. *Sem.* solitaria, oblonga.

1. *occidentalis*, fol. oppositis ternisque. Lin. Lam. ill. p. 257. t. 86. Pluck. alm. 336. t. 77. f. 4. Hab. in Amer. septentrionali. h

225. **DIPSACUS.** *Cal.* communis polyphyllus; proprius superus. *Recept.* paleaceum. (Flor. compositi.)

1. *fullonum*, fol. sessilibus serratis, paleis uncinatis. Will. d. sp. 1. p. 543. *Carduus fullonum.* Lobel. ic. 2. t. 27. Hab. in Europa australi. $\overline{\text{K}}$

2. *sylvestris*, fol. sessilibus serratis, paleis rectis, involucri capitulo longioribus. Jacq. aust. 5. t. 402. Hab. ad vias in humidiusculis. $\overline{\text{K}}$

3. *laciniatus*, fol. connatis sinuatis. Hab. in Alsacia (Colmar), Germania, Carnioliæ, Gallia; (prope Dijon). $\overline{\text{K}}$

4. *pilosus*, subparvus, fol. petiolatis appendiculatis. L. Jacq. Flor. austr. t. 248. Hab. in sylvis, præsertim calcareis. Capit. globosa. $\overline{\text{K}}$

226. **SCABIOSA.** *Cal.* communis polyphyllus: proprius duplex superus. *Recept.* paleaceum aut nudum. (Flor. compositi.)

* *Corollulis quadrifidis.*

1. *alpina*, corollulis quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis, floribus cernuis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis. Willd. sp. pl. Lin. p. 545. *Dipsacus foliis pinnatis, pinnis serratis, capitulis globosis.* Hall. helv. n.º. 200. Hab. in alpinis. $\overline{\text{K}}$

2. *ustulata*, cor. quadrifidis aequalibus, calycis squamis acutis, fol. lyratis dentatis. Thunb. prod. 29. Hab. ad Cap. b. Spei.

3. *rigida*, coroll. quadrifidis subradiantibus, calycibus imbricatis obtusis, fol. lanceolatis serratis auriculatis. Lin. Thunb.

prod. p. 28. Comm. hort. 2. p. 185. t. 93. Hab. in Arthiopia, et ad Cap. b. sp. h Caul. suffrutescosus, scaberr.

4. *attenuata*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis: squamis oblongis obtusis, fol. linearibus glabris integris basi-que pinnatifidis. Aiton. Kew. 1. p. 134. *S. trifida.* Thunb. prod. 28. Hab. ad Cap. b. spei. h

5. *scabra*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycis squamis obtusis, fol. lupinatifidis scabris rigidis. Thunb. prod. 29. Lin. supp. 118. Ad Cap. b. spei. $\overline{\text{K}}$ Caul. teretes simpliciter scabri.

6. *transylvanica*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycibus paleisque aristatis, fol. radicalibus lyratis. Jacq. hort. t. 111. Moris. 2. 6. t. 23. f. 13. Hab. in Transylvania. \odot

7. *syriaca*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis paleisque aristatis, caule dichotomo, fol. lanceolatis. Hab. in Syria.

8. *leucantha*, coroll. quadrifidis subaequalibus, squamis calycinis ovatis imbricatis, fol. pinnatifidis. p ? Scabiosa trenta. Hacquet. pl. alp. p. 13. t. 4. l. 1. *S. Hacquetii.* Lam. ill. p. 250. Hab. in collibus Narbonne, et in Delphinato. p . in Carniola. Flores subglobosi, albi. $\overline{\text{K}}$

9. *corniculata*, cor. 4-fidis aequalibus calyc. squamis obtusis, seminum angulis in cornicula æxantibus. Walst. et Kneib. pl. rar. Hung. p. 11. t. 13. In apricis Banatus et Transylv.

10. *centauroides*, coroll. quadrifidis subaequalibus, fol. radicalibus integerrimis, caulinis decussive pinnatis, cal. imbricato. Lam. ill. p. 250. Hab. in Galloprovinciæ alpinis. Flor. ochroleuci.

11. *parviflora*, coroll. quadrifidis subaequalibus, caul. dichotomo, fol. inferioribus ovatis crenatis, capitul. ovatis. Desf. Alt. t. p. 119. Vaill. Acad. 1722. p. 181. Hab. in Algeria. Cor. parva subvillosa. Cal. interior brevissimus. D.

12. *succisa*, coroll. quadrifidis aequalibus, caul. simplici, ramis approximatis, fol. lanceolato-ovatis: caulinis subdentatis, flor. subglobosis. Curt. Lond. t. 20. Hab. in Europæ pascuis, humidiusculis. Flor. autumnæ. Rad. præmorsa.

13. *integrifolia*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. indivisis: radicalibus ovatis serratis integris, ramis lanceolatis: caul. herbaceo. L. Roth. germ. 1. 58. II. 164. Hab. Monspelii et in Helvetia. \odot Corolla ru-

Lra. Folia radicalia Bellidis. Calyx to-phyl-lus; flore brevior.

14. *amplexicaulis*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. amplexicaulibus lanceolatis integerrimis; radicalibus trifidis crenatis. Lin. Hab. . .

15. *humilis*, coroll. quadrifidis inaequalibus, calycis squamis obtusis, fol. linearibus dentato-pinnatifidis. Thunb. prol. 28. Hab. ad Cap. b. spei cum sequente.

16. *decurrens*, coroll. quadrifidis inaequalibus, calycis squamis ovatis, fol. pinnatifidis: pinulis decurrentibus. Thunb.

17. *tartarica*, coroll. quadrifidis radiantibus, caule hispido, fol. lanceolatis pinnatifidis: lobis subimbricatis. Gmel. ii. 1. p. 159. Act. ups. 1744. p. 11. t. 1. Hab. in Tartaria. Planta 12-petalis. Flor. lutei. ☉

18. *arvensis*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. pinnatifidis incisus caule hispido. Curt. Flor. Lond. t. 13. Hab. in arvis, pratis.

* *dubia*, coroll. quinquefidis radiantibus aequalibus, involucri tetraphyllo. Moench. Hass. n.º. 116. t. 3. Hab. in monte Meisner in Hassia.

19. *uralensis*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. radicalibus simplicibus, caulinis decussive pinnatis, paleis arillis spice reflexis. Murr. goett. 2782. p. 13. t. 4. Hab. in Sibiria. ☉

20. *sylvatica*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. omnibus indivisis ovato-oblongis serratis, caule hispido. Jacq. austr. 4. t. 362. Hab. in Austriae, Helvetiae, Germaniae, Galliae sylvaticis et pratis montosis.

21. *longifolia*, coroll. 4-fidis radiantibus, fol. oblongis lanceolatis integerrimis, caule inferne glabro. Pl. rar. Hung. p. 4. t. 5. Cresc. in alpih. Marmaronensibus. Rad. multicrps. Sem. hirsuta. Priori affinis.

22. *canescens*, tomentoso-canescens, coroll. quadrifidis radiantib. caul. multifloro, fol. radicalib. ovato-lanceolatis, caul. pinnatifidis pinnatisque. Plant. rar. Hung. p. 53. t. 53. Hab. in Hungaria, Bohemia, et Germania, ju montosis, collibus. Confunditur cum *S. columbaria*; differt vero tomento, cal. fol. obtusis, radio 2-3 brevior. Nonnunquam occurrit caul. 1-floro et tunc cum pyrenaica non male congruit. Loc. cit.

23. *pyrenaica*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. tomentosis integris, dentatis et pinnatifidis, caul. 1-floro. Willd. sp. 1. p. 552. Allion. pedem. t. 25. f. 2. Boc. mus. p. 22. t. 6. Hab. in Pyrenaeis, Sabaudia et Helvetia. †

* * *Corollulis quinquefidis.*

24. *gramuntia*, coroll. quinquefidis, calycib. brevissimis, fol. caulinis bipinnatis filiformibus. Savr. monsp. p. 268. Desf. Atl. t. p. 120. Hab. MonsPELLI et in BARBARIA. ☉

25. *columbaria*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. radicalibus ovatis lyratisque crenatis, caulinis pinnatis linearibus. Flor. dan. t. 314. Habit. in Europae agris siccoribus.

26. *dauroides*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. bipinnatis, cal. communi villoso pinnatifido. Desf. Atl. t. p. 123. t. 38. Hab. in collib. Algeriae.

27. *graniflora*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. radicalib. oblongis crenatis; caul. pinnatifidis: pinis lanceolatis linearibus patulis. Scop. Delic. Insub. 3. p. 29. t. 14. Desf. l. c. Hab. in Barbariae arvis. Affin. *columbariae*: differt fol. pinna terminali lanceolata.

28. *tomentosa*, coroll. quinquefidis inaequalibus, fol. tomentosis; radicalibus pinnatifidis caespitosis, caulinis pinnato-linearibus. Cav. ic. 2. p. 66. t. 183. Hab. in Regni Valentini montib. Cor. dilute violacea. Fol. albedo-cinerea. ☉

29. *lucida*, cor. quinquefidis, fol. radicalibus lanceolatis acute serratis glabris, caulinis bipinnato-actaeis. Villars Dauph. 2. p. 293. In Delphinatus sylvaticis, pratis alpestribus. Fol. radicalia lucida, saepius incisa.

30. *sicula*, coroll. quinquefidis aequalibus calyce brevioribus, fol. lyrato-pinnatifidis. L. Jacq. horti. 1. p. 5. t. 15. Hab. in Sicilia. Caulis ruber, debilis. Pappus corona campanulata, plicata, multidentata, centro octocollato. L. ☉

31. *rutaefolia*, coroll. quinquefidis, fol. pinnatis summis linearibus, calycibus monophyllis quinquefidis. Vahl. symbol. 2. p. 26. Boec. sic. p. 95. t. 52. Hab. Tunet circa Cap. Zebibo et in maritimis Siciliae. Corollae subaequales, calyce vix longiores, paucae villosae.

32. *maritima*, coroll. quinquefidis radiantibus calyce brevioribus, fol. pinnatis: summis linearibus integerrimis. Habit. in Sicilia, MonsPELLI. ☉

33. *stellata*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. dissectis, receptaculis florum subrotundis. Clus. hist. 2. p. 1. icon. Loh. ic. 536. Hab. in Hispania, praesertim in agro Granatensi, et in Barbaria. ☉. Papp-

pus stellae limbo rotato, membranaceo, radiato setis 40.

32. *simplex*, caul. superne nudo, fol. bipinnatifidis villosis; foliol. linearibus acutis, cal. seminis maximo campanulato. Desf. Atl. 1. p. 136. t. 19. f. 1.

34. *prolifera*, coroll. quinquefidis radiantibus, flor. subsessilibus, caule proliifero, fol. indivisis. Herm. parad. 125. t. 125. Hab. in Aegypto et Barbaria. ☉

35. *at-opurpurea*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. dissectis, receptaculis florum subulatis. Hab. in India? Var. quoad Corollae colorem. ☉

36. *argentea*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. pinnatifidis; laciniis linearibus, pedunculis longissimis, caule tereti. Desf. Atl. 1. p. 121. f. Hab. in Oriente, et Algeria. ☿

37. *urceolata*, coroll. 5-fidis radiantibus, cal. multido urceolato, fol. subcartosis pinnatifidis. Desf. Atl. 1. p. 102. Bocc. sicil. t. 40. f. 3 et t. 59. Moris. a. 6. t. 13. f. 24. Hab. ad maris littora.

38. *indurata*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. ovato-lanceolatis crotis basi dentatis, caule rigente. Mant. Sc. altissima. Jacq. hort. 2. t. 185. Hab. in Africa. ☿. Panicula dichotoma; prima dichotomia pedunculifera, reliquis apice proliferis. S. africanae varietas? L.

39. *africana*, coroll. quinquefidis aequalibus, fol. simplicibus incis, caule fruticoso. Herm. parad. 219. t. 219. Hab. in Africa, Oriente. Plures dantur varietates vid. Willd. p. 556.

40. *monspeliensis*, coroll. quinquefidis aequalibus, calyce brevioribus, fol. omnibus pinnatis ciliatis. Jac. ic. rar. 1. tab. 24. Misc. 2. p. 320. Hab. Monspeli. ☿

41. *pumila*, coroll. quinquefidis radiantibus, subacaulis, fol. pilosissimis; radicalibus lyratis, caulinis pinnatis incis. Scabiosa *acaulis*. Thunb. prod. 29? Hab. ad Cap. b. spei.

42. *cretica*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. congestis lanceolatis subintegerrimis, caule fruticoso. L. Hab. in Creta. ☿

43. *saxatilis*, coroll. subquinquefidis subaequalibus, fol. lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, caulinis connatis, caul. herbaceo. Cav. ic. 2. p. 68. t. 184. Hab. in saxor. fissuris regni Valentini. Cor. alba. ☉

44. *limonifolia*, coroll. quinquefidis aequalibus, fol. cuneiformibus integerrimis, subtus rugosis incanis. Vahl. symb. 2.

p. 27. Hab. in Sicilia. Fol. inferne fere Siatice Limonii. ☿

45. *graminifolia*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. linearilanceolatis integerrimis, caule herbaceo. Amorn. acad. 4. p. 267. Bauh. prod. 127. t. 127. Moris. a. 6. t. 15. t. 36. Hab. in alpinis Europaeis et in Barbariae collibus.

46. *lyrata*, coroll. radiantibus, laciniis integris, fol. inferioribus oblongis serratis, superioribus basi pinnatifidis. Vahl. symb. 2. p. 27. Hab. ad Dardanellos.

47. *palaestina*, coroll. quinquefidis radiantibus; laciniis omnibus trifidis, fol. indivisis subserratis; summis basi pinnatifidis. Mant. 37. Gouan. illustr. p. 5. Hab. in Palaestina Flores albi, aut citri. Fructus Sc. stellatae. ☿

48. *isctensis*, coroll. quinquefidis radiantibus; calyce longioribus, fol. bipinnatis linearibus. Mant. 37. Hab. in Sibiriae Isctensis rupibus. Semina ut in priore.

49. *ucranica*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. radicalibus pinnatifidis; caulinis linearibus basi subciliatis. Gmel. sib. t. 87. Hab. in Ucraina.

50. *ochroleuca*, coroll. subquinquefidis radiantibus, fol. radicalib. bipinnatis linearibus. S. tenuifolia. Roth. germ. I. p. 59. II. 167. Moris. 2. g. t. 13. f. 23. Barr. ic. 770. f. 2. Hab. in pratis siccis. ☿

51. *banatica*, coroll. 5-fidis radiantibus, fol. radicalib. lyratis; caulinis subbipinnatis, calycib. discum aequantibus. Plant. rar. Hungar. p. 10. t. 12. In saxnis Banatis ad Ciklovam. Affin. S. ochroleucae. Cor. rubellae.

52. *papposa*, coroll. quinquefidis inaequalibus, caule herbaceo erecto, fol. pinnatifidis, seminibus aristatis plumosisque papposis. Syt. veg. Hab. in Creta. Knauiam refert. Caulis filiformis, brachiatus.

53. *pterocephala*, subacaulis, coroll. quinquefidis, caule procumbente fruticoso, fol. laciniatis hirsutis, pappo plumoso. Pterocephalus perenn. humilis laciniatus et incanus. Vaill. act. 1722. p. 184. Hab. in Grecia? ☿

227. KNAUTIA. Cal. communis oblongus, simplex, quinqueflorus; proprius simplex, superus. Cor. irregulares. Recept. nudum. (Flor. aggregati.)

1. *orientalis*, foliis incis, corollulis quinque calyce longioribus. L. Willd. sp. 1. p. 501. Hab. in Oriente. ☉. Semina compressa, apice multidentata.

9. *propontica*, fol. superioribus lanceolatis integerrimis, corollulis densis calyci aequalibus. Tilli. pis. 151. t. 48. In Oriente. Sem. corona 15-leniata ciliata. ♂

3. *palaestina*, fol. integris, calycibus hexaphyllis, seminibus papposis. Habit. in Palaestina. Semina. pappus radiis octo villosis. ♂

4. *plumosa*, fol. superioribus pinnatis, calycibus decaphyllis, seminibus papposis. Hab. in Oriente. Pappus radiis 12, pilosis longis. ♂

228. **ALLIONIA**. *Cal.* communis oblongus, simplex, triflorus; proprius obsoletus, superus. *Corollulae* irregulares. *Recept.* nudum. (Flor. aggregati.)

1. *violacea*, foliis cordatis, calycibus quinquefidis trifloris. Sp. pl. Hab. in Comana.

2. *incarnata*, fol. oblique cordatis altero majore, calycibus triphyllis trifloris. L'Herit. strip. 61. t. 31. Flor. Peruv. 1. p. 49. Weddell. Lond. it. 180. Hab. in rupibus et arenosis Peruvianis. ♂

229. **OPERCULARIA**. *Cal.* communis monophyllus, campanulatus inaequaliter dentatus; proprius 6. *Corollulae* 4. - 5-fidae, aequales. *Recept.* claudens operculiforme, cui semina inferne affixa.

1. *umbellata*, flor. umbellatis monandria. Willd. sp. p. 563. Gaert. sem. 1. p. 112. t. 24. Hab. in Nova Hollandia.

2. *aspera*, flor. capitatis, calyce sulcato glabro. Willd. p. 564. Gaert. sem. 1. p. 112. t. 24. f. 4. Hab. in Nova Zeelandia cum sequente.

3. *diphylla*, flor. capitatis, cal. hispidus. Willd. l. c. Gaert. sem. 1. p. 113.

230. **CRYPTOSPERMUM**. *Cal.* communis hexaphyllus: foliolis patentibus inaequalibus; proprius? e paleis receptaculi, triphyllus. *Corollulae* (sub-20) quadrifidae, primo ovatae. *Receptac.* globosum, paleaceum, subtus seminiferum. (Capsulae 1-loculares in receptac. subglobosum cohaerent, medio longitudinaliter dehiscen-tes. Young.)

1. *Youngii*. *Opercularia* paleata. Tho-

mas Young. In Act. Soc. Lin. 3. p. 30. c. icon. Hab. in N. Hollandia. Flores aggregati ut in priore genere, a quo calyce polyphylo et receptaculi forma satis differt.

231. **EVEA**. *Cal.* communis polyphyllus: foliolis 4 exterioribus latioribus; proprius quadridentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Petricarp.* . . . (Flor. aggregati.)

1. *guyanensis*, capitul. axillaribus brevissime pedunculatis. Lam. ill. p. 258. t. 59. Anbl. Hab. in Guyana. †

232. **HEDYOTIS**. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis. *Caps.* 2-locularis, polysperma; infera. *Recept.* dissepimento undique adnata. *Gertn.*

1. *fruticosa*, fol. lanceolatis petiolatis, corymbis terminalibus involucreatis. Lin. Willd. sp. 1. p. 564. Fl. zeyl. 63. In Zeylona.

2. *racemosa*, fol. lanceolatis, racemis axillaribus et terminalibus. nudiuculis. Lam. encycl. 3. p. 76. t. 62. f. 2. Rheed. mal. 10. p. 49. t. 25. Hab. in India.

3. *auricularia*, fol. lanceolato-ovatis, flor. verticillatis. Burm. zeyl. 227. t. 108. f. 1. Hab. in Zeylona. †

4. *hispidia*, fol. linearilanceolatis hispidis, flor. verticillatis. Retz. obs. 4. p. 23. Hab. in China.

5. *maritima*, fol. ovalibus obtusis, flor. oppositis sessilibus. In India orientali. Caul. herbacei prostrati.

6. *pumila*, fol. ovatis acutis, flor. alternis pedunculatis. Lin. suppl. Hab. in Tranquebaria. Facies Anagallidis.

7. *setosa*, fol. ovatis acutis cum acumine, flor. terminalibus ternis. Flor. Peruv. 1. p. 56. t. 88. f. a. Hab. in Andium montib. in Tarma. †

8. *juniperifolia*, fol. linearib. margine revolutis, caul. procumbente ramosissimo, flor. terminalibus ternis. Fl. Per. p. 57. t. 87. Cresc. in Tarmae et Cantae locis frigidis. †

9. *thymifolia*, fol. linearibus, margine revolutis, flor. corymbosis. Fl. Per. 1. p. 56. t. 88. Cum priore. †

10. *filiformis*, fol. linearibus acuminatis, caul. ramosissimo filiformi repente, flor. solitariis terminalibus. Fl. Per. p. 57. t. 87. b. In Andium alpinis. Herbae repens, habitus Galii.

11. *conferta*, fol. linearibus acuminatis, caul. ramosissimo repente, flor. terminibus solitariis. Fl. Per. l. c. fig. a. Habit. in alpb. Cantae et Tarmae. h

12. *diffusa*, fol. lanceolatis acutis, flor. alternis pedunculatis, caule procumbente diffuso. Willd. p. 366. Habit. in India orientali.

13. *herbacea*, fol. lineari-lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. Obolentaria *tenrifolia*. Burm. ind. 37. t. 14. f. 1. Hab. in Zeylona.

14. *graminifolia*, fol. linearibus, caule decumbente, panicula racemosa dichotoma. Vahl. symbol. a. p. 27. Lin. suppl. 119. Alsinæ spergularæ foliis, capitulis brevibus duris. Pluck. mant. g. t. 34. f. 2. Hab. in India orientali. Caules filiformes debiles Sicliaræ gramineæ.

15. *virgata*, fol. linearibus, caule erecto, panicula nuda dichotoma stricta, pedunculis lateralibus geminatis. Willd. p. 667. Hab. in Guinea.

16. *rupestris*, fol. quadrifariis subulatis canaliculatis, flor. sessilibus axillaribus, coroll. villosis tubo curvo. Swartz. prod. 29. et Flor. H. americana. Jac. amer. 20. Sloan. bisi. 2. t. 202. f. 1. Hab. in rupestribus maritimis Indiae occidentalis. h

232. SPERMATOC. Cal. 4-dentatus. Cor. 1-petala, infundibulif. Sem. 2, bidentata.

* *Floribus verticillatis.*

1. *tenuiflor*, glabra, foliis lanceolatis, staminibus inclusis, flor. verticillatis, seminibus hirtis. Willd. sp. t. p. 568. Dill. elth. 370. t. 277. f. 359. Hab. in Carolina, Jamaica.

2. *coerulescens*, fol. ovatis acutis pilosiusculis laevibus, stipulis floribus verticillatis æquantibus, staminibus exsertis. Vahl. eclog. 1. p. 9. Aublet. t. 19. f. 2. Cresc. cum priore.

3. *prostrata*, glabra, fol. subsensilibus ellipticis acutis, flor. verticillatis, caule prostrato. Willd. Aubl. t. 20. f. 3. Hab. ad ripas Gujanæ.

4. *radicans*, glabra, fol. subsensilibus lanceolatis, flor. verticillatis, caule procumbente radicante. Willd. Aubl. t. 20. f. 4.

5. *verticillata*, (*hyssopifolia*), glabra, fol. lanceolatis, verticillis globosis capitatisque. Mill. dict. n.º. 2. Dill. elth. t. 277. f. 358. Hab. in Jamaica, Africa. h. Odor Taitfolii Meliloti.

6. *villosa*, villosa, simplex, fol. ovato-lanceolatis pubescentibus, summis quaternis, flor. verticillatis, stam. inclusis. Swartz.

7. *scabra*, fol. subrotundis cauleque hispido-scabris, flor. verticillatis, stam. exsertis. Willd. sp. pl. 572. Hab. in India orientali. Foliis parvis orbiculatis distincta. W. t.

8. *articularis*, fol. ellipticis obtusiusculis subsabris. Lin. suppl. p. 119. Hab. in India orientalis apricis argillosis. ☉

9. *assurgens*, fol. lanceolatis lineatis margine scabris, verticillis parvis. Fl. Per. 1. p. 60. t. 92. Pluck. Alm. t. 136. f. 47. Cresc. in rudcratis Limæ et Huanuci, ubi per totum annum floret. t.

10. *gracilis*, glabra, fol. lanceolatis angustis, ramis inferioribus oppositis, superioribus dichotomis, verticill. minimis. Flor. Per. p. 61. t. 92. f. a. ☉

11. *stricta*, fol. lineari-lanceolatis lineatis, flor. verticillatis angustis. Lin. suppl. 120. Hab. in India orientali. ☉

12. *linifolia*, fol. lineari-lanceolatis villosis laevibus, summis quaternis, flor. verticillatis, stam. exsertis Vahl. eclog. 1. p. 8. Hab. in Cajenna.

13. *spinosa*, suffruticosa, fol. linearibus spinulis ciliatis, flor. verticillatis paucifloris. Swartz. obs. 45. Hab. in Americæ calidioris arvis. Folia Rosmarini.

** *Flor. axillaribus.*

14. *longifolia*, glabra, fol. lanceolatis utrinque ciliatis, margine scabris, verticillis dimidiatis (flor. axillaribus). Vahl. eclog. 1. p. 8. Aubl. Guj. 1. p. 58. t. 21. In Cajenna, Guiana.

15. *latifolia*, glabra (flavescent), fol. ovatis, caule erecto quadrangulati, stipul. calycib. villosis, flor. axillaribus. Lam. ill. p. 274. Aubl. t. 19. f. 1. In Gujana.

16. *aspera*, fol. ellipticis scaberrimis acutis glabriusculis, flor. axillaribus confertis, stam. inclusis. Vahl. eclog. 1. p. 10. Aubl. t. 22. f. 6. In India occidentali.

17. *hirta*, scabra, ramosa, fol. ovato-lanceolatis, flor. confertis axillaribus, stam. exsertis Swartz. prod. p. 45. Lin. Syst. veg. p. 124. Hab. in Jamaica in graminosis siccis. ☉

18. *hispida*, hispida, fol. obovatis oblongatis, flor. axillaribus. L. Murr. Com. Gott. 3. t. 5. p. 77. Hab. in Zeylona. Cor. violaceæ turbato-campesulata. ☉

*** *Flor. terminalibus capitatis.*

19. *alata*, fol. ovatis, summis sessilib., flor. terminalibus capitatis, caule 4-gono alato repente. Willd. sp. 569. Aub. t. 23. f. 7. Hab. in Gujana ad ripas. Flor. caerulei. $\text{\textcircled{T}}$

20. *hexagona*, fol. ovatis petiolatis, flor. terminalibus (capitatis), caule prostrato 6-gono. Willd. l. c. Aubl. t. 22. f. 8. C. priore.

**** *Flor. corymbosis.*

21. *sumatrensis*, fol. lanceolata hispida, corymbis terminalibus dichotomis. Retz obs. 4. p. 21. Hab. in Sumatra.

22. *peruviana*, fol. lanceolatis nervosis plicatis, flor. dichotomo-corymbosis terminalibus. S. *corymbosa*. Flor. Per. t. p. 60. t. gr. 8. Hab. in Munae ruderalis in Peruvia. Suffrutescens.

23. *procumbens*, fol. linearibus, caule procumbente, corymb. lateralibus pedunculatis. L. syst. veg. 19. p. 124. In India. S. *corymbosa*. L. Sp. pl. ed. 2. p. 149.

134. **SUERARDIA.** Cor. 1-petala, infundibulif. Sem. 2, tridentata.

1. *arvensis*, fol. omnibus verticillatis, flor. terminalibus. Flor. dan. t. 419. Hab. in arvis. $\text{\textcircled{C}}$

2. *murata*, fol. floralibus binis oppositis binis floribus. Allion. pædem. n. 34. t. 77. f. 1. Column. cephr. t. 503. Hab. in Italia, et Constantinopoli in vetustis muris. Fruct. reflexi asperi. $\text{\textcircled{C}}$

3. *fruticosa*, fol. quaternis aequalibus, caule fruticoso. Hab. in insula Adscensionis An hujus generis? $\text{\textcircled{h}}$

235. **ASPERULA.** Cor. 1-petala, infundibulif. Sem. 2, globosa.

1. *odorata*, foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis, fructu hispido. Smith. brit. t. p. 172. Curt. Lond. ic. Hab. in umbrosis, sylvis montosis.

2. *hexaphylla*, fol. senis linearibus, flor. umbellatis terminalibus subsessilibus. Allion. ped. n. 48. t. 77. f. 3. Hab. in rupibus Eilemontanis. $\text{\textcircled{T}}$

3. *arvensis*, fol. senis, flor. terminalibus sessilibus aggregatis. Habb. in agris praesertim cal. arvis. Flor. caerulei.

4. *hirta*, fol. senis linearibus sentis hispida, flor. terminalibus aggregatis involucro longioribus. Raymond in Bull. d. sciences n. 41. p. 231. t. 9. Hab. in Pyre-

næis, in siccis, rupestribus, praesertim calcaris. Flor. nivei, exius subpur. urascens.

5. *algerica*, fol. senis linearibus acutis denticulatis, inferioribus hirsutis, flor. aggregatis terminalibus. Desf. Atl. t. p. 127. (Asp. *hirsuta*). Hab. in collibus Algeriae. Cor. pallide rosea, laciniis ovatis. D.

6. *taurina*, fol. quaternis ovato-lanceolatis, flor. fasciculatis terminalibus. Moris. s. g. t. 21. f. 1. Hab. in alpinis Helvetiae, Italiae.

7. *crassifolia*, subfrutescens, fol. quaternis oblongis lateralibus revolutis obtusiusculis pubescentibus. Hab. in Cræta; Oriente. Flores fasciculati, terminales. Cor. exius pubescentes. $\text{\textcircled{h}}$

8. *aristata*, fol. linearibus subcarnosis, inferioribus quaternis, fl. subternis aristatis. Linn. suppl. Hab. in Europa australi.

9. *tinctoria*, fol. linearibus inferioribus senis; intermediis quaternis, caule fasciculo, flor. plerisque trifidis. Hab. in Suecia, Germaniae, Galliae, Siliriae collibus aridis. Rad. rubra. $\text{\textcircled{T}}$

10. *pyrenaica*, fol. quaternis lanceolato-linearibus, caule erecto, flor. saepius trifidis. Hab. in Pyrenæis et prope Valentiam.

11. *cynanchica*, fol. quaternis linearibus superioribus oppositis, caule erecto, floribus quadrifidis. Hab. in pratis aridis ad vias. Cespitosa.

12. *laevigata*, fol. quaternis ellipticis obsolete nervosis laevibus, margine glabris, fructibus scabris. Willd. sp. p. 579. Moris. s. g. t. 21. f. 4. Hab. in Europa australi. Non confundenda cum Galio rotundifolio.

236. **DIODIA.** Cor. 1-petala, infundibuliformis. Caps. 1-locularis, 2-sperma.

1. *virginica*, caule ramoso procumbente laevi, fructib. hirsutis. Mich. Flor. t. p. 81. Jacq. ic. rar. t. 29. Lsm. ill. t. 63. Hab. in Virginia aquosis. $\text{\textcircled{T}}$

2. *simplex*, caul. herbaceo simplici erectiusculo laevi, fol. ovato-lanceolatis. Sw.

3. *alabra*, procumbens, glabra, fol. ovali-lanceolatis, verticillis multifloris. Michaux. Flor. t. p. 82. Hab. in sabulosis sylvarum Carolinae.

4. *verticillata*, caul. herbaceo simplici erecto laevi, fol. lanceolatis verticillatis. Willd. sp. p. 580. Vahl. symb. 2. p. 28. Hab. in insula St. Crucis.

5. *prostrata*, caul. suffruticoso subdiviso, ramis prostratis filiformibus, fol. linearibus hirsutiusculis revolutis. Swartz. prod. 30. Hab. in Jamaica, Cumana. h

6. *scandens*, caul. scandente suffruticoso, fol. ovato-lanceolatis rigidis scabris. Swartz. prod. 30. Hab. in Hispaniola. h

7. *sarmentosa*, caul. flaccido fruticoso, ramis oppositis patentibus, fol. oblongis acutis scabriusculis. Sw. In Jamaica.

237. **HYDROPHYLAX.** *Cor.* 1-petala infundibuliformis. *Cal.* quadripartitus. Baccæ exsueca angulata 2-locul. dissepimento transversa. *Sem.* solitaria.

1. *maritima*. Lam. ill. t. 26. Lin. suppl. 126. *Sarcissus* arceps. Gaert. sem. 1. p. 118. t. 25. f. 4. Hab. in Indiae arcuosis. Facies *Arcnariae rubrae*.

238. **KNOXIA.** *Cor.* 1-petala, infundibuliformis. *Sem.* 2, sulcata. *Calycis* unicum folium majus.

1. *zeylanica*, floribus spicatis, fol. glabris. Willd. p. 582. Burm. ind. 34. t. 13. f. 2. Lam. ill. t. 59. f. 1.

2. *corymbosa*, flor. corymbosis, fol. subtus pubescentibus. Willd. Gaert. sem. 1. t. 25. f. 8? Lam. t. 59. f. 2. Hab. in India orientali.

239. **CARPHALEA.** *Cor.* 1-petala infundibuliformis intus hirta. *Cal.* 4-fidus: laciniis spathulatis scariosis. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *corymbosa*. Willd. sp. 1. p. 583. *Carphalea* madagascariensis. Lam. ill. t. 59. f. 4. Hab. in Madagascar.

240. **HOUSTONIA.** *Cor.* 1-petala infundibulif. *Caps.* 2-locularis, 2-sperma, supera.

1. *coerulea*, fol. radicalibus ovatis (spathulatis), caule composito, pedunculis primis bifloris. L. Moris. 2. 15. t. 4. f. 1. H. Linnæi, Michaux. Fl. p. 84-85. Hab. in Virginia. Var. magnitudine et flor. albis.

2. *serpillifolia*, caespitosa, fol. ovalibus in petiolum angustatis, pedunc. terminalib. 1-floris longissimis. Michaux. Flor. 1. p. 85. Hab. ad rivulos in montibus Carolinæ. Fol. subciliata. *Cor.* caerulea. ¶

3. *rotundifolia*, repens, fol. suborbiculatis crassiusculis, pedunc. axillarib. 1-floris. Mich. l. c. Cresc. in apricis submarinis Floridæ. Sempervirens. *Cor.* alba.

4. *angustifolia*, erecta ramossissima, fol. linearibus, flor. terminalib. fasciculatis subsessilibus sæpe ternis. Mich. Hab. in submarinis uti antecedens. *Cor.* purpurea. Caps. subtrinate.

5. *coccinea*, fol. ovato-lanceolatis subternis, caul. suffruticoso, flor. corymbosis. Andrew. Repos. t. 106. Hab. in Mexico.

6. *purpurea*, fol. ovato-lanceolatis, corymbis terminalibus, flor. superis. *Knoxia* purpurea. Lam. ill. p. 259. Hab. in Virginia. An diversæ generis? Conf. Michaux, Flor. 1. p. 86.

241. **GALIUM.** *Cor.* 1-petala, plana. *Sem.* 2, subrotunda.

* *Fructu glabro, passim scabro nec hispido. Fol. quaterna.*

1. *Rubioides*, fol. quaternis lanceolato-ovatis trinerviis rigidis subius scabris. caul. erecto, fractibus glabris. Schrad. spicil. p. 10. Hab. in Europa australi et in Siberia. Caulis firmus, erectus. L.

2. *hyssopifolium*, fol. quaternis inaequalibus linearis-lanceolatis obtusis glabris Hoffm. germ. ed. 2. p. 71. Hab. in pascuis sylvaticis montosis. Caul. erectus (subiacidus). Panic. trichotoma subovata. H.

3. *articulatum*, fol. ovatis trinerviis scabris, caul. ascendente articulis nodosis. Lam. ill. 1. p. 260. Hab. in Oriente.

4. *latifolium*, caul. erecto laevi, fol. quaternis amplioribus oblongo-ovalibus trinerviis: margine nervique subhispidis, pedunc. divaricatis multifloris. Mich. Flor. 1. p. 79. Hab. in Carolinae subalpinis. Flor. violaceo-purpurei.

5. *palustre*, fol. quaternis obovatis inaequalibus, caulis diffusis. Hab. in paludosis. caul. flaccidus. ¶

6. *trifidum*, fol. quaternis linearibus, caule procumbente scabro, cor. trifidis. Flor. dan. t. 48. In Dania, Canada. Stam. 3.

7. *fruticosum*, fol. quaternis linearibus obtusis glabris, caule tetragono frutescente, seminibus glabris. Willd. p. 585. Tournef. cor. 4. Hab. in Crete. h

8. *montanum*, fol. subquaternis linearibus laevibus, caul. debili scabro, sem. glabris. L. Hab. in Germania, Gallia. Inter G. Mollugineum et glaucum medium. Corymbi trifidi. L. ¶

8. *hirsutum*, procumbens hirsutum, fol. quaternis lanceolatis aequalibus caul. ramosissimo, pedunc. 1-floris, fructib. scabris. Flor. Peruv. t. p. 59. Hab. in Peruvia in Centae umbrosis. ☉

9. *corymbosum*, repens, fol. quaternis lanceolatis oblongis, ramulis corymbosis, pedunc. 1-floris, fructib. glabris. Fl. Per. l. c. In alpihus Tarmac. ☉

10. *ciliatum*, procumbens, fol. quaternis lanceolatis ciliatis aequalibus reflexis, pedunc. 4-phyllis 1-floris, fructib. glabris. Flor. Per. 4. c. Cresc. in collibus aridis Tarmac. Vere.

11. *ovale*, scandens hirsutum, fol. quaternis oblongo-ovalibus acuminatis aequalibus, pedunc. 1-floris, fructib. glabris. Fl. Per. l. c. Hab. in Peruviae versuris et rudratis. Vere.

12. *croceum*, procumbens, fol. quaternis linearibus ciliatis subus scabriusculis, pedunc. 1-floris, fructib. glabris rubris. Fl. Per. p. 59. Cum priore.

13. *mucronatum*, diffusum, fol. quaternis linearibus mucronatis aequalibus. corol. 4-fidis, fructibus glabris lacteis. Fl. Per. t. p. 60. Habit. in aridis Tarmac ad Curis tractus.

Obs. An forte ex enumeratis hisce Peruvianis speciebus quaedam ad Valantiae genus pertinet? An *G. croceum* idem ac *Rubia chilensis* Molinae?

14. *Claytoni*, caul. procumbentibus; angulis retro scabris, fol. subquaternis linearis-lanceolatis obtusis margine nervisque hispidulis. Michaux, Flor. 2. p. 78. Hab. in Canada. Flor. pauci, miوتي, albi.

15. *asperellum*, caul. decumbentibus retro aculeatis, fol. senis ovali-lanceolatis acumine flaccido margine nervis-ue hispidulis. Michaux l. c. Cresc. in Canadae septentrionalibus.

16. *uniflorum*, fol. quaternis 1-4-gonolines-ribus acutis glabris, caul. laevi, pedunc. unifloris cernuis, fructu glabro. Michaux. Hab. in Carolina. Sequenti affine.

* * Fol. ut plurimum senis.

17. *tinctorium*, fol. linearibus: caulibus senis; ramorum quaternis, caul. flaccido, pedunculis subbifloris, fructib. glabris. Hab. in America septentrionali.

18. *capense*, fol. senis linearibus glabris, caule frutescente erecto. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. spei. ? *G. frutescens*. Cav. ic. 3. p. 3. t. 206. f. 2. In Hispania.

19. *mucronatum*, fol. senis linearibus mucronatis glabris, caule pubescente debili. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

20. *expansum*, fol. senis linearibus mucronatis glabris, ramis divaricatis pubescentibus, panicula trichotoma. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

21. *asperum*, fol. senis oblongis serratis, caule hispido piloso, florib. paucis. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

22. *glabrum*, fol. senis oblongis serratis, caule hispido glabro, flor. paniculatis. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

23. *viscosum*, fol. infimis quaternis obovatis superioribus senis linearis-lanceolatis antrorsum serratis, carina cauleque laevi. Vahl. symbol. 2. p. 29. Hab. in montosis Tuneti. ☉

24. *purpureum*, fol. verticillatis linearis-setaceis, flor. terminalibus subpaniculatis, pedunc. capillaribus folio longioribus. Hab. in Italia, Gallia et Helvetia.

25. *rubrum*, fol. verticillatis linearibus patulis, pedunculis brevissimis. L. Hab. in Palatinatu, Italia.

26. *megalospermum*, fol. quinatis lanceolatis margine hispidis, pedunc. geminatis terminalibus. Willd. p. 594. Allion. pedem. n. 35. t. 79. Hab. in monte Cenico. Flor. albedo-flavi. Semina magna scabra. W.

27. *spurius*, fol. senis lanceolatis carinatis scabris, retrorsum aculeatis, pedunc. axillarib. ramosis divaricatis, fructib. laevibus. Roth. N. Beytr. p. 141. *G. hispidum*. Ej. germ. 2. p. 185. Hab. in eulius, ad saepe. *G. Aparine* simile. ☉

28. *uliginosum*, fol. senis lanceolatis retrorsum serrato-aculeatis mucronatis cauleque rigidis, cor. fructu majore. Lin. Hab. in uliginosis montosis, pascuis aquosis. ☉

* *hercynicum*, glabrum caespitosum procumbens, fol. senis obovatis mucronatis, ramis brevibus confertis, flor. glomeratis. *G. hercynicum*. Weig. obs. p. 25. Hab. in montosis, sylvaticis, graminosis, arenosis satis frequens. Vix a sequente diversum.

29. *saxatile*, fol. senis obovatis obtusis, caule ramosissimo procumbente, fructu granulato. Smith. brit. p. 175. Petiv. herb. brit. t. 30. f. 6. *G. montanum*. Huds. Habit. in Hispania, Italia, Helvetiae, et Angliae alpinis et creticis.

30. *Witheringii*, fol. quinis reflexis lanceolatis aristatis ciliatis, caul. erectiusculo simplici scabro, panic. terminali tri-

chotoma. *G. montanum*. Withering. arang. 1. p. 187. t. 28. Smith. brit. fr. p. 174. Hab. in ericetis montosis subhumidis in Anglia.

31. *austriacum*, fol. suboctonis glabris mucronatis, caul. diffuso, ramis floriferis subtrichotomis. *G. glabrum*. Hoffm. germ. ed. 2. p. 72. *G. austriacum*. Jacq. austr. t. 50. *G. laeve*. Thuill. Paris. p. 77? Hab. in Germania et Gallia?

32. *erectum*, fol. suboctonis lanceolatis antrorsum aculeato-serrulatis mucronatis, panic. trichotomis, caul. laeviusculo flaccido. Smith. brit. 1. p. 6. With. arrang. 1. p. 189. Hoffm. l. c. Hab. in Anglia et Germania. Caul. ramosissimus, flaccidus. Sm.

33. *scabrum*, caespitosum, caul. sublaevi depresso ascendente, basi tomentosa, fol. 6-8 linearibus subasperis mucronatis, infimis minutissimis (emarcidis) ellipticis, petiunculis trichotomis t. ternis. *G. scabrum*. Jac. austr. t. 422. Murr. Syst. veg. p. 151. *G. pusillum*. Lin. Smith. brit. 1. p. 177. Engl. bot. t. 74. *G. Bocconi*. Allion. Willd. sp. 1. p. 587. *G. supinum*. Lam. *G. paschale*. Vahl? *G. asperum*. Schreb. *G. sylvestre*. Poll. *G. pallens* et nitidulum. Thuill. hujus loci sunt. Hab. in montosis praesertim calcareis suis frequens, etiam in sylvaticis.

Obs. *G. anisophyllum*, pusillum argenteum, corrodacolum *Villarsii* hujus tantum varietates?

34. *tenue*, fol. senis subulatis laevibus, pedunc. trifidis, petalis aristatis. Willd. Vill. delph. 2. p. 322. t. 7. Hab. in alpinis Delphinatus. ¶

35. *Jussieu*, fol. subsenis lineari-subulatis laevibus, flor. umbellatis, caule ascendente. Willd. Caulib. filiformibus prostratis, fol. quinis angustis acutissimisque, flor. subumbellatis. Villars delph. 2. p. 323. t. 7. *G. caespitosum*, Lam. enc. *An senensis* var.? Juss. Act. paris. 1714. p. 37. t. 15. f. 2. In alpinis Delphinatus et Sabaudiae. ¶

36. *pyrenaicum*, fol. senis, flor. lateribus oppositis subsessilibus solitariis. Lin. suppl. 121. Gouan. illust. 5. t. 1. f. 4. *G. muscoides*. Lam. *G. hypnoides*. Vill. delph. Hab. in Pyrenaeis. ¶

*** *Fol. plus minusve octonis.*

37. *minutum*, caul. decumbente, fol. octonis lanceolatis mucronatis serrato-aculeatis glabris incurvis, fruct. reflexis. Gmel. sib. 3. p. 169. Hab. in imperio Ruthenico. Flor. lutei. Caul. laevis.

38. *verum (luteum)*, fol. octonis linearibus sulcatis, flor. paniculatis, ramis floriferis brevibus. Hab. in sylvaticis ad versuras agrorum. ¶

39. *Mollugo*, nitidum, fol. octonis ovato-linearibus subserratis reflexis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. Flor. dan. t. 455. β. pubescens. Schrad. spic. p. 16. Cresc. in pratis, ad sepes, vias. Flor. citrini, albi.

40. *lucidum*, caespitosum, fol. verticillatis suboctonis breviusculis patulis nitidis rigidis linearibus, caul. erecto, cortice basi secedente emarcescente. Allion. pelem. n^o. 21. t. 77. f. 2. *G. rigidum*. Vill. delph. 2. p. 319? Hab. in Europa meridionali, locis siccis petrosis. Praecedenti affine.

41. *elatum*, caul. elongato valido: geniculis tumidis, fol. suboctonis obovatis breviusculis opacis, panic. densa. Thuill. paris. p. 76. Cresc. in dumetis, ad sepes. Flor. albi. Inter *G. Molluginum* et sequentem media species. ¶

42. *sylvaticum*, fol. octonis lanceolatis laevibus subtus scabris floralibus binis, pedunc. capillaribus, caul. laevi stricto: genicul. tumidis. Lin. *G. laevigatum*. Villars? Hab. in sylvia. Flor. primo penduli.

43. *linifolium*, fol. subseptenis linearilanceolatis laevibus, pedunc. capillaribus, caul. erecto tetragono. Allion. Kew. 3. p. 144. Hab. in Europ. australi. ¶

44. *rigidum*, fol. verticillatis linearibus supra scabris, paniculis divaricatis, caul. erecto tereti piloso-scabriusculo. Ait. Kew. 3. p. 144. Hab. ¶

45. *aristatum*, fol. octonis lanceolatis laevibus, panic. capillari. petalis aristatis, acm. glabris. Syst. veget. boec. mus. 83. t. 75. Hab. in Baldo. ¶

46. *obliquum*, fol. octonis angustis, inferioribus cano-lutis superioribus glabris, cor. aristatis. Vill. Delph. 2. p. 320. t. 8. Hab. in pascuis, locis aridis lapideis in Delphinatu. A. G. scabro ob petala omnino diversum videtur.

47. *glomeratum*, glabrum, fol. octonis linearibus serratis, caul. aspero paniculato, petal. aristatis, sem. glabris. Desf. At. 1. p. 128. Hab. in Barbaria inter segetes.

48. *hierosolymitanum*, fol. denis lanceolato-linearibus, umbellis fastigiatis, fructibus glabris. L. Hab. in Palaestina. †

49. *glaucum*, caul. tereti, fol. linearibus margine revolutis subtus laevib., ramis pe-

dunculisque trichotomis, cor. campanulatis. Jacq. aust. t. 81. Hoff. germ. p. 73. Hab. in Germania. Cor. magna.

*** *Fructu hispido.*

50. *boreale*, fol. quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, sem. hispidis. Hab. in pratis, sylvis.

51. *rotundifolium*, fol. quaternis subrotundo-ovatis trinerviis hispido-ciliatis. Willd. Roth. germ. II. 185 G. decipiens. Ehrh. herb. 63. Borc. sieul. 10. t. 6. f. 1. Mor. s. g. t. 21. f. 5. In montosis nemorosis.

52. *bermudianum*, fol. quaternis linearibus obtusis, caule ramosissimo Sp. pl. 153. Hab. in Virginia.

53. *lappaceum*, fol. quaternis hispidis oblongis acuminatis, pedunc. 1-floris, fructibus lappaceis. Flor. Per. t. p. 59. Hab. in Peruvia. Herbacea, subscandens.

54. *ericoides*, fol. subquinis oblongis hispidis, margine revolutis, fructib. echinatis sessilibus et axillaribus. Lam. encycl. 2. p. 577. Hab. in Monte Video Brasiliæ.

55. *hispidulum*, pumilum ramosissimum cum fructu hispidum, fol. quaternis subovali-lanceolatis margine revolutis subrugosis. Michaux, p. 80. Hab. in Carolina inferiore.

56. *punctatum*, caule subaspro, fol. quaternis ovalibus obtusis i. ermis margine nervisque subpubescentibus punctatis, fructib. lappaceis. Mich. l. c. Hab. in Carolina inferiore. Flor. purpurei. G. purpureum. Walter.

57. *circaezans*, caule erecto laevi, fol. quaternis ovalibus planis inermibus, margine ciliato, pedunc. divaricatis paucifloris, fruct. cernuis lappaceis. Michaux Cresc. cum prior.

58. *triflorum*, caule procumbente basi hispidulo, fol. 6 ovali-lanceolatis mucronatis laevibus, pedunc. lateralibus et terminalibus trifloris, fructu hispido. Mich. l. c. In sylvis umbrosis Canadæ.

59. *zetaceum*, fol. scuis lineari-subulatis glebris denticulatis, caule laevi subtereti, fructib. hispidis. Lam. III. p. 264. enc. 2. p. 584. Desf. Atl. p. 129. In Hispan. et Barbar.

60. *provinciale*, fol. 6-8 linearib. rigidis margine scabris, panic. parvis tetramalibus. Lam. l. c. Hab. in Gallia australi et Italia.

61. *divaricatum*, fol. subsenis linearibus hispidis, ramis divaricato-dichotomis.

Lam. l. c. Hab. in Galliae arenosis et petrosis.

62. *tunetanum*, caule tereti canescente, fol. 8-12 linearib. pubescentibus margine revolutis asperis, sem. hispidis. Desf. Atl. 1. p. 129. Lam. III. p. 263. Hab. in Algeria in sepihus. Facies G. veri. L.

63. *ruthenicum*, fol. suboctonis linearibus scabris mucronatis, margine revolutis, caule pubescente, pedunculis germinibusque hirs. Willd. 7. p. 597. Hab. ad Wolgam inferiorem. T. Facie et magnitudine G. lutei. Flores albid. W.

64. *Aparine*, fol. octonis lanceolatis carinis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis. Flor. dan. 495. In Europae cultis et ruderalis, ad sæpes. ☉

65. *aparinoides*, fol. scuis oblongis margine carinaque retrorsum aculeatis, geniculis glabris. Vahl. symbol. 2. p. 30. Forck. descr. p. 30. Hab. in umbrosis Arabiæ.

66. *album*, fol. suboctonis oblongis inermibus margine scabris, caule pubescente herbarum lacri. Vahl. l. c. Hab. Smyrnae.

67. *microcarpum*, fol. subsenis; inferioribus oblongis, superioribus setaceis, pedunc. trifidis. Vahl. symb. Hab. in montosis aridis Tuncii, rarius in Hispania. Smil. G. parisiensis.

68. *pariense (tenerum)*, fol. linearibus subsenis cauleque scabris, pedunc. bifloris, fructibus hispidis. Gallium parisiense tenuifolium, flore atropurpureo? Tournef. G. anglicum. Hud. Smith. brit. 1. p. 179. Raf. angl. 3. t. 6. f. 1. Hab. in Anglia Hispania, Helvetia, Gallia, in arcuosis.

*** *Fructu villosa.*

69. *pilosum*, fol. quaternis subovalibus pilosis enerviis, seminib. pilosis. Ait. Kew. 1. p. 145. In Amer. boreali.

70. *maritimum*, caule hirs. fol. quaternis hispidis, pedunc. unifloris, fructibus villosis. Gouan. illust. 5. Hab. in Oriente, Monspelii.

71. *praecum*, hirs. fol. subsenis linearilanceolatis, caule lignosis. L. Hab. in Cretae rupibus. h. Caules varie flexi, tortuosi, lignosi.

72. *capillare*, caule tenui 4-gono, fol. octonis, fructu minime albo-tomentoso. Cav. ic. 2. p. 73. t. 1. f. 1. Hab. in Hispaniae monte St. Michaelis et in colle Montana verda. Cor. rubens. ☉

VALANTIA.

242. VALANTIA. Flor. polygami. *Hermaphr. Cal. o.* (subinteger, Juss.) *Cor. 4-fida. Styl. 2-fidus. Sem. 1* : altero sæpius abortivo. *Flor. Masculini. Cor. ut plurimum trifida, et 3-4-andra* : pistillo abortivo. (Fol. an Bractææ? post anthesin reflectuntur et fructum obtegunt.)

1. *Cruciata*, fol. quaternis ovatis hirsutis, pedunc. lateralibus diphyllis, flor. masculis ut plurimum 4-fidis. Lin. Gal. cruceatum. Smith. brit. 1. p. 173. Sowerb. engl. bot. t. 143. Hab. ad sæpes, in sylvaticis. \mathcal{T}

2. *glabra*, flor. masculis 4-fidis, pedunc. dichotomis, fol. 3-nerviis ovalibus ciliatis. Scop. carn. p. 344. Schkuhr. Handb. t. 345. Hab. in Carinthiæ, Italiæ et Ungariæ umbrosis. Priore tenerior, et fere glabra. \mathcal{T}

3. *articulata*, flor. masc. 4-fidis, pedunc. dichotomis aphyllis, flor. cordatis. Hort. ups. p. 303. Hab. in Aegypto. Syria et Mauritania. Fructu maturo, caulis ad articulos discedit. L.

4. *muralis*, tota glabra, flor. masculis trifidis, fructu laevi. Moris. s. g. t. 29. f. 2. Col. cephr. 1. p. 298. t. 297. Hab. in Gallia meridionalis et Italiæ muris. \odot

5. *hispida*, flor. masc. trifidis, caul. fructibusque hispidis. Lin. In Europa australi.

6. *Aparine*, pedunc. trifloris, flore intermedio sessili, lateralibus masculis trifidis subpedicellatis, fructu tuberculato. Vaill. parisi. t. 4. f. 3. h. Cresc. passim inter segetes. Facies Galii Aparines. Caul. scalar. Fol. antrorsum aculeata. Roth. \odot

7. *spuria*, pedunc. trifloris, flor. omnibus pedicellatis, fructu (majusculo) granulato reflexo, caul. decumbente simplici aculeato. Galium spurium auct. G. tricornis. Smith. Valantia tricornis Roth. N. Bot. Beytr. p. 142. Vaill. parisi. t. 4. f. 3. a. a. In agris frequens. Fol. retrorsum aculeata.

8. *cordata*, fructibus subrotundis bractea lata cordata obtectis. Hab. ... Sub sequentis nomine passim occurrit.

9. *Cucullaria*, caul. ramosissimo multifloro, bract. pedicellatis ovatis fructum lineare involventibus. Buxh. cent. 1. p. 13. t. 19. f. 2. Hab. in Hispania et Oriente.

Obs. Ob fructus formam peculiare hac ex specie constitui meretur genus.

243. CRUCIANELLA. *Cor. 1-petala, infundibuliformis* : tubo filii

formi; limbo unguiculato. *Cal. 2-phyllus. Sem. 2, linearia.*

1. *angustifolia*, erecta, fol. senis linearibus, floribus spicatis. Lin. Hab. Monspelii

2. *latifolia*, procumbens, fol. quaternis lanceolatis, floribus spicatis. Lin. C. priore.

3. *ægyptiaca*, fol. quaternis sublinearibus; flor. spicatis quinquefidis. Mant. Hab. in Aegypto. \odot

4. *patula*, diffusa, fol. margine revolutis, bracteis linearibus subulatis scabrisculis, flor. sparsis. Will. sp. pl. 602. Hab. in Hispania. \odot

5. *pubescens*, erecta, fol. subsenis linearibus pubescentibus, capitulis pedunculatis axillaribus et terminalibus. Willd. l. c. Hab. in Creta. Cor. purpurascens pube tenui tectæ. W.

6. *maritima*, procumbens suffruticosa, fol. quaternis mucronatis, florib. oppositis quinquefidis. Lin. In Creta et Monsp.

7. *capitata*, procumbens suffruticosa, fol. senis sublinearibus, flor. capitatis quinquefidis. Billardiere icon. pl. Syr. Decas. 1. p. 12. t. 3. Hab. in Monte Libano. Flores atrii, capitati.

8. *monspeliaca*, procumbens, fol. acutis caulinis quaternis ovatis; ramis linearibus, flor. spicatis. Lin. Hab. Monspelii, inque Palæstina. \odot

244. RUBIA. *Cor. 1-petala, campanulata, 4-5-fida. Baccæ 2, monospermae.* (Stam. 4-5.)

1. *tinctorum*, fol. lanceolatis aut senis annuis, caule aculeato scandente. *P. sylvestris*, fol. inferioribus senis, superne quaternis binisve, utrinque asperis. Mill. Hab. Monspelii, in Italia, Helvetiæ, Danubii pratis. Flor. 4-5 foli.

2. *aculeolata*, caul. laevi hexagono, fol. petiolatis ovato-lanceolatis retrorsum aculeatis. Cav. ic. 2. p. 75. t. 195. Hab. in Madras. Fl. Dec. Cor. 5-partita. Stam. 5. Cal. o, uti in quibusdam aliis. \mathcal{T}

3. *chilensis*, fol. annuis quaternis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris, caule laevi. Willd. p. 604. Molin. chil. p. 118. An Galium crocum. Flor. Per. Feuil. peruv. 85. t. 45. Hab. in regno chilensi. \mathcal{T}

4. *peregrina*, fol. subquaternis perennantibus linearibus supra laevibus, caul. aspero. R. tinctorum. Wither. Moris. sect. 9. t. 21. f. 2. Hab. in Gallorum Montè Pilati,

Ingulni, Nicarac, inque Anglia, Russia. Flor. 5-fidi atam. 5. Sun. \mathcal{T}

5. *lucida*, fol. perennantibus (4-6) ellipticis lucidis, caule laevi. Hab. in Majorca. Similis *R. peregrinae*, sed folia margine tantum retrorsum seabra, non vero carina. Flor. 5-fidi. Stg. 2, capitata.

6. *fruticosa*, fol. perennantibus ellipticis margine carinaeque seulptatis, caule frutescente aspero. Ait. Kew. 1. p. 147. Jacq. ic. rar. 1. 1. 25. Collect. 1. p. 71. Hab. in fruticetis Tenerifac. \mathcal{h}

7. *angustifolia*, fol. perennantibus linearibus supra scabris, caul. diffuso. Mant. p. 39. Lam. ill. gen. t. 60. f. 2. Hab. in Minorea. Flores lutei, 5-fidi.

8. *cordifolia*, fol. perennantibus quaternis cordatis. Pall. itin. 3. app. n°. 68. 1. 1. 65. 1. Hab. in Maiorca, Cap. b. spei, Sibiria, China, Japonia. \mathcal{T}

9. *Browni*, subhispida, fol. quaternis ovalibus, pedunculis solitariis uniflor. Mich. Fl. 1. p. 81. Brown. jam. p. 141. Valantia hypocarpia. Lin. Hab. in Carolinae umbratis.

245. MATTUSCHKEA. *Cal.* 4-partit. *Cor.* infundibulif. 4-fida. *Sem.* 4, nuda.

1. *hirsuta*. Willd. sp. 1. p. 606. Vahl. symbol. 3. p. 11. Perama hirsuta. Aubl. gujan. 1. p. 54. t. 18. Lam. ill. 4. 68. Hab. in Gujanae locis humidis arenosis. \odot

246. SIPHONANTHUS. *Cor.* 1-petala, infundibulif. longissima, infera. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* 4, monosperma.

1. *indica*. Willd. sp. 606. S. salicis folio, flore flavescente. Amm. Aet. petrop. Lam. ill. p. 318. t. 79. f. 1. Hab. in America meridionali. Racemus terminalis.

247. ROUSSEA. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* campanulata, 4-fida, infera: lacin. revolutis. *Bacca* 4-angularis polysperma.

1. *simplex*. Smilb. icon. ined. 1. p. 6. t. 6. Hab. in insula Mauriti. \mathcal{h}

248. FROELICHIA. *Cal.* superus 4-deutatus. *Cor.* tubulosa. *Bacca* 1-sperma exsucco. *Semen* arillatum.

1. *paniculata*. Willd. sp. 1. p. 607. Billardieria paniculata. Vahl. eclog. 1. p. 13. t. 10. Hab. in insula Trinitatis. \mathcal{h}

249. SCOLOSANTHUS. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* tubulosa, limbo revolutato. *Drupa* monosperma.

1. *versicolor*. Willd. l. c. Vahl. eclog. 1. p. 11. t. 10. Catesbaea parviflora. Lam. ill. t. 67. f. 2. Hab. in insula St. Cracis. \mathcal{h}

250. CATESBEA. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis, longissima spera. *Stam.* intra faucem. *Bacca* polysperma, bilocularis.

1. *spinosa*, cor. tubo tetragono abbreviato, baccis subrotundis. Swartz. Catesb. carol. 2. p. 100. t. 100. Hab. in insula Providentiae. \mathcal{h}

2. *parviflora*, cor. tubo tetragono abbreviato, baccis subrotundis. Swartz. Vahl. eclog. 1. p. 12. Sloan. hist. 2. p. 100. t. 207. f. 1. Hab. in Jamaica. \mathcal{h}

251. IXORA. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis longa. *Stam.* supra faucem. *Stigm.* 2-fidum crassum. *Bacca* 4-sperma.

1. *coccinea*, fol. sessilibus ellipticis obtusis mucronatis, corymbis terminalibus. Willd. sp. 1. p. 609. Burm. zeyl. 125. t. 57. Rumph. amb. 4. p. 105. t. 46. Rheed. mal. 2. p. 17. t. 11. Hab. in India. Caulis ruber. \mathcal{h}

2. *parviflora*, fol. subsessilibus lanceolato-oblongis, panicula terminali. Vahl. symbol. 3. p. 11. t. 52. Cum priore.

3. *alba*, fol. ovato-lanceolatis, florib. fasciculatis. Pluck. alm. Rheed. mal. 2. p. 19. t. 14. In India. \mathcal{h}

4. *Pavetta*, fol. ovato-lanceolatis undulatis obtusis petiolatis, flor. corymbosis. Andrew. t. 78. Hab. in India. Flor. o-lorati, lutescentes.

5. *ternifolia*, fol. ternatis lanceolatis subsessilibus, flor. fasciculatis coccineis. Cav. ic. 4. p. 3. t. 305. Hab. in Nova Hispania.

6. *americana*, fol. ternis lanceolato-oratis, flor. thyrsoidis. Amoen. acad. 5. p. 393. Hab. in Jamaica. \mathcal{h}

7. *fasciculata*, fol. ovato-ellipticis, ramulorum subfasciculatis, pedunculis filiformibus subtrifloris. Swartz. profr. 30. Chomelia fasciculata. Swartz. fl. ind. oct. 1. p. 238. Hab. in Jamaica. \mathcal{h}

8. *multiflora*, fol. lanceolato-oratis fasciculatis, pedunc. aggregatis unifloris breviss.

simis, bacca monosperma. Swartz. prod. 30. Hab. in Jamaica. h

Obs. An huius quoque generis *Lonicera corymbosa* L.? Lamiæ inter hoc et sequens genus non satis distincti extant. Ambo hinc a ecl. Lamarckio coniunguntur. Vid. ill. gen. p. 285.

252. PAVETTA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Stigm.* incrassatum, curvum. *Lin.* *Bacca* 1-locularis, 1-2-sperma.

1. *amplexicaulis*, glabra, fol. amplexicaulis ovalibus, corol. laciniis acutè lanceolatis. Hab. in India orientali.

2. *indica* (obtusæ), fol. subspicatis obovalibus, cor. laciniis rotundatis. Cum priorè, quæcumque sapienter confunditur. De Pavetta indica L. vide. Willd. sp. 1. p. 128. *Ixora paniculata*, Lam. ill. p. 205? h

3. *villosa*, ramis calycibusque villoribus incanis, fol. lanceolato-ellipticis, floribus fasciculatis. Vahl. symbol. 3. p. 12. Hab. in Arabia felici. h

4. *longiflora*, ramis glabris, fol. lanceolato-ellipticis, stipulis intus pilosis, calycibus quadrifidis, flor. fasciculatis. Vahl. symb. 3. p. 12. *Ixora occidentalis*. Forsk. Hab. in Arabia felici. h

5. *caffra*, fol. obovatis, flor. subumbellatis, calycibus setaceo-aristatis. Thunb. pr. 29. Lin. suppl. 121. *Crinita capensis*. Houtt. t. 40. f. 1. Hab. ad Cap. b. speci. h

6. *pentandra*, fol. oblongo-lanceolatis acuminatis, panic. trichotoma axillari, flor. pentandris. Willd. p. 611. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 233. Plum. ic. t. 156. f. 1. Hab. in India occidentali. Flor. suaveolentes. h

253. ERNODEA. *Cor.* 1-petala hypocrateriformis. *Cal.* 4-5-partitus. *Bacca* 2-locularis. *Sem.* solitaria.

1. *littoralis*, fol. lanceolatis 5-nerviis, floribus sessilibus. Lam. ill. p. 276. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 223. t. 4. Sloan. hist. t. 189. f. 1. et 2. Hab. in Jamaica, in Insul. Carib. h

2. *pungens*, fol. lanceolatis rigidis multinerviis mucronato-pungentibus, flor. pedunculatis. Lam. 1. e. Hab. in Amer. meridionali. *Cal.* 5-fidus.

Obs. An *Ernodene* eum sequente genere potius ad *Ixoras* aut *Pavettas* pertinent? Plura hæc Rubiaceæ genera, inter se

nimis effinia, in *vivis* denuo accuratius examinari debent, quo characteres firmiores eruantur.

254. SIDERODENDRUM. *Cor.* tubulosa. *Cal.* 4-dentatus. *Sigm.* 2, revoluta. *Bacca* dicocca 2-locul. *Sem.* solitaria.

1. *triflorum*. Vahl. eclog. 1. p. 10. Jacq. amer. 19. t. 175. f. 9. Pluck. alm. 346. t. 224. f. 2. Hab. in sylvia montis Martinie et Monserrat. Arbor procera. *Cor.* sæpe mutatur in folliculum oblongum forte ab insecto quodam. V. h

255. HOFFMANNIA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* hypocrateriformis, 4-partita, tubo brevissimo. *Filam.* 0. *Anth.* conniventes. *Bacca* bilocularis polysperma infera.

1. *pedunculata*. Swartz. fl. ind. oce. 1. p. 242. Hab. in Jamaica. h

256. CHOMELIA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* hypocrateriformis 4-partita. *Drupa* infera nuce 2-loculari. *Stigm.* 2, crassiuscula.

1. *spinosa*. Jacq. amer. 18. t. 13. Hab. in Carthagenæ sylvaticis. Arbor ramis horizontalibus. h

257. PETITIA. *Cal.* 4-dentatus inferus. *Cor.* 4-partita. *Drupa* nuce 2-loculari.

1. *domingensis*. Jacq. amer. 14. t. 182. f. 6. Hab. in Domingo sylvaticis. Arb. boscula ramis tetragonis striatis. h

258. MYONIMA. *Cal.* minimus subinteger. *Cor.* 4-partita tubo brevi. *Drupa* nuce 5-locul. 4-sperma.

1. *obovata*, foliis obovatis acuminatis. Willd. sp. 1. p. 614. Lam. encyclop. t. 68. f. 1. Hab. in insula Borbonia. h

2. *lanceolata*, fol. lanceolatis. Willd. Lam. t. 68. f. 2. Hab. in insula Borbonia. h

259. PYROSTRIA. *Cal.* minimus sub 4-dentatus. *Cor.* campanulata 5-fida faucē tomentosa. *Drupa*, pyriformis infera, 8-striata. *Nuces* 8, monosperma.

1. *salicifolia*. *Pyrostria* Lam. t. 68. f. 4. Hab. in insula Mauriti. h

260. MELANEA. *Cal.* 4-dentatus.

Cor. infundibuliformis, 4-fida.
Drupa infera nuce 2-locul. *Stylus*
2-fidus.

1. *sarmentosa*. Cunninghamia: caule
secundante; fol. oppositis obovatis obtusis sub-
tus tomentosis. Willd. sp. 1. p. 615. Melanes
sarmentosa. Lam. encycl. 3. p. 653. t. 66. f. 2.
Aubl. guj. 1. p. 106. t. 41. Hab. in Gujana. h

2. *verticillata*, caule erecto, fol. ternis
glabris oblongis, acuminatis. Willd. l. c.
Lam. t. 66. f. 1. Antirhea borbonica. Gmel.
Juss. Hab. in insulis Mauritiis et Bourbonia. h

261. *ÆGIPHILA*. *Cal.* 4-dentatus.
Cor. 4-fida. *Styl.* filiformis se-
mibifidus. *Bacca* 2-locularis: lo-
culis 2-spermis.

1. *martinicensis*, fol. ovato-lanceolatis
acuminatis glabris, ramis diffusis, panic.
terminalibus axillaribusve, calycib. glabris.
Swartz. prod. 151. Jacq. obs. 2. p. 3. t. 27.
Lam. ill. gen. t. 70. f. 1. In Martinica ad
stylarum margines. h

2. *arborescens*, fol. ellipticis acuminatis
glabris planis, corymb. axillaribus, cal.
ramisque inconis. Vahl. ecl. 1. t. 10. Ma-
nabca. Aubl. t. 24. Hab. in Gujana et ius.
Trinitatis. h

3. *villosa*, corymb. axillaribus termina-
libusque, fol. ellipticis o-lanceolatis subtus
pedunc. calicibusque villosis incanis. Vahl.
l. c. Manabca. Aubl. p. 62. t. 23. In Caje-
nne campis aridis. Priori affinis. h

4. *laevis*, fol. ovatis acuminatis glabris,
cymis capitatis tripartitis axillaribus, fructi-
bus oblongis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 66.
t. 25. Aeg. lutea. Lam. ill. t. 70. f. 3. Hab.
in sylvis Gujanae. h

5. *foetida*, fol. ovato-lanceolatis, subtus
petiolisque hirsutis, pedunculis axillaribus
solitariis. Swartz. prod. 32. Hab. in Ja-
maica. h

6. *trifida*, fol. ovato-lanceolatis glabris,
pedunculis axillaribus trifidis confertis. Sw.
prod. 32. Hab. in Jamaica. h

7. *multiflora*, fol. oblongis, flor. axilla-
ribus. Flor. Per. 4. p. 50. t. 76. Hab. in
Peruvia ad fluviorum margines. Fruter
ligno durissimo, et Corni habitus.

262. *NUXIA*. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 1-
petala, 4-fida. *Stam.* in fauce.
Stigm. truncatum. *Caps.* carnosa,
disperma: Lam.

1. *verticillata*, fol. ternis verticillatis.
Lam. ill. gen. t. 71. Hab. in ins. Bourbonia,

27 *elata*, fol. ellipticis acuminatis sub-
membranaceis oppositis. Aegiphila elata.
Swartz. Flora 1. p. 254. Brown. Jam. t. 3.
f. 3. Incult. fruticosa Jamaicae. Stam. ex-
serta. Pistill. abbreviatum. Sw.

263. *MITCHELLIA*. *Cor.* 1 - petala
superæ, hinc eidem germini.
Stigm. 4. *Bacca* bifida, 4-
sperma.

1. *repens*. Chamaedaphne. Mitch. gen.
27. Pluck. amalth. 198. t. 443. f. 2. Carib.
catal. 1. p. 20. t. 20. Hab. in Carolina,
Terra Mariana, Virginia. h

264. *COCCOCYPSILUM*. *Cal.* 4-
dentatus. *Cor.* infundibuliformis.
Stylus semibifidus. *Bacca* inflata,
2-locularis, polysperma. Sem.
lentiformia, libera.

1. *repens*, caule herbaceo repente, foliis
ovatis, flor. confertis axillaribus sessilibus,
Willd. sp. 1. p. 618. Swartz. prod. 31.
Brown. jam. 144. t. 6. f. 2. Hab. in montosis
Jamaicae. h

2. *Condalia*, caul. herbaceo repente,
fol. ovatis acutis, flor. umbellatis. Condalia
repens. Flor. peruv. 1. p. 54. t. 84. Hab. in
Peruviae nemorosis.

3. *lanceolatum*, caul. herbaceo rali-
cante, fol. lanceolatis integerrimis, pedunc.
multifloris. Fl. Per. l. c. Sub Condalia. Cum
priori in umbrosis.

4. *sessile*, caul. erecto suffruticoso, fol.
oblongis acutis, flor. sessilib. congestis axil-
laribus. Fl. Per. l. c. Sub Condalia.

5. *obovatum*, caul. erecto suffruticoso,
fol. obovatis acuminatis, pedunc. aggrega-
tis, flor. racemosis. Fl. Per. l. c. In memori-
bus Andinum ad Chincho montes.

6. *uniflorum*, caule erecto fruticoso, fol.
obovatis acuminatis, pedunculis axillaribus bis-
sifloris, stigmatib. capitatis. Willd. Fernelia
buxifolia β. Lam. encycl. 2. p. 448. t. 67. f. 1. Hab. in ins. Mauritiis. h

7. *bisflorum*, caule erecto fruticoso, fol.
ovatis acutis, pedunculis axillaribus bis-
sifloris, stigmatibus subulatis. Willd. Fernelia
buxifolia α. Lam. enc. 2. p. 448. t. 67. f. 2.
Hab. in insula Bourbonia.

265. *GONZALEA*. *Cal.* campanula-
tus, 4-dentatus. *Cor.* infundibu-
liformis. *Drupa* nuce 4 poly-
spermas includens.

1. *pendula*, fol. ovatis subcrenatis, ra-

mis pendulis. *Gonzalagunia* dependens. Flor. Per. 1. p. 56. t. 86. Hab. in Scranaë nemoribus. Cor., etiam sequentis, subto- mentosa rubella. h

2. *panamensis*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis, stigma 4-fido. *Buena*. Cav. ic. 6. p. 50-51. t. 571. Hab. in Panama. h

265. *HIGGINIA*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 4-partito. *Stigma* 2-labiatus prominens. *Bacca* bilocularis, bisulca, umbilicata, polysperma.

1. *aggregata*, fol. oppositis lanceolatis, pedunc. aggregatis verticillatis. Flor. Per. 1. p. 55. t. 83. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. h

2. *obovata*, fol. oppositis obovatis acuminatis, pedunc. aggregatis multifloris inaequalibus. Flor. Peruv. p. 56. t. 85. Cresc. in provincia Panatabuarum locis umbris. h

3. *verticillata*, fol. ternis lanceolatis, pedunc. solitariis dependens subquadri- floris. Flor. Per. 1. p. 55. t. 85. f. a. In Muna nemoribus per runestationes. h

Obs. An hujus generis *Bertiera*. Aubl. ? vid. Willd. sp. 2. p. 980.

267. *WALLERIA*. *Cal.* 4-fidus, inferus, laciniis obtusis. *Cor.* tubu- losa, 4-fida: lacin. erectis. *Bacca* 1-sperma.

1. *laurifolia*. Swartz. Flor. 1. p. 248-249. t. 6. Bryonia nigra fruticosa, fol. lauri- mit. Sloan. hist. 2. 234. t. 145. f. 5. Hab. in Jamaica, Hispaniola. h

268. *CALICARPA*. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Bacca* 4-sperma.

1. *americana*, foliis ovalibus serratis subtus tomentosis, cymis sessilibus. Lam. encycl. 1. p. 556. Pluck. alm. 31. t. 136. f. 3. Catesb. carol. 2. p. 47. t. 47. Hab. in Caro- lina, Virginia. *Cal.* cylindricus, vix qua- didentatus. h

2. *cana*, fol. ovatis denticulatis per petiolum semidecurrentibus, subtus villosis- canis, paniculis diebotomis. Vahl. symb. 3. p. 12. Retz. obs. 5. p. 1. Hab. in Malaba- ria, Cochinchina. h

3. *lanata*, fol. ovatis basi rotundatis in- tegerrimis subdenticulatis, supra rugosis subtus ramisque lanato-tomentosis. Vahl. 1. c. p. 13. *C.* tomentosa. Lin. Hab. in India. h

4. *macrophylla*, fol. lanceolato-elliptici-

crenatis attenuatis, supra rugosis, subtus ra- misque tomentoso-incanis. Vahl. p. 13. t. 53. Hab. in India. h

5. *globiflora*, fol. oblongo-lanceolatis diutato-serratis integerrimis, cymis die- botomis. Flor. Per. 1. p. 49. t. 77. Hab. in Chinchao nemoribus. h

6. *cordifolia*, fol. cordatis ovatisque acutis integerrimis, cymis brachiatis. Flor. Peruv. 1. p. 50. t. 77. f. a. Cresc. in Munna nemorib. Hirsuta. h

7. *ferruginea*, fol. lato-lanceolatis ser- ratis subtus scabrisculis, cymis termina- libus axillaribusque. Swartz. prod. 31. Hab. in Jamaica. h

8. *reticulata*, fol. elliptico-lanceolata subserratis reticulato-nervosis, subtus to- mentoso-incanis. Swartz. prod. 61. Flor. 1. p. 252. Hab. in Jamaica. h

9. *longifolia*, fol. lato-lanceolatis utrin- que glabris, superne serratis. Vahl. symb. 3. p. 13. Lam. encyc. p. 556. t. 69. f. a. Hab. ad Malaccam. h

10. *integrifolia*, fol. ovatis acutis inte- gerrimis, subtus subtomentosis, racemis densis axillaribus et terminalibus, tubo co- rollae calyce quadruplo longiore. Willd. p. 621. Jacq. amer. 15. tab. 173. f. 7. Hab. in sylvaticis Carthagenae. h

11. *villosa*, fol. oblongo-ovatis integer- rimis, subtus venoso-reticulatis villosis, racemis axillaribus, pellic. multifloris. Vahl. symbol. 3. p. 14. Habit. in India orientali. ? h

12. *japonica*, fol. oblongis acuminatis medio serratis glabris. Willd. Thunb. jap. 60. Hab. in Japonia. h

269. *AQUARTIA*. *Cal.* campanula- tus. *Cor.* rotata: laciniis linea- ribus. *Bacca* polysperma.

1. *aculeata*, foliis rejanis tomentosis. Willd. p. 621. Jac. amer. 15. t. 12. Lam. ill. t. 82. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. *Stigm.* numero solummodo a *Solanis* differt. h

2. *microphylla*, fol. minimis integris subnudis, aculeis subgeminatis patentibus. Lam. 1. c. p. 327. t. 82. f. 2. Hab. in St. Domingo. *Solanum* lycioides refert. h

270. *WITHERINGIA*. *Cor.* subcam- panulata: tubo quadrigibbo. *Cal.* minimus, 4-dentatus. *Bacca* 2- locularis. *Anth.* conniventes.

1. *solanacea*. L'Herit. sert. 1. 33. tab. 1.

Lam. ill. t. 82. Habit. in America meridionali. Umbel. axillares. $\overline{\text{U}}$

271. MYRMECIA. *Cal.* campanulatus, 5-dentatus. *Cor.* tubulosa: fauce inflata. *Glandul.* 5; germinis basin cingentes. *Caps.* 2-locul. 2-valv. polysperma.

1. *scandens*. Willd. sp. p. 623. Tachia gujanensis. Aubl. gujan. 1. p. 75 t. 29. Hab. in sylvis Gujanæ ad ripas rivulorum. In cavitate trunci et ramorum degunt formicae, unde nomen. Aubl. h

272. POLYPREMUM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-fida, rotata: lobis rotundatis. *Caps.* compressa, emarginata, bilocularis, polysperma.

1. *procumbens*. Willd. sp. 1. p. 623. Lam. encyl. t. 71. Michaux. Flor. 1. p. 83. Pet. gaz. 9. t. 5. f. 6. Hab. in Carolina, Virginia. Flos. plurib. bracteolis circumvallatus. \odot

273. LABATIA. *Cal.* 4-phyllus inferus. *Cor.* subcampanulata, 4-fida: laciniae 2, minute, in divisionis corollae. *Caps.* 4-locul. *Sem.* solitaria.

1. *sessilifolia*, florib. sessilibus, foliis tomentosis. Willd. sp. 1. p. 623. Habit. in Hispaniolæ fruticetis montosis. *Caps.* passim 2-locul. Swartz.

2. *pedunculata*, flor. pedunculatis, fol. glabris. Willd. Ponteria gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 86. t. 33. Habit. in sylvis Gujanæ. h

274. LASIOSTOMA. *Cal.* 5-fid. *Cor.* infundibuliformis: fauce villosa. *Caps.* 1-locul., disperma.

1. *cirrhusa*. Willd. , p. 624. Rouhamon gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 93. t. 36. Ad ripas fluminum Gujanæ. h

275. MANETTIA. *Cal.* 4-5-8-partitus. *Cor.* infundibuliformis, 4-5-partita: fauce barbata. *Caps.* oblonga, 2-locularis, 2-valvis: valvis duplicatis. *Sem.* numerosa, imbricata alata. (Stam. 4-5. Plantæ volubiles aut scandentes.)

1. *umbellata*; fol. ovatis subcordatis-

que, stipulis connatis acuminatis, pedune. umbellatis multifloris. Flor. Per. 1. p. 58. t. 50. f. 2. Hab. in Munna nemorib.

2. *mutabilis*, pubescens, fol. ovatis oblongisque acuminatis, stipulis semicircularibus, flor. subracemosis lateralib. Flor. Per. l. 2. t. 89. (M. racemosa.) *Cal.* plerumque 4-5-partitus, saepe 8-10-partitus.

3. *acutiflora*, fol. lanceolatis acutissimis connatis acuminatis, pedune. 1-3-floris. Flor. Per. 1. 89. f. b. In Peruviae nemoribus. Glabra.

4. *Lygistum*, fol. ovatis acutis venosis, caule volubili suffrutescente. Swartz. Flor. Ind. occid. 1. p. 323. Potesia *Lygistum* l. Brown. jam. 142. t. 3. f. 2. Hab. in Jamaica, in montibus alius. $\overline{\text{U}}$

5. *coccinea*, fol. ovatis acuminatis, racemis multioris, caule volubili fruticoso. Willd. sp. 1. p. 625. Nacibeia coccinea. Aubl. gujan. 1. p. 96. t. 37. f. 1. Habit. in Gujana. h

6. *picta*, fol. ovatis acutis, calyce quadridentato, caule volubili fruticoso. Willd. Aubl. guj. 1. p. 98. t. 37. f. 2. Hab. in Gujana. Folia luteo-variegata. h

7. *lanceolata*, fol. lanceolatis, calyce quinquesido inequali, florib. pentandris, caule erecto. Willd. Vahl. symbol. 1. p. 12. Hab. in montibus altioribus Hadie. h

276. TONTANEA. *Cal.* 4-fid. superus. *Cor.* 4-fida. *Nect.* margo 4-lobus stylum cingens. *Caps.* 2-locul. 2-partibilis polysperma.

1. *repens*. Tontanea gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 108. t. 42. Lam. ill. t. 64. Bellardia. Willd. sp. 1. p. 626.

277. PENÆA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* campanulata. *Stigm.* 4-lobum. *Caps.* tetragona, 4-locularis, 8-sperma.

1. *Sarcocolla*, fol. ovatis planis imbricatis, calyce ciliatis folio majoribus. Pluck. mant. 183. t. 436. f. 6. Willd. sp. 1. p. 626. Lam. ill. t. 78. f. 2. Hab. in Aethiopia. h

2. *mucronata*, flor. terminalibus, fol. acuminatis glabris. Thunb. prod. 30. Hab. in Aethiopia et in Cap. bon. spei cum sequentibus speciebus. Flor. rubri. Stylus tetragonus.

3. *marginata*, fol. cordatis marginatis, flor. lateralibus. Habit. juxta Capitis b. spei

fluvior. Fol. opposita s. ter. an, cordata, subsessilia obtusiuscula. *h*

4. *lateriflora*, fol. ovatis, florib. lateralibus sessilibus. Lin. suppl. p. 122. Hab. in Cap. b. spei. Fol. opposita sessilia acutiuscula. *h*

5. *tomentosa*, flor. lateralibus, fol. ovatis tomentosis. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei. *h*

6. *fucata*, fol. rhombo-ovatis, bracteis cuneatis acutis coloratis. Mant. 159. Lam. t. 78. f. 2. Hab. in Capitis b. spei montibus. Flor. purpurei. *h*

7. *squamosa*, fol. rhombo-cuneiformibus carnosiss. Mant. 331. Thunb. prod. 30. Hab. in Acthiopia, et Cap. b. spei. Cor. majuscula.

8. *fruticulosa*, fol. oblongiusculis obtusis, bracteis orbiculatis acutis. Lin. suppl. 121. Thunb. prod. 30. Ad Cap. b. spei. *h*

9. *Myrtoides*, fol. lanceolatis. Lin. sup. 122. Thunb. prod. 30. Cum priore.

278. **BILÆRIA**. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-fida. *Stamina* receptaculo inserta. *Caps.* 4-locularis, polysperma.

1. *ericoides*, antheris muticis exsertis, calycibus tetraphyllis, bracteis ternis longitudine calycis. Foliis quaternis oblongo-acrois pilosis imbricatis, cor. campanulatis. Aiton. Kew. 1. p. 149. Willd. sp. 1. p. 69. Erica Blaeria. Thunb. prod. 72. Pet. gaz. t. 2. f. 10. Hab. uti omnes sequentes species, quae frutices sunt, ad Cap. bonae spei.

2. *scabra*, antheris muticis, fol. quaternis lanceolatis piloso-hispidis, florum capitulis erectis, corollis clavatis. Erica scabra. Thunb. prod. 72. (qui hoc genus *Ericis* inseruit.)

3. *fasciculata*, antheris muticis, fol. quaternis lanceolatis ciliato scabris, capitulis erectis.

4. *articulata*, antheris muticis exsertis, fol. quaternis ovatis glabris, florum capitulis cernuis, cor. cylindricis. Lam. ill. t. 78. Erica eriocephala. Encycl. n.º. 78. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *purpurea*, antheris muticis inclusis, fol. quaternis ovatis subciliatis, florib. umbellatis, caule flexuoso erecto. Lin.

6. *muscosa*, antheris muticis subexsertis, calycib. monophyllis pilosis, corollis cam-

panulatis superne pilosis, floribus axillaribus, stigmatibus peltatis. Aiton. Kew. 1. p. 150. Erica albens. Thunb. prod. 70?

7. *pusilla*, antheris muticis, fol. ternis linearibus piloso-hispidis, flor. racemosis cernuis. Lin.

8. *glabella*, antheris aristatis, fol. quaternis oblongis glabris margine scabris, flor. aggregatis terminalibus. Blacia purpurea. Berg. cap. 34. Sebaethes. 1. p. 30. f. 20. f. 2. Hab. in Cap. b. spei.

9. *ciliaris*, antheris aristatis, fol. quaternis glabris, calyce lacero ciliato. Erica plumosa. Thunb. prod. 73. Hab. in Cap. b. spei.

279. **BUDDLEIA**. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Stamina* ex inclusis. *Caps.* 2-sulca, 2-locularis, polysperma.

1. *americana* (*Verbasci*), fol. ovato-lanceolatis serratis, stipul. subreniformibus revolutis, racemis compositis subpaniculatis. Flor. Per. 1. p. 53. t. 82. Willd. sp. 1. p. 611. Hab. in Caribaeis ad ripas et torrentes et in Peruvia. *h*

2. *occidentalis*, fol. lanceolatis integris serratisque, flor. paniculatis: spicis verticillatis. Flor. Peruv. 1. p. 53. t. 82. Pluck. alm. 270. t. 210. f. 1. Hab. in America, prope Limam. etc. *h*

3. *globosa*, fol. lanceolatis acuminatis crenatis, subtus tomentoso-albis, capitulis globosis oppositis pedunc. Lam. encyc. 1. p. 507. t. 69. f. 2. Flor. Per. 1. p. 52. t. 81. Jac. ic. rar. 2. t. 307. Collect. 2. p. 322. Hab. in Chili locis humidis. *h*

4. *incana*, fol. oblongis lanceolatisque crenulatis, stipul. marginalibus, pedunc. ternatim divisis, flor. capitatis. Flor. per. 1. p. 59. t. 80. Hab. in Peruviae ripis. Arbor 6-orgialis.

5. *connata*, fol. lanceolatis connatis crenatis, stipulis reniformibus, pedunc. solitariis capitatis. Flor. Peruv. 1. p. 52. t. 81. Hab. in Chancay segutibus et versuris. *h*

6. *diffusa*, subscandens, fol. ovatis subcordatisque acutis, stipul. reniformibus reflexis, pedunc. axillaribus, flor. capitatis. Flor. per. t. 80. Hab. in Peruv. ad agrorum margines, ubi fere semper floret.

7. *picata*, fol. ovatis utrinque acutis serratis, spicis longissimis simplicibus. Flor. Peruv. p. 53. t. 81. In versuris et locis aridis Munnae. *h*

8. *salvifolia*, fol. lanceolatis cordatis crenatis rugosis, subtus tomentosis, florib. paniculatis. Willd. p. 632. *Lantana salvifolia* fol. oppositis subsessilibus, flor. racemosis. Lin. Hab. ad Cap. b. spei. h

9. *madagascariensis*, fol. ovato-lanceolatis sultus tomentosis integerrimis, racemis terminalibus. Vahl. symbol. 3. p. 14. Lam. encycl. 1. p. 507. t. 69. f. 3. Hab. in Madagascar. h

10. *salicifolia*, fol. lanceolatis extrorsum serratis, subius tomentosis, racemis terminalibus, pedicellis multifloris, floribus nutantibus. Vahl. symbol. 3. p. 14. Hab. in Komaria?

11. *diversifolia*, fol. ovalibus glabris integerrimis subrepandisque, corymbis axillaribus subquinq. floris. Vahl. symbol. 3. p. 15. Hab. in Java. h

12. *virgata*, fol. lineari-oblongis obtusis integris, racemis terminalib., ramis virgatis erectis. Lin. suppl. 123. Hab. in Cap. bon. spei. Habitus Hyssopi. h

13. *incompta*, fol. fasciculatis ovatis canis, ramis flexuosis rigidis, racemis terminalibus. Lin. suppl. 123. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei. h

250. LINNÆA. *Cal.* superus duplex: fructus 2-phyllus; floris 5-partitis. *Cor.* campanulata. *Siam.* subdidynamus. *Bacca* sicca trilobularis.

1. *borculis*. Flor. dan. t. 3. Hab. in Suecia, Germania etc. et in Amer. boreali. *Cal.* fructus 4-phyllus? Plauta sempervirens, e fam. Caprifol. T.

251. CODONIUM. *Cal.* duplex: inferus 1-phyllus inæquale bifidus; superus turbinatus subinteger. *Cor.* campanulata. Drupa obovata. *Stigma.* capitatem.

1. *arborescens*. Von Rohr Genera plant. in Strivier af Naturhistorie Selskabet 1793. X. p. 206-207. t. 6. Arbuscula 8-10-pedalis. Ornus Lonicerae affinis.

252. EXACUM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-fida: tubo globoso. *Caps.* 2-sulca, 2-locularis, polysperma, apice dehiscens: locul. 2-spermis.

1. *viscosum*, fol. oblongis nervosis amplexicanlibus, florib. quinquefidis, bracteis cordato-perfoliatis calyce longioribus.

Smith. icon. pict. fasc. 3. t. 18. Willd. sp. p. 634. *Gentiana viscosa*. Ait. Kew. 1. p. 321. Hab. in Canaris. T.

a. *pedunculatum*, flor. quadrifidis terminalibus, calycis foliolis ovatis, fol. lanceolatis trinerviis impunctatis. Vahl. symbol. 3. p. 15. Pluck. mant. 43. t. 343. f. 3. Hab. in India orientali. ©

3. *albens*, fol. subtecurentibus, staminibus exsertis. Lin. suppl. 123. Burm. afr. 207. t. 74. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. ©

4. *aureum*, fol. sessilibus, flor. cymosis, staminibus exsertis. Lin. suppl. 123. Lam. ill. t. 80. Pluck. alm. 94. t. 275. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. ©

5. *sessile*, flor. quadrifidis lateralibus terminalibusque, capsulis nutantibus, fol. cordatis. Vahl. symbol. 3. p. 16. Hab. in Zeylona ad agrorum limites, et in sylvaticis. Caulis simplicissimus. *Cor.* subcampanulata albidus.

6. *cordatum*, flor. quinquefidis, calycis foliolis cordatis striatis. Lin. suppl. 124. *Gentiana exacoides*. Sp. pl. 332. Burm. afr. 208. t. 74. f. 5. Sch. mus. v. 1. t. 22. f. 7. Pluck. alm. 94. t. 275. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. ©

7. *punctatum*, fol. brevissime petiolatis oblongis trinerviis punctatis, stom. exsertis. Lin. suppl. 124. Hab. in India. *Cor.* coarulescens.

8. *quadrangulare*, calycib. truncatis quadridentatis quadrangularibus longitudine tubi. Willd. sp. 1. p. 636. *Gentiana quadrangularis*. Lam. encycl. 2. p. 638.

9. *guyanense*, cor. quadrifidis, calycib. membranaceis carinatis laevibus, fol. lanceolatis. Vahl. symb. 3. p. 16. Auhl. gujan. 1. p. 68. t. 26. f. 1. Hab. in Cajenna. ©

10. *diffusum*, cor. quadrifidis, calycib. membranaceis quadrifidis, fol. ovatis acutis trinerviis, caule divaricato ramoso. Willd. *Gentiana diffusa*. Vahl. symbol. 3. p. 47. Hab. in India orientali. ©

11. *tenuifolium*, cor. quadrifidis, calyc. quadripartitis, laciniis lanceolato-subulatis, panicula dichotoma. Willd. p. 638. Auhl. guj. 1. p. 70. t. 26. f. 2. Hab. in pratis humidis Cajennae, Gujanæ. ©

12. *filiforme*, cor. quadrifidis, caule filiformi subramoso, foliis radicalibus subrotundis, caulinis subulatis. W. Gentiana filiformis. In Fl. dan. t. 324. Vaill. paria. 32. t. 6. f. 3. Hab. in pratis humilissculis.

13. *aphyllum*, cor. quinquefida, caule

simplici aphylllo. Willd. *Gentiana aphylla*. Jacq. amer. 87. t. 60. f. 3. Hab. in sylvis montosis Martinicæ.

14. *heteroclitum*, cor. quadrifidis, caule alato brachiato, floribus sessilibus. Willd. p. 639. Hab. in Malabaræ agris. Stamina inæqualia 3 tria intra tubum, quartum faucis insertum. Stigma bilabiatum. An species Coutoubeæ?

15. *verticillatum*, flor. verticillatis, cor. quinquefidis, laciniis mucronatis, calycibus apice reflexis capsula longioribus, caule scabruicula simplici. Willd. p. 640. *Gentiana verticillata*. L. Vahl. symb. 3. p. 46. Plum. spec. 3. ic. 81. f. 2. Hab. in America caledoniore.

16. *hyssopifolium*, flor. verticillatis, cor. quinquefidis, laciniis acutis, calycibus capsula brevioribus, caule subramoso glabro. Willd. Retz. obs. 2. p. 15. Burm. afr. 205. t. 74. f. 3. Hab. in India orientali. Cor. fulva.

283. **CENTAURIUM**. *Cal.* 4-partitus appressus. *Cor.* subcompiculata 4-partita. *Stigm.* crassum, glandulosum subbifidum. *Caps.* (cal. et cor. persistentibus involucreta) 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *vernum*, caule simplice, cor. laciniis oblongis, stylo germinis longiore. Michaux. Flor. 1. p. 98. t. 12. f. 2. (Centaurella). Hab. in humilibus, sphagnosis Car. inferioris.

2. *autumnale*, caul. subramoso, cor. lacin. ovalibus, stylo germinis multo brevior. Michaux l. c. t. 12. f. 1. (Centaurella paniculata). Cum priore.

Obs. Plantulæ sunt graciles antecedenti generi affines, ex quo nonnullæ species forte huc referendæ.

284. **COUTOUBEA**. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 1-petala, 4-fida: *Squamæ* 4, cucullatæ. *Stigm.* bilabiatum. *Caps.* 2-valvis, polysperma.

1. *spicata*, foliis binis, spicæ floribus subsparsis. Aubl. gujan. t. 27. *G. alba*. Lam. ill. p. 319. t. 79. *Exacum spicatum*. Vahl symb. 3. p. 17. Willd. Spec. 1. p. 639. Hab. in Guiana ad ripas rivulorum.

2. *ternifolia*, fol. ternis, spic. flor. densis. Cav. ic. 4. p. 14. t. 328. Hab. in Panama. Flor. pariter albi. ☉

3. *purpurea*, caule ramoso, flor. pedicellatis axillaribus. Lam. ill. 1. c. *G. carnea*. Aubl. t. 28. *Exacum ramosum*. Vahl. l. c. Cresc. in Guiana et Cajenna in sylvis ad rivulorum ripas. Flor. purpurei.

Obs. Genus hocce, *Gentianis* affine, ab ill. Schreber (Gen. pl. p. 797.) *Ficium* denominatum est.

285. **FRASERA**. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida patens: Petala medio glandula barbata. *Caps.* compressa submarginata, 2-locularis. *Sem.* paucæ imbricata.

1. *carolinensis*. Gmel. Syst. Nat. L. 2. p. 256. Fr. *Walteri*. Michx. flor. 1. p. 96-97. Hab. in paludosis Carolinæ. Planta altissima, fol. oblongo-ovalibus oppositis verticillatisque.

286. **PLANTAGO**. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida: limbo reflexo. *Stamina* longissima. *Caps.* 2-locularis, circumscissa.

+ *Acaules*, *scapo* nudo.

* *Fol. latis*, ut plurimum *ovatis*.

1. *cordata*, fol. cordatis (?) latissimis subdentatis glabris, spica longissima fascicul. imbricata. Lam. ill. 1. p. 338. *P. canadensis*. Hort. Par. *P. Kentuckensis*, fol. lato-ovalibus subintegris, spic. flor. sparsis glomeratisque, cal. bracteisque rotundatis. Michx. Flor. 1. p. 94. Hab. in Kentucky, et Canada.

2. *cucullata*, fol. ovatis concavo-cucullatis novemnerviis subtus pubescentibus, spica cylindrica imbricata, scapo tereti alto. Lam. ill. p. 339. *P. maxima*. Ait. Jacq. ic. rar. t. 26. Willd. sp. 1. p. 642. In Sibiria. Tr.

3. *sinuata*, fol. ovatis sinuato-dentatis glabriusculis, spica cylindrica, caps. retusis. Lam. l. c. Hab. in ins. mauritiana.

4. *crispa*, fol. ovatis (basi) sinuato-dentatis undulatis subcarnosis, scapis brevissimis. Lam. ill. p. 339. Jacq. coll. suppl. p. 34. t. 16. *P. crassa*. Willd. *P. crassifolia*. Roth. Hab. in Europa meridionali?

5. *vaginata*, caule fruticoso (fol. deciduis) basi vaginato, fol. ovatis denticulatis. Vent. Jari. de Cels. p. 29. t. 29. Cresc. sponte in Mauritania. *Caps.* 1-locular. 1-sperma. h

* *bracteata*, fol. ovatis glabris in petio-

lum longum subdecurrentibus, bracteis patentibus longissimis. Moench. meth. p. 439. P. rosea, flor. expanso. C. B. Moris. s. 8. t. 15. f. 3. Var. sequentis.

6. *major*, fol. ovatis glabris, scapo teretibus, spica flosculis imbricatis. L. Willd. sp. 1. p. 641. cum varietatibus. Hab. ad vias. ☞

7. *asiatica*, fol. ovatis glabris, scapo angulato, spica flosculis distinctis. Gmel. sib. 4. n. 2. t. 37? Hab. in China, Sibiria. Retert P. majorem. ☞

8. *media*, fol. ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. Flor. dan. t. 581. In pascuis sterilibus, apricis, argillosis. Var. fol. hirsutis et spic. ramosis.

9. *virginica*, fol. lanceolato-ovatis pubescentibus subdenticulatis, floribus remotis, scapo tereti. Gisecke. ic. fasc. 1. n. 4. Michaux. flor. 2. p. 94. Moris. s. 8. t. 15. f. 8. Hab. in Virginia. Cor. subrostratum connivens. Mich. fol. semitriuvria et scapus pubescentia. ☉

10. *australis*, fol. ovato-lanceolatis subpetiolatis glabris, integris spica cylindrica. Lam. ill. p. 339. Hab. in Buenos-Ayres.

11. *tomentosa*, fol. ovatis tomentosis, scapo sulcato, spica cylindrica. Lam. l. c. p. 340. Hab. in Montevideo. Var. fol. ovato-lanceolatis.

** *Fol. plus minusve lanceolatis.*

12. *amplexicaulis*, subcanulescens, fol. lanceolatis amplexicaulibus pilosis, pedunc. axillaribus elongatis. Cav. ic. t. 125. Willd. sp. p. 650. Roth. cat. 2. p. 12. In Hispania in muro arcis Saguntinae. Bract. carinato-alatae. Sem. 2. R. Psyllium?

β? *lagopoides*, fol. lanceolatis nervosis ciliatis, caul. sulcato, pedunc. axillaribus, spic. ovatis: bracteis membranaeaeis. Desf. atl. 1. p. 133. t. 39. In Barbariae areosis.

13. *villosa*, subcanulescens, fol. linearilanceolatis, obsolete trinerviis subdenticulatis villosis-canescens, spic. subrotunda, bracteis alatis carinatis flore brevioribus. Roth. Cat. 2. p. 11. Moench meth. p. 439. Sem. 2. hinc convexa, inde plana; brunnea. R.

14. *pilosa*, fol. linearilanceolatis pilosis trinerviis integerrimis, scapo tereti pilosissimo, spic. ovato-oblonga bract. linearib. rigidiusculis squarrosa. Roth. l. c. p. 10. t. 1. Hab. in Hispania? Caps. disperma. Cor. quasi ringens. R.

15. *nutans*, subcanulescens, fol. lanceolato-acutis hirsutis, spic. subnutante copiosa bract. membranaeaeis linea nigra notatis. Poir. enc. 4. p. 381. Hab. in Malaga, Hispania. Sem. 3-4, nigra compressa. P.

16. *altissima*, fol. lanceolatis quinque-nerviis dentatis glabris, spica oblongo-cylindrica, scapo angulato scabro. Jacq. obs. 4. t. 83. Hab. in Italia. Folia sesquipedalia. ☞

17. *lanceolata*, fol. lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. Habit. in campis sterilibus. Var. scapo polystachio.

β. *sylvatica*, altior, spicis longis cylindricis.

γ. *atrata*, fol. lanceolat. subdentatis, scapo tereti hirsuto, spic. subovata nigricante. Hoppe. In Alpibus Salisburgens.

18. *capensis*, fol. ellipticis, spicae floribus distinctis. Thunb. prod. 29. Habit. ad Cap. b. spci.

19. *Lagopus*, fol. lanceolatis subdenticulatis, spica ovata albo-tomentosa, scapo tereti piloso. L. Moris. hist. 3. a. 8. t. 16. f. 13. Hab. in G. Narbonensi, Hispania.

20. *lusitanica*, fol. lato-lanceolatis trinerviis subdentatis subpilosis, scapo angulato, spica oblonga hirsuta. Lin. Viñ. Link in Schraders Bot. Journ. 1800. p. 58. Hab. in Hispania et Lusitania. Spica Pl. Lagopi, sed oblonga. ☞

21. *patagonica*, fol. lanceolato-linearibus subcanaliculatis integerrimis lanatopilosis, scapo tereti hirsuto, spicis cylindricis, staminibus tubum corollae non superantibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 306. Collect. suppl. 35. Habit. in Patagonia. Affinis sequenti. ☉

22. *albicans*, fol. lanceolatis obliquis villosis, spica cylindrica erecta, scapo tereti. L. Cav. ic. 2. t. 124? Desf. atl. 1. p. 136. Hab. in Hispaniae, Narbonae et Barbariae aridis. β? P. minuta Pall. it. 2. tab. E. fig. 1. a G. ab hac vix differre videtur. ☞

23. *argentea*, fol. angustolanceolatis integerrimis sericeis incanis, scapo laevi, spic. tereti flor. congestis. Desf. atl. p. 136. spic. ovata villosa. Lam. ill. p. 340. P. monosperma. Pourret Chlor. Narb. p. 29. Hab. in Karhar. et Gall. meridion.

24. *victoralis*, fol. linearilanceolatis pubescentibus, spic. subrotunda basi scopogae subangulato-villosis. Gerard Gall. prov. Poir. encyc. 4. p. 377. Hab. in Gall.

meridion. praesertim ad montem Victoire prope Aix.

25. *gracilis*, fol. lanceolatis serratis subnudis, spica gracili glaberrima. Poir. *enc.* 4. p. 115. Lam. *ill.* p. 341. Hab. in Barbariae collib. aridis, petrosis.

26. *interrupta*, fol. lanceolatis integris villosis, spica filiformi interrupta. Poir. *enc.* 4. p. 375. P. sparsiflora. Mich. *Cresc.* in Amer. septentr.

27. *Bellardi*, fol. lineari-lanceolatis scap. tereti hirsuto altioribus, spic. ovata. Vahl. *symb.* 2. p. 31. Willd. *sp.* 1. p. 616. scap. fol. longitudine, spic. cylindricis. Allioni *pedem.* 1. 85. P. *holostea*. Lam. Poir. *enc.* 1. c. p. 378. et P. *villosa*. Lam. *ill.* p. 340. β . pilosa. Lam. 1. c. Habit. in Hisp. anis, Italia et in Barbariae sabulosis. Var. α . magnitudine insigni, et β parvitate distinguitur. P.

28. *ciliata*, fol. incanis angusto-lanceolatis, scap. hirsuto fol. adaequante, spic. rotunda, cor. ciliatis. Desf. p. 137. t. 39. f. 3. Hab. in Barbariae arenosis desertis.

29. *remota*, fol. lineari-lanceolatis integris nudis basi lanatis, spic. longis glabris, flor. remotis. Lam. *ill.* p. 341. Habit. ad Ch. b. spei.

30. *Myosuros*, minuta, fol. lineari-lanceolatis trinerviis glabris, scap. tereti subpiloso, spic. cylindrica. Lam. *ill.* p. 342. Lecta in Montevideo a Commerson. Myos. minimum refert.

31. *limensis*, fol. lanceolato-linearibus, trinerviis, denticulis rarissimis, spic. ovato-cylindrica. Flor. Peruv. 1. p. 51. t. 78. P. hirsuta. Hab. in collibus Lima.

*** *Fol. ut plurimum linearibus, nec subulatis, neque laciniatis.*

32. *microcephala*, fol. linearib. longissimis striatis villosis, scapo pubescente filiformi, spica minima nuda. Poir. *enc.* 4. p. 378. Col. in Hort. Paris. Sponte in India? †

33. *velutina*, fol. linearib. acutis villosis-sericis, spica brevi subglabra, bract. obtusis ciliatis. Poir. 1. c. p. 379. Hab. in Italia, Calabria. Rad. crassa, elongata, flexuosa.

34. *atomerata*, minuta, fol. linearibus angustissimis villosis-ciliatis, scapo filiformi subpubescente, spica pauciflora glaberrima. Poir. 1. c. p. 385. *Cresc.* in ins. Teneriffa. 2. unc. vix longa.

35. *pigmaea*, villosa, fol. linearib. integerrimis, scapo fol. breviora, spic. capitata lanuginosa. Lam. *ill.* p. 341. Hab. ...

36. *scorzoneraefolia*, fol. linearibus nervosis nudis, scapo tereti, spica cylindrica glabra. Lam. *ill.* p. 342. Tournef. coroll. 5. Hab. in Oriente.

37. *scirpoides*, fol. linearib. longissimis trinerviis nudis, scapo tereti, spica ovata. Lam. *ill.* p. 342. Poir. *enc.* 380. Hab. in Hisp. anis?

38. *montana*, fol. linearib. pilosis, scapo tereti hirsuto, spica ovata villosa. Lam. *ill.* p. 341. In montosis et prope Montpellier. Rad. longa fusiformis.

39. *hipidula*, acaul. fol. linearib. integerrimis, scapis longissimis scabris, spica longa. Flor. Per. 51. t. 78. In Chile arenosis.

40. *hirsuta*, fol. linearib. ciliatis, spica cylindrica, scapo hirsuto. L. Habit. ad Cap. b. spei.

41. *alpina*, fol. linearibus planis, scapo tereti hirsuto, spica oblonga erecta. Jacq. *hort.* 1. 125. Hab. in Helvetiae, Austriae alpinis. †

42. *cretica*, fol. linearibus, scapo tereti brevissimo lanato, spica subrotunda nutante. P. *cretica* minima tomentosa, caule alunco. Tournef. cor. 5. Hab. in Creta. ☉

43. *maritima*, fol. linearibus subulis canaliculatis integerrimis basi lanatis, scapo tereti. β . *dentata*, fol. lanceolatis carnosius planiusculis glabris tricusatis hinc inde dentatis: denticulis ramosis teretiuseculis, scapo tereti. Roth. *germ.* 1. 61. II. 123. Hab. in littoribus maritimis locisque salis.

44. *graminea*, fol. linearibus subnudis remotissime dentatis, scapo tereti hirsuto, spic. cylindricis. Lam. *ill.* p. 343. Boel. *pempt. ic.* Hab. in Gall. meridon. maritimis et montosis. †

45. *recurvata*, fol. linearibus canaliculatis recurvatis nudis. Mant. 2. p. 198. *Murr.* *Comm. goett.* 1880. p. 19. tab. 6. β ? *serpentina*. Lam. *ill.* p. 345. Poir. *enc.* 4. p. 381. Hab. in Europa australi, Oriente.

**** *Fol. laciniatis dentatis in corn. rangiferin. formam.*

46. *Coronopus*, fol. subhirsutis, semipinnatis β . pinnis raris lanceolatis. Hall. *helv.* n°. 658. Blakw. t. 460. Willd. p. 648. β . *Columnae*, fol. bipinnatis, basi lanatis,

foliis confluentibus, summis auriculatis, scapo tereti. Gouan. illust. p. 6. Halât. in Europae et Barbariae glareosis. ☉

Y? *Cornuti*, fol. pinnatis: pinnis inaequalibus et distantibus, scapo tereti, stylis longissimis, filamentis brevissimis. Jacq. ic. rar. 1. t. 27. Misc. 2. p. 351.

47. *Lorlingii*, fol. linearibus subdentatis, scapo tereti, spica ovata: bracteis corinatis membranaceis. Loefl. it. 124. Jacq. hort. t. 126. Hab. in Hispaniae collibus agrorumque marginibus. Rad. fibrosae. Fol. caespitosa. P. Coronopae minor et praecocior.

48. *macrorrhiza*, fol. spatulatis serratis subnullis, spica cylindrica. Poir. it. 2. p. 154. Vahl. symb. 2. p. 31. Willd. sp. p. 648. P. crithmoides. Desf. Mor. 2. 8. t. 17. f. 36. In Barbaria ad vias et littora maris. ☞

49. *alopecuroides*, fol. linearibus praelongis, superne rariis dentatis calycibusque ciliatis, spica longissima. Poir. in enc. bot. 4. p. 387. Lam. ill. 1. p. 342. Hab. in Barbaria.

50. *Serraria*, fol. lanceolatis 5-nerviis dentato-serratis scapo tereti tomentoso, spica longissima. Lin. P. spula laciniata hirsuta. Col. cephr. t. 256. Hab. in umbrosis subhumidis Barbariae, Apuliae et Germaniae. Rad. crassa subfrutescens. Poir. enc. 1. c.

51. *barbata*, fol. spatulato-lanceolatis dentatis, capit. subquadrifloris. Forst. Comment. Goett. g. p. 25. t. 4.

***** *Fol. subulatis.*

52. *sericea*, caule decumbente suffruticoso, fol. linearibus subulatis incurvis sericeis, spica ovata. Flor. Peruv. p. 51. t. 79. f. b. Hab. in collibus Tarmae.

53. *congesta*, caule suffruticoso patente, fol. linearibus subulatis, spica ovato-oblonga. Flor. Per. l. c. Cresc. in eodem antecedentis loco.

54. *triquetra*, fol. subulatis trigonetricis strictis scabris, scapo tereti. P. *subulata*. Lin. P. fol. triangulari-prismaticis. Guett. Stamp. 2. p. 428. Lob. ic. 439. Habitat in maritimis Mediterranei. Rad. crassa. Fol. conferta. ☞

55. *aristata*, fol. subsetaceo-linearibus, spica oblongo-cylindrica, bracteis subulato aristatis flor. longioribus. Michaux. Flora 1. p. 65. Hab. in pratensib. Illinoensium.

56. *philippica*, fol. subulatis villosis, scapo nudo fol. aequante, spic. ovatis. Cav.

ic. 4. p. 35. t. 359. f. 2. Hab. in St. Cruz, in insulis Philippicis. Cor. quadrifida alba, centro violacea. Cav. ☉

†† *Psyllia*, caule ramoso foliosis, fol. linearibus. (Flor. capitati. Caps. 2-locularis, 2-sperina. Juss.)

57. *Psyllium*, caul. ramoso herbaceo, fol. subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. Hab. in Europa australi, inter segetes.

58. *stricta*, caul. ramoso erecto herbaceo, fol. linearibus canaliculatis integerrimis, capit. aphyllis. Schousb. maroc. 1. p. 69. ic. 145. Psyllium majus erectum. C. B. p. 191. Moris. 2. 8. t. 17 f. 2. Cresc. in agris circa Mogadore. A priori vix specie diversa videtur.

* *arenaria*, caule ramoso, subherbaceo, fol. pubescentibus subviscosis, spica ovatis compactis subfoliosis. Poir. in enc. bot. 4. p. 392. P. *arenaria*, herbacea pilosissima, caule erecto, fol. subintegerrimis, capit. ovatis, bracteis calycibusque ovatis. Plant. rar. Hung. p. 51. t. 51. Videtur Plant. Psyllium auctor. et ab Linnaeo vix distincta. Hab. in arenosis.

59. *egyptiaca*, caule ramoso herbaceo decumbente, fol. linearibus integerrimis, capit. longe foliosis laxis. Jacq. ic. rar. 1. t. 28. Collect. 1. p. 45. P. *squarrosa* Murr. Willd. sp. 1. p. 650. Hab. in Aegypto.

60. *parviflora*, fol. oppositis linearibus ciliatis, pedunc. folio brevioribus, spic. rotundis, bract. adpressis cal. aequantibus. Desf. atl. 1. p. 141. Hab. in Barbaria. Rad. longa, tortuosa.

61. *arborescens*, fol. filiformibus confertis glaberrimis pedunc. longioribus, capit. paucifloris aphyllis, caul. arborescente, Poir. in enc. bot. 4. p. 389. Hab. in Insul. canariens. Broussonet. Ramosa, lignea, dura cortice cinereo.

62. *genuensis*, fol. angustissimis confertis recurvis pedunc. brevioribus, capit. aphyllis glabris, caule fruticoso. Poir. l. c. p. 390. Hab. in montibus prope Genève. P. *Cynops* affinis.

63. *Cynops*, caule ramoso suffruticoso, fol. integerrimis filiformibus strictis, capit. subfoliatis. Pall. it. 3. p. 606. Moris. 2. 8. t. 17. f. 1. Hab. in Gallo-Provincia, Italia, Sicilia. ☞

64. *indica*, caule ramoso herbaceo, fol. integerrimis reflexis, capitulis foliosis. Hab. in Aegypto et circa Astracan.

65. *afra*, caule ramoso fruticoso, foliis lanceolatis dentatis, capitulis aphyllis. Moris. a. 8. t. 13. f. 4. Hab. in Sicilia, Barbaria.

66. *pumila*, caule ramoso herbaceo, fol. integerrimis carnosis, ramis lacribus. Lín. suppl. 125. P. (*exigua*). Murr. comm. goett. 1778. p. 54. t. 5. Hab. in Europa australi. ☉

287. **CENTUNCULUS.** *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida; limbo patente. *Stam.* brevia. *Caps.* 1-locularis, circumscissa, polysperma.

1. *minimus*, fol. alternis ovatis, flor. sessilibus. Curt. Lond. t. 11. Sowerb. angl. bot. t. 531. Vaill. bot. t. 4. f. 2. Habit. in uliginosis, pascuis et ericetis inundatis. ☉

2. *lanceolatus*, fol. deorsum angustatis; inferioribus ovalibus, superioribus lanceolatis; flor. pedicellatis. Michaux, 1. p. 94. Hab. in Carolinae udis. ☉

288. **SPIELMANNIA.** *Cal.* 5-fidus. *Cor.* fauce barbata; limbo 5-lobo subaequali. *Stigma* uncinatum. *Drupa* nucce biloculari.

1. *africana*. Lam. ill. 1. p. 336. t. 85. Lantana. Lín. Willd. sp. 3. p. 321. Spielm. Jaminum. Medic. in act. palat. 3. p. 196. t. 15. *Stam.* aequalia.

289. **SCOPARIA.** *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-partita. rotata, fauce pilosa. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *dulcis*, fol. ternis, floribus pedunculatis. Willd. sp. 1. p. 652. Lam. ill. t. . . . Vahl. symb. 1. p. 12. Habit. in Jamaica, Curassao. ☉

2. *procumbens*, fol. quaternis, floribus sessilibus. Jacq. amer. 18. Hab. in America calidiore. ☉

3. *arborea*, fol. lanceolatis alternis integerrimis, corymbo supradecomposito trichotomo. Lín. suppl. 125. Hab. ad Cap. b. spei. Arbor habet in Oleae s. Phyllitrac. An hujus generis? h

290. **BARTONIA.** *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* campanulata, 4-fida, persistens. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *tenella*. Mohlenberg, Willd. in Act. Soc. natur. cur. Berol. 4. v. 3. Hab. in Philadelphia. Primo obtutu Bufoniae tenuifoliae similis.

291. **SANGUISORBA.** *Cal.* 2-phyllus inferus. *Cor.* supera. *Germen* inter calycem corollamque.

1. *officinalis*, spicis ovatis, *stam.* cor. subaequalibus. Flor. dan. t. 97. *β.* *auriculata*, altior, fol. auriculatis. Hab. in pratis sicciorebus.

2. *mauritanica*, villosa, fol. profunde serratis, spic. ovatis (virescentibus), calyce rugoso. Desf. Atl. 1. p. 142. Moris. s. 8. t. 18. f. 4. Priori affinis; foliola profundius serrata. Habit. in Algeriae sepibus. ☉

3. *media*, spicis cylindricis, *stam.* cor. longioribus. Moris. s. 8. t. 18. f. 2. Hab. in Canada. ☉

4. *canadensis*, spicis longissimis, *stam.* cor. triplo longioribus. Lam. ill. p. 344. spicis albidis dignis. Michaux. Flora p. 100. Cornut. canad. 175. t. 174. Habit. in Canada, Sibiria. ☉

292. **KRAMERIA.** *Cal.* 6. *Cor.* 4-5-petala. *Nectarium* 4-phyllum, bifforme. *Anthera* perforata. *Drupa* echinata.

1. *triandra*, fol. obl. obovatisque acuminatis, tomentosis, flor. triandris. Flor. Per. 1. p. 61. t. 93. Hab. in Peruviae montium declivibus, in arenosis. h

2. *laxa*, fol. lanceolatis, racemo terminali, cor. 4-petalis. Lín. Willd. s. pl. 1. p. 693. Hab. in Guamae Americae. h

3. *cytisoides*, fol. alternis ternatis tomentosis, racem. terminalibus, cor. 5-petalis Cav. ic. 4. p. 60. t. 390. Hab. in N. Hispania. Ad latus germinis foliola 2 ovata, et ex filam. basi exsurgunt corpuscula 3, filiformia, nectarium vulgo nominata. Cav.

4. *linearis*, fol. linearibus attenuatis, pedunc. solitariis, cor. 5-petalis. Flor. Per. 1. p. 62. t. 94. f. 2. Hab. in Peruv. collibus argillosis. h

293. **ACÆNA.** *Cal.* 4-5-phyllus, superus. *Cor.* 6. *Filam.* 2-4-5. *Nect.* 6. *Stigm.* penicillatum. *Drupa* angulata obovata, glochidibus echinata. (Fol. imparipinnata.)

1. *lappacea*, caul. erecto, foliolis oblongis obovatisque serratis, racem. paniculatis. Flor. Per. 1. p. 66. t. 93. f. 2. Cresc. in locis calidis et praeruptis Tamae. Repens villosa. Autumno h

2. *trifida*, caulib. erectis, foliol. cuneiformib. trifidis, spicis globosis. Flor. Per. 1. p. 67. t. 97. f. c. In regni chilensis pascuis, campis et collib. Vere ob fructus vesibus adhaerentes *Amor seco* ab incolis nuncupatur.

3. *argentea*, caule repente, foliolis ovato-oblongis, spic. globosis. Flor. Per. 67. t. 93. Fewill. 3. p. 55. t. 41. Cum priore abunde in uliginosis arvisque. Vernaeule Broquin. Pl. medicinalis. $\overline{\text{L}}$

4. *ovalis*, caule repente, foliol. ovalibus profunde serratis linearis, spic. globosis. Fl. Per. 1. c. In locis umbrosis et humidis Pillao. $\overline{\text{L}}$

5. *cylindristachya*, scapis prostratis, foliol. oblongis argute serratis, spic. cylindricis. Flor. Per. 1. p. 68. t. 104. Habit. in collib. frigidis Tarmae, $\overline{\text{L}}$

6. *pinnatifida*, scap. erectis, foliolis obovatis pinnatifidis, spic. lousis interruptis. Flor. Per. 1. c. fig. b. In Chile collibus Incana. $\overline{\text{L}}$

294. *CISSUS*. *Cal.* quadridentatus inferus. *Petala* 4, libera reflexopatula decidua. *Nect.* Discus germeu cingens. *Bacca* 2-locularis, 1-2-4-sperma. (Stam. passim 5.)

* *Foliis simplicibus, plerisque.*

1. *compressicaulis*, fol. cordatis acute serratis, flor. umbellatis, pedunc. dichotomis. Flor. Peruv. 1. p. 64. t. 100. Hab. in Chaucay ruderals.

2. *Ampelopsis*, fol. cordatis dentatis, racemis duplicato-bifidis, flor. 5-andris. *Ampelopsis* cordata. Michaux. Flor. 1. p. 159. Hab. in Amer. bor. in dumetis et ad ripas amnis Savannah. Fol. superne passim angulata.

3. *vitigena*, fol. cordato-subrotundis lobatis subindivisisque villosis dentatis. Vahl. symb. 3. p. 18. Pluck. mant. t. 337. f. 4. Hab. in India. $\overline{\text{h}}$

4. *repanda*, fol. cordatis integris sublobatis repantibus utrinque glabris. Vahl. symb. 3. p. 18. Hab. in India orientali. Rami teretes, flexuosi.

5. *latifolia*, fol. cordato-ovatis villosis acuminatis setaeo-serratis, ramis tetragonis. Vahl. symb. 3. p. 18. Willd. sp. 1. p. 656. Hab. in India orientali et Madagascariae sylvis. $\overline{\text{h}}$

6. *cordifolia*, fol. cordatis integerrimis. Hab. in America. Fol. magna. $\overline{\text{L}}$

7. *rotundifolia*, fol. cordato-subrotundis serratis. Vahl. symb. 3. p. 19. Saelanthus. Forsk. descr. p. 35. tab. 4. Habit. in sylvis Arabiae felicis.

8. *Sicyoides*, foliis subcordatis nudis, setaeo-serratis, ramulis teretibus. Swartz. obs. 48. Lam. ill. t. 84. f. In Jamaica. $\overline{\text{L}}$

9. *quadrangularis*, fol. cordatis dentatis carnosiss serrato-dentatis, caule tetragono-tumidiusculo. L. Man. 37. Saelanthus quadrangulus. Forsk. descr. p. 33. tab. 2. Rumph. amb. 5. p. 83. t. 44. f. 2. Habit. in Arabia, India. Caulis longissimus. $\overline{\text{L}}$

** *Foliis angulatis.*

10. *tomentosa*, fol. subpentagonis obtuse dentatis, subtus tomentoso-ferrugineis. Lam. ill. 1. p. 330. Hab. in lus. Borloniae. Fol. basi truncata.

11. *angulata*, fol. subpentagonis angulato-lobatis erenulatis subtus tomentosis. Lam. p. 331. Hab. in India orientali.

12. *capensis*, fol. 5-angularibus dentatis subtus ferrugineo-tomentosis, flor. subcapitatis. Thunb. prod. p. 44. Hab. ad Cap. b. spei.

*** *Foliis ternatis.*

13. *acida*, fol. ternatis obovatis glabris crenatis incisis. Sloan. ism. 106. hist. 1. p. 233. t. 143. f. 6. Pluck. alm. 71. t. 152. f. 2. Hab. in America calidiore. $\overline{\text{h}}$

14. *cinerea*, fol. ternatis, foliol. pubescentibus dentatis: lateralibus subcordatis, petiol. teretibus. Lam. ill. p. 332. In India orientali.

15. *cirrrosa*, fol. ternatis villosis, foliol. ovatis serratis. Vitis cirrrosa. Thunb. prod. 44. Hab. in Cap. b. spei.

16. *alata*, fol. ternatis subrotundis hirsutis subdentatis, ramis membranaceo-angulatis. Jacq. amer. 23. t. 182. f. 10. C. trifoliato. L. Hab. in Jamaica. Scandit superatque altissimas arbores. $\overline{\text{L}}$

17. *microcarpa*, fol. ternatis oblongis serratis glabris membranaceis. Vahl. eclog. 1. p. 16. Plum. Cat. p. 18. f. t. 259. f. 4. Hab. in India occidentali. $\overline{\text{h}}$

18. *crenata*, fol. ternatis, foliol. subrotundis erenatis. Vahl. symb. 3. p. 19. Vitis trifolia. L. Rumph. amb. 5. p. 450. t. 166. f. 2. Hab. in India orientali. $\overline{\text{h}}$

19. *carnosa*, fol. ternatis ovatis obtusis serratis glabris, ramis petiolisque teretibus. Vahl. symb. 3. p. 19. Lam. encyclop. 1. p. 31. Rheed. mal. 7. p. 17. t. 9. Hab. in India orientali.

20. *obovata*, fol. ternatis, foliol. obovatis integerrimis glabris, Vahl. symb. 3. p. 19. Hab. in ins. St. Crucis.

**** *Foliis quinatis.*

21. *hederacea*, caul. radicante scandente, fol. quinato-digitatis, racem. subsessilib., flor. 5-andris, Hedera quinquefolia, L. Ampelopsis, Michaux. Hab. in America. In hortis ad parietes tegendos optime adhibetur. Foliola superne dentata.

22. *pentaphylla*, (tenuis) fol. quinatis, foliol. indivisis serratis, caule herbaceo filiformi. Vitis pentaphylla, Thunb. jap. 105. Hab. in Japonia. Flor. racemosi, $\bar{\eta}$.

23. *striata*, fol. quinato-digitatis: foliol. serratis, caul. striato-flexuoso, cymis coarctatis. Flor. Per. 1. p. 64. t. 100.

24. *granulosa*, fol. quinatis: foliolis obovatis, caul. angulato granuloso. Flor. Per. 1. c. t. 101. In Peruv. praeceptis.

***** *Foliis pedatis.*

25. *pedata*, fol. petalis, foliol. lanceolatis serratis, subtus tomentosis, Vahl. symb. 3. p. 20. Lam. encycloped. 1. p. 31. Ruess. mal. 2. p. 17. t. 10. In India. An hujus generis, cum fructus quadrilocularis sit? Habit. in India orientali. $\bar{\eta}$

26. *japonica*, fol. pinnatis subpedatis glabris, foliol. crenatis aristatis. Willd. sp. 1. p. 659. Vitis japonica Thunb. In Japonia. $\bar{\eta}$

***** *Foliis pinnatis: foliolis oppositis.*

27. *obliqua*, fol. simpliciter pinnatis, foliol. 2-3 oblique cordatis. Flor. Per. 1. p. 65. t. 101. In Tarnac praeceptis. Flor. corymbosi.

28? *Mappia*, fol. subbipinnatis: foliol. ovatis integerrimis. Lam. ill. p. 332. Hab. in ins. Franciae.

29. *orientalis*, fol. bipinnatis, foliol. ovatis serratis, caul. frutescente scandente? Lam. 1. c. t. 84. l. 2. In Oriente. Pinna lateralis ex foliis 3 constat.

30. *stans*, fol. bipinnatis, foliol. incisoserratis, flor. pentandris, caul. arborescente. Vitis arboorea. Lin. Ampelopsis. bipinnata. Michaux. Hab. in Carolina et Virginia.

Obs. Petalis liberis, nec calyptratum cohaerentibus, stam. plurimum 4, facilius ramorum ad nodos scubilitate hoc genus praecipue a Vite differt. Auct. Flor. Borreali-americanae specibus 2, 21 et 28 ob

numcrum staminum quinarium distinctum constituit genus.

295. *EPIMEDIUM*, *Nectaria* 4, cynthiiformia, petalis incumbentia. Cor. 4-petala. Cdl. caducis.

1. *alpinum*. Engl. bot. t. 439. Batsch. Anal. flor. 1. n.º 10. Hab. in Alpium umbrosis. $\bar{\eta}$

296. *CORNUS*, *Involucrum* 4-phyllum 2-pinis. Petala supera 4. Drupa nucæ 2-loculari.

* *Involucratae umbellatae.*

1. *suecica*, herbacea, foliis omnibus oppositis sessilibus nervosis. Willd. phytog. 1. p. 3. n.º 12. et sp. 1. p. 660. herbacea ramis binis. L. Flor. lapp. 65. t. 5. f. 3. Hab. in Europa et Asia boreali Inque Kamtschata.

2. *canadensis*, herbacea, fol. summis verticillatis subpetiolatis venosis. Willd. 1. c. l'Herit. Corn. n.º 2. t. 1. In Canada, Labrador etc. Fructus globosus.

3. *florida*, arboorea, involucro maximo: foliol. obovatis. L. l'Herit. Corn. n.º 3. Casteb. carol. 27. t. 27. Hab. in Virginiae sylvis. Fructus ovatus.

4. *mascula*, arboorea, umbellis involucrum aequantibus. In saeclibus Europae. Vere floret, priusquam folia erumpunt.

* *Nuda cymosa.*

5. *sanguinea*, ramis rectis, fol. ovatis concoloribus, cymis depressis. l'Herit. Corn. n.º 5. Hab. in Europae, Asiae, Americae borealis dumetis, ad saepes. Fruct. niger. $\bar{\eta}$

6. *alba*, ramis recurvatis, foliis late-ovatis subtus canis, cymis depressis. l'Her. n.º 7. Hab. in Sibiria, Canada. Fructus albus. $\bar{\eta}$

7. *sericea*, (caerulea), ramis patulis fol. ovatis subtus ferrugineo-sericeis, cymis depressis. l'Herit. 2. Willd. arb. 75. G. Anomum. Vogel ic. rar. t. 101. C. caerulea. Lam. Hab. in Carolina meridionali, Pennsylvania. Fructus caerulei. $\bar{\eta}$

8. *circinata*, ramis verrucosis, foliis orbiculatis subtus tomentosis canis, cymis depressis. l'Herit. n.º 8. t. 3. C. tomentosa. Michaux. 91. Hab. in Pennsylvania. $\bar{\eta}$

9. *stolonifera*, caul. inclinato, ramis debilibus, fol. ovalibus utrinque subpubescentibus subtus albicantibus, cymis parvulis. Michaux. Flor. 1. p. 92. Cresc. ad

ripas Canadae et N. Angliae. Frutex stoloniferus, purpureus.

10. *fastigiata*, subglabra, ramis strictis fastigiatis, fol. ovalib. longe acuminatis, cymis longius pedunc. Michaux. Habit. in dumosis et ad ripas Virginiae, Carolinae. Sequenti affinis. Ramuli fusi subquadrang.

11. *stricta*, ramis strictis, foliis ovatis concoloribus nudiusculis, cymis paniculat. P'Herit. t. 4. Habit. in America septentr.

12. *paniculata*, ramis erectis, foliis ovatis subtus canis, cymis paniculat. P'Her. n°. 10. t. 5. C. *racemosa*, cymis paniculato-racemosis. Lam. ill. p. 303. Hab. in America septentrionali. h

13. *alternifolia*, fol. alternis. Lin. supp. 125. P'Herit. Corn. n°. 11. t. 6. Vsr. ramulis rubris et viridibus, apice corymbosis. In America septentrionali. Petala revoluta. h

267. **FUSANUS**. *Cal.* superus, 4-fidus. *Cor.* o. *Stylus*. subnullus. *Stigm.* 4. *Drupa* 1-sperma.

1. *compressus*. Linn. syn. veg. ed. 13. Lam. ill. t. 77. Thesium Colpoen. Lin. supp. p. 161. Berg. cap. t. 1. f. 1. Hab. ad Capbon. spei. Arb. ramis compressis. Racemi axillares.

258. **GLOSSOMA**. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Anth.* membrana coerente. *Stigma* 4-fidum. *Drupa* nucce sulcata, 1-sperma.

1. *arborescens*. Willd. sp. 2. p. 664. *Volomita guianensis*. Aubl. guj. 1. p. 91. t. 35. Habit. in sylvis Guianae. h

259. **SAMARA**. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* basi petali inserta. *Stigm.* infundibuliforme. *Drupa* 1-sperma.

1. *laeta*, floribus confertis pedicellatis, fol. ovatis obtusis. Swartz. prod. 151. Lam. ill. t. 74. *Memeocylon umbellatum*. Lin. Fl. zeyl. 469. Burm. Zeyl. 66. t. 31. In India orientali. Flor. infra folia.

2. *coriacea*, floribus sessilibus conglomeratis, fol. lanceolato-ovatis acutis subcoriaceis. Sw. flor. 1. p. 261. In Jamaicae sylvis montosis. h

3. *pentandra*, floribus pentandris, fol. ellipticis. Ait. Kew. 1. p. 160. Habit. ad Cap. b. spei. h

4. *floribunda*, floribus pentandris, fol.

obovatis. Willd. sp. 1. p. 665. *Rapanea guianensis*. Aubl. guj. 1. p. 121. t. 46. Hab. ad pratorum margines Cajennae et Gujanae. h

300. **FAGARA**. *Cal.* 4-5-fidus. *Cor.* 4-5-petala. *Capr.* 2-valvis, monosperma, simplex aut multiplex. (*Stam.* 4-5 et 8.)

1. *triphylla*, fol. ternatis, foliol. ovatis acumin. integerrimis, paniculis supraaxillaribus. Willd. sp. 1. p. 636. Lam. encycl. 2. p. 443. Rumph. amb. 2. p. 138. t. 62. Hab. in insulis Philippinis. h

2. *Evodia*, fol. ternatis, foliol. lanceolatis integerrimis. Willd. *Evodia hortensis*. Forst. char. gen. p. 13. t. 2. Hab. in insulis Americorum et novis Ilicridibus. Vix a praecedente diversa. h

3. *Pterota*, fol. pinnatis, foliol. obov. emarginatis, petiolo communi marginato articulo infermi. Willd. Lam. ill. t. 84. Brow. Jem. 146. t. 5. f. 1. Hab. in Jamaica. Odor hircosus. h

4. *Piperita*, fol. pinnatis, foliol. oblongis basi inaequalibus crenatis. Thunb. Jap. 64. Kaempf. amoen. t. 893. Habit. in Japonia. h

5. *tragodes*, fol. pinnatis, foliol. cuneiformibus emarginatis, petiolo communi alato-articulato aculeato. W. Jacq. amer. 21. t. 14. Hab. in America. *Pterotae* nimis affinis. h

6. *Zanthoxyloides*, petiolis cotisque foliorum aculeatis, floribus quinquefoliis dioicis. Lam. encyclop. 2. p. 462. Hab. in Senegal et Guinea. h

7. *horrida*, fol. pinnatis, pinnis ovatis crenatis, spinis ramorum spinosis. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 329. Hab. in Japonia. h

8. *capensis*, fol. pinnatis, pinnis ovatis obtusis crenatis, ramis aculeatis flexuosis. Thunb. prod. 28. Habit. ad Cap. b. spei. h

9. *armata*, fol. pinnatis, pinnis crenatis, ramis petiolisque aculeatis. Thunb. prod. 28. Hab. ad Cap. b. spei. h

10. *Avicennae*, fol. pinnatis, foliolis lanceolatis integerrimis alabris. Willd. 2. p. 668. Lam. encyclop. 1. p. 441. Lobel. ic. 2. t. 133. Hab. in China. h

11. *octandra*, fol. pinnatis utrinque tomentosis, foliol. ovatis dentatis, petiolo communi articulo-alato, flor. octandris. Willd. sp. p. 668. Habit. in Caracae duris. Ah cum sequente distincti generis? h

12. *elaphrium*,

19. *Elaphrium*, foliis pinnatis glabris : foliol. oblongo-lanceolatis obtuse dentatis, petiolo communi articulato-alato, floribus octandris. Willd. Jacq. amer. 106. t. 71. f. 3. Hab. in Caribagenae fruticetis marit. h

301. HARTOGIA. *Cal.* 4-fidus. *Petal.* 4, *patentia*. *Drupa* ovata. *Nuce* 2-sperma.

1. *capensis*. Lin. suppl. 138. Thunb. Diss. N. G. 5. p. 87. c. 1c. Willd. sp. 1. p. 669. Schrebera schinoides. Thunb. prod. p. 28. t. 2. Hab. in Cap. b. spci sylvis. Mygindae species ? h

302. AZIMA. *Cal.* 4-fidus, urceolatus. *Cor.* 4-petala. *Bacca* 2-locularis : loculis 2-spermis : 1 saepius abortivo.

1. *tetracantha*, fol. oppositis petiolatis ovato-lanceolatis glabris apice pungentib. ; spinis stipularibus quaternis. Lam. enc. 1. p. 339. Seb. th. 1. 1. 13. f. 1. Monetia barlerioidea. L'Her. Willd. In India et ad Cap. b. sp. h

303. BLACKBURNIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus inferus. *Stigm.* simplex. *Bacca* ? monosperma.

1. *pinnata*, Forst. char. gen. p. 12. t. 6. Ptelea pinnata. Lin. sup. 126. Hab. in insul. deserta Norfolk. h

304. PTELEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus, inferus. *Stigmata* 2. *Caps.* rotundata membranaceo-alata, 2-locular. 2-sperma.

1. *trifoliata*, fol. ternatis. Trcw. rar. 12. t. 9. Hab. in Virginia. Flor. passim spetali et abortiunt. h

305. GYROCARPOS. Flor. polygami. *Cal.* 4-partitus inaequalis. *Cor.* 0. Nect. 4. *Stigm.* sessile. *Caps.* 1-locularis, 1-sperma. 5-alata.

2. *Jacq. ini*. Roxburg. Corom. t. 1. G. Americanus Jacq. amer. pict. t. 261. f. 50. H. in Caribagenae sylvat. et Coromandelinae montosis. Arbor elegans, procera. Pueri ludendi gratia fructus in altum propicere solent, qui ob alas lente et in gyros descendunt. Inde nomen.

306. SKIMNIA. *Pe ala* 4-concava. *Cal.* 4-partitus. *Bacca* 4-sperma.

1. *japonica*. Thunb. jap. 65. Habit. in

Japonia. Fol. sempervirentia. Panicula terminalis. h

307. OTHERA. *Petal.* 4-lanceolata. *Cal.* 4-partitus. *Capsula* ?

1. *japonica*, flor. aggregatis pedunculatis, stigm. sessili. Lam. ill. p. 310. Thunb. jap. 61. Ej. tc. fasc. 2. Hab. in Japonia. Hlex ? h

2. *Oriza*, flor. racemosis, stylo manifestis. Lam. 1. c. Oriza japonica. Th. l. c. Willd. Sp. p. 672. In Japonia.

Obs. Ambae plantae culterius examinandae an diversi aut ejusdem generis sint, fructus enim ignotus est.

308. LUDWIGIA. *Cor.* 4-petala, aut 0. *Cal.* 4-partitus, superus : lacin. longis persistentib. *Caps.* 4-gona, 4-locularis, infera, polysperma.

* *Fol. oppositis*-

1. *oppositifolia*, (zeylonica), fol. oppositis lanceolatis, caule diffuso. L. Syst. Veg. p. 135. caule diffuso, fol. lanceolatis, capsulis pedunculatis fol. dimidio breviorib. Fl. zeyl. 66. Hab. in India. h

2. *erigata*, fol. oppositis lanceolatis, caule erecto, flor. terminalibus. Ludwigia triflora. Lam. encycl. 3. p. 588. Habit. in India. Germina tetragono-alata. Capsula subcubica. Lin. ©

3. *nitida*, caul. assurgente, fol. opposit. ovalibus, flor. axillaribus minimis, caps. subovata. Michaux. Flor. 1. p. 87. Hab. in Carolinae inferioris humidis. Bractae nulae. Majo.

4. *pedunculata*, repens subpubescens, fol. oppositis lineari-lanceolatis glabris, pedunc. axillaribus longissimis, caps. clavato-oblongis. Michaux. p. 88. In paludosis submaritimis Carolin. infer. Flos ratiouis plantae parvulae maximus. M.

* *Foliis alternis*.

5. *Jussiaeoides*, erecta glabra, foliis lanceolatis decurrentibus, flor. axillaribus subsessilibus, caps. clavatis oblongis. Michaux. p. 89. Cum priore in aquis umbratis.

6. *angustifolia*, erecta ramosissima glabra, fol. linearibus, flor. axillaribus, caps. turbinato-prismatica oblongiuscula. Michaux. p. 88. Juxta fossas Car. infer.

7. *virgata*, erecta glabra, ramis virgatis, fol. sessilibus linearibus, flor. suboppositis.

casis; caps. globoso-4-gonis. Michaux p. 89. In aridis sylvis Carol. infer. Majo.

8. *capitata*, radice repente erecta, fol. sublinearibus, flor. capitatis; petal. calice brevioribus, caps. sub3-gono-semiglobosa. Michaux p. 99. L. suffruticosa. Walter. In aquosis apricis Carol.

9. *macrocarpa*, major subpubescens, fol. longo-lanceolatis acutis, subtus albicantibus, flor. subpedicellatis, caps. globoso-4-gona cal. laciniiis maximis coronata. Michaux p. 89 L. alternifolia. Linn. In Virginiae praevisibus. Fol. in plurimis alterna.

10. *microcarpa*, subprocumbens glaberrima, fol. obovatis punctis callosis marginatis, flor. axillaribus apetalis minutis. Michaux. Flor. p. 88. Cresc. in humidis. Folis parvula, obtusa cum macrone.

11. *mollis*, subtomentoso-pubescent, fol. lanceolatis oblongis, flor. apetalis subterminalibus, caps. subrotandis. Michaux p. 90. In Car. infer. paludosis. Julio.

309. **ISNARDIA**. *Cor.* campanulatus, 4-fidus. *Cal. o. Caps.* 4-gona, 4-locularis, cal. cincta.

1. *palustris*, fol. ovatis integris. Willd. sp. 2. p. 680. excl. synonym. nonnullis Lam. ill. t. 77. Roth. germ. 2. p. 199. In Europae meridionalis et Americae paludosis. Peltidi similis. T.

Obs. Non est Ludwigiae species, cum duo haec genera etiam quoad ordines naturales inter se distincta sint.

2. *hastata*, foliis semiamplexicaulibus hastato-lanceolatis. Flor. Peruv. 1. p. 66. t. 86. f. 2. Hab. in Peruviae paludosis. Suffruticosa.

310. **OLDENLANDIA**. *Cor.* tetrapetala. *Cal.* 4-partitus, superus. *Caps.* 2-locularis, infera, polysperma; Receptacula libera. G. (Syl. 1-2.)

1. *verticillata*, florib. verticillatis sessilibus, stipulis sessigeris. Lin. Willd. sp. 1. p. 674. Rumph. amb. 6. p. 25. t. 10. Hab. in Amboinae, Jamaicae collibus apricis.

2. *trinervis*, caule decumbente, fol. ovatis trinerviis, flor. verticillatis axillaribus, caps. hispidis. Retz. obs 5. p. 27. Hab. in Indiae umbrosis praecipue sub Pandano.

3. *glomerata*, decumbens hirsuta, fol. ovalibus, flor. conglobatis. Michaux. Flor. 1. p. 63. In Car. infer. humidis.

4. *depressa*, caule diffuso, fol. ellipticis petiolatis glabris, pedunc. geminata axillaribus. Willd. l. c. p. 675. Rheed. mal. 10. p. 61. t. 31. In India orient. h

5. *capensis*, pedunc. axillaribus unifloris, fol. linearibus acutis. Lin. suppl. 127. Hal. ad Cap. b. spec.

6. *uniflora*, caule repente, pedunculis simplicissimis lateralibus, fructib. hispidis, fol. subovatis acutis Lin. Flor. Per. 1. p. 54. Hab. in Virginiae, Jamaicae et regali Chilensis aquosis.

7. *biflora*, pedunc. bifloris petiolo longioribus, fol. lanceolatis. Burm. zeyl. 22. t. 11. Hab. in India. O

8. *pentandra*, flor. pentandris monogynis, fol. linearibus, pedunc. bifloris. Retz. obs. 4. p. 29. Heuchera dichotoma Murr. comment. goett. 1772. p. 64. t. 1? Habit. in Tranquebaria. O

9. *umbellata*, umbel. nudis lateralibus alternis, fol. linearibus. Roth. cor. mand. 1. p. 2. t. 3. Hab. in India. T

10. *corymbosa*, pedunc. multiflor. fol. lineari-lanceolatis. Gaertn. de fr. 1. p. 147. Ehret. pict. 1. 2. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. O

11. *hirsuta*, umbel. axillaribus, caule calycibusque hispidis, fol. ovatis acutis. Lin. suppl. 127. Hab. in Java.

12. *debilis*, umbel. axillaribus, pedunc. paucifloris, fol. ovatis sessilibus. Forst. pr. n. 56. Hab. in insula Tongatabu maris pacifici.

13. *foetida*, umbel. terminali trichotoma, fol. spatulatis. Forst. prodr. u. 55. Hab. in insula Tongatabu.

Obs. Plures, uti videtur, *Oldenlandia* species cl. Cavanilles in vol. sexto Ic. plant. hisp. sub genere *Hedyotis* descripsit, cum in mentem Lamarellii et Schreberi, et forte nec immerito, duo haec genera baud diversa putet.

311. **AMMANNIA**. *Cor.* 4-petala, aut 0, calyci inserta. *Cal.* 1-phyllus, plicatus, 8-dentatus, inferus. *Caps.* 4-locularis. (Passim 2-locul. et Stam. 8.)

1. *latifolia*, fol. semi-plexicaulibus, caul. tetragono, ramis erectis. Lin. Willd. sp. 2. p. 678. Sloan. hist. 1. p. 44. t. 7. f. 4. Hab. in Caribaeis, locis humidis. O

2. *ramosior*, fol. semi-plexicaulibus, caul. tetragono erecto, ramis patentissimis

flor. inferioribus verticillatis. Lin. Michaux 1. p. 99. Hab. in Virginia. Pet. purpurea. ☉

3. *humilis*, procumbens, fol. lanceolatis deorsum angustatis, flor. omnibus solitariis, caps. 1-locularibus. Michaux Fl. p. 99. A. ramosior. Walter. Hab. in Carol. septentrion. paludosis.

4. *debilis*, fol. lanceolatis basi attenuatis, caul. ramoso, flor. fasciculatis axillaribus, caps. bilocularibus. Ait. Kew. 1. p. 163. Hab. in India orientali. ☉

5. *sanguinolenta*, fol. sessilib. linearilanceolatis basi cordatis, pedunc. brevissim. multifloris, florib. octandris petaloideis. Willd. p. 679. Swartz. prod. 33. In fossis et aqueis Jamaicae, Hispaniolae.

6. *coccinea*, fol. sessilibus linearilanceolatis basi cordatis, pedunc. subunifloris, flor. octandris petaloideis. Willd. (A. octandra). Am. coccinea. Roth. progr. 1773. n. 4. Hab. in India orientali. Caulis erectus giganteus brachiatus. Pet. sanguinea. Simil. praecedenti.

7. *verticillata*, fol. subsessilibus lanceolatis, flor. congesto-verticillatis sessilibus, cal. 4-dentato. Lam. ill. p. 311. t. 77. f. 3. Cornelia verticillata. Ard. spec. 2. t. 1. Hab. in Italia.

8. *indica*, fol. linearibus sessilibus decurrentib., umbel. axillarib. brevissimis, cal. 4-dentato. Lam. l. c. Am. baccifera. Burm. ind. t. 15. f. 3. In India.

9. *senegalensis*, fol. sessilibus subariculatis, flor. pedicellatis aggregatis, cal. 4-dentato. Lam. ill. p. 312. t. 77. f. 2. In Senegal.

312. TRAPA. Cor. 4-petala. Cal. 4-partitus. Nux spinis 4, oppositis cincta, quae calycis folia fuere.

1. *natans*, nucib. quadricornibus, spinis patentibus. Linn. suppl. 128. Willd. sp. 2. p. 681. fol. natantibus, petiolis ventricosis. Hal. helv. n. 527. In Europae australis Asiaeque stagnis limosis. ☉

2. *bicornis*, nucibus bicornibus. Linn. suppl. 128. Gaert. scdm. 2. p. 84. t. 95. Hab. in China.

313. POTHOS. Spatha. Spadix simplex floribus tectus. Cal. o. Petala quatuor. Bacca disperma.

1. *scandens*, petiol. latitudine foliorum, caul. radicante. Linn. Willd. Sp. 1. p. 684.

Rumph. amb. 5. p. 400. t. 184. f. 1. 2. 3. Rheed. mal. 7. t. 40. Hab. in India. ☉

2. *acaulis*, fol. lanceolatis integerrimis, nerviis. Jacq. amcr. 240. t. 153. Habit. in Americae calidioris arboribus. ☉

3. *lanceolata*, fol. lanceolatis integerrimis trinerviis, scapo apice triquetro. Sp. pl. 1373. Plum. 47. t. 62. fl. t. 206. Hab. in Amer. calidior. ☉

4. *crenata*, fol. lanceolatis crenatis. Plum. ap. 4. ic. 39. Hab. in insula St. Thomae. ☉

5. *violacea*, caulescens, fol. ovato-lanceolatis integris nervosis punctatis. Swartz. Dracontium scandens. Aubl. Guj. 2. p. 836. In Jamaica et India occidenti. ☉

6. *crassinervia*, fol. oblongis acuminatis integerrimis venosis, costa media fol. tricarinata. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 610. Collect. 4. p. 192. Hab. in sylvis montosis Americae calidioris ad Caracas. ☉

7. *cordata*, fol. cordatis, lobis imbricatis, spadice spatulato subaequant. Willd. Plum. spec. 4. ic. 38. fl. t. 205. Cum priore. ☉

8. *macrophylla*, fol. cordatis, spadice longissimo, radice nodosa. Swartz. prod. 33. Jacq. ic. rar. t. 610. Collect. 4. p. 191. Plum. amer. 48. t. 61. Habit. in India occidentali. ☉

9. *pinnata*, foliis pinnatifidis. L. Rumph. amb. 5. p. 489. t. 183. f. 2. In India. ☉

10. *palmata*, fol. palmatis. L. Plum. amcr. 49. t. 64. 65. In America calidior. ☉

11. *digitata*, fol. digitatis. Jacq. ic. rar. 3. t. 611. Collect. 4. p. 119. Hab. in sylvis montosis Americae calid. ad Caracas. ☉

12. *pentaphylla*, fol. digitatis quinatis ovatis acuminatis. W. Aubl. Guj. 2. p. 837. t. 326. In sylvis Cajennae, Gujanae. ☉

314. COMETES. Involuerum 4-phyllum, 3-florum. Cal. 4-phyllus. Caps. 3-cocca.

1. *alterniflora*, Burm. ind. t. 15. f. 5. Hab. in Suratte. ☉

315. CURTISIA. Cal. 4-part. Petala 4. Drupa supera, subrotunda, succulenta: Nuc. 4-5-loculari.

1. *saginea*, Willd. sp. 1. p. 687. Ait. Kew. 1. p. 167. Sili. oxylum. Burm. afr. 215. t. 82. Hab. ad Cap. b. 21. f. 7.

316. *CHLORANTHUS*. *Cal.* o. *Petalum* 3-lobum, lateri germinis insidens. *Anth.* petalo accretæ. *Bacca* 1-sperma.

1. *inconspicuus*, Swartz. L'Herit. sert. angl. 1. 35. 1. 2. *Nigra* spicata. Thunb. Hab. in China, Japonia. h

317. *ELÆAGNUS*. *Cal.* coloratus; 4-fidus, campanulatus, superus. *Cor.* o. *Drupa* monosperma.

1. *angustifolia*, fol. lanceolatis. Lin. Willd. sp. 1. p. 688. Pall. ross. 1. p. 10. t. 4. l. (inermis) fol. lanceolatis. Mill. diet. n.º 2. Hab. in Bohemia, Hispania, Syria, Cappadocia, inque Aquis Sextilis locis subhumidus. h

2. *orientalis*, fol. oblongis ovatis opacis. Mant. 41. Pall. Ross. 1. p. 11. t. 5. Hab. in Oriente. Folia neutra pagina nictentia aut argentea. L. h

3. *spinosa*, fol. ellipticis, subtus argenteis, ramulis basi spinosis. Lam. ill. p. 299. Hab. in Aegypto. h

4. *pungens*, ramulis spinoscentibus, fol. oblongis undulatis; flor. axillaribus binis. Thunb. jap. 68. p. 789. Habit. in Japonia. h

5. *latifolia*, fol. ovatis maculatis. Lam. ill. t. 73. f. 2. Hab. in Zeylona. Fol. lineis atro-rubentibus. h

6. *crispa*, inermis, fol. lanceolato-oblongis obtusis undulatis fl. solitar. Thunb. jap. 66. Hab. in Japonia cum sequentibus speciebus. h

7. *multiflora*, inermis, fol. obovatis obtusis, flor. axillaribus aggregatis, pedunc. flore longioribus. Thunb. jap. 66.

8. *umbellata*, inermis, fol. obovatis obtusis, flor. axillaribus aggregatis, pedunc. flore brevioribus. Thunb. jap. 66. t. 14. In monte Falona Japoniae. h

9. *glabra*, inermis, fol. ovato-oblongis acumatis, flor. axillaribus subsolitariis. Thunb. jap. 67.

10. *macrophylla*, inermis, fol. rotundato-ovatis argenteis. Thunb. l. c. Habit. in Japonia. h

318. *GONATOCARPUS*. *Cal.* o. *Cor.* 4 fida. *Drupa* infera, octogona, 1-sperma.

1. *micranthus*. Willd. Sp. 2. p. 650. Thunb. jap. 69. t. 15. Hab. in Japonia. Fl. spicati cernui minuti. Th. h

319. *SANTALUM*. *Cor.* 4-petala: petalis calyci innatis, præter *Glandulas* 4. *Cal.* 4-dentatus. *Bacca* intera, monosperma.

1. *album*. Sirium myrsifolium L. Mant. p. 800. Roxb. corom. 1. p. 2. t. 2. Hab. in India. h

320. *DRAPETES*. *Cal.* o. *Cor.* infundibuliformis: limbo 4-fido. *Receptacula* pedicellata, barbata: *Sem.* 1, tectum. (Flor. aggregata-fasciculati.)

1. *muscoideus*, Lam. in Journ. d'Hist. natur. n.º 5. p. 186. 1. 10. Habitu *Passerinae*. Geneti *Dais* affinis. L.

321. *CANSIERA*. *Cal.* globoso-urceolatus, 4-dentatus, inferus. *Nect.* 1, dentata germen cingentia. *Bacca* 1-sperma. Juss.

1. *scandens*, Roxbourg. 2. p. 1. t. 103. Habit. in Coromandelia.

322. *STRUTHIOLA*. *Perianthium* 2-phyllum. *Cor.* tubulosa, ore glandulis 4-8. *Bacca* exsucca, 1-sperma.

1. *virgata*, fol. lanceolatis striatis, summis ciliatis, ramis pubescentibus. Thunb. prod. 76. Retz. obs. 3. p. 26. Burm. afr. p. 127. t. 47. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei h

Obs. Omnes generis species crescent ad Cap. b. spei, tempore vespertino et nocturno, odore grato fragrant et sæpius his per annum florescent.

2. *erecta*, fol. linearibus glabris, ramis glabris tetragonis. Thunb. prod. 76. Wendl. obs. bot. p. 9. t. 2. f. 10. Flor. albidis.

3. *nana*, fol. linearibus obtusis, pilosis, flor. terminalibus fasciculatis toment. Lin. suppl. 128. Bractear. coerulescentes. h

4. *juniperina*, fol. linearibus acutis patentibus, corollis calycibusque nudis. Retz. obs. 3. p. 26.

5. *angustifolia*, fol. oppositis erectis linearibus dorso trisulcatis, ramis compositis villosis. Lam. ill. p. 214. h

6. *ciliata*, fol. sparsis lanceolatis mucronatis ciliatis concavis quadrilariam imbricatis apice incurvis. Andrew, t. 149. Fl. albidis, vespere fragrantissimi. Augusto. S. ciliata. Lam. ?

β. *rubra*, flore rubro, fol. minus incurva. Andrew. t. 139.

γ. *imbricata*, fol. ovatis sulcatis quadrifariis confertis margine ciliatis, glandulis corollinis quatuor. Andrew. t. 113. Aestate.

β ? *striata*, pubescens, fol. oppositi-ovatis subimbricatis sulcato-striatis, cor. tomentosis. Lam. ill. p. 214. h

8. *ovata*, fol. ovatis glabris, ramis glabris rugosis. Thunb. prod. Andrew. t. 119. Flor. majusculi.

323. RIVINA. Cor. 4-petala, persistens. Cal. nullus. Bacca 1-sperma. Sem. lentiforme, scarbrum. (Stam. 4, 8 et 12.)

1. *humilis*, racemis simplicibus, flor. tetrandris, fol. pubescentibus. (Piercea tomentosa). Mill. Styl. supra germen decurrit. In Caribaeis, Jamaica, Barbados. h

2. *laevis*, racemis simplicibus, florib. tetrandris, fol. ovatis acuminatis glabris planis, caul. tereti. Willd. Sp. 1. p. 604. Lam. ill. t. 81. f. 2. *humilis*. Mill. Hab. in America. Fol. margine purpureo.

* *latifolia*, florib. tetrandris, baccis siccis, fol. lato-ovatis laevibus. Lam. ill. p. 324. In ins. Madagascar.

3. *brasiliensis*, racemis simplicibus, flor. tetrandris, fol. ovatis undulato-rugosis, caul. sulcato. Willd. l. c. fol. cordatis. Nocca in Uteri bot. Annal. 6. Stück. p. 63. Hab. in America. h

4. *secunda*, glabra, foliis ovatis acuminatis obsolete denticulatis, cal. bilabiato. Flor. Per. 1. p. 65. t. 102. Hab. in sylvis Poguto. h

5. *octandra*, racemis simplicibus, flor. octandris dodecandrisve. Amoen. acad. 4. p. 305. R. dodecandra. Jacq. In America calidior. Stam. 4. intra calycis folia; relictis 8 alternantibus. L. h

324. SALVADORA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Bacca 1-sperma. Sem. arillo vestitum.

1. *persica*. Lin. Roxb. coromand. 1. p. 26. t. 26. Willd. Sp. 2. p. 665. Habit. ad Sinum persicum, in India orient. h

325. EMPLEURUM. Flor. polygamus. Cal. 4-fidus, inferus. Cor. o. Styl. lateralis. Caps.

magna, oblonga; latere debiscens. Sem. 1, arillatum.

1. *serrulatum*, Ait. Kew. 3. p. 340. Lam. ill. t. p. 347. t. 86. Diosma uni-capsularis. Linn. suppl. p. 155. Ad Cap. b. spei. h

26. CAMPHOROSMA. Cal. urecolatus: dentibus 2 oppositis, alterutroque minimis. Cor. nulla. Stam. exserta. Caps. 1-sperma.

1. *paleacea*, fruticosa, ramis spiciformibus paleaceis pilosis. Linn. suppl. 128. Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *monsipeliaca*, fol. hirsutis linearibus. Lam. ill. t. 86. Buxb. cent. 1. p. 18. t. 28. f. 1. Hab. in Hispaniae Narbonae, Tartariae arenosis. h

3. *acuta*, fol. subulatis rigidis glabris. Hab. in Italia, Tartaria. T.

4. *glabra*, fol. subtriangulis glabris inermibus. Hab. in Helvetia? Facies Poly-eneml. T.

327. PTERANTHUS. Cal. 4-partitus persistens, lacin. concavis: 2-majoribus cristatis. Cor. o. Filam. basi connata. Caps. membranacea, 1-sperma, cal. tecta.

1. *echinatus*. Desf. atl. 1. p. 144-145. Camphorosma Pteranthus. Lin. Louchea cervina. L'Herit. stirp. t. 65. Hab. in Barbariae et Arabiae arvis argillosis. Pedicelli plani, obovati. ©

328. ALCHEMILLA. Cal. 8-fidus. Cor. o. Sem. 1, cal. vestitum.

1. *capensis*, fol. reniformibus sublobatis repando-crenatis, ramis axillaribus. Willd. Sp. 1. p. 608. Lam. ill. t. 106. Hab. ad Cap. b. spei. Facies sequentis, sed minor.

2. *vulgaris*, fol. reniformibus novemlobis acute dentatis utrinque subnudis, corymbis terminalibus. Willd. Flor. dan. t. 63. In sylvis vulgaris.

3. *hybrida*, (*pubescens*), fol. lobatis sericeis acute serratis, caulo petiolisque longis dense pilosis. A. *pubescens*. Lam. pluk. phyt. 240. f. 2. In Enrop. passuis. T.

4. *alpina*, fol. digitatis serratis subtus argenteo sericeis. L. Fl. lapp. 61. Fl. dan. t. 49. A. argentea. Lam. In alpiibus Europae. T.

5. *pentaphylla*, fol. quinatis ternatisque

multifloris glabris. Hab. in monte Cenisio, Furca, Gothardo Rhactorum. $\text{\textcircled{C}}$

6. *Aphanoides*, fol. multiparitis, caul. erecto. Lin. suppl. 129. Hab. in N. Granada. An sequentis generis? $\text{\textcircled{C}}$

DIGYNIA.

329. *APHANES*. Cal. 8-fidus: laciniis alternis minimis. Cor. o. Sem. 2, calyce vestita: uno interdum abortivo. (Stam. 1, 2 et 4.)

1. *arvensis*, foliis trifidis pubescens, flor. axillaribus glomeratis. L. Flor. dan. t. 973. *Alchemilla Aphanes*, Willd. Sp. 2. p. 659. Hab. in arvis et agris.

Obs. Stam. a nonnullis aut 4, quorum 3 vero abortiu-t, ab aliis observata. - Sequentes species ob stylos 2 et semina 2, ad hoc genus retuli, forte genere diversas, cum diandreae sint et stylos diversos habeant: Auctores ipsi hac de re dejuicent iconibusque illustrent.

2. *tripartita*, villosa, fol. 3-partitis, laciniis cuneiformibus multifidis, flor. dichotomo-orymbosis. Flor. Peruv. t. 68, sub *Alchemilla*. Hab. in montibus et scaturiginibus Pillao et Tarmae.

3. *orbiculata*, villosa, fol. orbiculato-reniformibus lobatis serratis, flor. spicato-corymbosis. Fl. Per. l. c. Hab. in Peruviae montibus frigidis et humilis. Caul. ramosissimus, serpens.

4. *pinnata*, foliis pinnatis: pinnulis 2-3-fidis. Flor. Per. p. 69, sub *Alchemilla*. Crescit cum prioribus.

330. *CRUZITA*. Cal. 4-phyllus: exterior 3-phyllus. Cor. o. Sem. 1, cal. vestitum.

1. *americana*, Lam. ill. p. 548. C. hispanica. L. Hab. in Cumana Americae nec in Hispania. Caulis altus. Flor. spicati.

331. *BUFFONIA*. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala, brevior. Caps. 1-locularis, 2-valvis, 2-sperma.

1. *annua*, caul. paniculato, flor. lateralibus terminalibusque, cal. striato. Lam. ill. p. 349. B. tenuifolia. Lin. Pluck. alm. t. 76. f. 4. Habit. in Gallia australi, et in Angliae maritimis rarius. $\text{\textcircled{C}}$

2. *perennis*, caule apice ramoso florifero, cal. margine serrato. Lam. l. c. t. 87. f. 2. Hab. in Gallia australi. $\text{\textcircled{C}}$

332. *HAMAMELIS*. *Involucrum* tri-phyllum. Cal. proprius 4-phyllus. Petala 4, linearia. Nux bicornis, 2-locularis.

1. *virginica*. Lin. Duham. arb. t. p. 287. t. 114. Wild. Sp. p. 701. In Virginia. Floret autumnno, insequente vere semina perficit.

333. *PAGAMEA*. Cal. 4-dentatus persistens. Cor. 4-fida, urceolaris, intus villosa. *Drupa* supera, 2-locularis, nuculis 2, bilocularibus.

1. *guyanensis*, Aubl. gujan. t. 44. Lam. ill. p. 352. t. 88. Hab. in Guyana. Stipul. 2. vaginantes deciduae. Fol. lanceolata. $\text{\textcircled{C}}$

334. *HYPECOU*. Cal. 2-phyllus. Petala 4: exterioribus duobus latioribus. Siliqua.

1. *procumbens*, siliquis arcuatis compressis articulatis, petalis binis majoribus obtuse trilobis. Willd. Sp. t. p. 704. Hab. inter Archipelagi, Galliae segetes. $\text{\textcircled{C}}$

2. *littorale*, siliquis articulatis compressis arcuatis, petalis integris: exterioribus longioribus linearis-spathulatis. Jacq. ic. rar. t. 309. Collect. 2. p. 205. Habit. in sabulosis aridis Austriae littoralis. $\text{\textcircled{C}}$

3. *pendulum*, siliquis cernuis teretibus cylindricis, petalis majoribus obtuse trilobis. Willd. p. 705. Sauv. monsp. 263. Pall. it. 3. p. 553. Hab. in Galloprovincia, Sibiria. $\text{\textcircled{C}}$

4. *erectum*, siliquis erectis teretibus torulosis. Ann. ruth. 58. t. 9. i. 9. Habit. in Davuria. Flores reliquis majores. W.

335. *NERTERIA*. Cal. o. Cor. infundibuliformis, quadrifida, supera, Bacca bilocularis, 2-sperma.

1. *depressa*. Smith. ic. ined. fasc. 2. p. 28. t. 28. Gaert. sem. 1. p. 124. t. 26. f. 1. Flor. Per. t. p. 60. t. 90. Gomoria granadensis. Lin. suppl. 129. Lam. ill. t. 87. Hab. in Novae Granadae locis humidis et regno Chilensi.

336. *GALOPINA*. Cal. o. Cor. supera 4-fida. Sem. 2, muricata.

1. *circaeoides*. Thunb. Nov. Gen. t. p. 3. Anthospermum. Thunb. prod. 32. Hab. ad Cap. b. speci. $\text{\textcircled{C}}$

T R I G Y N I A.

337. *BOSCIA*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 4-locularis,

1. *undulata*. Thunb. prod. p. 32. Hab. ad Cap. b. spei. h

T E T R A G Y N I A.

338. *MYGINDA*. *Cal.* minutus, 4-partitus. *Petala* 4. *Stigm.* 2-4. *Drypa* globosa 1-sperma.

1. *Uragoga*, fol. subcordatis acuminatis subserratis pubescentibus. Swartz. Willd. sp. 2. p. 722. Jacq. amer. t. 16. Habit. in America meridion. Corymb. axillaris. h

2. *Rhacoma*, fol. lanceolato-ovatis crenatis, flor. 1-gynis, stylo 4-fido. Swartz. Flor. 1. p. 340. Jacq. ic. rar. 2. t. 311. *Rhacoma* Crossoptalum. Lin. In Jamaicae maritimis. h

3. *latifolia*, fol. ellipticis crenatis subcoriaceis, stigm. 2-7. Swartz. l. c. p. 342. Hab. in Caribaeis. h

4. *rotundata*, fol. ovato-subrotundis crenatis petiolatis, pedunc. axillarib. subsimplicibus paucifloris. Lam. ill. n.º 1516. Hab. in insulis antillicis. Fol. subtus pubescentia. h

5. *integrifolia*, fol. ovatis integerrimis, fructib. subsolitariis. Enc. bot. 4. p. 396. Cresc. in ins. Martinica. Cortex griseo-albidus, glandulis parvis obsitus.

6. *ilicifolia*, fol. ovato-subrotundis dentato-spinosis subtus incanis, pedunc. axillaribus furcatis. Enc. bot. l. c. Hab. ad St. Dominico. Cort. in adultis flavus. Lign. durum album. h

339. *ILEX*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* rotata. *Stylus*. o. *Bacca* 4-sperma.

1. *Aquifolium*, fol. acutis spinosis nitidis undulatis, flor. axillarib. subumbellatis. Ait. Kew. 1. p. 168. W. sp. p. 307. Flor. dan. 508. β . heterophylla, foliis dentatis spinosis integrisque γ . I. ferox, fol. supra echinatis. Habit. in Europa australiori, Japonia, Virginia. Polygama dioica. Planta hermaphrodita 5-petala, pentandra? Ger. h

2. *japonica*, fol. oppositis ovatis acuminatis spinosis sessilibus, racemis terminalibus. Willd. sp. 1. p. 707. Thunb. jap. 79. Hab. in Japonia. h

3. *opaca*, fol. ovatis acutis spinosis

glabris planis, flor. ad basin ramulorum annotinorum sparsis. Ait. Kew. 1. p. 169. Hab. in Carolina. h

4. *crocea*, fol. oblongis serratis: serraturis ciliato-spinosis. Thunb. prod. 32. H. in sylvis Cap. b. spei. h

5. *serrata*, fol. acutis ciliato-serratis, flor. axillaribus solitariis. Thunb. jap. 78. Habit. in Japonia. h

6. *latifolia*, fol. ovatis serratis, florib. axillaribus aggregatis. Thunb. jap. 79. In Japonia. Caulis arborecens.

7. *Perado*, fol. ovatis cum acumine, inermibus subintegris. Ait. Kew. 1. p. 169. Hab. in Madera. h

8. *Prinoides*, fol. elliptico-lanceolatis acutis deciduis serratis, serraturis muticis. Ait. Kew. 1. p. 169. Habit. in Carolina, Virginia. h

9. *myrtifolia*, fol. ovatis utrinque acut. integerrimis, flor. fasciculatis lateralibus dioicis. Lam. ill. p. 356. Hab. in insulis Caribaeis. Fol. et infloresc. Sideroxyli. h

10. *rosmarinifolia*, fol. linearib. acutia sparsim dentatis: margine reflexo, cymis brevibus lateralibus. Lam. l. c. 1. Cassine γ . enc. bot. Hab. in Carolina.

11. *aestivalis*, fol. ovato-ellipticis planis superne crenato-mucronatis, pedunc. simplicibus. Lam. l. c. *Prinos* lucidus. Ait? Cresc. in Madera.

12. *cuneifolia*, fol. cuneiformibus tricuspidatis. Lin. Plum. ic. 118. f. 2. Hab. in America meridionali. h

13. *Cassine*, fol. alternis distantib. semipervirentibus lanceolatis serratis: serraturis acuminatis. Ait. Kew. 1. p. 170. Hab. in Carolina. h

14. *vomitaria*, fol. alternis distantibus oblongiusculis obtusiusculis crenato-serratis: serraturis muticis. Ait. 170. Cassina *Peragua*. Lin. Mill. dict. 1. 83. f. 2. Cassina vera Floridanorum Catesb. carol. 2. t. 57. In Florida austr. h

15. *crenata*, fol. ovatis crenatis, pedunc. rameis sparsis subtrifloris. Thunb. jap. 78. Hab. in Japonia. h

16. *marginata*, fol. obovatis emarginatis, flor. axillaribus binis. Thunb. Hab. in Japonia. h

17. *salicifolia*, fol. lanceolatis utrinque attenuatis dentatis, pedunc. petiolo longioribus axillaribus cymosis. Willd. sp. p. 710. Jacq. collect. 4. p. 36. t. 2. f. 2. Hab. in ins. Mauritii. h

18. *asiatica*, fol. lato-lanceolatis oppositis integerrimis. Lin. In India. h

19. *integra*, fol. oblongis obtusis integerrimis, flor. sessilibus umbellatis; pedunc. unifloris. Thunb. jap. 77. Hab. in Japonia. h

20. *rotunda*, fol. rotundatis acutis integris, pedunc. umbelliferis. Thunb. jap. 77. Hab. in Japonia. Rami nodulosi. h

21 ? *obcordata*, stigmae simplice, fol. obcordatis coriaceis, caul. fruticoso. Swartz. Flor. 1. p. 338. Hab. in montibus coeruleis Jamaicae. h

22 ? *Macneoua*, (*acuminata* Willd.) fol. ovatis acuminatis emarginatis integerrimis, pedunc. cymosis axillaribus. Willd. sp. 711. *Macneoua gujanensis*. Aubl. guj. t. p. 88. t. 34. Lam. ill. t. 75. In Gujana, Cajenna. h

23 ? *Paltoria*, fol. ovalibus erenatis, pedunc. subtrifloris, stig. magno tetragono integro. *Paltoria ovalis*. Flor. Per. l. p. 44. t. 84. Habit. in Peruviae montibus altissimis. Biorgyalis. h

340. **RIQUERIA**. *Cal. triplex. Petala 4*, concava. *Filam. compressa. Caps. 4-locularis*, stylis coronata.

1. *avenia*. Fol. oblonga avenis. Racemi terminales. Flor. Per. l. p. 70. In Peruviae nemoribus. h

341. **POTAMOGETON**. *Cal. o. Petala 4. Stylus o. Semina 4*.

1. *natans*, fol. natantibus petiolatis ellipticis acutis basi rotundatis subcordatis. Willd. sp. p. 712. Flor. dan. t. 1025. Habit. in Europae lacubus et stagnis. h

2. *fluitans*, fol. natantibus longe petiolatis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis Willd. Roth. germ. II. 202. In Europae fluviis. Simile praecedenti. h

3. *heterophyllum*, fol. superioribus petiolatis ellipticis utrinque attenuatis, inferioribus confertis sessilibus linearibus. Willd. Schreb. spicil. p. 21. Habit. in stagnis et rivulis.

4. *perfoliatum*, fol. corollatis amplexicaulis. Habit. in Europae lacubus et fluviis. Totum praeter apicem submersum. h

5. *densum*, fol. ovatis acumin. oppositis confertis, caule dichotomo, spica quadriflora. Encl. bot. t. 397. Hab. in Europae meridionalis fossis.

6. *lucens*, fol. lanceolatis planis oppositis in petiolos desinentibus triuncerviis. Hab. in lacubus, stagnis. h

7. *crispum*, fol. lanceolatis alternis oppositis undulatis serratis. Curt. Lond. ic. Flor. dan. t. 927. Hab. in fossis et rivulis lentis.

8. *serratum*, fol. lanceol. oppositis subundulatis. P. fol. tenuibus ellipticis, nervis convergentibus. Hall. P. caul. longe ramosis. Gnet. Hab. in rivulis. Differt a priore praecipue fol. confertioribus integerrimis. Willd. p. 715.

9. *compressum*, fol. linearibus obtusis, caule compresso, spicis brevibus 4-6-floris. Flor. dan. t. 203. Hab. in fossis paludosis. ©

10. *striatum*, fol. linearibus striatis, caul. compresso, flor. spicatis. Flor. Per. l. p. 70. t. 96. Hab. in Peruviae aquis. Fluitans.

11. *Zosteræfolium*, fol. linearibus longissimis obtusis cum mucrone, alternis oppositis sessilibus, caule compresso, spic. uncialibus multifloris. Schumacher. Flor. Zaelland. septent. t. p. 50. Habit. in Zaellandiae rivulis et piscinis.

12. *gramineum*, fol. lineari-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus, caule tereti subdichotomo. Smith, brii. l. p. 196. Raj. syn. ed. 3. t. 4. f. 3. In fossis et fluviis. Stipula involuto-tubulosa.

13. *pusillum*, fol. linearibus alternis oppositis stipul. angustioribus basi patentibus, caule tereti, pedunc. axillaribus paucifloris. Smith, l. c. p. 197. Vaill. bot. t. 32. f. 4. Hab. in aquis argillaceis. Stipulae amplexicaul. fol. latiores.

14. *pectinatum*, fol. setaceis parallelis approximatis disjunctis, basi vaginantibus. Smith, l. c. Flor. Dan. t. 185. p. maritimum. Lin. Var. *pectinati secundum* Sch. Smith. Caul. subflexuosus. Schum. p. 52. Vaill. bot. t. 32. f. 3.

15. *filiforme*, fol. linearibus marginibus involutis, caul. tereti pedunculisque filiformibus elongatis, spic. 3-glomeratis. Schumacher. l. c. p. 51. P. setaceum. Frequens in Zaellandiae lacubus. A P. setaceo diversum dicit auctor. †

16. *setaceum*, fol. lanceolatis oppositis acuminatis. Lin. Hab. in fossis paludosis. †

242. **RUPPIA**. *Cor. o. Cal. o. Sem. 4*, pedicellata.

1. *maritima*, flor. dan. t. 364. Engl. bot. t. 136. Mich. gen. t. 35. Hab. in Europae et Americae maritimis et fossis stagnantibus. h ?

Obs. Pedunc. subspirales longissimi vel breves, Valisneriae modo, a planta contrahuntur aut laxantur. vid. Smith, brit. s. 193. Planta videtur monoica.

343. *SAGINA*. *Cal.* 4-phyllus. *Petal.* 4. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis, poly-perma.

1. *cerastoides*, caule diffuso dichotomo, fol. spatulatis obovatisque recurvis, pedunc. fructiferis reflex. Smith, Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 344. Willd. sp. 1. p. 718. Habit. in arenosis maritimis et fissuris rupium, in Bodotriæ insulis. ☉

2. *procumbens*, caulib. glabris procumbentibus. Curt. Lond. 3. t. 12. Hab. in pascuis sterilibus, aridis. Var. floribus apetalis. ☉

3. *apetala*, caule erectiusculo pubescente, flor. subapetalis. Curt. t. 14. Habit. in agris et arenosis. ☉

344. *MOENCHIA*. *Cal.* 4-phyllus. connivens: lacin. lanceolatis acutis. *Cor.* abbrevior: petal. integris. *Caps.* evalvis, 1-locularis, apice 5-fariam dehiscens. *Sem.* reniformia scabra.

1. *glauca*, caul. erecto 1-2-floro. Sagina erecta. Lin. Curt. Lond. Fac. 2. t. 12. Engl. bot. t. 609. M. quaternella. Ehrh. Alvinella erecta. Moench. meth. p. 222. In pascuis, ericetis, sylvestribus. Vere. ☉

345. *RADIOLA*. *Cal.* multifidus. *Pet.* 4. *Caps.* supera, 8-valvis, 8-locularis. *Sem.* solitaria.

1. *Millegrana*, caule ramosissimo dichotomo. Smith. brit. 1. p. 202. Radiola linoides. Roth. germ. 2. p. 599. Linum Radiola. Lin. Flor. dan. t. 178. Millegrana. Raj. syn. Chamaelium. Vaill. Bot. t. 4. f. 6. Cresc. in inundatis arenosis, sabulosis. ☉

346. *TILLÆA*. *Cal.* 3-s. 4-partitus. *Petal.* 3 s. 4, æqualia. *Caps.* 3 s. 4, bi-poly-spermae.

1. *aquatica*, caule erecto, fol. linearibus, flor. sessilibus. Willd. Sp. 1. p. 730. Hab. in Sueciae et Germaniae inundatis. ☉

2. *prostrata*, caul. prostrato, fol. lanceolatis, flor. axillaribus pedunculatis W. 1. c. Schlut. in Unt. Nov. Annal. bot. 6. p. 4. Hab. in Geruziae humilibus. Stam. 8: 4 sterilia. ☉

3. *Vaillantii*, caule erecto dichotomo, pedunc. elongatis cal. turbinato semidriformi. Willd. sp. p. 720. Buillaria. L'Her. Decand. Pl. græc. 10. Vaill. Paris. t. 10. f. 2. In Galliae humidis. ☉

Obs. Ob calyc. et squamas nectarinas 4, integras lineares forte distincti generis, quononnullae aliae species forsitan pertinent.

4. *capensis*, fol. oblongiusculis, flor. quadrifidis. Lin. suppl. 129. Crassula nautas Thunb. prod. p. 54. Hab. ad Cap. b. spei. Rad. capillares copiosae. Nectaria purpurea triangularia. ☉

5. *perfoliata*, fol. perfoliatis ovatis, corymbis terminalibus, floribus quadrifidis. Lin. suppl. 120. Crassula inanis Th. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

6. *connata*, caule erecto, fol. connatis linearibus, carnosis, flor. axillaribus. Flor., Per. t. p. 70. t. 96. f. a. Hab. in collibus Chancay, supra saxa. ☉

7. *umbellata*, fol. subpetiolatis ovatis obtusis integris, caule capillari erecto, flor. umbellatis. Willd. p. 721. Crassula Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

8. *decumbens*, decumbens, fol. subulatis, petalis calyce brevioribus. Willd. H. ad Cap. b. spei. ☉

9. *muscosa*, procumbens. flor. trifidis. Lin. Decand. Plant. Grass. 10. Lam. ill. t. 90. f. 2. Mich. gen. 22. t. 20. In Europae merid. humidis, turfosis muscosis. Numerus partium in planta culta interdum quinquarius. Caps. articulatae, 2-spermae.

347. *COLDENIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* infundibuliformis. *Styli* 4. *Caps.* 4, approximatae, 1-spermae.

1. *procumbens*. Linn. Lam. ill. t. 89. Pluck. alm. 363. t. 64. f. 6. Habit. in India. Fol. petiolata, obovata, subulnata. L. ☉

MONOGYNIA.

Valeriana supina, sibirica, villosa. Boerhaavia 4-andra. Justicia pulcherrima. Lycium 4-andrum. Cordia 4-andra. Solanum flexuosum. Citræxylæ quaedam

species. Casentae quaedam. Convallaria bifolia. Coffeae nonnullae species. Nondeletia pilosa, virgata. Hillia 4-andra. Guetterda elliptica, membranacea. Portlandia 4-andra. Evonymi plures. Portulaca meridiana. Cinchonae nonnullae. Laugeria coriacea, Melastoma 4-andra. Lythrum thymifolium. Prinos glaber et nitidus. Peplis indica. Sissoemia 4-andra. Thesium alpinum. Corchorus Coreta. Exaca quaedam.

D I G Y N I A.

Gentianae quadrifidae. Swertiae nonnullae. Mygynda latifolia. Ulmus suberosa. Herniaria fruticosa, glabra?

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

ASPERIFOLIAE s. BORRAGINAEAE, Juss.

Gen. 348-38. Caule sunt ut plurimum herbaceo, etiam frutescente, rarius arboresc.; foliis alternis, saepe asperis; semina habent plerumque 4, pericarpio inclusa; aut nuda (nuculae), calice persistente cincta. Cor. regularis infundibuliformis, fauce nunc aquamulis fornicata, nunc nuda.

† Semina 4, nuda.

348. **HELIOTROPIMUM**. Cor. hypocrateriformis, 5-fida, interjectis dentibus aut plicis: fauce nuda. (Spicae recurvato-involutae.)

1. *peruvianum*, fol. lanceolato-ovatis, caule fruticoso, spicis numerosis aggregato-corymbosis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 740. In Pern. Vanillam redolet. h

2. *amplexicaule*, fol. lanceolatis obtusis semimplexicaulibus, spicis ramosis, caule fruticoso. Vahl. symbol. 3. p. 21. In Brasilia. h

3. *indicum*, fol. cordato-ovatis (ovalib.) acutis scabriusculis, spicis solitariis, fructibus bisidis. Lin. Pluck. phyt. 245. f. 4. In India utraque. ©

4. *parviflorum*, fol. ovatis rugosis scabris oppositis alternisque, spicis subconjugatis. Mant. 201. Dill. elib. 178. t. 146. f. 175. Hab. in India. ©

5. *inundatum*, fol. oblongis obtusis hirsutis, spicis quaternis erectis, caule frutescente. Swartz. profl. 40. Ej. Flor. 1. p. 343. Hab. in insulis Caribaeis, in Jamaicae locis submaritimis.

6. *villosum*, fol. subrotundo-ovatis in-

tegerimis planis villosis-tomentosis, spicis solitariis. Willd. l. c. p. 741. Tournef. cor. 7. Hab. in insula Malo. ©

7. *europaeum*, fol. ovatis integerrimis, tomentosis rugosis, spicis conjugatis. Linn. Jacq. aust. 3. t. 207. In Europa australi. Inodora. ©

8. *coromandelianum*, fol. obovatis villosis integris, spicis simplicibus conjugatisque, seminibus punctatis. Retz. obs. 2. p. 9. Hab. in India.

9. *malabaricum*, fol. ovatis plicatis strigosis integerrimis, spicis subsolitariis. Retz. obs. 4. p. 24. Burm. ind. 40. t. 16. f. 1. Hab. in India.

10. *marifolium*, fol. lanceolatis hispidis, caulibus procumbentibus fruticulosis, spicis simplicibus alternis. Retz. obs. 2. p. 8. Hab. in India. h

11. *supinum*, fol. ovatis integerrimis tomentosis plicatis, spicis solitariis. Gouan. monip. 17. c. fig. Tournef. Cor. 7. it. vol. 1. p. 342. t. 23. Hab. Salmanticae juxta agros, Mompeli in litora et in Barbaria. ©

12. *undulatum*, fol. lanceolatis hispidis margine revolutis undulatis, spicis conjugatis, corollis villosis, caule procumbente. Vahl. symbol. 1. p. 13. Lithospermum hispidum. Forsk. arab. p. 38. n.º 24. Hab. in Aegypto. h

13. *lineatum*, foliis ellipticis petiolatis villosis margine revolutis planis, spicis conjugatis, caule procumbente. Vahl. symb. 1. p. 13. Forsk. arab. p. 39. n.º 25. Habit. in Aegypto. h

14. *strigosum*, fol. linearibus lanceolatis strigosis-papillois, spicis conjugatis, caule erecto fruticoso. Willd. p. 743. Habit. in Guinea. Facies H. zeylanici. h

15. *fruticosum*, fol. lineari-lanceolatis pilosis margine revolutis, spicis solitariis sessilibus, caule fruticoso. Lam. ill. p. 394. Sloan, hist. 1. t. 132. f. 4. Hab. in insulis Caribæia.

16. *curassavicum*, fol. lanceolato-linearibus glabris avenis, spicis conjugatis. Pluck. alm. 183. t. 36. f. 3. Moris. 2. 17. t. 31. f. 12. Hab. in Americæ calidioris maritima. ☉

17. *zeylanicum*, fol. lineari-lanceolatis utrinque attenuatis subtus villosis, spicis solitariis conjugatisque filiformibus longissimis nudis. Willd. p. 744. Lam. encyclop. 5. p. 60. et ill. p. 393. Burm. ind. t. 16. fig. 2. Hab. in Zeylona. ♀

18. *persicum*, fol. lineari-lanceolatis villosis recurvatis, caule fruticoso, spicis terminalibus foliosis. Lam. l. c. Burm. t. 19. f. 1. Hab. in Persia. ♀

19. *corymbosum*, fol. oblongo-lanceolatis, caule fruticoso, spicis terminalibus aggregato-corymbosis, lacin. calycis longis subulatis. Flor. Per. 2. p. 2. t. 107. Hab. in Peruvia. ♀

20. *oppositifolium*, fol. ovatis acutis latissimè integerrimis, caule fruticoso, spic. dichotomo-corymbosis. Flor. Per. l. c. t. 108. In Munna aridis. Coccol. exus hispidiuscula.

21. *incanum*, fol. ovatis acutis crenatis lenticatis rugosis, caul. fruticoso, spic. dichotomo-corymbosis. Flor. Per. l. c. fig. 6. Hab. in Huanuci colliib. aridis. Cal. fructus ventricosus.

22. *myrcalix*, fol. oblongo-lanceolatis, caule suffruticoso, spicis oppositifol. dichotomis, cal. minimis 5-dentatis. Flor. Per. p. 3. t. 109. In Peruvie colliibus.

23. *pilosum*, fol. lanceolatis integerrimis, caule fruticoso procumbente, spicis brevibus subquaternis, fructu hispidulo. Fl. Per. 1. p. 3. t. 110. f. a. Hab. in Lima colliibus aridiisculis.

24. *lanceolatum*, fol. lanceolatis, caule fruticoso, spicis terminalibus dichotomo-corymbosis. Flor. Per. 2. p. 4. t. 101. H. in Pillao et Huanuci nemoribus. Cor. dilute cæruleæ.

25. *microstachyum*, fol. oblongis alternis, caul. herbaceo, spicis aggregatis brevibus, fruct. bipartilibus. Flor. Per. l. c. fig. b. Hab. in aridis Tarmæ. Sem. 2, bilocularia, nonnulla 1-locularia. l. c.

26. *synzostachium*, fol. ovatis oppositis intermediis alternis, spicis longissimis ge-

minis, fructu 2-partibili. Hab. in Lima segetibus et campis aridis. Cor. tubus clavatus longissimus: lacinis acutis.

Obs. An cum priore Messerschmidie aut distincti generis species? cum semina pericarpio manifesto inclusa sint.

27. *scabrum*, fol. lanceolatis strigosis, caule ramoso diffuso, flor. congestis. Retz. obs. 2. p. 8. Hab. in India. Facies fere Sphaerædiæ. Retz. ☉

28. *orientale*, procumbens, fol. linearibus glabris avenis, flor. sparsis lateralibus. Lin. Hab. in Asia. ☉

29. *gnaphalioides*, fol. linearibus obtusis tomentosis, pedunculis dichotomis, floribus quaternis, caule feuteco. L. Jacq. amer. 25. t. 173. f. 12. Ed. 2. t. 264. f. 77. Moris. List. 3. 2. 12. t. 28. l. 6. In Barbados, Jamaicae macitima. ♀

30. *ternatum*, fol. ternis alternisque lanceolatis subtus incanis, spicis terminalibus conjugatis. Vahl. symbol. 3. p. 21. Hab. in India occident. Facies H. fruticosi, et forte non nisi varietas. Vahl. ♀

31. *pinnatum*, fol. pinnatis. Vahl. l. c. Hab. ad fretum Magellanicum.

349. **MYOSOTIS.** Cor. hypocrateriformis, 5-fida, subemarginata: fauce clausa fornicibus. Sem. lævia aut echinata.

* *Seminib. lævibus.*

1. *scorpioides*, semin. lævibus, caule subsimplici, fol. lanceolatis obtusis, cal. corollæque patulis. Willd. sp. p. 746. Flor. dan. t. 581. M. palustris Roth. germ. l. 87. II. 221. Hab. in Europæ humidis, rivulis. Fol. ligulata subcarnea. T.

2. *arvensis*, caule basi remotissimo foliisque pilosis, racemo nudo, corol. connivente. Bull. herb. t. 355. Hab. in pratibus, arvis. Var. caule simplicissimo. fol. rosaceo-congestis, petalis non emarginatis: M. simplex. ☉

β? *sylvatica*, caule elongato hirsuto, fol. lineari-lanceolatis, racemo conjugato. Ehrh. Freq. in sylvis. Caul. 3-gonus, ultea pedalis. Fol. rad. marida subovata.

γ? *versicolor*, subæscpitosa, caul. elongato foliisque ligulatis pilosis, flor. minutis flavis. In sylvaticis. Caul. tectiusculus scaber. Fol. caul. alterna. Cor. flava et cæruleæ. Cal. clausus. Vid. Roth. germ. 2. p. 222.

3. *lutea*, caule herbaceo erecto, foliis

ovatis alternis ciliatis villosis, flor. sparsis racemosis, cor. limbo integro patentissimo. *Anchusa lutea*, Cav. ic. t. p. 50. t. 69. f. 1. Habit. in Mattiæi vicinis, Martio. Rad. fibrosa, rubesc. ☉

4. *Apula*, seminibus nulis, fol. lineato-lanceolatis hispidis, racemis foliosis. Lam. ill. p. 395. Lithospermum apulum. Vahl. Pluck. Phyt. 16. f. 5. Floh. in Europa meridionali, in Alpibus et ad Cap. bou. spei. Rad. lignosa fere. Flores terminales. Cor. lutea vix cal. longior.

5. *obtusata*, semin. laevibus, fol. lanceolatis acutis hispidis, cal. obtusissimis, radice repente ramosa. Plant. rar. hungar. p. 103. t. 100. Cresc. in Hungariae graminosis et pratis. Petala non emarginata. Sem. basi alba, circulo tumido. ☉

6. *nana*, seminibus laeviusculis margine serrulatis, caule simplici paucifloro, foliis oblongis villosis. Willd. Vill. Delph. 2. p. 459. M. tergovensis. Haecq. pl. alp. p. 12. t. 2. f. 6. In Alpibus. Flor. majusculi. ☉

7. *fruticosa*, seminib. laevibus, caule fruticoso laevi. L. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

8. *spathulata*, seminib. laevibus, foliis spatulatis hispidis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. Forst. prod. n.º 62. In Nova Zeelandia.

9. *rupestris*, seminib. laevibus, foliis linearibus villosis, racemis alternis. Willd. p. 748. Pall. itin. 3. app. n.º 71. t. E. f. 3. Hab. in Davuriae saxosis apricis siccis. ☉ Flor. speciosi.

10. *corymbosa*, seminib. laevibus, fol. linearibus acutis, caul. oblongis, flor. corymbosis. Flor. Peruv. 2. p. 5. Hab. in Chile campis. Subhispidis. ☉

11. *granulosa*, sem. granulosis, foliis linearibus hispidis punctis albicanthibus, flor. secundis. Flor. Per. l. c. Habit. in Limae arenosis.

12. *humilis*, semin. rugosis, fol. linearibus, caul. brevibus, florib. lateralibus secundis. Flor. Per. l. c. Habit. in Peruviae campis. Procumbens. ☉

** *LATIFOLIA*. Sem. s. fructibus echinatis.

13. *virginiana*, sem. aculeato-glochidibus, fol. ovato-oblongis, racemis divaricatis. Lin. Moris. 4. 11. t. 30. f. 9. In Virginia. Sequentis var. ? ☉

14. *Lappula*, sem. aculeis glochidibus, fol. lanceolatis pilosis. L. Cynoglossum glandulosum faucium glabris. Hall. helv. n.º 589. Hab. in argillosis, ruderalis, muris. ☉

15. *squarrosa*, seminum angulis setoso-uncinatis, fol. lanceolatis pilosis apice callois. Retz. obs. 2. p. 9. Hab. in Sibiria ad Volgam. ☉

16. *echinophora*, sem. undique hamato-aculeatis, pedunc. apice incurvatis axillaribus solitariis, fol. lanceolatis pilosis. W. Pall. itin. 3. app. n.º 71. t. li. f. 1. Hab. in Sibiria ad Volgam in ripis praeruptis nitrosis. ☉

17. *spinocarpos*, semin. muricato-spinosis, racemis foliosis, floribus remotis, fol. linearibus pilosis. Vahl. symb. 2. p. 32. *Anchusa spinocarpos*. Forst. descr. p. 41. Circa Alexandriam. Flores albi. Caulis diffus. ☉

18. *borbonica*, sem. aculeis glochidibus echinatis, fol. subnudis lineari-lanceolatis longissimis. Lam. l. c. In insula Bourbonia. Fol. tuberculata.

19. *gracilis*, sem. echinatis, fol. linearibus, caul. gracilibus, flor. lateralibus laxo spicatis secundis. Flor. Per. 2. p. 5-6. Hab. in Chole campis et collib. Cor. alba. ☉

20. *Cynoglossoides*, seminib. depresso-concavis, aculeis glochidibus radium muricatis, fol. oblongis hispidis, flor. axillarib. Lam. l. c. Hab. ad Cap. b. spei.

21. *pectinata*, sem. apice setosis, racemis rectis, fol. ovato-lanceolatis villosis. Willd. Pall. itin. 3. app. n.º 71. t. E. f. 4. Hab. in Sibiria in rupibus muscosis frigidis ad Jenisem. ☉

350. *TIQUILIA*. Cal. 5-partitus. Cor. infundibuliformis: laciniis emarginatis, fauce unda. Stam. exserta. Styl. filiformis, longior. Stigmata 2, simplicia. Sem. 4: unum saepius abortivum.

1. *dictyotoma*, Lithospermum *dictyotomum*, semin. laevibus, caul. prostrato, fol. oblongo-obovatis linearibus rugosis, floribus congestis. Flor. Per. 2. p. 5. t. 111. Hab. in Peruviae arenosis. Caul. dictyotomus, geniculatus, nodosus. Habitus omnino a Lithospermis recedit. Nom. vernaculum *Tiquilo*.

351. *LITHOSPERMUM*. Cor. infundibulif. fauce perforata, nuda. Cal. 5-partitus. Sem. ossea, nitida. (Crenitalia inclusa.)

1. *officinale*, semin. laevibus, corollis vix calycem superantibus, fol. lanceolatis venosis. Engl. bot. t. 134. Willd. sp. p. 751. Flor. dan. t. 1084. Hab. in ruderalis, sylvestris. Sem. alba. ☉

2. *latifolium*, fol. lato-ovalibus nervosis supra asperis subnudis, sem. lucidis punctatis. Michaux, Flor. 1. p. 137. Halat. in umbrosis Kentucky. Priori affine.

3. *angustifolium*, pumilum procumbens, fol. linearib. 1 pilis brevib. appressis, semin. nudiis punctatis, Michaux, p. 130. Ad flumen Ohio. Puncta in seminibus uti autecedentis excavata.

4. *distichum*, sem. laevibus lucidis, fol. ovato-lanceolatis, margine revolutis, flor. axillaribus petiolatis. Ortega Decad. p. 8. In insula Cuba. Cor. alba: fauce lutea. Sem. alba. Folis latiusculis, fere avenia.

5. *arvense*, seminib. rugosis, coroll. viz calyce superantibus. Engl. bot. t. 123. Fl. dan. t. 456. Hab. in agris et arvis. Planta tinctoria videtur. ☉

6. *tinctorium*, semin. rugosis, corollis cal. superantibus, fol. linearilanceolatis, flor. lateralibus solitariis. Flor. Per. 2. p. 4. t. 114. In Ghile arenosis. Pl. herbacea, hinc inde purpurea.

7. *cuneifolium*, ineanum, fol. cuneiformibus, flor. axillaribus solitariis, semin. nudiis. Flor. Per. 2. p. 4. Hab. in Peruviae collibus aridis.

8. *hispidum*, sem. rugosis, fol. lanceolatis sessilibus, apice revolutis. Flor. Per. 1. c. p. 5. In Peruviae saxosis. Albicans. Cor. lutea. ☉

9. *muricatum*, sem. muricatis, cor. cal. aequante, fol. lanceolato-linearibus. Flor. Per. 2. p. 4. Cal. fruct. expansus. In Ghile ruderalis et parietibus.

10. *incanum*, seminibus asperis, spicis terminalibus compositis coarctatis, foliis linearibus villosis. Forst. prod. n.º 65. In insula Teauten et feroci. h

11. *papillosum*, seminib. rugosis, fol. lanceolato-ovatis papilloso-hirsutis. Thunb. Prod. 34. Hab. ad Cap. b. spei.

12. *tetrastigma*, fol. lanceolatis hirsutis, flor. in spicis terminalibus secundis, stigmate quadrifido. Lam. encyc. 3. p. 29. et ill. p. 368. Hab. in Aegypto. ☉

13. *scabrum*, seminib. laevibus, foliis lanceulatis papilloso-scabris hirsutis. Th. prod. 34. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *orientale*, ramis floriferis lateralibus, bracteis cordatis emplexicaulibus. Habit. in Oriente. ☉

Obs. Habitus recedit. Cal. subdeceguus. Cor. flava, fauce margine pilosa. Stigma ca-

pitatum. Sem. subpubescentis: *Oskampia* trichotoma. Moench. Method. p. 470.

15. *purpureo-caruleum*, sem. laevibus, corollis calyc. multatis superantibus. L. H. in memoribus et secus vias. Caules steriles repentes radicanes. h

16. *fruticosum*, (*rosmarinifolium*), fruticosum, fol. linearibus hispidis, margine revolutis, staminib. corollam aequantibus. Mill. dict. n. 3. *Anchusa* lignosior Monspelensium, flore violaceo. Barr. ic. 1168. *Euglossum*, rosmarial fol. Gard. aix. t. 15. Hab. in Europa australi. h

17. *decumbens*, (*pentagonum*), callosolispilum, fol. lanceolatis, cal. basi pentagonis strigosis, sem. tuberculatis, caule herbaceo. Venten. Descr. p. 37. t. 37. Habit. in Bagdad. ☉

18. *callosum*, decumbens, fol. lanceolato-linearibus callosolispilosis hispidis, caule suffruticoso hispido. Vahl. symbol. 1. p. 14. Hab. in desertis prope Cairo. h

19. *ciliatum*, fol. ovatis incanis margine callidis ciliatis, caule suffruticoso muricato hispido. Vahl. symbol. 1. p. 14. Habit. ad canales prope Cairo. h

20. *tenuiflorum*, fol. linearilanceolatis strigosis, coroll. filiformibus. Lin. suppl. 130. Hab. in Aegypto. Cor. caerulea. ☉

21. *dispermum*, semin. duobus, caly. cib. patentibus. Lin. dec. 1. t. 7. In Hispania Calyx quasi inflatus. ☉

22. *retortum*, fol. inferioribus spathulatis summis linearibus, calycibus fructiferis pendulis ciliatis monospermis, aemine confuso callosolispilosis. Willd. sp. 2. p. 755. Pall. it. 3. app. n.º 72. t. II. 64. a. Hab. in Sibiria ad ripas praerupt. nitrosas Volgae. ☉

β ? *incurvum*, fol. sublancoelatis incanis, cal. lacinia apice incurvatis, seminib. quaternis. In Hispaniae collibus. Thibaut.

352. BA T SCHIA. Cal. subquinq. fids. Cor. hypocrateriformis (majuscula), tubo recto, cal. longior: iatus basi apiculo barbato: fauce nuda, lacinia rotundatis. Sem. dura nitida.

1. *carolinensis*, hirsuta, fol. floralibus ovatis, cal. longis anblaucoelatis. B. Gmelini. Michaux. Flor. 1. p. 130. Gmel. cyt. II. p. 315. Hab. in aridis sylvis Carolinae inferioris.

2. *canescens*, candicanti-villosa, fol. omnibus oblongis, cal. brevissimis. Mich.

t. 14. In collibus sylvaticis Tennessee. Obs. An Lithospermum oricoidale L. hujus generis?

353. *ANCHUSA*. Cor. infundibuliformis: fauce clausa fornicibus. Sem. basi insculpta, superficie ut plurimum venosa.

1. *paniculata*, fol. lanceolatis strigosis integerrimis, panicula dichotoma divaricata, flor. pedunculatis, cal. quinquepartitis, lacinii subulatis. Ait. Kew. 1. p. 177. Willd. sp. 2. p. 756. *A. macrophylla*. Lam. ill. p. 402? Hab. in Madera. \mathcal{H}

2. *capensis*, foliis lanceolatis callosis villosis, racemis triehotomis. Thunb. pr. 34. Hab. ad Cap. b. spi.

3. *officinatis*, foliis lanceolatis, apicis imbricatis secundis, bract. ovatis. Lin. Fl. dan. t. 572. Hab. ad rudrata, vias, agros. Cal. 5-partitus. \mathcal{H}

4. *angustifolia*, fol. oblongo-lanceolatis integris, flor. spicatis, calycib. quinquefidis, bract. linearis-lanceolatis. Moris. 2. 11. t. 26. f. 4. In Italia, Germania. \mathcal{H}

5. *undulata*, strigosa, fol. linearibus dentatis, pedicellis bracteis minoribus, cal. fructiferis inflatis. Boccon. mus. t. 77. Burr. ic. 578. Hab. in Hispaniae, Lusitaniae, Si. biriae pratis. \mathcal{H}

6. *tinctoria*, tomentosa, fol. lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. H. Monspeli et in Barbaria. \mathcal{H}

7. *hispida*, pedunc. axillaribus diphylis, fol. lanceolatis repando-dentatis hispidis. Vahl. symb. 2. p. 33. In Aegypto.

8. *virginica*, flor. sparsis, caule glabro. A. Paecon indigenis dicitur qua se piungunt americani. Pluck. alm. 30. Moris. 2. 11. t. 28. f. 4. Hab. in Virginia. \mathcal{H}

9. *lanata*, fol. villosis, calycib. hirsutis, staminibus corolla longioribus. H. Algiriae.

10. *sempervirens*, peduncul. diphyllis capitatis. Hab. in Anglia, Hispania. Flor. veie. Cor. caerulea Myosotidis. \mathcal{H}

11. *parviflora*, fol. linearibus cauleque ramosissimo hispidis, racemis paucifloris confertis. Willd. p. 759. Hab. in Oricute.

12. *caespitosa*, foliis linearibus obtusis basi attenuatis caule longioribus, racemo terminali simplici subquadrifloro. Willd. Lam. encycl. 1. p. 498. Hab. in Creta. Rad. crassa, \mathcal{H}

† *Buolossus* : *squamulis faucis cor. penicilliformibus.*

13. *italica*, caule exaltato, fol. lucidis strigosis, racemis bipartitis diphyllis, flor. subaequalibus, fauce barbatis. Retz. obs. 1. p. 12. Trew. Dec. 2. p. 14. t. 13. Moris. 2. 11. t. 26. f. 1. Hab. in Europa australi in campis : saepius cum *A. officinali* confunditur. (Bogl. caeruleum.)

Obs. An *Cynoglossum fulvum*, cor. cal. aequali limbo fornicumque apicibus barbatis Rudolphi in Schrad. bot. Journ. 2. p. 280. bujus loci? qualis plantae prope Lisbonam crescentis pedunculi lanugine aurea vetusti sunt.

354. *CYNOGLOSSUM*. Cor. infundibuliformis: fauce clausa fornicibus. Semina depressa, laterq. interiore stylo affixa.

1. *officinale*, staminibus corolla brevioribus, fol. lato-lanceolatis basi attenuatis tomentosis sessilibus, lacinii calycinis oblongis. Ait. Kewt 2. p. 179. Willd. sp. 2. p. 760. Flor. dan. t. 1147. Hab. in rudratis. Odore murino foetet. Smith.

2. *montanum*, stam. corolla brevioribus, fol. spatulato-lanceolatis lucidis nudiusculis subius scabris. Smith, Brit. 1. p. 216. (C. sylvaticum.) C. montanum. Lam. C. virginianum. Lin. syst. veg. ed. 13. nec Sp. pl. C. Dioscoridis. Villars. C.-virente folio. montana frigidarum regionum. Column. Ecphr. t. 175. C. sylvaticum Haenke in Jacq. coll. 2. p. 77. non differe videtur. Hab. in sylvaticis montosis. Vix foetet. Sm.

3. *picum*, corollis calyci subaequalibus venosis, lacinii calic. subrotundo-dilatatis, fol. lanceolatis tomentosis : superioribus basi cor. Janis. Ait. l. c. *creticum*. Villars. Hab. in Europa australi, Barbaria et Madera. \mathcal{H}

4. *lanceolatum*, fol. lanceolatis utrinque attenuatis supra punctato-scabris inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus. Vahl. symbol. 2. p. 34. Hab. in Arabia.

5. *virginicum*, foliis amplexicaulibus. Gron. virg. 99. Moris. 2. 11. t. 30. f. 9. Hab. in Virginia. \odot

6. *amplexicaule*, hirsutissimum, foliis ovali-oblongis : superioribus amplexicaulibus, corymbo terminali aphylo, seminibus obovatis. Mich. Fl. 1. p. 132. In montibus Alleghania. An idem cum antecedente?

7. *clandestinum*, fol. lanceolatis villosis, corol. calycem aequantibus aequi-

tomentoso pubescentibus. Desf. atl. I. p. 159. t. 42. Habitat ad limites agrorum Algeriae. Sem. cebinata spinulis peltatis uncinatis. D.

8. *cheirifolium*, corollis calyce duplo longioribus, fol. lanceolatis sericeis. C. fol. spatulatis incanis tomentosis semimplexicaulis. Gouan. monsp. 20. Hab. in Creta, Gallia, Hispania, Oriente. Corollae albae venis sanguineis. ♂

9. *apenninum*, staminibus corollam aequantibus. Col. cephr. t. 170. Hab. in alpinis Apenninis et Campoelarensibus. ♂

10. *hispidum*, fol. oblongis obtusis setaeo-hispidis, stom. corolla brevioribus. Thunb. prod. 34. Hab. ad Cap. b. spei, cum tribus sequentibus. ♂

11. *hirsutum*, foliis lanceolatis villosis-hispidis, seminibus aculeis uncinatis. Th.

12. *echinatum*, fol. lanceolatis obtusis papillois hirsutis, semin. subconicis uncinato-aculeatis. Thunb. h

13. *muricatum*, fol. ovatis villosis scabris, semin. callosis-muricatis. Thunb. h

14. *angustifolium*, fol. linearibus hispida, stylo corollis campanulatis longiore, seminibus laevibus. Willd. l. c. p. 761. Tournef. Cor. 7. Habitat in Armenia. Cor. calyce multo longior. Semina glabra clypeata. ♀

15. *laevigatum*, fol. lanceolato-ovatis glabrisculis, calycibus tomentosis, sem. laevibus. Linn. suppl. 131. C. *Rindera*. Pall. Flor. ross. 2. p. 56. t. 68. *Rindera* tetraspis. Pall. it. 1. p. 486. t. F. f. 1. 2. Hab. in Sibiria. Cor. perva. ♀

16. *glastifolium*, fol. lanceolatis glabris subtus papulosis, seminib. membranaceis centro submuricatis. Willd. p. 764. Tourn. Cor. 7. Hab. in Armenia.

17. *cristatum*, fol. lineari-lanceolatis hispida, sem. membranaceis centro et margine muricatis. Willd. l. c. C. seminibus margine membranaceo cristatoque pelvis instar cinctis. Lam. encycl. 2. p. 238. Hab. in Oriente.

18. *decurrens*, fol. lanceolatis decurrentibus venosis, caule anguloso-alato. Fl. Per. 2. p. 6. Hab. in Chile nemoribus. Sem. echinata: aristis glochidatis. ♂

19. *revolutum*, stom. corol. brevioribus, cor. calyce duplo longioribus, fol. lanceolatis: caulinis sessilibus. Flor. Per. l. c. Crescit in umbrosis. Semin. ciliato-lamellatis. ♂

20. *pilosum*, fol. linearibus, flor. solitariis fol. alchercantibus. Flor. Per. l. c. t. 111. Cresc. in locis aridis. Fruc. cristatus, uncinatus. ♂

21. *lineare*, canescens, fol. linearibus, florib. solitariis oppositifoliis, sem. dentatis. Flor. Per. l. c. p. 6. In campis aridis. ♂

22. *pauciflorum*, hispidum, fol. lanceolatis inferne angustatis, pedunc. subsempiternis. Flor. Per. l. c. Cum priore. ♂

23. *lusitanicum*, fol. cordatis amplexicaulis glabris, margine laevibus. Vahl. symb. 2. p. 34. Hab. in Lusitania. Cal. nulus. ♂

24. *linifolium*, fol. lineari-lanceolatis glabris, margine denticulato-scalbris. Vahl. l. c. Moris. s. 11. t. 30 f. 11. In Lusitania. Cal. basi strigosus. ♂

25. *lanatum*, calyc. tomentoso-lanatis, corol. limbo acuto profunde quinquefido, racemulis cernuis. Lam. Hab. in Oriente.

26. *japonicum*, cal. villosis, fol. oblongis villosis, caulibus prostratis. Thunb. jap. 81. Ej. Icon. pl. Jap. Hab. in Japonia. ♂

27. *lateriflorum*, fol. linearibus acutis angustis pilosis, flor. lateralibus solitariis subsessilibus, sem. radiatum cristatis. Lam. ill. p. 400. Hab. in Lima. ♂

28. *scorpioides*, caule prostrato, foliis lanceolatis scabris, pedunculis axillaribus unifloris, sem. umbilicatis glabris. Jacq. Collect. 2. p. 3. Schmidt bohem. 1. n. 220. Hab. in nemorosis umbris udis Bobemiacae. ♂

29. *Omphalodes*, fol. radicalibus ovato-cordatis, caulinis ovatis petiolatis. Willd. p. 766. Curt. bot. mag. t. 7. Moris. s. 13. t. 26. f. 3. Hab. in Lusitaniae, Carniolae nemorosis ad radices montium. Vere. ♂

30. *cappadocicum*, fol. petiolatis radicalibus cordatis, caulinis infimis lanceolatis, summis cordatis sessilibus. Willd. p. 767. Hab. in Cappadocia. ♀

31. *myosotoides*, fol. radicalibus spatulato-lanceolatis, caulinis linearibus sessilibus, seminib. membranaceis laevibus margine ciliato denticulatis. Willd. l. c. Billard. Icon. pl. Syr. 2. p. 6. t. 2. C. *lithospermifolium*. Lam. Hab. in summo caemine montis Libani. ♀

355. PULMONARIA. Cor. infundibuliformis, fauce perva. Cal. prismatico-5-gonus.

1. *angustifolia*, fol. radicalibus lanceolatis.

ceolatis. Flor. dan. 483. Hab. in Pannonia, Helvetia, Suecia, Germania. Sequenti al-
mis affinis, solum foliis angustis sublinea-
ribus distinguenda. L. \mathcal{E}

2. *officinialis*, fol. radicalibus ovato-
cordatis scabris. P. foliis ovatis hirsutis.
Smith. brit. 1. p. 216. Engl. bot. t. 118.
Hab. in nemoribus. \mathcal{E}

3? *suffruticosa*, fol. linearibus scabris,
calycibus subulatis quinquepartitis. Pluck.
phyt. 42. f. 7. Hab. in alpihus Italiae. \dagger

** MERTENSIA. Calyces abbreviati,
tubo corollae dimidio breviores.

4. *paniculata*, calyc. abbreviatis quin-
quepartitis hirsutis, fol. ovato-oblongis
acuminatis pilosiusculis. Ait. Kew. 1. p. 181.
Hab. ad fretum Hudsonis. \odot

5. *virginica*, calyc. abbreviatis glaber-
rimis, fol. ovatis, caule erecto, flor. subpa-
niculatis terminalibus. Michx. Flor. 1. p.
131. Mertensia pulmonarioides. Roth. catal.
bot. 1. p. 34. Pluck. alm. t. 227. 1. 6. Hab.
in Virginia et Carolina ad ripas arenosas. \mathcal{E}

6. *parviflora*, caule diffuso procumbente
glaberrimo, fol. ovali-spatulatis carnosis,
pedunc. l. teralibus 1-floris. Michaux, l. c.
Habit. ad litora maris prope Sumen St.
Laurentii.

7. *sibirica*, calycibus abbreviatis, foliis
radicalibus cordatis. Sp. pl. 104. Gmel. sib.
IV. t. 39. Habit. in Sibiria. Corymbi ra-
mosi, nantes. L. \mathcal{E}

8. *maritima*, calycib. abbreviatis, foliis
ovatis glaucis, caule ramoso procumbente.
Lightf. scot. 1. p. 133. t. 7. In Angliae et
Europae boreal. littoribus. \odot

356. SYMPHYTUM. Corollae lim-
bus tubulato-ventricosus: fauce
clausa radiis subulatis.

* *Foliis ovatis.*

1. *officinale*, (album), foliis ovato-
lanceolatis decurrentibus. Lin.

β . *purpureum*, cal. pateate: 8. *patens*.
Sibth. Flor. oxon. p. 70

γ . S. (α et β) *bohemicum*, caule an-
gustato-hirsuto, racemis apice revolutis,
styl. cor. excedente. Schmidt bohém. n. 2.
212. Habitat. in Europae umbrosis sublu-
millis. Radix nigra. \mathcal{E}

2. *tuberosum*, fol. ovatis semidecurrenti-
bus, summis oppositis, (radice alba.)
Jacq. obs. 3. p. 12. t. 63. Hab. in Germania
australi, Monapellii, Hispania. \mathcal{E}

3. *orientale*, fol. ovatis acutis subpunc-
tatis. Lin. Buxb. cen. 5. p. 36. t. 58. Italia.
juxta Constantinop. rivulos, primo vere. \mathcal{h}

** *Foliis cordatis.*

4. *tauricum*, fol. cordatis crenulatis basi
inaequalibus. Willd. in Nov. Act. Soc. Nat.
cur. Berol. 2. p. 120. t. 6. f. 1. S. orientale
Pallas in Act. Petrop. 1792. p. 306. Hab. . .

5. *pannonicum*, foliis cordatis acumi-
natis integerrimis basi aequalibus. 8. cor-
datum. Willd. l. c. Pl. rar. Hungar. p. 6.
t. 7. Hab. in pinetis Comit. Beharensis et in
Transylvania. Cor. luteo-alba.

357. CERINTHE. Cor. limbus tu-
bulato-ventricosus: fauce pervia.
Nuc. 2, biloculares.

1. *major*, corollis obtusis patulis apice
ventricosus campanulatis, staminib. corolla
brevioribus. Roth. cat. 1. p. 32. Lam. ill. t.
93. Willd. p. 772. Habit. in Sibiria, Hel-
vetia. \odot

β ? *aspera*, cor. obtusis patulis cylin-
dricis, stamin. corollae aequalibus. Roth. l.
c. p. 33. Hab. in Europa australi. \odot

2. *minor*, fol. amplexicaulibus integris,
coroll. acutis clausis. Jacq. austr. t. 124. In
Austriae, Syriae agris et Jenae. \mathcal{E}

358. ONOSMA. Cor. campanulata:
limbo tubuloso-ventricosus, 5-
dentato, fauce pervia. Styl. in-
clusus. Semina 4.

1. *simplicissima*, corollis ventricosus,
fol. linearilanceolatis hirsutis. Willd. sp.
2. p. 773. Gmel. sib. 4. p. 76. t. 40. Hab. in
Sibiria. \mathcal{E}

2. *orientalis*, corollis cylindricis acu-
tis, fructibus pendulis, foliis linearibus
hirs. Willd. l. c. Hab. in Oriente. \mathcal{E}

3. *echioides*, corol. cylindricis obtusis
fructibus erectis, fol. lanceolatis hirsutis.
Willd. sp. p. 774. Jacq. austr. t. 295. Lam.
ill. t. 93. Hab. in Europae rupibus. \mathcal{E}

4. *taurica*, cor. cylindricis obtusiusculis,
racemis axillaribus subnatis, foliis
linearilanceolatis hirsutis. Willd. in Nov.
Act. Soc. Nat. Cur. Berol. v. 2. Pallas in
Nov. Act. Petrop. 1792. p. 306. Fol. et cor.
angustiora quam in antecedente, cui affinis.

5. *echinata*, pilosissima, foliis angustolanceolatis verrucosis, florib. natis, sem. tuberculoso. Desfont. Atl. r. p. 101. t. 1.

43. Hab. in arenis deserti prope Casiam. Sem. magna. ♂

6. *sericea*, fol. petiolatis oblongo-lanceolatis sericeo-villosis. Willd. l. c. Symphytum orientale obovae fol. argenteo, flore flavescente. Tournef. Cor. 6. In Oriente. ♀

7. *coerulea*, fol. sessilibus lanceolatis sericeo-villosis, stamin. corolla longioribus. Willd. 775. Tournef. Cor. 7. Habit. in Armenio. ♀

8. *tenuiflora*, fol. sessilibus linearibus obtusis hirtis, corollis cylindricis; calycinis foliis linearibus parum longioribus. Willd. Symphytum orientale Echii folio, flore albo tenuissimo. Tournef. Cor. 6. In Oriente. Parvitate fol. distincta. W.

9. *caspica*, caule ramoso divaricato, fol. oblongo-lanceolatis hispida, pedunculis axillaribus fructiferis reflexis, cor. obtusis. Willd. Onosma orientalis. Pall. it. 2. t. L. (bona.) Habit. in arenosis versus mare caspium. ♂

10. *micrantha*, caule ramoso divaricato, fol. oblongis petiolatis subius incano-hispidis, racemis nudis. Willd. Pall. it. 2. app. n^o. 109. t. L. Hab. in Sibiria ad Irten et inter Jaikum et Volgam, locis arenosis. ♂

* *gigantea*, caule ramoso altissimo, fol. oblongo-lanceolatis scabris, cal. pilosis-simis. Lam. ill. p. 407. Hab. in Oriente.

359. **ONOSMODIUM.** Cal. profunde 5-partitus. Cor. oblonga subcampanulata: fauce nuda; limbo ventricosos semiquinquesido: lacini. subcuneiventibus acutis. Anth. sessiles inclusae. Stylus exsertus.

1. *hispidum*, fol. obovati-lanceolatis papilloso-punctatis, corol. laciniis subulatis. Michx. Flor. 1. pl. 133. Lithospermum virginianum. L. Hab. in Virginia.

2. *molle*, villososandicans, fol. oblongo-ovalibus subtriplinerviis, cor. lacini. subovalibus. Mich. t. 15. Habit. in Tennessee, circa Nashville.

360. **BORAGO.** Cor. rotata: fauce radiis clausa.

1. *officinalis*, fol. alternis, calycibus patentibus. Blackw. 1. 36. Willd. sp. 1. p. 776. Hab. sponte in Aleppo. ♂

2. *indica*, fol. ramificationum oppositis amplexicaulibus, pedunc. unifloris. Cal. aurito. Pluck. alm. 30. t. 76. f. 3. Hab. in India. ♂

3. *africana*, foliis oppositis petiolatis ovatis, pedunc. multifloris. In Aethiopia. ♂

4. *longifolia*, foliis linearilanceolatis sessilibus alternis, calyc. basi hirsutissimis. Poir. it. 2. p. 157. t. 3. Desf. Atl. t. 44. In locis humidis Numidiae.

5. *zeylanica*, fol. ramiis alternis sessilibus, pedunc. unifloris, calyc. inauritis. Mant. 202. Jacq. Collect. 3. p. 169. Ic. var. 2. t. 314. Hab. in India orientali.

6. *crassifolia*, foliis ovato-lanceolatis subcarnosis denato-spinosis, superne scabris glaucis, petalis linearibus. — Venten. Descr. p. 100. t. 100. Hab. in Oriente. Num. floris parvum passim quaternarius.

7. *orientalis*, calycibus tubo corollae reflexae brevioribus, fol. cordatis. Tourn. itin. t. 523. Buxh. cent. 5. p. 16. t. 30. Hab. circum Constantinopolim. Pedunc. axillares multiflori. Stam. exserta, villosa. ♀

8. *cretica*, calycibus longitudine tubi corollae reflexae, fol. ovatis. Willd. p. 778. Hab. in Creta. Distincta a precedente foliis calycinis ovato-rhombicis. W.

361. **ASPERUGO.** Cal. fructus compressus: lamellis plano-parallelis, sinuatis.

1. *procumbens*. Lin. Flor. dan. t. 552. Hab. in ruderalis pinguibus. ♂

362. **LYCOPHIS.** Cor. tubo incurvato, et rectiusculo. Cal. inflatus aut ventricosus.

1. *vesicaria*, foliis integerrimis, caule prostrato, calycibus frutescentibus inflatis pendulis. Lin. Willd. sp. p. 779. Echiioides violacea. Desf. Atl. 1. p. 164. Nones decumbens. Moench. Meth. p. 422. Hab. in Europa australi. ♂

* *nigricans*, caule procumbente, foliis integerrimis, cal. fruct. inflatis pendulis, cor. calyce brevioribus. Desf. l. c. Moris. 6. 11. t. 26. f. 21. Habit. in arcosis prope Torzer. ♂

2. *pulla*, fol. integerrimis, caule erecto, calycibus frutescentibus inflatis pendulis. Jacq. austr. t. 188. Hab. in Tartaria, Germania, in arvis.

3. *ciliata*, foliis lanceolatis denticulatis hispido-ciliatis, calyce fructifero inflato pendulo. Willd. p. 780. Hab. in Oriente.

4. *obtusifolia*, foliis lanceolatis obtusis subintegerrimis, calyce fructifero inflato erecto. W. In Chio. ♂

5. *variegata*, fol. repandis dentatis callosis, caule decumbente, corollis cerasuis. Lin. Moris. s. 11. t. 26. f. 10. *Anchusa perolata*, Lam. ill. p. 403. Hab. in Creta. ☉

6. *aegyptiaca*, foliis ovato-lanceolatis verrucosis, scaberrimis, florib. axillaribus aternis pedunculatis. Lin. sp. ed. l. p. 138. Asp. rugo aegyptiaca. Lin. Willd. p. 779. *Anchusa verrucosa*. Lam. Jacq. hort. 3. t. 21. Hab. in Aegypto. Cor. ochroleuca: tubo recto. Sem. rugosa subius concava. J. An potius *Anchusae* species?

7. *arvensis*, foliis lanceolatis hispidis, calycibus florentibus erectis, (cor. tubo incurvo.) For. lapp. 77. Flor. dan. t. 435. In arvis. ☉

8. *echioides*, foliis lanceolatis hirsutis, caule ramosissimo erecto, floribus secundis sessilibus. Buxb. cent. 3. p. 1. t. 1. Hab. in Armenia. ¶

9. *orientalis*, foliis ovatis integerrimis scabris, calycib. erectis. Hab. in Oriente. ☉

10. *virginica*, fol. linearis - lanceolatis confertis tomentosis mollibus, caule erecto. Gron. virg. 140. Hab. in Virginia ad vias. ☉

Obs. Hocce genus forte in duo separandum est.

363. ECHIUM. Cor. ut plurimum irregularis, fance nuda, ampla.

1. *fruticosum*, (africanum), caule fruticoso, fol. lanceolatis basi attenuatis villosis strigosis aveniis, foliolis calycinis lanceolatis acutis. Ait. Kew. 1. p. 186. W. sp. p. 781. E. africanum fruticans. Comm. hort. 2. p. 107. t. 54. Pluck. Mant. 31. t. 341. f. 1. Hab. in Aethiopia. Plura fruticosa sunt, nomen hinc minus aptum.

2. *formosum*, caule fruticoso, foliis nitidis lanceolatis hispidis; corollis magnis aequalibus. E. grandiflorum. Andrew. t. 20. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. rubra, stam. longior, limbo brevi, obtuso.

3. *ferox*, caule fruticoso, ramis foliisque oculatis, flor. spicatis, cor. subaequalibus. Andrew. t. 39. Cum priore. Cor. aeneo violacea, limbo patente obtuso, tubo brevi?

4. *candicans*, caule fruticoso, foliis lanceolatis nervosis ramisque hirsutis, foliolis calycinis oblongis lanceolatis acutis, stylis hirsutis. Ait. Kew. 1. p. 186. Jacq. Col. s. p. 44. Ic. rar. 1. t. 30. Hab. in Maderae rupibus altis. Tota planta albicat, quasi argentea. ¶

5. *giganteum*, caule fruticoso, fol. lanceolatis basi attenuatis pilosis, pilis brevissimis; bracteis calycinibusque strigosis, staminibus corolla longioribus. Ait. Lin. suppl. 131. Hab. in rupibus Teneriffae. Corollae subaequales albae.

6. *strictum*, caule fruticoso stricto ramoso, fol. oblongo-lanceolatis pilosis, cor. subaequalibus, staminibus corolla longioribus. Ait. Kew. 1. p. 186. Linn. suppl. 131. Hab. in rupibus Teneriffae. ☉

7. *argenteum*, caule foliisque lanceolatis acutis sericeo-villosis, spica terminali simplicifolia. Thunb. prodr. 33. Andrew. t. 154. Hab. ad Cap. b. spei montibus nigris. ¶

8. *sericeum*, fol. linearis-cuneatis, cauleque suffruticoseo inanis. In Aegypto. ¶

9. *setosum*, foliis linearis - lanceolatis cauleque suffruticoseo procumbente hispidis inanis. Vahl. symb. 2. p. 35. Hab. in Aegypto. Corolla unguicularis canescens.

10. *trichotomum*, caule glabro subtrichotomo, ramis tomentosis, fol. lanceolatis imbricatis tomentosis. Thunb. prodr. 33. Ad Cap. b. spei. ¶

11. *hispidum*, caule glabro, ramis apice foliisque lanceolatis piloso-hispidis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

12. *paniculatum*, caule pubescente, ramis angulatis, fol. piloso-hispidis. Thunb. l. c. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

13. *trigonum*, caule villosa, fol. oblonga canaliculatis piloso-hispidis. Thunb. Ad Cap. b. spei. ¶

14. *capitatum*, caule piloso, floribus capitato-corymbosis aequalibus, staminibus corolla longioribus, foliis hispidis. Mant. 42. Thunb. prodr. 33. Hab. ad Cap. b. spei. Corolla peris. ¶

15. *glaucophyllum*, caule fruticoso, ramis calycibusque glabris, foliis lanceolatis glaucis aveniis ad oras strigosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 312. Collect. 2. p. 325. Andrew. t. 165. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

Obs. Echium laevigatum Lin. et E. glabrum Thunb. hujus videntur loci.

16. *incanum*, caule villosa, foliis linearis-ensiformibus sericeo-tomentosis, racemo spicato linearis. Thunb. prodr. 33. Hab. ad Cap. b. spei.

17. *spicatum*, caule villosa, foliis ensiformi-ellipticis villosis, spica composita linearis-oblonga. Thunb. Linn. suppl. 132. Cum priore. Ad Cap. b. spei.

18. *caudatum*, caule villoso, fol. oblongis setaceo-hispidis, spica composita ovato-oblonga. Thunb. Ad Cap. b. spici.

19. *italicum*, caule herbaceo piloso, fol. lineari-lanceolatis strigoso-hirsutis, inferioribus nervosis, cor. subaequalibus, staminibus corolla longioribus. Ait. Kew. t. p. 187. E. caule erecto piloso, spicis hirsutis, corollis subaequalibus, staminibus longissimis. Län. p. ? Echinum plurimum. Jacq. aust. 5. app. t. 6. Hab. in Anglia, Italia, Helvetia, Pannonia, Gallia, in collibus siccis. Corolla subparva, alba. Stam. longissima. ♂

20. *asperum*, caule ramoso pilosissimo, fol. lanceolatis tuberculosis, corolla villosa, stam. exsertis. Lam. ill. p. 412. E. pyrenaicum. Desf. Atl. t. p. 161. Län. mant. p. 335. In agro Tuneano et Algerensi.

21. *flavum*, caule simplici, fol. lanceolatis, hirsutissimis, stam. cor. subregulari duplo longioribus. Desf. l. c. t. 45. Hab. in Atlante, prope Tlemcen.

22. *humile*, fol. angusto-lanceolatis pilosis scabris in petiolum decurrentibus, cal. hirsutissimis. Desf. l. c. Hab. in arcuosis prope Casem.

* *angustifolium*, caule simplici hispido, foliis linearibus, cor. calyce duplo longioribus. Lam. ill. p. 412. Barf. ic. n.º 1015. Hab. in Hispania. ☉

23. *rubrum*, caule ex racemulis brevibus longe apicato, corollis subaequalibus, fol. lineari-lanceolatis hispidis. Host. synop. p. 93. Jacq. aust. 5. app. t. 3. Hab. in pratis Austriae, Pannouiae. ☉

24. *vulgare*, caule tuberculato-hispido, fol. caulinis lanceolatis hispidis, floribus apicatis lateralibus. Flor. dao. t. 445. Black. t. 299. Hab. ad vias et agros. Var. fol. pubescentibus submollioribus. ♂

25. *violaceum*, caule diffusio, cor. stamina aequantibus, tubo calyce brevior. Län. Hab. in Austria, Germania, Italia. ☉

26. *maritimum*, fol. spatulato lanceolatis villosis strigosis, staminibus corolla brevioribus. Willd. sp. 788. Tournel. inst. 136. Bocc. mus. 2. p. 84. t. 78. In maritimis Italiae, Siciliae. ☉

27. *tenue*, caule erecto tenui foliisque lanceolatis strigosis, stam. cor. brevioribus. Roth. Catal. 2. p. 16. E. mic. ntlum. Schousboe. Hab. in arvis in Barb. ria. Cor. coerulesca striis albis. ☉

28. *parviflorum*, caule erecto diehotomo, fol. caulinis ovali-oblongis, corol.

subaequalibus longitudine calycis, stamin. corol. brevioribus. Roth. l. c. p. 14. Moench. method. p. 423. Hab. . Cor. vix calycem superans.

* *australe*, fol. caulinis ovatis utrinque attenuatis, stam. corol. aequantibus. Lam. ill. p. 413. Cresc. in Europa australi? Ab E. lusitanico distinctum videtur.

29. *grandiflorum*, foliis pubescentibus mollioribus, caulinis ovato-oblongis, caule subramoso piloso, cor. calyce 4-plo longioribus. Desf. Atl. t. p. 166. t. 46. H. . ☉

30. *plantagineum*, fol. radicalibus ovatis linearis petiolatis, cor. calyce majoribus. Län. Barr. ic. t. 1026. In Italia. Bract. semicordatae. ☉

31. *creticum*, caule procumbente, calycibus frutescentibus distantibus. Län. Hab. in Creta, Oriente. ☉

32. *orientale*, caule ramoso, fol. caulinis ovatis, flor. solitariis lateralibus. Län. Hab. in Oriente. ☉

33. *lusitanicum*, cor. stam. longioribus caule simplici, fol. caulinis lanceolatis serricis, flor. apicatis lateralibus. Roy. Lugd. 407. Hab. in Europa australi. ☉

364. ECHIOCHILON. Cal. 4-partitus. Cor. bilabiata: labio superiore bilobo; inferiore 3-lobato: lobis rotundatis; tubo gracili arcuato. Sem. 4.

1. *fruticosum*, caule fruticoso, ramis hirsutis, fol. subulatis asperis, flor. solitariis axillaribus. Desf. Atl. t. p. 167. t. 47. Hab. prope Kerwan in regno Tunetano. Hyeme fleret.

++ *Fructus baccatus. Caul. frutescens aut arboreus.*

365. MESSERSCHMIDIA. Cor. tubo i. globo, faucis nuda. Baccamuricata uberosa, bipartibilis: singulo dispermo.

1. *fruticosa*, caule fruticoso, fol. petiolatis ovato-lanceolatis cor. hypocrateriformibus. Län. suppl. 132. Hab. in Teneriff et insula Canar. h

p. *angustifolia*, fol. petiolatis linearilanceolatis. Lam. ill. p. 415. Habit. in ins. Canariis.

2. *Argusia*, caule herbaceo, fol. sessilibus, corollis infundibuliformibus. Län. suppl. 132. Act. Petropol. 1763. p. 315. 2

11. Gmel. It. 2. p. 197. t. 27. Arguzia montana. Amm. rath. 38. In Davuriac aprici glaucosis. Caulis palmatis \bar{h}

366. **TOURNEFORTIA.** Cor. infundibuliformis: tubo basi glabro. *Bacca* 2-locularis, 2-4-sperma, supera, apice duobus poris perforata.

1. *hirsutissima*, fol. ovatis petiolatis acuminatis, caule hirsuto, spicis ramosis terminalibus, bacis hirsutis. Swartz. obs. 58. Habit. in America calidiore. \bar{h}

2. *volubilis*, foliis ovatis acuminatis glabris, petiolis reflexis, caule volubili, pedunc. corymboso-dichotomis Flor. Per. 2. p. 24. t. 148. f. b. Lam. ill. t. 93. f. 2. Sloan. hin. 1. t. 143. f. 2. Pluck. alm. 386. t. 235. f. 6. Habit. io Jamaica, Mexico, Peruvia. Arbor scandens. Bac. 4-sperma. \bar{h}

3. *syriacifolia*, fol. subcordato-ovatis acuminatis glabris, spicis cernosis. Vahl. jmb. 3. p. 23. Habit. in Cajenna. \bar{h}

4. *laurifolia*, caule volubili, fol. ovato-longis repandis glabris, petiol. geniculatis, bacca torulosa 2-partibili. Vent. voir de Plant. rar. p. 2. t. 2. Habit. in Portorico et St. Thomas.

5. *macrophylla*, fol. ovato-lanceolatis dis maximis, pedunc. ramosis, spicis longis pedunculis. Lam. ill. p. 416. T. msa. Lin. Jacq. coll. 1. p. 96. Ic. rar. 11. Sloan. jam. t. 212. f. 2. Habit. in naica. \bar{h}

6. *bifida*, fol. ovatis glabris petiolatis, hinc bifidis axillaribus, spicis divaricatis. Lam. ill. p. 417. Habit. in insula Franc. \bar{h}

7. *foetida*, fol. ovato-lanceolatis hirsutis, ramosis, spicis pendulis. Pittonia msa, Nicotianae foliis foetidissimis, 1. gen. 5. ic. 220. Habit. in Mexico, aica. \bar{h}

8. *humilis*, foliis lanceolatis sessilibus, simplicibus recurvis laevibus. Pittonia msa, Aechuae fol. Plum. gen. 5. 17. f. 2. Habit. in America calida. \bar{h}

9. *bicolor*, foliis ovatis acuminatis glabris superne rugosiusculis, spicis cernosis recurvis. Swartz. Flor. ind. occid. 44. Habit. in fruticetis Jamaicae. \bar{h}

10. *polystachia*, fol. ovatis acutis rugosiusculis, pedunc. terminalibus corym-

boso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 149. f. a. Habit. in Peruvia praeruptis. Bacca 4-sperma.

11. *undulata*, fol. oblongo-lanceolatis acutis lineatis rugosis, pedunc. corymboso-dichotomis polytachis. Flor. Per. p. 25. f. 6. Habit. in Camanae collibus. Coc. pubescentes. Bacca 2-sperma. \bar{h}

12. *longifolia*, fol. oblongo-lanceolatis oblique venosis, margine subrevoluto, pedunc. corymbosis. Flor. Per. l. c. t. 150. In Peruvia nemoribus. Bacca 2-sperma. Symphyti habitus. \bar{h}

13. *angustiflora*, foliis ovatis venosis acumine obliquo, pedunculis bifurcatis, cor. angustis. Flor. Per. 2. p. 25. t. 151. f. a. Cum priore. Bacca alba, 2-sperma, glabra, suffruticosa.

14. *virgata*, fol. ovato-oblongis subundulatis hispidulis integerrimis, pedunculis terminalibus subdichotomis. Flor. Per. l. c. t. 150. Spic. revolutae.

15. *mutabilis*, foliis ovatis integerrimis scabris, spicis cernosis brevibus, cor. lobis crenulatis. Vent. Choix de Plant. p. 3. t. 3. Habit. in Jamaica.

16. *argentea*, fol. ovatis obtusis tomentoso-sericeis, spicis terminalibus compositis. Lio. suppl. 131. Rumph. 4. t. 55. Habit. ad littora maris Zeylanici. Truncus brevissimus, cortice fissis. \bar{h}

17. *sericea*, fol. ovato-lanceolatis subtus tomentosis sericeis, spicis lateralibus terminalibusque dichotomo-paniculatis. Vahl. eclog. l. p. 17. Habit. in insula Montserrat. \bar{h}

18. *suffruticosa*, (*incana*), fol. sublanceolatis incanis undulatis, caul. suffruticoso spicis ramosis laxis. Lam. ill. p. 417. Habit. in Jamaica. Plures dantur suffruticosae. \bar{h}

367. **CORDIA.** Cor. infundibuliformis. Stylus dichotomus. *Drupa* nucis 2-loculari.

1. *Myxa*, fol. ovatis supra glabris, corymbis lateralibus, calycibus decemstriatis. Lin. Willd. sp. 2. p. 2072. Pluck. alm. 306. t. 217. f. 3. Habit. in Aegypto, Malabar. Folia Alni. \bar{h}

2. *rotundifolia*, foliis subrotundis crenatis scabris, pedunc. corymboso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 148. f. a. Habit. passim in Limae arenosis. Cal. striatus.

3. *obliqua*, fol. integerrimis subrotundo-

cordatis nervoso-venosis obliquis. Willd. phytog. 1. p. 4. f. 1. Hab. in India orientali. Calyx non striatus. An prioris varietas?

4. *monofea*, fol. subrotundo-ovatis densatis venosis scabris, corymbis axillaribus monoicis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 43. t. 58. Hab. in sylvis Indiae. An potius polygama? h

5. *spinescens*, fol. ovatis acutis serratis scabris, petiolis subsquinescentibus. Mant. 206. Hab. in India orientali. Rami tomentosi, ferruginei. h

6. *Sebestena*, foliis oblongo-ovatis repandis scabris s. Jacq. am. ed. 2. t. 44. And. t. 157. *Sebestena* scabra flore minato crispo. Dill. elth. 341. t. 255. f. 331. Hab. in Ind. h

7. *aspera*, fol. ovatis acuminatis asperis, floribus cymosis rugosis. Forst. prod. n. 109. Hab. in insula Tongatabu. h

8. *dichotoma*, fol. oblongo-ovatis vix crenatis, corymbis dichotomis. Forst. prod. n. 110. Hab. in N. Caesonia. h

9. *Geraseanthus*, fol. lanceolato-ovatis scabris, panicula terminali, calycibus decemstratis. Jacq. amer. 1. 175. f. 16. Brown. jom. 170. t. 29. f. 3. Hab. in Jamaicae sylvis. An species *Cerdania* cum n. 1? h

10. *flavescens*, fol. oblongis acuminatis reticulato-venosis glabris, racemis axillaribus. Willd. Fructus viridi-flavescens cerasiforme. Aubl. guj. 1. p. 26. t. 80. In sylvis Gujanae et Cajennae ad margines pratorum. h

11. *Toqueva*, fol. cordatis acuminatis villosis, flor. racemosis. Aubl. guj. 1. p. 228. t. 90. Hab. in sylvis Gujanae. h

12. *macrophylla*, foliis ovatis villosis sesquipetalibus. Mill. diet. 3. Sloan. jam. 184. hist. 2 p. 130. t. 221. f. 1. Hab. in Jamaica. h

13. *micranthus*, fol. ellipticis acutis integris membranaceis venosis, racemis compositis laxis. Swartz. Fl. ind. occident. 1. p. 460. In Jamaicae sylvis montium. h

14. *elliptica*, fol. oblongis apice attenuatis integris subcoriaceis, racemis compositis diffusis, drupis acuminatis. Swartz. l. c. p. 461. Hab. in Jamaica, Dominica. h

15. *Collococca*, fol. oblongo-ovatis integerrimis, floribus corymbosis, calycibus interne tomentosis. Sloan. hist. 2. t. 203. f. 6. Pinck. phyt. t. 158. f. 1. Hab. in Jamaica. h

16. *hirsuta*, fol. oblongis utrinque attenuatis pubescentibus, caule pedunculisque

corymbosis terminalibus axillaribusque hirsutis. Willd. p. 1076. Aubl. guj. 1. p. 215. t. 86. Hab. in sylvis Cajennae et Gujanae. h

17. *tetrandra*, foliis ovatis acutis, basi inaequaliter cordatis subus scabris, cyma terminali, floribus tetrandris. Willd. Fructu albo tetrapyreno. Aubl. In Gujana ad fluviorum ripas.

18. *tetraphylla*, fol. quaternis obovatis integerrimis glabris, pedunc. lateralibus multistor. Willd. C. fol. verticillatis, fructu olivaceoformi. Aubl. 1. p. 224. t. 88. Hab. in maritima Gujanae.

368. **PATAGONULA. Cor. rotata. Stylus dichotomus. Cal. fructifer maximus. Sem. . .**

1. *americana*. Lin. Dill. elth. t. 226. f. 293. Lam. ill. t. 66. *Cordia Patagonula*. Ait. Willd. sp. p. 1076. Hab. in Patagonia. A *Cordia* differt calyce et forte fructu.

369. **M-NAIS. Cal. 3-phyllus. Cor. hypocrateriformis. Bacca 4-ocularis. Sem. solitaria.**

1. *topiaria*. Lin. Hab. in America meridionali. Fol. ovata, integra. An *Ehretiae* species? h

370. **EHRETIA. Cor. tubulosa. Drupa 2-ocularis. Nuclei solitariae, 2-oculares. Stigma emarginatum.**

1. *tinifolia*, fol. oblongo-ovatis integerrimis glabris, flor. paniculatis. Amoen. acad. 5. p. 545. Willd. sp. 2. p. 1077. Lam. ill. t. 66. Trew. Ehret. t. 24. Hab. in Jamaica. h

2. *aspera*, fol. ovatis scaberrimis, flor. corymboso-spicatis secundis. Willd. phyt. 1. p. 4. t. 2. f. 1. Roxb. corom. 1. p. 41. t. 85. Hab. in rupestribus siccis Indiae. Medium tenet inter *Ehretias* et *Tournefortias*, et cum *Cordia* stigmate convenit. Willd. h

3. *laevis*, fol. ovatis glabris, flor. lateralibus corymboso-spicatis secundis divaricatis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 42. t. 86. Hab. in montibus Circarensibus Indiae. Simillima praecedenti. W. h

4. *internodis*, fol. oblongo-ovatis glabris, paniculis infrastolaeis. Willd. l'Her. stirp. 1. p. 47. t. 24. E. petiolaris. Lam. in rupibus insulae Msuruii. Corolla campanulata. h

5. *spinosa*, spinosa. Jacq. amer. 46. t. 80. f. 18. Hab. in America. h

Bourreria, foliis oratis integerrimis
bus, flor. subcorymbois, calycibus
is. Linn. *Beurreria succulenta* Jacq.
n. jam. 1788. t. 15. f. 2. In Jamaica.
reria affinitate jungit Ebreitis cum
is. h

virgata, fol. oblongis integris superne
is, ramis filiformibus, pedunc. termin.
is sparsis unifloris, calycibus hirsutis.
tz. Fl. ind. occid. 1. p. 463. In desertis
niolae. h

exsucca, fol. cuneiformi-lanceolatis
ine reflexis. Lin. *Beurreria exsucca*
ibus exsuccis quadrifidis. Jacq. amer.
173. f. 17. Hab. in Amer. merid. h

microphylla, fol. cuneiformibus ob-
superne scabris punctatis, peduncul.
bus axillaribus subunifloris. Lam. ill.
5. Pluck. t. 31. f. 1. Hab. in India. h

buzifolia, fol. fasciculatis obovatis
to-punctatis, apice subtridentatis, ped.
ul. multifloris. Willd. Roth. corom. 1.
1. 37. *Cordia retusa*. Vahl. symb. 2. p.
ab. in India orientali. h

VARRONIA. *Cal.* campanula-
us 5-dentatus. *Cor.* tubulosa
al. paullo longior: ore patente
renato - plicato. *Styl.* dichoto-
mus. *Stigma* 4. *Drupa* ovata t-
ocularis (4-locular. Lin.) 1-
perma. Flor. Per. 2. p. 22.

crenata, fol. ovato-subrotundis cre-
rugosis, pedunculis lateralibus, flor.
tis. Fl. Per. l. c. t. 136. f. 6. Hab. in
isae petrosis et argillosis. Lantaneae
1. h

arviflora, fol. ovato-oblongis serra-
elunc. oppositifoliis alternantibusque,
globosis. Orteg. Dec. plant. p. 86. In
spania et Peruvia. An una ex enume-
Peruviae speciebus?

lineata, fol. lanceolatis lineatis, pec-
lis lateralibus petiolo adnatis, spicis
is. Amoen. acad. 5. p. 364. Willd. sp.
1099. Brown. jam. t. 11. f. 2. Pluck.
t. 328. f. 5. Hab. in America. h

bullata, fol. ovatis venoso-rugosis,
globosis. Linn. l. c. Swartz. obs. 88.
in Jamaicae fruticetis arboris. h

globosa, foliis lanceolatis oblongis,
dichotomo, pedunc. axillaribus elon-
gatis, spicis globosis. Hab. in Amer.
tas V. bullatae? Swartz. obs. 88. h

miculata, (*mirabil.* Jacq.), fol. ova-
gis serratis, floribus racemosis secun-

dis, corollis hypocrateriformibus. Swartz.
prod. p. 465. Jacq. amer. 41. t. 33. Tourne-
fortia serrata. Lin. vid. Lam. ill. 418. Hab.
in fruticetis et petrosis graminosis Hispani-
niolae. Pedic. geniculati. h

6. *martinicensis*, foliis ovatis acumi-
natis, spicis oblongis. Jacq. amer. 41. t. 32.
Hab. in Martinica. A V. curassavica non
diversa. Swartz. obs. p. 89. h

7. *curassavica*, fol. lanceolatis, spicis
oblongis. Jacq. amer. ed. 2. p. 25. Swartz.
obs. 88. In Jamaicae fruticetis, pascuis. h

8. *dichotoma*, foliis ovato-lanceolatis
acutis sursum serratis, pedunc. umbellato-
spicatis. Flor. Per. l. c. f. a. Copiosae in Per.
ruderatis etc. Drupa coccinea. h

9. *obliqua*, foliis ovatis acutis obliquis
obtusis serratis, pedunculis rameis, spicis
oblongis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 147. f. a. In
Peruviae praeruptis. Flor. densi sessiles. h

10. *cylindristachya*, fol. ovatis acutis
dense serratis rugosis, spicis longis supra-
axillaribus et terminalibus. Flor. Per. p.
23. t. 147. f. a. (macrostachya) Cresc. in
Peruviae saepibus. Drupa calyce involuta,
alba. h

11. *ferruginea*, fol. ovatis drmatatis sub-
tus tomentosis, pedunc. lateralibus, spic.
oblongis. Lam. ill. p. 418. Hab. in Ame-
rica. h

12. *angustifolia*, fol. linearibus sca-
bris subde talis obtusis, spicis lineari-
oblongis. Willd. p. 1081. Hab. in insula
St. Crucis. Fol. inferne tomentosa.

13. *alba*, fol. cordatis, florib. cymosis.
Jacq. amer. ed. picta. p. 26. Hab. in Ame-
rica. h

14. *monosperma*, fol. ovato-lanceolatis,
spicis subrotundis, nucis 1-loculari. Jacq.
Sevenbr. 1. p. 18. t. 39. Hab. ad Ca-
racas. h

372. **CERDANA.** *Cal.* tubulosus,
to-striatus. *Cor.* infundibulifor-
mis: limbo 5-partito. *Nectar.*
cyathiforme, germen ambiens.
Stigm. 2, bifida.

1. *alliodora*, fol. oblongis ovatisque,
flor. paniculatis. Flor. Per. p. 47. t. 184. In
Peruvia, in nemoribus Pozuzo et Murao.
Arbor excelsa, cujus cortex, receniter evul-
sus, odorem foetidum spirat, drinde vero,
uti et folia, allium redolet. Fol. saepissime
a Formicis exiguis devorantur. l. c.

+++ *Asperifoliae fructu capsulari.*

373. ALDFA. *Cor.* campanulata. *Styl.* bifidus. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, 2-sperma, cal. 5-partito involuta. (Genitalia longe exserta.)

1. *pinnata*, fol. pinnatis, superioribus simplicibus. Flor. Per. 2. p. 8, t. 14. Hab. in Chile et Peruvia. Filam. hirsuta. Spicae recurvatae. Sequenti generi affinis.

374. PHACELIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* subcampanulata, 5-fida. *Stam.* exserta. *Caps.* 2-locul., 2-valvis, 4-sperma.

1. *bipinnatifida*, (simplex), erecta, fol. pinnatifidis: lacin. inciso-lobatis, spicis utplurimum bifidis, corollae lobis margine simplicibus. Michaux, Flor. 1. p. 134. t. 16. Hab. in sylvis occidentaliibus montium Alleghanis.

2. *fimbriata*, assurgens, foliis pinnatifidis: lacinii integris, spica solitaria, cor. lobis ciliato-fimbriatis. Michaux l. c. Pluck. t. 245. f. 5. Cresc. in Carolinae montibus albis.

375. HYDROPHYLLUM. *Cor.* campanulata, interne striis 5 melliferis. *Stigm.* 2-fidum. *Caps.* globosa, 2-valvis.

1. *magellanicum*, tomentoso-lanuginosum, fol. pinnatis. Lam. in Journ. d'hist. nat. n.º 10. p. 373 t. 19. Valerianum recept. ¶

2. *appendiculatum*, hirsutum, foliis radicalibus subpinnatifidis: caulinis sublobato-angulosis, calycis sinibus appendiculatis. Michaux Flor. 1. p. 134. Hab. in sylv. montanis Tenassée. *Cor.* caerulea.

3. *virginicum*, fol. pinnatifidis pinnatisque: lacinii ovali-lanceolatis incis. Lin. Lam. ill. t. 97. f. 1. Hab. in Carolinae et Virginiae sylvis montanis. ¶

4. *canadense*, glabrescens, fol. lobato-angulosis. Lin. Lam. l. c. t. 97. f. 2. In Canadae sylvis humidis. ¶

376. ELLISIA. *Cor.* infundibuliformis angusta. *Bacca* sicca, 2-locularis, 2-valvis. *Sem.* 2 punctata: altero super alterum.

1. *Nyctelea*. Hab. in Virginia. Fol. pinnatifida.

377. NOLANA. *Cal.* 5-fidus: laciniiis latis. *Cor.* campanulata. *Stigm.* capitatum subpentagonum. *Sem.* 5, recept. caruoso coalita, arillata?

1. *prostrata*, (gallinacea), caule prostrato, fol. ovato-oblongis, cal. laciniiis triangulari-sagittatis. Fl. Per. 2. p. 6. L. sp. pl. ed. Willd. p. 794. Schumdel. ic. t. 18. Hab. sponte in Peruviae maritimis arenosis. Cibus gallinis jucundus. ☉

2. *coronata*, caule prostrato, calycis laciniiis subcorollatis. cor. fauce villosa. Flor. Per. l. c. t. 112. f. b. Hab. in Peruviae saxosis collibus. Faux villis pulchra coronata. Caul. pubescens. ☉

3. *spathulata*, caule erecto, fol. cordato-triangularibus, calyc. laciniiis spathulatis. Flor. Per. t. 113. f. a. Cum priore Cal. in fructu bipartiti. Fol. carnosa.

4. *inflata*, caule prostrato, fol. radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis, calyc. inflatis. Flor. Per. t. 112. f. a. In Camanae collibus arenosis.

5. *revoluta*, caule procumbente, foliis confertis linearibus margine revolutis, cal. ventricosus. Flor. Per. 2. p. 8. t. 113. f. b. Cresc. in Peruviae arenosis.

Obs. *Nolanae*, dicunt auctores laudati operis, plantae sunt succosae, inferne ramosissimae, unica specie excepta, prostratae, habitu solanaceae, fructu vero diversae, cujus nuculae epithermide succulenta obiectae, quadriloculares sunt: locul. 1-3 vero saepe abortientibus.

LYTHNACHIAE. Juss. (gen. 378-386.) *Cor.* regulares: limbo saepius 5-lobo. *Stam.* rarius plura aut pauciora quam 5. *Caps.* 1-locularis, polysperma: placentae centrali libera. Caulis herbaceus. Fol. opposita aut alternas.

378. ARETIA. *Cor.* hypocraterif. 5-fida: tubo ovato. *Stigm.* depresso-capitatum. *Caps.* 1-locularis, globosa, 5-valvis, subpentaspermis.

1. *helvetica*, fol. imbricatis, floribus subsessilibus. L. Willd. sp. 2. p. 795. Diapensia helvetica. Sp. pl. 2. p. 201. Aretia fol. subhirsutis, ovatis, cauliculis tegentibus. Hall. helv. n.º 617. t. 11. Androsace Dia-

asia. Vill. Delph. 2. p. 472. Hab. in alp. clytiac, Galliae, in petrosis aridis. ☞

2. *alpina*, foliis linearibus patentibus, rib. pedunc. L. Jacq. aust. 5. t. 18. Anosace alpina. Lam. ill. t. 98. f. 3. A. fol. stis repandis, scapis unifloris. Hall. helv. 618. t. 11. Hab. in Vallesia et Delph. ☞

3. *Vitaliana*, fol. linearibus recurvatis, r. subsessilibus: tubo elongato. Primula italica. Vill. Dauph. 2. p. 470. Hab. in pibus Pyrenaeis, Helveticis, et Italia. ☞

Obs. *Primulae* flor. lutei, *Aretiae* foliis ramosis et caps. 5-valvis ei adsunt.

9. ANDROSACE. *Involucrum* umbellulæ. *Cor.* tubus ovatus: ore glanduloso. *Caps.* 1-locularis, ovato-globosa, 5-fariam debiscens, polysperma.

1. *maxima*, fol. ovatis dentatis, perian- is fructum maximis. Lin. Jacq. aust. t. 1. Willd. sp. p. 796. Lam. ill. t. 93. f. 1. b. inter Germaniae, Austriae, Helvetiae ptes. ☞

2. *elongata*, glabra, foliis lanceolatis natis, umbella fructifera elongata, cor. yce angulato brevioribus. Retz. obs. 2. 10. Jacq. aust. 4. t. 330. Folia cinerea. b. in Austria, Germania. ☞

3. *filiformis*, fol. ovatis dentatis petio- is, umbellae radiis capillaribus, corollis ycem campanulatum excedentibus. Retz. t. 2. p. 10. Gmel. sib. 4. p. 81. t. 44. f. 4. b. in Sibiria. ☞

4. *septentrionalis*, fol. lanceolatis den- is glabris lucidis, perianthiis angulatis r. brevioribus. Gmel. l. c. t. 43. f. 1. Flor. t. 7. Rotb. germ. II. 232. Vill. Delph. 2. 481. In alpinis Lapponiae, Russiae, iliae, Germaniae. Var. fol. subpinnatis locis fertilibus. Vill. ☞

5. *odoratissima*, fol. triquetris lanceo- is ciliatis, umbellae radiis brevibus, ianthiis angulatis corollae brevioribus. W. Schreber. Dec. p. 7. t. 4. Hab. in Cap- lociae alpinis. ☞

6. *villosa*, fol. ovato-lanceolatis ciliatis, lunc. brevissimis, cor. calyce majore. ppe. A. fol. pilosis, perianthiis hirsutis. 1. Jacq. Flor. aust. 4. t. 332. Ej. coll. 1. 193. Hab. in alpinis Rheticis, Pyrenaeis Corniolis. ☞

7. *Chamaejasme*, hirta, fol. lanceolatis gerrimis, pedunc. brevissimis, corollis

calyce majoribus. Hoppe. v. Wulf. in Jacq. coll. 1. p. 194. In Corniolis alpinis.

8. *lutea*, glabra, fol. linearibus inte- gerrimis, pedunc. longissimis, cor. calyce majoribus. Hoppe. Jacq. aust. 4. t. 334. A. paniculosa. Vill. Delph. p. 477? Habit. in Austriae, Helvetiae et Galliae alpinis.

9. *obtusifolia*, foliis lanceolatis basi angustatis glabris, perianthiis angulatis pubescentib. W. Alton. pedem. n. 396. t. 46. f. 1. Aretia foliis ellipticis lanceolatis gla- bris, scapis umbellatis. Hall. p? *brevis- folia*, fol. petiolatis lanceolatis hispidis, pedunc. involucri quadruplo longioribus. Vill. delph. 2. p. 480. t. 15. Hab. in Hel- vetiae, Italiae, Galliae, Styriae alpinis. Planta Villarsii est sola varietas. ☞

10. *carnea*, fol. subulatis glabris, um- bella involucra aequante. Lin. Pluck. alm. 332. t. 108. f. 5. p. Aretia Halleri, fol. ciliatis. Lin. sp. pl. 1. p. 142. Hab. in alpi- Pyrenaeis, Helveticis. ☞

11? *spathulata*, fol. caespitosis spathula- tis, flor. corymboso-racemosis. Cav. ic. 5. p. 50. t. 484. f. 1. Habit. in America meridionalis humidis.

Obs. Cor. carneo-rubens, absque glandulis in fauce, nec involucrum intra flores adest secundum auctorem, qui cum Villarsio et Lamarkio *Androsacen* et *Aretiam* in unum conjungit genus.

380. PRIMULA. *Involucr.* umbel- lula. *Cor.* tubus cylindricus: ore patulo; limbo emarginato. *Stigm.* globosum. *Caps.* 1-locularis: ore 10-fido.

1. *verticillata*, foliis serratis glabris: floribus verticillatis. Vahl. symb. 1. p. 15. t. 5. Hab. in monte Kurma ad rivulos. ☞

2. *veris*, (*officinalis*), foliis rugosis dentatis, limbo corollarum concavo, tubi collo oblongo. Flor. dan. t. 431. Bull. t. 171. Engl. bot. t. 5. Hab. in fruticetis argillois. Corolla odorata. Cal. inflatus.

3. *elatior*, fol. rugosis dentatis hirsutis, limbo corollae plano, tubi collo hemisphaerico, floribus interioribus nutantibus. Jacq. misc. 1. p. 158. Fl. dan. t. 434. Engl. bot. t. 513. Hab. in sylvis. Fl. pallide lutei.

4. *acaulis*, fol. rugosis dentatis, subtus hirsutis, scapis unifloris. Jacq. misc. 1. p. 158. Fl. dan. t. 434. Curt. Fl. lond. ic. P. vulgaris. Smith. brit. t. p. 222. Primula sylvestris. Scop. P. grandiflora. Lam. Crete. in nemoribus, scapibus.

5. *sarinosae*, fol. rugosis crenatis-gla-

bris, subtus farinosis, umbella erecta. Jacq. misc. 1. p. 159. Flor. dan. t. 125. Curt. Lond. ic. Hab. in alpinis et in pratis uliginosis Germaniae, Sueciae, Gallicae. $\overline{\text{T}}$

6. *Cortusoides*, fol. rugosis lobatis, scapo multifloro. Andrew. 1. 7. Gmel. sib. 4 p. 85. t. 45. f. 1. Habit. in Sibiria. Corolla rubra. Folia Cortusae. $\overline{\text{T}}$

7. *villosa*, fol. planis serrulatis hirsutis, Jacq. l. c. 1. p. 159. Ej. Flor. Aust. 5. app. t. 27. Curt. mag. t. 14. P. foliis subhirsutis dentatis, scapo paucifloro. Hall. hist. n.º 613. P. pubescens, foliis planis serrulatis subvillosis. Jacq. misc. 1. p. 159. t. 18. f. 2. Hab. in alpinis Carinthiae, Helvetiae. $\overline{\text{T}}$

8. *nivalis*, foliis lanceolatis planis argute dentatis glaberrimis. Willd. sp. p. 803. Poll. it. 3. app. n.º 81. t. 9. f. 2. Hab. in alpinis Davuriae ad seaturigines frigidissimas. $\overline{\text{T}}$

9. *longiflora*, fol. serratis glabris, subtus farinosis, umbella nutante, corol. tubo longissimo. Jacq. Fl. aust. 5. app. t. 46. Allion. pedem. t. 39. f. 3. Habit. in alpinis. $\overline{\text{T}}$

10. *glutinosa*, fol. serrulatis glabris glutinosis, involucri foliolis maximis. Jacq. Fl. aust. 5. app. t. 26. Pluck. phyt. t. 149. f. 6. Hab. in summis alpinis. Olor Orchididis conopsea. $\overline{\text{T}}$

11. *marginata*, foliis obovatis serratis-dentatis albo marginatis, scapo multifloro, involucri foliolis pedunculis breviorib. Curt. mag. 191. Hab. in alpinis Helvetiae. $\overline{\text{T}}$

12. *Auricula*, foliis serratis carnosius obovatis, scapo multifloro, calycibus subfarinosis. Jacq. aust. t. 405. Hab. in alpinis. Color genuinus luteus, qui cultura tam varius et pulcher factus est.

* *lutea*, foliis spathulato-subrotundis integerrimis, tubo floris calyce angustiore. Villars. 2 p. 469. cal. brevis subfarinosa. Lam. ill. p. 429. Hab. in Galliae et Helvetiae alpinis.

13. *longifolia*, foliis oblongo-obovatis denticulatis, involucri foliolis basi auriculatis. Curt. mag. t. 393. P. auriculata. Lam. ill. p. 429. Ventenat hort. Cels. p. 42. t. 40. Hab. in Oriente. Scapus apice farinosus. Lam. Corolla intus citrina. V.

14. *gigantea*, fol. serratis glabris rhombo-ovatis, scapo paucifloro alissimo. Jacq. misc. 1. p. 160. Gmel. sib. 4. p. 84. Hab. in Sibiria. $\overline{\text{T}}$

15. *minima*, foliis glaberrimis nitidis

enueiformibus argute serratis, scapo paucifloro. Jacq. l. c. Flor. aust. t. 273. Hab. in alpinis. Corolla carnea. $\overline{\text{T}}$

16. *integrifolia*, fol. integerrimis ellipticis, ad oras subrenato-cartilagineis, umbella erecta, calycibus longe tubulosis obtusissimis. Jacq. Flor. aust. t. 127. Habit. in alpinis Pyrenaeis, Helveticis, Austriacis, Styriacis, Carniolicis. $\overline{\text{T}}$

17. *carniolic*, fol. integerrimis ellipticis, umbella erecta, calycibus acutis brevissimis. Jacq. l. c. Fl. aust. 3. app. t. 4. In Carniolic. Folia margine non cartilaginea. Calyces abbreviati. Willd. $\overline{\text{T}}$

18. *norvegica*, foliis integerrimis ovatis glabris petiolatis, floribus infundibuliformibus, calycibus tubulosis obtusis. Retz. secund. n.º 239. Flor. dan. t. 188. P. finmarctica. Jacq. Willd. p. 806. Hab. in alpinis Norvegiae. $\overline{\text{T}}$

19. *viscosa*, fol. ovatis integerrimis villosulo-viscosis, umbella erecta, cor. hypocrateriformibus. Willd. l. c. Allion. pedem. n.º 338. t. 5. f. 1. Hab. in alpinis Pedemontanis. $\overline{\text{T}}$

20. *sibirica*, foliis integerrimis ovatis longe petiolatis, umbella pauciflora nutante, cor. hypocrateriformi. Jacq. misc. 1. p. 161. Gmel. sib. 4. p. 83. t. 46. f. 1. Hab. in pratis humilioribus Sibiriae. $\overline{\text{T}}$

381. **CURTUSA.** *Cor.* rotata, tubo subnullo, fauce annuli elevato, lacin. ovatis acutis. *Caps.* 1-locularis, ovalis, apice 5-valvis.

1. *Mathioli*, calycibus corolla brevioribus. L. Jacq. ic. t. 32. Andrew. 1. 1. In alpinis Austriae, Sibiriae, Silesiae. $\overline{\text{T}}$

2. *Gmelini*, calycibus corollam excedentibus. Lin. Amoen. 2. p. 340. Gmel. sib. 4. p. 79. t. 43. f. 1. Lam. ill. t. 59. f. 2. Hab. in Sibiria. $\overline{\text{T}}$

382. **SOLDANELLA.** *Cor.* campanulata, lacero-multifida. *Caps.* 1-locularis, apice multidentata.

1. *alpina*. Jacq. aust. t. 13. Curt. mag. t. 49. 8. foliis reniformibus sublobatis. Sch. bohem. 1. 2. n.º 147. P. Clusii, fol. reniformibus integerrimis. Schmidt. bohem. 1. 2. t. 148. Hab. in alpinis. $\overline{\text{T}}$

383. **DODECATHÉON.** *Cor.* rotata, reflexa. *Stam.* tubo insidentia. *Caps.* 1-locularis, oblonga.

1. *Meadia*, foliis oblongo-ovalibus den-

ato-repandis, umbellis multifloris laxis, bracteis ovalibus. Michaux Flor. 1. p. 123. Frew Ehret. t. 12. Meadia. Catesb. car. 3. t. 1. Hab. in Virginia. $\overline{\text{T}}$

2. *integerrimifolium*, fol. subpathulatis integerrimis, umbellis paucifloris strictis, bracteis linearibus. Michaux, l. c. Pluck. alm. t. 79. f. 6 In montibus Alleghanis juxta rivulos sylvaticos.

384. CYCLAMEN. *Cor.* rotata, reflexa, tubo brevissimo: fauce prominente. *Bacca* tecta capsula.

1. *colum*, fol. orbiculatis cordatis integerrimis. Aiton. Kew. 1. p. 195. Curt. mag. t. 4. Hab. in Europa australi. $\overline{\text{T}}$

2. *europaeum*, fol. orbiculatis cordatis crenatis. Ait. p. 196. Jacq. aust. 5. p. 1. t. 401. Encl. bot. t. 217. Hab. in Silesiae, Bohemiae, Austriae, Barbariae sylvis umbrosis montosis. Rad. tuberosa magna. Scapi, germine impraegnato, spiraliiter contorquentur fructumque in terra recondunt. Smith.

3. *persicum*, foliis oblongo-ovatis cordatis crenatis. Aiton. l. c. Curt. mag. t. 44. In insula Cypro. $\overline{\text{T}}$

4. *hederacifolium*, foliis cordatis angulatis denticulatis. Aiton. l. c. Lob. ic. 605. Swert. florileg. t. 59. Hab. in Italia. $\overline{\text{T}}$

5. *indicum*, corollae limbo nutante. In Zeylona. $\overline{\text{T}}$

385. MENYANTHES. *Cor.* hirsuta. *Stigma* 2-fidum, *Caps.* 1-locularis, (in Plant. emersis 2-valvis: valvul. medio placentiferis; in natantibus ruptilis. Michaux.)

1. *nymphoides*, foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. L. Flor. dan. t. 319. Walschmidia nymphoides. Corolla 5-fida. Glandul. ad basin germinis. Peps 1-locularis. Stamina ciliata. Hayne in Schreb. Journ. 1800. p. 14. Hab. in Europae australioris aquis stagnantibus, fossis majoribus. $\overline{\text{T}}$

2. *trachysperma*, cor. glabra, laciniis integris, stylo subnullo, seminibus vesiculososis strobis. Michaux, p. 126. Villarsia aquatica. Gmel. S. N. Lin. 2. p. 447. Vent. Choix des Plant. p. 9. Habit. in America boreali. An distinctum genus?

3. *ovata*, fol. ovatis petiolatis, caule paniculato. Lin. suppl. Houttuyn t. 47 f. 1. Vent. l. c. t. 9. Hab. in aquis Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

4. *indica*, fol. cordatis subcrenatis, petiolis floriferis, corollis interne pilosis. L. Sloan. Cat. rar. hist. t. 252. Rumph. 6. t. 79. f. 3. Hab. in Malabarica, Zeylona, Cap. b. spei, Jamaicae fossis. $\overline{\text{T}}$

5. *trifoliata*, corollis superne dense barbatis, foliis ternatis. Flor. dan. t. 541. Curt. Lond. ic. Engl. bot. t. 465. β . minor. Mich. Flor. 1. p. 125. Hab. in Europae et Americ. aquis et palustribus. Fl. Hyacinthoides. $\overline{\text{T}}$

386. HOTTONIA. *Cor.* hypocrateriformis. *Stamina* tubo corollae imposita. *Stigm.* globosum. *Caps.* 1-locularis.

1. *palustris*, flor. verticillatis pedunculatis. Willd. Sp. p. 812. Flor. dan. t. 487. Hab. in fossis. $\overline{\text{T}}$

2. *sessiliflora*, flor. verticillatis sessilibus. Vahl. symbol. 2. p. 36. Hab. in India.

3. *indica*, pedunculis axillaribus solitariis, fol. multifloris Pet. gaz. Erica africana equiseti folio. Seb. mus. 2. t. 37. f. 5. Burm. zeyl. t. 55. f. 1. Rheed. 12. t. 36. Habit. in India.

4. *serrata*, pedunc. axillaribus solitariis, foliis lanceolatis tenuissime serratis. Willd. sp. 814. Hab. in India. Caulis subramosus. V.

387. CORIS. *Cal.* ventricosus: dentibus subspinosus. *Cor.* 1-petala, irregularis. *Caps.* 5-valvis, calyce cincta. *Sem.* plurima.

1. *mo-speliensis*, Linn. Willd. 2. p. 1000. Vill. 2. p. 464. Lam. ill. t. 202. Hab. in Europae australis maritimis. Cor. purpureo. Fol. (superiora) spinulosa. Var. foliis omnibus denticulato-spinosis, vid. Lam. ill. t. 202. An species distincta?

388. SAMOLUS. *Cor.* hypocrateriformis, 5-fida squamis interstincta. *S. am.* tubo inserta. *Caps.* seminifera, 1-locularis, 5-dentata, polysperma.

1. *Valerandi*, caule erecto, fol. obtusis, racemo multifloro. Smith. brit. 1. p. 259. Flor. dan. t. 198. Curt. Lond. ic. Hab. in paludosis, maritimis, locis subiosis per omnem terrarum orbem. $\overline{\text{T}}$

2. *repens*, parvula repens. Sheffieldia repens. Lin. suppl. p. 175. Forst. gen. p. 18. t. 9. Willd. sp. p. 813. Hab. in N. Zealand. et insula Paschatia. Pepl. Portulacae similis. $\overline{\text{T}}$

389. *LYSIMACHIA*. *Cor.* rotata.

Caps. globosa, mucronata, 10 valvis. (Filam. in quibusdam basi connata.)

* *Pedunculis racemosis.*

1. *vulgaris*, foliis ternis ovatis lanceolatis, racemis terminalibus. Flor. dan. t. 68. Cor. lon. l. c. Willd. sp. t. p. 816. Hab. ad ripas et paludes. Var. fol. d. $\frac{1}{2}$

2. *decurrens*, racemis simplicibus terminalibus, corollae segmentis obtusis, staminibus corolla longioribus Forst. prod. n.º 65. Hab. in insula Tanna.

3. *Ephemereum*, racemis terminalibus, petalis obovatis patulis, fol. lineari-lanceolatis sessilibus. Art. Kew. t. p. 198 Murr. Comment. goett. 1789. p. 9. t. 2. Till. pis. 106. t. 42. f. 2. Hab. in Media, Sibiria. Differta sequente foliis subtus fusco-punctatis. ☉

4. *atropurpurea*, spicis terminalibus, petalis lanceolatis, staminibus corolla longioribus. L. Comm. rar. 33. t. 33. Hab. in Oriente. ☉

5. *dubia*, racemis terminalibus, petalis connatis, stam. corolla brevioribus, fol. lanceolatis petiolatis. Art. Kew. t. p. 199. *Lysimachia atropurpurea*. Murr. l. c. p. 6. t. 1. Buxb. cent. 1. t. 33. Cum priore ☉

6. *angustifolia*, glaberrima ramulosa, fol. oppositis verticillatisque longo-linearibus, punctatis, racemo terminali brevi, petalis oblongis. Michaux Flor. t. p. 128. L. strieta. Art. Willd. sp. 2. p. 818? Hab. in Carolina inferiore?

7. *race-osa*, glaberrima elata, foliis ovali-lanceolatis oppositis punctatis, racemo terminali longissimo laxo, petalis oblongo-ovalibus. Michaux, Lam. ill. p. Pluck. Amalth. t. 428. f. 4? Hab. in New-York. Cor. uti in priore flava. $\frac{1}{2}$

8. *thyrsiflora*, racemis lateralibus pedunculatis. L. Flor. dan. t. 519. Naumburgia guttata. Moench. meth. suppl. p. 24. ob stam. libera. Hab. in Eur. borealis paludib. inque alpiis australioris, et America? cfr. Michaux, Flor. p. 127. $\frac{1}{2}$

* * *Pedunculis unifloris.*

9. *quadrifolia*, foliis quaternis petiolo ciliatis, pedunc. quaternis unifloris L. Pet. Ger. 5. t. 2. f. 5. β ? *hirsuta*, caule hirsuto, foliis subsessilibus 3-4-nis oppositisque ovalibus punctatis, pedunc. 4-nis, petalis integris. Michaux, Flor. t. p. 127. Hab. in Canada. β . in Carolina.

10. *ciliata*, foliis petiolatis subcordato-ovalibus margine subpul. crenatis; petiolo ciliato, flor. cernuis, pedicel. subgeminis, petalis rotundatis crenulatis. Michaux, Flor. t. p. 126. Willd. sp. 2. 819. Wach. hort. t. 12. Hab. in New-York et Connecticut.

11. *hybrida*, glabra, fol. oppositis longe petiolatis lanceolatis, petiolo ciliato, flor. cernuis, petalis crenulatis. Michaux p. 127. L. *angustifolia*, foliis lineari-lanceolatis basi ciliatis, pedunc. filiformibus 1-floris, cor. dentatis. Willd. in N. Act. Soc. Berol. v. 3? Hab. in Carolina, Pennsylvania.

12. *heterophylla*, cracilis, foliis oppositis, imis suborbiculatis breviter petiolatis; superioribus linearibus sessilibus basi subciliatis, flor. cernuis. Michaux l. c. Hab. in Georgia.

13. *punctata*, fol. subquaternis subsessilibus, pedunc. verticillatis unifloris. Linn. Jacq. aust. t. 366. Habit. in Holland. inter arundines, et in Helvetia, Sibiria, Carnioli. Petala maculis fulvis punctata. $\frac{1}{2}$

14? *Linum stellatum*, calye. corollam superantibus, caule erecto ramosissimo. L. Magn. Monsp. 161. t. 162. Hab. in Galliae et Italiae collibus Parva, 2-3-pollicaris. Cor. 5-fida. Fructus 5-valvis.

15. *memorum*, fol. ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. Linn. Flor. dan. t. 174. Anagallis lutea nemorum. Bauli. Hab. in nemoribus roridis. Anagallidem refert: fol. subtus quoque punctata, sed caps. differt.

16. *japonica*, fol. subcordatis, floribus axillaribus subbinis, pedunc. folio brevioribus. Thunb. jap. p. 83. Habit. in Japonia. ☉

17. *Nummularia*, fol. subcordatis, flor. solitariis, caule reptante. Linn. Flor. dan. t. 493. Hab. in pascuis humidis et in umbrosis. $\frac{1}{2}$

390. *I. UBINIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* hypocraterif. : limbo plano 5-partito equali. *Filam.* medio tubi adnata. *Stigm.* obtusum. *Caps.* 1-locularis, polyperma, mucronata.

1. *spatulata*. Vent. Hort. Cels. p. 96. t. 56. *Lysimachia mauritiana*. Lam. Willd. p. 820. Hab. in insula Mauritiae. Habit. Conv. tricoloris. Folia alterna. Caps. non sponte dehiscit, sed compressione 2-4-valvis. Vent. 5-valvis. Lam. ☉

391. *ANAGALLIS*. *Cor.* rotata.
Filam. hirsuta. *Caps.* circum-
scissa.

1. *arvensis*, caule diffuso nudo, petalis integris planis margine pilis capitis. A. *arvensis*. L. Willd. sp. 2. p. 821. A. mas. Vill. Dauph. 2. p. 461. Blackw. t. 43. Engl. bot. t. 529. In arvis.

2. *caerulea*, caule erectiusculo subulato, petalis dentatis demum reflexis. A. *caerulea*. Schreb. A. femina. Vill. Cresc. cum antecedente, sed minus frequens. Praeter color. caeruleum floribus, caulis insuper minus ramosus est. Folia sursum angustiora, subtus magis punctata.

3. *ovalis*, caule erecto, foliis ovalibus cum brevi acumine, floribus subsessilibus. Flor. Per. 2. p. 8. L. 115. f. 2. Hab. in Peruviae collibus arenosis. Pusilla. Flores axillares. ☉

4. *alternifolia*, fol. oblongo-ovatis alternis, flor. axillaribus longe pedunculatis. Cav. ic. 6. p. 1. t. 505. f. 2. Hab. in humidis Coacep. Chili. Fol. glauco-viridia venosa. In Gonorrhoea a Chilenibus adhibetur. C.

5. *pumila*, caule erecto, fol. subrotundis acutis sessilibus. Swartz. ind. occid. 1. p. 345. Hab. in Jamaicae montibus alius, locis paludosis. ☉

6. *Monelli*, fol. lanceolatis, caule erecto, herbaceo. Schousb. Mar. p. 78. ♀? A. verticillata erecta, fol. caulibus verticillatis, axillis foliorum in caule et ramis florigeris. Allion. ped. 11. 318. t. 85. f. 3. Hab. in Italia et Barbaria. Flor. coerul. ☉

7. *collina*, fol. lanceolatis, caule diffuso basi lignoso (fruticoso). Schousb. l. c. Hab. in Barbaria. Cor. phoenicea.

♂? *orientalis*, caule basi lignoso, flor. rubris. Similis *arvensi*, sed major et perennis. Ad eadem ac *collina*? colitur apud Cels.

8. *latifolia*, fol. cordatis amplexicaulis, caule compresso. Lin. In Hispania. Cor. caerulea. Caulis recto-paten, brachiatus, quadrangularis: angulis oppositis, triplo latioribus. L.

9. *linifolia*, fol. linearibus, caule erecto. L. Hab. in Lusitania, Hispania.

10. *tenella*, fol. subrotundis acutiusculis, caule repente. Linn. Curt. Lond. ic. Engl. bot. 1. 510. Irsek'a alpina. F. W. Schmidt. Obs. bot. in Usteri anal. bot. 2. p. 124. Hab. in Galliae, Angliae, Germaniae, Italiae erietis humidis. ☉

11. *crassifolia*, caule repente stolonij-

fero, foliis subrotundis, pedunc. axillaribus. 1-floris. Thore chloris du Département des Landes. p. 62. Hab. prope Dax in uliginosis, turiosis. Cor. alba. Filam. hispida basi cohaere. *Lysimachis* affinis.

392. *DORÆNA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala, 5-fida. *Stigma* emarginatum. *Caps.* supera, 1-locularis, 1-valvis, poly-perma.

1. *japonica*. Thunb. jap. p. 84. Hab. in Japonia. Fol. oblonga, alterna. Flor. racemosi. h

393. *BACOPA*. *Cal.* 5-partitus inaequalis. *Cor.* rotata: tubo staminifero. *Stigma* capitatum. *Caps.* 1-locularis, polysperma.

1. *aquatica*. Aubl. Guian. p. 120. t. 49. Lam. ill. p. 445. t. 107. Willd. Sp. 2. p. 84. Hab. in Cayenna. Fol. opposita lanceolata. Pedunc. axillares.

394. *BASSOVIA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* rotata. *Bacca* ovata, nodulosa. *Sem.* marginata, nidulantia.

1. *sylvatica*. Aubl. 1. p. 217. t. 85. Lam. ill. t. 102. Willd. 2. p. 1065. In sylvis Gujanee humidis. Folia alterna pedunculi axillares. ☉

395. *SPHENOCLEA*. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-fida, cal. minor. *Caps.* compressa, 2-locularis, circumscissa. *Sem.* numerosa, subteretia.

1. *zeylanica*. Gaertn. de fruct. et sem. 1. p. 113. t. 24. f. 5. Willd. sp. p. 927. Pongatium indicum. Lam. ill. p. 44. Gaertnera. Retz. Rheede. 11. t. 24. Habit. in Indiae humidis. ☉

† *Genera ericoidea* 1. *bicornia*, *pentandra* (gen. 356-404.)

396. *POIRETIA*. *Cal.* 5-partitus, imbricatus persistent. *Cor.* 5-petala. *Stam.* receptaculo inserta. *Anth.* connatae. *Caps.* 5-locul., 5-valvis, dissepimentis e medio valvularum.

1. *eucllata*. Cav. ic. 4. n. 378. t. 343. Sprengelia incarnata. Smith. Act. holm. 1794. p. 260. L. B. W. sp. 2. p. 633. Andrew. t. 2. Hab. in Nova Hollandia. Frutex bipedalis, rigidus.

397. *EPACRIS*. *Cal.* duplex: exterior imbricatus. *Stigma* capi-

tatum. *Germ.* cinctum squamulis 5. *Caps.* 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, polysperma. *Cav.*

1. *longiflora*, foliis cordato-ovatis rigidis apice subspinosis, flor. tubulosis elongatis. *Cav.* ic. 4. p. 25. t. 344. Corolla punicea.

Obs. Omnes hujus generis species in Australasia, seu Nova Hollandia aut Zeelandia praesertim prope oppidum Jackson laetae sunt, etiam omnes frutices sunt.

2. *pulehella*, fol. imbricatis cor latis : acumine rigido, flor. axillaribus t. bul so-catis anulatis. *Cav.* l. c. p. 26. t. 345. Cor. rufens.

3. *pungens*, fol. ovatis imbricatis rigidis : acumine spinaciformi, cal. exteriore conico. *Cav.* t. 346. Cor. tubus rubescens : limbo alio.

4. *spuria*, fol. ovato-mucronatis : limbo revoluti, flor. axillaribus subternis. *Cav.* 2. p. 27. t. 347. f. 1. An diversa a sequente ?

5. *grandiflora*, fruticosa, foliis ovatis acuminatis mucronatis recurvatis, floribus axillaribus. *Willd.* sp. p. 834. Hab. in Nova Hollandia. h

6. *pumila*, herbacea ? fol. ovato-oblongis imbricatis : florib. sessilibus sub-olitaris terminalibus. *Forst.* l. c. Lin. suppl. 138. Hab. in Nova Zeelandia. T

7. *longifolia*, arborea, fol. lineari-lanceolatis basi vaginantibus, racemis erectis articulatis lateralibus. *Forst. prod.* n. 68. Lin. suppl. p. 138. Hab. in N. Zeelandia. h

8. *rosmarinifolia*, fruticosa, fol. linearib. obtusis rigidis vaginantib. : flor. solitariis lateralibus. *Forst.* Hab. in N. Zeelandia. h

9. *villosa*, foliis linearibus imbricatis, ramis villosis, flor. axillaribus. *Cav.* t. 347. f. 2. Cor. laciniatus tomentosis.

398. STYPHELIA. *Cal.* imbricatus. *Cor.* tubulosa, 5-fida : laciniis saepe revolutis hirsutis aut glabris. *Nect.* membranaeum, lacernum, germen cingens. *Stigma* capitato-5-fidum. *Siam.* lauc inserta. *Drupa* 5-locularis : locul. 2-sperma.

1. *tubiflora*, corol. clavata longissima : limbo revoluti hirsuto, florib. axillaribus solitariis, fol. obovato-linearibus. *Smith.* Nova Holl. 1 p. 45. t. 14. *Willd.* sp. 2. p. 835. Crescunt omnes species in Nova Hollandia seu Australasia et h sunt.

2. *triflora*, foliis imbricatis ovatis mucronatis glaucis, flor. axillaribus ternis. *Andrew.* Repos. t. 72. Cor. longissima, rubescens, apice flava.

3. *ericoides*, cor. limbo patente hirsutissimo racemis axillaribus brevissimis erectis, fol. lanceolato-ellipticis revolutis. *Smith.* l. c. p. 48.

4. *strigosa*, corollae limbo patente imberbi : fauce pilosa, racemis axillaribus brevissimis erectis, fol. subulatis. *Smith.*

5. *scoparia*, cor. limbo concavusculo imberbi, racemis axillaribus brevissimis recurvis, fol. lineari-lanceolatis. *Smith.*

6. *daphnoides*, corollae limbo patente subpubescenti, florib. axillaribus solitariis, foliis ellipticis concavusculis. *Smith.* l. c.

7. *Gnidium*, cor. limbo reflexo hirsuto, spicis terminalibus solitariis ovatis, foliis lineari-lanceolatis sparsis. *Hort.* Malmanson. p. 23. t. 23.

8. *lanceolata*, cor. limbo revoluti hirsuto, racemis aggregatis terminalibus, foliis lineari-lanceolatis. *Smith.* *Ardisia* acerosa *Gaert.* sem. 2. p. 78. t. 94 ? *Epacris* juniperina. *Lin.* suppl. p. 138.

9. *elliptica*, cor. limbo patente imberbi, racemis aggregatis subterminalibus, fol. lanceolato-ellipticis. *Smith.*

10. *juniperina*, arborea, foliis sparsis linearibus cuspidatis serrulatis, flor. sessilibus solitariis terminalibus. *Forst. prod.* n. 71. sub genere *Epacris*.

* *procumbens*, caule procumbente, fol. lineari-lanceolatis imbricatis ciliatis, flor. axillaribus solitariis. *Ventenata* procumbens. *Cav.* ic. 4. p. 28. t. 349. f. 1. Fol. nervis parallelis.

* *humifusa*, fol. linearibus sparsis numerosis, floribus axillaribus. *Cav.* l. c. t. 348. Caulis ramosissimus.

Obs. Forsitan duae hae species ab enumeratis non diversae, quare stellulas apposui. Hoc genus ab *Epacris* fructu tantum differt.

399. PEROA. *Cal.* duplex : exterior triphyllus. *Cor.* hypocrateriformis : lacini acutis tomentosis. *Germ.* ovatum nudum. *Stigm.* simplex. *Caps.* ovata, 1-locularis, 1-sperma. *Sem.* oblongum.

1. *microphylla*, caule fruticoso, foliis ovatis imbricatis, flor. terminalibus. *Pero-*

joa. Cav. ic. 4. p. 39. t. 349 f. 2. Copiose inter Jackson et Botany-Bay. Differt ab Epacri stigm. simplicis, squamularum circa germina defectu et fructu 1-spermo. C.

400. PYXIDANTHERA. Cal. 5-partitus : laciniis incumbens, membranaceis. Cor. campanulata, 5-partita. Filam. lamellata. Anth. loculis subglobosis circumscissis. Styl. crassus. Stigm. 3. Caps. .

1. *barbulata*, fol. cuneato-lanceolatis acutis basi interna barbulis. Michaux, Fl. 1. p. 252. Hab. in Carolina superiore. Pusilla repens, Azaleae procumbentis habitum. T.

401. BEOBOTRYS. Cor. tubulosa, 5-fida. Cal. duplex, superus; exterior 2-phyllus; inferior campanulatus, 5-dentatus. Bacca 1-locularis, polysperma. (Cal. squamula duplici infra persistente cinctus. Juss.)

1. *nemoralis*, fol. ovato-dentatis. Vahl. symb. 1. p. 19. Willd. sp. p. 992. Maesa. Forsk. Juss. Hab. in insula Tauna. h

2. *lanceolata*, foliis lanceolatis serratis. Vahl. l. c. t. 6. Maesa Forsk. Juss. gen. p. 280. In montibus Arabiae felicia. Racemi supradecompositi, axillares. h

402. ARGOPHYLLUM. Cal. 5-fidus, semisuperus. Cor. 5-partita. Nec. 2. tubus interior, 5-gonius, pyramidatus truncatus. Caps. seminifera, 3-locularis, 3-fariam dehiscens; polysperma.

1. *nitidum*, Lin. suppl. p. 22. Lam. ill. 2. p. 1. t. 111. Hab. in Nova Caledonia. Frutex sericeus. Flores paniculati.

403. BROSSÆA. Cal. carnosus superus. Cor. conica truncata. Caps. 5-sulca, 5-locularis, tecta calyce persistente, 5-fissuris per-via. J.

1. *coccinea*, Lin. Plum. gen. 7. ic. 64. f. 2. Hab. in America calidior. Frut. multicaulis. Flores solitarii.

404. CYRILLA. Cal. minutus subtruncatus, 5-partitus, superus. Petala 5, stellatim patentia (ri-

gidula). Styl. 2-fidus. Bacca (Caps. l.) exsiccabilis, 2-locularis. Sem. solitaria funiculo appendensa. M.

1. *caroliniana*, foliis lanceolato-cuneatis acutis membranaceis nervosis. Michaux Flor. 1. p. 158. C. racemiflora. Linn. Itera cyrilla L'Herit. Stirp. t. 66. Jacq. ic. rar. t. 47. Hab. in Carolina. Petala pedicello longiora. M. h

2. *antillana*, foliis cuneato-oblongis obtusis coriaceis subus enerviis. Michaux; l. c. In ins. Antil. Spicae crassiores. h

405. ITEA. Cal. 5-fidus campanulatus. Petala 4, linearia reflexo-patentia, cal. inserta. Stigma capitatum, bilobum. Caps. 2-locularis, 2-valvis; valvis margine introflexo seminiferis. M.

1. *virginica*, foliis serratis, spicis pubescentibus. Michaux Flor. 1. p. 157. Hab. in Virginia.

Obs. Etiam ordine naturali, 'qui sa-xifrageae, a priore genere, quocum ab aliquibus conjuncta, differt. Richard apud Michaux. l. c.

406. PLUMBAGO. Cal. oblongus glanduloso-saber. Cor. infundibulif. Stam. squamis basin cor. clandestinis inserta. Stigma 5-fidum. Sem. 1, oblongum, tuni-catum.

1. *europaea*, foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris (rigidis), caule stricto. Willd. sp. 2. p. 83. Habitat in Europa australi et in Peruvia. Pl. tinctoria videtur. T.

2. *lappathifolia*, foliis amplexicaulibus lanceolatis laevibus, caule divaricato. Willd. Hab. in Iberia. Similis praecedenti. T.

3. *capensis*, foliis petiolatis oblongis integris subus glaucis, caule erecto. Th. prodr. 33. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *zeylanica*, foliis petiolatis ovatis glabris, caule filiformi. Lin. Rhced. 10. t. 8. Hab. in India. h

5. *rosea*, fol. petiolatis ovatis glabris sub-lenticulatis, caule geniculis gibbosis. Linn. Rumph. 5. t. 168. Hab. in India. h

6. *scandens*, foliis petiolatis ovatis glabris, caule flexuoso scandente. Lin. Sloan. 1. p. 211. t. 133; f. 1. Hab. in America calidior. h

7. *auriculata*, fol. ovato-oblongis petiolatis sulcis spinuloso-punctulatis, petiolis auriculatis caulem amplexantibus. Lam. enc. 2. p. 267. Hab. in India. h

407. WEIGELIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* infundibuliformis. *Syl.* e basi geminis. *Stigma* peltatum. *Sem.* 1.

1. *japonica*, fol. sessilibus ovato-lanceolatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. 2. p. 331. Ej. Flor. jap. t. 16. Willd. sp. p. 836. Hab. in Japonia. h

2. *coracensis*, fol. petiolatis obovatis. Thunb. l. c. Kaempf. ic. select. t. 45. Cum priore. h

408. ABRONIA. *Cal.* 6. *Cor.* infera, hypocrateriformis, supra germen coarctata. *Sem.* 1, 5-angulare, cor. basi indurata tectum.

1. *umbellata*. Lam. ill. p. 460. t. 105. Tricraus admirabilis. L'Herit. Willd. sp. 2. p. 807. Hab. in Californiae maritimis. Fl. capitato-umbellati.

409. MIRABILIS. *Cor.* infundibuliformis, inferne coarctata, supera. *Cal.* inferus. *Nectarium* globosum, germen includens. *Stigma* globosum. *Nux* infra corollam, striata.

1. *dichotoma*, flor. sessilibus axillaribus erectis solitariis. Lin. Willd. sp. 2. p. 699. Admirabilis. Clus. hist. 2. p. 90. Hab. in Mexico. T

2. *Jalapa*, flor. congestis pedunculatis, fol. glabris. Willd. Batich. anal. plant. 2. p. 34. Hab. in India utraque. Flor. flavo-rubri, albi, vespera explicantur.

3. *longiflora*, flor. congestis longissimis subnatis terminalibus, foliis subvillosis. Lin. Act. holm. 1755. p. 176. t. 6. f. 1. Hab. in Mexici frigidis montibus. T

410. FABIANA. *Cor.* infundibuliformis, limbo plicato revoluta; *Tubus* longissimus. *Stam.* inaequalia. *Stigma* emarginatum. *Caps.* bilocularis, 2-valvis.

1. *imbricata*, fol. imbricatis ovatis minimis. Flor. Per. 2. p. 12 t. 122. Hab. in Regni Chilensis campis et ripis arcuosis. Resinosa, Tamarisci habitu. h

411. NIEREMBERGIA. *Cor.* subhypocrateriformis: tubo longissimo; fauce coarctata plicata. *Stam.* inaequalia, superne adpressa. *Stigma* bilobum. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis.

1. *repens*. Flor. Per. 2. p. 1. t. 123. f. 1. Hab. in Regni Chilensis campis apricis et pascuis arenosis Conceptionis. Herbaeae, pedalis. Convolvulacea?

412. XUAREZIA. *Cor.* rotata. *Stigma* compressum. *Caps.* bilocularis, 2-valvis: valvis bifidis.

1. *biflora*, fol. lanceolatis superne serratis, flor. geminis. Flor. Peruv. 2. p. 13. t. 123. l. c. Capraria peruviana. Fewell Peruv. 2. p. 64. t. 48. In Peruviae arenosis, ripis et argillosis. Ab incolis loco Theae adhibetur. h

413. PORANA. *Cor.* campanulata. *Cal.* 5-fida, in fructu maior. *Syl.* semibifidus, longior, persistens. *Stigmata* globosa. *Per.* bivalve.

1. *volabilis*. Burm. ind. 51. t. 21. f. 1. Willd. sp. p. 845. Lam. ill. t. 186. In India orientali. Fol. ovata, serrata, plicata. L. h

CONVOLVULACEAE (monostyli. Gen. 414-418.) calycer sunt 5-fido, ut plurimum persistente, corollae campanulata aut infundibuliformi tubo elongato, capsula 2-3-4-loculari, corumque folia aeterna sunt, insuper herbas parum frutes, sicut saepe volubiles et quasdam laetes. Monogynae aut Polygynae sunt.

414. RETZIA. *Cor.* cylindrica extus villosa. *Stigma* bifidum. *Caps.* 2-locularis, polysperma.

1. *spicata*. Thunb. Act. lund. 1. p. 55. t. 1. f. 5. Lam. ill. t. 103. Hab. in Cap. h. spei altissimis montibus. Corol. rufescentes. h

415. ENDRACHIUM. *Cal.* coriaceo, 5-phyllus. *Cor.* campanulata s. urecolata extus hirsuta. *Stam.* exserta. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* substipitata, lignosa, 2-locularis.

21. *Madagascariense*. Gmel. Syn. veget. Thapsia spectabilis, Smith ic. ined. 1. p. 7. t. 7. Willd. spec. 2. p. 615. Endrachium

drechium Juss. Humbertia madagascariensis Lam. ill. t. 105. Hab. in Madagascar. f.

46. **CONVOLVULUS.** Cor. campanulata, plicata. Stigm. 2, simplicia. Caps. 2-3-locularis: loculis dispersis.

* *Caule volubili.*

1. *arvensis*, fol. sagittatis utrinque acutis, pedunc. subunifloris. Lin. Willd. sp. p. 844. Flor. dan. t. 569. Hab. in agris. Bract. remotae. f.

* *auriculatus*, foliis linearibus hastato-acuminatis, auriculis integris. Lam. enc. bot. 3. p. 540. Boec. mus. t. 33. Pluck. alm. t. 24. f. 3. Var. f. prioris. Lin.

2. *incarnatus*, foliis sagittatis oblongis acuminatis glabris: lobis divaricatis acutis integerrimis, pedunc. 1-floris. Vahl. Eclog. amer. 2. Hab. in Curassao. C. arvensi affinis.

3. *ruber*, fol. sagittatis glabris emarginatis: lobis obtusissimis divaricatis integerrimis, umbellis involucriatis, caule piloso. Vahl. l. c. Hab. in America meridionali.

4. *sepium*, fol. sagittatis postice truncatis, pedunc. tetragonis unifloris, bracteis cordatis maximis. Flor. dan. t. 458. Engl. bot. t. 313. Flor. Per. 2. p. 10. Habit. in sepibus et salicetis, etiam in America et Peruvia. Stigma simplex.

5. *Scammonia*, foliis sagittatis postice truncatis, pedunc. tertibus subtrifloris. Lin. Moris. hist. 2. t. 1. t. 3. f. 5. Mill. dict. t. 102. Scammonia syriaca. Bauh. pin. 294. Hab. in Syria, Mysia, Cappadocia. f.

6. *involucratus*, fol. cordato-hastatis pubescentibus, pedunc. subtrifloris, calycibus bracteatis. Willd. sp. p. 845. Hab. in Guinea.

7. *Hermanniae*, fol. cordato-sagittatis subhastatisque crenato-sinuat: nonnullis integerrimis, pedunc. bifloris. Flor. Per. 2. p. 10. L'Her. Stirp. p. 67. t. 33. Hab. in Peru. Cor. alba. Caps. helvola, carnosa.

8. *arenatifolius*, fol. sagittatis crenatis, pedunc. longis, flor. umbellatis. Flor. Per. l. c. t. 218. f. a. Cum priore. f.

9. *sagittifolius*, fol. oblongo-sagittatis: sinu profundissimo, auriculis subcuneatis, pedunc. 1-floris, cal. laciniis rotundato-ovalibus. Mich. flor. t. p. 138. Pluck.

t. 85. f. 3. Hab. in America boreali. Cor. ampla, rosea.

10. *bonariensis*, fol. hastatis, basi cuneatis, apice setula terminatis, pedunc. subtrifloris. Cav. ic. 5. p. 54. t. 48. f. 2. Hab. in planitie de Buenos-Ayres. Corol. alba venulis roseis variegata.

11. *farinosus*, fol. cordatis acuminatis repandis, pedunc. trifloris, caule farinoso. Lin. Jacq. hort. t. 35. Hab. in Madera. f.

12. *lanuginosus*, fol. cordatis oblongis subhastatis tomentoso-sericeis: auriculis dentatis, pedunculis trifloris, caule piloso. Vahl. symb. 3. p. 23. Hab. in Oriente. Fol. tomento subferrugineo tecta. Cor. fere C. Scammoniae, flavescens.

13. *villosus*, fol. cordatis ovatis acuminatis margine villosis subciliatis, caput. pedunculatis hirsutimis involucriatis. C. ciliatus. Vahl. Eclog. amer. 2. Hab. in Cajenna. C. guianensis habitu.

14. *nummularius*, villosus, fol. cordatis mucronatis, pedunc. multifloris folio longioribus, calycib. ovatis, bracteis lanceolatis. Vahl. l. c. In America meridionali. Sequenti affinis.

15. *nodiflorus*, fol. subtomentosis ovatis subcordatis, pedunc. bifidis multifloris fol. brevioribus, Vahl. l. c. Lam. enc. 3. p. 557. Hab. in ins. St. Crucis. Au diversus a C. verticillato?

16. *parviflorus*, foliis cordato-oblongis mucronatis, pedunc. ramosis multifloris brevib. subverticillatis. Enc. bot. 3. p. 556. Burm. amer. p. 81. t. 94. f. 2. Habit. ad St. Dominico in collibus petrosis, ubi flosset Decembri.

17. *ovalifolius*, glaber, foliis ovalibus integerrimis emarginatis, pedunc. 1-7-floris, cal. obovatis. Vahl. Eclog. 2. Hab. in India orientali.

18. *incanus*, tomentoso-sericens, fol. lanceolatis sagittatis obtusis basi subcuneatis, pedunc. bifloris. Vahl. l. c. Hab. in America. Cor. caeruleo-villosa.

19. *emarginatus*, fol. lanceolatis inferioribus emarginatis mucronatis, pedunc. unifloris, foliis calycinis exterioribus semiovatis magnis Vahl. l. c. Burm. ind. 47. t. 21. l. 2. Hab. in India.

20. *Medium*, glaber, fol. linearib. hastato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunc. unifloris, cal. sagittatis, caule volubili. Lin. Vahl. symb. 3. p. 24. Reed. t. 55. Hab. in India. Affinis C. repanti. L. Calycis

foliola sagittata, ut in Campanula Medio.
Lin. ☉

21. *filicalis*, foliis lineari-lanceolatis obtusis mucronatis, basi dilatatis dentatis, foliolis calycinis oblongis. Vahl. l. c. Hab. in Guinea. ☉

22. *simplex*, foliis linearibus hastato-acuminatis; auriculis dentatis, foliolis calycinis simplicibus. Lam. enc. 3. p. 542. (C. hastatus.) In India orientali.

23. *dentatus*, fol. hastatis glabris; auriculis dentatis, pedunc. multifloris muricatis. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orientali.

24. *hastatus*, fol. lanceolatis hastatis, pedunc. axillaribus geminis bifloris. Vahl. symb. 1. p. 15. Hab. in Aegypto.

25. *panduratus*, radice crassa, foliis cordatis integris panduriformibus, calycibus laevibus. L. Mich. Flor. 1. p. 138. C. megalarhizus, flore amplo lacteo; fundo purpureo. Dill. elt. 101. t. 85. f. 99. In Virginiae arenosis. Junior subtomentosus. ☉

26. *bracteatus*, fol. cordatis subintegris trilobisque hastatis attenuatis, pedunculis unifloris, foliolis exterioribus calycis bracteiformibus. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orientali.

27. *bicolor*, fol. cordatis villosis, basi angulato-sublobatis, pedunc. unifloris, foliolis exterioribus calycis bracteiformibus. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orient.

28. *trilobus*, fol. cordatis villosis trilobis; lobis ovatis acutis, pedunc. unifloris, caule vobibili. Thunb. prod. 35. Hab. ad Cap. b. spei.

29. *platanifolius*, fol. cordatis trilobis; lobis lateralibus dentato-angulatis, pedunc. subtrifloris calycibusque subaequalibus glabris. Vahl. symb. 3. p. 26. Fewill. 3. p. 16. t. 11. Pluck. t. 167. f. 3. Hab. in Amer. australi. ☉

30. *acuminatus*, fol. cordatis trilobisque acuminatis, pedunc. elongatis multifloris calycibusque glabris. Vahl. l. c. Hab. in insula St. Crucis.

31. *obscurus*, fol. cordatis acuminatis, pedunc. filiformibus unifloris calycibusque glabris, caule hirsutissimo. Vahl. symb. 3. p. 27. C. flore minore lacteo, fundo atrofescente. Dill. elth. 98. t. 83. f. 95. Hab. in China, Batavia, Zeylona et Surinamo. ☉

32. *flavus*, fol. cordatis repando-sublobatis denticatis apice mucronatis, pe-

duncul. bifidis multifloris. Willd. p. 852. Burm. ind. 77. t. 30. f. 2? In India orient.

33. *angularis*, fol. cordatis quinqueangulatis integerrimis villosis, pedunculis multifloris. L. Burm. ind. 46. t. 19. f. 2. Hab. in Java.

34. *Batatas*, fol. cordatis hastatis quinqueangulatis, caule repente hispido tuberoso. L. Michaux Flor. 1. p. 138. C. radice tuberosa esculenta. Catesb. car. p. 60. t. 60. Rumph. 5. t. 130. Hab. in India utraque. Fol. modo hastato, modo angulato-lobato. Mich.

35. *maximus*, fol. cordatis ovatis acuminatis integerrimis glaberrimis, caule petiolisque glabris. Lin. suppl. 237. Rheed. 11. t. 53. Hab. in Zeylona. Caulis internec ligneus. ☉

36. *gemellus*, fol. cordatis subtus villosiusculis, pedunc. bifloris. Vahl. symb. 3. p. 27. Burm. ind. 46. t. 41. f. 1. Hab. in Java et Tranquebariae ruderalis. Floret ante meridiem usque ad 12 horam, quod raro in calidis regionibus. Koenig.

37. *cymosus*, fol. cordatis integerrimis, caule filiformi, pedunc. multifloris umbellato-cymosis. Flor. Per. 2. p. 9. t. 117. f. b. In Peruvia ad Potuzo versuras. Caul. ramosissimus pilis deciduis hirsutus.

38. *sphaerostigma*, fol. cordatis subvillois, flor. umbellatis, stigm. binis divaricatis capitatis. Cav. ic. 5. p. 54. t. 481. Hab. in Mindanao. Calyx villosus. Au potius Ipomoea?

39. *pentanthus*, fol. cordatis acuminatis glabris subrepandis, umbellis pedunc. capitatis quinquefloris, cal. ciliatis. Willd. p. 855. Jacq. ic. rar. 2. p. 316. Collect. 4. p. 210. Hab. . . h

40. *guyanensis*, foliis cordato-ovatis subtus calycibusque tomentosis, pedunc. elongatis, flo. corymbois - subcapitatis. Vahl. symb. 3. p. 28. Auhl. guj. 1. p. 136. t. 52. Hab. ad ripas rivulorum in Cajenna et Guyana. ☉

41. *capitatus*, hispidus, fol. cordato-ovatis, flor. cordatis. Vahl. symb. 3. p. 29. Hab. in India orientali.

42. *hispidus*, hirsutissimus, fol. cordato-ovatis, flor. umbellatis, pedunc. brevissimis. Vahl. Symb. p. 29. In India orientali.

43. *triflorus*, fol. cordato-lanceolatis attenuatis glabris obtusis, pedunc. trifloris. Vahl. p. 30. Hab. in India orientali.

44. *verticillatus*, fol. cordatis oblongis

nudis, pedunc. umbellatis bifidis multiflor.
L. sp. pl. 220. Ipomoea verticillata, Amoen.
acad. 5. p. 394. Hab. in America. Flores
caeruleo-rosae, parvi.

45. *vickiceus*, foliis foliolisque calycis
dubius exterioribus cordato-ovatis acutis,
pedunc. elongatis bifidis multifloris. Vahl.
ymb. 3. p. 29. Hab. in insula St. Crucis.

46. *umbellatus*, fol. cordatis, caule volu-
bili, pedunc. umbellatis. Lin. Swartz.
obs. 62. Pluck. alm. 114. t. 167. f. 1. Plum.
amer. 88. t. 102. Hab. in Martinica, Do-
mingo. Cor. lutea. Stigm. 2, globosa. Sw. 7.

47. *tuguriorum*, fol. cordato-sagittatis
acutis, caule anguloso, pedunc. tetragonis
unif. Forst. n. 74. Hab. in Nova Zeelandia.

48. *cordifolius*, fol. cordatis hastatis
dentatis, pedunc. bifido-umbellatis, caule
volubili. Th. prod. 35. H. ad Cap. b. spei.

49. *bifidus*, fol. cordatis oblongis acu-
minatis cultus mollissimis, pedunc. bifidis
multifloris. Vahl. symb. 3. p. 30. Hab. in
Java et India orientali.

50. *malabaricus*, fol. cordatis glabris,
caule perenni villosa. L. Rheed. 12. t. 51.
Hab. in Malabaricae arenosis. h

51. *coelestis*, fol. cordatis acuminatis-
simis pubescentib., pedunc. elongatis um-
bellato-trifidis. Forst. prod. n. 77. Hab. in
ins. Tanna.

52. *canariensis*, fol. cordatis pubes-
centibus, caule perenni villosa, pedunc.
multifloris. L. Comm. hort. 2. p. 101. t. 51.
Pluck. alm. t. 325. f. 1. Hab. in Canariensis.
insulis. h

53. *ferrugineus*, ferrugineo-tomentosus,
fol. cordato-ovatis acutis, pedunc. axilla-
ribus quadrifloris. Vahl. eclog. 1. p. 17.
Hab. in Amer. merid. h

54. *muricatus*, fol. cordatis, pedunculis
incrassatis calycibusque laevibus, caule
muricato. L. Hab. in Surate. Simillimus
C. purpureo. ©

55. *triqueter*, fol. cordatis acutis sub-
villosis, pedunc. multifloris, caule tricari-
nato. Vahl. symb. 3. p. 30. Hab. in insula
St. Crucis.

56. *anceps*, fol. cordatis, caule volubili
uriting carinato. L. H. in Zeylona, Java.

57. *Turpethum*, fol. cordatis angulatis,
caule membranaceo quadrangulari, pedunc.
multif. L. Blackw. t. 397. Herm. Lugd. B.
t. 178. 179. Turpethum repens, fol. Althaeae
vel Indicum. Bauh. pin. 149. In Zeylona. T

58. *grandiflorus*, foliis cordatis ovatis

obtusiusculis integerrimis, pedunc. subli-
foris, cal. coriaceis, caule petiolisque pu-
bescens. Lin. suppl. 136. Rheed. 11. t.
50. Hab. in India inter spinae ad littora
fluminum. Caulis arboreus. Cal. dis. tri-
phyllus coriaceus. h

59. *trinervius*, fol. cordatis oblongis gla-
bris trinerviis, caule volubili tereti, pedunc.
unifloris. Thunb. jap. 85. encycl. bot. 3. p.
543. Hab. in Japonia. Folia opposita. An
Ipomoea?

60. *peltatus*, fol. peltatis, pedunculis
multifloris. L. Rumph. amb. 5. t. 159. Hab.
in Amboina inque Societatis insulis.

61. *Jalapae*, caule volubili, fol. ovatis
subcordatis obtusis, obsolete repandis sub-
tus villosis, pedunc. unifloris. Ait. Kew. 7.
p. 211. Hab. in Mexico, Vera cruce. Rad.
magna, nigra. Sem. hirsuta. Ipomoea ma-
crobryga. Mieboux. p. 141?

62. *macrospemus*, fol. ellipticis acutis
glabris, cor. planis, capsularum localis
monospermis, caule scandente. Willd. p.
860. Mouroucou violacea. Aubl. Guj. 1. p.
142. t. 54. Hab. in Gujanae sylvis. h

63. *tenellus*, fol. ellipticis mucronatis,
basi subcordatis, pedunc. bifloris fol. lon-
gioribus. Willd. Lam. enc. 3. p. 515. Pluck.
alm. 114. t. 166. Hab. in Carolina.

64. *sericeus*, fol. lanceolato-ellipticis,
sulcis tomentoso-sericis, pedunc. subum-
bellatis, cal. pilosis, caule volubili. Lin.
C. mollis. Burm. ind. 44. t. 17. f. 1. Hab.
in India. h

65. *tomentosus*, fol. trilobis tomentosis,
caule lanuginoso. Lin. Sloan. jam. 51. hist.
t. 98. f. 2. Pluck. t. 167. f. 4. In Jamaica.

66. *quinqueflorus*, fol. sagittato-ovatis
attenuatis glabris crenato-subrepandis, pe-
dunc. subquinquefloris. Vahl. symb. 3. p.
31. Hab. in insula Borbonia?

67. *arenarius*, fol. oblongis emarginatis
basi lobatis integrisve, pedunc. unifloris,
cor. tubulosis. Vahl. symb. 1. p. 18. Hab.
in ins. Axoricis et ins. St. Crucis.

68. *althaeoides*, fol. cordatis sinuatis
sericis: lobis repandis, pedunc. bifloris.
L. Barr. rar. 5. t. 312. Hab. in Europae
meridionalis, Orientis et Africae collib. T

69. *cairicus*, fol. palmatis glabris ser-
ratis, stipulis foliiformibus palmatis, axil-
laribus tomentosis, cal. pedunculatis laevibus.
Vahl. symbol. 1. p. 15. Ipomoea palmata.
Pursh. Hab. in Aegypto. T

70. *quinquefolius*, fol. palmato-quin-
a 2

cordatis nervoso-venosis obliquis. Willd. phytog. 1. p. 4. f. 1. Hab. in India orientali. Calyx non striatus. An prioris varietas?

4. *monocla*, fol. subrotundo-ovatis dentatis venosis scabris, corymbis axillaribus monocla. Willd. Roxb. corom. 1. p. 43. t. 58. Hab. in sylvis Indiae. An potius polygama? h

5. *spinescens*, fol. ovatis acutis serratis scabris, petiolis subquinescentibus. Mant. 206. Hab. in India orientali. Rami tomentosi, ferruginei. h

6. *Sebestena*, foliis oblongo-ovatis repandis scabri s. Jacq. am. el. 2. t. 44. And. t. 157. *Sebestena* scabra flore minato crispo. Dill. elth. 341. t. 255. f. 331. Hab. in Ind. h

7. *aspera*, fol. ovatis acuminatis asperis, floribus cymosis rugosis. Forst. prod. n. 109. Habit. in insula Tongatabu. h

8. *dichotoma*, fol. oblongo-ovatis vix crenatis, corymbis dichotomis. Forst. prod. n. 110. Hab. in N. Caledonia. h

9. *Gerascanthus*, fol. lanceolato-ovatis scabris, panicula terminali, calycibus decemstriatis. Jacq. amer. t. 175. f. 16. Brown. jam. 170. t. 29. f. 3. Hab. in Jamaicae sylvis. An species *Cerdanea* cum n. 1? h

10. *flavescens*, fol. oblongis acuminatis reticulato-venosis glabris, racemis axillaribus. Willd. Fructus viridi-flavescens cernuiforme. Aubl. guj. 1. p. 26. t. 89. In sylvis Gujanae et Cajennae ad margines pratorum. h

11. *Toquepa*, fol. coriatis acuminatis villosis, flor. racemosis. Aubl. guj. 1. p. 228. t. 90. Hab. in sylvis Gujanae. h

12. *macrophylla*, foliis ovatis villosis sesquipedalibus. Mill. dict. 3. Sloan. jam. 184. hist. 2 p. 130. t. 221. f. 1. Hab. in Jamaica. h

13. *micranthus*, fol. ellipticis acutis integris membranaceis venosis, racemis compositis laxis. Swartz. Fl. ind. oechl. 1. p. 460. In Jamaicae sylvis montium. h

14. *elliptica*, fol. oblongis apice attenuatis integris subcoriaceis, racemis compositis diffusis, drupis acuminatis. Swartz. l. c. p. 461. Hab. in Jamaica, Dominica. h

15. *Collococca*, fol. oblongo-ovatis integerrimis, florib. corymbosis, calycibus interne tomentosis. Sloan. hist. 2. t. 203. f. 2. Pluck. phyt. t. 158. f. 1. Hab. in Jamaica. h

16. *hirsuta*, fol. oblongis utrinque attenuatis pubescentibus, caule pedunculisque

corymbosis terminalibus axillaribusque birsutis. Willd. p. 106. Aubl. guj. 1. p. 219. t. 86. Hab. in sylvis Cajennae et Gujanae. h

17. *tetrandra*, foliis ovatis acutis, basi inaequaliter coriatis subtus scabris, cyma terminoli, floribus tetrandris. Willd. Fructu albo tetrapyreno. Aubl. In Gujana ad fluviorum ripas.

18. *tetraphylla*, fol. quaternis obovatis integerrimis glabris, pedunc. lateralibus multisor. Willd. C. fol. verticillatis, fructu olivaceiformi. Aubl. 1. p. 224. t. 88. Hab. in maritimis Gujanae.

368. **PATAGONULA. Cor. rotata. Stylus dichotomus. Cal. fructifer maximus. Sem. . .**

1. *americana*. Lin. Dill. elth. t. 226. f. 293. Lam. ill. t. 56. *Cordia* Patagonula. Ait. Willd. sp. p. 1076. Hab. in Patagonia. A *Cordia* differt calyce et forte fructu.

369. **M-NAIS. Cal. 3-phyllus. Cor. hypocrateriformis. Bacca 4-locularis. Sem. solitaria.**

1. *topiaria*. Lin. Hab. in America meridionali. Fol. ovata, integra. An *Ehretiae* species? h

370. **EHRETIA. Cor. tubulosa. Drupa 2-locularis. Noces solitariae, 2-loculares. Stigma emarginatum.**

1. *tinifolia*, fol. oblongo-ovatis integerrimis glabris, flor. paniculatis. Amoen. seed. 5. p. 545. Willd. sp. 2. p. 1077. Lam. ill. t. 56. Trew. Ehret. t. 24. Hab. in Jamaica. h

2. *aspera*, fol. ovatis scaberrimis, flor. corymbosis - spicatis secundis. Willd. phyt. 1. p. 4. t. 2. f. 1. Roxb. corom. 1. p. 41. t. 55. Hab. in rupestribus siccis Indiae. Medium tenet inter *Ehretias* et *Tournefortias*, et cum *Cordia* stigmatibus convenit. Willd. h

3. *laevis*, fol. ovatis glabris, flor. lateralibus corymbosis - spicatis secundis divaricatis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 42. t. 56. Habit. in montibus Circarensibus Indiae. Simillima praecedenti. W. h

4. *internodis*, fol. oblongo-ovatis glabris, paniculis infrafoliaceis. Willd. Phier. stirp. 1. p. 47. t. 24. E. petiolaris. Lam. In rupibus insulae Mauriti. Corolla campanulata. h

5. *spinosa*, spinosa. Jacq. amer. 46. t. 80. f. 18. Hab. in America. h

6. *Bourreria*, foliis ovatis integerrimis laevibus, flor. sulcorymbosis, calycibus glabris. Linn. *Beurreria succulenta* Jacq. Brown. jam. 178. t. 15. f. 2. In Jamaica. *Beurreria* affinitate jungit Ehretia cum Cordia. h

7. *virgata*, fol. oblongis integris superne scabris, ramis filiformibus, pedunc. terminalibus sparsis unifloris, calycibus hirsutis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 463. In desertis Hispaniolae. h

8. *exsucca*, fol. cuneiformi-lanceolatis margine reflexis. Lin. *Beurreria exsucca* fructibus exsuccis quadrifidis. Jacq. amer. 45. t. 173. f. 17. Hab. in Amer. merid. h

9. *microphylla*, fol. cuneiformibus obtusis, superne scabris punctatis, pedunc. brevibus axillaribus subunifloris. Lam. ill. p. 425. Pluck. t. 31. f. 1. Hab. in India. h

10. *buxifolia*, fol. fasciculatis obovatis callosopunctatis, apice subtridentatis, pedunc. multifloris. Willd. Roxb. coron. 1. p. 42. t. 3. Cordia retusa. Vahl. symb. 2. p. 42. Hab. in India orientali. h

371. *VARRONIA*. *Cal.* campanulatus 5-dentatus. *Cor.* tubulosa cal. paullo longior: ore patente crenato-plicato. *Styl.* dichotomus. *Stigma* 4. *Drupa* ovata 1-locularis (4-locular. Lin.); 1-sperma. Flor. Per. 2. p. 22.

1. *crenata*, fol. ovato-subrotundis crenatis rugosis, pedunculis lateralibus, flor. capitis. Fl. Per. 1. c. t. 146. f. 6. Hab. in Peruviae petrosis et argillosis. Lantanae forma. h

* *parviflora*, fol. ovato-oblongis serratis, pedunc. oppositifoliis alternantibusque, spicis globosis. Orteg. Dec. plant. p. 86. In N. Hispania et Peruvia. An una ex enumeratis Peruviae speciebus?

2. *lineata*, fol. lanceolatis lineatis, pedunculis lateralibus petiolo adnatis, spicis globosis. Amoen. acad. 5. p. 394. Willd. sp. 2. p. 1079. Brown. jam. t. 11. f. 2. Pluck. alm. t. 328. f. 5. Hab. in America. h

3. *bullata*, fol. ovatis venoso-rugosis, spicis globosis. Linn. l. c. Swartz. obs. 88. Hab. in Jamaicae fruticetis artilia. h

4. *globosa*, foliis lanceolato-oblongis, canle dichotomo, pedunc. axillaribus elongatis nudis, spicis globosis. Hab. in Amer. Varietas V. bullatae? Swartz. obs. 88. h

5. *geniculata*, (*mirabil.* Jacq.), fol. ovatis rugosis serratis, floribus racemosis secun-

dis, corollis hypocrateriformibus. Swartz. prod. p. 465. Jacq. amer. 41. t. 33. Tournefortia serrata. Lin. vid. Lam. ill. 418. Hab. in fruticetis et petrosis graminosis Hispaniolae. Pedic. geniculati. h

6. *martinicensis*, foliis ovatis acuminatis, spicis oblongis. Jacq. amer. 41. t. 32. Hab. in Martinica. A V. curassavica non diversa. Swartz. obs. p. 89. h

7. *curassavica*, fol. lanceolatis, spicis oblongis. Jacq. amer. ed. 2. p. 25. Swartz. obs. 88. In Jamaicae fruticetis, passulis. h

8. *dichotoma*, foliis ovato-lanceolatis acutis sursum serratis, pedunc. umbellato-spicatis. Flor. Per. 1. c. f. a. Copiose in Per. ruderalis etc. Drupa coccinea. h

9. *obliqua*, foliis ovatis acutis obliquis obtuse serratis, pedunculis rameis, spicis oblongis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 147. f. a. In Peruviae praeruptis. Flor. densi sessilis. h

10. *cylindristachya*, fol. ovatis acutis dense serratis rugosis, spicis longis supra-axillaribus et terminalibus. Flor. Per. p. 25. t. 147. f. a. (*macrostachya*) Cresc. in Peruviae saepibus. Drupa calyce involuta, alba. h

11. *ferruginea*, fol. ovatis dentatis subtus tomentosis, pedunc. lateralibus, spic. oblongis. Lam. ill. p. 418. Hab. in America. h

12. *angustifolia*, fol. linearibus scabris subde talis obtusis, spicis linearibus oblongis. Willd. p. 1081. Hab. in insula St. Crucis. Fol. inferne tomentosa.

13. *alba*, fol. cordatis, florib. cymosis. Jacq. amer. ed. picta. p. 26. Hab. in America. h

14. *monosperma*, fol. ovato-lanceolatis, spicis subrotundis, nuce 1-loculari. Jacq. Sevenbr. 1. p. 18. t. 39. Hab. ad Caracas. h

372. *CERDANA*. *Cal.* tubulosus, 10-striatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5-partito. *Nectar.* cyathiforme, germen ambiens. *Stigm.* 2, bifida.

1. *alliodora*, fol. oblongis ovatisque, flor. paniculatis. Flor. Per. p. 47. t. 181. In Peruvia, in nemoribus Potuzo et Muroa. Arbor exalta, cujus cortex, recenter evulsus, odorem foetidium spirat, deinde vero, uti et folia, allium redolet. Fol. saepissime a Formicis exiguis devorantur. l. c.

+++ *Asperifoliae fructu capsulari.*

373. ALDEA. *Cor.* campanulata. *Styl.* bifidus. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, 2-sperma, cal. 5-partito involuta. (Genitalia longe erecta.)

1. *pinnata*, fol. pinnatis, superioribus simplicibus. Flor. Per. 2. p. 8, t. 14. Hab. in Chile et Peruvia. Filam. hirsuta. Spicae recurvatae. Sequenti generi affinis.

374. PHACELIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* subcampanulata, 5-fida. *Stam.* exserta. *Caps.* 2-locul., 2-valvis, 4-sperma.

1. *bipinnatifida*, (simplex), erecta, fol. pinnatifidis: laciniis incisum-lobatis, spicis ut plurimum bifidis, corollae lobis margine simplicibus. Michaux, Flor. 1. p. 134, t. 16. Hab. in sylvis occidentilibus montium Alleghani.

2. *ambriata*, aemurgens, foliis pinnatifidis: laciniis integris, spica solitaria, cor. lobis ciliato-ambriatis. Michaux l. c. Pluck. t. 245. f. 6. Cresc. in Carolinae montibus aliis.

375. HYDROPHYLLUM. *Cor.* campanulata, interne striis 5 melliferis. *Stigm.* 2-fiduum. *Caps.* globosa, 2-valvis.

1. *magellanicum*, tomentoso-lanuginosum, fol. pinnatis. Lam. in Journ. d'hist. nat. n^o. 10. p. 373 t. 19. Valerianam refert. T.

2. *appendiculatum*, hirsutum, foliis radicalibus subpinnatifidis: caulinis sublobato-angulosis, calycis sinibus appendiculatis. Michaux Flor. 1. p. 134. Hab. in sylv. montanis Tenassée. *Cor.* caerulea.

3. *virginicum*, fol. pinnatifidis pinnatisque: laciniis ovali-lanceolatis incis. Lin. Lam. ill. t. 97. f. 1. Hab. in Carolinae et Virginiae sylvis montanis. T.

4. *canadense*, glabriusculum, fol. lobato-angulosis. Lin. Lam. l. c. t. 97. f. 2. In Canadae sylvis humidis. T.

376. ELLISIA. *Cor.* infundibuliformis angusta. *Bacca* sicca, 2-locularis, 2-valvis. *Sem.* 2 punctata: altero super alterum.

1. *Nyctelea*. Hab. in Virginia. Fol. pinnatifida.

377. NOLANA. *Cal.* 5-fidus: laciniis latis. *Cor.* campanulata. *Stigm.* capitatum subpentagonum. *Sem.* 5, recept. carnosus coalita, arillata?

1. *prostrata*, (gallinaea), caule prostrato, fol. ovato-oblongis, cal. laciniis triangulari-sagittatis. Fl. Per. 2. p. 6. L. sp. pl. ed. Willd. p. 794. Schumdel ic. t. 18. Hab. sponte in Peruviae maritimis arenosis. Cibus gallinis jucundus. ©

2. *coronata*, caule prostrato, calycis laciniis subcorollatis. *Cor.* fauce villosa. Flor. Per. l. c. t. 112. f. b. Hab. in Peruviae saxosis collibus. Faux villis pulchre coronata. Caul. pubescens. ©

3. *spathulata*, caule erecto, fol. cordato-triangularibus, calyc. laciniis spathulatis. Flor. Per. t. 113. f. a. Cum priore Cal. in fructu bipartitus. Fol. carnosae.

4. *inflata*, caule prostrato, fol. radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis, calyc. inflatis. Flor. Per. t. 112. f. a. In Gamae collibus arenosis.

5. *revoluta*, caule procumbente, foliis confertis linearibus utraque revolutis, cal. ventricosus. Flor. Per. 2. p. 8. t. 113. f. b. Cresc. in Peruviae arenis.

Obs. *Nolanae*, dicunt auctores laudati operis, plantae sunt succosae, inferne ramosissimae, unica specie excepta, prostratae, habitu solanaceae, fructu vero diversae, ejus nunculae epidermide succulenta obtectae, quadriloculares sunt: locul. 1-3 vero saepe abortientibus.

LYSIMACHIAE. Juss. (gen. 378-396.) *Cor.* regulares: limbo saepius 5-lobo. *Stam.* rarius plura aut pauciora quam 5. *Caps.* 1-locularis, polysperma: placentae centrali libera. Caulis herbaceus. Fol. opposita aut alternis.

378. ARETIA. *Cor.* hypocraterif. 5-fida: tubo ovato. *Stigm.* depresso-capitatum. *Caps.* 1-locularis, globosa, 5-valvis, subpentasperma.

1. *helvetica*, fol. imbricatis, floribus subsessilibus. L. Willd. sp. 2. p. 795. *Dianthus helveticus*. Sp. pl. 2. p. 203. *Aretia* fol. subhirsutis, ovatis, cauciculos tegentibus. Hall. helv. n^o. 617. t. 11. *Androsace* Dia-

penia. Vill. Delph. 2. p. 472. Hab. in alp. Helvetiae, Galliae, in petrosis aridis. $\overline{\text{T}}$

2. *alpina*, foliis linearibus patentibus, florib. pedunc. Lin. Jacq. aust. 5. t. 18. Androsace alpina. Lam. ill. t. 98. f. 3. A. fol. ovatis repandis, scapis unifloris. Hall. helv. n. 618. t. 11. Hab. in Valtellina et Delphinatu. $\overline{\text{T}}$

3. *Vitaliana*, fol. linearibus recurvatis, agr. subsessilibus: tubo elongato. Primula Vitaliana. Vill. Dauph. 2. p. 470. Habit. in alpinis Pyrenaeis, Helveticis, et Italicis. $\overline{\text{T}}$

Obs. Primulae flor. lutei, Aretiae folia pilis ramosis et caps. 5-valvis ei adsunt.

39. ANDROSACE. *Involucrum* umbellulæ. *Cor.* tubus ovatus: ore glanduloso. *Caps.* 1 - locularis, ovato-globosa, 5-fariam dehiscentis, polysperma.

1. *maxima*, fol. ovatis dentatis, perianthis fructuum maximis. Lin. Jacq. aust. t. 331. Willd. sp. p. 796. Lam. ill. t. 93. f. 1. Hab. inter Germaniae, Austriae, Helvetiae segetes. \odot

2. *elongata*, glabra, foliis lanceolatis dentatis, umbellae fructifera elongata, cor. calyce angulato brevioribus. Retz. obs. 2. p. 10. Jacq. aust. 4. t. 330. Folia cinerea. Hab. in Austria, Germania. \odot

3. *filiformis*, fol. ovatis dentatis petiolatis, umbellae radiis capillaribus, corollis calyce campanulato excedentibus. Retz. obs. 2. p. 10. Gmel. sib. 4. p. 81. t. 44. f. 4. Hab. in Sibiria. \odot

4. *septentrionalis*, fol. lanceolatis dentatis glabris lucidis, perianthis angulatis cor. brevioribus. Gmel. l. c. t. 43. f. 1. Flor. dan. t. 7. Roth. germ. II. 232. Vill. Delph. 2. p. 481. In alpinis Lapponiae, Russiae, Galliae, Germaniae. Vur. fol. subpinnatis in locis fertilibus. Vill. \odot

5. *odoratissima*, fol. triquetris lanceolatis ciliatis, umbellae radiis brevibus, perianthis angulatis corolla brevioribus. W. l. c. Schreber. Dec. 7. t. 4. Hab. in Capadociae alpinis. $\overline{\text{T}}$

6. *villosa*, fol. ovato-lanceolatis ciliatis, pedunc. brevissimis, cor. calyce majore. Hoppe. A. fol. pilosis, perianthis hirsutis. Lin. Jacq. Flor. aust. 4. t. 332. Ej. coll. 1. p. 193. Hab. in alpinis Rhaeticis, Pyrenaeis et Carniolicis. $\overline{\text{T}}$

7. *Chamaejasme*, hirta, fol. lanceolatis integerrimis, pedunc. brevissimis, corollis

calyce majoribus. Hoppe. v. Wulf. in Jacq. coll. 1. p. 194. In Carniolicis alpinis.

8. *lutea*, glabra, fol. linearibus integerrimis, ped. nec. longissimis, cor. calyce majoribus. Hoppe. Jacq. austr. 4. t. 333. A. pauciflora. Vill. Delph. 2. p. 477. Habit. in Austriae, Helvetiae et Galliae alpinis.

9. *obtusifolia*, foliis lanceolatis basi angustatis glabris, perianthis angulatis pubescentibus. W. Allion. pedem. n. 326. t. 46. f. 1. Aretia foliis ellipticis lanceolatis glabris, scapis umbellatis. Hall. ϕ ? *brevifolia*, fol. petiolatis lanceolatis hispidis, pedunc. involuero quadruplo longioribus. Vill. Delph. 2. p. 480. t. 13. Hab. in Helvetiae, Italiae, Galliae, Styriae alpinis. Planta Villarii est sola varietas. \odot

10. *carnea*, fol. subulatis glabris, umbellae involucra aequante. Lin. Pluck. alm. 332. t. 108. f. 5. ϕ . Aretia Halleri, fol. ciliatis. Lin. sp. pl. t. p. 142. Hab. in alpinis Pyrenaeis, Helveticis. $\overline{\text{T}}$

11 ? *spathulata*, fol. esesphosis spathulatis, flor. corymbosum-racemosis. Cav. ic. 6. p. 56. t. 484. f. 1. Habit. in America meridionalis humidis.

Obs. Cor. carneo-rubens, absque glandulis in fauce, nec involucrum infra flores adest secundum auctorem, qui cum Villarsio et Lamarkio Androsacen et Aretiam in unum cojungit genus.

380. PRIMULA. *Involucr.* umbellulæ. *Cor.* tubus cylindricus: ore patulo; limbo emarginato. *Stigm.* globosum. *Caps.* 1 - locularis: ore 10-fido.

1. *verticillata*, foliis serratis glabris: floribus verticillatis. Vahl. symb. 1. p. 15. t. 5. Hab. in monte Kurma ad rivulos. $\overline{\text{T}}$

2. *veris*, (*officinalis*), foliis rugosis dentatis, limbo corollarum concavo, tubi collo oblongo. Flor. dan. t. 433. Bull. t. 271. Engl. bot. t. 5. Habit. in fruticetis argillosis. Corolla odorata. Cal. inflatus.

3. *elatior*, fol. rugosis dentatis hirsutis, limbo corollae plano, tubi collo hemisphaerico, floribus interioribus nutantibus. Jacq. misc. 1. p. 158. Fl. dan. t. 434. Engl. bot. t. 513. Hab. in sylvis. Fl. pallide lutei.

4. *acutula*, fol. rugosis dentatis, subtus hirsutis, scapis unifloris. Jacq. misc. 1. p. 158. Fl. dan. t. 434. Curt. Fl. lond. ic. P. vulgaris. Smith. brit. t. p. 222. Primula sylvestris. Scop. P. grandiflora. Lam. Cresc. in nemoribus, sepibus.

5. *farinosa*, fol. rugosis crenatis-gla-

bris, subtus farinosis, umbella erecta. Jacq. misc. 1. p. 159. Flor. dan. t. 125. Curt. Lond. ic. Hab. in alpinis et in pratis uliginosis Germaniae, Sueciae, Gallicae. $\overline{\text{T}}$

6. *Cortusoides*, fol. rugosis lobatis, scapo multifloro. Andrew. t. 7. Gmel. sib. 4 p. 85. t. 45. f. 1. Habit. in Sibiria. Corolla rubra. Folia Cortusae. $\overline{\text{T}}$

7. *villosa*, fol. serrulatis hirsutis, Jacq. l. c. 1. p. 159. Ej. Flor. Aust. 5. app. t. 27. Curt. mag. t. 14. P. foliis subhirsutis dentatis, scapo paucifloro. Hall. hist. n. 613. β . pubescens, foliis planis serrulatis subvillosis. Jacq. misc. 1. p. 157. t. 18. f. 2. Hab. in alpinis Carinthiae, Helvetiae. $\overline{\text{T}}$

8. *nivalis*, foliis lanceolatis planis argute dentatis glaberrimis. Willd. sp. p. 803. Poll. it. 3. app. n. 81. t. 9. f. 2. Hab. in alpinis Davuriae ad scaturigines frigidissimas. $\overline{\text{T}}$

9. *longiflora*, fol. serratis glabris, subtus farinosis, umbella nutante, corolla longissimo. Jacq. Fl. aust. 5. app. t. 46. Allion. pedem. t. 39. f. 3. Habit. in alpinis. $\overline{\text{T}}$

10. *glutinosa*, fol. serrulatis glabris glutinosi, involucri foliolis maximis. Jacq. Fl. aust. 5. app. t. 26. Puck. phyt. t. 149. f. 6. Hab. in summis alpinis. Olor Oreliidis conopsea. $\overline{\text{T}}$

11. *marginata*, foliis obovatis serrato-dentatis albo marginatis, scapo multifloro, involucri foliolis pedunculis breviorib. Curt. mag. 191. Hab. in alpinis Helvetiae. $\overline{\text{T}}$

12. *Auricula*, foliis serratis carnosius obovatis, scapo multifloro, calycibus subfarinosi. Jacq. aust. t. 405. Hab. in alpinis. Color genuinus luteus, qui cultura tam varius et pulcher factus est.

* *lutea*, foliis spatulato-subrotundis integerrimis, tubo floris calyce angustiore. Villars 2 p. 469. cal. brevi subfarinaceo. Lam. ill. p. 429. Hab. in Galliae et Helvetiae alpinis.

13. *longifolia*, foliis oblongo-obovatis denticulatis, involucri foliolis basi auriculatis. Curt. mag. t. 39. P. auriculata. Lam. ill. p. 429. Ventenat hort. Cels p. 42. t. 40. Hab. in Oriente. Scapus apice farinosus. Lam. Corolla iatus citrina. V.

14. *gigantea*, fol. serratis glabris rhombico-ovatis, scapo paucifloro altissimo. Jacq. misc. 1. p. 160. Gmel. sib. 4 p. 84. Hab. in Sibiria. $\overline{\text{T}}$

15. *minima*, foliis glaberrimis nitidis

cuneiformibus argute serratis, scapo paucifloro. Jacq. l. c. Flor. aust. t. 273. Hab. in alpinis. Corolla carnea. $\overline{\text{T}}$

16. *integrifolia*, fol. integerrimis ellipticis, ad oras subrenato-cartilagineis, umbella erecta, calycibus longe tubulosis obtusissimis. Jacq. Flor. aust. t. 327. Habit. in alpinis Pyrenaeis, Helveticis, Austriacis, Styriacis, Carniolicis. $\overline{\text{T}}$

17. *carniolica*, fol. integerrimis ellipticis, umbella erecta, calycibus acutis brevissimis. Jacq. l. c. Fl. aust. 1. app. t. 4. In Carniola. Folia mar. ine non cartilaginea. Calyces abbreviati. Willd. $\overline{\text{T}}$

18. *norvegica*, foliis integerrimis ovatis glebris petiolatis, floribus infundibuliformibus, calycibus tubulosis obtusis. Retz. scand. n. 249. Flor. dan. t. 188. P. Smaragdica. Jacq. Willd. p. 806. Hab. in alpinis Norvegiae. $\overline{\text{T}}$

19. *viscosa*, fol. ovatis integerrimis villosis-viscosis, umbella erecta, cor. hypocrateriformibus. Willd. l. c. Allion. pedem. n. 338. t. 5. f. 1. Hab. in alpinis Pedemontanis. $\overline{\text{T}}$

20. *sibirica*, foliis integerrimis ovatis longe petiolatis, umbella pauciflora nutante, cor. hypocrateriformi. Jacq. misc. 1. p. 161. Gmel. sib. 4 p. 81. t. 46. f. 1. Hab. in pratis humilibus Sibiriae. $\overline{\text{T}}$

381. *CURTUSA*. Cor. rotata, tubo subnullo, fauce annulo elevato, lacin. ovatis acutis. Caps. 1-locularis, ovalis, apice 5-valvis.

1. *Mathioli*, calycibus corolla brevioribus. L. Jacq. ic. t. 32. Andrew t. 1. In alpinis Austriae, Sibiriae, Sillesiae. $\overline{\text{T}}$

2. *Gmelini*, calycibus corollam excedentibus. Lin. Amoen. 2. p. 340. Gmel. sib. 4. p. 79. t. 45. f. 1. Lam. ill. t. 99. f. 2. Hab. in Sibiria. $\overline{\text{T}}$

382. *SOLDANELLA*. Cor. campanulata, lacero-multifida. Caps. 1-locularis, apice multidentata.

1. *alpina*. Jacq. aust. t. 13. Curt. mag. t. 49. S. foliis reniformibus sublobatis. Sch. bohem. t. 2. n. 147. β . Clusii, fol. reniformibus integerrimis. Schmidt. bohem. t. 2. 148. Hab. in alpinis. $\overline{\text{T}}$

383. *DODECATHEON*. Cor. rotata, reflexa. Stam. tubo insidentia. Caps. 1-locularis, oblonga.

1. *Meadia*, foliis oblongo-ovalibus den-

-fatto-repandis, umbellis multifloris laxis, bracteis ovalibus. Michaux Flor. 1. p. 123. Trew Ehret. t. 12. Meadia. Catesb. car. 3. t. 2. Hab. in Virginia. $\bar{\tau}$

2. *integrifolium*, fol. subpathulatis integerrimis, umbellis paucifloris strictis, bracteis linearibus. Michaux, l. c. Pluck. alm. t. 79. f. 6 In montibus Alleghanis juxta rivulos sylvaticos.

384. CYCLAMEN. Cor. rotata, reflexa, tubo brevissimo: funce prominente. Bacca tecta capsula.

1. *coul*, fol. orbiculatis cordatis integerrimis. Aiton. Kew. 1. p. 195. Curt. mag. t. 4. Hab. in Europa australi. $\bar{\tau}$

2. *europaeum*, fol. orbiculatis cordatis crenatis. Ait. p. 196. Jacq. aust. 5. p. 1. t. 401. Engl. bot. t. 217. Hab. in Sileciae, Bohemiae, Austriae, Barbariae sylvis umbrosis montosis. Rad. tuberosa magna. Scapi, germine impraegnato, spiraliciter contorquentur fructumque in terra recondunt. Smith.

3. *persicum*, foliis oblongo-ovatis cordatis crenatis. Aiton. l. c. Curt. mag. t. 44. In insula Cypro. $\bar{\tau}$

4. *hederaefolium*, foliis cordatis angulatis denticulatis. Aiton. l. c. Lob. ic. 605. Swert. florileg. t. 59. Hab. in Italia. $\bar{\tau}$

5. *indicum*, corollae limbo nutante. In Zeylona. $\bar{\tau}$

385. MENYANTHES. Cor. hirsuta. Stigma 2-fidum. Caps. 1-locularis, (in Plaut. emersis 2-valvis: valvul. medio placentiferis; in natantibus ruptilis. Michaux.)

1. *nymphoides*, foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. L. Flor. dan. t. 319. Waldschmidtia nymphoides. Corolla 5-fida. Glandul. ad basin germinis. Peps 1-locularis. Semina ciliata. Hayne in Scler. bot. Journ. 1800. p. 14. Hab. in Europae australioris aquis stagnantibus, fossis marjoribus. $\bar{\tau}$

2. *trachysperma*, cor. glabra, laciniis integris, stylo subnullo, seminibus vesiculosis strobis. Michaux, p. 126. Villarsia aquatica. Gmel. S. N. Lin. 3. p. 447. Vent. Choix des Plant. p. 9. Hab. in America boreali. An distinctum genus?

3. *ovata*, fol. ovatis petiolatis, caule paniculato. Lin. suppl. Nouttuyn t. 47 f. 1. Vent. l. c. t. 9. Hab. in aquis Cap. b. spei. $\bar{\tau}$

4. *indica*, fol. cordatis subcrenatis, petiolis floriteris, corollis interne pilosis. L. Sloan. Cat. 121. hist. t. 252. Rumph. 6. t. 79. f. 3. Hab. in Malabaricae, Zeylonae, Cap. l. spei, Jamaicae fossis. $\bar{\tau}$

5. *trifoliata*, corollis superne dense barbatis, foliis ternatis. Flor. dan. t. 511. Curt. Lond. ic. Engl. bot. t. 405. p. minor. Mich. Flor. 1. p. 125. Hab. in Europae et Americ. aquis et palustribus. Fl. Hyacinthoides. $\bar{\tau}$

386. HOTTONIA. Cor. hypocrateriformis. Stamina tubo corollae imposita. Stigm. globosum. Caps. 1-locularis.

1. *palustris*, flor. verticillatis pedunculatis. Willd. Sp. 812. Flor. dan. t. 487. Hab. in fossis. $\bar{\tau}$

2. *sessiliflora*, flor. verticillatis sessilibus. Vahl. symbol. 2. p. 36. Hab. in India.

3. *indica*, edunculis axillaribus solitariis, fol. multifidis Pet. gaz. Erica africana equivel. folio. Seb. mus. 2. t. 37. f. 5. Burm. zeyl. t. 55. f. 1. Rheed. 12. t. 36. Hab. in India.

4. *serrata*, pedunc. axillaribus solitariis, foliis lanceolatis tenuissime serratis. Willd. sp. 814. Hab. in India. Caulis subramosus. V.

387. CORIS. Cal. ventricosus: dentibus subspinosus. Cor. 1-petala, irregularis. Caps. 5-valvis, calyce cincta. Sem. plurima.

1. *mo-speliensis*, Linn. Willd. 2. p. 1000. Vill. 2. p. 461. Lam. ill. t. 202. Hab. in Europae australis maritimis. Cor. purpurea. Fol. (superiora) spinulosa. Var. foliis omnibus denticulato-spinosis, vid. Lam. ill. t. 202. An species distincta?

388. SAMOLUS. Cor. hypocrateriformis, 5-fida squamis interstincta. Sam. tubo inserta. Caps. seminifera, 1-locularis, 5-dentata, polysperma.

1. *Valerandi*, caule erecto, fol. obtusis, racemo multifloro. Smith. brit. t. p. 259. Flor. dan. t. 198. Curt. Lond. ic. Hab. in paludosis, maritimis, locis saliosis per omnem terrarum orbem. $\bar{\tau}$

2. *repens*, parvula repens. Sheffieldia repens. Lin. suppl. p. 135. Forst. gen. p. 18. t. 9. Willd. sp. p. 831. Hab. in N. Zealand. et insula Paschalis. Pepl. Portulacae similis. $\bar{\tau}$

389. *LYSIMACHIA*. *Cor.* rotata. *Caps.* globosa, mucronata, 10-valvis. (Filam. in quibusdam basi connata.)

* *Pedunculis racemosis.*

1. *vulgaris*, foliis ternis ovatis lanceolatis, racemis terminalibus. Flor. dan. t. 684. Curt. Lond. ic. Willd. sp. 1. p. 816. Hab. ad ripas et paludes. Var. fol. 4. $\frac{1}{2}$

2. *decurrens*, racemis simplicibus terminalibus, corollae segmentis obtusis, staminibus corolla longioribus Forst. prod. n.º 65. Hab. in insula Tanna.

3. *Ephemerum*, racemis terminalibus, petalis obovatis patulis, fol. linearilanceolatis sessilibus. Ait. Kew. 1. p. 168. Murr. Comment. geot. 1782. p. 9. t. 2. Till. pis. 106. t. 42. f. 2. Hab. in Media, Sibiria. Differta a sequente foliis subtus fusco-punctatis. ☉

4. *atropurpurea*, spicis terminalibus, petalis lanceolatis, staminibus corolla longioribus. L. Comm. rar. 33. t. 33. Hab. in Oriente. ☉

5. *dubia*, racemis terminalibus, petalis connatis, stam. corolla brevioribus, fol. lanceolatis petiolatis. Ait. Kew. 1. p. 159. *Lysimachia atropurpurea*. Murr. l. c. p. 6. t. 1. Buxb. cent. 1. t. 33. Cum priore. ☉

6. *angustifolia*, glaberrima ramulosa, fol. oppositis verticillatisque longo-linearibus, punctatis, racemo terminali brevi, petalis oblongis. Michaux Flor. 1. p. 128. L. stricta. Ait. Willd. sp. 2. p. 818? Hab. in Carolina inferiore?

7. *racemosa*, glaberrima elata, foliis ovali-lanceolatis oppositis punctatis, racemo terminali longissimo laxo, petalis oblongo-ovalibus. Michaux, Lam. ill. p. 1. Pluck. Amalth. t. 428. f. 4? Hab. in New-York. Cor. uni in priore flava. $\frac{1}{2}$

8. *thyrsiflora*, racemis lateralibus pedunculatis. L. Flor. dan. t. 517. Naumburgia guttata. Moench. meth. suppl. p. 23. ob stam. libera. Hab. in Eur. borealis paludibus, inque albis australioribus, et America? cfr. Michaux, Flor. p. 127. $\frac{1}{2}$

* *Pedunculis unifloris.*

9. *quadrifolia*, foliis quaternis petiolo ciliatis, pedunc. quaternis unifloris. L. Pet. Gaz. 5. t. 2. f. 5. $\frac{1}{2}$? *hirsuta*, caule hirsuto, foliis subsessilibus 3-4-nis oppositisque ovalibus punctatis, pedunc. 4-nis, petalis integris. Michaux, Flor. 1. p. 127. Hab. in Canada. $\frac{1}{2}$ in Carolina.

10. *ciliata*, foliis petiolatis subcordato-ovalibus margine subpul. crenatis, petiolo ciliato, flor. cernuis, pedicel. subgeminis, petalis rotundatis crenulatis. Michaux, Flor. 1. p. 126. Willd. sp. 2. 819. Wach. hort. t. 12. Hab. in New-York et Connecticut.

11. *hybrida*, glabra, fol. oppositis longe petiolatis lanceolatis, petiolo ciliato, flor. cernuis, petalis crenulatis. Michaux p. 127. L. *angustifolia*, foliis linearilanceolatis basi ciliatis, pedunc. filiformibus 1-floris, cor. dentatis. Willd. in N. Act. Soc. Berol. v. 3? Hab. in Carolina, Pennsylvania.

12. *heterophylla*, gracilis, foliis oppositis, imis suborbiculatis breviter petiolatis, superioribus linearibus sessilibus basi subciliatis, flor. cernuis. Michaux l. c. Hab. in Georgia.

13. *punctata*, fol. subquaternis subsessilibus, pedunc. verticillatis unifloris. Linn. Jacq. aust. t. 366. Hab. in Holland. inter arundines, et in Helvetia, Sibiria, Carniolia. Petala maculis fulvis punctata. $\frac{1}{2}$

14? *Linum stellatum*, calyc. corollam superantibus, caule erecto ramulosis. L. Magn. Monsp. 161. t. 162. Hab. in Galliae et Italiae collibus Parva, 2-3-pollicaris. Cor. 5-fida. Fructus 5-valvis.

15. *nemorum*, fol. ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. Linn. Flor. dan. t. 174. *Anagallis lutea nemorum*. Bauh. Hab. in nemoribus roridis. *Anagallidem* refert: fol. subtus quoque punctata, sed caps. differt.

16. *japonica*, fol. subcordatis, floribus axillaribus subbinis, pedunc. folio brevioribus. Thunb. jap. p. 83. Hab. in Japonia. ☉

17. *Nummularia*, fol. subcordatis, floribus solitariis, caule repente. Linn. Flor. dan. t. 493. Hab. in pascuis humidis et in umbrosis. $\frac{1}{2}$

390. *UBINIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* hypocraterif. : limbo plano 5-partito aequali. *Filam.* medio tubi adnata. *Stigm.* obtusum. *Caps.* 1-locularis, polysperma, mucronata.

1. *spathulata*. Vent. Hort. Cels. p. 95. t. 96. *Lysimachia mauritiana*. Lam. Willd. p. 820. Hab. in insula Mauritiae. Habitu Conv. tricoloris. Folia alterna, Caps. non sponte dehiscit, sed compressione 2-4-valvis. Vent. 5-valvis. Lam. $\frac{1}{2}$

391. *ANAGALLIS*. *Cor.* rotata.
Filam. hirsuta. *Caps.* circum-
scissa.

1. *arvensis*, caule diffuso nudo, petalis integris planis margine pilis capitis. A. arvensis. L. Willd. sp. 2. p. 821. A. mas. Vill. Dauph. 2. p. 361. Blackw. t. 43. Engl. bot. t. 529. In arvis.

2. *caerulea*, caule erectiusculo subalato, petalis dentatis demum reflexis. A. caerulea. Schreb. A. femina. Vill. Cresc. cum antecedente, sed minus frequens. Praeter color. caeruleum floris, caulibus super minus ramosus est. Floris sursum angustiora, subtus magis punctata.

3. *ovalis*, caule erecto, foliis ovalibus cum brevi acumine, floribus subsessilibus. Flor. Per. 2. p. 8. t. 115. f. a. Hab. in Peruviae collibus arenosis. Pusilla. Flores axillares. ☉

4. *alternifolia*, fol. oblongo-oratis alternis, flor. axillaribus longe pedunculatis. Cav. ic. 6. p. 3. t. 505. f. a. Hab. in humidis Consep. Chili. Fol. glauco-viridia venosa. In Gonorrhoea a Chilenibus adhibetur. C.

5. *pumila*, caule erecto, fol. subrotundis acutis sessilibus. Swartz. ind. occid. 1. p. 345. Hab. in Jamaicae montibus aliis, locis paludosis. ☉

6. *Monelli*, fol. lanceolatis, caule erecto, herbaceo. Schousb. Mar. p. 78. 37A. verticillata erecta, fol. caulibus verticillatis, axillis foliorum in caule et ramis florigeris. Alion. ped. m. 318. t. 65. f. 4. Hab. in Italia et Barbaria. Flor. coerul. ☉

7. *collina*, fol. lanceolatis, caule diffuso basi lignoso (truncoso). Schousb. l. c. Hab. in Barbaria. Cor. phoenicea.

8. *orientalis*, caule basi lignoso, flor. rubris. Similis arvensi, sed major et perennis. Ad eandem ac *collina*? collitur apud Celts.

9. *latifolia*, fol. cordatis amplexicaulis, caule compresso. Lin. in Hispania. Cor. caerulea. Caulis erecto-patens, brachiatum, quadrangulare: angulis oppositis, triplo latioribus. L.

10. *linifolia*, fol. linearibus, caule erecto. L. Hab. in Lusitania, Hispania.

11. *tenella*, fol. subrotundis acutiusculis, caule repente. Linn. Curt. Lond. ic. Engl. bot. t. 530. Irasc. alpina. F. W. Schmidt. Obs. bot. in Usteri anal. bot. 2. p. 124. Hab. in Galliae, Angliae, Germaniae, Italiae ericetis humidis. ☉

12. *crassifolia*, caule repente stolonij-

fero, foliis subrotundis, pedunc. axillaribus. 1-floris. Thore chloris du Département des Landes. p. 62. Hab. prope Dax in uliginosis, turfosis. Cor. alba. Filam. hispida basi coacta. Lysimachitis affinis.

392. *DORÆNA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala, 5-fida. *Stigma* emarginatum. *Caps.* supera, 1-locularis, 1-valvis, polysperma.

1. *japonica*. Thunb. jap. p. 84. Hab. in Japonia. Fol. oblonga, alterna. Flor. racemosi. h

393. *BACOPA*. *Cal.* 5-partitus inequalis. *Cor.* rotata: tubo staminifero. *Stigma* capitatum. *Caps.* 1-locularis, polysperma.

1. *aquatica*. Aubl. Guian. p. 120. t. 49. Lam. ill. p. 445. t. 102. Willd. Sp. 2. p. 84. Hab. in Cayenna. Fol. opposita lanceolata. Pedunc. axillares.

394. *BASSOVIA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* rotata. *Bacca* ovata, nodulosa. *Sem.* marginata, nidulenta.

1. *sylvatica*. Aubl. 1. p. 217. t. 85. Lam. ill. t. 102. Willd. 2. p. 1067. In sylvis Gujanae humidis. Folia alterna pedunculis axillares. ☉

395. *SPHENCLEA*. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-fida, cal. minor. *Caps.* compressa, 2-locularis, circumscissa; *Sem.* numerosa, subteretia.

1. *scylanica*. Gaertn. de fruct. et sem. 1. p. 113. t. 24. f. 5. Willd. sp. p. 927. Pongatium indicum. Lam. ill. p. 44. Gaertnera. Retz. Alceide. 11. t. 24. Habit. in Indiae humidis. ☉

† *Genera ericoidea s. bicornia, pentandra* (gen. 348-404.)

396. *POIRETIA*. *Cal.* 5-partitus, imbricatus persistens. *Cor.* 5-petala. *Stam.* receptaculo inserta. *Anth.* connatae. *Caps.* 5-locul., 5-valvis, dissepimentis e medio valvularum.

1. *cucullata*. Cav. ic. 4. n. 378. t. 343. Sprengelia incarnata. Smith. Act. holm. 1794. p. 260. t. 8. W. sp. 2. p. 833. Andrew. t. 2. Hab. in Nova Hollandia. Frutex bipedalis, rigidus.

397. *EPACRIS*. *Cal.* duplex: exterior imbricatus. *Stigma* capi-

tatum. *Germ.* cinctum squamulis 5. *Caps.* 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, polysperma. *Cav.*

1. *longiflora*, foliis cordato-ovatis rigidis apice subsynovo, flor. tubulosis elongatis. *Cav.* ic. 4. p. 25. t. 344. Corolla punicea.

Obs. Omnes hujus generis species in Australasia, seu Nova Hollandia aut Zeelandia praesertim prope oppidum Jackson laetae sunt, etiam omnes frutices sunt.

2. *pulchella*, fol. imbricatis cor latis, acumine rigido, flor. axillaribus tubulosis anulatis. *Cav.* l. c. p. 26. t. 345. Cor. rufescent.

3. *pungens*, fol. ovatis imbricatis rigidis, acumine spinaeformi, cal. exteriore conico. *Cav.* t. 346. Cor. tubus rubescens: limbo albo.

4. *spuria*, fol. ovato-mucronatis: limbo revolutis, flor. axillaribus subternis. *Cav.* a. p. 27. t. 347. f. 1. An diversa a sequente?

5. *grandiflora*, fruticosa, foliis ovatis acuminatis mucronatis recurvatis, floribus axillaribus. Willd. sp. p. 834. Hab. in Nova Hollandia. h

6. *pumila*, herbacea? fol. ovato-oblongis imbricatis: florib. sessilibus sub-olinaris terminalibus. Forst. l. c. Lin. suppl. 138. Hab. in Nova Zeelandia. T

7. *longifolia*, arborea, fol. linearilanceolatis basi vaginantibus, racemis erectis articulatis lateralibus. Forst. prod. n. 68. Lin. suppl. p. 138. Hab. in N. Zeelandia. h

8. *rosmarinifolia*, fruticosa, fol. linearibus obtusis rigidis vaginantibus: flor. solitariis lateralibus. Forst. Hab. in N. Zeelandia. h

9. *villosa*, foliis linearibus imbricatis, ramis villosis, flor. axillaribus. *Cav.* t. 347. f. 2. Cor. lacin. intus tomentosa.

398. *STYPHELIA*. *Cal.* imbricatus. *Cor.* tubulosa, 5-fida: laciniis saepe revolutis hirsutis aut glabris. *Nect.* membranaceum, lacinum, germeum cingens. *Stigma* capitato-5-fidum. *Siam.* laevis. *Drupa* 5-locularis: locul. 2-spermis.

1. *tubiflora*, corol. clavata longissima: limbo revolutis hirsuto, florib. axillaribus solitariis, fol. obovato-linearibus. Smith. Nova Holl. p. 45. t. 14. Willd. sp. 2. p. 835. Crescunt omnes species in Nova Hollandia seu Australasia et h sunt.

2. *triflora*, foliis imbricatis ovatis mucronatis glaucis, flor. axillaribus ternis. Andrew. Repos. t. 72. Cor. longissima, rubescens, apice flava.

3. *ericoides*, cor. limbo patente hirsutissimo racemis axillaribus brevissimis erectis, fol. lanceolato-ellipticis revolutis. Smith. l. c. p. 48.

4. *strigosa*, corollae limbo patente imberbi: fauce pilosa, racemis axillaribus brevissimis erectis, fol. subulatis. Smith.

5. *scoparia*, cor. limbo concaviusculo imberbi, racemis axillaribus brevissimis recurvis, fol. linearilanceolatis. Smith.

6. *daphnoides*, corollae limbo patente subpubescenti, florib. axill. rufis solitariis, foliis ellipticis concaviusculis. Smith. l. c.

7. *Gnidium*, cor. limbo reflexo hirsuto, spicis terminalibus solitariis ovatis, foliis linearilanceolatis sparsis. Hort. Malmanson. p. 23. t. 23.

8. *lanceolata*, cor. limbo revolutis hirsuto, racemis aggregatis terminalibus, foliis linearilanceolatis. Smith. *Ardisia acerosa* Gaert. sem. 2. p. 78. t. 94? *Epacris juniperina*. Lin. suppl. p. 138.

9. *elliptica*, cor. limbo patente imberbi, racemis aggregatis subterminalibus, fol. lanceolato-ellipticis. Smith.

10. *juniperina*, arborea, foliis sparsis linearibus cuspidatis serrulatis, flor. sessilibus solitariis terminalibus. Forst. prod. n. 71. sub genere *Epacris*.

* *procumbens*, caule procumbente, fol. linearilanceolatis imbricatis ciliatis, flor. axillaribus solitariis. Ventenata procumbens. *Cav.* ic. 4. p. 28. t. 349. f. 1. Fol. nervis parallelis.

* *humifusa*, fol. linearibus sparsis numerosis, floribus axillaribus. *Cav.* l. c. t. 348. Caulis ramosissimus.

Obs. Forsitan duae hae species ab enumeratis non diversae, quare stellulas apposui. Huc genus ab *Epacris* fructu tantum differt.

399. *PEROA*. *Cal.* duplex: exterior triphyllus. *Cor.* hypocrateriformis: lacin. acutis tomentosis. *Germ.* ovatum nudum. *Stigm.* simplex. *Cape.* ovata, 1-locularis, 1-sperma. *Sem.* oblongum.

1. *microphylla*, caule fruticoso, foliis ovatis imbricatis, flor. terminalibus. *Pero-*

jos. Cav. ic. 4. p. 29. t. 349 f. 2. Copiote inter Jackson et Botany-Bay. Differt ab Epacri stigmi, simplice, squamularum circa germen defectu et fructu 1-spermo. G.

400. PYXIDANTHRA. *Cal.* 5-partitus: lucinis incumbentibus paleaceo-membranaceis. *Cor.* campanulata, 5-partita. *Filam.* lamellata. *Anth.* loculis subglobosis circumscissis. *Styl.* crassus. *Stigm.* 3. *Caps.* ..

1. *barbulata*, fol. cuneato-lanceolatis acutis basi interna barbulatis. Michaux, Fl. 1. p. 152. Hab. in Carolina superiore. Pusilla repens, Azaleae procumbentis habitus. ¶

401. BÆOBOTRYS. *Cor.* tubulosa, 5-fida. *Cal.* duplex, superus; exterior 2-phyllus; inferior campanulatus, 5-dentatus. *Bacca* 1-locularis, polysperma. (*Cal.* squamula duplici infra persistente cinctus. Juss.)

1. *nemoralis*, fol. ovato-dentatis. Vahl. symb. 1. p. 19. Willd. sp. p. 992. Maesa. Forsk. Juss. Hab. in insula Tanna. ¶

2. *lanceolata*, foliis lanceolatis serratis. Vahl. l. c. t. 6. Maesa Forsk. Juss. gen. p. 180. In montibus Arabiae felicia. Racemi supradecompositi, axillares. ¶

402. ARGOPHYLLUM. *Cal.* 5-fidus, semisuperus. *Cor.* 5-partita. *Nec.* s. tubus interior, 5-gonius, pyramidatus truncatus. *Caps.* seminifera, 3-locularis, 3-fariam dehiscens; polysperma.

1. *nitidum*. Lin. suppl. p. 22. Lam. ill. 2. p. 1. t. 111. Hab. in Nova Caledonia. Frutex sericeus. Flores paniculati.

403. BROSSÆA. *Cal.* carnosus superus. *Cor.* conica truncata. *Caps.* 5-sulca, 5-locularis, tecta calyce persistente, 5-fissuris per-
via. J.

1. *coccinea*. Lin. Plum. gen. 7. ic. 64. f. 2. Hab. in America calidior. Frut. multicaulis. Flores solitarii.

404. CYRILLA. *Cal.* minutus sub-
turbinateus, 5-partitus, superus. *Petala* 5, stellatim patentia (ri-

gidula). *Styl.* 2-fidus. *Bacca* (*Caps.* l.) exsiccabilis, 2-locularis. *Sem.* solitaria funiculo appensa. M.

1. *caroliniana*, foliis lanceolato-cuneatis acutis membranaceis nervosis. Michaux Flor. 1. p. 158. C. racemiflora. Linn. Itca cyrilla L'Herit. Stirp. t. 66. Jacq. ic. rar. t. 47. Hab. in Carolina. Petala pedicello longiora. M. ¶

2. *antillana*, foliis cuneato-oblongis obtusis coriaceis subus enerviis. Michaux; l. c. In ins. Antil. Spicae crassiores. ¶

405. ITEA. *Cal.* 5-fidus campanulatus. *Petala* 4, linearia reflexo-patentia, cal. inserta. *Stigma* capitatum, bilobum. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis: valvis margine introflexo seminiferis. M.

1. *virginica*, foliis serratis, speciebus pubescentibus. Michaux Flor. 1. p. 157. Hab. in Virginia.

Obs. Etiam ordine naturali, qui *saxifragaceae*, a priore genere, quocum ab aliquibus conjuncta, differt. Richard apud Michaux. l. c.

406. PLUMBAGO. *Cal.* oblongus glanduloso-scaber. *Cor.* infundibulif. *Stam.* squamis basin cor. claudentibus inserta. *Stigma* 5-fidum. *Sem.* 1, oblongum, tuni-
catum.

1. *europaea*, foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris (rigidis), caule stricto. Willd. sp. 2. p. 837. Habitat in Europa australi et in Peruvia. Pl. tinctoria videtur. ¶

2. *lappathifolia*, foliis amplexicaulibus lanceolatis laevibus, caule divaricato. Willd. Hab. in Iberia. Similis praecedenti. ¶

3. *capensis*, foliis petiolatis oblongis integris subtus glaucis, caule erecto. Th. pro-l. 33. Hab. ad Cap. l. spec. ¶

4. *zeylanica*, foliis petiolatis ovatis glabris, caule filiformi. Lin. Rheed. 10. t. 8. Hab. in India. ¶

5. *rosea*, fol. petiolatis ovatis glabris sublenticulatis, caule geniculis gibbosis. Linn. Rumph. 5. t. 168. Hab. in India. ¶

6. *scandens*, foliis petiolatis ovatis glabris, caule flexuoso scandente. Lin. Sloan. 1. p. 211. t. 133: f. 2. Hab. in America calidior. ¶

7. *auriculata*, fol. ovato-oblongis petiolatis sulcis squamoso-punctulatis, petioliis auriculatis caulem amplexantibus. Lam. enc. 2. p. 367. Hab. in India. h

407. WEIGELIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* infundibuliformis. *Styl.* e basi germinis. *Stigma* peltatum. *Sem.* 1.

1. *japonica*, fol. sessilibus ovato-lanceolatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. 2. p. 141. Ej. Flor. jap. t. 16. Willd. sp. p. 836. Hab. in Japonia. h

2. *caracensis*, fol. petiolatis obovatis. Thunb. l. c. Kacupf. ic. select. t. 45. Cum priore. h

408. ABRONIA. *Cal.* 6. *Cor.* infera, hypocrateriformis, supra germen coarctata. *Sem.* 1, 5-angulare, cor. basi indurata tectum.

1. *umbellata*. Lam. ill. p. 469. t. 105. Tricatus admirabilis. L'Herit. Willd. sp. 2. p. 807. Hab. in Californiae maritimis. Fl. capitato-umbellati.

409. MIRABILIS. *Cor.* infundibuliformis, inferae coarctata, supera. *Cal.* inferus. *Nectarium* globosum, germen includens. *Stigma* globosum. *Nux* infra corollam, striata.

1. *dichotoma*, flor. sessilibus axillarib. erectis solitariis. Lin. Willd. sp. 2. p. 699. Admirabilis. Clus. hist. 2. p. 50. Habit. in Mexico. T

2. *Jalapa*, flor. congestis cylindricis, fol. glabris. Willd. Batsch. anal. plant. 2. p. 34. Hab. in India utraque. Flor. flavi, rubri, albi, vespera explicantur.

3. *longiflora*, flor. congestis longissimis subnatis terminalibus, foliis subvillosis. Lin. Act. holm. 1755. p. 176. t. 6. f. 1. Habit. in Mexico frigidis montibus. T

410. FABIANA. *Cor.* infundibuliformis, limbo plicato revoluto; *Tubus* longissimus. *Stam.* inaequalia. *Stigma* emarginatum. *Caps.* bilocularis, 2-valvis.

1. *imbricata*, fol. imbricatis ovatis minimis. Flor. Per. 2. p. 12 t. 122. Habit. in Regni Chilensis campis et ripis arcuosis. Resinosa, Tamaricici habitu. h

411. NIEREMBERGIA. *Cor.* subhypocrateriformis: tubo longissimo; fauce coarctata plicata. *Stam.* inaequalia, superne adpressa. *Stigma* bilobum. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis.

1. *repens*. Flor. Per. 2. p. 123. f. 1. Habit. in Regni Chilensis campis apricis et pascuis arenosis Conceptionis. Herbacea, polalis. Convolvulacea?

412. XUAREZIA. *Cor.* rotata. *Stigma* compressum. *Caps.* bilocularis, 2-valvis: valvis bifidis.

1. *biflora*, fol. lanceolatis superne serratis, flor. geminis. Flor. Peruv. 2. p. 13. t. 123. f. 2. *Capraria peruviana*. Fewill Peruv. 2. p. 764. t. 48. In Peruviae arenosis, ripis et argillosis. Ab incolis loco Thene adhibetur. h

413. PORANA. *Cor.* campanulata. *Cal.* 5-fidus, in fructu maior. *Styl.* semilividus, longior, persistens. *Stigmata* globosa. *Per.* bivalve.

1. *volabilis*. Burm. ind. 51. t. 27. f. 1. Willd. Sp. p. 843. Lam. ill. t. 186. In India orientali. Fol. ovata, serrata, plicata. L. h

CONVOLVULACEI (monogyni. Gen. 414-418.) calyce sunt 5-fido, ut plurimum persistente, corolla campanulata aut infundibuliformi tubo elongato, capsula 2-3-4-loculari, eorumque folia alterna sunt, insuper herbas, solum frutices, sicut saepius volabiles et quasdam lactes. Monogynae aut Polygynae sunt.

414. RETZIA. *Cor.* cylindrica extus villosa. *Stigma* bifidum. *Caps.* 2-locularis, polysperma.

1. *spicata*. Thunb. Act. lund. 1. p. 55. t. 1. f. 5. Lam. ill. t. 103. Hab. in Cap. b. spei altissimis montibus. Corol. rufescentes. h

415. ENDRACHIUM. *Cal.* coriaceus, 5-phyllus. *Cor.* campanulata s. urceolata extus hirsuta. *Stam.* exserta. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* sulcistipitata, lignosa, 2-locularis.

21. *Madagascariense*. Smcl. Syst. veget. Thuyina spectabilis. Smith ic. incl. 1. p. 7. t. 7. Willd. spec. 2. p. 915. Endrachium

drachmum Jus. *Hambertia madagascariensis*. Lam. ill. t. 105. Hab. in Madagascar. h

416. CONVOLVULUS. *Cor. campanulata*, plicata. *Stigm.* 2, simplicia. *Caps.* 2-3-locularis: loculis dispersis.

* *Caule volubili.*

1. *arvensis*, fol. sagittatis utrinque acutis, pedunc. subunisporis. Lin. Willd. sp. p. 844. Flor. dan. t. 569. Hab. in agris. Bract. remotae. h

* *auriculatus*, foliis linearibus hastato-acuminatis, auriculis integris. Lam. enc. bot. 3. p. 540. Boec. mus. t. 33. Pluck. alm. t. 24. f. 3. Var. β . prioris. Lin.

2. *incarnatus*, foliis sagittatis oblongis acuminatis glabris: lobis divaricatis acutis integerrimis, pedunc. 1-floris. Vahl. Eclog. amer. 2. Hab. in Curassao. *C. arvensis* affinis.

3. *ruber*, fol. sagittatis glabris emarginatis: lobis obtusissimis divaricatis integerrimis, umbellis involucreatis, caule piloso. Vahl. l. c. Hab. in America meridionali.

4. *sepium*, fol. sagittatis postice truncatis, pedunc. tetragonis unifloris, bracteis cordatis maximis. Flor. dan. t. 458. Engl. bot. t. 313. Flor. Per. 2. p. 10. Habit. in sepibus et salicetis, etiam in America et Peruvia. Stigma simplex.

5. *Scammonia*, foliis sagittatis postice truncatis, pedunc. teretibus subtrifloris. Lin. Moris. hist. 2. s. 1. t. 3. f. 5. Mill. dict. t. 102. Scammonis syriaca. Bauh. pin. 294. Hab. in Syria, Mysia, Cappadocia. h

6. *involucratus*, fol. cordato-hastatis pubescentibus, pedunc. subtrifloris, calycibus bracteatis. Willd. sp. p. 845. Hab. in Guinea.

7. *Hermanniae*, fol. cordato-sagittatis subhastatisque crenato-alutis: nonnullis integerrimis, pedunc. bifloris. Flor. Per. 2. p. 10. L'Her. Stirp. p. 67. t. 33. Hab. in Peru. Cor. alba. Caps. helvola, carnosae.

8. *arenatifolius*, fol. sagittatis crenatis, pedunc. longis, flor. umbellatis. Flor. Per. l. c. t. 118. f. 6. Cum priore. c

9. *sagittifolius*, fol. oblongo-sagittatis: sinu profundissimo, auriculis subacuminatis, pedunc. 1-floris, cal. laevibus rotundato-ovalibus. Mich. flor. 1. p. 138. Pluck.

t. 85. f. 3. Hab. in America boreali. Cor. ampla, rosea.

10. *bonariensis*, fol. hastatis, basi rupeutis, apice setula terminatis, pedunc. subtrifloris. Cav. ic. 5. p. 54. t. 48. f. 2. Hab. in planitie de Buenos-Ayres. Corol. alba venulis roseis variegata.

11. *farinosus*, fol. cordatis acuminatis repandis, pedunc. trifloris, caule farinoso. Lin. Jacq. hort. t. 35. Hab. in Madera. c

12. *lanuginosus*, fol. cordatis oblongis subhastatis tomentoso-sericeis: auriculis dentatis, pedunculis trifloris, caule piloso. Vahl. symb. 3. p. 23. Hab. in Oriente. Fol. tomento subferrugineo tecta. Cor. fere C. Scammoniae, flavescentes.

13. *villosus*, fol. cordatis ovatis acuminatis margine villosis subciliatis, caput. pedunculatis hirsutissimis involucre. C. ciliatus. Vahl. Eclog. amer. 2. Hab. in Cajenna. C. guianensis habitu.

14. *nummularius*, villosus, fol. cordatis mucronatis, pedunc. multifloris folio longioribus, calycib. ovatis, bracteis lanceolatis. Vahl. l. c. In America meridionali. Sequenti affinis.

15. *nodiflorus*, fol. subtomentosus ovatis subcordatis, pedunc. bifidis multifloris fol. brevioribus, Vahl. l. c. Lam. enc. 3. p. 557. Hab. in ins. St. Crucis. An diversus a C. verticillato?

16. *parviflorus*, foliis cordato-oblongis mucronatis, pedunc. ramosis multifloris brevib. subverticillatis. Enc. bot. 1. p. 556. Burm. amer. p. 81. t. 94. f. 2. Habit. ad St. Dominico in collibus petrosis, ubi floret Decembri.

17. *ovalifolius*, glaber, foliis ovalibus integerrimis emarginatis, pedunc. 1-7-floris, cal. obovatis. Vahl. Eclog. 2. Hab. in India orientali.

18. *incanus*, tomentoso-sericeus, fol. lanceolatis sagittatis obtusis basi subciliatis, pedunc. bifloris. Vahl. l. c. Hab. in America. Cor. extus villosa.

19. *emarginatus*, fol. lanceolatis: inferioribus emarginatis mucronatis, pedunc. unifloris, foliolis calycinis exterioribus semiovatis magnis Vahl. l. c. Burm. ind. 47. t. 21. l. 2. ? Hab. in India.

20. *Medium*, glaber, fol. linearib. hastato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunc. unifloris, cal. sagittatis, caule volubili. Lin. Vahl. symb. 1. p. 24. Rheed. 11. t. 55. Hab. in India. Affinis C. reptanti. L. Calycis

M

foliola sagittata, ut in Campanula Medio.
Lin. ☉

21. *filiculis*, foliis linearibus lanceolatis obtusis mucronatis, basi dilatatis dentatis, foliolis calycinis oblongis. Vahl. l. c. Hab. in Guinea. ☉

22. *simplex*, foliis linearibus hastato-acuminatis auriculis dentatis, foliolis calycinis simplicibus. Lam. enc. 3. p. 542. (C. hastatus.) In India orientali.

23. *dentatus*, fol. hastatis glabris auriculis dentatis, pedunc. multifloris muricatis. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orientali.

24. *hastatus*, fol. lanceolatis hastatis, pedunc. axillaribus geminis bifloris. Vahl. symb. 1. p. 15. Hab. in Aegypto.

25. *panduratus*, radice crassa, foliis cordatis integris panduriformibus, calycibus laevibus. L. Mich. Flor. 1. p. 138. C. megalorhizus, flore amplo lacteo; fundo purpureo. Dill. elt. 101. t. 85. f. 99. In Virginiae arenosis. Junior subtomentosus. ¶

26. *bracteatus*, fol. cordatis subintegris trilobis hastatis attenuatis, pedunculis unifloris, foliolis exterioribus calycis bracteiformibus. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orientali.

27. *bicolor*, fol. cordatis villosis, basi angulato-sublobatis, pedunc. unifloris, foliolis exterioribus calycis bracteiformibus. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orient.

28. *trilobus*, fol. cordatis villosis trilobis lobis ovatis acutis, pedunc. unifloris, caule volubili. Thunb. prod. 35. Hab. ad Cap. b. spei.

29. *plataniifolius*, fol. cordatis trilobis lobis lateribus dentato-angulatis, pedunc. subtrifloris calycibusque subaequalibus glabris. Vahl. symb. 3. p. 26. Fewill. 3. p. 26. t. 11. Pluck. t. 167. f. 3. Hab. in Amer. australi. ¶

30. *acuminatus*, fol. cordatis trilobisque acuminatis, pedunc. elongatis multifloris calycibusque glabris. Vahl. l. c. Hab. in insula St. Crucis.

31. *obscurus*, fol. cordatis acuminatis, pedunc. filiformibus unifloris calycibusque glabris, caule hirsutissimo. Vahl. symb. 3. p. 27. C. flore minore lacteo, fundo atropurpureo. Dill. elt. 98. t. 83. f. 95. Hab. in China, Batavia, Zeylona et Surinamo. ☉

32. *flavus*, fol. cordatis repando-sublobatis dentatis apice mucronatis, pe-

duncul. bifidis multifloris. Willd. p. 852. Burm. ind. 7. t. 30. f. 2? In India orient.

33. *angularis*, fol. cordatis quinqueangularibus integerrimis villosis, pedunculis multifloris. L. Burm. ind. 46. t. 19. f. 2. Habitat in Java.

34. *Batatas*, fol. cordatis hastatis quinqueerviis, caule repente bispido tubifero. L. Michaux Flor. 1. p. 138. C. radice tuberosa esculenta. Catesb. car. p. 60. t. 60. Rumph. 5. t. 130. Hab. in India utraque. Fol. modo hastato, modo angulato-lobata. Mich.

35. *maximus*, fol. cordatis ovatis acuminatis integerrimis glaberrimis, caule petiolisque glabris. Lin. suppl. 237. Rheed. 11. t. 53. Hab. in Zeylona. Caulis inferne ligneus. ¶

36. *gemellus*, fol. cordatis subtus villosiusculis, pedunc. bifloris. Vahl. symb. 3. p. 27. Burm. ind. 46. t. 41. f. 1. Hab. in Javae et Tranquebarine ruderalis. Floret ante meridiem usque ad 12 horam, quod raro in calidis regionibus. Koenig.

37. *cymosus*, fol. cordatis integerrimis, caule filiformi, pedunc. multifloris umbellato-cymosis. Flor. Per. 2. p. 9. t. 117. f. b. In Peruvia ad Pozuzo versura. Caul. ramosissimis pilis deciduis hirsutus.

38. *sphaerostigma*, fol. cordatis subvillosis, flor. umbellatis, stig. binis divaricatis capitatis. Cav. ic. 5. p. 54. t. 481. Habitat in Mindanao. Calyx villosus. An potius Ipomoea?

39. *pentanthus*, fol. cordatis acuminatis glabris subrepandis, umbellis pedunc. capitatis quinquefloris, cal. ciliatis. Willd. p. 855. Jacq. ic. var. 2. p. 316. Collect. 4. p. 210. Hab. . . h

40. *guyanensis*, foliis cordato-ovatis subtus calycibusque tomentosis, pedunc. elongatis, flor. corymboso-subcapitatis. Vahl. symb. 3. p. 28. Anbl. guj. 1. p. 136. t. 52. Hab. ad ripas rivulorum in Cajenna et Guyana. ¶

41. *capitatus*, hispida, fol. cordato-ovatis, flor. cordatis. Vahl. symb. 3. p. 28. Hab. in India orientali.

42. *hispida*, hirsutissima, fol. cordato-ovatis, flor. umbellatis, pedunc. brevissimis. Vahl. Symb. p. ag. In India orientali.

43. *triflorus*, fol. cordato-lanceolatis attenuatis glabris obtusis, pedunc. trifloris. Vahl. p. 30. Hab. in India orientali.

44. *verticillatus*, fol. cordatis oblongis

nudis, pedunc. umbellatis bifidis multiflor. L. sp. pl. 220. Ipomoea verticillata, A. Moen. Acad. 5. p. 394. Hab. in America. Flores caeruleo-rosae, parvi.

45. *viciifolius*, foliis foliolisque calycis duobus exterioribus cordato-ovatis acutis, pedunc. elongatis bifidis multifloris. Vahl. symb. 3. p. 29. Hab. in insula St. Crucis.

46. *umbellatus*, fol. cordatis, caule volubili, pedunc. umbellatis. Lin. Swartz. obs. 62. Pluck. alm. 114. t. 167. f. 1. Plum. amer. 88. t. 102. Hab. in Martinica, Domingo. Cor. lutea. Stigm. 3, globosa. Sw. T.

47. *tuguriorum*, fol. cordato-sagittatis acutis, caule anguloso, pedunc. tetragonis unis. Forst. n. 74. Hab. in Nova Zeelandia.

48. *cordifolius*, fol. cordatis hastatis dentatis, pedunc. bifido-umbellatis, caule volubili. Th. prod. 35. II. ad Cap. b. spei.

49. *bifidus*, fol. cordatis oblongis acuminatis subtus mollissimis, pedunc. bifidis multifloris. Vahl. symb. 3. p. 30. Hab. in Java et India orientali.

50. *malabaricus*, fol. cordatis glabris, caule perenni villosulo. L. Rheed. 12. t. 51. Hab. in Malabaricae arenosis. h

51. *coelestis*, fol. cordatis acuminatis subtus pubescentib., pedunc. elongatis umbellato-trifidis. Forst. prod. n. 77. Hab. in ins. Tanna.

52. *canariensis*, fol. cordatis pubescentibus, caule perenni villosulo, pedunc. multifloris. L. Comm. hort. 2. p. 101. t. 51. Pluck. alm. t. 325. f. 1. Hab. in Canariensib. insulis. h

53. *ferrugineus*, ferrugineo-tomentosus, fol. cordato-ovatis acutis, pedunc. axillaribus quadrifloris. Vahl. eclog. 1. p. 17. Hab. in Amer. merid. h

54. *muricatus*, fol. cordatis, pedunculis incrassatis calycibusque laevibus, caule muricato. L. Hab. in Surate. Simillimus C. purpureo. ©

55. *triqueter*, fol. cordatis acutis subvillosis, pedunc. multifloris, caule tricarinato. Vahl. symb. 3. p. 30. Hab. in insula St. Crucis.

56. *anceps*, fol. cordatis, caule volubili utrinque carinato. L. H. in Zeylona, Java.

57. *Turpethum*, fol. cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari, pedunc. multifl. L. Blackw. t. 397. Herm. Lugd. B. t. 178. 179. Turpethum repens, fol. Althaeae velindicum. Bauh. pin. 1. 9. In Zeylona. T.

58. *grandiflorus*, foliis cordatis ovatis

obtusiusculis integerrimis, pedunc. sublobatis, cal. coriaceis, caule petiolisque pubescentibus. Lin. suppl. 136. Rheed. 11. t. 50. Hab. in India inter spineta ad litora fluminum. Caulis arboreus. Cal. di-s. triphyllus coriaceus. h

59. *trinervius*, fol. cordatis oblongis glabris trinerviis, caule volubili tereti, pedunc. unifloris. Thunb. jap. 85. encycl. bot. 3. p. 543. Hab. in Japonia. Folia opposita. An Ipomoea?

60. *peltatus*, fol. peltatis, pedunculis multifloris. L. Rumph. amb. 5. t. 159. Hab. in Amboina inque Societatis insulis.

61. *Jalapa*, caule volubili, fol. ovatis subcordatis obtusis, obsolete repandis subtus villosis, pedunc. unifloris. Ait. Kew. 1. p. 211. Hab. in Mexico, Vera cruce, Rad. magna, nigra. Sem. hirsuta. Ipomoea macrorhiza. Michaux. p. 141?

62. *macrospermus*, fol. ellipticis acutis glabris, cor. planis, capsularum localis monospermis, caule scandente. Willd. p. 860. Mouroucoa violacea. Aubl. Guj. 1. p. 142. t. 54. Hab. in Gujanae sylvis. h

63. *tenellus*, fol. ellipticis mucronatis, basi subcordatis, pedunc. bifloris fol. longioribus. Willd. Lam. enc. 3. p. 515. Pluck. alm. 114. t. 166. Hab. in Carolina.

64. *sericeus*, fol. lanceolato-ellipticis, sultus tomentoso-sericeis, pedunc. subumbellatis, cal. pilosis, caule volubili. L. C. mollis. Burm. ind. 44. t. 17. f. 1. Hab. in India. h

65. *tomentosus*, fol. trilobis tomentosis, caule lanuginoso. Lin. Sloan. jam. 57. hist. t. 98. f. 2. Pluck. t. 167. f. 4. In Jamaica.

66. *quinqueflorus*, fol. sagittato-ovatis attenuatis glabris crenato-subrepandis, pedunc. subquinquefloris. Vahl. symb. 3. p. 31. Hab. in insula Borbonia?

67. *arenarius*, fol. oblongis emarginatis basi lobatis integrisve, pedunc. unifloris, cor. rubulosis. Vahl. symb. 1. p. 18. Hab. in ins. Azoricis et ins. St. Crucis.

68. *althaeoides*, fol. cordatis sinuatis sericeis lobis repandis, pedunc. bifloris. L. Barr. rar. 5. t. 312. Hab. in Europae meridionalis, Orientis et Africae collib. T.

69. *cairicus*, fol. palmatis glabris serrulatis, stipulis foliiformibus palmatis, axillaribus tomentosis, cal. pedunculatis laevib. Vahl. symbol. 1. p. 15. Ipomoea palmata. Forsk. Hab. in Aegypto T.

70. *quinquelobus*, fol. palmato-quin-
Al 2

quelobis serrulatis obtusis glabris, axillis tomentosis, pedunc. unifloris, caule glabro. Vahl. symb. 3. p. 32. In insula St. Crucis.

71. *vitifolius*, fol. palmatis quinglobis globis dentatis, caule piloso, pedunculis multifloris. L. Mant. 203. Burma. ind. 45. t. 18. f. 1. Pluck. alm. t. 25. f. 3. Hab. in India orientali.

72. *mucronatus*, fol. palmato-petatis lobis ciliatis apice mucronatis, pedunculis unifloris. Forst. prod. n.º 79. Hab. in insula Taona.

73. *macrocarpus*, fol. palmato-petatis quinguepartitis, pedunc. unifloris. L. Plum. spect. 1. ic. 31. f. 1. Hab. in Amer. Pedunc. articulati, incrassati. ☉

74. *paniculatus*, fol. palmatis lobis septenis ovatis acutis integerrimis, pedunc. paniculatis. Linn. Jacq. collect. 4. p. 216. Rheed. 11. t. 49. Hab. in Malabarica arenosa. Var. fol. 3-lobis et 5-lobis. T.

75. *macrorhizos*, fol. digitatis septenis integerrimis, caule glabro, pedunc. triflor. Linn. Plum. sp. 1. ic. 50. f. 1. Hab. in Amer. An Ipomoea?

76. *quinquefolius*, fol. digitatis glabris dentatis, pedunc. laevibus. Linn. Swartz. obs. 61. Pluck. alm. 116. t. 167. f. 6. Hab. in America, in Jamaicae sepibus. Stigm. 2, subglobosa. Sw. Ipomoea?

77. *glaber*, fol. digitatis quinatis: foliol. ovato-lanceolatis integerrimis laevibus, pedunc. multifloris. Lam. enc. bot. 3. p. 466. Aubl. Gujan. p. 138. t. 53. Willd. p. 86. Hab. in Cayena. Lactescens.

78. *venosus*, glaber, fol. digitatis: foliolis petiolatis ovato-acuminatis venosis, petiolis communibus basi cithrosis. Lam. l. c. Vahl. symb. 3. p. 32? Hab. in ins. Franc. et Bourbonicae. Ipomoea?

79. *eriospermus*, fol. digitatis: foliolis suboctoos linearibus, angustissimis, sem. hirsutis. Lam. l. c. p. 567. Cresc. in St. Domingo. Cap. 4-valvis, 2-lo. ul. loculis 2-spermis. Sem. sericea.

80. *macrocalyx*, fol. quinatis oblongo-lanceolatis integerrimis, pedunc. longiusculis racemoso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 10. t. 98. Io Peruv. nemorosis. Petioli contorti.

81. *chilensis*, pedunc. 1-floris, fol. profundissime 5-partitis: lacinii linearibus, media productiore. Cav. ic. 5. p. 54. t. 480. f. 1. (C. dissectus.) Cresc. in Regno chilensi.

82. *tensifolius*, foliis digitatis quinatis, foliolis linearibus, pedunc. subquadrifloris

Vahl. symbol. 3. p. 33. Hab. in India orientali.

* * *Caule prostrato et non volubili.*

83. *siculus*, fol. cordato-ovatis, pedunc. unifloris: bracteis lanceolatis, flor. sessilib. L. Moco. sic. t. 48. Moris. 1. t. 7. f. 5. Hab. in Sicilia. Caul. vix, vel parum volubilis. Linn.

84. *ebracteatus*, fol. cordato-sagittatis postice obtusis, pedunc. petiolo brevioribus ebracteatis. Lam. enc. bot. 3. p. 531. Hab. Primo intuitu antecessenti similis dicitur, verum bracteatum defectu distinguitur. Stigmata 2, globulosa, an hinc Ipomoea?

85. *trichosanthes*, pubescens diffusus, fol. lanceolatis oblongis cum acumine, pedunc. longis 1-5-floris, cor. pilosa indivisa. Michaux p. 137. C. humistratus et aquaticus. Walt. Cor. alba, margine subrotundenticulato. Styl. profunde 2-partitus. Caps. pubescens. Mich.

86. *stans*, erectus, tomentoso-incanus, fol. subcordatis, pedunc. 1-floris, calyc. bracteis obiectis: lacinii lanceolatis muticis. Michaux Flor. 1. p. 136. In Caoda juxta Lacum Champlain. Affinis C. spithameo. Walt.

87. *pentapetaloides*, fol. lanceolatis obtusis nervis linearis, ramis declinatis, flor. solitariis semiquinquefidis. L. Vahl. symb. 2. p. 36. C. humilis. Jacq. collect. 4. p. 209. t. 22. β? C. prostratus, fol. radicalibus ovatis obtusis emarginatis longe petiolatis, pedunc. unifloris, caule prostrato. Roth. Abb. p. 11. t. 3. Hab. io Majorca. ☉

88. *ciliatus*, fol. oblongis cuneiformib. obtusis emarginatis ciliatis, caule prostrato, caps. pilosissimis. Roth. catal. 2. p. 22. Priori affinis. Hab. . †

89. *lineatus*, fol. lanceolatis sericeis lineatis petiolatis, pedunc. bifloris, calycib. sericeis subfoliaceis. L. C. spicaefolius, fol. lineari-lanceolatis basi angustatis, caule simplici, pedunc. folio brevioribus. Lam. enc. 1. p. 527. C. serpens maritimus, spicae foliis. Triumf. obs. 31. t. 91. f. 2. Muot. 29. t. 140. Hab. in Hispaniae, Siciliae, Mediterranei maritimis et montosis. Cor. extus hirtae.

90. *evoluloides*, caule prostrato, fol. spatulatis villosis obtusis integerrimis, flor. sessilibus. Desf. Atl. p. 16. t. 49. In regno Tunetano prope Sbibam. Cor. parva, caerulea. Caps. villosa. D.

91. *suffruticosus*, caule villosa suffruticoso, fol. angusto-lanceolatis, pedunc.

1-floris folio longioribus. Desf. Atl. 1. p. 175. t. 48. Hab. in Adante prope Tlemsen. Cor. pallide rosea aut alba. \bar{h}

92. *saxatilis*, hirsutissimus, fol. linearibus, flor. capitatis, calycib. acumineatis. Vahl. symbol. 3. p. 33. C. lanuginosus, tomentosus - incanus, fol. linearibus, flor. capitatis terminalibus. Lam. enc. 4. p. 551. Boec. mus. 2. p. 70. t. 70. Hab. in Hispania, Italia, Tauria. \bar{h}

93. *Cneorum*, fol. lanceolatis tomentosis, flor. umbellatis, calycib. hirsutis, caul. erectiusculo. L. C. argenteus. Lam. l. c. p. 552. Cneorum album, folio argenteo molli. Bauh. pin. 463. Hab. in Hispania, Creta, Syria. \bar{h}

94. *linearis*, caulibus erectis frutescentibus, fol. linearibus, acutis pilosius - sericeis, flor. terminalibus umbellato-paniculatis, calycib. pilosis. Curt. bot. mag. 1. 259. Hab. . . \bar{h}

95. *Cantabrica*, fol. linearibus lanceolatis acutis, caule ramoso erectiusculo, calycib. pilosis, pedunc. subtrifloris. Lin. Jacq. Fl. austr. 1. 296. Moris. 2. s. 1. t. 4. f. 3. Cantabrica quorundam. Clus. hist. 2. p. 49. β . *terrestris*, fol. linearibus sericeis, pedunc. subtrifloris, cal. hirsutis mucronatis. L. spec. 2. p. 224. Hab. in Europa australi, Tauria, Africa. Mollis iocosa. \bar{h}

96. *palustris*, caule erecto ramoso, fol. lanceolatis pilosis, flor. axillaribus solitariis minutis subtomentosis. Cav. ic. 6. p. 80. t. 600. f. 2. Cresc. in paludosis in Acapulco vicinis. Pedunc. bi stipulati. C.

97. *Ammanni*, sericeus, procumbens, fol. linearibus, pedunc. unifloris axillaribus longe bracteatis, cal. acuto. Lam. encyc. 3. p. 526. Willd. sp. p. 870. In Sibiria ad Jeniscam et ad lacum Baikal. \bar{h} Cor. minuta calyce paulo major, pilis exterioribus sericeo-villosis. W.

98. *pilosellaeifolius*, villosus, fol. lanceolatis, pedunculis racemosis paucifloris. Willd. l. c. Lam. enc. p. 528. C. orientalis homifusus Pilosellae fol. Tournef. Hab. in Oriente. Rami axillares triflori. \bar{h}

99. *Doryenium*, fol. sublinearibus sericeis, caule frutescente paniculato, calycibus nudiusculis obtusis. Linn. Hab. in Oriente. \bar{h}

100. *proliferus*, fol. linearibus subtus sericis, capitulis terminalibus, ioque dichotomis bracteis ovatis extus hirsutissimis. Vahl. eclog. 1. p. 18. Hab. in America meridionali. Facies C. Cantabricae. \bar{h}

101. *lanatus*, fol. lanceolatis linearibus, tomentosis, ramis senescentibus spinosis,

flor. capitatis involucratibus. Vahl. l. c. p. 16. Hab. in Aegypto inferiori et in monte Siosi. \bar{h}

102. *Histrice*, fruticosus, fol. oblongis fol. sessilibus subsolitariis, ramis spinoscentibus. Vahl. Hab. in Arabia. \bar{h}

103. *spinosus*, fruticosus, fol. lanceolatis, pedunc. unifloris, ramis floriferis spinosis. Willd. p. 871. Lin. suppl. 137. C. fruticosus. Pall. it. 2. p. 734. t. M. Hab. in Sibiriae arceosis collibus ad fluvium Irin. Rudimenta ramulorum in axillis foliorum ramorum in spinas breves mutantur. Habitus C. Cocorii. L. \bar{h}

104. *scoparius*, fol. linearibus pilosiusculis, pedunc. subtrifloris, calyc. sericeis ovatis acutis, caule fruticoso, ramis virgatis. Ait. Kew. 1. p. 213. Lin. suppl. 135. Hab. in Teneriffa circa oppidum St. Cruz. Facies Spartii s. Genistae et non Convolvuli. Cor. extus lirsotae albae. Rasura huius ligni, quod durum album i spiritibus radianibus, spargit odorem rosaceum. \bar{h}

105. *Oenotheroides*, fruticosus erectus, fol. linearibus canescentibus, pedunc. axillaribus solitariis cretis unifloris bracteatis, calycib. lanceolatis glabris. Lin. suppl. 137. Hab. ad Cap. b. spei. Habitus Oenotherae mollissimae. Cor. magna fulva.

106. *floridus*, fol. oblongo-lanceolatis basi attenuatis subpilosis, ramis floriferis pedunculisque paniculatis. Ait. Kew. 1. p. 214. C. fruticosus prostratus canus, fol. linearibus lanceolatis glabris, thyrsis terminali pyramidalis composito. L. suppl. 136. Jacq. ic. 1. t. 34. Collect. 1. p. 62. Hab. in rupibus Teneriffae. Copia, florum omnium pulcherrimus. Lin.

107. *cuneatus*, caule fruticoso erecto, fol. cuneiformibus obtusis mucronatis glabris, corymbis axillaribus fol. brevioribus. Willd. sp. p. 873. Hab. in India orientali. \bar{h}

108. *corymbosus*, fol. cordatis, pedunc. umbellatis, caule repente. L. Plum. spec. 1. ic. 89. f. 2. Hab. in America.

109. *secundus*, fol. cordatis acuminatis integerrimis, pedunc. secundis longissimis, flor. umbellatis. Flor. Per. 2. p. 10. t. 117. f. 2. In Peruv. collibus arceosis.

110. *spilhamacus*, fol. cordatis pubescentibus, caule recto, pedunc. unifloris. Lin. Hab. in Virginia.

111. *persicus*, fol. ovalibus tomentosis pedunc. unifloris. Amoen. acad. 2. p. 341. Gmel. it. 3. p. 36. t. 7. Hab. in Persia ad maris Caspici litus. \bar{h}

112. *tricolor*, fol. lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, flor. solitariis. Lin. Moris. t. 1. f. 4. f. 4. Hab. in Africa, Mauritania, Hispania, Italia et Peruvia. Fol. obovata. ☉

113. *acetosaeifolius*, fol. oblongo-lanceolatis subhastatisque, pedunc. elongatis unifloris, caule repente. Vahl. eclog. 1. p. 18. Plum. amer. 91. t. 105. Hab. in Amer. merid. ☿

114. *repens*, fol. saginatis postice obtusis, caule repente, pedunc. unifloris. L. Michaux 1. p. 137. Cor. alba, colore roseo ad ambitum suffusa. Cal. lobractatus. M. Hab. in India utraque ad ripas, in arenosis maritimis. Caul. geniculatus. ☿

115. *reptans*, fol. hastato-lanceolatis auriculis rotundis, caule filiformi repente, pedunc. unifloris. L. Rumph. 5. t. 155. f. 1. Hab. in India. An a priori diversus?

116. *edulis*, fol. cordatis integris trilobisque glabris, caule repente angulato. Thunb. jap. p. 84. Hab. in Japonia. ☿

117. *hirtus*, fol. cordatis subhastatisque villosis, caule petiolisque pilosis, pedunc. multifloris. Mill. dict. n. 10. Hab. in India.

118. *Soldanella*, fol. reniformibus, pedunc. unifloris. Moris. s. 1. t. 3. f. 2. Soldanella maritima minor. Bauh. pin. 295. Hab. in Angliae, Hispaniae, Belgii, Italiae, Frisiae litoribus maris et in Carnioliis. ☉

119. *Imperati*, foliis panduriformibus integris emarginatis basi cordatis, pedunc. unifloris, caule repente. Vahl. symbol. 1. p. 17. C. stoloniferus. Lam. enc. 3. p. 527. Cyrill. pl. rar. fasc. 1. p. 14. t. 5. Moris. s. 1. p. 15. t. 7. Soldanellae congener Imperati. Barr. obs. 33. ic. 856. Hab. ad litora maris Neapoli.

120. *obtusilobus*, glaber, foliis crassis sinuato-lobatis: lobo impari majore emarginato, pedunc. 1-floris, cor. brevi campanulata. Michaux. Flor. 1. p. 139. Hab. in Amer. boreal. litoribus.

121. *Pes caprae*, fol. bilobis, pedunculis unifloris. Linn. Herm. Lugd. B. 174. t. 175. Rumph. 5. t. 159. f. 1. Hab. in India.

122. *Lasianthus*, flor. solitariis, fol. palmato-laciniosis tomentosis: lacinia media ampliore pinnatifida. Cav. ic. 5. p. 53. t. 479. f. 1. Hab. in Regno chilensi.

123. *laciniosus*, flor. solitariis, foliis laciniosis: lacinii capillaribus 2-3-fidis. Cav. l. c. Lam. enc. 3. p. 546. t. 479. f. 2. Cresc. prope Montevideo. Cor. et cal. extus villosi, ut in priore, cui affinis.

124. *platycarpus*, flor. racemosis, fol. pinnatis, caps. compressis. Cav. l. c. p. 55. t. 482. In Mexico. An hujus generis?

125. *venosus*, glaber, fol. digitatis foliolis petiolatis ovato-acuminatis, petiolis basi cichorosis. Enc. l. c. Hab. in Ins. Mauritii.

126. *brasiliensis*, fol. emarginatis basi biglandulosis, pedunc. trifloris. L. Hab. in Brasilia, Domingo maritimis. ☿

127. *multifidus*, foliis palmatis, foliis septenis linearibus integris, pedunc. unifloris, caule decumbente. Thunb. prodr. 35. Hab. ad Cap. b. spei.

128. *sublobatus*, procumbens, fol. superioribus apice dentato-repandis, floribus capitatis. Lin. suppl. 135. Hab. in India. Involucrum hexaphyllum. Cor. magna. ☉

129. *capensis*, fol. hastatis, lobis semibifidis, pedunc. subbifloris, caule decumbente villosis. Willd. p. 877. castatus. Th. prod. 35. Hab. ad Cap. b. spei.

130. *sagittatus*, fol. leviter sagittatisque, pedunc. unifloris, caulib. prostratis. Thunb. prodr. 35. Cum priore.

131. *littoralis*, foliis oblongis lobato-palmatis, pedunc. unifloris, caule repente. L. Plum. sp. 1. ic. 90. f. 2. Hab. in Amer.

132. *martinicensis*, fol. ellipticis, glabris, pedunc. unifloris folio longioribus, caule repente. Jacq. amer. 26. t. 17. Hab. in Martinicae umbris, inundatis.

Obs. Plures Convolvuli species ob stigma capitato - didymum ad Ipomoeas relative sunt, et nonnullae examinandae adhuc restant, numne potius ad idem pertineant genus.

417. **IPOMOEAE.** Cor. infundibuliformis, aut campanulata, 5-plicata. *Stigmata* capitato-globosa, papillosa. *Caps.* 2-3-locularis, polysperma.

1. *Quamoclit*, fol. pinnatifidis linearib. flor. subsolitariis. Lin. Willd. sp. 2 p. 879. Quamoclit 1. Jacminum americanum. Clos. posth. 9. Rumph. 5. t. 155. f. 2. Hab. in India. Conv. pennatus. Lam. enc. 3. p. 569.

2. *dissecta*, fol. palmatis, lacinii angustatis pinnatifidis dentatis, pedunc. subbifloris. Willd. phytog. 1. p. 5. n. 19. t. 2. f. 3. Hab. in Guioea.

3. *umbellata*, foliis digitatis septenis 1 pedunc. umbellatis brevissimis. L. suppl. Flum. spec. 3. ic. 9a. f. 2. Hab. in Amer.

4. *carolina*, fol. digitatis 1 foliolis petiolatis, pedunc. unifloris. Lin. Catesb. Car. 2. p. 19. t. 19. Hab. in Carolina.

5. *coccinea*, fol. cordatis acuminatis, basi angulatis, pedunc. 2-fidis. L. Comm. rar. 21. t. 11. *β. luteola*, fol. cordatis acuminatis subangulatis, pedunc. primum dichotomis, dein racemosis, Jacq. ic. rar. 1. t. 35. Collect. 2. p. 266. Hab. in Domingo. ☉

Obs. An Ip. angulata. Orteg. Dec. p. 83. Flor. Per. 2. p. 11. t. 119. Varietas?

6. *lacunosa*, foliis cordatis acuminatis scrobiculatis basi angulatis, pedunc. sub-unifloris flore brevioribus. Lin. Dill. ekh. 101. t. 87. f. 102. Hab. in Virginia, Carol. Simillima I. coccinea. Flor. tubo crassiore albi, ore purpurascens. ☉

7. *leucantha*, fol. cordatis acuminatis integerrimis, pedunculis unifloris solitariis folio brevioribus. Willd. p. 881. Jacq. ic. t. 318. Collect. 2. p. 280. Hab. in Amer. torrida. ☉

8. *solanifolia*, fol. cordatis acutis integerrimis, pedunc. unifloris solitariis fol. aequalibus. Willd. l. c. Plum. sp. 3. ic. 94. f. 1. Hab. in Amer.

9. *bona nox*, fol. cordatis acutis integerrimis, caule aculeato, flor. ternis, cor. indivis. L. Cav. ic. 1. p. 52. t. 300. Sloan. hist. 171. t. 96. f. 1. Hab. in India arenosis, arborescens. Cor. subus lutescens. limbo albo, radiis 5 lutescentibus. ☉

10. *campanulata*, fol. cordatis, pedunc. multifloris, perianthio exteriori orbiculari, cor. campanulatis lobatis. Lin. Reed. 11. p. 175. t. 56. Hab. in India. Sub perianthio quinquepartito, aliud perianthium minus orbiculatum integerrimum. L.

11. *violacea*, fol. cordatis integerrimis, flor. confertis, cor. indivis. Lin. Plum. spec. 3. ic. 93. f. 1. Sloan. hist. 1. p. 155. t. 93. f. 1. Hab. in Amer. merid. †

12. *verticillata*, fol. cordatis, pedunc. axillaribus ternis reflexis, calycib. hispidis. Vahl. symb. 3. p. 33. Hab. in Arabia felici.

13. *carnea*, fol. cordatis glabris, pedunc. multifloris, cor. marginatis. Jacq. amer. 26. t. 18. Hab. in America. †

14. *repanda*, fol. cordatis oblongis repandis, pedunculis ramosis cymosis. Jacq. amer. 26. t. 20. Hab. in America. ☉

15. *filiformis*, fol. oblongo-cordatis obtusis integerrimis uniconatis, pedunculis cymosis. Willd. Murr. syst. veg. 205. Jacq. am. pict. 20. t. 26. Jacq. amer. 27. t. 12. Hab. in Martiniace sylaticis. †

16. *biflora*, caule volubili, fol. cordatis pubescentibus, pedunc. geminis, cor. lobis trifidis. Lin. sub Convolv. Willd. p. 854. Hab. in China. Pistillum album, stigma 2. capitata, purpurea. L.

17. *striata*, fol. cordatis attenuatis glabris, pedunc. fol. longioribus subquadri-floris, cor. glabris extus striatis. Vahl. symb. 3. p. 28. Willd. l. c. sub Conv. In India. Cor. alba: fundo fusco - purpurascens. Stigma capitatum. V.

18. *parviflora*, fol. cordatis acuminatis glabris, pedunc. multifloris, calycibusque acuminatis villosis. Vahl. l. c. Ip. *paniculata*, caule volubili, fol. ovatis acuminatis, pedunc. paniculatis. Burm. ind. t. 21. f. 3. Hab. in Java.

19. *sibirica*, foliis cordatis acuminatis laevibus, pedunc. incrassatis 1-floris. Lin. sub Convolv. Hab. in Sibiria. Stigma 2-lobum.

20. *speciosa*, fol. cordatis sulcis tomentoso-sericeis, pedunc. priore longioribus, umbelliferis. Ait. Kew. 1. p. 211. Smith. ic. pict. t. 17. sub Conv. C. *neruosus*. Burm. ind. t. 20. f. 1. In India orient. Caul. volub. arboreus. Fol. subus argentea. †

21. *purpurea*, foliis cordatis indivisis fruct. cernuis, pedicellis incrassatis. Roth. Cat. bot. 1. p. 37. Conv. purpureus. Lin. Ehr. pict. t. 7. f. 2. H. in Amer. Cor. colore variat.

22. *ciliolata*, volubilis glaber, fol. cordatis subciliatis, pedunc. longiusculis 1-floris, cal. lacinis lato-ovalibus obtusis. Michaux. 2. p. 137. sub Conv. Hab. circa urbem Knoxville in Tennessee. Cor. ampla, tubulat-campanulata, alba. Stigmata subglobosa. M.

23. *tricolor*, fol. cordatis acuminatis flor. axillaribus subumbellatis, pedunc. can. crassiore. Cav. l. c. p. 5. t. 208. Hab. Cor. tricolor, crenulata. Cal. violaceo-niger. C.

24. *glandulifera*, caul. volubili hirsuto, fol. cor. lato - subrotundis acuminatis, pedunc. subquadri-floris incrassatis, calycib. glanduliferis. Flor. Peruv. 2. t. 121. f. 2. in Lima etc. segetibus. Flor. mane explicantur, hinc ab incolis *Auroras* denominatur haec planta.

25. *tamniifolia*, fol. cordatis acuminatis

pilosus, flor. aggregatis. Lin. Willd. p. 886. Dill. elth. t. 318. f. 414. Habit. in Carolina.

26. *sagittata*, fol. glaberrimis inferioribus cordatis, superioribus sagittatis, pedunc. subunifloris. Desf. atl. 1. p. 177. Poir. it. p. 122. Cav. ic. 2. t. 107. Conv. Webber. W. sp. p. 845. In Barbaria et Hispania (prope oppidum Castulo) ad lacuum et maris ripas. Sem. lanata. h

27. *hastata*, fol. sagittato-hastatis, pedunc. bifloris. L. Burm. ind. 50. t. 18. f. 2. Hab. in Java. Flor. lutei.

28. *glaucofolia*, foliis sagittatis postice truncatis, pedunc. bifloris. Linn. Dill. elth. t. 87. l. 101. Hab. in Mexicæ arvis.

29. *acutangula*, fol. sagittato-triangularibus, angulis postice dentatis, caule erecto, pedunc. 3-5-floris fol. longitudine. Fl. Per. 2. p. 11. t. 119. t. b. (I. angulata.) Hab. in Poturo, nemoribus. Cor. coccinea. ©

30. *angustifolia*, fol. hastato-linearibus, pedunc. 1-floris. Jacq. coll. 2. p. 367. ic. rar. t. 317. Vahl. symb. 3. p. 25. In India.

31. *japonica*, fol. lanceolatis hastatis acutis: auriculis postice 1-dentatis, caule simplic. Vahl. l. c. Thunb. jap. p. 85. W. p. 849. In Japonia juxta Jedo et Nagasaki.

32. *simplex*, fol. lanceolatis integris, floribus solitariis. Thunb. prod. 36. Hab. in Cap. b. spei.

33. *hederacea*, fol. trilobis quinquelobisve cordatis, pedunc. unifloris, calycib. villosis. Willd. 2. p. 884. Jacq. ic. t. 36. Stigm. 3-lobum. Jacq. Habit. in America torrida. ©

34. *tritoba*, fol. trilobis cordatis, pedunculis trifloris L. Hab. in Amer. Cor. cylindricæ, viol. acæ. ©

35. *sanguinea*, fol. cordatis trilobis, lobis lateralibus postice angulato-sublobatis, pedunc. trifloris, calycibus glabris. Vahl. symb. 3. p. 33. Hab. in insula St. Crucis. ©

36. *hederifolia*, fol. trilobis cordatis, pedunc. multifloris racemosis. Lin. Plumb. spec. 3. t. 93. f. 2. Hab. in Amer. ©

37. *hepaticifolia*, fol. trilobis, florib. aggregatis. Lin. Burm. ind. 50. t. 20. f. 2. Fol. superiora 5-loba. Lam. ill. p. 461. Sub Convolv. Hab. in Zeylona.

38. *punctata*, fol. cordatis trilobisque, cor. indivisis, fruct. erectis. Lin. sub Conv. hederacea. Willd. p. 851. C. flore purpureo, cal. punctato. Dill. elth. p. 59. t. 93. f. 96. Hab. in utraque India et Africa. Stigm. 3-lobum. Jacq. ©

39. *carolina*, fol. cordatis trilobisque villosis, cal. laevibus, caps. hirtis, pedunc. subbifloris. Lin. sub Conv. fol. profunde sublanceolato-3-lobis. Michaux. Flor. 1. p. 139. Hab. in Carolina, sepibus. h

40. *cuspidata*, fol. cordatis trilobis: lobis cuspidatis, pedunc. 1-floris, cal. laciniis linearibus basi hirsutis. Flor. Peruv. 2. p. 13. t. 119. f. a. Hab. in Peruviae petronis Petioli longi. ©

41. *villosa*, fol. cordatis trilobis: lobis acuminatis lateralibus extrorsum excavatis, pedunc. trifloris involucreatis. Fl. Per. 2. p. 12. t. 521. f. 1. In Per. nemoribus et ad agrotum margines. Cor. caerulea. Caps. glabra.

42. *macrorrhiza*, fol. cordatis lobatisque plicatis subtus tomentosis, pedunc. subunifloris, rad. crassissima. Michaux. Flor. 1. p. 141. In Georgiae et Floridae maritimis. Cor. magna, alba. Sem. lanuginosa. +

43. *crassifolia*, caule erecto ramoso, fol. reniformibus emarginatis subplicatis, pedunc. axillaribus subtrifloris petiolo brevioribus. Cav. Descr. p. 100. Habit. in Guayaquil.

44. *stans*, caule erecto suffruticoso ramoso, fol. cordatis truncatis sinuato-dentatis. Cav. ic. 3. p. 26. t. 250. Hab. .

45. *Nil*, foliis cordatis trilobis, coroll. semiquinquefidis, pedunc. petiolo brevioribus. Linn. Willd. sp. 2. p. 851. sub Ipomoea. Cur. mag. t. 188. Hab. in Amer.

46. *barbata*, cordatis trilobis, pedunc. subunifloris retortis, cal. barbatis. Roth. Cat. 1. p. 37. Dill. elth. t. 88. f. 92.

47. *varia*, fol. cordatis lobatisque, pedunc. unifloris erectis, cal. laciniis dorso barbatis: 3 exterioribus cordato-lanceolatis. Roth. Cat. p. 17. Convolv. pilosus. Moench. meth. p. 432. Rad. fusiformis. An eadem ac I. hederacea? h

48. *tridentata*, fol. oblongis tricuspidatis: basi dilatato-dentatis, pedunc. 1-flor. incrassatis 4-gonis. Roth l. c. p. 19. Conv. tridentatus. Lin. W. Sp. 1. p. 848. Rheede 11. t. 65. In Indiae aridis. Caps. 2-locularis, 4-sperma. Stigm. 2, globosa. ©

49. *pentaphylla*, caule fruticoso filiformi volubili, fol. quinatis glabris, flor. axillaribus, pedunc. solitario. Cav. ic. 3. p. 29. t. 256. Hab. Pedunc. axillares 1-3-flori. Cor. limb. crenulatus.

50. *pilosa*, caule scandente piloso, fol. quinatis pilosis integerrimis. Cav. ic. 4. p. 11. t. 323. Conv. 5-phyllus. Linn. Ipomoea.

Jacq. pl. rar. v. 2. Hab. in Amer. calidiore. Caul. et petioli longi valde pilosi. ☉

51. *muricata*, foliis quinatis linearibus angustis sessilibus, cal. muricatis. Cav. ic. 1. c. f. 2. Hab. in Huanajuato. Caps. 2-locularis.

52. *ternisolia*, fol. ternis linearibus angustis petiolo communi longioribus. Cav. 5. p. 52. t. 478. Hab. in Apulco vicinis Flor. axillares.

53. *parviflora*, fol. cordatis quinquelobato-palmatis, umb. axillaribus pedunculatis, cal. capsulisque pilosis. Vahl. symb. 3. p. 34. Sloan. hist. 1. t. 97. f. 1. Hab. in ins. St. Crucis. Affinis. I. trilobae. ☉

54. *heterophylla*, foliis palmatis: lobis lateralibus superne lobulo erectiusculo acutis. Ortega. Dec. plant. p. 9. Habit. in Nova Hispania et in ins. Cuba.

55. *sinuata*, fol. palmato-pedatis septemlobis: lobis lanceolatis inaequaliter sinuatis, pedunc. 1-floris. Ortega Dec. 7. p. 84. Conv. dissectus. Jacq. hort. 2. t. 159. Cresc. cum priore.

56. *Papiria*, fol. palmatis cordatis: lobis quinis lanceolatis, pedunc. 1-floris, radice tuberosa. Flor. Peruv. 2. p. 11. t. 120. f. 2. Hab. in Tarmae collibus. Radix uti sequentis vi drastica gaudet.

♂ ? *subtriloba*, fol. cordatis subtrilobisque, pedunc. 1-floris, rad. tuberosa. Flor. Per. l. c. Cum priore. Cor. etiam purpurea. ☿

57. *tuberosa*, fol. palmatis, lobis septenis lanceolatis acutis integerrimis, pedunc. trifloris. Lin. Plum. am. t. 276. f. 6. Hab. in Jamaica. Cor. sulphurea. ☿

58. *digitata*, fol. palmatis: lobis septenis lanceolatis obtusis, pedunc. trifloris. Lin. Plum. Sp. 3. ic. 92. f. 1. In America, Cor. coccineae.

59. *Pes tigridis* (tigrina), villosa, fol. palmatis flor. aggregatis. Lin. Herm. Lugd. t. 187. Dill. Elh. t. 318. f. 412. Hab. in India. ☉

Obs. Ipomoea bracteata, bracteis latis venosis carnis plieatis distichis. Cav. ic. 4. p. 51. t. 477. ob corollae limbum integerrimum revolutum, filam. glabra, stigm. simpliciter ovatum distinctum genus efflicere videtur. In opere botanico: *Encyclopedie methodique*, vol. 3. p. 534-563. plures sub genere Convolvuli describere extant species, quae ob signa capitato-dilysum verae Ipomoeae videntur. Inter ea duo haec genera charactero nimis artifi-

ciali, quo affinitas inter quasdam species aliquando dilaceratur, inter se disjunguntur.

418. *DIAPENSIA*. Cal. 5-phyllus imbricatus foliolis tribus. Cor. hypocrateriformis: limbo 5-fido plano. Stam. tubo cor. imposita. Caps. 3-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *lapponica*, floribus pedunc. Linn. Flor. dan. t. 47. Hab. in alpihus lapponicis. Sed. facie, Arelis affinis. ☿

419. *COBÆA*. Cal. inferus persistens, 5-gonus: angulis basi compresso-alatis. Cor. campanulata. Stam. declinata. Stigma 3-fidum. Germ. cinctum corpore glanduloso. Caps. obovata, 3-locularis, recept. 3-gono disticta. Sem. imbricata, marginata.

1. *scandens*. Cav. ic. 1. p. 11. t. 16 et 17. et vol. 5. p. 69. t. 500. bis. Habit. prope Mexico et in Acapulco. Caul. longissimus, scandens. Fol. pinnata cirrhosa: pinnulis ovatis. Cor. maxima, violacea. E. Bignoniacearum familia. C.

420. *MACROSTEMA*. Cal. inferus persistens, semiquinque partitus. Cor. infundibuliformis: lacini lanceolatis. Stam. longissima exserta, basi nuda. Caps. 4-locularis, 4-valvis: dissepimento valvulis parallelo cruciata. Sem. solitaria.

1. *vitifolia*. Calbo Cav. ic. 5. p. 51. t. 476. in honorem ejusdem medici secul. 16. Calbo sic dicti. Hab. in Amer. septentr. Caul. scandens. Pedunc. axillares multiflori.

~~~~~  
POLEMONIACEAE. Cal. inferus, persistens. Cor. regularis, quinqueloba. Stam. 5, in medio tubi inserta. Caps. 3-locularis, 3-valvis: valvis medio intus sequisferis, receptac. centrali 3-gono. Caul. herbaeus aut frutescens. Fol. alterna aut opposita. Vid. Juss. gen. pl.

421. *POLEMONIUM*. Cor. 5-partita, fundo clauso valvis staminiferis. Stigma 3-fidum. Caps. 3-locularis, supera.

1. *caeruleum*, fol. pinnatis (17), florib.

erectis, calycib. cor. tubo longiorib. Lin. Flor. dan. 255. Willd. Sp. 2. p. 886. *♀*. *alba*, flor. albis. In Europa et Asia.  $\overline{\text{L}}$

2. *reptans*, caul. reptante, fol. pinnatis septenis, florib. terminalibus nutantibus. Lin. Lam. ill. 1. 206. f. 2. Mill. dict. 1. 209. Hab. in Virginiae montibus.  $\overline{\text{L}}$

3? *dubium*, fol. inferioribus hastatis, superioribus lanceolatis. Linn. Habit. in Virginia. Stylus semibifidus.  $\dagger$

4? *Rostroides*, erectum, caule filiformi, fol. lanceolatis ciliatis, panic. pauciflora pedunc. nuda. Linn. suppl. p. 139. Hab. in Cap. b. spei.  $\dagger$

5. *Campanuloides*, erectum glabrum, fol. lineari-lanceolatis integris erectis, flor. terminalibus solitariis. Linn. suppl. 139. Hab. in Cap. b. spei. An potius Campanula?

*Obs.* Ambae hae posteriores species germinae infero a Polemoniis recedunt. Lam. ill. p. 472; hinc hujus generis non sunt.

422. PHLOX. Cor. hypocrateriformis. Filam. inaequalia. Stigma 3-fidum Cal. prismaticus. Caps. 3-locularis, 1-sperma.

1. *paniculata*, caule alto laevi, foliis lanceolatis margine scabris, corymbis paniculatis, cor. laciniiis rotundatis. Ait. Kew. 1. p. 205. Willd. Sp. 2. p. 819. Dill. elth. 205. t. 166. f. 201. Fol. undulsa. Col. aristati. Michaux. Hab. cum omnibus fere speciebus in Amer. septent.  $\overline{\text{L}}$

2. *undulata*, fol. oblongo-lanceolatis subundulatis margine scabris, caule laevi, corymbis paniculatis, cor. laciniiis subrotatis. Ait. Kew. 1. p. 205. Hab. in America boreali.  $\overline{\text{L}}$

3. *triflora*, caul. erectis subpubescentibus, fol. lanceolatis glabris, corymborum ramis subtrifloris, cal. dentibus linearibus. Michaux Flor. 1. p. 143. Hab. in Carolina superiore. Humilis.

4. *latifolia*, caule erecto laevi, foliis subcoriato-ovalibus, flor. fastigiato-corymbosis. Michaux. In Carolinae sylvis sphagnosis. Cor. majusculae laciniae suborbiculatae.

5. *aristata*, caule debili pubescente, panic. e racemis laxis et subgeminifloris fastigiata, aristis calycin. longissimis. Mich. p. 144. Var. corol. roseo-purpureo.  $\text{♀}$ . et cor. albedo-roseo. Hab. in Carolina ad ripas amnis Santae, et  $\text{♂}$ . circa Knoxville.

6. *suaveolens*, (*candida*), fol. ovato-lanceolatis nudique laevibus, caule glaberrimo, racemo paniculato. Ait. Kew. 1. p. 206. Hab. in America boreali. Flores albi leviter suaveolentes. Ait.  $\overline{\text{L}}$

*Obs.* Var. sequentis secundum Michaux. Flor. 1. p. 143.

7. *maculata*, fol. oblongo-lanceolatis glabris, caule maculato scabrescens, racemo corymboso. Ait. Jacq. hort. 1. 127. Hab. in Virginia.  $\overline{\text{L}}$

8. *pilosa*, fol. lanceolatis villosis, caule erecto, corymbo terminali. Hab. in Virginia.  $\overline{\text{L}}$

9. *carolina*, fol. lanceolatis laevibus, caule scabro, corymbis subsanguis. Lin. Mart. cent. 10. t. 10. Hab. in Carolina.  $\overline{\text{L}}$

10. *glaberrima*, fol. lineari-lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali. Lin. Hab. in Virginia.  $\overline{\text{L}}$

11. *divaricata*, fol. lato-lanceolatis superioribus alternis, caule bifido, pedunc. geminis. Lin. Mill. dict. n.º 4. et ic. f. 1. Habit. in Virginia.  $\overline{\text{L}}$

12. *ovata*, fol. ovatis, florib. solitariis. Pluck. mant. 122. t. 148. f. 4. In Virginia.  $\overline{\text{L}}$

13. *reptans*, pubescens, caul. fertilibus erectis simplicibus, fol. radicalibus obovatis, caulibus ovali-lanceolatis, corymbo paucifloro. Michaux p. 145. Cresc. in excelsis montibus Carol. occidentalis. Habitu quodammodo Bellidis. Corolla maxima caerulea.

14. *linearis*, fol. alternis linearibus, flor. terminalibus confertis. Cav. ic. 6. p. 17. t. 527. In urbis chilensis Talcahuano vicinis. Fol. mollia subvillosa.  $\odot$ ?

15. *biflora*, pubescens, fol. lineari-lanceolatis interioribus oppositis, pedunc. axillaribus geminis. Flor. Per. 2. p. 17. In R. chilensis arenosis. Pedalis.  $\odot$

16. *subulata*, fol. subulatis hirsutis, flor. oppositis. Lin. Pluck. alm. 233. t. 98 f. 2. Hab. in Virginia. Cor. lobi emarginati.

17. *sibirica*, fol. linearib. villosis, pedunc. ternis. Lin. Gmel. sib. 4. p. 87. t. 46. f. 2. H. in Asia boreali. Lobi cor. rotundati.  $\overline{\text{L}}$

18. *setacea*, fol. setaceis glabris, flor. solitariis. Lin. Pluck. alm. t. 98. f. 2. Hab. in Virginia.

19? *pinnata*, fol. pinnatis: pinnulis linearibus angustissimis, florib. axillaribus. Cav. 1. c. t. 528. Habit. in Montevideo et in N. Hispania.  $\text{h}$



423. **CANTUA**. *Cal.* 1-phyllus tubulosus. *Cor.* infundibulif. 5-partita : laciniis obcordatis s. emarginatis. *Germ.* corpori glanduloso insidens. *Stigm.* 3-partitum. *Caps.* subtrigona, 3-locularis, trivalvis. *Sem.* imbricata, margine membranaceo cineta.

1. *uniflora*, fol. glabris ovatis integris (nonnullis quadrifido-dentatis), florib. solitariis. Pegiophragmos uniflorus. Fl. Per. 2. p. 18. *Cantua ovata*. Cav. ic. 4. p. 43. t. 363. Hab. in Peruviae sepibus.

*Obs.* Nomen vernaculum *Cantu*, unde nomen genericum ortum. Auctores Flor. Per. et Chilensis hoc genus Periphragmos denominant.

2. *dependens*, fol. obovatis acuminatis, aveniis : ramis pendulis. Flor. Per. 2. l. c. t. 133. Cresc. in Peruviae versuris.

3. *buxifolia*, fol. ovato-lanceolatis subsessilibus inferne pubescentibus, flore tubuloso, stam. inclusis. Lam. ill. gen. t. 106. f. 2. Hab. in Peru. †

4. *tomentosa*, fol. sublancoelatis sessilibus utrinque tomentosis, stam. corollae subaequalibus. Cav. ic. 6. p. 43. t. 364. In Peru. Rami tomentosi. †

5. *flexuosa*, fol. lanceolatis acuminatis, flor. corymbosis. Flor. Per. 2. p. 17. t. 131. In Peruviae versuris. Fol. masticata colore luteo salivam imbuunt. *C. pyrifolia* Lam. ? h

6. *foetida*, fol. lanceolatis glabris, pedunc. subtrifloris. Flor. Peruv. l. c. t. 132. Cresc. in umbrosis et rudicatis. Fol. amara et aciculata, et, uti lignum, colorem luteum praebent. h

424. **HOITZIA**. *Cal.* duplex : interior 1-phyllus, tubulosus ; exterior polyphyllus : foliolis 4-8 polymorphis serratis (Bractea?) *Cor.* infundibuliformis : laciniis ovatis. *Stigma*, caps. et semina uti in *Cantua*.

1. *coccinea*, caule fruticoso, fol. sessilib. ovato-acutis pubescentibus. Cav. ic. 6. p. 44. t. 365. H. mexicana. L. ill. *Cantua* Hoitzia. Willd. Sp. p. 878. Habit. passim in regno Mexitano, copiose prope Guanajuato. h

2. *caerulea*, caule suffruticoso, foliis subsessilibus linearibus spinosis : Cav. l. c. t. 366. Cum priore. *Cal.* exterior translucidus. h

3. *glandulosa*, caule suffruticoso aspero, fol. ovato-lanceolatis petiolatis : ramis sublinearibus. Cav. l. c. p. 45. t. 367. Hab. inter Actopam et Salvatierra, oppida Mexicana. Caul. villosus : villis glanduliferis. C.

*Obs.* Praeter calyc. duplicem, folia hujus generis serrata et petala non emarginata sunt. Nomen vernaculum *Paititziltzin*, ex quo nomen *Hoitzia* Jussiaci.

425. **GILIA**. *Cor.* infundibuliformis. *Filam.* aequalia, iurisnris cor. inse ta prominula. *Stigmata* 3. *Caps.* 3-locularis, polysperma. *Sem.* nuda, nec marginata.

1. *laciniata*, fol. laciniato-pinnatifidis florib. capitatis. Fl. Per. 2. p. 10. t. 123. f. 6. Hab. in Peruviae collibus arenosis.

2. *coranopifolia*, fol. linearipinnatifidis, seminib. cubicis. Willd. Sp. p. 879. sublantua. *Ipomopsis elegans* Michaux. Flor. 1. p. 141. *Ipomoea rubra* Lin. Hab. in Carolina.

426. **BONPLANDIA**. *Cal.* liber, tubulosus 5-dentatus. *Cor.* subbilabiata. 5-partita : lacini. emarginatis. *Stam.* declinata. *Stigma* trifidum. *Caps.* ovato-trigona, 3-locularis, 3-sperma. *Sem.* elliptica.

1. *geminiflora*, caule herbaceo, foliis alternis lanceolatis serratis, flor. axillarib. geminis. Cav. ic. 6. p. 21. t. 332. Hab. in Nova Hispania. *Cor.* violaceo rubra. *Stam.* filiformia. ☉

427. **NAVARRERIA**. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* membranacea, 1-locularis, bivalvis.

1. *involuta*, fol. pinnato-multifidis. Flor. Per. 2. p. 8. Hab. in Chile umbrosis et agnoscis ☉

**CAMPANULACEAE** (gen. 428-435) distinguuntur calyce aspero aut seminifero, corol. regulari campanulata aut rotata, s. unni latere fissi subbilabiata : limbo 5-fido. Stamina numero sunt varia : 4-10, basi saepius dilatata germina cingentia, antheris distinctis aut connatis. Fructus inferus est aut bacca, aut drupa, aut capsula, haec 2-3-5-6-locularis. Caeterum sunt

aetherbae aut passim frutices lactescen-  
tes. (Hic enumerantur genera pentandro  
monogyna, staminibus liberis.)

428. *CAMPANULA*. Cor. campanu-  
lata, fundo clauso valvis stami-  
niferis. *Stigma* 3-5-fidum. *Caps.*  
infera, poris lateralibus dehiscens.

\* *Foliis laevioribus.*

1. *cenisia*, minuta, caul. unifloris, fol.  
ovatis glabris integerrimis sub-ciliatis. Linn.  
Allion. ped. n. 2. 195. t. 9 f. 2. Willd. Sp. 2.  
p. 896. Hab. in alpinis Helveticis inque Ce-  
nisiis alpinis. Radix repens, alternatim emittens  
ramos terminatos fol. radicalibus. Caul.  
pollicares.

2. *uniflora*, caule unifloro, calyce cor.  
aequante. Fl. lapp. 85. t. 9. f. 5. 6. Hab. in  
alpinis Lapponicis.  $\bar{\mathcal{T}}$

3. *Bellardi*, caule nudo unifloro, foliis  
petiolatis elliptico-lanceolatis dentatis. Al-  
lion. pedem. n. 2. 366. t. 85. f. 5. Hab. in  
alpinis Italiae.  $\bar{\mathcal{T}}$

4. *pulla*, caule unifloro, foliis caulinis  
ovatis crenatis, cal. cernuis. Jacq. Fl. austr.  
3. t. 285. Hab. in Austriae et Styriae al-  
pinis.  $\bar{\mathcal{T}}$

5. *Zoysii*, caule subtrifloro, cor. ovato-  
campanulatis, fol. integerrimis: radicalib.  
ellipticis petiolatis, caulinis sessilibus ob-  
longis obtusis. Will. Jacq. ic. a. t. 334. Coll.  
2. p. 122. Hab. in alpinis Carniolae.  $\bar{\mathcal{T}}$

6. *glauca*, fol. sessilibus ovatis serratis  
sulcis glaucis, caule angulato paniculato,  
pedunc. unifloris. Thunb. jap. 88. Hab. in  
Japonia.  $\bar{\mathcal{T}}$

7. *grandiflora*, fol. ternis oblongis serr-  
atis, caule unifloro, flore patulo. Linn.  
suppl. 140. Jacq. hort. 3. p. 4. t. 3. C. gen-  
tinoides, flor. turbinatis patulis, stigmate  
quinquefido. Lam. encyc. 1. p. 574. Hab. in  
Sibiria, Tartaria. Caul. tener.  $\bar{\mathcal{T}}$

8. *tetraphylla*, fol. quaternis oblongis  
serratis. Thunb. jap. 87. Habitat in Japonia.  
Flor. in ramis racemosi cernui.

9. *triphylla*, fol. ternis linearibus, flor.  
verticillato-ternis. Thunb. jap. 87. Hab. in  
Japonia. Radix fusiformis.  $\bar{\mathcal{T}}$

10. *verticillata*, fol. floribusque verti-  
cillatis. Lin. suppl. p. 141. Pall. it. 3. p. 719.  
t. G. f. t. Hab. in Davuria.  $\bar{\mathcal{T}}$

11. *hederacea*, glabra, foliis coriatis  
quincelobis petiolatis, caul. laxo. Lin. Flor.  
dan. t. 330. Engl. bot. t. 77. Hab. in An-

gliae, Galliae, Hispaniae et Daniae um-  
brosis, humidis. Caps. hemisphaerica.

12. *cochlearifolia*, caulib. simplicibus  
unifloris, fol. radicalibus coriatis - subro-  
tundis crenatis longissime petiolatis, caul.  
subpatulis, flor. cernuis. Lam. enc. 3. p.  
578. W. p. 914. C. *fragilis*. Cyrilli. Barcl.  
ic. 451. Hab. in Alpibus et Italiae montosis.  
Petioli aice subulati.

13. *rotundifolia*, (decepiens) ramosis-  
sima diffusa, fol. radicalibus (cito pereun-  
tibus) subrotundis profunde crenatis, cau-  
linis confertis angusto-linearibus. Flor.  
dan. t. 855. Curt. Lond. ic. Cresc. frequens  
in muris, ad saxa, in veruris agrorum.

14. *reniformis*, major, fol. radicalibus  
pluribus reniformibus persistentibus, caul.  
sparsis oblongo-lanceolatis in petiolum de-  
currentibus. C. rotundifolia.  $\beta$ . Lam. enc.  
t. p. 578. H. in monte Cental in Auvergne.

15. *caespitosa*, ascendens late caespit-  
osa, fol. omnibus acute serratis, inferiori-  
bus pluribus ovato-acuminatis, caulinis  
linearibus subsparsis. C. *caespitosa*. Scop.  
Lam. C. *pusilla*. Haenke in Jacq. Coll. 2.  
p. 79. Hab. frequens in Europa australi et  
subalpinis ad saxa, truncos putrescentes.

16. *tenuifolia*, fol. radicalibus oblongis,  
caul. linearib. caul. elongato gracilib. Hoffm.  
Fl. germ. p. 100. In pratis, arvis.

17. *linifolia*, pubescens, fol. radicalib.  
obovato-subrotundis, caulinis lineari-lan-  
ceolatis subdentatis, caule subunifloro. W.  
p. 83. Jacq. Coll. 2. p. 81. C. uniflora, fol.  
integerrimis hirsutis subrotundis lanceolatis  
et linearibus, caule unifloro. Vill. Delph. 2.  
p. 500. t. 10.  $\beta$ ? C. Schreuchzeri, fol. subfal-  
catis lanceolato-linearibus, flore (unico)  
pendulo. Vill. 2. p. 503. t. 16. H. in pratis  
subalpinis et montosis Europae.

18. *flexuosa*, glabra, caule erecto flexuo-  
so, ramulis confertis foliosis, fol. lanceo-  
latis subremote serratis, flor. (parvulis)  
breviter paniculatis nutantibus. Michaux,  
Flor. 1. p. 109. Hab. in montibus altis Ca-  
rolinae. Subpedalis.

19. *divaricata*, subnitens erecta, foliis  
membranaceis remote serratis, panicula  
ramulis subaphyllis divaricatis, flor. (par-  
vulis) nutantibus. Mich. l. c. Cum priore.

20. *filiformis*, caps. bilocularibus apice  
dehiscens, fol. linearibus, inferioribus  
dentulatis, florib. terminalibus ternatis.  
Flor. Per. 2. p. 55. t. 200. f. 5. Hab. in ari-  
dis Concept. Chile. Fol. distantia.

21. *gracilis*, fol. lineari-lanceolatis ob-

solet serratis, caule dichotomo, pedunc. terminalibus elongatis 1-floris. Forst. pro-l. n. 87. C. vincaeflora. Jardin de Malmaison. ic. Hab. in N. Zeelandia.

19. *pubescens*, caule hirsuto, fol. glabris: radicalibus cordatis; caulinis oblongo-dentatis petiolatis. Willd. p. 894. Schm. bohem. n. 167. Hab. in rupibus sylvae Bohemicae. Facies fere C. rotundifoliae. Y. Willd. ¶

20. *Linarioides*, caul. virgatis, apice ramoso-paniculatis, fol. linearibus sparsis exiguis, flor. erectis terminalibus. Lam. enc. t. p. 573. Hab. in Monaria in Monte Video. Facies Antirrhini Linariae. Lin.

21. *carpathica*, foliis omnibus cordatis serratis petiolatis glabris, ramis filiformibus, nigris. Ait. Kew. t. p. 219. Jacq. hort t. p. 22. t. 57. Hab. in montib. Carpathicis. ¶

22. *Lobelioides*, caul. teretibus strictis glabris, fol. lineari-lanceolatis denticulatis, cor. infundibuliformibus trifidis quadrifidisque. Ait. Kew. t. p. 219. Hab. in locis latebrosis Maderae. Cor. minutissimae albo-purpureascentis. ☉

*Obs.* Var. cal. tripartito et quinquepartito, corol. limbo tripartito et quinquepartito, etiam stam. 3-5. Lin.

23. *porosa*, fol. radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis, caule punctato-scabro, flor. racemosis. Thunb. prod. p. 39. C. fol. lanceolatis laevibus, caule erecto sursum punctis porosis. Lin. suppl. 12. Hab. in Cap. b. spei.

24. *undulata*, fol. lanceolatis undulatis glabris, floribus racemosis, caule calycibusque glabris. Thunb. prod. 39. Hab. ad Cap. b. spei.

25. *linearis*, herbacea erecta, fol. linearibus integris glabris, flor. cernuis, caps. hispidis. Lin. suppl. 140. Hab. ad Cap. b. spei.

26. *sessiliflora*, prostrata, fol. linearibus integris, flor. axillaribus solitariis sessilibus. Lin. suppl. 139. Cum priore.

27. *patula*, foliis strictis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula, cal. denticulato. Smth. brit. r. p. 235. Engl. bot. t. 42. Flor. dan. t. 373. β. C. decurrens, fol. caulinis lanceolatis serratis decurrentibus. Lin. Fl. aenc. t. n.º 178. Hab. in sylvis, arvis, pascuis, ad sepes. Fol. lactescentia, amara, subcrenata. Fl. terni. ☉

28. *Rapunculus*, radice fusiformi, fol. undulatis pilosis, radicalibus lanceolato-

ovalibus, panicula coarctata. Linn. Engl. bot. t. 283. Rapunculus caulescens. Bauh. pin. 97. In sylvaticis, graminosis, arvis. Caul. multangulus, strictus, basi hirsutus. Cor. subparva. ☉

29. *alata*, caule simplici, foliis glabris lato-lanceolatis decurrentibus, flor. sessilib. terminalibus. Desf. atl. r. p. 178. t. 50. Hab. in Atlante prope Macaue. Fol. profunde serrata.

30. *unidentata*, erecta glabra, fol. lanceolatis acutis utrinque unidentatis, panicula divaricata foliosa. Lin. suppl. 139. Hab. in Cap. b. spei. Caul. simplicissimi.

31. *fasciculata*, fruticosa erecta, fol. ovatis subunidentatis recurvis, flor. clomeratis terminalibus. Lin. suppl. 139. Thunb. prod. 39. Cum priore. h

32. *persicifolia*, glabra, fol. radicalib. obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. Linn. Bull. t. 367. β. Rap. nemorosus angustifolius, magno flore. Bauh. pin. 93. Hab. in asperis, sylvaticis. ¶

33. *pyramidalis*, foliis laevibus serratis cordatis; caulinis lanceolatis, caul. junctis simplicibus, umbellis sessilibus lateralibus. Lin. Pyramidalis laevis. J. Bauh. hist. p. 808. Hab. circa Idriam et in Carniolia. Caul. ab imo ad apicem ramulos florigeros profert.

34. *americana*, fol. cordatis lanceolatisque, petiolis interioribus ciliatis, flor. secundis, corol. quinquepartitis planis. Lin. Ait. Kew. r. p. 220. C. planiflora. Lam? Hab. in Pennsylvania. Stylus corolla longior. ☉

35. *nitida*, fol. oblongis crenatis laevigatis, caulinis lanceolatis subintegris, cor. campanulato-rotatis. Ait. Kew. t. p. 221. Dodart. memo. 4. p. 119. t. 118. Habitat in America boreali. ¶

36. *lilifolia*, fol. lanceolatis: caulinis acute serratis, flor. paniculatis nutantibus. Lin. Gmel. sib. 3. t. 26. Hab. in Sibiria, Tartaria. ¶

37. *stylosa*, fol. petiolatis subcordatis acute serratis, flor. (parvis) nutantibus, stylo longe exerto. Lam. enc. t. p. 580. Gmel. sib. 3. t. 27. In Sibiria et Tartaria. Diversa a priore?

β? *periplocifolia*, fol. cordatis serratis longe petiolatis, caul. adacendentibus multifloris. Lam. l. c. Cresc. cum priore, cujus varietas?

38. *limonifolia*, ramis patentibus simplicibus, fol. radicalibus ellipticis laevibus integerrimis, caulinis linearibus subulatis, flor. sessilibus ternis. Lin. Willd. 2. p. 914. Hab. in Oriente. ☉

39. *virgata*, ramis virgatis, fol. lanceolatis utrinque acutis densatis scabrisculis, cor. profunde partitiis, flor. subspicatis sessilibus. Billard. pl. Syriac. 2. p. 11. t. 6. Phytoma virgata. Willd. Sp. 2. p. 924. Hab. in Libano. ☿

40. *acuminata*, glabrescens, caule stricto, fol. ova o-lanceolatis in longum acumen desinentibus subseratis, spica fasciculato-multiflora, cor. subulatis. Mich. Fl. 1. p. 108. Dodart mem. 4. p. 119. t. 18. In remotis occidentalis. Pensylv. et Virgin.

41. *ensifolia*, fruticosa, fol. ensiformibus serratis glabris, florib. paniculatis nutantibus. Lam. enc. 1. p. 555. Hab. in monte ignivomo insulae Borboniae. E medio rosulae foliorum assurgit caulis paniculatus scuncialis fol. sessilibus distantibus minoribus instructus. Lin. h

42. *rhomboides*, fol. rhomboidibus serratis, caulinis ovatis serratis, spica secundata, calyc. dentatis. Hab. in alpinis. ☿

43. *Alpini*, foliis lanceolatis serratis, inferioribus petiolatis, summis sessilibus, flor. nutantibus, stylo exerto. Lam. enc. 1. p. 681. Lin. Sp. 2. p. 166p. Hab. in umbris, humidis Italiae prope Bassano.

44. *crispa*, fol. laevibus petiolatis subcordatis duplicato-serratis incis, caule simplici, flor. lateralibus et terminalibus patulis. Lam. l. c. Tournef. Cor. 3. Hab. in Armenia.

\* \* *Foliis scabris.*

45. *latifolia*, foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, flor. solitariis pedunculatis, fructibus cernuis. Lin. Engl. bot. t. 302. Flor. dan. t. 85. Hab. in montosis, scabris. ☿

\* *urticifolia*, caule angulato hispido, fol. ovato-lanceolatis grosse serratis, pedunc. unifloris axillaribus cernuis, calyc. hispidis. Schmid. bohem. n. 171. Willd. Sp. 2. p. 900. Hab. in Germaniae et Bohemiae nemoribus umbris. ☿

46. *Rapunculoides*, rad. repente, fol. cordat - lanceolatis, caule ramoso, flor. secundis, sparsis, calycibus reflexis. Lin. Moris. 2. 5. t. 3. f. 32. Hab. in Helvetiae, Galliae, Angliae, Germaniae sicissimis. Cal. scabr. Cor. C. Rapunculi. ☿

47. *Bonomiensis*, fol. ovato-lanceolatis cultus scabris sessilibus, caule paucifloro. Moris. 2. 5. t. 4. f. 38. Hab. in Ballo, Lessinensium jugis, Bononia, Carniolia. Caul. habitu Verbasci nigri. ☿

48. *vesula*, pubescens, foliis oblongis obtusis crenatis, caule unifloro. Willd. C. uniflora, fol. glabris ovalibus dentatis, caul. subnudo, cal. glabro. Allion. ped. n. 397. t. 7. f. 1. In Italia ad radicem montis Vesuli. ☿

49. *bicaulis*, hispida, caule gemino 1-floro, radice crassiuscula. Lapeyrouse Fl. Pyren. ic. In Pyrenia in monte Raudie.

50. *ptarmicaefolia*, fol. linearibus margine ciliato-serratis, flor. sessilibus erectis. Willd. p. 902. Lam. enc. 1. p. 573. Hab. in Armenia.

51. *graminifolia*, fol. lineari-subulatis, capitulo terminali. Lin. Col. phyt. 2. t. 54. Barr. ic. 332. In Italiae, Carnioliae montibus, Aprutii Salmone vicinis. Similis Phytumae hemisphaericae. Caul. simplicissimi, vix foliis longiores. Linn. ☿

52. *Trachelium*, caule angulato, foliis petiolatis cordato-lanceolatis acutis serratis, cal. ciliatis, pedunc. trifidis. Engl. bot. t. 22. Flor. dan. t. 1026. Hab. in scabris et nemorosis. Fructus lacunosus-torusus. ☿

53. *glomerata*, caule angulato simplici glabrescens, fol. scabris oblongo-lanceolatis cordatis sessilibus, capitulo glomerato. Willd. Hab. in agris et pratis aridis, et in collibus calcareis.

\* *petraea*, caule angulato simplici, flor. sessilibus capitato-glomeratis, fol. subtus tomentosis. Lin. Alliou. t. 39. f. 2. Hab. in Baldo.

54. *Cervicaria*, hispida, flor. sessilibus, capitulo terminali hemisphaerico, fol. lanceolato-linearibus undulatis. Lin. C. caule simplici aspero, fol. linguatis asperis, flor. capitatis. Hall. belv. n. 636. H. in Helvetiae, Germ., Succiae asperis sylvaticis. ☿

55. *marginata*, fol. lanceolatis undulatis serratis marginatis, ramis debilibus, flor. terminalibus solitariis. Thunb. jap. p. 89. et Ejusd. Ic. pl. jap. Dec. 3. Hab. in Japonia ad margines viarum. Caulis basi crassus, subliguosus, decumbens. Th. ☿

56. *lanuginosa*, hispida - lanuginosa, fol. ovatis rugosis crenatis in petiolum attenuatis, caule simplici, flor. subsessilibus erectis patulis. Lam. enc. 1. p. 584. An C.

*peregrinalis*? L. Bauh. pin. p. 64. Cervicaria media. Thunb. p. 32. Hab. in Tartaria.

57. *tomentosa*, fol. radicalibus longis spatulatis crenatis, summis cuneiformibus, flor. pedunculatis subspicatis, calyce tomentoso. Lam. l. c. In Oriente. †

58. *argentea*, fol. oblongis angustis tomentoso-argenteis, caule paniculato, ram. unifloris. Lam. l. c. Tourn. Cor. 3. Hab. in Armenia. Caps. turbinatae.

59. *thyrsoides*, hispida, racemo ovato oblongo terminali, caule simplicissimo, fol. lanceolato-linearibus. Jacq. vind. 211. obs. 1. p. 33. t. 21. Roth. germ. 1. 100. Hall. helv. n.º 688. Hab. in alpinis et montibus Helvetiae, Carnioliae. Cor. aurescunt. †

60. *adpressa*, fol. lanceolatis dentatis ciliatis, caule erecto, panicula decomposita. Thunb. prod. 38. Lin. suppl. p. 140. Hab. ad Cap. b. spei.

61. *subulata*, fol. lanceolatis trigonis ciliatis, florib. paniculatis, caule erecto, Thunb. prod. 38. Ad Cap. b. spei. †

62. *hispidula*, hispida, florib. erectis, calyce longitudine cor. Lin. suppl. 142. Hab. in Cap. b. spei. Folia linearia acuminate ciliata imprimis carina. Cor. infundibuliformis. Stigma trifidum. Lin. †

63. *paniculata*, foliis lanceolatis undatis hirtis, caule angulato hispido, flor. racemosis. Thunb. prod. 38. Ad Cap. b. spei. †

64. *cinerea*, foliis lanceolatis integris glabris, caule lanato, flor. terminalibus solitariis. Thunb. Cum prioribus.

65. *cernua*, fol. oblongis undatis hirtis, flor. terminalibus cernuis, calycibus glabris. Th. prod. 39. In Cap. bonae spei. †

\* \* \* *Capsulis obiectis calycis sinus reflexis.*

66. *Elatines*, fol. cordatis dentatis pubescentibus, caul. prostratis, pedunculis capillaribus multifloris. L. Allioni. Pedem. t. 7. f. 1. (Fig. justo major.) Habit. in Europae australis alpinis. ©

67. *velutina*, caule ascendente, fol. obovatis incanis mollissimis, flor. paniculatis, lacin. calicis sagittatis. Desf. Atl. 1. p. 180. t. 51. Cresc. in rupium fissuris prope Fiemscu. Stigm. 5.

68. *capensis*, foliis lanceolatis dentatis hispidis, pedunc. longissimis, caps. strigosis. Lin. Com. hort. 2. p. 69. t. 35. An cum sequente hujus divisionis?

69. *procumbens*, caule dichotomo dif-

fuso, fol. obovatis crenatis obtusis, flor. solitariis axillaribus. Linn. suppl. p. 141. Cresc. in Cap. b. spei humidis.

70. *Erinus*, caule dichotomo, fol. sessilibus: superioribus oppositis trifidentatis. L. Willd. Sp. 2. p. 917. Moris. S. 5. t. 3. f. 25. Hab. in Europa australi. Veronicam arvensensem refert. ©

71. *Erinoides*, caul. diffusis, fol. lanceolatis subserratis decuercentibus linea scabra, flor. pedunculatis solitariis. Lin. Herm. Lugd. Bat. 1. 111? In Africa. Similis Loecliae erinoidi. †

72. *diffusa*, caul. diffusis, fol. petiolatis serrato-dentatis lanceolatis, inferioribus cordatis, pedunc. 1-floris. Vahl. symb. 1. p. 18. Barr. ic. 453. In Calabria.

73. *Allionii*, capsulis obiectis, caule unifloro hispido, fol. lineari-lanceolatis undulatis hispidis. Willd. sp. p. 607. Vill. delph. 2. p. 512. t. 10. C. nana. Lam. C. alpestris. Allion. pedem. n.º 418. t. 6. f. 3. Hab. in alpinis Helvetiae, Galliae, Italiae. †

74. *caucasica*, pusilla, caps. obiectis 3-locularibus cernuis, calic. erectis paucifloris, fol. obovatis crenatis scabris, radice repente. Bieberstein Tabl. au etc. Cresc. in abruptis lapideis circa Kurt-Bulak. †

75. *ligulata*, (hungarica), fol. undulatis hispidis: crenis callois, caps. calicis sinibus obiectis, capitulo terminali. Kitaib. Plant. rar. Hungar. p. 65. t. 64. Hab. in Hungariae sylvis. C. glomeratae similis dicitur.

76. *ligularis*, cal. sinibus reflexis, caule 1-floro, foliis angustis lingulatis obtusis integerrimis. Lam. enc. 1. p. 385. In Alpib?

77. *punctata*, capsulis trilocularib. obiectis, caule simplici erecto lolioso, fol. subpetiolatis, flor. nutantibus. Willd. flor. cernuis interne punctatis villosis. Lam. enc. 1. p. 549. Gmel. sib. 3. p. 155. t. 30. Hab. in Siberia.

78. *Medium*, caps. quinguelocularibus obiectis, caule indiviso erecto folioso, flor. erectis. Lin. Habit. in Germaniae, Italiae sylvis apricis. †

79. *pelvisiformis*, caps. obiectis, fol. inferioribus ovatis serratis petiolatis: caul. subsessilibus, flore maximo pelvisiformi. Lam. l. c. p. 585. Tournesf. Cor. 3. Hab. in ins. Candia. Fol. tomentosa.

80. *tubulosa*, caps. obiectis, fol. radicalibus petiolatis ovatis inaequaliter den-

tatis basi incisus, caul. oblongis serratis sessilibus, flore tubuloso. Lam. l. c.

81. *violae*, humilis, caps. obiectis, fol. radicalibus cordatis crenatis petiolatis, fl. amplis pedunculatis, cal. hispido. Lam. p. 587. (C. violae-folia.) Hab. in Sibiria?

82. *barbata*, caps. quinquelocularibus obiectis, caule simplicissimo subunifolius, fol. lanceolatis, cor. barbata, Jacq. obs. 2. p. 14. t. 37. Hab. in alpinis Austriae, Helvetiae, Pedemontii, &c.

83. *spicata*, hispida, spica laxa, flor. alternis, fol. linearib. integerrimis. C. caule simpliciter aspero, fol. linearib., flor. laxe et longissime spicatis. Hall. Hab. in Valesia inferiori. Tota pilis albis hispida. L. &c.

84. *strigosa*, caps. obiectis, fol. lanceolatis integerrimis, pedunc. axillaribus unifloris, caule strigoso. Vahl. symb. 3. p. 34. Hab. in Oriente.

85. *alpina*, fol. ellipticis hirsutis, petiolis alaribus unifloris, flor. glabris. Hall. helv. n.º 695. Jacq. austr. 2. t. 118. Hab. in alpinis Schneeberg, Helvetiae. Tota flavescens. Folia lineari-oblonga, integra. Linn. &c.

\* *longifolia*, hispida, caule simplice, pedunc. axillaribus 1-floris: flor. erectis, fol. linearibus subcrenatis longissimis. Lapeyrouse. Flor. Pyren. ic. Hab. in monte Rancid in Pyreneis.

86. *mollis*, caps. 5-locularibus obiectis pedunculatis, caule prostrato, fol. suborbiculatis. Lin. Bocc. mus. t. 145. Barr. t. 759. Hab. in Italia, Hispania.

\* *dichotoma*, caps. 5-locularibus obiectis, caule dichotomo, flor. cernuis. Sp. p. 237. Willd. p. 910. Morit. s. 5. t. 3. f. 26. Desf. atl. 1. p. Barr. ic. 759. Hab. in Syria et Barbaria.

87. *saxatilis*, caps. 5-carinatis obiectis, flor. alternis nutantibus, fol. obovatis crenatis. Bocc. mus. 2. p. 76. t. 64. Hab. in Cretae scopulis saxosis.

88. *alliarifolia*, caps. obiectis, flor. radicalibus reniformibus duplicato-dentatis, caulibus ovatis dentatis sessilibus. W. l. c. Hab. in Oriente. Fol. radicalia facie Erysimi Allioriae. W.

89. *heterophylla*, fol. subovatis glabris integerrimis, caul. diffusis. Linn. Lam. enc. 1. p. 588. Camp. saxatilis, fol. inferioribus bellidis, caeteris Nunulariae. Tournef. iter. 1. p. 243. In insulis Archipelagi.

90. *parviflora*, cal. sinu reflexo, caule superne ramoso, foliis radicalibus longe petiolatis obovatis crenatis, caulibus ovato-lanceolatis incisus, flor. paniculatis. Lam. l. c. Tournef. Cor. 4. In Oriente.

91. *lyrata*, hispida, caps. obiectis, fol. radicalibus longis petiolatis lyratis: lobo terminali cordato, flor. erectis subsessilib. Lam. l. c. Mor. 2. t. 3. f. 31. Vid. Camp. tomentosa. Vent. Hort. Cels. p. 18. t. 18. Cum priore.

92. *sibirica*, caps. 3-locularibus obiectis, caule paniculato. Gmel. sib. 3. p. 154. t. 29. Jacq. austr. t. 200. Hab. in Sibiria, Austria. Flor. oblongi, parvi. &c.

93. *tridentata*, caps. 5-loculari obiecta, caule unifloro, fol. radicalibus tridentatis. Schreb. dec. 3. t. 2. Hab. in Oriente. Fol. radicalia Statices reticulatae. Flos majusculus. &c.

94. *laciniata*, caps. obiectis pedunculatis, fol. serratis: radicalibus lyratis, caulibus lanceolatis. L. Hab. in Graccia, Libano. Similis Michauxiae. W.

95. *stricta*, caps. obiectis, fol. hirtis: caulibus lanceolatis serratis, caule simplicissimo, flor. sessilibus. L. Hab. in Syria, Palaestina.

96. *aurca*, frutescens, caps. 5-locularibus, stigmatibus quinquefidis, caule paniculato, fol. duplicato serratis. Lin. suppl. 141. In insulae Maderae rupibus. Nitida. Flor. flavesc.

\* *Leucostea*. Corol. subhypocrateriformis. Stig. 2-3-fidum. Caps. longissima, prismatocylindrica, 2-3-locularis, polysperma. *Prismatocarpus*. L'Herit. Sert. angl. p. 1.

97. *interrupta*, fol. subulatis ciliatis, ramis floriferis superne interruptis aphyllis. L'Her. sub Prismatocarpis cum sequentibus. Hab. ad Cap. h. spei.

98. *ericoides*, paniculata, fol. subulatis subciliatis, panic. longis pedunculatis. L'Her. Lam. III. 2. p. 63. Polemonium Roelliotos. Lin. suppl. ? C. subulata. Th. Poir. p. 38 ? C. hispida. Linn. suppl. ? Cum priore.

99. *altiflora*, fol. subulatis subciliatis confertissimis, pedunc. longissimo aphylo, germ. tomentosis. L'Her. l. c.

Obs. Tres haec enumeratae species Lepidium subulatum refer. L'Her.

100. *fruticosa*, fol. lineari-subulatis mucicis, panic. terminali pedunculata, caule

caule fruticoso. L'Herit. Willd. Spec. 2. p. 912.

101. *plicata*, fol. linearibus undulatis, caule prolifero laxo ramoso, germ. longissimis. Prism. crispus. L'Her. Habitu C. undulatae.

102. *Prismatocarpus*, foliis lanceolatis glaberrimis, flor. terminalibus sessilibus, cor. cal. duplo longioribus. Prism. nitidos. L'Her. C. Prismatocarpus. Ait. W. p. 913.

103. *Speculum*, (arvensis) caule ramosissimo diffuso, fol. oblongis subcrenatis, florib. solitariis majusculis patulis. Curt. mag. t. 108. Willd. Spec. p. 912. Legouisia arvensis. Durand. Flor. de Bourgogne 2. p. 37. (qui primus hanc plantam sub nomine infuso ut diversum genus a Campanulis removit.) Hab. in agris, ad versuras viarum. Cor. fundo squamulis destituta (?) Dur.

104. *hybrida*, caule stricto basi subramoso, fol. oblongis subundulatis crenatis, calycib. corol. subclandestina longioribus. Lin. Moris. 2. 5. t. 2. f. 22. Cresc. minus frequens cum priore, in locis calcaratis.

105. *Pentagonia*, caule ramosissimo, fol. linearibus acuminatis, cal. pilosis cor. breviorib. Lin. L'Her. l. c. Hab. in Thracia. Cor. rotata.

106. *biflora*, caps. 3-locularibus, fol. late ovatis crenatis sessilibus, flor. binis axillaribus sessilibus. Flor. Per. 2. p. 55. t. 200. Hab. in Peruviae arenosis. Cal. 3-5-partitus. Sequentem refert.

107. *perfoliata*, (amplexicaulis), caule simplici, fol. cordatis crenatis amplexicaulis, florib. axillarib. sessilib. glomeratis. Lin. Moris. 2. 5. t. 2. f. 23. C. amplexicaulis. Michaux Flor. 1. p. 108. Habit. in Amer. borealis cultis.

429. **LIGHTFOOTIA**. Cal. 5-phyl-lus. Cor. 5-petala, fundo clausa valvis staminiiferis. *Stigma* 3-5-fidum. *Caps.* 3-5-locularis, 3-5-valvis semisupera.

1. *subulata*, fol. subulatis, petalis linearibus. L'Her. Sert. p. 4. t. 5. Willd. sp. p. 868. Campanula capillacea. Lin. suppl. 7. Hab. ad Cap. b. spel. h

2. *oxycooides*, fol. petalisque lanceolatis. L'Her. l. c. t. 4. Lobelia tenella. Lin. Mant. Hab. cum priore. Rami filiformes prostrati. h

*Obs.* Hoc et sequens genus Campanulis nimis affinia, cum valvis staminiiferis, charactere generi Campanulae aequae essentiali, ac nectarium Ranunculis, cum Campanulis conveniunt.

430. **ROELLA**. Cor. infundibuliformis: fundo clauso valvulis staminiiferis. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* sub 2-locularis, cylindrica, infera. (Caps. 1-locularis apice pervia. Gærtn.)

1. *ciliata*, fol. lanceolatis ciliatis, flor. solitariis terminalibus. Thunb. prodr. 38. Willd. Sp. 1. p. 918. Lam. ill. t. 127. f. 2. Hort. cliff. 492. t. 35. Comm. hort. 2. p. 77. t. 39. Habit. in Mauritania, Aethiopia et Cap. b. spei.

2. *squarrosa*, fol. ovatis dentatis ciliatis, flor. terminalibus aggregatis. Th. R. filiformis. Lam. ill. p. 66. t. 127. f. 2. Habitat. ad Cap. b. spei, cum sequentibus. h

3. *decurrens*, foliis lanceolatis ciliatis decurrentibus, pedunc. longissimis axillarib. Ait. Kew. 1. p. 228. L'Her. sect. angl. p. 4. t. 6. Andrew. t. 258. c

4. *muscosa*, fol. ovatis dentatis reflexis glabris, flor. terminalibus solitariis. Thunb. Lio. suppl. 143. c

5. *spicata*, fruticosa erecta, fol. lanceolatis integris ciliatis, flor. terminalib. subspicatis. Lin. suppl. 143. h

431. **PHYTEUMA**. Cor. primo tetra-conica, dein 5-partita: laciniis linearibus laxis. *Stigma* 2-s. 3-fidum. *Caps.* 2-s. 3-locularis infera.

\* *Floribus capitato-spicatis*.

1. *pauciflorum*, capitulo subfolioso, fol. omnibus lanceolatis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 919. Rapunculus ful. ovatis, obtuse dentatis, bracteis maximis obtusis. Hall. helv. n°. 680. Hab. in alpinis Helveticis, Syriacis. Stylus saepius bifidus. h

2. *Scheuchzeri*, capitulo subfolioso, bracteis linearibus capitulo longioribus, fol. lanceolatis dentatis. Willd. l. c. Allion. pedem. n°. 428. t. 39. f. 2.

3. *Ph. Scorzoneraefolium*, fol. omnibus oblongis laeviter crenatis, supremis linearibus, spica oblonga. Vill. delph. 2. p. 519. t. 14. f. 2. Hab. in alpinis Helveticis et Pedemuntanis, et in Delphicatis. h

3. *Michellii*, capitulo subrotundo, bracteis oblongo-lanceolatis, fol. linearibus rigidis subintegerrimis. Willd. Ph. spica oblonga, fol. lineari-lanceolatis subintegerrimis. Allion. ped. n.º 427. t. 7. fig. 3. Hab. in monte Cenisio et in alpinis Hetruriae et Valesinae. ¶

4. *hemisphaericum*, capitulo subrotundo, bracteis ovatis ciliatis, fol. linearibus subintegerrimis caule vix breviorib. Willd. Jacq. collect. 2. p. 61. ic. rar. vol. 2. Hab. in Helvetiae, Italiae, Austriae, Hassiae, Pyrenaeis montibus et pratis.

5. *comosum*, fasciculo terminali sessili, fol. densius: radicalibus cordatis. Linn. Barr. ic. 889. Jacq. austr. app. 1. 50. Hab. in Babli, Carniolae et Tyrolensibus montibus. ¶

6. *orbiculare*, capitulo subrotundo, fol. serratis: radicalibus cordatis. Linn. Engl. bot. 1. 142. In alpinis et pratis.

¶ *lanceolata*, fol. omnibus oblongo-lanceolatis. Willd. Vill. Dauph. 2. p. 517. t. 12. f. 1.

¶ *ellipticum*, fol. omnibus oblongo-ellipticis obtusis. Willd. Vill. p. 522. t. 11. f. 2.

¶ *Charmelii*, capitulo rotundo, fol. radicalibus cordatis subdentatis, caulinis linearibus integerrimis. Vill. l. c. t. 11. fig. 3. In rupestribus calcareis. Planta antisyphilitica.

7. *nigrum*, capitulo ovato, bracteis serratis, fol. simpliciter dentatis, radicalibus cordatis, caulinis lanceolatis amplexicaulis. Willd. Schmidt. bohem. 1. n.º 189. Hab. in pratis nemoribusque circa thermas Carolinas. ¶

8. *betonicaefolium*, spica oblonga, fol. simpliciter crenatis, radicalibus lanceolato-cordatis, caulinis lanceolatis. Willd. fol. cordatis oblongis crenatis, spica oblonga. Vill. 518. t. 12. f. 3. Hab. in montibus Delphinatus. ¶

9. *spicatum*, spica elongata, stylis pilosisculis trifidis, fol. radicalibus cordatis duplicato-dentatis. Willd. Flor. dan. 362. Hab. frequens in sylvestribus. Flores albi.

¶ *Rapunculus*, rck. repente crassiuscula, fol. radical. cordatis petiolatis, caulinis oblongis sessilibus, spica ovata. Ph. ovalis. Hoppe. Creac. vere in sylvis. Fl. violacei.

10. *ovatum*, spica ovata, stylis hirsutis flore longioribus emarginato-bifidis, fol. radicalibus cordatis duplicato-dentatis.

W. Schmidt. Fl. bohem. I. n.º 190. Ph. Halleri. Allion. Hab. in pratis subalpinis Sudetorum, Bohemiae, Helvetiae et Pedemontii. ¶

#### \* Flor. axillaribus sparsis.

11. *Lobelioides*, fol. lineari-lanceolatis denticulatis hispidis, caule paniculato flor. geminis pedunculatis sparsis. Willd. phytog. 1. n. 20. t. 4. f. a. Hab. in Armenia.

12. *lanceolatum*, fol. lineari-lanceolatis tenuissime denticulatis scabris, caule basi ramoso, ramis simplicissimis foliosis, flor. sparsis geminatis sessilibus. Willd. l. c.

¶ *canescens*, fol. sessilibus inferioribus obovatis serratis, superioribus lanceolatis integerrimis, flor. axillaribus racemosis. Plant. rar. Hungar. p. 12. t. 14. In Hungariae montibus apicis.

13. *rigidum*, foliis lineari-lanceolatis obsolete denticulatis glabriusculis, caule simplicissimo foliolo, flor. sparsis, pedunc. trifloris. W. Hab. in Oriente.

14. *amplexicaule*, fol. amplexicaulis cordatis ovatis, duplicato-serratis, floribus sparsis. W. Hab. in Oriente.

PETROMARULA. Cal. 5-fidus. Cor. primo ovato, dein 5-partita: laciniis reflexis. Filum. basi dilatata. Stig. capitatum simplex. Germ. globosum. Caps. .

15. *pinnata*, foliis pinnatis, racemo composito. Vent. Hort. Cens. p. 52. t. 52. Linn. Willd. Sp. p. 925. Rapunculus erectus, Petromarula. Bauh. hist. 2. p. 817. t. 812. Hab. in Greis, Oriente, ubi ad muros et rupes frequens crescit.

Obs. Habitu et filamentis cum Campanulae genere, cor. rotata, quamvis facie aliena, cum Phyteumate convenit; sed ab utroque stylo crasso et stig. simplice capitato differt, quare non male ut diversum genus constitui posset.

432. FORGESIA. Cal. turbinatus, 5-fidus. Petala 5. Stigma 2-lobum. Caps. seminifera, stylo 2-partito acuminata. Caps. 2-locularis, polysperma.

1. *borbonica*. Desforgia. Lam. ill. p. 69. t. 125. Forgesia. Juss. gen. p. 181. Hab. in ins. Borbonia. Arbor. Fol. lanceolato-ovata, serrata. Escalloniae Smith affinis. Lam.

433. TRACHELIUM. Cor. infundibuliformis. Styl. longius. Stigma



globosum. *Caps.* trilocularis, infera.

1. *caeruleum*, ramosum erectum, fol. ovatis serratis planis, flor. corymbosis. L. Willd. Sp. p. 926. Barr. ic. 683 684. Hab. in Italiae et Orientis umbrosis. ♂

2. *diffusum*, ramosissimum diffusum, ramis divaricatis recurvis, foliis subulatis. Linn. suppl. 143. Habit. ad Cap. bon. spei.

3. *angustifolium*, erectum, fol. linearib. sessilibus integerrimis glabris. Schousb. mæoe. 1. p. 85. In montosis aridis prope Texam.

4. *tenuifolium*, erectiusculum, foliis linearibus ciliatis hispidis. L. Hab. ad Cap. b. spei.

434. *GOODENIA*. *Cor.* labiata, 5-fida, undulata, longitudinaliter fissâ, genitalia exsertens. *Anth.* lineares. *Stigma* urceolatum ciliatum. *Caps.* 1-2-locul. 2-valv. polysperma, dissepimento parallelâ. *Sem.* imbricata.

1. *ovata*, fol. ovatis denticulato-serratis glabris, pedunc. 3-floris, caps. licari. Smith. Act. Soc. Linn. Lond. 2. p. 347. Willd. Sp. 2. p. 954. Vent. Hort. Cels. 1. 3. Andrew. t. 68. Hab. in Nova Hollandia cum omnibus sequentibus.

2. *paniculata*, fol. obovato-lanceolatis dentatis corollisque pilosis, caule nudiusculo paniculato. Smith. Act. Soc. Linn. p. 348. Cav. ic. 6. p. 5. t. 507?

3. *bellidifolia*, fol. obovatis denticulatis carnosissimis, caule nudiusculo apicato, cor. extus hirsuta, feuctu quadrivalvi. Smith. l. c. p. 349. Flor. Savi.

4. *calendulaecea*, fol. integerrimis obovatis crassis scabris, flor. axillaribus caeruleis. Andrew. Repos. t. 22. Var. sequentis?

5. *stricta*, fol. lanceolatis integris dentatisve carnosissimis glabris, cor. extra hirsuta, stigmate ore contracto. Smith. l. c. Hab. in Novae Hollandiae locis humidis. Flores caerulei.

6. *heterophylla*, fol. integris dentatis lobatisve pilosis, fructu subrotundo, cor. nudiuscula. Smith. l. c. Cav. ic. 6. t. 508.

7. *hederacea*, fol. subrotundis integris quinquelobis, cor. extus laeta, caule prostrato. Smith. l. c.

8? *radicans*, caule repente, fol. spatulatis. Selliera radicans. Cav. ic. 5. p. 49. t. 44. f. 2. Habit. in humidis maritimis Chiloe et in valle Chilensi prope Coquimbo.

Obs. Ob semina imbricata marginata, uti in quibusdam Goodeniis, haec plantam, sed dubitanter, huc retuli, eum auctor de natura pericarpii adhuc incertus sit.

435. *SCÆVOLA*. *Cor.* 1-petala: tubo longitudinaliter fissâ. *Limbo* 5-fido laterali. *Drupa* infera, 1-sperma. *Nux* 2-locularis.

1. *Lobelia*, fol. obovatis glabris integerrimis. Vahl. symb. 2. Lam. encyel. t. 124. f. 1. Willd. Sp. 2. p. 955. *Lobelia Plumieri*. Lin. Jacq. amec. Catech. ear. 1. p. 79. t. 79. Hab. in Indiis. ♀

2. *Koenigii*, fol. obovatis glabris superne dentato-subrepentibus, calyce quinque-dentato. Vahl. symb. 3. p. 36. Lam. ill. t. 124. f. 2. Hab. in India orientali. ♀

3. *sericea*, fol. obovatis villosis mollissimis, superne dentatis. Vahl. symb. 2. p. 37. Habit. in Sauvage Island.

4. *laevigata*, fol. alternis obovatis dentatis glabris, fructu minimo. S. micrucaepa. Cav. ic. 6. p. 4. t. 509. *Goodenia laevigata*. Curt. Mag. t. 287. *Cor.* dilute violacea.

5? *albida*, stylo cauleque piloso. Sm. Act. Linn. 2. p. 348. Willd. Sp. p. 954. sub *Goodenia*. Hab. ad portum Jackson in N. Hollandia.

6. *hispida*, fol. linearibus lanceolatis hispidis, inferioribus dentatis, stylo apice hirsuto, cor. extus pilosa. Cav. l. c. p. 7. t. 510. *Goodenia ramosissima*. Smith. l. c. Cum priore. *Cor.* pariter dilute violacea.

RUBIACEAE (gen. 436-474) constituunt ordinem plantarum valde naturalem et generum ditissimum. Pirimae sunt fruticosae aut etiam herbaceae; folia in his verticillata, in illis opposita, integerrima, stipulis aut vagina ciliari distincta. Flor. plurimum fragrantis, nonnullae odore sunt ingento. *Cor.* tubulosa 2. infundibuliformis. *Staminum* numerus valde variat, maxima parte 5 sunt, plura 4 (talia genera 10 antecedente classi occurrunt), rarius 6 aut plura. Fructus inferus, natura varius: nunc dicocenus s. semina nuda referens, nunc capsularis, plerumque baccatus, passim drupaceus, limbo calycis in plurimis coronatus, 1-2-aut multilocularis. Embryo

(*Coreulum* Just.) oblongus, tenuis, perispermio (albumine. G.) magno corno involutus. Plura rubiacea genera (quod etiam in omni ordine valde naturali locum habet) inter se nimis affinia segre distinguuntur.

436. *CINCHONA*. Cal. campanulatus, 5-dentatus. Cor. infundibuliformis: limbo 5-partito ut plurimum hirsuto. Caps. oblongo-teres, 2-locularis, 2-partibilis: dissepimento parallelo. Sem. numerosa, compressa margine membranaceo cincta.

\* *Staminibus inclinis.*

1. *officinalis*, fol. ovato-lanceolatis glabris, caps. oblongis. Vahl. in Act. Soc. Hist. nat. Haf. 1. p. 17. t. 2. Willd. Sp. 2. p. 957. Lam. enc. t. 64. f. 1. Habit. in Loxa Peruviae. Panicula terminalis; patens trichotoma. Caps. semipollicaris, lineis ob-curvis elevatis. Vahl. h

2. *pubescens*, fol. ovatis basi elongatis subtus pubescentibus, caps. cylindricis. Vahl. l. c. p. 19. t. 2. Hab. in Peru. h +

3. *macrocarpa*, foliis obovatis subtus pubescentibus cossatis. Vahl. l. c. p. 20. t. 3. C. *officinalis*. Linn. suppl. 144. Hab. in regno Santa-Fé. Rami villosi-tomentosi. Cal. campanulatus pubescens. Cor. coriacea pilis adpressis tomentosa. Caps. bipollicaris. h

\* *nitida*, fol. obovatis nitidis, panic. brachiata, cor. albo-purpureis, limbo parum hirsuto. Flor. Per. 2. p. 50. t. 193. Ruiz. quinol. art. 2. p. 56. Hab. in Andium montibus altis, nemorosis, frigidis et in pluribus aliis locis in Peruvia. Fol. glabra, subtus venosa.

*Obs.* Antifebrilis, tonica et antiseptica est. In provincia Huanuci Tarmæ, Huamalies et Xauxæ pro genuino cortice Peruviano, majorique pretio quam reliquæ species venditur. An peculiaris species?

4. *hirsuta*, fol. ovalibus crassis margine reflexis, supra nitidis venosis, subtus pubescentibus: terminalibus subcordatis, flor. corymbosis (purpurascens.) Fl. Per. 2. p. 57. t. 192. Cresc. cum priore, cum qua eodem pretio æstimatur. Caps. obscure purpurea, exsiccatione atra. h

5. *purpurea*, fol. oblongo-ovalib. ovatisq. (purpurascens.) panic. brachiata magna, fl. subcorymbosis, cor. albo-purpureis, limbo hirsuto albo. Flor. Per. 2. p. 52. t. 193.

In Andium montibus imis nemorosis. Caps. oblonga angusta.

6. *ovata*, fol. ovatis subtus tomentosis, panic. brachiata, florib. subcorymbosis. Flor. Per. l. c. t. 195. Cresc. in Andium montibus imis nemorosis calidis versus Pozuzo et Pauso. Fol. subtus venis purpurascens. Cor. pubescens limbo patente albo. h

7. *lanceolata*, fol. lanceolato-oblongis glabris, panic. brachiata magna, flor. subcorymbosis. Fl. Per. 2. p. 51. In Andium montib. frigidis et nemorosis. Cor. roseo-purpurea, limbo hirsuto. Cort. extus fuscus, intus lutescens.

8. *magnifolia*, fol. oblongis ovalibusque glabris, panic. brachiata, flor. subcorymbosis, cor. albae limbo villosiusculo. Flor. Per. 2. p. 53. t. 196. Cresc. in Andium nemorib. calidissimis prope torrentes. Cor. odorata uti *Citrus Aurantium*. Arbor fere 40-ulnaris, coma valde frondosa, erecto patens. Caps. oblonga magna.

9. *acutifolia*, fol. ovatis acutis, panic. terminalibus brachiata, cor. candida glabris. Flor. Per. 3. p. 1. t. 225. Hab. in Peruviae Andium nemorosis. Filam. medio tubi inserta; Anth. inclusæ. Capsula turbinata.

10. *micrantha*, fol. ovalibus obtusis, panic. maxima, flor. nemorosis parvis, cor. albae limbo lanato. Flor. Per. 2. p. 52. t. 194. Cum priore in montibus aliis frigidis. Arbor 23-ulnaris.

11. *glandulifera*, fol. ovato-lanceolatis supra glandulosis, panic. subcorymbosis, cor. albido-rosceis limbo lanuginoso. Flor. Per. 3. p. 1. t. 224. Cresc. in locis sæpe memoratis. Frutex 2-orgialis.

12. *dichotoma*, fol. oblongo-lanceolatis, pedunculis terminalibus dichotomis paucifloris, caps. angustis linearib. longis. Flor. Per. 2. p. 53. t. 197. Cort. fuscus, maculis albis variegatus, amarissimus.

13. *rosea*, fol. oblongis obtuse acuminatis, panic. brachiata, flor. corymbosis. cor. fauce glabra, limbo margine tomentoso. Flor. Per. 2. p. 54. t. 199. In Andium nemoribus imis, copiose ad Pozuzo etc. tractus. Filam. basi hirsuta, infra medium tubi inserta. Anth. parum exsertæ. Fol. palmaria, nitida, a formicis quibusd. exiguis avide appetuntur.

\*\* *EXOSTOMA*, *Staminibus exsertis.*

14. *philippica*, fol. ovatis glabris, flor. corymbosis, pedunc. trifidis, anth. ex-

vis. C.v. ic. 4. p. 15. t. 329. Hab. prope Manila in St. Cruz. Née. Arbor humilis.

15. *longiflora*, pedunc. axillaribus 1-floris, fol. lineari-lanceolatis glabris, cor. tubo longissimo. Lambert de Cinchona. p. 38. t. 12. C. caribaea. Journ. de Phys. Oct. 1790. p. 243. t. 1.

Obs. Cinchona spinosa ejusdem auctoris hoc ad genus non pertinere videtur.

16. *caribaea*, foliis ovato-lanceolatis, pedunc. axillaribus terminalibusque unifloris, stamin. exsertis. Swartz. obs. 72. Jacq. amer. Cinchona jamaicensis. Wright. in Act. angl. vol. 67. p. 504. t. 10. Hab. in Caribaeis. h

17. *corymbifera*, fol. oblongo-lanceolatis, corymbis axillaribus. Linn. suppl. 144. Forst. in Act. ups. nov. 3. p. 176. Habit. in ins. Tongatabu et Eaove maris pacifici. Folia palmaria saturate viridia, nervo subtus purpureo. Corymb. trichotomus magnus. h

18. *lineata*, panic. terminali, fol. ovatis acuminatis glabris lineatis, caps. pentagonis. Vahl. l. c. p. 22. t. 4. Habit. in St. Dominica. h

19. *floribunda*, panic. terminali, caps. turbinatis laevibus, fol. ellipticis acuminatis. Vahl. p. 23. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 375. Lam. enc. t. 164. f. 2. Cinchona montana. Badier. Roz. Journ. de Phys. Feb. 1789. p. 229. Ust. et Koem. Mag. de Bot. 6. p. 96. t. 3. Hab. in Jamaica, Hispaniola, St. Lucia, Dominica et Guadeloupe locis montosis et ad torrentum ripas. h

20. *brachycarpa*, panic. terminali, caps. obovatis costatis, foliis ellipticis obtusis. Vahl. p. 25. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 378. Hab. in montibus umbrosis Jamaicae occidentalis. Caps. obovata lineis 10 elevatis costata. Vahl.

21. *angustifolia*, flor. paniculatis glabris, caps. oblongis pentagonis, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 380. et in Act. holm. 1787. p. 117. t. 3. Lam. t. 164. f. 3. Hab. in Hispaniola ad ripas petrosas fluviorum. h

Obs. Auctores Florae Peruvianae, vol. 2. p. 49. de speciebus hujus subdivisionis censent, eas ad genus, *Portlandia* referri debere.

437. *COSMIBUENA*. Cal. deciduus, 5-dentatus. Cor. tubus longissimus: limbo reflexo obliquo glabro. Stam. infra faucem inserta.

Caps. apice bivalvis; valvulis involutis subbilocularis. Recept. lamellata hinc valvulis adpressa, inde seminifera. Sem. ovalia, cincta alba lineari reticulata.

1. *obtusifolia*, fol. ovalibus obovatisque obtusis, flor. corymbosis. Flor. Per. 3. p. 3. t. 198. Cinchona grandiflora. Flor. Per. 2. p. 53. Cresc. ad Pozuzo ripas. Cor. candida, fragrantissima. Arb. 3-orgyalis.

2. *acuminata*, fol. ovalibus acuminatis, flor. solitariis sessilibus. Flor. Per. l. c. p. 4. t. 206. Hab. in Peruviae Andium nemorosis imis. Arbor 5-alnaris.

438. *PINKNEA*. Cal. laciniae inaequales: 1-2 bractaeformibus magnis. Cor. longe tubulosa. Filam. basi tubi inserta. Caps. superne 2-valvis: valv. medio septiferis. Sem. alata, transverse invicem superposita.

1. *pubescens*, fol. ovalibus subtus tomentosis, flor. fasciculato-paniculatis. Michaux Flor. 1. p. 205. Hab. ad Georgiae ripas fluvii St. Mariae. Subarborescens. Cinchonae affinis.

439. *PORTLANDIA*. Cal. 5-phyllus. Cor. clavato-infundibuliformis: laciniae patenti-deflexis. Caps. 5-gona, retusa, coronata, 2-locularis, 2-valvis: valv. duplicatis 2-fidis, polysperma.

1. *tetrandra*, flor. tetrandris. fol. obovatis. Forst. prod. n.º 86. Willd. Sp. 2. p. 935. Lin. suppl. 143. In insula Savage Island maris pacifici. Cor. tetragona. h

2. *graniflora*, flor. pentandris, foliis lanceolato-ellipticis. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 385. Smith. ic. pict. l. p. 6. t. 6. Brown. jam. 164. t. 11. f. 1. Habit. in Jamaicae rupibus calcareis. Cor. Datu-rae. h

3. *coccinea*, florip. pentandris, foliis ovatis coriaceis. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 384. Hab. rarius in Jamaicae occident. praecipitibus montium. h

4. *corymbosa*, flor. corymbosis, fol. ovatis acutis lanceolatisque, stipulis subovatis, flor. pentandris. Flor. Peruv. 2. p. 49. t. 190. f. 2. Hab. in Andium praeruptis, locis calidis. Cor. calycis 4-plo longior. h

440. DANAIS. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: fauce villosa. *Stylus* apice bifidus. *Caps.* globosa, umbilicata, 2-locularis, apice 2-valvis, polysperma. *Sem.* margine membranaceo. (Genitalia exerta.)

1. *fragens*, (deoudata), fol. lanceolatis, flor. dioicis, caps. calyce deciduo denudatis. *Paederia fragrans*, Lam. enc. 2. p. 267. t. 166. f. 2. Willd. Sp. 2. p. 1219. Hab. in ins. Madagascaria, Mauritii et Bourbonia. Planta scandens, uti sequentes. Rad. rubra.

2. *coronata*, capsul. laevibus calyce persistente coronatis. An distincta species?

3. *sulcata*, fol. ovatis, caps. sulcatis cal. subfoliaceo coronatis. In ins. Mauritii, ubi altissimas arbores scandit. h

*Obs.* Vidi has species in Herbario dom. Anbert du Petit Thouars, qui eorum characteres ex observationibus in locis natalibus institutis mecum communicare voluit. Hoc genus *Cinchonis* affine et ab iis caps. globosis praecipue differt.

441. GENIPA. *Cal.* tubulosus aut turbinatus subinteger. *Cor.* hypocrateriformis, limbo magno 5-partito. *Anth.* in fauce sessiles exsertae. *Stigma* clavatum, integrum s. simplex. *Bacca* (magna) carnosa, apice attenuato-truncata, 2-locularis, polysperma.

1. *oblongifolia*, fol. oblongo-ovatis subsessilibus, racemis terminalibus. *Flor.* Per. 2. p. 67. t. 220. f. 2. Hab. in Peruv. Andium nemorib. imis calidis. Bacca mali persici magnitudinis, ex cujus pulpa et seminibus Indi colore nigro persistente faciem manusque inficiunt. Etiam liquum, colore roseum, utilissimum est.

2. *americana*, (grandifolia), foliis lanceolatis subsessilibus integris Lin. *Gardenia* Genipa. Swartz. obs. p. 84. Willd. Sp. 2. p. 1223. Plum. Sp. ic. 136. Hab. in Amer. meridionali. Arbor, florens Junio. Fruct. citri magnitudinis, edulis.

*Obs.* Hoc genus a *Gardenia* inter alia stigmate clavato nec bilamellato distinguendum, hinc omnes *Gardeniae* tali gaudentes stigmate, huc referri debent. An hujus generis *stylocoryna*. Cav. ic. 6. p. 21. t. 16?

3. *Merianae*, tota hirsuta, fol. oblongo-

obovatis, florib. in summitate congestis, fructu depresso-globoso. Richard in Act. Soc. Nat. Paris. p. 107. Hue Duroia Ericipila. Lin. suppl. Hab. in Cayenna.

4. *edulis*, glaberrima, foliis oblongis, flor. in summitate congestis, plurimumque 4-fidis; fructu globoso lacvi. Richard l. c. Cum priore.

442. GARDENIA. *Cal.* laciniis verticalibus aut obliquis. *Cor.* primo contorta, infundibuliformis 5-q-fida: tubo saepius longo. *Stylus* elevatus. *Stigma* bilobum. *Bacca* 2-locularis, polysperma. *Sem.* duplici serie disposita. *Anthera* ori tubi inserta.

#### \* *Inermes.*

1. *radicans*, inermis, fol. lanceolatis, cor. hypocrateriformibus obtusis, calyce angulato, caule radicante. Willd., Sp. 2. p. 1225. Thunb. Diss. de *Gardenia* n. 1. t. f. 1. et ejusd. Diss. acad. 2. p. 4. Hab. in Japonia. h

2. *florida*, inermis, fol. ellipticis, cor. hypocrateriformibus, calycinis laciniis verticalibus lanceolato-subulatis. Ait. Kew. 1. p. 293. Lin. suppl. 163. Eluret. pict. t. 15. Rumph. 7. t. 14. f. 2. Habitat in India orientali, Surate, Amboina et Cap. bon. spei. *Flor.* solitarii, magni, odori. h

3. *longiflora*, inermis, fol. lanceolatis, cor. longissimis hirsutis acutis, bacca cylindrica. *For.* Peruv. 2. p. 67. t. 219. f. 2. Hab. in Andium nemoribus imis calidis ad Pozuzo. Fruct. 2. orgyalis, valde ramosus. *Bacca* lutea, 1 1/2-palmaris, pulpa dulci eduli.

4. *tubiflora*, inermis, fol. ellipticis undulatis, flor. ternis, cor. lacinis linearibus reflexis: tubo gliformi longissimo. Andr. t. 183. Hab. in Sierra Leone. Odor fragrantissimus.

5? *Thunbergia*, inermis, foliis ellipticis otrinque acuminatis, cor. hypocrateriformibus, cal. latere rumpentibus, laciniis apice dilatatis cucullatis. Ait. Kew. 1. p. 294. Thunb. Diss. de *Gardenia* n. 3. *Thunbergia* capensis. Mont. Act. holm. 1773. p. 282. t. 11. Habitat ad Cap. b. spei et in Manilla. *Cal.* appendiculatus laciniis cucullatis. *Cor.* limbus planus decempartitus. Filum. o. *Anth.* g. t. 10. *Stigma* oblique truncatum, 5-sulcatum, sulcis reflexis emarginatis. An potius peculiare genus?

6. *latifolia*, inermis, fol. obovato-sub-

rotundis, cor. hypocrateriformibus, lacinii calycinis subulatis obtuse carinatis. Ait Kew. 1. p. 234. H. in montibus Indiarum orientalis. h

7. *clusiaefolia*, inermis, caule erecto, fol. obovatis emarginatis, panic. terminali, lacinii corol. cuspidatis. Willd. p. 1227. Jacq. collect. append. p. 37, t. 4. f. 3. Gaesb. carol. 1. p. 59. t. 59. Habit. in insulis Bahamensibus. h

8. *gummifera*, inermis, foliis oblongis obtusis hirtis, stipulis subulatis, lacinii calycinis ovatis brevissimis, tubo recto. Lin. suppl. 164. Thunb. Diss. de Gard. n. 4. t. 2. f. 3. Hab. in Zeylona. Ex rimis corticis et foliis sudat Gummi-resina, Gummi Elemi similima. h

9. *Mussaenda*, inermis, foliis ovatis acutis, stipulis mucronatis, lacinii calycinis subulatis compressis, tubo incurvato h. rto. Lin. suppl. 163. Mussaenda formosa Jacq. amer. 70. t. 48. Ed. picta t. 70. Hab. in Carthagenae sylvis. Fol. subpubescentia. h

\* *madagascariensis*, inermis, foliis ovatis utrinque glabris, flor. axillaribus sessilibus solitariis longe tubulosos externe tomentosis. Lam. enc. 2. p. 608. Hab. in Madagas.: Antecedenti affinis.

10. *Rothmannia*, inermis, fol. oblongis, stipulis subulatis, lacinii calycinis subulatis teretibus longitudine tubi, tubo glabro ampliato brevi. Lin. suppl. 165. Th. in Act. botan. 1776. p. 65. t. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Flores suavescentes, imprimis nocte. h

#### \*\* Spinosae.

11. *uliginosa*, spinosa, ramis apice spinosis, cor. intus tubo hirsutis. Retz. obs. 2. p. 14. Hab. in paludosis Indiarum. h

12. *armata*, spinosa, spinis ramulorum terminalibus quaternis, lacinii calycinis linearibus cuneiformibus, flor. aggregatis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 524. Jacq. amer. 70. Hab. in Martinicae et Caribaeanae sylvis. h

13. *micranthus*, spinosa, fol. ellipticis utrinque acutis spinis longioribus, florib. sessilibus, corol. glabris. Willd. Thunb. Diss. 1. t. 2. f. 2. Hab. in China et Zeylona. h

14. *multiflora*, spinosa, spinis fol. brevioribus uncinatis, fol. ovalibus acuminatis, flor. cymoso-umbellatis. Willd. Sp. 2. p. 1231. Randia longiflora. Lam. enc. 3. p. 25. ill. t. 156. f. 3. Hab. in India orientali. Tubo longo, stigmatibus et antheris

ad faucem corol. cum Gerdaniis magis convenit.

443. *MUSSAENDA*. Cor. infundibulif. Stigmata 2, crassiuscula, Bacca oblonga, 2-locularis, polyperma. Sem. quadrifariam disposita. Stam. tubo interne inserta.

1. *frondosa*, ramis foliisque ramorum et paniculae villosis. Vahl. symbol. 3. p. 37. Willd. Sp. 2. p. 997. Burm. zeylan. 165. t. 76. Rumph. 4. t. 51. Rheed. 2. t. 18. Hab. in India. Bractea alba enata in folium album, ellipticum, nervosum, panicula longius. L. h

2. *glabra*, ramis foliisque ramorum et paniculae glaberrimis. Vahl. l. c. p. 38. In India orientali. Rumphii folium principissae huc pertinere videtur. Vahl. h

444. *RANDIA*. Cal. 5-partitus: lacin. lineari-lanceolatis contortis. Cor. hypocrateriformis: tubo cal. vix longior. Stigma bilobum: lobis oblongis, inaequalibus. Bacca dissepimento incompleto, semibilocularis, cal. tubuloso coronata. Sem. plurima, per 4 series alternatim superimposita.

1. *obovata*, spinis oppositis, fol. obovatis acutis. Flor. Per. 2. p. 68. t. 220. f. h. Hab. in Peruviae Andium praeruptis calidis. Bractee 7 sub singulo flore.

2. *rotundifolia*, spinis ramisque subverticillatis, foliis subrotundis ovatisque rugosis. Flor. Per. 1. c. Cresc. in Peruv. nemoribus. Stipul. intrafoliaeae membranaceae folvae.

3. *latifolia*, fol. spatulato-ovalibus, spinis in apice fol. multo brevioribus. Lam. enc. 3. p. 25. Randia aculeata. Lin. Gardenia Randia. Willd. Sp. p. 1230. Brown. Jam. t. 85. f. 1. Habit. in Antillis, Jamaica etc.

4. *mitis*, subinermis, fol. subovalibus. Lin. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 528. Sloan. Jam. hist. 2. p. 18. t. 161. f. 1. Cum priore.

5. *parvifolia*, fol. obovatis fasciculatis spinis subbrevioribus. Lam. l. c. p. 25. Sloan. l. c. 2. p. 100. t. 207. f. 1. Cresc. in Jamaica, St. Domingo. Magis spinosa.

6. *parviflora*, fol. ovatis petiolatis spinis

nis arcuatis brevissimis, flor. pedicellatis subfasciculatis axillaribus. Lam. l. c. *Gardenia micranthus*. Thunb. Willd. Spec. 2. p. 1230?

445. *CANTHIUM* M. Cal. 5-fida. Cor. 5-fida, patens. Stylus elevatus. Stigma capitatum aut clavatum. Bacca corticosa, 2-locularis, 2-sperma. Sem. hinc convexa, inde plana: sulco longitudinali.

\* *Spinosa, stigma capitato.*

1. *chinense*, spinosa, floribus sessilibus hirsutis. *Gardenia spinosa*. Thunb. Willd. Sp. 2. p. 1229. In China.

2. *coronatum*, spinosum, fol. ovato-unciniformibus obtusis, laciu. calycinis foliaceis, bacca coronatis. Lam. enc. 1. p. 602. *Gardenia spinosa*. Lin. suppl. Pluck. alm. t. 98. Gard. demetorum. Ait. Willd. l. c. f. 6. Habit. in India. Horride spinosa.

3. *parviflorum*, foliis ovatis petiolatis apicis vix longioribus, densibus calycinis acutis brevissimis bacca nudis umbilicatis. Lam. l. c. Roxb. Corom. 1. p. 39. t. 51. fl. fol. majoribus et acutioribus. Pluck. l. c. f. 3. *Webera tetrandra*. Willd. Sp. 2. p. 1224. Habitat in India orient. Radix dicitur amara, rubra, odore grato.

4. *pedunculare*, spinosum, fol. ovato-acutis subsessilibus, peduncul. folio longioribus. Cav. ic. 6. p. 21. t. 436. In Insul. philippicis.

\*\* *Curia, inermis, stigma clavato.*

5. *corymbosum*, inerme, fol. oblongis acutis, corymbo terminali. Willd. l. c. sub *Webera*. *Rondeletia asiatica*. L. Cupi. Rheol. mal. 2. t. 23. In Malabar et Zeylona. h

6. *cymosum*, inerme, fol. ovatis acuminatis, cymis multifloris axillarib. *Webera cymosa*. W. Hab. in India orientali. Arb. ramis pubescentibus. Stigm. capitato-bilobum. W.

Obs. An posteriores duae hae species revera hujus generis? Notum *Webera* caeterum inter ruscas, a pluribus jam adoptatum, conservandum est.

446. *ERITHALIS*. Cal. urceolatus. Cor. 5-partita: laciniis recurvis. Bacca 10-locularis, 10-sperma.

1. *fruticosa*, (odorata), fol. obovatis,

cymis compositis pedunculatis. Willd. Sp. 2. p. 996. E. odorifera, arborea erecta, Jacq. amer. pict. t. 260. f. 20. Plum. ic. t. 249. f. 2. *β. inodora*, fruticosa procumbens. Jacq. Hab. in Jamaica, Martinica. *β.* in Curacao.

2. *polygama*, fol. obovatis, flor. axillaribus: in masculis cymosis, hermaphroditis solitariis. Forst. prod. n.º 101. *β.* Rumph. 3. t. 140. Hab. in insula Societatis.

447. *GUETTARDA*. Cal. integer, obsolete dentatus, aut crenatus. Cor. tubulosa, limbo 5-9-fida. Stigma capitatum. Drupa nucis sulcata 5-passim 2-locularis. (Stam. 4, 5, 6, 7 et 9.)

1. *speciosa*, fol. ovatis utrinque nudis, cor. subnovefidis. Lam. enc. 3. p. 53. t. 154. f. 2. Lin. syst. veg. p. 899. Rheede 4. t. 47 et 48. Hab. in India, Malabar et ins. Java. Flores Nychotit, longe pedunculati. Cor. 7-9-fida. Siam. eodem quoque numero variat. Arbor meliocris. Fol. laeviuscula.

2. *argentea*, fol. ovatis subtus argenteis pubescentibus, venis transversis, cor. subsexfidis. Lam. l. c. t. 154. f. 1. Halesia arboreascens. Brown. jam. t. 20. f. 1. Hab. in Jamaica et Cayenna. Flores externa tomentosi. Drupa pubescens, 6-locular. h

3. *Mathiola*, fol. obovatis mucronatis scabris, subtus venosis pubescentib., flor. sub-6-andris. Guettarda scabra Vent. Choix de Plant. t. 1. Lam. l. c. f. 3. *Mathiola scabra*. Lin. Habit. in America.

Obs. Linnaeus secundum figuram Plummeri, naturae incongruam, corol. dicit 1-petalum. Cor. 5-6-fida. Stam. 5, 6, 7.

4. *rugosa*, fol. subcordatis ovatis acutis scabris subtus tomentosis, flor. 6-andris. Swartz. prodr. p. 59. Flor. ind. occ. 2. p. 632. Vahl. symb. 3. p. 50. Habit. in ins. Antigua, Dominica etc. Flor. parvi. Fol. superno aspera. Drupa. coccinea.

5. *elliptica*, fol. ellipticis, flor. 4-andris. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 614. Cresc. in Jamaicae campesribus siccis. Drupa umbilicata, 4-sperma. Pedunculi axillares. h

6. *membranacea*, fol. ovatis acuminatis membranaceis hispido-scabris, flor. tetrandris. Swartz. l. c. p. 635. In Hispaniolae fructibus montosis. Racemi terminales. Drupa oblonga, 4-sperma. Cal. tubulato-coronata.

7. *parviflora*, fol. oblongis glabris laciniatis, pedunc. trifloris subpentandris. Vahl. Eclog. a. Lam. ill. t. 154. f. 4. Hab. in ins. St. Crocis et in Monserrat.

Obs. Secundum v. Rohrsp. Vahl. *Edechi* Loëd. huc pertinet.

8. *odorata*, fol. confertis parvulis subovatis acutis glabris, floribus lateralibus subracemosis, *Laugeria* odorata. Swartz. Willd. Sp. 2. p. 1081. *Laugieria* odorata. Jacq. amer. t. 177. f. 21 et Ed. picta t. 259. f. 16. Hab. in Carthagenae et Havanae arbutis apricis maritimis.

9. *hirsuta*, fol. oblongis acutis, spicis longis multifloris revolutis, cor. laciniis embriato-plicatis, fructibus pentagonis, *Laugeria* hirsuta. Flor. Per. 2. p. 22. t. 145 f. a. Hab. in Peruv. nemorib. Arb. 30-ularius. Bract. magnae. Fol. subtus pubescentia venosa venosissima.

10. *crispiflora*, fol. ovatis acuminatis nervosis, subtus villosis, lacin. corol. crispatis. Vahl. Eclog. amer. Fasc. 2. t. 6. Habit. versus summities montium in ins. Montserrat. h

♂? *dependens*, fruct. 3-gonis. Flor. Per. l. c. sub *Laug.*

\* *LAUGERIA. Drupa subrotunda, 2-sperma.*

11. *Lucida*, fol. oblongis obtusis integris membranaceis nitidis, racemis dichotomis, drupis nucibus bilocularibus. Sw. Fl. ind. occ. t. p. 475. Vahl. symb. 3. p. 40. t. 57. Habit. in fruticetis Jamaicae calidioris, ins. St. Luciae et St. Crucis. h

12. *tomentosa*, fol. ovatis acutis integris subtus tomentosis, racemis dichotomis, drupis nucibus bilocularibus. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 477. Facie Tournefortii similis. Hab. in fruticetis Jamaicae occid. h

13. *coriacea*, fol. elliptico-ovatis subcoriaceis utrinque glabris obtusiusculis, spicis bisidis, flor. tetrandris. Vahl. ecl. 2. p. 26. Habit. in insula Montserrat ad summities montium. h

14. *resinosa*, fol. lato-lanceolatis glabris, subtus glaucis, spicis axillaribus bisidis, ramis apice resinosis. Vahl. l. c. p. 27. Hab. in altis montibus insulae Montserrat. h

Obs. Variant species *Laugeriae* quoad numerum loculamentorum putaminis, saepe maturitate unum vel alterum quoque evanescit. Genus a Guettardis parum diversum, et forte non absonum foret cum eo conjungere. Vahl.

448. *SCHRADERA. Involucr. universale* multiflorum. Cal. superus urceolatus. Cor. 5-6 fida, campanulata, fauce hirsuta. *Bacca* polysperma. (Stam. 5-6.)

1. *capitata*, involuero dentato, calyce integerrimo, fol. obtusis. Willd. Sp. II. p. 238. Vahl. ecl. 1. p. 35. t. 5. *Urcularia* exotica. Gmel. syst. 2. p. 390. Habit. in ins. Montserrat. Frutex scandens parasiticus. Involuerum coriaceum circiter 15-florum. Numerus partium floris a 5-6. h

2. *cephalotes*, (jamaicensis), involuero integerrimo, cal. dentato, fol. acuminatis. Willd. l. c. *Fuchsia* involucreta, Swartz. Fl. ind. occ. 2. p. 674. Hab. in sylvis et montibus Jamaicae interioris. Involuerum 8-florum. Numerus octonarius frequentissimus est, rarius 5-7-9-10-arius. W. h

449. *MORINDA. Flores* in globum collecti supra receptac. sphaericum. Cal. sub-5-dentatus. Cor. subinfundibuliformis, 5-fida, patens. *Baccæ* aggregatae, obmutuam compressionem angulatae, apice retusae, 2-spermae.

1. *umbellata*, erecta, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. confertis. Linn. Willd. Sp. 2. p. 991. Hab. in India. h

2. *citrifolia*, arborea, pedunc. solitaria. Lin. Rumph. amb. 2. p. 158. t. 99. Rheede. 1. t. 52. Cum priore.

♂? *angustifolia*. Badendus angustifolia. Rumph. 3. p. 157. t. 98. h

3. *Royoc*, procumbens. L. Jacq. hort. 1. t. 16. *Royoc* humifusum, fructu compresso. Plum. Spec. 2. t. 26. Hab. in Amer. calidior. h

450. *NAUCLEA. Cal.* sub-5-dentatus. Cor. infundibuliformis. Caps. subtrigona bilocularis, polysperma. Flor. in globum collecti supra Recept. commune globosum pilosum.

1. *orientalis*, fol. oblongis acutis, pedunc. aequalibus, stam. longitudine cor. Willd. Sp. 2. p. 928. Cephalanthus fol. oppositis. Lin. Flor. zeylan. 51. Rheede. mal. 3. p. 29. t. 33. Hab. in India orient. Capitula florum magnitudine pomi minoris, flava. Stigma pyramidatum. W. h

2. *purpurea*, fol. oblongis utrinque attenuatis, pedunc. incrassatis, staminibus

inclusis. Willd. l. c. Roxb. coromand. t. p. 41. t. 54. *Cephalanthus chinensis*, Lam. enc. 1.<sup>a</sup> p. 671. Rumph. amb. 3. p. 84. t. 55. Hab. in India orientali. Similis praecedenti. Stigma capitatum. W. h

3. *parviflora*, fol. ellipticis obtusiusculis, staminibus longitudine tubi cor. dentibus calycinis brevissimis acutiusculis. Willd. p. 939. Roxb. corom. 1. p. 40. t. 52. Hab. in India orientali. Stigma cylindraceo-capitatum. W. h

4. *africana*, fol. oblongo-ovatis acuminatis, stam. tubo cor. longioribus reflexis, dentibus calycinis brevissimis subrotundis. Willd. *Uncaria inermis*. Willd. in *Usteri delect.* 2. p. 199. t. 3. Hab. in Guinea. h

5. *aculeata*, fol. ovatis acutis, caule aculeato. Willd. *Uncaria aculeata*. Willd. in *Usteri delect.* 2. p. 200. N. *guyanensis*, spinis aduncis, capit. subternatis. Enc. bot. 4. p. 436. t. 153. f. 2. *Ouroparia gujanensis*, Aubl. guj. 1. p. 177. t. 68. Hab. in sylvis Gujanae. Caulis tetragonus aculeis magnis oppositis recurvato-uncinatis obsitus. W. h

6. *cordifolia*, fol. subrotundo-cordatis, capitulis pedunculatis axillaribus. Willd. Roxb. corom. 1. p. 40. t. 53. Habit. in montosis Indiae orientalis. Stigma clavatum. h

*Obs.* Totum genus a *Cephalantho* viz nisi numero diversum. W.

451. *CANEPHORA*, *Cal.* communis tubulosus, multiflorus: *Proprius* 5-fidus, *Cor.* campanulata subaequalis. *Caps.* coronata, 2-locularis.

1. *axillaris*, fol. subrotundo-ovatis, flor. solitariis axillaribus. Willd. Sp. pl. 2. p. 976. Lam. ill. gen. t. 151. f. 1. Hab. in Madagascaria.

2. *capitata*, fol. lanceolatis, floribus terminalibus aggregatis. Willd. l. c. Lam. t. 151. f. 2. Cum priore.

452. *CEPHELIS*, *Flor.* capitati involuerati. *Cal.* 5-d-ntatus. *Cor.* tubulosa. *Stigma* 2-partitum. *Bacca* disperma. *Receptaculum* paleaceum. *Invol.* 1-5-polyphyllum.

1. *violacea*, capitulis globosis terminalibus, involuero pentaphyllo, fol. nervosis glabris. Swartz. *Flor. ind. occ.* 1. p. 479. Willd. p. 977. Aubl. t. 60. Hab. in Gujana et India occident. h

2. *tomentosa*, hirsuta, capitulis pedunculatis axillaribus terminalibusque, involucri diphyllo cordatis acuminatis. Vahl. *eclog.* 1. p. 19. *Tapogomea*. Aubl. guj. 1. p. 160. t. 6. Hab. in sylvis Gujanae, inque insula Trinitatis. h

3. *punicea*, glaberrima, capitulis terminalibus erectis, involucri diphyllo. Vahl. *eclog.* 1. p. 19. Hab. in Jamaica. h

4. *elata*, capit. globosis terminalibus, pedunc. elongatis, involuero diphyllo, fol. glabris. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 437. In montibus Jamaicae australis. Involucrum 2-phyllum: foliol. magnis. h

5. *axillaris*, capit. axillarib. sessilibus. Swartz. l. c. p. 441. Hab. in insula St. Christophori. h

6. *purpurea*, capit. terminalibus nudis, fol. oblongis pictis subtus villosis, caule repente tomentoso Willd. p. 978. *Tapogomea purpurea*. Aubl. guj. 1. p. 162. t. 63. f. 3. Habit. in sylvis remotis Gujanae. h

7. *alba*, capitulis terminalibus nudis, foliis ovatis subtus pubescentibus, caule repente glabro. Willd. Aubl. l. c. t. 62. f. 4. Hab. in sylvis remotis Gujanae.

8. *glabra*, capitulis terminalibus nudis, fol. oblongis glabris, caul. erectis, ramulis villosis. Willd. p. 979. Aubl. p. 162. t. 63. Hab. in Gujana. h

9. *involucrata*, (*carapichea*), capit. terminalibus globosis, involuero tetraphyllo inaequali, fol. oblongis acuminatis. Willd. *Carapichea gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 168. t. 64. Hab. in sylvis ad ripas Gujanae. Stain. exerta et fruct. capsularis. An distincti generis?

10. *sessiliflora*, (*Patabea*), capitulis terminalibus globosis sessilibus nudis, flor. tetrandris. Willd. l. c. *Patabea coccinea*. Aubl. guj. 1. p. 110. t. 43.

11. *muscosa*, capitulis subrotundis sub sessilib. terminalib., palcis dentatis. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 442. *Morinda muscosa*. Jacq. amer. p. 65. t. 45. Habit. in Martinicae sylvis montium et ad fluviorum ripas. h

12. *bubalina*, capitulis terminalib. pedunculatis, fol. oblongis glabris. Linn. suppl. sub *Lonicera*. Hab. ad Cap. b. sp. Cal. hirtus dentibus recurvis. Cor. hirta Symphyti.

*Obs.* Ob affinitatem, quae terminandum ill. Jussieu, (vil. Ej. gen. pl.), extat inter hanc et antecedentem plantam, forte genere a



*Cephaelibus separandam*, sub hoc genere militet, donec accuratius inquisita sit; saltem non *Lonicera* est.

13. *emetica*, herbacea procumbens, fol. lanceolatis glabris capitulis axillaribus, pedunculatis paucifloris. Lin. suppl. p. 144. sub *Psychotria*. Willd. Sp. pl. 2. p. 368.

*Obs.* Haec species in Act. Soc. Linn. Lond. v. 6. p. 137. t. VI. sub peculiari genere: *Callicocca* proposita, secundum observationes cl. Richardi huc potius pertinet.

453. *BERTIERA*. *Cor.* 5-fida. *Stigma* 2-lamellatum. *Bacca* 2-locularis polysperma.

1. *guyanensis*. Vahl. symb. 3. p. 33. Aubl. guj. t. p. 180. t. 69. Lam. ill. t. 165. Hab. in sylvis Gujanae et Cajennae. Fructus ramis tomentosis. Flor. paniculati. h

454. *DUHAMELIA*. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 5-locularis, infera, polysperma. (Racemi partiti: flor. secundis.)

1. *patens*, ramis sulcatis, fol. 3-4-oblongo-lanceolatis pubescentibus, floribus cymosis secundis. Flor. Per. 2. p. 68. t. 221. f. 2. Jacq. amer. pict. p. 39. t. 72. Lam. enc. 3. p. 65. Willd. Sp. 2. p. 980. Hab. in sepibus montosis Hispaniolae et in Peruviae Andium nemoribus ac in Poturo versuris. Cal. ruber. h

2. *sphaerocarpa*, ramis teretibus, fol. ternis oblongis utrinque hirsutis, floribus subcorymbosis. Flor. Per. 1. c. t. 221. f. b. Cresc. in Peruviae nemoribus. Corolla croceo-punicea. h

3. *axillaris*, subherbacea, racemis axillaribus, flor. subsecundis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 443. Hab. in Jamaicae, Hispaniolae fructetis saxosis juxta rivos. h

4. *Chrysantha*, racemis terminalibus, fol. oblongis cuneatis acuminatis glaberrimis, flor. pedicellatis. Swartz. l. c. p. 444. Jacq. ic. rar. 2. t. 335. Plum. amer. 212. t. 218. f. 1. In fructetis montosis Jamaicae occid. et ad Caracas.

5. *ventricosa*, racemis terminalibus axillaribusque, cor. campanulatis ventricosis, fol. ternis. Swartz. p. 446. Ham. grandiflora. L'Her. vert. angl. 4. t. 7. Hab. in Jamaicae collibus et fructetis aridis. h

6. *glabra*, fol. utrinque glabris, fructibus congestis sessilibus. Lam. enc. 3. p.

65. *Amajoua gujanensis*. Aubl. guj. 2. sup. 13. t. 375. Hab. in sylvis Gujanae. h

455. *SABICEA*. *Involucrum* 2-4-phyllum. *Cor.* hypocraterif. 5-infundibulif. *Stigma* 5-partitum. *Bacca* 5-locularis, polysperma. (Numerus partium passim quaternarius.)

1. *hirta*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, flor. pedunculatis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 450. Schwenkfeldia. Willd. Sp. 2. p. 982. Hab. in Jamaicae. h

2. *cinerea*, fol. oblongis acutis tomentosis, subtus incanis, flor. subsessilibus. Swartz. p. 452. Aubl. guj. 1. p. 192. t. 75. Habit. in sepibus Cajennae, Gujanae. h

3. *aspera*, caule volubili, fol. ovatis acutis asperis subtus villosis. Aubl. guj. 1. p. 197. t. 76. Hab. in Gujana ad fluviorum ripas. h

4. *umbellata*, fol. ovatis acutis, pedunc. axillaribus umbellatis. Flor. Per. 2. p. 55. t. 200. f. 2. sub Schwenkfeldia. Hab. in Andium nemoribus. Suffruticosa volubilis, subhispida. *Bacca* hirsuta, albicans.

5. *diversifolia*, fol. altero minimo, flor. axillaribus conglomeratis. Peculiaris haec species detecta in insula Mauritii a Dom. Aubert. Fol. majus late ovatum obtusum minus primo obtutu bracteaeforme, ita ut folia alterna videantur.

456. *RONDELETIA*. *Cor.* infundibuliformis, tubo apice subventricoso, laciniis subrotundis planiusculis. *Cups.* subrotunda, coronata, 2-locularis. *Sem.* plura aut solitaria.

\* *Seminibus pluribus.*

1. *americana*, (*dichotoma*), foliis sessilibus, panic. dichotoma. Lin. Willd. Sp. 2. p. 930. Plum. gen. ic. 129. f. 1. Lam. ill. t. 162. f. 1. Hab. ut omnes fere sequentes in Amer. merid.

2. *odorata*, foliis petiolatis subovatis obtusis. L. Jam. amer. edit. picta. t. 61. Hab. in Amer. rupestribus ventricosis, maritimis. Flor. pulchri miniati, violam redolentes. In quibusdam Linnari operib. haec species errore typographico *obovata* audit.

3. *trifoliata*, fol. ternis, subtus to-

mentosis Jacq. amer. 60. t. 43. ed. picta. t. 62. Ebrei. pict. t. 15. Hab. in Amer. Fruct. adhuc observandus.

4. *virgata*, foliis subrotundis, ramis filiformibus patentibus, pedunc. trifidis, flor. ternis confertis tetrandris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 354. Hab. in fruticetis maritimis Hispaniolae. h

5. *pilosa*, fol. ovatis utrinque pilosis, pedunc. axillaribus fol. brevioribus trifidis, floribus tetrandris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 356. R. triflora. Vahl, symb. 3. p. 34. t. 54. Hab. in ins. St. Crucis et Montserrat. h

6. *buxifolia*, fol. obovatis glabris, flor. tetrandris axillaribus solitariis. Vahl. eclog. amer. Fasc. 2. t. 12. Hab. in ins. Montserrat.

\* *Seminibus subsolitariis.*

7. *thyrsoides*, fol. oblongis acutis membranaceis subtus pubescentibus, thyrsis axillaribus. Swartz. l. c. p. 358. Hab. in collibus aridissimis Jamaicae. h

8. *racemosa*, fol. lanceolatis - ovatis acuminatis utrinque glabris, stipulis ellipticis acumine brevi, racemis axillaribus dichotomis patulis. Swartz. Fl. p. 360. Brown. jam. 143. t. 2. f. 3. Hab. in Jamaicae sylvestrib. montium. R. thyrsoides et laurifoliae proxima. Sw. h

9. *laurifolia*, fol. lanceolato-oblongis acutis utrinque glabris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. Brown. jam. 143. t. 2. f. 2. Hab. in fruticetis Jamaicae. h

10. *tomentosa*, fol. ovatis acuminatis tomentosis, pedunc. tripartitis axillaribus brevibus. Swartz. l. c. Petesio stipularis. Lin? Hab. in Jamaicae collibus petrosis umbrosis. h

11. *umbellulata*, fol. lanceolato-ovatis acutis subhirsutis, pedunc. axillar. apice trichotomis, flor. subumbellatis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 367. Hab. in Jamaicae rupibus petrosis juxta fluvios. h

12. *incana*, fol. ovato-lanceolatis subtomentosis scabris, pedunc. axillar. simplicibus trifloris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 369. Hab. rarius in Jamaicae montibus petrosis calcareis. h

13. *hirsuta*, fol. oblongis acutis hirsutis, pedunc. axillar. dichotomis laxis, flor. hirsutis. Swartz. Hab. in fruticetis montium Jsm. austr. h

14. *hirta*, fol. oblongis acuminatis hirsutis

rigidis subtus nervosis, pedunc. axillaribus trichotomis erectis. Swartz. Ait. Kew. 1. p. 227. Hab. in fruticetis montosis Jamaicae priore. h

*Obs.* Quae in hac subdivisione enumeratae sunt species, ulterius examinandae sunt, quarum nonnullae hujus generis haud videntur.

457. **MACROCNEMUM.** *Cal.* campanulato-cyathiformis. *Cor.* campanul. aut infundibuliformis. *Caps.* 2-locularis. *Sem.* imbricata.

1. *jamaicense*, corymbis axillaribus elongatis nudis. Willd. Spec. 2. p. 933. Swartz. obs. 68. t. 3. f. 1. Hab. in Jamaicae austr. locis umbrosis ad rivulorum ripas. h

2. *candidissimum*, corymbis terminalibus brevibus paucifloris bracteatis, bracteis coloratis subrotundis. Willd. p. 934. Vahl, symb. 2. p. 38. t. 30. Habit. in vicinis St. Marthae. h

3. *coccineum*, panicula terminali elongata bracteata, bracteis longissimis coloratis. Willd. Vahl, symbol. 2. p. 38. t. 29. Hab. in ins. Trinitatis Americae. h

4. *corymbosum*, fol. ovato-oblongis basi excavatis carinatis rugosis sessilibus corymb. magnis. Flor. Peruv. 2. p. 48. t. 189. Hab. in Andium collib. Cor. crassa. Caps. fusco-purpureas. tandem atra.

*Obs.* Quamvis cortex hujus speciei parum amarus sit, collectores tamen Cinchonarum cortici illum admiscere solent, quae fraus facile dignosci potest, cum cortex Macrocnemi intus albus sit, et sapore amarissimo viscido gaudcat. Flor. Per. p. 48.

5. *microcarpon*, foliis oblongis obtuse acuminatis subtus pubescentibus, racemis terminalibus, flor. congestis sessilibus. Fl. Per. 2. p. 48. t. 188. Habit. in Chincho et Cuchero nemoribus imis, calidis. Cor. laciniae reflexae.

6. *venosum*, fol. oblongis acuminatis venosis lincatis, nervo venisque pubescentibus, racemis terminalibus. Flor. Per. 1. c. t. 119. f. 6. In Peruv. nemoribus calidis. Stipulae strictae rub. s. ant.

*Obs.* Tres haec Peruviae species a characterie generico parum differre videntur.

458. **NONATELLA.** *Cal.* 5-dentatus,

*Cor. tubulosa. Bacca striata*, 5-locularis, 5-sperma.

1. *racemosa*. Aubl. guj. p. 186. t. 72. Oribasia. Schreb. Psychotria. Willd. Spec. 2. p. 966. Hab. in sylvis Gujanæ. Ceteræ Nonateliæ Aubletii alius sunt generis. h

459. VANGUIERA. *Cor. campanulato-globosa*, fauce pilosa. *Stigma* 2-lamellatum. *Bacca* pomiformis, 4-5-locularis, 4-5-sperma.

1. *edulis*. Vahl. symb. 3. p. 36. et in Act. Soc. Hafn. 1. p. 208. t. 7. Juss. gen. pl. 249. Lam. ill. t. 159. Willd. Sp. 2. p. 976. Hab. in India. Arb. Flor. corymboso-cymosi. Sem. amygdalina. J.

460. DENTELLA. *Cal.* 5-partitus, supernus. *Cor. infundibuliformis* lacinjiis tridentatis. *Caps.* 2-locularis polysperma.

1. *repens*. Forst. prod. n.º 98. Lam. ill. t. 118. Oldenlandia repens, caps. subsessilib. hispidis, fol. lanceolatis. Lam. mant. 40. Burm. ind. 38. t. 15. f. 2. Rumph. 6 t. 170. f. 4. Hab. in India orientali et Nova Caledonia. Caps. undique pilis obtusis cavis pellucidis obiecta. Lin.

461. SERINSA. *Cor. infundibuliformis*, fauce ciliata, limbi lacinjiis subtrilobis. *Bacca* 2-sperma.

1. *foetida*. Willd. Sp. 2. p. 1061. Lycium japonicum. Thunb. t. 17. L. foetidum. Lin. suppl. p. 150. Hab. in India, Japonia. Fol. venosa. *Cor.* alba. In India in hortis Buai ad instar adhibetur.

462. SIPANEA. *Cal.* 5-partitus. *Cor. infundibuliformis*, 5-loba. *Caps.* coronata, 2-locularis, 2-partibilis, polysperma.

1. *pratensis*. Aubl. guj. 1. p. 148. t. 86. Lam. ill. t. 151. Virecta pratensis. Vahl. Eclog. Amer. 2. Hab. in Guiana.

463. VIRECTA. *Cal.* 5-dentatus: dentibus interjectis. *Cor. infundibuliformis. Stigma* bipartitum. *Caps.* 1-locularis, polysperma.

1. *biflora*, fol. ovatis, pedunc. bifloris. Lin. suppl. 134. Vahl. symb. 2. p. 38. Ejusd. ecl. 2. W. Sp. 2. p. 972. Rondeletia biflora, caul. filiformi repente, pedunc. biflor. Rauh. Descr. pl. rar. Surinam. p. 7. t. 2. f. 9. Hab. in Surinam subhumidis. Herba te-

nera Mercurialis annuae. Corolla rubescens: ore albo. Lin. ©

464. SOLENA. *Cal.* 5-fidus superus. *Cor. hypocrateriformis*, tubo longissimo, fauce pilosa. *Style* filiformis. *Stigma* trifidum. *Bacca* unilocularis, polysperma. (Cyrtanthus. Schreb.)

1. *longiflora*. Willd. Sp. 2. p. 961. Posoqueria longiflora. Aubl. guj. 1. p. 134. 1. 51. Lam. ill. t. 161. Hab. ad ripas fluviorum Gujanæ. Flor. corymbosi. *Cor.* albae nantes. h

465. UCRIANA. *Cal.* 5-dentatus supernus. *Cor. hypocrateriformis*: tubo longissimo, fauce ventricosa nuda. *Anthere* sessiles. *Style* clavatus pilosus. *Stigma* 2-lamellatum. *Bacca* 2-locularis, polysperma.

1. *speciosa*. Willd. l. c. Tocoyena longiflora. Aubl. guj. 1. p. 131. t. 50. Hab. in sylvis Gujanæ. Fl. terminales capitati. h

466. PSYCHOTRIA. *Cal.* 5-dentatus, coronatus. *Cor. infundibuliformis. Bacca* globosa aut ovalis. Sem. 2, sulcata, ossca.

\* *Cor. tubo tereti recto.*

1. *asiatica*, stipulis emarginatis, fol. lanceolatis ovatis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 961. Jacq. amer. Hab. in India. h

2. *glabrata*, stipulis acutis indivisis deciduis, fol. ovatis glaberrimis nitidis, flor. paniculatis erectis. Swartz. flor. ind. occ. 1. p. 360. Hab. in Jamaica rupibus. h

3 ? *axillaris*, stipulis acutis indivisis, fol. ovatis acutis, flor. axillaribus. Willd. l. c. p. 962. Ronabea latifolia, caul. flexuosis, fol. ovatis acutis viridibus e caeruleo variegatis, fructu nigri ante striato. Aubl. guj. 1. p. 154. t. 59. Lam. ill. t. 166.

4. *R. erecta*, caul. tenuiorib. fol. ovatis acutis tenuioribus, fol. minoribus e luteo virentibus. Hab. in sylvis Gujanæ. A reliquis habitu diversa, et florib. axillaribus distincta. Willd. Sem. hinc plana, inde convexa. Aubl. h

4. *laurifolia*, stipulis ovatis acuminatis deciduis, fol. lanceolato-ovatis acutis crassiusculis glabris, panic. erectis, bacis subrotundis. Swartz. fl. ind. qeoid. 1. p. 392. Hab. in Jamaica, Hispaniolæ fruticosa aridis. h

5. *parviflora*, stipulis ovatis cuspidatis deciduis, fol. elliptico-ovatis acuminatis parallelis-venosis, panic. erectis, baccis ovalib. Willd. l. c. *S. mira tinctoria*. Aubl. guj. 1. p. 170. t. 65. Hab. in sylvis Gujanæ. Cortex ad paucos sericeos et gossypinos rubro colore tingendos alibetur. h

6. *hirsuta*, stipulis lanceolatis integris deciduis fol. lanceolato-ovatis acutis hirsutis, caule hirsutissimo, panic. patente. Sw. l. c. p. 394. Hab. in australi Jamaicae sylvis vetustis. h

7. *foetens*, stipulis acuminatis integris deciduis, fol. lanceolato-ovatis acutis glabris, panic. patentissima, ramis reflexis filiformibus. Swartz. l. c. p. 396. Cum priore. Odore foetido subacido ex ramis fractis, folisque contusis distinguitur. Sw.

8. *citrifolia*, stipulis ovatis perdistentibus, fol. ellipticis acuminatis subcoriaceis, panic. brevibus, baccis oblongis costatis. Swartz. p. 398. Hab. in Ind. occid. h

9. *nitida*, stipulis subrotundis deciduis, fol. subrotundo-ovatis acuminatis, panic. terminali, cor. limbo subo longiore. W. Mapouria gujensis. Aubl. guj. 1. p. 175. t. 67. Hab. in ripis fluviorum Gujan. h

10. *marginata*, stipulis integris acuminatis deciduis, fol. lanceolato-ovatis acutis margine cartilagineo-setosis, panic. laxa. Swartz. l. c. p. 400. Brown. jam. 161. n. 6. Hab. in sylvestribus Jamaicae australis. h

11. *tenuifolia*, stipulis ovatis emarginatis deciduis, fol. oblongis acutis tenuioribus glabris, pan. erectis subsessilibus. Swartz. p. 402. Hab. in fruticetis Hispaniolæ. h

12. *nervosa*, stipulis oblongis emarginatis deciduis, fol. ovatis utrinque acuminatis nervosis (venosis) subundulatis, panic. sessilibus erectiusculis. Swartz. p. 403. Hab. in fruticetis Jamaicae. Fol. non aut nervosa, sed venosa, venia prominentibus. Willd. l. p. 964. h

13. *carthaginensis*, stipulis emarginatis, fol. obovatis acuminatis, panic. terminali. Willd. p. 964. Jacq. amer. p. 65. t. 174. f. 52. Ed. picta. t. 260. Hab. in Carthagenæ fruticetis. h +

14. *Myrsiphyllum*, stipulis ovatis deciduis, fol. lanceolato-ovatis nervosis nitidis rigidis, ramis secundis, racemis compositis terminalibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 405. et 406. Brown. jam. 159. Hab. in Jamaicae fruticetis aridis. Vere. Facie a ceteris diversa. Bacca immatura dura

3-locularis est, demum succosa. dissepimento evanescente. Sw. An potius Myrsiphyllum dicendum?

15. *laxa*, stipulis ovatis acutis deciduis, fol. ovatis acuminatis, racemis ternis terminalibus trichotomis, ramis pedicellisque subcapillaribus laxis. Swartz. p. 407. Hab. in fruticetis montium Jamaicae. h

16. *parasitica*, stipulis amplexicaulibus retusis, fol. ovatis acuminatis avenis subscutellatis, racemis terminalibus axillaribusve compositis. Swartz. p. 408. Viscoides pendulum. Jacq. amer. 93. t. 51. f. 1. An hujus generis? Hab. in Martinica, Dominica, Guadeloupe, etc. h

17. *horizontalis*, stipulis ovatis, foliis lanceolato-ovatis acutis, ramis fol. ramulisque panicularum horizontalibus. Swartz. p. 410. Hab. in Hispaniolæ locis apricis cretaceis. h

18. *nutans*, stipulis bidentatis, fol. lanceolatis acutis nervosis, racemis tripartitis erectis, fructiferis nutantibus. Swartz. p. 411. Hab. in Hispaniolæ collibus aridis solo cretaceo. h

19. *speciosa*, arborea, fol. oblongo-lanceolatis, involucri terminali subtrifloro. Forst. prod. n. 89. Hab. in ins. Tahiti. h

20. *flexuosa*, stipulis bidentatis, foliis ovatis utrinque attenuatis, panic. divaricata flexuosa. Willd. p. 966. Nonatelia paniculata. Aubl. guj. 1. p. 184. t. 70. f. 2. Hab. in Cajennæ locis sterilibus. h

21. *racemosa*, stipulis bilobis, fol. oblongis acuminatis, racemo terminali simplici, flor. involucriatis. Willd. l. c. Aubl. guj. 1. p. 186. t. 72. sub Nonatelia. Hab. in sylvis Gujanæ. h

22. *violacea*, stipulis oblongis obtusis deciduis, fol. oblongis acuminatis, flor. paniculato-corymbosis involucriatis. Willd. Nonatelia. Aubl. guj. 1. p. 188. t. 73. El. in sylvis Gujanæ. h

23. *capitata*, fol. oblongis acuminatis, stipulis bifidis, florib. capitatis acutis, bracteis obvallatis. Flor. Per. 2. p. 59. t. 208. f. 5. Hab. ut omnes sequentes spec. Peruvianæ in Andium nemoribus.

24. *pilosa*, fol. oblongo-ovatis acutis pilosis, flor. terminalibus verticillato-cymosis, bracteis pilosis cinctis. Flor. Per. p. 60. t. 208. f. 5. Bac. caeruleæ. Inflorescentia Asperulam quandam refert.

25. *subtomentosa*, fol. lanceolato-oblongis, stipul. bifidis acutis, pedunc. ter-

minalibus trifidis, flor. capitatis bracteis cinctis. Flor. Per. 2. p. 61. t. 210. Flor. sessiles caerulei.

26. *brachiata*, stipul. ovaris bifidis, racemo terminali composito, ramis brachiatis, flor. aggregatis sessilibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 415. Hab. in montibus altis Jamaicae australis. h

27. *grandis*, stipul. deltoideis margine revolutis apice subulatis, fol. cuneiformibus, obovatis, caule angulato. Swartz. p. Flor. ind. occ. 417. Habit. in fruticetis montosis Jamaicae interioris occidentalis. h

28. *patens*, stipul. bidentatis, fol. dictichis lanceolatis - ovatis membranaceis, ramis patentibus, panic. secundis. Swartz. p. 419. Hab. in montibus altis Jamaicae praesertim in montibus caeruleis. An diversa a n. 27? h

29. *uliginosa*, stipul. connatis acutis convexis, fol. lanceolato-oblongis, semin. compressis cristatis, caule subherbaceo simpliciter erecto. Swartz. p. 421. Hab. in Jsm. depressis subhumidis montium. h

30. *serpens*, caule subherbaceo repente, fol. ovatis utrinque acutis. Lin. Mant. 204. Hab. in India orient. Similis Pa. herbaceae. Stipulae subrotundae. h

31. *herbacea (sylva)*, caule herbaceo repente, fol. cordatis petiolatis, pedunc. axillaribus 3-4-8o lin. Willd. Sp. 2. p. 367. Jacq. amer. t. 46. Ed. pict. t. 67. Hab. copiose in umbrosis uliginosis. Per stolones plures proferens plantulas, ita ut tandem earumdam sylva quasi exurgat. Bacc. rufae. Jacq.

32. *macropoda*, caule herbaceo repente, fol. cordatis acutis glabris, stipul. ovatis, umbellulis 3-6-floris, seminib. laevibus. Flor. Per. 2. p. 61. t. 211. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. Priori valde affinis. Bacc. atro-purpurea.

33. *gracilis*, fol. cordatis acutis supra pilosisculis, stipulis ovatis, umb. 6-8-floris, seminib. sulcatis. Flor. Per. 1. c. f. a. Cum priore. Cor. dilate violacea. P. violaceae. Anbl. affinis dicitur.

Obs. Species illae herbaceae, repentes, habitu nimis a ceteris recedunt, forte hinc ut peculiare genus sejungendae.

34. *corymbosa*, stipulis bidentatis, fol. lanceolato-ovatis acutis subrigidis nitidis, flor. subcorymbosis, pedunc. pedicellisq. coloratis. Swartz. p. 421. Hab. in montib. excelsis Jamaicae. h

35. *pubescens*, stipul. bidentatis, fol.

lanceolato-ovatis acuminatis pubescentib. panic. cymosis patentibus. Swartz. p. 425. Habit. in sepibus ruderalisque Jamaicae vulgaris. h

36. *pedunculata*, stipul. bidentatis, fol. ovato-lanceolatis rugosisculis, flor. cymosis, pedunc. communi elongato. Swartz. p. 427. Brown. jam. p. 160 n. 4. Hab. in sylvis montosis Jamaicae. h

37. *alpina*, stipul. bidentatis, fol. lanceolato-ovatis membranaceis reticula o-venosis, panic. erectis, cor. elongatis diaphanis. Swartz. p. 431. Habit. in montib. caeruleis Jamaicae australis. h

38? *paniculata*, stipulis bidentatis, fol. ovatis, panic. recta, caule arboreo. W. Sp. p. 970. Chiococca paniculata. Linn. suppl. 145. Hab. in Surinamo et Amer. merid. h

39. *macrophylla*, fol. oblongo-lanceolatis amplis, stipul. unidentatis, racemis axillarib. subdichotomis. Flor. Per. 2. p. 56. t. 202. Stipulae semiamplexicaules, internodi ad basin glandulis minimis obiectae.

40. *reticulata*, fol. oblongo-lanceolatis venoso-reticulatis, stipulis bidentatis, dentibus subulatis, racem. terminalib. brachiatis. Fl. Per. 1. c. Corol. lutea exius pubescens.

41. *amethystina*, fol. oblongis acuminatis, stipul. vaginantib. quadridentatis, racemis terminalibus, cor. laccisque amethystinis. l. c. p. 57. t. 203. Stipul. ad basin singuli denticuli glandulae 7.

42. *macrobotrys*, fol. lanceolatis pubesc. longis, stipul. bidentatis racemis terminalib. longissimis. p. 57. t. 203. f. a. Stipulis interioribus ad basin denticulorum glandulis numerosis. Cor. lutea pubescens.

43. *thyrsiflora*, fol. lanceolatis glabris, stipulis vaginantibus acidentatis, thyrsis terminalib. Flor. Per. p. 57. t. 214. Stipulae denticulus intermedius ovatus ciliatus. Cor. lutea, tubulosa.

44. *obovata*, fol. obovatis acuminatis amplis, stipul. emarginatis, thyrsis terminalibus, cor. tubulosis. l. c. p. 58. t. 204. f. a. Cor. purpurea, intus villosa. Pedunc. bracteis reflexis stipati.

45. *sulphurea*, fol. obovato-cuneiformibus acuminatis, stipul. emarginatis, racemo paniculato, cor. infundibuliformibus. l. c. t. 205. f. a. Planta amarissima, tinctorum luteam praestantissimam praestat ideoque ab invicis hunc in usum adhibetur. An Pteleocouria?

46. *alba*, fol. lanceolatis, stipulis obovatis, integerrimis, auratis deciduis, racemo paniculato, cor. bacisque albis. Fl. Peruv. 3. t. 205. f. a.

47. *cymosa*, fol. oblongo-lanceolatis acutis utrinque bidentatis, cymis terminalibus, cal. 5-partitis longis. l. c. t. 206. f. a. Cor. violaceo-purpurea. Tub. prope basin villosus.

48. *villosa*, fol. oblongo-ovatis hirsutis stipul. ovatis acutis deciduis, panic. racemosa brachiata. p. 59. t. 207. f. a. Bacca rubra, globosa. An eadem ac *P. hirsuta*.

49. *foveolata*, fol. lanceolatis subtus ad apicem nervi foveolis quatuor, stipul. ovatis caducis, panicul. fructus cernua. t. 207. f. b. Flor. sessilibus 3-5-approximatis. Cor. parva, albo-lutea.

50. *mitis*, fol. lanceolatis supra mitibus (?) subtus glabris, stipul. annularibus emarginatis, racemis subpaniculatis terminalibus. Fl. Per. p. 60. t. 208. Cor. infundibuliformibus luteis.

51. *virgata*, foliis oblongis acuminatis coriaceis venosissimis, stipul. bilobis profunde emarginatis, corymb. terminalibus, flor. sessilibus congestis. Tab. 209. Cor. infundibuliformis, sulphurea.

52. *trifida*, fol. lanceolatis acuminatis, stipul. bifidis acutis, pedunc. axillaribus terminalibusque trifidis trifloris. Tab. 209. f. b. Bacca nigra, umbilicata, subrotundoturbinata.

53. *repanda*, fol. lanceolatis repandis, stipul. lanceolatis ciliatis, pedunc. paniculato-racemosis, flor. sessilib. Pag. 61. Cor. minima, lutea. Bacca purpurea.

**PALICOURIAE.** Cor. tubo basi hinc gibbo obliquo aut subincurvo. Flor. colore ut plurimum lutei, passim caeruleo-lescentes.

54. *crocea*, fol. ovatis acutis nervosis, panic. erectis pedunculisque croceo-coloratis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 429. Willd. Sp. 2. p. 969. Brown. Jam. t. 23. f. 2. a. quoad flores. Hab. in Americae fruticulis subtomentosis.

55. *Palicourea*, stipul. bilobis, fol. lato-ovatis utrinque acuminatis, panic. erectis, cor. cylindricis ventricosus subcurvis extus furniosis. Swartz. l. c. p. 433. Palicourea gujanensis. Aubl. 1. p. 173. t. 66. Stephanium Schreber. Hab. in sylvis.

56. *lutea*, fol. lato-ovatis acuminatis, cor. tubo longo, laciniis acutis, Willd.

p. 971. Nonatilia Aubl. p. 190. t. 79. Cum priore in Gujana.

57. *longiflora*, fol. ovato-lanceolatis, stipul. bilobis, cor. tui incurvo, lacini. obtusiusculis. Willd. Aubl. 1. 71. sub Nonatilia. Hab. in Gujanae sylvis.

58. *hyacinthoides*, fol. obovatis acuminatis amplis, stipul. bifidis, racem. compositis purpureis. Flor. Peruv. 2. p. 69. t. 213. f. a. P. hyacinthiflora. Pedunc. patulo-reflexi.

59. *caerulea*, fol. lanceolatis acuminatis, stipul. ovatis, racem. terminalibus, flor. aggregatis. Flor. Per. l. c. Cor. lutescens limbo revoluta. Bacca caerulea.

60. *finctoria*, fol. oblongis acuminatis, foveolis ad basin venarum, stipul. lanceolatis, racem. brevib. brachiatis. Fl. Per. 2. p. 62. t. 211. Cor. albo-luteo rubescens.

61. *luteo-virescens*, fol. oblongis acuminatis, stipul. bifidis, paniculis laxis, bract. longis reflexis. P. lutea. Flor. Per. 2. p. 61. t. 212. f. b. Cor. tenuis, luteo-virescens. Bacca subdityma.

62. *viridis*, fol. oblongis acuminatis dorso foveolatis, stipul. lanceolatis, racem. subpaniculatis. Flor. Per. l. c. t. 210. f. b. Cor. parva viridis. Sem. hinc convexa 5-sulca, inde plana laevia.

**Obs.** Quamvis auctores operis allegati cor. oblique aut incurvae nullam in descriptionibus fecerint mentionem, tamen ex iconibus hoc divinare potest.

467. **COFFEA.** Cal. crescens, 5-dentatus: dentibus deciduis. Cor. hypocrateriformis. Stam. supra tubum. Anth. sagittatae. Bacca infera, disperma. Sem. arillata, hinc convexa, inde plana.

1. *sambucina*, fol. oblongo-lanceolatis acutis, cymis corymbosis terminalibus. Forst. prod. n.º. 92. Willd. Sp. 2. p. 973. Hab. in ins. Amicorum. h

2. *opulina*, fol. ovato-lanceolatis, corymb. coarctatis globosis terminalibus. Forst. prod. n.º. 93. In N. Caledonia. h

3. *odorata*, fol. ovatis acutis, cymis corymbosis axillaribus. Forst. l. c. Hab. in ins. Tanna et in ins. Amicorum. h

4. *arabica*, fol. oblongo-ovatis acuminatis, pedunc. axillarib. aggregatis, cor. quinquefidis. W. l. c. Blackw. t. 337. Jus. act. 1713. p. 388. t. 7. Habit. in Arabia felici.

5. *mauritiana*

5. *mauritiana*, baccis oblongis basi acutis dispermis. Lam. enc. 1. p. 5. t. 160. f. 2. Hab. in ins. Borbonia.

6. *riflora*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, pedunc. terminalib. ternis unis. Forst. prod. n.º 95. Hab. in insula Tahiti. h

7. *guyanensis*, fol. lanceolatis, pedunc. axillaribus agg. egatis, corol. quadrifidis. Willd. baccis exiguis. Aubl. guj. p. 150. t. 57. Hab. in sylvis Gujanæ. h

8. *paniculata*, fol. oblongis acuminatis, panic. terminali divaricata, cor. quadrifidis, ramis tetragonis. Willd. Aubl. t. 58. Hab. in sylvis Gujanæ. h

9. *racemosa*, fol. oblongo-ovalib. acuminatis, stipul. bifidis, racemis axillarib. terminalibusque (sub antesi) nutantibus. Flmr. Peruv. 2. p. 64. t. 214. f. a. Hab. in Peruviae nemoribus Pati et Macora.

10. *umbellata*, fol. oblongis acuminatis, venis transversalibus (nervosis), stipul. subrotundis, florib. congestis umbellatis. Flmr. Per. 2. p. 66. t. 215. f. a. Cresc. in Andium nemoribus. Involuer. universale 4-phyllum, partiale 7-phyllum.

11. *ciliata*, fol. oblongis acuminatis, stipul. truncatis ciliis abbreviatis, racemis terminalibus. Fl. Per. l. c. t. 216. f. a. Hab. in Peruviae Andium nemoribus.

Obs. Plures flores, huic quadrifidi, tetrandri sunt.

12. *verticillata*, fol. oblongo-lanceolatis obovatisque acuminatis, stipul. ovatis ciliatis, racemis terminalibus verticillatis. Flmr. Per. 2. p. 66. t. 217. f. b. Cor. faux villosa. Cal. ciliatus.

13. *nitida*, fol. oblongis, obtuse acuminatis nitidis, stipul. truncatis ciliatis, racemis terminalibus. Flmr. Peruv. 2. p. 66. t. 217. f. a.

14. *foveolata*, fol. oblongo-ovalibus acute acuminatis, foveolis ad basin venarum, stipul. ovatis, racem. terminalib. Flmr. Per. l. c. t. 216. Pedunc. brachiato-decussati. Cor. faux hirsuta.

15. *longifolia*, fol. lanceolato-oblongis undulato-repandis, stipulis ovatis, racem. terminalibus ternis. Flmr. Per. 2. p. 66. t. 218. f. a. Stipul. in vaginæ formam connatæ. Cor. lacin. reflexæ.

16. *microcarpa*, fol. lanceolatis acutis, stipul. utrinque bidentatis, cymis axillaribus terminalibusque paucis. Fl. Per. l. c.

f. b. Hab. uti antecedentes in Andium nemoribus.

†† РОТІМА. *Bacca monosperma*: sem. 1 nempe abortivo.

17. *occidentalis*, fol. ovato-lanceolatis glabris, pedunc. trifidis subaxillaribus, cor. 4-fidis, 4-andris, baccis 1-spermis. Jacq. amer. pict. t. 68. Plum. Sp. ic. 156. f. 2. Hab. in Amer. merill., St. Domingo, etc. Cor. laciniae acuminatæ deflexæ.

Obs. Praeter Baccam monospermam a Cnf. *arabica* differt: perispermo basi in 4 lobos diviso et emyryone in ejus substantia immerso: hæc partes enim in *C. arabica* convolutæ sunt.

18. *acuminata*, fol. ovalibus acuminatis ad axillas venarum villosis, stipul. caudatis, racem. paucifloris. Flor. Per. 2. p. 64. t. 214. f. b. Hab. in Peruviae nemorib. Bacca 1-sperma.

Obs. Hæc species ab antecedente, in qua axillas venarum non villosas inveniri, omnino diversa videtur. Fol. etiam multo minora et magis venosa sunt. Differentis specificæ *C. occidentalis* a cl. Willdenovio furtim de *C. acuminata* desumpta.

19. *sessilis*, fol. sessilib. oblongo-lanceolatis acuminatis basi excavatis stipulis ovatis, racemis axillarib. Flmr. Per. 64. t. 215. f. b. (non f. a.) Hab. in Andium nemoribus. Fol. magna, ovata, fere sessilia. Pedunc. trifidi.

468. **CHIOCOCCA**, Cor. infundibuliformis, æqualis. *Bacca* compressa, didyma, 2-sperma, infera. Sem. oblonga, compressa.

1. *racemosa*, fol. ovatis acuminatis, racem. subdivisis axillarib. secundis subnutantibus. Willd. Sp. p. 975. Lin. suppl. 145. Jacq. Dill. elib. 306. t. 228. f. 295. Sloan. hist. 2. p. 97. t. 188. f. 3.

2. *Chiococco scandens* sarmentis tenuissimis et fere indivisis. Brown. jam. 164. Swartz. obs. p. 76. Habit. in Jamaicae, Barbados, locis contragosis. h

3. *brachiata*, scandens, fol. ovatis deflexis, ramis brachiatis horizontalib. Flmr. Per. 2. p. 67. t. 219. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus. Cor. luteo-viridis.

3. *barbata*, erecta, fol. ovatis, pedunc. axillaribus unifloris, cor. fauce barbata. Forst. prod. n.º 96. Hab. in ins. Marchionis, Societatis et Amicorum. h

469. *PÆDERIA*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis, 5-loba, intus hirsuta. *Stylus* bipartitus. *Bacca* fragilis (nitida) disperma.

1. *foetida*. Lin. Willd. *Sp.* 2. p. 1219. Lam. enc. 2. p. 257. t. 166. f. 1. Rumph. 5. t. 160. Hab. in India, h

470. *DISODEA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* infundibuliformis. *Caps.* compressa, 1-locularis, basi 2-valvis, 2-sperma. *Recept.* filiforme. *Sem.* orbiculata, membrana cincta.

1. *foetida*. *Lygodisodes foetida*, fol. cordatis acutiusculis, caule volubili. Flor. Peruv. 2. p. 48. t. 188. f. a. Hab. in Peruviae nemorib. Ad trabes ligandas loco funium sumitur.

471. *PLACOMA*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* campanulata, 5-fida. *Bacca* 3-locularis: loculis monospermis.

1. *pendula*. Ait. Kew. 1. p. 292. Gmel. syst. pl. p. 390. Willd. *Sp.* 2. p. 1210. Hab. in Canariis. Caul. tenuis articulatus. Fol. linearia, internodiis longiora.

472. *CHIMARRHIS*. *Cal.* margo integer. *Cor.* infundibuliformis. *Caps.* infera, 2-locularis: loculis 1-spermis. *Stigma* 2-partitum.

1. *cymosa*. Jacq. amer. p. 61. Willd. *Sp.* 2. p. 971. Hab. in Martinica. Arb. procera, elegans. Flor. parvi in racemis cymosis. Gallice: *Bois de rivière*, quod nomen genericum graece datum idem significat.

473. *HIPPOTIS*. *Cor.* infundibuliformis curvata. *Nec. ar.* germen ambiens. *Bacca* 2-locularis, calyce magn. auriculiformi coronata.

1. *triflora*, fol. ovato-oblongis acuminatis, pedunc. trifloris. Flor. Per. 2. p. 56. t. 20. Hab. in Peruv. nemoribus. An revera genus rubiacum?

474. *VOGELIA*. *Cal.* 5-phyllus: foliolis complicatis magnis transversim unguato-sulcatis. *Cor.*

tubulosa, plicata. *Stigma* 5-fidum.

1. *africana*. Lam. ill. gen. p. 376. t. 149. Cresc. in interiore Africa, ubi detecta a cl. Veillant. Spica aroboriformi, bracteis plicatis, fol. oboordatis cum mucrone facile distinguenda planta.

475. *TRICYCLA*. *Cal.* 3-phyllus: foliolis magnis subrotundis venosis, persistens. *Cor.* infundibuliformis, 5-fida: laciniis tricrenatis. *Filam.* infra germen inserta. *Samara* ovata, cor. tubo ampliato cincta. (Stamina aliquando 7.)

1. *spinosa*, caule arboreo; ramis alternis spinosis, fol. fasciculatis sublineari-bus, basi angustioribus. Cav. ic. 6. p. 79. t. 598. Hab. in Pampas de Buenos-Ayres. Aprili.

476. *BELLONIA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* rotata. *Caps.* infera, laciniis corollinis conniventibus rostrata, 1-locularis, polysperma.

1. *aspera*, fol. ovatis serratis, florib. corymbosis terminalibus. Swartz. prodr. p. 42. Willd. *Sp.* 2. p. 934. Lam. ill. 1. 149. Hab. in Amer. Fol. subtus aspera.

2. *spinosa*, fol. ovatis angulatis dentato-serratis, pedunc. axillarib. 1-floris. Swartz. Flor. ind. oce. 1. p. 382. Cresc. ad ripas, locis desertis et sylvaticis in St.-Domingo et Hispaniola. Caul. spinosus. Flor. vere. Numerus quaternarius in flor. saepius observatur. Sw.

477. *WIBELIA*. *Cal.* inferus, 5-partitus. *Petala* 5, in tubum conniventia, apice reflexa. *Stigma* 2-lobum. *Pericarp.* 2-loculare.

1. *guyanensis*. Payrola. Lam. ill. t. 122. Paypayrola gujanensis. Gmel. syst. veg. p. 419. Aubl. p. 249. t. 99. Hab. in Gujana. Racem. axillares.

Obs. Nomen Aubletii nimis barbarum et illud Lamarkii cum Payrola fere consonum repudiari duxi. Dr. Wibel est auctor Florae Wertheimien-sis nec non alius libri botanici argumenti germanice conscripti.

478. *STROEMIA*. *Cor.* 4-petala aut p. *Cal.* 4-phyllus. *Nectar.*



ligulatum. *Bacca* corticosa, pedicellata.

1. *farinosa*, fol. oblongis farinosis, flor. petaloideis pentandris. Vahl. symb. 1. p. 20. Willd. Sp. 2. p. 993. *Cadaba farinosa*, fol. ovatis oblongis farinosis. Forsk. desc. p. 68. Lam. encycl. 1. p. 544. Hab. in Arabia felici. *h*

2. *tetrandra*, fol. oblongis mucronatis nudis, florib. petaloideis tetrandris. Vahl. symb. 1. p. 20. *Cleome fruticosa*. Lin. Burm. ind. 140. t. 46. f. 3. Hab. in India. Filam. saepe duo inferiora basi coacta. *h*

3. *glandulosa*, piloso - viscosa, fol. subrotundis, flor. apetalis. Vahl. symb. 1. p. 20. *Cadaba glandulosa*. Forsk. Hab. in Arabia felici. Capsula oblonga hirsutissima. *h*

4. *rotundifolia*, fol. orbiculatis glabris, flor. apetalis. Vahl. symb. 1. p. 20. *Cadaba rotundifolia*. Forsk. Hab. in Arabia felici. Caps. pendula glabra. *h*

479. **CONOCARPUS**. *Cor.* 5-petala, aut nulla. *Sem.* nuda, solitaria, infera. *Flores* aggregati.

1. *erecta*, erecta, fol. lanceolatis. L. Willd. Sp. 2. p. 994. Jacq. amer. 78. t. 52. f. 1. Ed. picta t. 78. Plum. ic. 135. t. 144. f. 2. Hab. in Jamaicae, Bermudensium, Brasiliae maritimis. *h*

2. *procumbens*, procumbens, fol. obovatis. Jacq. amer. 79. t. 52. f. 2. Mill. dict. n°. 2. Ed. picta. t. 260. f. 22. Hab. in montibus maritimis Cubae. Var. *flor.* 5-6-andria. *h*

3. *racemosa*, fol. lanceolato-ovatis obtusiusculis, fructibus segregatis. Lin. Sw. obs. 79. Jacq. amer. 80. t. 53. et pict. t. 79. Sloan. jam. 156. hist. 2. p. 66. t. 187. f. 1. Hab. in maritimis arenosis et limosis Caribaearum viciniaeque Continentis. Rami juniores rubent. Stamina huic decem. Jacq. *h*

480. **THYSIUM**. *Cal.* 1 - phyllus, cui stamina inserta. *Nux* infera, monosperma, cal. persistente tecta.

1. *Linophyllum*, caule erecto subramoso panicula foliacea, flor. pedicellatis, bract. ternis, fol. linearibus. Willd. Spec. 2. p. 311. Hayne in Schrad. bot. Journ. 1800. p. 32.

β. *intermedium*, caule stricto elongato, fol. linearibus lanceolatis trinerviis, panic. foliacea. Schrad. spicil. Flor. germ. 1. p. 27.

γ. *montanum*, caule flaccido, fol. lanceolatis trinerviis, panic. foliacea. Sch. l. c. In Europae siccis montosis cretaceis, etiam Oriente. *Nux* subrotunda. *h*

\* *ramosum*, caule erecto ramoso, racemis foliatis elongatis, flor. sessilibus, bract. nemorib. obvallatis. Hayne l. c. p. 30. t. 7. Th. alpinum. Pollich. Th. palatinum. Roth. Hab. in Palatinatu. *Nux* oblonga.

2. *alpinum*, caul. prostratis simplicib. racemo foliato secundo, florib. sessilibus, bract. obvallatis. Hayne l. c. p. 32. t. 6. Jacq. austr. 5. t. 416. Hab. in montosis et vix subalpinis. An cum Th. *ramoso* constanter a Th. *Linophyllo* diversum?

3. *ebracteatum*, caule erecto simplice, racemo foliato, flor. pedicellatis ebracteatis. Hayne l. t. p. 33. t. 7. Hab. in pascuis nemorosis prope Berolinum. Fol. obtusa concava. Racem. apicem versus sterilis.

4. *humile*, fol. linearibus subcaernosis, flor. axillarib. sessilib. quinquefidis. Vahl. symb. 3. p. 43. *Nucca globosae* rugosae.

5. *lineatum*, fol. linearibus, caule tereti angulato inferne aphylo, ram. erect. divaricatis, flor. axillaribus pedunculatis. Lin. suppl. 162. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *squarrosus*, fol. linearibus subulatis, recurvato - reflexis, caule tereti, florib. axillaribus sessilibus. Lin. suppl. 162. flor. axillaribus pedunculatis. Thunb. prod. 46. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *frasca*, flor. subapicatis secundis ciliato-lanatis, fol. subulatis. L. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. simplices, palmates. Fructus ovatus, rugosus.

8. *funale*, flor. apicatis, cor. ciliatis, caule flexili suffruticoso, foliis subulatis brevissimis. Hab. ad Cap. bon. spei. Facie Restionis capensis. *h*

9. *spicatum*, flor. spicatis laevibus, fol. subulatis brevissimis remotissimis. Linn. Hab. in Cap. b. spei montibus. Flores distincti bracteis tribus, margine membranaceis.

10. *capitatum*, flor. capitatis sessilibus terminalib., fol. triquetris laevib., bract. ovatis ciliatis. Hab. in Aethiopia. *h*

11. *strictum*, flor. umbellatis, fol. lan-

ecrolais decurrentibus. Lín. Hab. ad Cap. b. spei. h

12. *umbellatum*, flor. umbellatis, fol. oblongis. Lín. Pluck. mant. 43. t. 342. f. 1. Hab. in Virginiae, Pennsylvaniae pasculis siccis. Umbellulae racemosae, involucreto tetraphyllo.

13. *fragile*, fol. ovato-triquetris erianthis decurrentibus, caule angulato, flor. axillaribus sessilibus. Lín. suppl. Hab. ad Cap. b. spei. Habitus Silsol. e.

14. *scabrum*, capitulis pedunculatis, fol. triquetris, margine corinaeque scaberrimis. Lín. Hab. ad Cap. b. spei. Simillim. T. capitato. h

15. *paniculatum*, fol. lanceolatis remotis, ramis angulatis diffusis, flor. terminalibus. Thunb. prod. 45. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. subligulosus, pedalis, totus quantus in panic. floriferam effusus, more Galii. Lín. h

16. *amplexicaule*, flor. subspicatis secundis ciliato-lanatis. Lín. Mant. p. 213. Hab. in Cap. b. spei montib. alius. h

17. *triflorum*, foliis lanceolatis, caule angulato, pedunc. axillaribus triehotomis compositis. Lín. suppl. 162. Hab. ad Cap. b. spei. h

18. *euphorbioides*, pedunculis trifloris terminalibus, fol. subovatis caruosis. Lín. Mant. 214. Hab. ad Cap. bon. spei. Rami superne dichotomi. h

19. *spinosum*, fol. subulatis mucronato-spinosis, flor. axillaribus solitariis. Linn. suppl. p. 161. Ad Cap. b. spei.

481. *QUINCHAMALIUM*. Cal. inaequalis 3-4-dentatus. Cor. tubo longo, 5-partita. Stam. basi laciniarum cor. inserta. Stigma truncatum. Sem. 1.

1. *chilense*. Molin. chil. p. 159. Lam. Ill. t. 112. Q. *procumbens*, fol. linearib. sparsis, flor. terminalibus caespitosis sessilib. Flor. Per. 2. p. 1. t. 107. f. b. Hab. in Per. collib. arenosis. Rad. fusiformis. Cor. extus purpureo-rubra, intus lutea.

482. *ARIONA*. Cal. diphyllus. Stigma 2, lamellata. Bacca? bilocularis?

1. *tuberosa*, tomentosa, fol. sparsis vaginantibus apice subulatis patulis, corymbo terminali. Cav. Ic. 4. p. 57.-58. Cresc. in

Amer. meridion. partis, vulgo Descado, in siccis et aridis. Fol. tomentosa. Cor. extus tomentosa lutescens, intus luteo-albicans. Rad. fibris divergentib. tuberculiferis. C.

Obs. Quoad stum haec planta a priori non diversa, scd quibusd. fructificationis partibus tamen differt, hinc praesertim quoad fructum accuratiori subijcienda examini.

483. *FAGREA*. Cor. infundibuliformis, tubo longissimo. Stigma peltatum. Bacca 2-locularis, carnosa. Sem. globosa.

1. *Zeylanica*. Thunb. in Act. holm. 1782. p. 125. t. 4. Willd. Sp. 2. p. 830. Hab. in Zeylona. Frutex ramis crassis, 4-gonis. Folia opposita, coriacea. Flor. magni.

484. *AZALEA*. Cor. campanulata, aut infundibuliformis subobliqua. Stam. receptaculo inserta. Stigma obtusum. Caps. 5-locularis.

\* Cor. campanulatis.

1. *indica*, flor. subsolitariis, calycibus pilosis. Linn. Herm. Lugd. t. 163. Var. fol. angustioribus. Kaempf. Reliq. t. 52. In India orient.

2. *lapponica*, fol. ellipticis, punctis excavatis asperis. Lín. Flor. dan. t. 966. Flor. Lapp. t. 6. f. 1. Hab. in alpi. Lapponicis. h

3. *procumbens*, ramis diffusis procumbentibus, fol. ellipticis (minutis) glabris, margine revolutis. Flor. dan. t. 9. Fl. Lapp. t. 6. f. 2. Cresc. in Europ. alpihus. Habitus recedit.

4. *rosmarinifolia*, flor. solitariis, fol. lineari-lanceolatis margine reflexis hirsutis. Lam. ill. p. 491. Burm. Fl. ind. p. 42. t. 3. f. 3. Hab. in Japonia.

\*\* Cor. infundibuliformibus.

5. *pontica*, fol. ovato-oblongis pilosis ciliatis, stam. longissimis declinatis. Andr. t. 16. Pall. ross. t. 69. Hab. ad Pontem-Euxinum in Or. et in Amer. ? Cor. pulchra lutea

β. *A. calendulacea*, Michaux. p. 151.

Obs. Linnæus dicit de Az. Pontica fol. nudis utrinque glabris.

6. *nudiflora*, fol. ovatis, cor. pilosis, stam. longissimis. Lín. Curt. mar. t. 180. Var. cor. coccineis, carncis et albis. Vid. Alt. Kew. p. 202. Hab. in Virginia.

7. *viscosa*, ramis hispida, fol. ovato-lanceolata, utrinque viridibus, margine scabris, stam. cor. piloso-gluinoso sublongioribus. Linn. Cum priore.

\* *glauca*, fol. lanceolato-ovatis subtus glaucis, stam. cor. viz longiorib. Lam. ill. t. 170. f. 2. Prioris var. secundum Aiton. Huc *A. scabra* quorundam. Cor. alba.

\* 8. *periclymena*, fol. glabriusculis nervo supra lanuginoso subtus setigero, florib. non viscoso (roseis) limbo ampliore tubo hirsuto, stam. longissime exsertis. Mich. Flor. t. p. 151. Hab. in New-Jersey. Fol. utrinque viridia.

9. *canescens*, fol. subtus canescentib., cor. nuda non viscosa (rosea), cal. minutissimi dentib. rotundatis. Michaux, p. 150. Hab. in Carol. inferiore juxta rivulos. Stam. exserta.



**CAPRIFOLIAR.** 5-andrac (gen. 485-499).  
*Cal.* monophyllus, superius saepius bracteatus. *Cor.* monopetalum (paucim polypetalum), subirregularis. *Stam.* 4, 5, 6, 10. *Styl.* 1. *Stigm.* 1-3. Fruct. inferus baccatus, nonnunquam capsularis. Embryo in cavitate auperina perispermii solidi magni situs. *Cal.* ut plurimum fusciscent. Fol. in plurimis opposita, sed stipulis destituta, quo haec familia a rubiaceis quoque differt.

485. **LONICERA.** *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* tubulosum, 5-fida irregularis. *Bacca* infera, 2-3-4-locularis, polysperma.

\* **CAPRIFOLIUM**, *floribus in pedicello solitariis, tubo ut plurimum longo. Bacca distincta, 3-loculari.*

1. *Caprifolium*, flor. ringentibus terminalibus sessilibus, fol. summis connato-perfoliatis. Linn. Willd. Spec. 2. p. 982. Jacq. Flor. austr. t. 357. Hab. in nemorosis et domestis Europae, praesertim aust. *Cal.* subintegerrimus. h

2. *Periclymenum*, capitulis ovatis imbricatis terminalibus, fol. omnib. distinctis ringentibus. Smith brit. t. p. 260. Flor. dan. t. 508. *fl.* *quercifolia*, fol. sinuatis. Hab. in nemorosis. *Cal.* 5-dentatus.

3. *parviflora*, fol. summis connato-perfoliatis subtus glaucis, cor. breviusculis gibbis, filam. herbatis. Enc. botan. t. p. 798. L. media et L. dioica. L. Syst. veg. huc pertinent. *Caprifolium* bracteosum. Mich. Flor. t. p. 105. Hab. in Carolinac montib.

Fl. flavescentes aut etiam secundum Mich. violaceo - purporci, in axillis bractearum sessiles, rarius pedunculati.

4. *sempervirens* (coccinea), fol. summis connato-perfoliatis, cor. infundibuliformi subregulari. *Caprifolium sempervirens*, spicae verticillis distantibus, corol. subregulari rutilo - coccinea. Mich. l. c. Herm. Lugd. t. 483. Hab. in Carolinae sylvis. Fl. per totam aetatem. Frut. tener.

5. *grata*, flor. verticillatis terminalibus, fol. perennantibus obovatis subtus glaucis, summis connato-subperfoliatis, cor. ringentibus. Ait. Kew. t. p. 231. Habit. in Amer. bor. Fol. plerumque terna. Willd.

6. *japonica*, flor. binis terminalib. sessilibus, fol. omnibus distinctis, caule volubili. Thunb. jap. p. 89. Hab. in Japonia. *fl.*

\* \* **XYLOSTEON**, *pedunc. bifloris, baccis 2, basi connatis, 2-locularibus, aut in unam coadunatis.*

7. *canescens*, peduncul. bifloris, baccis distinctis, caule volubili, fol. corollato-ovatis petiolatis. Schousb. maroc. t. p. 88. L. *biflora*, Desf. Atl. t. p. 184. t. 52. Hab. in scopulis ad Magalore et in monte Trans. h

8. *nigra*, pedunc. bifloris baccis distinctis, fol. ellipticis integerrimis. Linn. Jacq. Flor. austr. 4. t. 314. Hab. in Eur. austr. Fol. juniora hirsuta. Pedicelli fol. incumbentes. Bract. fructib. adpressae.

9. *Xylosteum* (dumetorum), pedunc. bifloris baccis distinctis, fol. integerrim. pubescentibus. Linn. Flor. dan. t. 808. Hab. in sylvaticis. Pedicelli perpendiculares. Bract. lineares, patentes.

10. *tartarica*, pedunc. bifloris, baccis distinctis fol. cordatis obtusis. Jacq. ic. pl. var. t. 37. Pallas. Flor. rossica t. 36. Hab. in Tartaria. Bract. 2, lineares.

*fl.* *sibirica*, flor. rubris.

11. *pyrenaica*, pedunc. bifloris, bacc. distinctis, fol. obovato-lanceolatis glabris. Willd. Sp. 2. p. 58. Hab. in Pyrenaeis. Flor. primo vere. Cor. regulares. Bract. lanceolatae.

12. *alpigena*, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis didymis, fol. ovali lanceol. L. *Caprifolium* foliis ovato-lanceolatis subhirsutis, bacc. bicolla biflora. Hall. helv. Hab. in alpihus. Fol. glabra. Cor. fusco-rubra. Vere.

13. *caerulea*, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis globosis, stylis indivisis, fol. ovatis.

Lin. Pall. ross. 1. p. 58. t. 37. Hab. in Helvetia. Cor. flava.

14. *orientalis*, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis, fol. petiolatis ovatis acutis, subtus pubescentibus. Lam. enc. 1. p. 724. Tournef. cor. 42. Hab. in Asia minori.

15. *flexuosa*, flor. subsessilibus, basi distinctis, fol. ovatis integris glabris, caul. flexuoso. Thunb. in Act. Soc. Lin. 2. p. 330. L. nigra. Flor. jap. p. 85. Hab. in Japonia.

\*\*\* *SYMPHORICARPOS* (*Symphoria*.) *Cal.*

4 - dentatus. *Cor.* 3 - fida, subaequalis. *Bacca* coronata, 4 - locularis, 4 - sperma; loculis 2 interdum abortivis.

16. *Symphoricarpos* (*S. conglomerata*), flor. axillarib. subcapitato-glomeratis. *Symphoricarpos* vulgaris. Michaux, Flor. 1. p. 106. Lin. Willd. Spec. 2. p. 686. Dill. elth. 1. 278. f. 360. Habitat in Virginia et Carolina.

17. *racemosa*, racemo terminali, cor. intus barbata, *Symph.* racemosus. Mich. l. c. p. 107. Hab. in montosis, ad lacus Mistassin. Cum priore a *Lonicera* potius separari debet.

483. *DIERVILLA*. *Cal.* oblongus, 5 - fidus. *Cor.* duplo longior, infundibuliformis, 5 - fida, patens. *Caps.* oblonga, 4 - locularis, polysperma.

1. *humilis*. D. *Tourneforti*, racemis terminalibus, fol. serratis. Michaux, 1. p. 107. *Lonicera* *Diervilla*, Lin. Tournef. in Act. Soc. rrg. 1706. t. 7. f. 1. Habitat in Acaulia, Noveboraco, Canada et in Carolinae alpstribus. Frutex elegans. Flor. lutei.

*Obs.* *Lonicera dubautina* et *corymbosa*. Lin. nec hujus nec *Lonicerae* genus.

487. *TRIOSTEUM*. *Cal.* 5 - fidus. *Cor.* vix longior, tubulosa, 5 - loba. *Bacca* 3 - locularis, 3 - sperma, infera.

1. *perfoliatum* (majus), fol. connatis flor. sessilibus perfoliatis. Willd. 2. p. 950. Dill. elth. 1. 293 f. 378. Hab. in Amer.

2. *angustifolium*, caule hispido, fol. connatis, pedunc. oppositis unifloris. Vahl. symb. 3. p. 37. T. minus. Michaux, Flor. 1. p. 107. *Lonicera* *humilis* hirsuta, caule obsolete rubente quadrato, fol. lanceolatis adversis, flore luteo ad alas unico. Gron.

virg. 143. Pluck. alm. 287. t. 104. f. 2. Hab. in Virginia. Cor. lutea. T.

3. *triflorum*, caule subpubescente, pedunculis oppositis trifloris, fol. petiolatis Vahl. symb. 3. p. 37. Hab. in Madagascar? Caul. tenuissime pubescens.

488. *HELICIA*. *Cal.* oblongus, truncatus, suffultus bractea carnosa. *Cor.* 5 - partita. *Anthera* spirales. *Bacca* calycina, 1 - sperma.

1. *parasitica*. *Helitanthera* *parasitica*. Loureiro Flor. Cochinchin. ed. Willd. 1. p. 176. Fol. lanceolata. Spicae axillares, flor. coccinei Adrept arboribus cultis in Cochinchina.

489. *AIDIA*. *Cal.* tubulosus, 5 - dentatus. *Cor.* hypocrateriformis, fauce lanosa. *Anth.* lineares, cor. incisuris insertae, *Bacca* 1 - perma.

1. *cochinchinensis*. Loureiro, l. c. p. 177. Fol. lanceolata. Racemi axillares. Arb. magna; lignum album, grave.

*Obs.* Duo haecce b. Loureiro genera ab ill. Jussieu confirmati sunt; vid. les Genres des Plantes par O. F. Brisseau - Mirbel, tome 4. p. 407-408.

*SOLANACEAE. Lurida*. Lin. (Gen. 490-508.) *Cor.* hinc monopetala, campanulata aut rotata: limbo 5 - lobo, paululum irregulari. *Stamin.* nonnunquam didynamia. *Styl.* omnibus unicus, stigmata plerumque simplice. Fruct. in plurimis *bacca* 2 - 5 - locularis, aut *capsula* 2 - locularis, 2 - sperma. Caulis herbaceus aut frutescens. Folia alterna, in multa plus minusve tomentosa, in quibusdam per paria aut fasciculata approx. data. Plantae hujus familiae quoad fructum aliasque partes in universum suspectae imo nonnullae venenae, quod eorum habitus luridis etiam ostendit. Nonnullae interea tam ad usum medicum quam oeconomicum utilissimae reperiuntur

† *Fructus capsularis.*

490. *VERBASCUM*. *Cor.* rotata, subinæqualis. *Filam.* barbata. *Caps.* 2 - locularis, 2 - valvis: valvul. inflexis, polysperma.

1. *Thapsus*, fol. decurrentibus utrinque

tomentosis, caule spicato simplici. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1001. Flor. dan. t. 631. Engl. bot. t. 549. Hab. in Europae glareosis sterilibus. Flores flavi. Anth. miniatæ. ♂

2. *Thapsoides*, fol. decurrentib., caul. ramoso. Lin. Habit. in Europa rarius. ♂

3. *Boërhaavii*, fol. sublyratis, florib. sessilibus. Lin. V. fol. radicalibus ovatis petiolatis, caulinis oblongis sessilibus, subius tomentosis serratis. Mill. t. ic. 273. Hab. in Europa australi. ☉

4. *haemorrhoidale*, fol. ovato-oblongis basi attenuatis tomentosis obsolete crenulatis, racemis spiciformibus elongatis, fasciculis flor. bracteatis. Aitou. Kew. 1. p. 236. Hab. in Madera. ♂

5. *phlomoideis*, fol. ovatis utrinque tomentosis: inferioribus petiolatis. Linn. II. 239. V. fol. obovatis sessilibus tomentosis, spica composita interrupta, bract. cordato-lanceolatis. Moench. Flor. hsp. n. 170. t. 4. Hab. in Italia et Germania. ♂

6. *floccosum*, tomentosum-candicans, fol. ovatis subintegerrimis, glomerulis multifloris, caps. rotundis. Plant. Hungaricæ. p. 81. t. 79. Cresc. in Hungaria inter arbor. et frutices. Caul. 3-4-petalis, tomento deterso, elegant. purpurascens. Filam. pilis albis. An satis a sequente diversum?

7. *Lychnitis*, fol. cuneiformi-oblongis supra denuatis, caule angulato paniculato. Smith. brit. 1. p. 250. V. album. Moench. meth. p. 447. Engl. bot. t. 58. Hab. in pascuis et ad vias, solo calcareo. Flor. pedicellati, lactei. Filam. flavescentia. Anth. croceæ. Smith.

8. *pulverulentum*, fol. ovato-oblongis subserratis utrinque pulverulentis, caule tereti paniculato. Smith. l. c. V. *pulverulentum*, caule ramoso, calyc. farinoso fasciculatis farinoso, flore luteo. Villars. Delph. 2. p. 450. Engl. bot. t. 487. Cresc. in ruderalis, sepib. ad margines agrorum. Flor. majores aurei, filam. villo albo et anth. miniatæ distincti. Sm.

9. *nigrum*, fol. oblango-cordatis petiolatis undulato-crenat. subpubescentib. Sm. l. c. Engl. bot. t. 95. Flor. dan. t. 1089. Hab. in sylvaticis. Flor. aurei. Filam. villus violaceus.

10. *virgatum*, fol. oblango-lanceolatis deotatis sessilibus, radicalibus sublyratis pubescentibus, caule ramoso, flor. aggregatis subsessilibus. Sm. p. 259. Engl. bot. t. 550. Lob. ic. 564. Verbasc. Chaici. Vill. 2. p. 491. t. 13. V. gallicum. Willd. Sp. 2. p. 1005. eadem videtur planta. Hab. in

Angliæ arvis, et ad vias et inter rupes in Delphinatu. Filam. purpurea. V.

\* *Alopecurus*, fol. ovatis subius incanis crenatis spica laxa rarius ramosa (simpliciuscula). V. nigrum. β. Lin. Hort. Clus. 54. Thuill. l. c. p. 110. Hab. in locis aridis.

11. *parisiense*, fol. caulinis obverse ovatis cum acumine floralibus (bracteis) lanceolatis, caule ramoso. Thuill. Flor. Par. p. 110. Hab. circa Parisios in locis glareosis. Flor. lutei.

12. *ferrugineum*, fol. subvillosis rugosis, caulinis subsessilibus aequaliter crenatis, radicalibus oblongis cordatis duplicato-crenatis. Aiton. Kew. 1. p. 237. Andrew. t. 162. Hab. in Europa austr. Filam. incrassata.

13. *phoeniceum*, fol. ovatis nudis crenatis radicalibus, caule subnudo racemoso. Lin. Jacq. austr. t. 125. Blatteria purpurea. Bault. pin. Hab. in Europa orientali, Germania, Carniolia. Cor. rotata, saturate purpurea. Filamenta purpurea, horum superiores 3 barba alba. Anth. nigrescentes b. ♂

14. *Blattaria*, caule ramoso, fol. amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis. Lin. Hab. in Europ. australioria argillaceis. Var. flor. albis. ♂

15. *viscidulum*, fol. oblongis amplexicaulibus nudiusculis, radicalib. sinuato-crenatis, scapo pedicellisque subbifloris glanduloso-viscidulis. V. Blattarioides. Enc. bot. 4. p. 225. Thuill. Paris. Hab. circa Parisios.

16. *Claytoni*, glabrum, caule simpliciosculo, fol. caulinis oblongis sublanceolatis incisè duplicato-crenatis. Mich. Fl. 1. p. 148. Hab. in Carolina.

17. *monspessulanum*, fol. ovato-lanceolatis petiolatis profunda dentatis, flor. spicatis. Hab. prope Montpellier. Vidi in herbario cl. Richardi. Folia quasi sinuato-dentata, parvula.

18. *sinuatum*, fol. radicalibus pinnatifido-repandis tomentosis; caulinis amplexicaulibus nudiusculis, ramis primis oppositis. Lam. encyc. 4. p. 221. Willd. Sp. 2. p. 1006. Habit. in Europa austr Italia et Gallia merid.

19. *undulatum*, fol. incano-tomentosis, radicalibus sinuato-crepatis, caulinis sessilib. indevisis, caule virgato, flor. sessilib. Lam. l. c. V. græcum fruticosum, fol.

innuato candidissimo. Tournef. it. t. p. 335. Hab. in Oriente.

20. *parviflorum*, fol. pinnatifido-runcinatis utrinque tomentosis radicalibus, caule ramoso nulliusculo, flor. minimis. Lam. l. c. in Oriente? Fl. Turaxic. Fl. parvitate Scopariae dulcis similis. L.

21. *lyratum*, hirsutum, fol. radicalib. lyrato-pinnatifidis: caulinis inaequaliter dentatis, subsessilibus, cal. 5-phylo serrato. Lam. enc. 4. p. 222. Hab. in Hispania?

22. *pinnatifidum*, fol. lineari-lanceol. pinnatifidis, laciniis obtusis dentatis, flor. sessilibus glomeratis. Vahl. symb. 2. p. 39. Hab. in ins. Archipelagi.

23. *Barnadesii*, caule subnudo, fol. lanceolatis dentato-sinuatis glabris, pedunc. unifloris. Vahl. symb. 2. p. 39. Hab. in Hispaniae collibus versus oppidum Ortales.

24. *Osbeckii*, fol. incisim nudis, caule folioso, cal. lanatis, pedunc. bifloris. Osbeck. it. 2. Blatteria orientalis, Bugulae folio, flore maximo virescente lituris luteis in semicirculum striato. Tournef. cor. 8. it. 2. p. 83. t. 81. Buxb. cent. 5. p. 17. t. 32. Hab. in Hispania et circa Bosphorum.

25. *spinosum*, caule folioso frutescente. Lin. Amoen. acal. 4. p. 307. Vahl. symb. 2. p. 39. Leucium spinosum. Alp. exot. 37. t. 36. Hab. t. in Creta. h

491. **RAMONDA.** Scapi radicales. Cor. rotata, 5-partita. Stam. approximata: antheris apice perforatis. Caps. 1-locularis; recept. 2, parietalia, polysperma. Richard.

1. *pyrenaica*, fol. ovalibus tomentosis arenatis. Verbasenum Myconi. Lin. Rhrh. pl. select. t. 57. Mill. ic. t. 277. Hab. in Pyrenaeis. Hoc genus in memoriam cl. Ramond ob merita in plantas pyrenaeas observandas sic appellatur.

492. **DATURA.** Cor. infundibuliformis, plicata. Cal. tubulosus, angulatus, deciduus: basi orbiculata persistente. Caps. 4-valvis, 4-locularis, laevis, aut spinosa.

1. *ferox*, pericarpis spinosis erectis ovatis: spinis aumnis maximis convergentib. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1007. Moris. 3. t. 15. t. 2. f. 4. Hab. in China. Flores parvuli. Fol. plicata. ☉

2. *Stramonium*, pericarp. spinosis erectis ovatis, foliis ovatis sinuatis glabris basi in petiolum attenuatis. Flor. dan. t. 436. Blakw. t. 313. Curt. Lond. ic. Habit. in America, nuoc vulgaris in ruderatiss. per Europam. In loco natali cor. etiam violaceo-caerulea. Flor. Per. e. p. 15. ☉

3. *Tutula*, pericarpis spinosis erectis ovatis, fol. cordatis glabris dentatis. Lin. Hab. ... Fol. basi quasi truncata. Caul. purpurascens, punctis albis adspersus. Cor. pallide caerulea ☉

\* *dubia*, fol. ovato-lanceolatis indivisis petiolatis. Hab. ... Ex herb. cl. Richardi. An var. sequentis cultura ortae?

4. *fasinosa*, pericarpis tuberculatis nutantibus globosis, fol. ovatis angulatis. Rumph. 5. t. 243. f. 2. Hab. in Aegypto. Cor. violacea, intus alba, passim duplicata s. plena. ☉

5. *Metel*, cal. tereti subtumido, pericarpis spinosis nutantibus globosis, foliis cordatis subintegris pubescentibus. Linn. Kniph. cent. 1. t. 24. Rumph. 5. t. 87. Habit. in Asia, Africa et in insulis Canariis. Omnium fortissima. ☉

6. *laevis*, pericarpis glabris inermib. erectis, fol. glabris, caule fistuloso herbaceo. Ait. Kew. 1. p. 239. Jacq. hort. 3. p. 44. t. 82. Hab. in Abyssinia. ☉

7. *ceratocaula*, pericarp. obovatis inermibus pendulis, fol. ovato-lanceolatis undulatis subtus tomentosis, caul. dichotomis corniformib. Ortega, Decal. p. 17. D. *macro-caulis*, fol. oblongis rependis subtus sericeis, caule herbaceo inferne piloso superne glabro subinflato. Roth. N. Bot. Beyträge, p. 159. Cresc. in ins. Cuba. Cor. speciosa alba: angulis purpurascens, circa vesperam explicatur. ☉

493. **BRUGMANSIA.** Cal. latere ruptilis, persistens. Cor. infundibuliformis, plicata. Antherae conglutinae. Stigma utriusque lineatim decurrens. Caps. 2-locularis (inermis.)

1. *candida*, floribus pendulis. Datura arborea, pericarp. glabris inermib. oblongis pendulis, fol. ovato-lanceolatis oblongisque geminis, caule fruticoso. Flor. Per. 2. p. 15. t. 128. cfr. Willd. Spec. 2. p. 1010. Hab. in Peruvia. Flores vespertino tempore fragrantiores, maximi, albi, penduli. h

2. *bicolor*, fol. congestis, cor. versicolore. Datura sanguinea, pericarp. inermib.

mibus oblongo-cylindricis pendulis, fol. lanceolatis angulatis congestis, caule fruticoso. Flor. Per. 2. p. 15. Cresc. in Peruv. in altis, frigidis et ruderalis. Cor. e medio ad basin lutescens, superne rubra, lineis 15 sanguineis maculata.

*Obs.* Ex analogia cum priore, nec ex autopsia, hanc speciem huc retuli. Cl. Moench. in Meth. plant. suppl. p. 37. aliam adhuc speciem capsulis muricatis instructam descripsit, quae forte etiam hujus generis est. Speciosum hoc genus, cum Dauris habitu tantum conveniens, memoriae Cl. Brügmann, Professoris Historiae naturalis et Botanices Lugduni Batavorum meritisimi et dignissimi dicari velim.

494. *HYOSCYAMUS*. Cor. infundibuliformis, obtusa, irregularis. Stam. inclinata. Caps. operculata, 2-locularis.

1. *niger*, fol. amplexicaulibus sinuatis, flor. venosis sessilibus. Lin. Willd. Spec. 2. p. 1010. Engl. botan. t. 52. Hab. in Europ. ruderalis pinguibus. Planta venenata. Cor. ochroleuca. ♂

2. *reticulatus*, fol. caulibus petiolatis cordatis sinuatis acutis; floralibus integerrimis, corol. ventricosis. Linn. Cam. hort. 77. t. 22. Hab. in Creta, Syria, Aegypto. Cor. campanulatae, rubrae, venis obscuris pulchre reticulatae. L. ♂

3. *albus*, fol. petiolatis sinuatis obtusis, flor. sessilibus. Lin. Blackw. t. 111. Hab. in Europa australi. ☉

4. *aureus*, fol. petiolatis dentatis acutis, flor. pedunculatis, fructibus pendulis. Lin. Hab. in Creta, Oriente. Cor. aurea, fauce atro-purpurea striata. ♂

5. *muticus*, fol. petiolatis ovatis acutangulis, calycibus muticis, bract. indivisis. Lin. Mant. 45. H. heterophyllus. Lam. Hab. in Aegypto, Arabia. Racemus secundus apice incurvato. ♂

6. *pusillus*, fol. lanceolatis dentatis; flor. inferioribus binis, calycibus spinosis. Pluck. alm. 188. t. 37. f. 5. Hab. in Persia. Cor. flava fauce nigra. ☉

7. *physaloides*, fol. ovatis integerrimis, calycibus inflatis subglobosis. L. Amoen. acad. 7. t. 6. f. 1. Hab. in Sibiria. Cor. purpurascens. Stam. conniventia. Stigma caputatum, albidum. Floret primo vere. ☿

8. *Scopolia*, fol. ovatis integris, calyc. inflatis campanulatis laevibus. Scop. carn.

ed. 2. n.º 254. Scop. la. caruolica. Jacq. obs. 1. p. 32. t. 20. Hab. circa Idriam in sylv. Cor. Atropae. Caps. operculata Hyoscyami.

495. *NICOTIANA*. Cor. infundibuliformis, limbo plicato. Stam. inclinata. Caps. 2-valvis, 2-locularis.

1. *Tabacum*, fol. lanceolato-ovatis sessilibus decurrentibus, flor. acutis. Linn. Willd. Sp. 2. p. 1014. Blackw. t. 146. Hab. in America; nota Europaeis ab a. 1560.

2. *fruticosa*, fol. lanceolatis subpetiolatis amplexicaulibus, flor. acutis, caule frutescente. Lin. Hab. ad Cap. h. spei et in China.

3. *rustica*, fol. petiolatis ovatis integerrimis, flor. obtusis. Blackw. t. 437. In America.

4. *paniculata*, fol. petiolatis cordatis integerrimis, flor. (parvis) paniculatis obtusis clavatis. Flor. Per. 2. p. 16. t. 129. Hab. in Peru.

5. *urens*, fol. cor. latis crenatis, racem. recurvatis, caule hispido pruriginoso. L. Plum. Spec. 3. ic. 211. Hab. in America meridionali. Caps. Acanthi more delascit. Juss. h

6. *glutinosa*, foliis petiolatis cordatis integerrimis, flor. racemosis secundis subringentibus. Lin. Flor. Per. 2. p. 16. Act. botm. 1753. p. 41. t. 2. In Peru et petrosis Limaec. Calycis una lacinia reliquis duplo major. ☉

7. *undulata*, fol. radicalibus subspatulatis, caul. petiolatis ovatis undulatis, flor. nutantibus; tubo longo cylindrico. Vent. Jard. de Malmaison. p. 10. t. 10. Hab. prope oppidum Jackson in N. Holl. Silenem refert. Cor. lactea; limbo plano.

8. *crispa*, caule inberculato ramoso, ramis attenuatis, fol. lanceolatis acutis undulato-crispis, N. plumbaginifolia. Viviani Elench. Plant. Hort. Dinagro. p. 26. N. crispa. H. P. Flor. albid. Cor. laciniiis acutis, plicatis.

9. *tomentosa*, fol. lanceolatis decurrentibus subtus tomentosis, panic. maxima diffusa, cor. subringentibus acutis. Flor. Per. 2. p. 16. t. 129. f. a. Hab. in ruderalis et arvis in Peruvia. h

10. *undulata*, fol. lanceolatis petiolatis undulatis, racemis terminalibus, calice bilabiato, cor. brevibus acutis. Flor. Per. t. 130. f. b. Cresc. in frigidis locis Tar-

mae. Cal. denticulus supremus longissim.  
Cor. lutea. ☉

11. *angustifolia*, fol. lanceolatis : superioribus linearibus acutis, panic. diffusa, cor. angustissimis : limbo plicato. Fl. Per. t. 130. f. a. In Conceptionis Chile versuris. Cor. tubus viridis, limbus albus. ☉

12. *pusilla*, fol. oblongo-ovalibus radicalibus, flor. racemosis acutis, fol. ovato-lanceolatis obtusis rugosis, cal. brevissimis. Mill. ic. 185. f. 2. Hab. in Vera Cruce.

496. PETUNIA. Cal. profunde 5-fidus : laciniis subspathulatis. Cor. tubulosa : limbo dilatato subquinquelobo. *Stigma* capitatum, bilobum. *Caps.* 2-valvis, 2-locularis, polysperma.

1. *parviflora*, caulibus prostratis, cor. vix calyce longioribus. Jussieu in Annal. du Mus. d'Hist. Natur. Fasc. 9. p. 214. 216. t. 47. f. 1. Hab. in America ad flum. Plata, uti et sequens species. Fol. Cerasii.

2. *nyctaginiflora*, caule hirsuto, foliis ovato-oblongis pubescentibus, cor. calyce 4-plo longioribus. Juss. l. c. f. 2. Fol. Heliotropii. Cor. magna Mirabilis. J.

497. LA MARKEA. Cal. longus, 5-gonus, 5-fidus. Cor. hypocrateriformis, 5-partita : limbo subaequali obtuso. *Caps.* teres, 2-locularis, polysperma.

1. *coccinea*, glaberrima, fol. obovatis nitidis. Richard in Act. Soc. Lin. p. 107. Hab. in Cayenna.

†† *Fructus baccatus.*

498. ULLOA. Cal. ovatus, inflatus, 5-partitus. Cor. tubulosa : fauce gibbosa. *Stigma* oblongum. *Bacca* bilocularis calyce magno obvoluta. *Sem.* reniformis.

1. *parasitica*. Juanulloa parasitica, fol. oblongis acuminatis, racemis dependentibus. dichotomis. Flor. Peruv. 2. p. 47. t. 185. Hab. in Peruv. nemoribus. Flor. et fruct. colore puiceo. h

499. JABOROSA. Cor. tubulosa. Cal. 5-fidus, brevis. *Stam.* fauci inserta. *Stigma* capitatum. *Bacca*?

1. *integrifolia*, fol. ovatis subintegerrimis, flore longo tubuloso. Lam. enc. 3. p. 181. t. 111. Willd. Sp. 2. p. 1016. Hab. in Bonaria. ☉

2. *runcinata*, fol. sinuato-lyratis dentatis, flore brevi subcampanulato. l. c. Cum priore. Scapus in his speciebus est uniflorus. Willd. ☉

500. TRIGUERA. Cor. campanulata : limbo inaequali. *Nect.* breve, germen cingens, 5-dentatum. *Filam.* nectario inserta. *Bacca* 4-locularis : loculis 2-spermis.

1. *ambrosiaca*, caule sulcato - alato, fol. superioribus obovatis dentatis pubescentibus. Willd. Sp. 2. p. 810. Cor. Diss. 2. app. 2. t. 2. Hab. in Boëtia. ☉

2. *inodora*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis glabris. Cav. l. c. app. 3. Cresc. cum priore.

501. SOLANDRA. Cal. rumpens. Cor. clavato - infundibuliformis maxima. *Bacca* 4-locularis, polysperma.

1. *grandiflora*. Swartz. Flor. p. 387. t. 9. Willd. Sp. 2. p. 936. In Jamaica, arboribus maximis et rupium fissuris subparasitica. Cor. lutea. Datura armentosa. Lam. ill. 2. p. 9.

502. ATROPA. Cor. campanulata. *Stam.* distantia. *Bacca* globosa, 2-locularis, calyci insidens.

1. *Mandragora*, acaulis, scapis nigris. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1016. Bull. herb. t. 145. *Mandragora* acaulis. Gaertn. de sem. 2. p. 237. Blackw. t. 364. *Mandragora* mas. Lobel. ic. 267. Flor. vere. Cor. albidula.

β. A. fol. minoribus angustioribus et magis undulatis. Lam. eneycl. 1. p. 391. *Mandragora* flore subaeeruleo purpureo. Bauh. pin. Hab. in Hispaniae, Helvetiae, Italiae, Sibiriae, Cretae, Cykladum apriciis. An distinctum genus?

2. *Belladonna*, caule herbaceo brachisto, fol. ovatis integris. L. Jacq. austr. 4. t. 309. Hab. in Austriae, Angliae, Germaniae, Italiae montibus sylvestribus. Corol. parum ringens, lutea. *Bacca* nigra, venenata. ☉

3. *umbellata*, caule frutescente, fol. ovatis cordatisque integerrimis angulatisque, flor. umbellatis, cor. revolutis. Flor. Per. 2. p. 44. t. 181. f. 2. Hab. in Peruviae collibus. Cor. mellifera. *Stigma* capitatum.



4. *biflora*, caule fruticoso, fol. ovatis acutis integerrimis, pedunc. bifloris, stam. cor. longioribus. Flor. Per. 1. 181. f. 6. b. Cresc. in praeruptis locisque humidis. Cor. subrotata, extus villosa. Stigma. 2-lobum.

5. *bicolor*, caule fruticoso, fol. ovatis angulatis glabris, pedunc. 3-4-floris. Flor. Per. 2. p. 45. Habit. in Peruviae umbris. Corol. tubulosa, rubro-viridis. Fol. subgemina.

6. *aspera*, caule herbaceo, fol. ovatis geminis: altero minori, flor. solitaria cernuis, cor. subdecussidis. Flor. Per. 1. c. Cor. luteo - caerulea, centro violacea: lacin. 5 - acutis, 5-alternis emarginatis. Filam. hirsuta.

7. *procumbens*, caule herbaceo procumbente, fol. geminis ovatis integerrimis (tenuioribus dorso et margine villosis) flor. umbellatis plicatis filam. glabris. Cav. ic. 1. p. 53. t. 72. A. plicata. Roth. Cat. 2. p. 24. *Saracha procumbens*. Flor. Per. 2. p. 43. t. 180. f. b. Hab. in Peruvia et Mexico. Cor. pubescens. Bacca depresso-globosa, lutea, 2-locularis. Roth. 1-locularis. Fl. Per.

8. *umbellata*, caule erecto herbaceo hirsuto, umbellis axillaribus pedunculatis cernuis, flor. plicatis, filam. basi barbatis, fol. ovatis scabris, floralib. geminis. Roth. 1. c. p. 24. Hab. . . Bacca globosa nitida atra, lineis 4-cruceatis notata, 2-locular. Priori affinis.

\* *SARACHA*. Cor. *rotato-campanulata*. Bacca (per abortum) 1-locularis. Recept. carnosum.

9. *punctata*, suffruticosa, fol. ovato-oblongis, cor. punctatis. Flor. Per. 2. p. 42. t. 178. In Peruv. altis. Flor. saejusculi nutantes.

10. *dentata*, caule procumbente, fol. geminis ovatis integris dentatisque, pedunc. subquadrifloris. Flor. Per. 2. l. c. t. 179. f. b. sub *Saracha*, uti antecedens et sequentes species. Corol. albo - violacea, utrinque villosa. Cresc. cum priore.

11. *contorta*, fol. ovatis angulato-dentatis integrisque, pedunc. multifloris umbellatis. Flor. Peruv. 2. p. 43. t. 180. f. a. In praeruptis Cantae. Stamina basi hirsuta. ☉

12. *biflora*, pubescens, fol. ovatis subgeminis, pedunc. bifloris. Flor. Peruv. 2. p. 42. t. 179. Hab. in Peruvia inter segetes et ad saepes. Corol. luteo - viridis. Bacca alba. ☿

13. *solanacea*, caule fruticoso, pedunc. solitar., cor. campanulatis, fol. subovatis. Linn. Mant. 205. *Solanum aggregatum*. Jacq. ic. rar. 2. t. 323. Collect. 4. p. 124. *Solanum guineense*. Lin. Spec. plant. 2. p. 263. Hab. ad Cap. b. spei littora maritima. ♀

*Obs.* An potius *Solanum*? vide Roth N. Bot. Beyträge, p. 162.

14. *arborescens*, caule frotescente, pedunc. confertis, corol. revolutis, fol. oblongis. Linn. Habit. in locis montosis frigidis Jamaicae. Cor. alba. ♀

15. *frutescens*, caule fruticoso, pedunc. confertis (subsolaribus), fol. cordato-ovatis obtusis. Linn. Lam. ill. t. 114. *Physalis suberosa*, cortice suberoso, fol. orbiculatis nitidis integerrimis. Cavan. ic. 2. p. 1. t. 102. Barr. ic. 1773. Hab. in Hispania. ♀

503. *NICANDRA*. Cal. 5-partitus, 5-angulatus: angulis compressis laciniosisque sagittatis. Cor. campanulata. Stam. incurva. Bacca carnea (exsucca 3 5-locularis, cal. tecta.)

1. *Physalodes*. Gsertn. de fruct. 2. p. 237. t. 131. Airo; a *Physalodes*. Lin. *Calydermos erosus*. Flor. Per. 2. p. 44. Hab. sponte in segetibus, ruderalis et versutus Lima etc., ubi per totum annum floret. Caulis subaltus ramosissimus. Cal. membranaceus venoso-reticulatus. Cor. albo-caerulea. ☉

504. *LINKIA*. Cal. 5-partitus: laciniosis lineari-lanceolatis erectis. Cor. campanulata: tubo pentagono. Anth. sagittatae.

1. *peruviana*. Desfontainia *spinosa*, fol. ovatis dentato-spinosis, flor. solitariis. Flor. Per. 2. p. 47. t. 186. Hab. in Peruv. oemorrhoides ad Churupallana praedium in Province. Tarma et inter Monna et Pozuzo. Fol. sapore amara, eaque masticata papyrus luteo colore tingunt. Fructus ad sepes conficiendas utilis et ob flor. cocci-neorum pulchritudinem coli meretur.

*Obs.* Cum jam geos *Fontanesia* existat, nomen mutandum erat. Plantam dicavi memoriae Cl. Link, viri amissioni, Professor. apud Rostockientes, ob opuscula botanica varia bene meriti.

505. *PHYSALIS*. Cor. campanulato-rotata. Stam. conniventia.

*Bacca* intra calycem inflatum, bilocularis.

\* *Perennes.*

1. *somnifera*, caule fruticoso, ramis rectis, flor. confertis. Willd. Spec. 2. p. 1019. Cavan. ic. 2. p. 2. t. 101. Habit. in Mexico, Creta, Hispania. Fructus Phyllanthidis, Flos Atropae.  $\text{h}$

2. *aristata*, caule fruticoso, fol. oblongis integris glabris, ramis petiolis pedunculisque lanuginosis, dententibus calycin. aristatis. Ait. Kew. 2. p. 244. Habit. in ins. Canariis.  $\text{L}$

3. *flexuosa*, caule fruticoso, ramis flexuosis, flor. confertis. L. Hab. in India. Habitus P. somniferæ.  $\text{h}$

4. *arborescens*, caule fruticoso, fol. ovatis pilosis, flor. solitariis, cor. revolut. Lin. Mill. dict. t. 206. f. 2. Hab. in Campechia.

5. *curassavica*, caule fruticoso, fol. ovatis tomentosis. Lin. Pluck. alm. 352. t. 111. f. 5. Hab. in Curassao.

6. *tomentosa*, caule fruticoso tomentoso, fol. elliptico-oblongis tomentosis, fl. laterali. aggregatis. Thunb. prodr. p. 37. Hab. a Cap. b. spei.  $\text{h}$

7. *viscosa*, fol. geminis repandis obtusis subtomentosis, caule herbaceo superne paniculato. Jacq. hort. t. 136. Alkekengi bonariense repeas, bacca turbinata viscosa. Dill. elth. 11. t. 10. f. 10. S. Hab. in Virginia, Bonaria. Tomentosa et subseabra, sed non viscosa. Jacq.  $\text{+}$   $\text{L}$

8. *obscura*, herbacea divaricato-ramosissima, foliis suborbiculatis acuminatis inaequaliter dentatis. Michaux Flor. 1. p. 149. Habit. in Carolina. Cor. flava, maculis fuscis, anth. caeruleiscentes. Var. viscido-pubescentes, et  $\beta$ . glabra.

9. *lanceolata*, pumila pubescens, fol. subsessilibus ovali-lanceolatis subintegris, cal. villoso, caule dichotomo. Mich. l. c. In Carolina.  $\text{L}$

10. *pennsylvanica*, fol. ovatis subrepandis obtusis nudiusculis, flor. geminis, caule herbaceo. Hab. in Virginia. Flor. unicolores.  $\text{L}$

11. *Alkekengi*, foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso. Hab. in Italiae, Germaniae. Japoniae serotibus. Calycis fructus sanguinei.  $\text{L}$

12. *peruviana*, pubescens, fol. cordatis integerrimis. Spec. pl. 1670. Hab. Lima.

Simillima Daturæ Metel. Flor. penduli, lutei, umbilico cor. maculis quinque fuscis utrinque conspicuis, fauceque hirsuta. L.

\* \* *Annuae.*

13. *angulata*, ramosissima, ramis angulatis glabris, fol. ovatis dentatis. P. fol. oblongo-lanceolatis dentatis integerrimisque, flor. pendulis. Flor. Per. 2. p. 42. Dill. elth. 13. t. 12. f. 12. Hab. in India utraque.  $\odot$

14. *pubescens*, ramosissima, fol. villosa-viscosa cordatis, flor. pendulis, cal. fructiferis subrotundo-globosis angulatis. Willd. p. 1023. Flor. Per. 2. p. 41. Moris. 1. 13. t. 3. f. 24. Hab. in India utraque. Corollae maculae fuscae. Baccae globosae, luteae.

15. *nodosa*, herbacea ramosa, foliis ovato-oblongis suberosis pubescentibus, flor. pendulis. Lam. ill. p. 23. Hab. in America.

\* *latifolia*, erecta ramosa villosa pubesens, fol. cordatis subintegerrimis, pedunc. brevibus nutantibus 1-floris. Lam. ill. l. c. Ph. barbadensis. Enc. bot. 2. p. 11. In Amer. Sequenti affinis.

16. *barbadensis*, ramosissima, foliis ovato-cordatis pubescentibus, flor. pendulis, cal. fructiferis ovato-acuminatis angulatis. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 39. Hab. in Barbados.

17. *chenopodiifolia*, ramosissima, fol. glabris ovatis acuminatis angulato-dentatis, cal. laevibus, magnitudine fructus, globosis. Willd. l. c. Hab.  $\odot$

18. *minima*, ramosissima, pedunculis fructiferis fol. villosa longioribus. Herm. Lugd. B. t. 571. Riffed. 10. t. 140. f. 71. In Indiae aridis sordidis.  $\odot$

19. *pruinosa*, ramosissima, fol. villosis, pedunc. strictis. Lin. Alkekengi barbadense, nanum, Alliariae fol. Dill. elth. 12. t. 9. f. 9. Hab. in America. Antherae flavae. Baccae subturbinatae. L.  $\odot$

20. *prostrata*, ramosissima diffusă prostrata, fol. ovatis repandis, caule ramisque terribus hirsutis. Jacq. ic. rar. 1. t. 38. Collect. 1. p. 59. 1. Her. Stirp. p. 43. t. 22. Hab. in Pernivae arenosis et collibus. Cor. fragrans, caerulea, lineis purpureis maculata. Flor. Per. 2. p. 41. Andr. t. 75.

506. SOLANUM. Cal. persistens. Cor. rotata, aut campanulata. 5-loba, plicata. Anthera sub-

coalitæ, apice porogemino dehiscentes. *Bacca* 2-locularis, poly-sperma. (*Anth.* passim liberæ præsertim in corol. basi hyalina.)

† *Inermia.*

\* *Folliis integris, aut sinuatis.*

1. *laurifolium*, caule inermi arboreo, fol. petiolatis ovato-oblongis, subus tomentosis, panicula terminali dichotoma divaricata. Lin. suppl. 118. Hab. in America australi. Arb. Baccæ nigrae.

2. *verbascifolium*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis tomentosis integerrimis, corymbis bifidis terminalib. Willd. phyt. 1. p. 5. n. 17. Jacq. hort. t. 13. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 1. Hub. in Ainer. h.

*auriculatum*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis acuminatis tomentosis integerrimis, stipulis cordatis, corymbis bifidis terminalibus. Willd. Ait. Kew. 1. p. 246. Hab. in ins. Madagascar, Mauritii et Bourboniae. An Var. præcælentis? Stipulis nonnunquam deciduis.

4. *pubescens*, caule inermi tomentoso fruticoso, fol. ovatis, basi decrescentibus integerrimis pubescentibus, racemis subumbellatis axillaribus. Willd. phyt. 1. p. 5. t. 3. Hab. in Indiae orientalis hortis. Simile *S. verbascifolium*, flor. racemoso-umbellatis, oppositifoliis.

\* *luteo-album*, caule fruticoso, folliis ovatis acutis, racemis lateralibus, flor. secundis. Fl. Per. 2. p. 16. t. 160. f. b. (*S. pubescens*.) Hab. in Per. nemoribus ad Cuchero tractus. Fol. utrinque pubescentia. Cor. albo-lutescens. An prioris varietas?

5. *virgatum*, caule inermi frutescente, ramis virgatis, fol. ovato-acutis, subus tomentosis, umbellis (in ramorum dichotomia) sessilibus. Lam. ill. 2310. encycl. p. 280. In Canariis. h.

6. *riparium*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis incanis, corymb. terminalibus dichotomis multifloris. Fl. Per. 2. p. 14. t. 166. f. b. (*S. dichotomum*. Hab. in Iluanaqui provincia ad torrentium marginæ. Rami tomentoso-pulverulenti. Flor. parvi. Cor. calyce duplo major, violacea. Bacca lutea.

7. *nutans*, caule inermi fruticoso, fol. oblongo-ovatis acuminatis, racemis brevissimis oppositifoliis, flor. secundis nutantibus. Flor. Peruv. 2. p. 14. t. 166. f. a. Hab. in Peruviae ruderalis passim in Pillao circuitu. Frutex ferrugineus. Folia

integerrima, venosissima. Corolla alba brevis.

8. *grandiflorum*, caule arboreo, fol. ovatis sinuatis integerrimisque, racemis racemis recurvis, flor. secundis magnis. Fl. Per. 2. p. 35. t. 168. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus humidis et calidis ad Pozuzo. Arb. sexorgyalis. Fol. subus lanuginosa, supra hispida. Cor. violacea, zonis textus lanuginosis. Bacca magna lanuginosa.

9. *viridiflorum*, caule fruticoso, fol. cordatis simplicibus, racemis dependentib. Flor. Peruv. 2. p. 38. t. 173. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus. Planta orgyalis, villosa. Cor. viridis. Bacca magna, turbinate, villosa.

10. *sessile*, caule inermi fruticoso, fol. spatulatis sessilibus, pedunc. terminalib. recurvo-pendulis, flor. capitato-umbellatis. Flor. Peruv. 2. p. 35. t. 167. f. a. Hab. in Peruv. ruderalis ad Manna vicum. Frutex biorgyalis, gl. her. Fol. conferta, ad basin eripia, pelulua. Flor. parvi. Corol. alba. Bacca alba.

11. *Melongena*, caule inermi herbaceo, fol. ovatis tomentosis, pedunc. pediculis inermis, calyc. inermib. Syst. verg. 188. Willd. s. p. 1036. *S. pomiferum* fructu oblongo. Bauh. pin. 167. Pluck. phyt. 226. f. 2. Fructus magnus violaceus.

β. *ovigera*, fructu ovato albo. Mill. Tournef. inst. 151. Lam. enc. p. 294. In Asia, Africa, America. An var. *S. insani*, cui aculeis exceptis, similis?

12. *muricatum*, caule subinermi suffruticoso radicante, turionibus muricatis, fol. oblongo-lanceolatis integris pubescentibus. Ait. Kew 1. p. 250. Willd. Sp. pl. p. 1037. Few. Peru. 2. p. 735. t. 26. *S. scabrum*. Lam. enc. p. 291. *S. variegatum*, fol. lanceolatis laevi inaequalibus excavatis, fl. cymosis, fructu maximo ovato. Fl. Per. 2. p. 19. t. 169. f. a. Hab. copiose in Peruv. cultis. Caulis radicans. Bacca ovata alba, purpureo colore variegata, pendula. 1-2-palmaris, edulis. h.

13. *salvifolium*, caule inermi fruticoso, fol. ovato-lanceolatis subus tomentosis, calycibus corollisque tomentosis. Lam. ill. n. 2108. enc. p. 280. An *S. subinermis*. Jacq. Willd. Sp. 2. p. 1037. *S. Hab.* in Gujana et Jamaica. h.

β ? *longiflorum*, inermis, fol. ellipticis integris attenuatis infra subtomentosis, racemis latissimis, cor. 5-partitis. Vahl. ceclog. amer. 1. p. 20. Hab. in Cajenna.

14. *terminale*, inermis frutescens, fol.

lanceolato-ovatis subintegerrimis pilosis, umbellis terminalibus. Vahl. l. c. Forsk. descr. p. 45. Hab. in Arabia felici. h

15. *pauciflorum*, fol. ovatis integerrimis, ramis calycibusque decedentatis tomentosis, pedunc. axillaribus geminis unifloris. Vahl. eclog. 1. p. 20. Hab. in Martinica.

16. *diphyllum*, caule inermi fruticoso, fol. geminis: altero minore, flor. cymosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 322. Collect. 2. p. 331. Hab. in Amer. Pedunc. subsolitarius. Bacca flava. h

17. *fugax*, caule inermi fruticoso dichotomo divaricato, fol. lanceolatis integerrimis glabris, pedunculis longissimis solitariis axillaribus unifloris, cal. decedentato. Willd. p. 1027. Jacq. ic. rar. 2. t. 324. Collect. 4. p. 123. Lam. enc. 4. p. 282. Hab. circa Caracas. Cor. stellaris: angulis flavescens. h

18. *geminatum*, fol. ovatis integerrimis, calycibusque decedentatis glabris, pedunc. axillaribus geminis unifloris, caule scandente. Vahl. eclog. 1. p. 21. Hab. in Cajenna. h

19. *retrofractum*, fol. ovatis glabris, ramulis axillaribus retrofractis, umbellis axillaribus terminalibusque sessilibus, cal. truncatis. Vahl. eclog. 1. p. 21. Hab. in Amer. merid. Affine S. geminato. h

20. *stellatum*, caule inermi fruticoso scandente flexuoso, fol. ovatis glabris acuminatis, pedunc. subgeminatis unifloris axillaribus, calycib. inaequaliter dentatis. Willd. p. 1028. Jacq. ic. rar. 2. t. 325. Coll. 3. p. 254. Hab. Calyx est quadri-quinque- et sex-dentatus: dentibus inaequalibus. Willd. h

21. *scandens*, caule inermi volubili, fol. cordatis ovatis dependens subtus mollissimis, panis terminalibus. Lin. suppl. 147. Enc. p. 292. Hab. in Surinamo. Caul. herbaceus. Cor. lacini recurvis.

22. *glandulosum*, caule suffruticoso scandente, fol. geminis ovato-cordatis, pedunc. 3-quinis interfoliaceis, denticul. calycinis glandulaeformibus. Flor. Peruv. 2. p. 35. t. 167. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. Fol. opposita? Cal. turbinatus, sagulato-striatus, carnosus. Lacini. 10, rarius 12-14, glandulaeformibus!

23. *lentum*, fruticosum inerme decumbens, ramis subscandentibus, fol. petiolatis ovatis, flor. terminalibus subumbellatis sessi-

lib., cal. 10-dentato. Hab. in Mexico. Stam. 4 sessilia, unicum longius pedicellatum. Cor. violacea: limbo 5-gono.

24. *obliquum*, caule inermi suffruticoso, fol. cordatis obliquis acutis, pedunc. lateralibus recurvis, flor. secundis. Flor. Per. 2. p. 35. t. 165. f. a. Hab. in Peruviae nemoribus ad Chincaico vicum, biorgyale. Cor. purpureo-violacea. Bacca oblonga.

25. *oblongum*, caule inermi suffruticoso, fol. geminis oblongis acuminatis altero maximo, racemulis lateralibus brevissimis, flor. secundis. Flor. Per. 2. p. 34. t. 165. f. b. Hab. in Peruv. nemorib. ad Pillao traciis. Planta glaberrima. Fol. majora tripalmaria, parva quadruplo minora. Bacca lutescens.

26. *biformifolium*, caule inermi suffruticoso flexuoso, fol. geminis oblongo-lanceolatis: altero minimo orbiculato, pedunc. 1-floris interfoliaceis, cal. 10-partito. Flor. Per. 2. p. 32. t. 161. f. a. Hab. in Peruv. nemoribus ad Chincaico runcationes. Corol. purpureo-violacea, patens. Calyx multipartitus, lacini linearib. Bacca luteo-rubra, cal. incarcerationa.

Obs. Haec et frequens species tam cal. multipartito, quam flor. situ axillari a ceteris differunt Solanis, an ab iis genere disjungendae?

27. *lineatum*, caule inermi fruticoso, fol. geminis ovatis acuminatis lineatis subtus villosis, pedunc. interfoliaceis 1-floris, cal. 10-fido. Flor. Per. 2. p. 31. t. 158. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus ad Munpa vicum. Cal. multipartitus: lacini linearib. Cor. alba, longitudine calycis. Bacca cal. incarcerationa, fusca.

28. *acuminatum*, caule inermi fruticoso, fol. geminis ovatis oblongis acuminatis stricto, racemulis lateralibus, flor. secundis. Fl. Per. 2. p. 34. t. 159. f. a. Hab. in Peruviae nemoribus ad Chincaico vicum. Planta glabra, caulis erectus, ramosis. Cor. parva, alba.

29. *filiforme*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis cordatisque obtusis, pedunculis lateralibus filiformibus bifidis subumbellatis. Flor. Peruv. 2. p. 31. t. 159. f. b. In Peruviae collibus. Planta habitu Salviae. Caulis granulatus. Corolla albo-caerulea.

30. *triquetrum*, caule inermi frutescente triqueiro, fol. cordatis acuminatis glabris, umbellis oppositifoliis subpedunculatis. Willd. Sp. p. 1029. S. caule triqueiro, fol. cordatis in lancea ferrugineo

productis. Cav. ic. 3. p. 30. t. 259. Hab. in N. Hispania. Caulis humifusus ramosus. Umb. 4-flora. Cor. alba. h

31. *foetidum*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis dependentibus, umbel. oppositifol. nutantibus. Flor. Peruv. 2. p. 39. Hab. in Tarmae oppidi versitris et ruderalis. Planta foetidissima. Cor. albo-caerulea. Bacca aurca.

32. *urceolatum*, caule fruticoso, fol. oblongis acuminatis, pedunc. oppositifol. 2-4-floris. Flor. Per. 2. p. 35. t. 168. f. a. (S. oppositifolium.) Hab. in Peruviae nemorib. ad Vitoc vicum. Planta orgyalis. Fol. undulato-repanda, utrinque glabra. Cal. in flore parvus, in fructu magnus, fere urceolatus. Dantur plures species ubi flores fol. sunt oppositi, hinc nomen minus congruum mutavi.

33. *pulverulentum*, caule inermi fruticoso, ramis pulverulentis, fol. lanceolato-linearibus, racemis ramis subcorymbosis. Flor. Peruv. 2. p. 33. t. 163. f. b. (S. *angustifolium*.) Hab. in nemorib. Huancu ad Acamayo tractus. Caulis ramosissimus. Fol. undulata longa venosa. Cor. albo-violacea.

34. *nitidum*, caule inermi fruticoso, ramis glabris nitidis, fol. ovato-lanceolatis acutis, racem. terminalib. subcymosis. Fl. Peruv. 2. p. 33. t. 163. f. a. Hab. in Peruv. nemorib. ad Tarmae provinciam. Fol. leviter repanda, venosa. Cor. albo-violacea, pulverulenta. Bacca nigra.

35. *corymbosum*, caule inermi suffruticoso, fol. ovato-lanceolatis acutis, pedunc. florentib. corymbosis. Jacq. ic. rar. 1. t. 40. Collect. 1. p. 78. S. fol. ovatis integris subtrilobisque, flor. cymosis. Retz. obs. 5. p. 22.

β. *S. cymosum*. Fl. Per. p. 31. t. 160. f. a. Hab. in Peruv. cultis, versuris et subhumidis locis. h

36. *nodiflorum*, caule inermi fruticoso, folis glabris ovatis utrinque acuminatis, umbellis pedunculatis extrafoliaceis (c. caulis nodis prodeuntibus.) Willd. Spec. p. 1035. S. fol. per petiolum decurrentibus, pedunc. filiformib. umbelliferis intrafoliaceis. Jacq. ic. rar. 2. t. 326. Collect. 2. p. 288. Hab. in ins. Mauriti. Pedunc. ex caul. nodis incrassatis rubescentibus proveniunt. h

37. *incurvum*, pubescens, caule herbaceo, fol. ovatis acuminatis, racemis geminis, altero breviori, pedicel. incurvis secundis. Flor. Per. 2. p. 34. t. 164. f. b.

Hab. in Peruv. nemorib. ad Munna vicum. Planta bipedalis. Caulis articulationibus incrassatus. Cor. albo-violacea.

38. *patulum*, caule inermi fruticoso, ramis pulverulentis, fol. lanceolatis acutis, racemis terminalib. patulis. Fl. Per. 2. p. 33. t. 164. f. a. (S. lanceolatum.) Hab. in Peruviae nemorib. Fol. sesquipalmaria. Cor. violacea magna. Bacca nigra. Pedunc. elongati, gemini, glabri.

39. *havanense*, caule inermi frutescente, fol. lanceolatis nitidis integerrimis, pedunc. subbiflor. L. Mant. 47. Swartz. obs. 82. Jacq. amer. 49. t. 35. Ed. picta. t. 48. Fl. Per. 2. p. 39. Hab. in Martinicae, Jamaicae, Peruv. umbrosis locis. Fol. aliquando gemina. Pedunc. solitarii 2-ternique.

40. *anceps*, caule herbaceo, fol. oblongo-lanceolatis, pedunc. axillaribus bi-ternis brevissimis, fructibus conicis ancipitib. Fl. Per. 2. p. 36. t. 169. f. a. Hab. in Peruv. nemorib. ad Cuchero tractus. Planta herbacea, tripedalis. Fol. integerrima. Flores secundi, parvi, virescentes. Bacca versus apicem multiangularis.

41. *Gnaphaloides*, caule inermi fruticoso, fol. lanceolatis repandis nitidis, umbellis oppositifoliis tomentosis, baccis nutantib. Flor. Peruv. 2. p. 31. (S. *calygnaphalum*.) Hab. in Peruv. umbrosis. Frutex bi-orgyalis. Cor. violacea. Baccae atrorubrae, saponaceae.

42. *acutifolium*, caule inermi suffruticoso flexuoso, foliis geminis ternisque lanceolatis integerrimis, pedunc. 1-floris interfoliaceis. Fl. Per. 2. p. 33. t. 163. f. b. Hab. in Munna nemorib. calidis hirsuta. Fol. utrinque hispidula, delfea. Cor. alba.

43. *sericeum*, caule inermi fruticoso, ramis gracilibus, fol. (parvulis) ovatis lanceolatis sericeis integerrimis, pedunc. lateralib. 2-flor. Flor. Peruv. 2. p. 33. t. 161. f. b. Hab. in Huancabussi nemoribus imis, calidis. Planta trinervis. Fol. parva, incana. Cor. violaceo-caerulea, extus sericea. Bacca rubra.

44. *Pseudo-capsicum*, caule inermi fruticoso, fol. lanceol. repandis, umbel. sessilib. Lin. S. fruticosum baccarum. Bauh. pin. 61. Pseudo-capsicum. Dod. pempt. 718. meth. p. 476. Hab. sponte in Madera, nunc ubique in Anthophylorum hortis colitur; autumnis in hyemem usque baccis cerasiformibus rubris copiosis onustus est pulcher hieco frutex.

\* *microcarpum*, caule inermi fruticoso, fol. ovato-lanceolatis, umbellis lateralibus, pedunculatis. Vahl. symb. 2. p. 40. Willd. Spec. pl. p. 1026. S. diphylum. Farak. Hab. in Aegypto. Fol. latis integerrimis, umbel. pedunculatis, fructu triplaminare videtur diversum a S. Pseudo-capsico. Vahl. h

45. *Dulcamara*, caule inermi fruticoso scandente, fol. cordatis glabris, superioribus auriculatis, carymbis oppositifol. L. Flor. dan. t. 607. Black. t. 14. S. Scandens s. Dulcamara. Bauh. pin. Hab. in Europae humentibus. Var. fol. omnibus uniformibus et p. pubescentibus, quae forte est S. lignosum, s. Dulcamara marina. Rafi. Syn. p. 265, cujus fol. secundum Hudson biruta sunt.

46. *crassifolium*, caule inermi frutescente subsarmentoso, fol. ovatis integris vel sinuato-angulosis obtusiusculis, flor. pendulis. Lam. enc. p. 284. S. Dulcamaram africanam, fol. crassis hirsutis. Dill. clib. 365. t. 273. f. 252. Willd. Sp. p. 1029. Hab. ad Cap. b. spec. h

47. *betaceum*, caule fruticoso inermi, fol. ovato-acutis crassis: limbo crispo, racemis pendulis. Cav. ic. 6. p. 15. t. 534. S. crassifolium. Ortega Dec. p. 117. In N. Hispania. Bacca ovata, magna, luteoviridis: 3 zonis longitudinalibus fuscis, tandem rubens. C.

48. *crispum*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis subcordatisque undulato-crispis acuminatis, flor. corymbosis. Flor. Per. 2. p. 31. t. 158. f. a. Hab. in Chile rudelat. Subtriangulare, amarissimum. Cor. dilute violacea. Bacca albo-lutescens. Incolae, quibus Natre dicitur, decoctam vel infusum ad febres inflammatorias in frequenti usu habent.

49. *leprosum*, caule erecto, fol. oblongo sinuatis subtus incanis, pedunc. alutariis bifloris. Ortega Dec. p. 115. Bacca lutescens, cerasi magnitudine.

50. *scissifolium*, caule fruticoso erecto, fol. cordatis sinuatis, racemis lateralibus 2-3-fidis subcymosis. Ortega Dec. p. 116. Hab. in insula Cuba. Cor. alba, cal. quadruplo longior.

51. *Chenopodioides*, caule inermi subherbaceo, fol. ovato-oblongis repando-sinuatis subhirsutis, junioribus subtus tomentosis. Lam. enc. p. 290. S. chenopodioides acinis albescentibus. Fcw. obs. 2. t. 14. Hab. in ins. Mauritiis.

52. *Phyllanthum*, caule inermi herbaceo alato, fol. sinuato-lobatis floriferis. Cav. ic. 4. p. 35. t. 359. f. 1. S. caule alato, foliis decurrentibus ovatis subtriangularibusque, racemis oppositifol. flor. pendulis. Fl. Per. 2. p. 32. Ha. it. in Lima, Chanccay et Lurin arciosis locis. Pedunc. oppositifolii, usque ad foliorum discum decurrentes. Spec. singularis ob fol. ad medium pedunculis adnata. Folia cuneata, 5-laba. ☉

53. *pygmaeum*, caule herbaceo inermi pollicari, fol. ovatis trilobis. Cav. ic. 5. p. 23. t. 439. f. a. Hab. in planitie vulgo Pampas de Buenos-Ayres. Caul. simplex, terminatus florib. ut plurimum binis. Fol. minima. Bacca minuta, villosa, globosa. ☉

54. *nigrum*, caule inermi herbaceo, fol. ovatis dentato-angulatis, racemis divicibus nutantibus. Lin. Elar. Dav. t. 40. ☉

\* *patulum*, ramis teretibus glabris, fol. integerrimis glabris. Dill. clib. 367. t. 275. f. 355. Hab. in India.

\* *villosum*, ( *moschatum* ), ramis teretibus villosis, fol. angulatis subvillatis, bac. luteis. Dill. clib. 366. t. 274. f. 353.

\* *guineense*, ramis angulatis dentatis, fol. integerrimis glabris. Dill. t. 274. f. 354. Lam. enc. 4. p. 289.

\* *virginicum*, ramis angulatis dentatis, fol. repandis glabris. Dill. t. 275. f. 256. S. alatum. Macench. meth. p. 474. Sw. obs. 83. Hab. in Amer.

β. *judaicum*, ramis aculeis incurvis, fol. repandis nudis. Cum priore.

\* *hirsutum*, ramis teretibus foliisque integerrimis hirsutis. Vahl. symb. 2. p. 40. S. aegyptiacum. Lam. l. c.

Obs. Varietates sic dictae Sol. *nigri* revera species sunt et cultura non mutantur, excepto S. *judaico*, quod s. *virginici* varietas est. Willd. p. 1014. — Ob conformitatem, quae inter eas obstat, ut subspecies hic enumeratae sunt.

55. *aethiopicum*, caule inermi herbaceo, fol. ovatis repando-angulatis, pedunc. fertilibus unifloris cernuis, fruct. torulosis. Jacq. hort. t. 12. S. torulosum. Moench. Hab. in Aethiopia. Fruct. ruber, magnus, profunde torulosus s. sulcatus.

56. *triste*, caule inermi frutescente, fol. lanceolato-oblongis subrepandis glabris, racemis subcymosis. Jacq. amer. 5a. t. 40. f. 2. Ed. pict. t. 49. Hab. in Martinica. h

57. *ruscemosum*,

57. *racemosum*, caule inermi frutescente, fol. lanceolatis repandis undulatis, racemis longis rectis. Lin. Jacq. amer. 50. t. 36. Ed. pict. t. 50. Hab. in Martinica, Surinami. Flor. albi. Pedunc. apice crassiores. h

58. *quadrangulare*, caule inermi frutescente tetragono, fol. ovatis integris angulatisque, flor. paniculatis. Thunb. profl. 36. Lin. suppl. 147. Hab. ad Cap. b. spec. Fol. sarpe decurrunt et caules angulos crispas formant. L. h

59. *triangulare*, caule inermi herbaceo trigono. fol. oblongo-ovatis integerrimis nullis, cor. pallide violaceis. Lam. enc. 4. p. 290. Rumph. 6. t. 26. f. 2. Hab. in Ind. orient. ©

60. *repandum*, caule inermi subherbaceo flexuoso laevi, fol. ovatis repandis tomentosis, pedunc. axillaribus cymosis. Forst. profl. n.º 105. Hnb. in Marchionis et Societatis insulis.

61. *bonariense*, caule subinermi fruticoso, fol. ovato-oblongis sinuato-repandis scabris. L. Dill. elth. t. 272. f. 351. Hab. in agro Bonariensi. Aculi aliquot in teruello caule. Flor. albi, magni, utantes. Planta coronaria. h

62. *macrocarpon*, caule inermi suffruticoso, fol. cuneatis repandis glabris. L. excl. Feuilli synonymo. Habit. in Peru. Caul. rigens. Bacc. pomiformes, flavae.

63. *angulatum*, caule bienni, fol. cordatis sinuato-angulatis, racem. lateralib. brevissim. pauciflor. recurvis. Flor. Peruv. a. p. 36. ic. 170. f. n. S. amplissimo anguloso hirsutoque folio, fructu aureo maximo. Few. obs. 3. p. 61. t. 46. Hab. in Peruv. hortis. S. *quitoense*. Lam. enc. 4. p. 285. Ulnaris, hirsutissima. Corolla albo-violacea. Bacca globosa, parvi citri aurantii magnitudine et colore.

\* \* *Foliis laciniatis et pinnatis.*

64. *lyratum*, caule inermi herbaceo erecto, fol. lytrato-basat. tomentosis. Th. jap. p. 92. Hab. juxta Nagasaki in Japonia. Totum tomentosum. Fol. inferiora lytrato-pinnatifida, superiora hastata.

65. *Tegore*, caule inermi fruticoso hirsutissimo, fol. petiol. inferiorib. pinnatifido-sinuatis, superiorib. cordatis, racemis simplicib. axillarib. Willd. Aubl. guj. 1. p. 212. t. 84. Hab. ad ripas fluvii Sinemari Gujao. h

66. *aviculare*, caule fruticoso inermi glaberrimo, fol. pinnatifidis, lacio. lanceolatis acutis, panic. axillaribus binis

ternisve. Ait. Kew. 1. p. 247. Curt. mar. t. 349. (S. lacioiatum. Willd. p. 1010.) S. *aviculare*. Forst. prod. n.º 107. Lam. enc. 4. p. 292. Hab. in N. Zeelandia. Fl. Geranii pratensis, laciniis corol. emarginatis. Anth. separatar. Willd. h

67. *quercifolium*, caule inermi subherbaceo angulato flexuoso scabro, fol. pinnatifidis, racem. cymosis. L. Sp. pl. 264. Fl. Per. a. p. 36. Few. Peruv. 772. t. 15. In Peruv. versuris. Cor. violaceae: maculis duabus viridibus ad basin singuli lobi. Similis S. sequenti, differt: fol. scabris, floribusq. paniculato-corymbosis majoribus. Willd.

68. *ralicans*, caule inermi herbaceo laevi teretiusculo prostrato radicante, fol. pinnatifidis, racem. cymosis oppositifol. Lin. Dec. 1. t. 10. Hab. in Peru. In Flor. Peruv. non occurrit. T

69. *reclinatum*, caule inermi sulcato ramoso, fol. pinnatifidis: pinnulis longia sublinesrib. decurrentibus, pedunc. racemosis axillarib. Colitur in horis. Vid. le Botaniste-Cultivateur, 2. p. 134. Tot. glabr. Flor. magni, caerulei.

70. *runcinatum*, caule herbaceo procumbente anguloso, fol. laciniato-pinnatifidis, corymb. terminalibus, dichotomis. Flor. Per. 2. p. 36. Hab. in Peruvise et Chilensis regni ruderalis et versuris. Pl. succosa, fragilis, tripedalis. Fol. subbruniceata. Cor. violacea, revoluta. Bacca parva, lutea.

71. *pinnatifidum*, caule herbaceo alato fol. decurrentib. pinnatifidis, flor. paniculatis. Fl. Per. a. p. 37. t. 170. f. b. S. caule herbaceo erecto laevi, fol. ampl. profunde pinnatifidis glaberrimis, flore plano. Lam. ill. n.º 2533. t. 115. f. 4. enc. 4. p. 287. Hab. in Peruv. arenosis. Planta succosa. Caul. fragilis. Corolla dilute caerulea. Bacca lutea.

72. *multifidum*, caule herbaceo nudo, fol. multifid. in petiolum decurrentibus, pedunc. dichotomo-paniculatis. Fl. Per. 2. p. 37. t. 171. f. a. Lam. enc. 4. p. 287. Hab. in Peruv. collibus ad Pongo prov. Camanae vicum. S. pinnatifido affine, sed canl. teres non alatus. Fol. semi-amplexicaulia. Corolla obscure caerulea.

73. *pinnatum*, caule inermi herbaceo sulcato, fol. pinnatis, flor. corymbosis. Cav. ic. 5. p. 23. t. 430. f. 1. Hab. prope Coquimbo in Chile. Caulis est fere alatus ex decursu foliorum. Corolla saturate lutea. Bacca globosa, nigra. Fol. potius pinnatifida sunt. ©

73. *pomiferum*, caule herbaceo villosa, fol. interrupte pinnatis, fructu oblongo inverse conico. Cav. Descr. p. 112. Flores racemosi. Baccæ obconicæ.

74. *peruvianum*, caule inermi herbaceo, fol. pinnatis incisus tomentosis (incanis), racem. bipartitis. foliosis, baccis subpilosis. Iân. Jacq. ic. rar. 2. t. 327. Collect. 2. p. 284. Fl. Per. 2. p. 37. Hab. in Peruv. aridis locis, versur. et ruderat. Fl. longe pedicellati. Corolla lutea; laciniis acutis reflexis. ¶

75. *Lycopersicum*, caule inermi herbaceo, fol. pinnat. incisus, racem. bipart. aphyllis, fructib. glabris torulosus. Murr. syst. veg. 224. S. *pomiferum* fructu rotundo striato molli. Baub. pin. 167. Pomum amoris. Rumph. amb. 5. p. 417. t. 151. f. 1. Flor. Per. 2. p. 37. Hab. in Amer. calidiore. ☉

Obs. Secundum auctores Fl. Peruv. l. c. in ruderatis maritimis regni peruviani abundat S. *Lycopersici* varietas illa, quam C. Bauhinus *Solanum racemosum ceratocnium* forma nuncupat. Pin. p. 167, quæ hirsuta procumbens est, an distincta?

76. *Pseudo-Lycopersicum*, caule inermi herbaceo, fol. pinnat. incisus, racem. simplicibus, fructibus subvillosis, laevibus. Jacq. hort. 1. t. 11. Hab. . . Var. prioris? cui simillimum. ☉

77. *tuberosum*, caule inermi herbaceo, fol. interrupte subcorymbosis pinnatis integerrimis, pedunc. S. *tuberosum* esculentum. Baub. prod. 89. t. 89. Flor. Peruv. 2. p. 38. Hab. sponte in collib. et prædiis in Peru. Innotuit 1550. C. Bauhino. ¶

78. *pimpinellifolium*, caule inermi herbaceo, fol. pinnat. integerrimis, racemis simplicibus. L. Amoen. acad. 4. p. 208. Hab. in Peru. ¶

79. *montanum*, rad. tuberosa, caule inermi herbaceo, fol. subcordatis repand. L. fol. ovat. integr. lacinialisque. Fl. Per. 2. p. 32. t. 160. f. a. Hab. in Peru, in collib. arenosis et saxosis.

80. *mite*, caule herbaceo radicante, fol. impari-pinnatis, foliol. oblongis, racemis axillarib. aggregatis, baccis glo. os. Flor. Per. 2. p. 38. t. 171. f. a. Hab. in Chincao vicos in locis humidis et umbrosis in Peruvia. Cul. nitidus, flexuosus. Fol. minutissima. Flor. minimi, albi.

81. *diffusum*, caule suffruticoso, ramis virgat. diffusis, fol. impari-pinnatis: foliol. oblongis, pedunc. axillarib. 2-5-flor. Flor.

Per. 2. p. 37. t. 171. f. b. Hab. in Peruviae nemorib. ad Huancu provinciam. Jaesini facie. Cor. violacea, patens.

82. *pendulum*, caule fruticoso, foliis pinnatis: foliol. 2-6-nis oblique cordatis, racem. dependentib. furcat. Fl. Per. 2. p. 39. t. 174. f. a. Hab. in *Panathauarum* provinciae nemoribus. Cor. elongata profunde 5-fida: lacin. acutis, subpulescens, purpurea.

83. *conicum*, caule herbaceo, fol. impari-pinnatis: foliol. oblongo-lanceolatis, pedunc. axillarib. subtern. apicatis, fructu conico. Flor. Per. 2. p. 38. t. 172. f. b. Hab. in Peruv. nemorib. ad Chincao et Cuchero tractus. Cor. albo-cærulea. Bacc. conica, alba.

84. *ternatum*, caule suffruticoso tetragono scandenti radicante, fol. ternatis, pedunc. axillarib. Flor. Per. 2. p. 38. t. 172. f. a. Hab. in Peruvine nemor. humidis. Planta glabra. Fol. longe petiolata. Baccæ ovato-conica albicans.

#### †† *Aculeata* (Folia in plurimis sinuato-lobata.)

85. *insanum*, caule aculeato herbaceo, fol. oval. tomentosis, pedunc. pendul. in crassatis, cal. aculeatis. Pluck. alm. 550. t. 226. f. 3. Moris. 2. 13. t. 2. f. 2. Triongum hortense. Rumph. amb. 5. p. 233. t. 85. In Indiis. Affinis S. *Melougnac*, Differt caule, et fol. aculeatis. ☉

\* *seylanicum*, caule aculeato fruticoso, fol. oval. sinuat. subtomentosis, calycibus aculeatis, fructu oviformi. Scop. delic. insubr. 1. t. 1. Lam. enc. p. 295. Hab. in Zeylona.

86. *torvum*, caule aculeato fruticoso, aculeis curvis, fol. subcordatis ovatis sinuat. tomentosis, rachibus aculeatis, cal. inermibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 456. S. indicum. L. Sp. pl. 1. p. 187. Pluck. alm. 350. t. 225. f. 6? Hab. in sepibus Jamaicae et insularum Bermudensium. Var. fol. inermibus: petiol. solis hinc inde aculeatis. S. ¶

87. *volubile*, caule aculeato fruticoso scandente, fol. angulatis, petiol. rachibus calycibusque aculeatis. Swartz. l. c. p. 458. S. sarmentosum. Lam. enc. 4. p. 308. S. lanceaefolium. Jacq. ic. 7. Hab. in sylvis Hispaniolae. ¶

88. *ferox*, caule aculeato herbaceo, fol. cordatis angulatis, tomentosis, aculeatis, hirs. cal. obtectis. Hab. in Malaharia. Statua S. *Melougnac*. Cal. aculeati, obtegetes totas baccas hirsas.



89. *campechiense*, caul. fruticoso aculeato hirtio, fol. cordato-oblong. quinquelobis dentatis; cal. aculeatissimis. Willd. p. 1039. Dill. elth. 361. t. 268. f. 367. Lam. enc. 4. p. 237. Hab. in America. Fol. acis stellatis divergentibus. An a sequente diversum? h

90. *fuscatum*, caule herbaceo aculeato, fol. cordato-ovatis sinuato-lobatis obtusis lob. subangulatis, aculeis superiorib. coloratis. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 42. Collect. 1. p. 51. Lam. l. c. t. 266. Habit. in Amer. Rami varic spinosi, latere solari fusciscentes. ©

91. *mammosum*, caule aculeato herbaceo, fol. cordatis angulato-lobatis: utrinque villosis aculeat. Lin. Pluck. alm. 350. t. 226. f. 1. Merlon. surin. 27. t. 27. Hab. in Virginia, Barbados. ©

92. *hirtum*, fruticosum aculeatum, fol. cordato-angulatis tomentosis aculeatis; peduncul. lateralibus aggregatis calycibusque hirsutissimis. Vahl. symb. 2. p. 40. Hab. in ins. Trinitatis. h

93. *paniculatum*, caule petiolisque aculeatis, fol. sinuato-angulatis supra glabris, flor. paniculatis. L. Hab. in Brasilia. Caul. et petioli albo-tomentosi aculeis rectis.

94. *crinitum*, fruticosum aculeatum, fol. ovatis sinuato-angulatis tomentosis, petioli, pedunc. calycibusque echinatis. subcrinitis. Lam. encyc. p. 297. Hab. in Cajenna. Le Blond. h

95. *aculeatissimum*, caul. fruticoso aculeatissimo, fol. cordatis quinquelobo-sinuato-pilo-sculis, calyc. subaculeatis. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 41. Collect. 1. p. 100. Hab. in Amer. Affine S. campechiensi. h

96. *virginianum*, caule erecto aculeato, fol. pinnatifid. undique aculeatis, lacinii sinuatis obtusis, margine ciliatis, calycibus aculeatis. Willd. p. 1041. Dill. clth. 360. t. 267. f. 346. Pluck. alm. 351. s. 62. f. 3. Hab. in Amer. ©

97. *Jacquini*, caule decumbente diffuso aculeato, fol. pinnatifid. undique aculeatis lacin. sinuat. obtusis, margine nudis, cal. aculeatis. Willd. S. virginianum. Jacq. ic. rar. 2. t. 332. Coll. 2. p. 285. Hab. in India orient. ©

98. *xanthocarpum*, caule decumbente diffuso aculeato, fol. pinnatifidis aculeatis stellato-pubescentibus; lacin. sinuat. acutis margine nudis, calycibus aculeatis. Willd. Schrad. et Wendl. tert. Hannov. 1. p. 8. t. 2. Hab. in Aethiopia. S. Jacquini similimum. ©

99. *coagulans*, caule aculeato fruticoso, fol. oblongis repando-sinuatis tomentosis aculeatis; lobis rotundatis integris. Vahl. symb. 2. p. 41. Forsk. descrip. 47. Hab. in Arabia felici. h

100. *jamaicense*, caule aculeato fruticoso, fol. ovatis medio latioribus obtusangulatis utrinque tomentosis, racibus calycibusque aculeatis; aculeis reflexis. Sw. flor. ind. occid. 1. p. 454. Hab. in ruderatis Jamaicae, Hispaniolae. S. tomentosum rectis. h

101. *indicum*, caule aculeato fruticoso fol. cuneiformib. angulat. subvillosis jaggerimis; aculeis utrinque rectis. L. Burm. zeyl. 220. t. 102. Dill. elth. 362. t. 270. f. 349. S. cuneatum Moench. meth. p. 476. Hab. in India. h

102. *undatum*, fruticosum aculeatum, fol. ovatis repand. subtus tomentosisculis, aculeis nudis. Lam. enc. 4. p. 301. Rheed. malab. 2. t. 37. Hab. in ins. Mauritiu Flor. corymbosi, interdum 1-flori. Baccis magnis, ovatis.

103. *heterophyllum*, fruticosum aculeatum, fol. ovatis sinuato-repandis subtus tomentosisculis, aliis minoribus obovatis integerrimis. Lam. enc. p. 301. Hab. in Gujana. Fl. racemosi. Fol. magna.

104. *ciliatum*, caule aculeato herbaceo, fol. cordatis sinuato-angulatis aculeatis ciliatis pedunculis brevibus paucifloris. Lam. ill. n°. 2360. encycl. 4. p. 298. Hab. ... Floris parvi, subaculei.

105. *angivi*, aculeatum fruticosum, fol. ovatis sinuato-angulatis subtus tomentosis, cal. incurvis. Lam. enc. 4. p. 304. Ill. n°. 275. Habit. in insula Madagascar. Flor. racemosi. Fructus parvi, rubri, aculeati.

106. *carolinense*, caule aculeato annuo, foliis hastato-angulatis; aculeis utrinque tectis, racemis laxis. L. Jacq. ic. rar. 2. t. 331. Coll. 2. p. 287. Dill. clth. 362. t. 269. f. 348. Michaux, Flor. 1. p. 170. In Carolin. Caulis pinnilis. Folia ovali-oblonga lasi acuta. Michaux, Can. 4. quod fruticosus, sed annuus.

107. *sinuatum* (villosum), caule fruticoso tereti aculeato, fol. bipinnatifido-sinuatis villosis utrinque aculeatis, calycibus villosis aculeatis. Willd. p. 1043. Hab. ... Differt a S. Sodomco: fol. villosis bipinnatifidis, corol. flavis, laccis calyce tectis. Willd. h

108. *sodomum*, caule aculeato fruticoso tereti, fol. pinnatifido-sinuatis sparse aculeat. nudis, calycib. aculeatis. Moris. 2. 3.

t. 2. f. 15. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 4? In Africa. h

109. *capense*, caule aculeato fruticoso tereti, fol. sinuato - pinnatifidis aculeatis nudis, lacin. altern. integr. obtusis. Linn. suppl. 147. Hab. in Cap. b. s. ci. Planta copiosa aculeorum horrida. h

110. *marginatum*, aculeatum, fol. cordat. repand. margine albis. Lin. suppl. 147. Jacq. ic. rar. t. 45. Collect. r. p. 50. Habit. in Abyssinia. Caulis albo-tomentosus. Cal. meris. fructiferi aculeati.  $\beta$ ? S. argyrantha. Courset Botan. cultivateur, 4. p. 48. Cal. 6-7 - fidus. Stam. saepe 6. h

111. *stramonifolium*, caule aculeato-fruticoso, fol. cordat. angulato-lobat. integr. subinermib. subtus tomentosiusculis. Ait. Kew. t. p. 252. Jacq. ic. rar. t. 44. In India occident. h

112. *toxicarium*, fruticosum aculeatum, fol. lobato-angulosis tomentosis basi oblique marginatis, aculeis utrinque sparsis, racemis sessilibus, lacin. corollae sublanceolatis. Rich. in Act. Soc. Paris. Lam. encycl. p. 309. Hab. in Gujana.

113. *hispidum*, caule aculeato fruticoso hispidissimo, setis apice stellatis, fol. lobatis, corymb. magn. dichotomis. Flor. Per. 2. p. 40. t. 156. f. b. In Peruviae ruderalis. (S. stellatum.) Folia superiora nonnulla ovata, integerrima, acuta; pauca subrepanda, reliqua cordata, 7-11-lobata subspithamea, subtus valde hirsuta, supra aspera setis minimis in stellarum formam dispositis.

114. *incanum*, caule arboreo aculeato, fol. juniorib. 7-9-lobatis; adultis sinuatis, racemis 2-3-nis subcorymbosis, fl. secundis. Flor. Per. 2. p. 40. t. 175. f. b. Hab. in Peruv. praeruptis, ad torrentium margines. Arbor 4-origyalis et ultra. Fol. supra nitida, subtus tomentosa, alba. Cor. alba. Fol. ad ulcera canerosa adhibentur.

115. *Milleri*, caule fruticoso aculeato, fol. glabris subquingelobo - pinnatifidis integerrim. aculeatis, pedunc. 1-flor. subgeminatis. Willd. Sp. 1. p. 1099. Jacq. ic. rar. 2. t. 330. Collect. 4. p. 209. Lin. suppl. p. 270. Hab. ad Cap. b. spec. h

116. *trilobatum*, caule aculeato fruticoso, fol. cuneiformi-angulatis subtrilobis obtus. glabris, flor. racemosis. Willd. l. c. Burm. ind. p. 27. t. 22. f. 2. S. acetorae-folium. Lam. encyc. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 5. p. 306. Hab. in Jam. et India orient. Caulis alutus. Fol. parva glabra. h

*Obs.* Hoc cum praecelente conjunxit Linnaeus, ab illo vero diversum fol. nunquam pinnatifidis, cor. quadruplo et ultra majorib. violaceis. Willd.

117. *laciniatum*, caule aculeato fruticoso scandenti, fol. geminis laciniatis: altero lanceolato-integerrimo, racem. filiformibus longissimis. Fl. Per. 2. p. 40. t. 177. f. a. Hab. in uemorib. Chincae et Cuchero. Cor. caerulea. Bac. globoso-ovata, magnitudine parvi pyri, aerea.

118. *tectum*, aculeatum, fol. bipinnato-sinuatis, fructu tecto. S. fructu - tecto. Cav. ic. 4. p. 5. t. 309. Hab. in Imperio Mexico. Caulis, foliorum nervi et calyces aculeati. Fl. racemosi. Cor. lutea, extus tomentosa. Bac. calice aucto tecta.

119. *sismbrifolium*, aculeatum, fol. subbipinnatifidis villosis aculeatis; lobis dentatis, stigmatibus bilobis. Lam. ill. 2286. enc. p. 307. Hab. circa Buenos-Ayres. Commerson.

120. *cornutum*, aculeatum, fol. pinnato-pinnatifidis aculeatis, antheris declinatis corniformibus: infra maxima productissima. Lam. enc. p. 308. Juss. in Annal. d. Muscum. 14. p. 120. t. 9. Habit. in Mexico Fl. lutei, subinaequales. Cal. spinosus.

121. *Vespertilio*, caule aculeato fruticoso, fol. cordat. integris, cor. subirregularibus, anthera ima productiore. Ait. Kew. t. p. 252. Wendl. hort. Herrenb. p. 5. t. 21. Hab. in insulis Canariis. Una ex antheris imis longissima arcuata. h

122. *sanctum*, caule aculeato fruticoso, aculeis tomentosis folisque oblique ovatis repandis. Lin. Vahl. symb. 2. p. 41. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 2. Hab. in Palacstina. Caul. tomentosus, cinereus, aculeis crassis, flavescentibus. h

123. *hybridum*, caule aculeato fruticoso, fol. ovatis subinermibus acutis repandis: tenellis dorso et ad oras violaceo - pulverulentis. Linn. Jacq. hort. 2. t. 113. Habit. in Guinea. h

124. *tomentosum*, caule aculeato fruticoso, aculeis acerosis rectis, fol. cordatis inermib. subrepandis: tenellis purpureo-pulverulentis. Hocc. sic. 8. t. 5.

$\beta$ ? *coccineum*, caule aculeato fruticoso, fol. ovatis subrepandis, uno alterove nucleio armatis subtomentosis. Jacq. ic. rar. t. 43. Habit. in Aethiopia. h

125. *rigidum*, aculeatum frutescens humile, fol. ovatis sinuato-angulosis aculeatis nulliusculis, aculeis rectis albid. Lam. enc. p. 303. Hab. . . h

126. *polygamum*, caule aculeato, foliis ovato-oblongis sulcatis integris supra scabriusculis, subtus tomentosis. Vahl. symb. 3. p. 39. t. 55. Hab. in ins. St. Crucis. h

127. *bahamense*, caule aculeato fruticoso, fol. lanceol. repandis obtusis margine reflexis, racem. simplicib. Linn. Dill. eith. 263. t. 271. f. 250. Sloan. jam. 108. hist. 1. p. 38. t. 11. f. 3. Habit. in America insula Providentia. h

128. *obscurum*, fol. elliptico-lanceolatis planis subtus villosis, racemis lateralibus, caule petiolisque aculeatis. Vahl. symbol. 2. p. 41. S. crotonoides. Lam? Habit. in Cajenna. h

129. *giganteum*, caule aculeato fruticoso: aculeis tomentosis, fol. lanceol. acutis inermibus, supra glabris, subtus tomentosis et incanis, racem. dichotom. cymosis terminalibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 328. Coll. 4. p. 125. S. *niveum*. Vahl. symb. 2. p. 41. Th. pr. 36. Hab. ad Cap. b. spec. h

130. *scabrum*, caul. aculeato fruticoso, fol. sinuato-angulat. scabris, corymb. dichotomis, flor. intus secundis. Fl. 2. Per. p. 39. t. 175. f. a. Habit. in Peruviae versuris et ruderalis. Fol. subtus valde venosa, utrinque actia minimis in stellarum formam digestis scabra. Baccæ aurantiæ loco saponis ad crines et vestimenta aluenda inseruiunt.

131. *incarceratum*, caule aculeato suffruticoso, fol. geminis cordatis aculeatis, flor. secundis, bac. glabr. cancellatis. Flor. Per. 2. p. 40. t. 176. f. a. Hab. in Peruv. nemoribus, ad Chinæo runcationes. Calyx inermis, in flore reflexus, infructu erectus. Cor. albo-violacea. Baccæ alba, oblonga, venosa, glaberrima.

132. *flexuosum*, fol. geminatis elliptico-lanceolatis scabriusculis integris, subtus petiolisque aculeatis, florib. tetrandris. Vahl. eclog. 1. p. 22. Habit. in Cajenna. Valde affine S. obscuro. h

133. *lanceolatum*, caule fruticoso tomentoso aculeato, fol. angusto-lanceolatis integerrimis, subtus tomentosis inermibus, panicula terminali. Willd. Cav. ic. 3. p. 23. t. 245. S. cymosum. Ortega Deced. 1. p. 12. Hab. in Mexico. Flor. caerulei terminales magni. h

134. *eleagnifolium*, caule fruticoso petiolis foliisque lanceolatis obtusis inferne tomentosis subaculeatis, racem. lateralibus. Willd. Cav. ic. 3. p. 22. t. 243. Habit. in Amer. calidiore. Aculei capillares. h

135. *polyacanthos*, aculeatissimum, fol.

linearilanceolatis subrepandis subsessilibus obtusis, pedunc. axillarib. unifloris, aculeis acicularib. Vahl. eclog. 1. p. 24. Lam. enc. 2. p. 23. S. (*parviflorum*.) Cavan. ic. 3. t. 19. t. 246. Plum. ic. 218. t. 224. f. 1. Hab. in ins. Dominica. Corol. alba. Baccæ minina. h

136. *igneum*, caule aculeato fruticoso, fol. lanceolatis acuminalis basi utrinque revolutis, racem. simplicibus. Linn. Jacq. hort. t. 14. Pluck. alm. 350. t. 225. f. 5.

β. S. *parvifolium*. Vahl. eclog. 1. p. 23. Hab. in Amer. Flor. albi. Spinæ rubro-igneæ.

137. *pyracanthos*, caule aculeato suffruticoso, fol. oblongis acutis sinuatis tomentosis: utrinque aculeis rectis suboccidentis. Lam. encyclop. 4. p. 299. Hab. in ins. Madagasc. Caul. obscure fuscus, apice et in juniorib. tomentosus.

138. *asperum*, caule aculeato arboreo, fol. oblongis solitar. geminisque, corymbis ramis subdichotomis Flor. Peruv. 2. p. 39. t. 174. f. b. (S. *aspero-lanatum*.) Hab. in Peruv. præruptis ad Huancanasi arcem. Frutex aspero-lanatus: lantigo lucida in stellæ formam digesta. Caulis erectus superne ramosissimus, vix aculeatus. Cor. alba. Baccæ luteæ.

### +++ Spinosa.

139. *lycioides*, caule fruticoso spinoso, fol. ellipticis, pedunc. aggregatis unifloris. Jacq. ic. rar. 1. t. 46. Collect. 1. p. 96. Flor. Per. 2. p. 41. t. 177. f. b. Habit. in Peruv. locis argillosis et petrosis, passim ad Huancu et Tarumæ provincias. Caul. ramosissimus, ramis in spinam foliosam floriferam desinentib. Cal. lacin. appendiculat. Anth. liberæ. Corol. in hortis nivea, in Peruv. caerulea, fundo lutescens. Baccæ globosa, rubro-crocea. Sem. ossea. An diversum genus? h

### 507. CAPSICUM. Cor. rotata. Baccæ ex ucca.

1. *annuum*, caule herbaceo, peduncul. solitariis. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1050. Rheed. 2. t. 35. Hab. in America meridionali. ☉

2. *baccatum*, caule fruticoso lævi, pedunc. geminis. Linn. Rumph. 5. t. 88. f. 2.

3. *sinense*, caule fruticoso, pedunculis geminatis, fructib. ovatis pendulis, foliorum petiol. subpubescentib. Willd. Jacq. hort. v. 3. t. 67. Habit. in China. Fructus ovatus magnitudine cerasi. h

4. *grossum*, caule suffutescente, scutib. incrassat. variis. Mant. 47. Berl. syst. aut. 2. t. 2. f. 1. Hab. in India. Fructus maximus.

5. *frutescens*, caule fruticoso, pedunc. solitariis, fructibus oblongis. Willd. Clus. exot. 340. f. 2. Rumph. 3. t. 88. f. 1. 3. 4. Hab. in Indiis. h

6. *cerasiforme*, caule scuticoso, pedunc. solitariis, fructibus globosis. Willd. Hab. .... Simile antecedenti, sed fructus globosus. W.

508. **CESTRUM**. Cor. infundibuliformis: lac. acutis marginatis. Stam. denticulo in medio, ant. edentula. Anth. 4-gonac. Bacca 1-2-locularis. Sem. pauca, angulata.

1. *Jaurifolium*, filamentis denticulatis nudisve, fol. elliptic. coriaceis nihilisim., pedunc. petiolo breviorib. L'Herit. stip. 1. p. 69. t. 34. Willd. Sp. 2. p. 1054. C. venenatum, Lam. encyc. 1. p. 680. Pluck. phyt. t. 95. f. 1. Hab. in America. h

2. *macronphyllum*, filam. denticulatis, fol. ovato-oblongis acuminatis glaberrimis, flor. fasciculatis sessilib. Vent. Choix de Pl. p. 18. t. 18. Hab. in ins. Antillanis, Porto-Rico. Riedel. Priori affine. Cur. alba.

3. *nocturnum*, filamentis dentatis, pedunc. subracemosis folio aequalib. L'Hérit. stip. 1. p. 70. Dill. elth. 183. t. 151. f. 185. Pluck. alm. 35. t. 64. f. 3. Hab. in Jamaica. Chili. h

4. *Parqui*, filamentis denticulatis nudisve, caule florifero paniculato, stipulis lineacib. L'Her. l. c. 1. t. 36. Pacqui. Feuil. Peruv. 2. p. 72. t. 32. f. 1. C. vicatum, fol. lanceolatis acutis, ramis floriferis paniculatis, pedunc. corymboso-racemosis. Floe. Peruv. 2. p. 27. Hab. in Chili locis humidis. h

Obs. In Flor. Peruv. l. c. p. 28. de hac specie sequentia prolata sunt. L'Hérinicus folia ramulorum inferiorum perperam *stipulas* appellavit, et Filam., contra ejus assertionem, in loco natali *edentula* sunt, nec non ad basin solummodo tumida ac villosa.

5. *auriculatum*, filamentis edentatis, stipul. amplexicaulib. lunatis, fol. ovatis, flor. panicul. terminalib. Willd. C. Hellunda. Lam. enc. 1. p. 680. Hellunda Jasmini flor. Feuil. Pecuv. 2. p. 25. t. 20. f. 3. Habit. in Lima humidis.

6? *auriculatum* (affine), foliis ovatis oblongo-lanceolatisque, auricul. (stipulis) oblique cordatis, ram. florifec. divergentib., pedunc. corymboso-paniculatis. Floe. Per. 2. p. 28. t. 155. f. 2. Hab. in Per. versuris, ruderalis, sepibus.

Obs. An ob stipulae formam diversa ab *C. auriculato*. L'Hec. cujus stipulas etiam ceniformes, amplexicaules observavi sed saepius tantum in can. juniorib. fl. experis.

6. *scandens*, filamentis edentulis, fol. ovatis attenuatis glabris, caxem. axillaribus subcompositis, ramis scandentibus. Vahl. eclog. 1. p. 24. Hab. prope St. Martbam. h

7. *undulatum*, filam. dentatis, fol. ovatis acutis undulatis, pedunc. axillaribus terminalibusque paucifloris. Fl. Pec. 2. p. 28. t. 155. Hab. in Pecuv. ruderalis praesertim ad Huanuci urbem.

8. *confertum*, fol. ovato-ovalibus acuminatis coriaceis confertissimis, flor. axillaribus congestis sessilib. Flor. Per. p. 29. t. 153. In Pecuv. sylvis, Cal. cilialis. Cor. lutescens: limbo externe atro. Filam. edentula.

9. *conglomeratum*, fol. lanceol. acutis, floe. axillarib. numerosissim. conglomeratis sessilib. Flor. Per. t. 156. Cresc. in Peruviae paucis locis altis seignis. Flor. nonnulli limbo 6-7-fido. Stigm. concavum.

10. *vespertinum*, filamentis edentatis, tubo filiformi (longo), pedunc. brevissimis. L'Herit. stip. 1. p. 72. C. *confertum*, Millec. Jasinum laurinis foliis, flore pallido luteo, frustu atro-caeruleo. Sloan. hist. 2. p. 96. t. 204. f. 2. Hab. in America. Cortex et fructus foetentes. Sw. h

11. *diurnum*, filament. edentatis, lacin. cor. subrotundis reflexis, fol. lanceolatis. L'Her. stip. 1. p. 74. Dill. clib. 186. t. 154. f. 186. Habit. in Chili, Havana. h

12. *venenatum*, fol. lanceolato-oblong. coccineis, flor. sessilib. Thunb. prodr. 36. Hab. ad Cap. b. spec. h

13. *tomentosum*, flor. confertis sessilib. terminalib. canis fol. calycibusque tomentosis. L. suppl. 150. Hab. in Amer. merid. Munt. h

14. *hirtum*, floe. subspicatis axillaribus, fol. coccineis acutis subtus camulisque hirtis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 478. Hab. in sylvis Jamaicae. h

15. *latifolium*, filamentis edentulis, ramis superne folisque ellipticis subtus pul-

verulenta - subvillosa, racemis axillaribus breviorib. Vahl. eclog. 1. p. 25. Lam. Hab. in ins. Trinitatis. Stigma capitatum. W. h

16. *racemosum*, fol. lanceolato - ovatis acutis, racemis brevibus compositis 1-3-nisque intermedio productiore. Flor. Per. 2. p. 29. t. 154. f. b. In Peruviae nemorib. Petioli suborti. h

17. *longiflorum*, fol. ovato - oblongis acutis, peduncul. terminalibus paniculato-racemosis, corol. tubo longissimo curvato. Flor. Per. l. c. p. 28. t. 154. Cor. 1. 1/2-pollicaris, purpurascens: limbo margine lanato.

18. *strigilatum*, fol. cordatis acutis, pedunc. geminis racemoso-paniculatis, altero brevior. Flor. Peruv. p. 29. t. 156. Cum priore in nemorib. Cor. magna tubo longo curvato, Jasmimum refert. Frutex lanugine brevi, atrigiliformi adpersus. Bacca ovata.

509. **SESSEA.** Cor. infundibuliformis. Stigma 2-lobum: lobo altero breviori. Caps. teres, curvata; 1-locularis, 2-valvis: valvul. 2-fidis.

1. *stipulata*, fol. lanceolatis cordatisque, racem. paniculatis. Flor. Per. 2. p. 9. t. 115. Habet. in Peruviae montibus. Frutex foetidus.

2. *dependens*, fol. cordato - oblongis, racem. longissim. pendulis. Flor. Per. l. c. t. 116. In Peruviae rupis. Arbor. 5 - orgyalis.

510. **LYCIUM.** Cor. tubulosa, fauce clausa Filam. barba. Bacca 2-locularis, polysperma.

\* *Spinosa.*

1. *afrum*, caul. strictis spinosis, foliis fasciculatis linearibus, bacc. globosis. Duham. N. ed. p. 107-110. Trew-Ehret. Pl. select. t. 24. Lam. ill. t. 112. f. 1. Willd. Sp. 2. p. 1057. Hab. in Barbaria, Aegypto, Arabia, Palestina, Hispania et Medina. Flor. fusco-purpurei. Var. fol. plus minusve longiorib. et subulatis. h

2. *carnosum*, caule ramisque erectis spinascentibus, fol. lineari - lanceolatis fasciculatis carnosis, bacc. sphaericis. Duham. l. c. p. 111. L. haticum. Mill. dict. rar. 2. L. rigidum. Thunb. 1. prod. p. 37. Trew-Ehr. t. 24. f. 1. Ad Cap. bonae spei. Priori simile, sed multo minus, 3-4 - pedes altum. h

3. *microphyllum*, caul. strictis rigidis divaricatis laevissimis, ramulis reflexis spinascentibus, fol. fasciculatis alternisve parabolicis. Duham. l. c. p. 112. Habet. in India et in Africa orient. Fol. glauca. †

4. *ruthenicum*, fol. linearibus fasciculatis, gemmis spinascentibus, ramis laxis. Willd. Murr. Comm. goett. 1779. p. 2. t. 2. L. tataricum. Pall. ross. 1. p. 78. t. 49.

5. *caspicum*, fol. breviorib. ram. spinosissimis, flor. minorib. Pall. ross. 1. t. 49. f. A. Hab. in Sibiriae nitrosis ad Volgam, in desertis Turcomanorum inque Hyrcania; 6. ad mare Caspium.

5. *tetrandrum*, spinosum, foliis ovatis obtusis, ramis angulatis, cor. quadrifidis. Thunb. prod. 37. L. suppl. 150. Hab. in Cap. b. spei. Simillimum L. afro. h

6. *barbarum*, caulib. procumbentibus angulatis simplicib. raro spinosis, fol. petiolatis ellipticis, cal. bifido, lacin. bidentatis, cor. margine villosa, bacca elliptica. Duham. p. 120. L. *barbarum*, fol. lanceolatis crassiusculis, cal. bifidis Linn. Sloan. afric. spec. n. 349. f. 349. Hab. in Africa, Barbaria, ubi detectum a Shaw. † vid. iter. vol. 2. Cor. pallide rubra post anthesin livida s. pallens. Filam. primo recto, dein incurvata inter cor. divisuras, supra basin villosa.

\* *turbinatum*, caul. erectis fasciculatis, ramulis dependentibus spinosis teretibus, fol. sessilib. lanceol. acuminatis, cal. trifido, bacca turbinata ante maturitatem bursiformi. Duham. ed. nov. p. 119. t. 31. L. halimifolium. Mill. L. *barbarum*. L. Sp. pl. 1. p. 192. Lam. encycl. n. 3. Hab. in China meridionali. Fol. nonnunquam quasi pulverulenta. Cal. rarius bifidus. Ad sepes etc. adhibetur. Filam. basi villosa. l. c.

7. *europaeum*, caul. ramisque erectis teretibus spinosis, fol. spatulatis, filam. imberbilis, bacca subrotunda. Duham. p. 124. L. fol. obliquis, ramulis flexuosis teretibus. Linn. Willd. p. 1069. Michx. N. Gen. Pl. t. 105. f. 1. Habet. in Europa meridionali, in Gallia, Italia, Lusitania, Graecia et in Barbaria. Rami longis et fortibus induti spinis. Cor. albido-rubra. Var. bac. rubris et flavis.

8. *lanceolatum*, caul. erectis apice flexuosis recurvis teretibus, ram. patentissim. spinosis, fol. subsessilib. lanceolatis acutis, cal. inaequaliter dentato, bacca oblonga. Duham. p. 123. L. europaeum. Lam. excl. synonym. Hab. in regno Neapolitano, Graecia. Cor. violacea.

9. *chinense*, erectum spinosum, ramis

diffusis angulatis, fol. petiolatis lanceolatis acutis, cal. 2-3-fidis, stylo staminibus vix longiore, bac. ovatis. Duham. N. ed. p. 116. t. 30. Trew-Ehr. t. 68. excl. synonymu. Hab. in China temperiore. Corol. infundibuliformis, violacea.

10. *ovatum*, caul. ramisque dependuntibus striatis raro spinosis, foliis petiolatis ovatis obtusis, cal. 5-dentatis, stylo staminibus longiore, bac. oblongis. Duham. l. c. p. 117. L. chinense. Lam. ill. t. 182. f. 2. L. barbarum. β. Willd. Sp. 2. p. 1059.

11. *cinerum*, spinosum, fol. lanceolatis glabris, ramis spinascentibus, pedunculis brevissimis. Thunb. prod. Hab. ad Cap. b. spec. h. +

12. *horridum*, spinosum, fol. obovatis carnosiss glabris, ramis spinascentibus, pedunc. brevissimis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spec. h.

13. *boerhaviaefolium*, spinosum, fol. ovatis integerrimis acutis glaucis, floribus paniculatis. Lin. suppl. 150. Ehetia halmifolia. L'Her. stirp. 1. p. 45. t. 23. Hab. in Peru. Var. fol. undulatis. h.

14. *obovatum*, spinosum, fol. obovatis obtusissimis, spinis foliosis: vevustioribus nullis, flor. paucis nutantibus. Flor. Per. 2. p. 46. t. 193. f. c. Hab. in circuitu et sepius Tarmae oppidi. Corol. purpureo-violacea.

15. *salsum*, spinosum, ram. gracilibus, spinis foliosis, fol. obovato-oblongis sessilibus, flor. solitariis. Flor. Peruv. 2. l. c. p. 183. f. a. Cor. albo-purpurea: tubo augusto.

#### •• Inermia.

16. *barbatum*, inermis, fol. ovatis glabris, ram. flexuosis, flor. paniculatis. Th. l. inermis. Lin. suppl. 150. Habit. ad Cap. b. spec. h.

17. *spathulatum*, inermis, fol. obovato-spathulatis, florib. fasciculatis axillaribus. Flor. Per. t. 183. f. l. Cresc. ad sepes urbis Huancu. Cor. violacea, limbo pubescente. Cal. truncatus. +

18. *umbellatum*, inermis, fol. oblongo-lanceolatis, pedunc. raris, flor. umbellatis, cal. pentagonis. Flor. Peruv. 2. p. 45. t. 183. f. b. Habit. in sepi. et versuris in prov. Canta in Peru. Filam. glabra. Bacca aurantia, 1-locularis. h.

19. *aggregatum*, inermis, fol. oblongis acutis undulatis subtus tomentosis, florib. axillaribus numerosissimis. Flor. Per. l. c. f. a. Hab. passim in Lima etc. vallibus et

praeruptis, etiam ad sepes. Cor. alba. Filam. imberbia. Bacca globosa aurantia, 2-locularis.

*Obs.* Tres hae species, quarum habitus etiam recedit, vix ad Lycia pertinent, sed *Attopae arborescenti* Lin. affines, quae cum non male peculiare genus efficere possent. L. *capsulare*. Lin. Willd. Spec. p. 1061. planta dubia et ob fructus forte non hujus generis est.

511. **POGONIA.** Cal. 5-phyllus, persistens. Car. infundibuliformis: ore villis clauso; limbo semiquinquefido. Styl. sursum parum subcurvatus; Stigma concavum. Drupa compressa, quadrilocularis.

1. *debilis*, fol. lanceolatis spicib. subserrulatis distichis, flor. soliter. axillaribus caeruleis, cortice scabroso. Andrew Repos. t. 210. Hab. in N. Hollandia, ad oppidum Jackson. Planta sarmentosa. E. Fata. campanulacea?

512. **CRYPTOSTOMUM.** Cor. infundibuliformis, calyci inserta. Nectar. monophyllum, corollam claudens. Bacca exsucca, 3-locularis: loculis monospermis. Sem. arillata?

1. *laurifolium*. Willd. Spec. 2. p. 1061. Montabera gujanensis. Aubl. guj. 2. p. 680. t. 274. Hab. in campis cultis Cajennae et Gujanae. Fructus sarmentosus. Folia alterna. h.

513. **ARDISIA.** Cal. 5-partitus. Cor. hypocrateriformis: limbo reflexo. Anth. magnae, erectae. Stigma simplex. Drupa carnosa, supera, 1-sperma.

1. *tinifolia*, flor. paniculatis, fol. ellipticis integris nervosis, caule arboreo. Sw. Fl. Ind. occid. 1. p. 468. Willd. Sp. 2. p. 1065. Sloan. hist. 2. p. 98. t. 105. Hab. in aridis submontosis Jamaicae. h.

2. *coriacea*, flor. paniculatis, fol. oblongis integris avenis coriaceis. Swartz. l. c. p. 470. Hab. in Antillis. h.

3. *serrulata*, florib. paniculatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis rugosis, caule fruticoso pubescente. Swartz. p. 471. Plum. cat. 18. ic. 80. Hab. in Hispaniola ad fluviorum ripas graminosas. h.

4. *acuminata*, panic. axillaribus terminalibusque, fol. oblongis acuminatis basi attenuatis. Willd. *Isocarrea gujanensis*. Aubl. 2. suppl. p. 3. t. 368. Hab. in campis cultis Gujanæ. h

5. *crenulata*, panic. terminali, fol. lanceolato-ovatis repando - crenatis acuminatis, basi attenuatis. Ven. Choix de pl. p. 5. t. 5. Hab. in Antillis.

6. *pyramidalis*, fol. lanceolato - ovatis glabris, racemis terminalibus, pedunc. umbelliferis compressis. Cav. ic. 6. p. 1. t. 502. Hab. prope Santa Cruz. Cor. rubra. Arbor.

7. *serrata*, fol. sparsis lanceolatis serratis, flor. racemis terminalibus compositis. Cav. l. c. p. 2. t. 503. sub *Anguillaria* uti antecedens. Arb. 15-20-pedulis.

8. *humilis*, racem. terminalibus compositis, pedicellis umbellatis, fol. lanceolato-ellipticis integerrimis coriaceis venosis. Vahl. symb. 3. p. 40. *Tinnus humilis* zeylanica, fol. crassis venosis. Burm. zeyl. 222. t. 101. Hab. in ins. Heiman, in paludosis salis ad Siam, Maloccam et in Zeylona. h

9. *solanacea*, corymbis axillarib. tripartitis, fol. oblongis utrinque attenuatis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 27. t. 27. Hab. in montosis Indis orient. h

10. *lateriflora*, racem. lateralib. axillaribusve compositis, florib. umbellatis, fol. oblongis acuminatis integerrimis, caule fruticoso. Swartz. l. c. p. 473. Hab. in Ind. occident. h

11. *excelsa*, racem. axillarib. simplicib. fol. obovatis margine cartilagineo-serratis. Ait. Kew. 1. p. 261. Gaertn. sem. 1. t. 77. f. 1. Hab. in Madera. h

12. *parasitica*, racemis axillarib. simplicibus, fol. sessilibus lanceolato - ovatis lineatis, caule fruticoso. Swartz. Hab. in truncis arborum versus juga montium ins. Dominicae. h

Obs. Hoc genus idem est ac *Anguillaria*. Gaertn. et *Badula*. Juss.

514. **BLADHIA**. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* rotata, quinquefida. *Bacca* 1-sperma. *Semen* arillatum.

1. *japonica*, fol. ternis serratis glabris, caule basi decumbente. Thunb. Flor. jap. 65. t. 19. Willd. Sp. 2. p. 1122. Hab. in fruticetis montium Japoniae. h

2. *glabra*, fol. oppositis serratis glabris, caule erecto. Thunb. in Act. Soc. Linn. 2. p. 331. et jap. p. 350. Hab. in Japonia. h

3. *villosa*, fol. serratis villosis. Thunb. jap. p. 66. t. 19. Hab. in Japonia. h

4. *crispa*, fol. oblongis crispis glabris. Thunb. l. c. p. 67. Kaeupff. smoen. Fasc. 5. p. 776. Cum priore.

515. **MYRSINE**. *Cor.* semiquinquefida connivens. *Germen.* cor. replens. *Stigma* magnum, lanigerum, (exsertum). *Drupa* 1-sperma: nuce 5-loculari. (*Bacca* immatura 5-sperma, matura 1-sperma. Gaertn.)

1. *africana*, sempervirens, fol. ovatis acutis superne serratis. Lam. ill. t. 121. Willd. Sp. p. 1221. Pluck. alm. t. 80. f. 5. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spec. h

Obs. Planta videtur Polygamo - monica, cum individua occurrunt flor. masculis tantum instructa, qui 4-andri fuerunt. Fol. serraturae spinulosae.

2. *retusa*, fol. obovatis obtusis, apice emarginato-denticulatis. Ait. hort. 1. p. 271. Hab. in ins. Azoriis. Flor. subcorymbos. Willd. Stigm. inclusum? cfr. Vent. Hort. Cels. p. 86-87. h

516. **LEEA**. *Cor.* 1-petala. *Nect.* 1-phyllum, tubo corollae inpositum, 5-fidum, erectum. *Bacca* 5-sperma, iufera. (Monica: Juss.)

1. *sambucina*, caule sulcato-angulato glabro, fol. subpinnatis. Willd. Sp. p. 1777. Aquilicia. Cavan. diss. 7. p. 372. t. 218. Staphylea indica. Burm. ind. 723. 24. f. 2. Rumph. 4. t. 45. Hab. in India orientali. Arborea facie Sambuci. h

2. *aequata*, caule tereti pubescente, fol. pinnatis. Willd. l. c. Mant. p. 124. In India orient. Corymbi trichotomi. h

Obs. An *Aquilicia* congener? vid. Juss. gen. p. 170.

3. *crispa*, caule angulato ambriato, fol. pinnatis. Hab. ad Cap. b. spec. Radix tuberosa. Flor. nivci. T.

517. **CORYNOCARPUS**. *Cal.* 5-phyllus interius. *Cor.* 5-petala. *Nect.* 5-petaliformia, cum petalis alteraantia, basi glanduliferis. *Nux* 1-sperma, clavata.

1. *laevigata*. Lin. suppl. 156. Fors. gen. p. 31. t. 16. Willd. Sp. 2. p. 1178. Habit. in

N. Zealandia. Fol. obovatis integra. Panic. terminalis magna rugosa. h

518. JACQUINIA *Cor.* 10-fida. *Stamina* receptaculo inserta. *Bacca* 1-sperma.

1. *arborescens*, fol. cuneiformibus, ramis ad ramificationes aequalibus, inferioribus verticillato-quaternis, superioribus dichotomis. Vahl. eclog. 1. p. 26. Willd. Spec. 2. p. 1063. Hab. in ins. Montserrat prope New-Windward. Arb. trunco erecto, quatuor, sex, decem, viginti, vel triginta pedes alto, diametro sex vel octopollinari.

2. *armillaris*, fol. cuneiformibus, ramis ad ramificationes nodosis verticillatis. Vahl. eclog. 1. p. 26. Jacq. amer. 53. t. 39. Ed. pict. Sloan. hist. 2. p. 89. t. 190. f. 2. Hab. in America. Frutex humilis 4-6-pedalis. h

3. *venosa*, fol. ovato-lanceolatis, venosis submembranaceis. Swartz. prod. 47. Habit. in India occident. h

4. *macrocarpa*, fol. rigidis lanceolatis mucronatis, flor. aurantiis, ba-c. cerasiformibus. Cav. ic. 5. p. 55. t. 483. Habit. non procul a mare Panamensis et Acapulci. Baec. continet corpus cartilagineo-carnosum, eni adherent 15 fere corpuseula plana ovata, an semina? G.

5. *ruscifolia*, fol. lanceolatis acuminatis. Jacq. amer. pict. t. 57. Meleola aculeata. Linn. Spec. pl. 1. p. 339. Dill. elth. t. 123. f. 149. Hab. in Amer. insid. in Havanae sylvia montosis. h

6. *linearis*, fol. linearibus acuminatis. Jacq. amer. t. 40. f. 1. Ed. picta. 178. Cresc. ad St. Domingo in litoribus maritimis. Pedunc. in hac et praecedente 1-floris. h

519. SICKINGIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* campanulata. *Caps.* lignosa. 2-locularis, 2-valvis. *Sem.* alata.

1. *Erythroxylon*, fol. rhombo-oblongis, apice dentatis subtus pubescentibus. Willd. in Nov. Act. Berol. v. 2. vid. Schrad. Bot. Journ. 1800. p. 291. Arb. 30-40 pedib. lignoque duro.

2. *longifolia*, fol. oblongo-obovatis integerrimis glabris. Willd. l. c. Cresc. cum prior in montosis sylvia ad Caracas. h

520. BECKEA. *Cal.* 5-fida. *Petala* 5. *Caps.* 3-4-locularis, polysperma, cal. tecta. (*Sem.* pauca. Gærtn.)

1. *frutescens*, fol. oppositis muticis,

dentibus calycinis membranaceis coloratis. Smith in Act. Soc. Lin. 3. p. 259. L. suppl. p. 514. Willd. Sp. 2. p. 1. Beckea chinensis. Gærtn. de fruct. 1. p. 157. t. 31. f. 7. Osb. iter. t. 1. Hab. in China.

2. *densifolia*, fol. 4-fariam imbricatis obtusis mucronatis reflexis dentib. calycin. foliaceis. Smith l. c. Hab. ad portum Jackson, N. South-Wales.

521. IMBRICARIA. *Petala* 5. *Stigma* capitatum. *Caps.* calyce tecta, 2-locularis, polysperma. Sm. (*Cap.* 1-locularis evalvis, apice amplo foramine dehiscens. Gærtn.) Conf. Juss. gen.

1. *crenulata*, fol. obovato-cuneiformibus, crenulatis, cal. denticulatis. Smith in Act. Soc. Lin. 3. p. 259. Jungia imbricata. Gærtn. de fr. 1. p. 175. t. 35. f. 5. Philadelphus imbricatus. Sol. Aud. Molliis Gmel. syst. p. 420.

2. *ciliata*, fol. triquetro-linearibus, calyceib. ciliatis, germine 5-gono. Smith l. c. p. 176. Jungia tenella. Gærtn. l. c. p. 176. Hab. in N. Hollandia.

522. ESCALLONIA. *Cal.* 5-dentatus, persistens. *Petala* 5, lingulata. *Stigma* capitato-depressum. *Bacca* seminafera, 2-locularis, polysperma. (*Caps.* 2-locularis calyce coronata, basi rimis 2-4-dehiscens. Recept. 2, in singulo loco. *Dissepimentum* interruptum. Syst. veg. Flor. Per. p. 66. sub Stereoxylon.)

1. *serrata*, fol. serratis subretusis subtus aviculis. Smith. ic. p. 31. t. 31. Hab. ad tretum Magellanicum.

2. *myrtilloides*, fol. obovatis venosis denticulato-glandulosis, pedunc. 1-floris, petalis spathulatis. Stereoxylon patens. Fl. Peruv. 3. p. 13. t. 234. Escal. myrtilloides. Smith. pl. ic. fasc. 2. p. 30. t. 30. Willd. Spec. 2. p. 1149. Habit. in Amer. merid. collibus frigidis montosis. Lignum durissimum ad varia utensilia utilissimum.

3. *corymbosa*, foliis oblongis serrulatis, pedunc. 1-floris, calycibus denticulatis, petalis oblongis. Flor. Per. 3. p. 14. t. 234. Arb. trivis, Myrti facie.

4. *virgata*, fol. obovato-spathulatis serrulatis, pedunc. 1-floris calyceb. dentatis, petalis obovatis. Flor. Per. t. 235. sub Ste-



*reoxyla*. Hab. in montibus et sylvis humidis. Ramuli sciores post defoliationem spinas acmulantur.

5. *resinosa*, fol. oblongo-obovatis serrulatis, pedunc. racemosis, petalis obovato-oblongis. Flor. Per. l. c. f. a. sub *Stercoxylon*. Hab. in Peruv. collib. frigidis. Ramuli purpurascens, resina illiis. Lignum durissimum.

6. *rubra*, fol. ovato-oblong. acuminat. serratis, pelunc. 2-7-floris, petalis spathulatis. Flor. Peruv. p. 15. t. 236. *Stercoxylon rubrum*. In R. Chilensis montibus, inter saxorum fissuras. Nect. conicum, 10-angulare, denticulatum.

7. *revoluta*, foliis obovatis denticulatis revolutis, racemis thyrsoides; petalis lineari-spathulatis. Flor. Per. l. c. f. a. Cum priore in umbrosis et scaturiginibus prope Conceptionis urbem et ad littora. Folia amara.

8. *pulverulenta*, fol. oblongo-ellipticis serrulatis, pedunculis racemosis - spicatis, petal. obovatis. Fl. Per. 3. p. 15. t. 237. f. a. Cresc. in R. Chilensis sylvis. Rami juveniores pulverulenti, pubescentes.

9. *pendula*, fol. lanceolatis acutissimis integris obsoleteque serrulatis, racem. pendulis longissimis, petalis linearibus. Flor. Per. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus. Lignum durum.

523. CERVANTESIA. Cal. minimus, crescens. Cor. o. Squamæ nectariferæ 5, ovales crenatæ, infra lacinias calycis insidentes. Stam. plana, basi calycis inserta. Nux calyce carnoso 5-gono, colorato involuta, 1-locularis.

1. *tomentosa*, fol. linearibus oblongis, flor. racemosis subsessilibus. Flor. Peruv. 3. p. 19-20. t. 245. f. b. Hab. in Peruviae præruptis circa Acobamba vicum, etiam in Cantae provinc. locis imis calidis. Stigm. simplex, obtusum, obsolete umbilicatum.

Obs. An hujus quoque loci *Cervantesia bicolor*, caule arboreo, fol. oblongis ferrugineo-tomentosis, flor. racemosis. Cav. ic. 5. p. 49-50. t. 4757 Secundum quædam stigm. emarginatum et veluti bicorne est. Conf. quoque. Fl. Per. l. c. Obs. 1.

524. ALZATEA. Cal. 5-fidus, 5-gonus. Cor. o. Stam. receptaculo inserta. Ovar. obcordata 2-lo-

cularis, 2-valvis: valvulis medio septiferis. Dissepimentum contrarium. Sem. super-imposita, membrana cincta.

1. *verticillata*, fol. obovatis emarginatis, flor. tetrumbosis. Flor. Peruv. 3. p. 20. t. 241. f. a. Hab. in Peruviae nemoribus, prope Messapata prædium.

Obs. Arbor hæc primo ex truncis distinctis posita ad 4 ulnarum altitudinem in unicum truncum conuclis, constabat. vid. l. c.

525. MYOSCHILUS. Cal. 5-phyl-lus, coloratus. Cor. o. Stam. receptaculo inserta. Stigma 2-3-fidum. Drupa 1-sperma, cal. coronata. Nux 1-locularis.

1. *oblonga*, fol. oblongis acuminatis repandis, flor. spicatis. Flor. Peruv. 3. p. 20. t. 242. f. a. Cresc. in R. Chilensis collib. et ripis arenosis prope Conceptionis urbem, etc. Cal. purpureus. Drupa, atropurpurea. Incolae fol. infuso, instar Senec. frequens utuntur.

526. ACHIRAS. Cal. 5-6-partitus: laciniiis ovatis emucavis incurvatis. Cor. ovata, 5-fida: laciniiis rotundatis: squamis totidem alternis ad faucem. Pomum mammosum 1-loculare. Sem. solitaria, hilo marginali, apiceque unguiculato. Stigma obtusum, striatum. (Stam. 4-6.)

1. *Lucuma*, florib. solitariis 2-3, foliis oblongo-obovatis, pomis mammosis. Flor. Peruv. 3. p. 17. t. 219. *Lucuma*. Juss. Gen. Hab. in Peruv. hortis et in R. Chilensis maritimis. Pomum mammosum sæpe ovatum, acuminatum. Semina castaneæ acmulantur. Arbor est procera, supra quam in ejus sæpius detrimentum copiose vegetat *Tillandsia Usneoides*.

2. *Caimito*, flor. aggregatis tetrandris, fol. obovato-lanceolatis, pomis ovalib. Fl. Per. 3. p. 18. t. 240. Hab. in Andium montibus. Arbor frondosissima lactifera. Fruct. edules et in hac specie molliores et sapidiore.

3. *mammosa*, flor. solitariis, fol. cuneiformi-lanceolatis, flor. pentandris. Linn. A. Sapota major. Jacq. amer. t. 182. f. 19. Ed. picta. t. 59. Willd. Sp. tom. 2. p. 234. Pluck. alm. t. 268. f. 2. Hab. in America meridionali.

4. *Sapota*, flor. solitariis, fol. lanceolato-ovatis, florib. hexandris. Jacq. amer. t. 41. Ed. pict. t. 41. Brown. Jam. 2. p. 200. t. 19. f. 3.

β. *Zapotilla*, brachiat. diffusus. Brown. Bah. cum priore.

5. *dissecta*, flor. confertis, cor. octodecemfilis, fol. obovatis emarginato-retusis. Forst. pl. excul. n°. 13. Linn. suppl. p. 210. A. *Balata*, foliis ovato-oblongis subtus cinereis, fructu viridi olivaceiformi. Anbl. guj. 1. p. 308. Willd. l. c. p. 223. Hab. in Philippine et Americam, etiam in Gujana et Malabar. Pedunculi axillares penduli, unisori.

527. **CHRYSOPHYLLUM**. Cor. campanulata, 5-fida: laciniis alternis patulis. *Bacca* (magna) 10-sperma, (etiam 1-2-sperma.)

1. *Cainito*, fol. ovatis parallelis striatis, subtus tomentoso-nitidis, bac. subrotundis. Linn. Jacq. amer. 51. t. 37. f. 1. pict. t. 51. Willd. Sp. 2. p. 1081. Lam. ill. 2. p. 44. t. 120. Cainito folio subtus aurco. Plam. gen. 10. ic. 69.

β. *jamaicense*, fructu purpureo subovato. Jacq. l. c. Sloan. jam. 206. hgt. 3. p. 170. t. 229.

δ. *caeruleum*, fructu caeruleo globoso. Jacq. amer. t. 37. Ed. picta. 1. 52. Hab. in Martinica. h

Obs. Eadem plante aut saltem huic valde affine videtur *Nycterisium ferrugineum*. Flor. Per. 2. p. 46. t. 187. cujus fructus auctoribus hucusque ignotus est.

2. *monopyrenum*, fol. oblongis acuminatis subtus tomentoso-aureis, fructu ovato monopyreno. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 480. Hab. in fruticetis et collibus Jamaicæ et Hispaniolæ. h

3. *microcarpum*, foliis ovatis glabris subtus pubescentibus, bac. oblongis obliquis monospermis. Swartz. prod. Fl. ind. occ. 1. p. 482. Hab. in Hispaniola ad fluviorum ripas. Sapor fructus dulcissimus. h

4. *angustifolium*, fol. lanceolatis parallelis striatis nitidis subtus tomentoso-ferrugineis, bacis olivaceiformibus. Lam. ill. 2. p. 44. Hab. in St. Dominica. Baccæ subdisperma. h

5. *oliviforme*, foliis ovato-oblongis, subtus tomentoso-nitidis, fructu monospermio olivaceiformi. Lam. l. c. Burm. amer. t. 69. Hab. in Martinica. h

6. *argenteum*, fol. falcato-ovatis, subtus tomentoso-nitidis. Jacq. amer. 53. t. 38. f. 1. Ed. picta. t. 54. Habit. in Martinica. h

7. *rugosum*, foliis oblongis acuminatis utrinque glabris, fructu acuminato rugoso. Swartz. l. c. p. 484. Hab. in sylvis montium Jamaicae occident. h

8. *pyriforme*, fol. oblongis acuminatis utrinque glabris, fructu pyriformi laevi. Willd. p. 1084. C. Maccoucou. Aubl. p. 213. t. 92. Hab. ad ripas amnis Galibienis Gujanæ. h

9. *glabrum*, fol. ovato-oblongis acutis utrinque glabris, fructu ellipso laevi. Willd. Jacq. amer. 53. t. 38. f. 2. Ed. picta t. 55. Habit. in sylvis Martinicæ. h

β. *pauciflorum*, fol. ovatis acuminatis utrinque subglabris, axillis paucifloris. Lam. l. c. Hab. in Martinica.

528. **SIDEROXYLON**. Cor. subrotata 5-fida. Squamæ 5, petalis alternæ serratæ. (Nect. in petalisque 5-phyllum. L.) *Drupa* 5-sperma.

#### \* *Inermia*.

1. *mite*, inermis, flor. sessilibus. Linn. Jacq. collect. 2. p. 249. Willd. Sp. p. 1089. Hab. in Africa. h

2. *inermis*, inermis, fol. perennantibus obovatis, pedunc. teretib. Lin. Jacq. coll. 2. p. 250. Lam. ill. 2. p. 47. t. 120. f. 1. Dill. elth. t. 265. f. 344. Hab. in Aethiopia. Fol. crassa rigida.

3. *cymosum*, inermis, fol. oppositis petiolatis, cymis compositis et decompositis. La suppl. 152. Hab. in monte tabulari Cap. b. spei. h

4. *sericeum*, inermis, fol. ovatis subtus tomentoso-sericeis. Ait. Kew. 1. p. 262. In N. Hollandia. h

5. *argenteum*, inermis, fol. ovatis retusis tomentosis, flor. pedunculatis. Thunb. prod. 36. et Rohmeria. Hab. ad Cap. bon. spei. h

6. *tomentosum*, inermis, foliis oblongis acuminatis obtusis, junioribus tomentosis, pedunc. aggregatis axillaribus. Willd. p. 1092. Roxb. corom. 1. p. 28. t. 28. Hab. in Ind. orientali. h

7. *nitidum*, inermis, fol. ovato-oblong. glabris nitidis petiolatis, pedunc. confertis axillaribus. Lam. l. c. p. 42. Habit. in St. Domingo.

\* \* *Spinosa.*

8. *decandrum*, spinosum, fol. deciduis ellipticis. L. Willd. p. 1091. Hab. in Amer. septentrionali. Stam. 10. Sae. nigra.

9. *multiflorum*, spinosum, fol. obovato-cuneatis coriaceis glaucis, pedunc. divisus fasciculatis lateralib. Lam. ill. 2. p. 43. Hab. ad Cap. b. spei. †

529. *BUMELIA*. *Cor.* 5-fida. *Nect.* 5-phyllum. *Drupa* monosperma.

1. *nigra*, fol. terminalibus oblongo-lanceolatis glabris margine undulatis, ramis laxis, ramulis virgatis floriferis. Swartz. Fl. ind. oec. 1. p. 487. Willd. Sp. p. 1085. Hab. in sylvis et locis montosis Jamaicae. h

2. *pallida*, fol. terminalibus ellipticis obtusis, pedunc. confertis lateralibus, ram. erectis. Swartz. p. 489. Hab. in campestribus Jamaicae. Distinguitur a B. nigra, quod arb. minor cortice albescente et flor. majores sicut. Swartz. h

3. *retusa*, fol. cuneato-ovatis retusis rigidis, pedunc. confertis axillaribus. Swartz. Flor. ind. oecid. 1. p. 490. Habit. in montosis Jamaicae. occid. h

4. *foetidissima*, fol. lanceolato-oblong. obtusis submarginatis, pedunc. confertis axillaribus. Willd. p. 1086. S. inerme, fol. suboppositis, florib. patentissimis. Linn. Mant. 49. Habit. in S. Domingo in sylvis montosis. h

5. *salicifolia*, foliis lanceolato-ovatis acuminatis, pedunc. confertis axillaribus et lateralibus. Swartz. l. c. Fl. ind. oecid. 1. p. 491. sub Bumelia. Aehras salicifolia. J. Sp. pl. 470. S. Masticodendrum. Jacq. coll. 2. p. 253. t. 17. f. 5. Lam. ill. 2. p. 41. Cornus. Cutesb. carol. 2. p. 75. t. 75. Habit. in collib. aridis Jamaicae, insul. St. Crucis, et in ins. Bahamensib. h

6. *montana*, foliis oblongis obtusis, pedunc. longioribus axillaribus distinctis. Sw. Fl. ind. oecid. 1. p. 493. Hab. in montibus altiorib. Jam. austr. h

7. *nervosa*, fol. alternis ellipticis subtus discoloribus, florib. aggregatis lateralibus axillaribusque tomentosis pedunculat. Vahl. ecl. 1. p. 28. Chrysophyllum Caimito. Aubl. Ch. macrophyllum. Lam. enc. 2. p. 44. Hab. in Cajenna. h

8. *Lycioides*, spinosa erecta, fol. lato-lanceolatis utrinque glabris. Michaux, Flor. 1. p. 122. Duharn. 2. t. 68. S. laeve. Walter. Hab. in Canada, Carolina.

9. *reclinata*, spinosa liffusa, ram. sterilibus divaricatis, fol. parvulis obovalibus glaberrimis. Michaux, l. c. Vent. Choix de Pl. t. 22. In dumetosis Georgiae rupibus.

10. *tenax* (chrysophylloides), spinosa fol. cuneato-lanceolatis, plicumque obtusis subtus sericeo-nitentibus. Michaux, p. 123. Jacq. collect. 2. p. 252. Ej. obs. 3. t. 54. sub Sideroxyla. Willd. Sp. 2. p. 1085. Habit. in dumetis littoralib. Carolinac. Fol. Chrysophylli. Arb. 20-pedalis. M.

11. *lanuginosa*, spinosa, ramulis patentissimis pubescentibus, fol. ovali-lanceol. subtus lanuginosis. Michaux, p. 122. In Georgiae humidis. Antecedenti affinis dicitur, quare eam hic retuli.

12. *pentagona*, (nol. lanceolatis acuminatis), pedunc. axillaribus, drupis pentagonis. Swartz. l. c. p. 494. Habit. in monte Josephi insulae Dominicae. h

13. *rotundifolia*, foliis suborbiculatis marginatis venosis coriaceis utrinque glabris. Swartz. p. 495. In fruticetis montium Jamaicae. h

14. *cuneata*, fol. cuneatis obovatis. Sw. l. c. p. 496. Hab. in fruticetis montium Jamaicae.

*Obs.* Hujus et praecedentis fructus nondum observatus est.

530. *MANGLILIA*. *Cal.* minimus, 5-partitus. *Cor.* rotata, 5-partita. *Nect.* squamulae o. *Drupa* 1-locularis, 1-sperma. Juss. Gen. pl.

1. *Jussieu*, fol. perennantibus oblongis glaberrimis, pedunc. fasciculatis brevibus. Chrysophyllum Manguillo. Lam. ill. 2. p. 45. Bumelia. Willd. Sp. 2. p. 1087. n.º 7. Hab. in Peru. h

2. *Milleriana*, fol. perennantibus lanceolato-ovatis acuminatis nitidis, cal. subrotundis. Lam. l. c. sub Chrysophyllo. Mill. ic. t. 269. Sideroxylon mite. Jacq. coll. 2. p. 249. Hab. ad Cap. b. spei. Pedunc. axillares, aggregati, albi. h

3. *melanophleas*, foliis perennantibus lanceolatis undulatis glabris, pedunc. brevissimis (purpureis), cal. subacutis. Lam. l. c. sub Chrysophyllo. Sideroxylon laurifolium. Lam. enc. bot. 1. p. 244. S. melanophleum. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1085. Jacq. hort. t. 71. Hab. in Acthiopia.

*Obs.* Praeunte Lamarkio 2. posteriores species ad hoc genus amandavi, quod fructu a Chrysophyllo et Nectarii detectu a Sida-

oxylo differt. Huc etiam pertinet *Cabalaria*. Flor. Per. prod. p. 141. t. 30. et syst. veget. Flor. Peruv. et Chilens., ubi p. 279-282. plures hujus generis enumeratae sunt species, quarum descriptiones et Icones in posterum expectari debent. An *Rocmeria*. Thunb. idem genus?

531. *TECTONA*. *Cor.* 5-fida. *Stigma* dentatum. *Drupa* sicca, spongiosa, intra calycem inflatum. *Nux* trilocularis.

1. *grandis*. Linn. suppl. 151. Roxb. corom. 1. p. 10. t. 6. Willd. Sp. 1088. Theka. Rheed. msl. 4. t. 27. Juss. gen. Lam. ill. t. 136. Habit. in vasis sylv. insularum Javae et Zeylonae, et in Malabaribus et Coromandelis. Arbor.

*RHAMNUS* (gen. 532-53.) cal. habent 1-phyllum, petala ut plurimum 5, aut 4-6, rarius 0, calyci inserta ejusdem laciniae alterna, squamiformia. Stam. cal. quoque inserta, petal. alterna aut opposita, plerumque 5, in quibusdam 4, rarissime 6 (Prinos). Stigm. simplex aut 2-3 et 5, quo nonnulla hujus familiae genera in sequentibus ordinibus occurrunt. Discus glandulosus in multis. Fructus superus (rarius inferus) baccatus, drupaceus et capsularis. Embryo planus et rectus, perispermio carnosio cinctus. Arbores aut frutices fol. opposita 2, alterna, stipulis saepe minimis distincta.

+ *Stamina petalis opposita. Fructus baccatus aut drupaceus.*

532. *RHAMNUS*. *Cal.* campanulatus, 4-5-fidus. *Cor.* squamulae staminum munitae, calyci insertae, (passim 0.) *Stigma* 1-2-4-fidum. *Bacca* 3-4-sperma. (Flor. passim polygami, et dioici.)

\* *Spinosi.*

1. *catharticus*, spinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis, fol. ovatis serratis. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1092. Flor. dan. t. 850. Duham. arb. 1. t. 60. Hab. in sylvaticis. Stigm. 4-fidum.

2. *infectorius*, spinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis, caulibus procumbentibus. Jacq. coll. 3. p. 17. Spina infectoria pumila L. Clus. hist. 1. p. 111. Habit. in Hispania, Gallia, Carniolis, Italia. Fol. subtus villosa. Calyx cyathiformis adentulus, L. In hortis caulem erectum vidi. h

3. *lycioides*, spinis terminalibus, fol. linearibus integerrimis obtusis. Willd. Sp. 1093. Cav. ic. 2. p. 56. t. 182. Hab. in Hispania. h

4. *Erythroxylon*, spinis terminalibus, fol. linearibus lanceolatis serratis acutiusculis. Willd. l. c. Pall. ross. 2. p. 26. t. 62. et ejusdem. itin. 3. app. n.º. 78. t. 1. f. 1. Hab. in Sibiriae rupibus apricis. h

5. *oleoides*, spinis terminalibus, foliis oblongis integerrimis. Linn. Hab. in Hispania. Similis *R. cathartico*, sed minor. Fol. ad gemmas 2. 3. Oleae similia.

6. *crenulatus*, ramulis spinoscentibus, flor. quadrifidis trifidisve dioicis, fol. oblongis obtusis serratis sempervirentibus. Ait. Kew. 1. p. 263. Hab. in ins. Teneriffa. h

7. *saxatilis*, fol. ovato-lanceolatis serratis, spinis terminalibus, flor. quadrifidis hermaphroditis, Jacq. Fl. Austr. 1. t. 53. Hab. in montib. Badensis, Italicis, Helveticis.

*Obs.* Squamae petaloideae 0. Stigm. 4-fidum. Drupa infera, sub 4-sperma: *Frangula saxatilis*. Cramer. enumer. pl. etc. Marburgi. 1803. p. 41.

8. *theesans*, spinis terminalibus, fol. ovatis serratis, ramis divaricatis. L. Mant. 207. Hab. in China, pauperibus Theae succedaneum. Sarmentosis. Ramis triati. Fl. in spica interrupto-glomerati. Stigma triplex. h

\* \* *Inermes.*

9. *Sarcophalus*, inermis, fol. ovalibus co-lacis integerrimis emarginatis. L. Amoen. acad. 5. p. 395. *Sarcophalus*. Brown. jam. 179. Hab. in America. h

10. *ferreus*, inermis, flor. hermaphroditis umbellatis axillaribus, fol. oblongo-ovatis emarginatis integerrimis glabris membranaceis. Vahl. symb. 3. p. 41. t. 58. Hab. in ins. St. Crucis. h

11. *laevigatus*, inermis, flor. hermaphroditis axillaribus subgeminis, fol. oblongis integerrimis coriaceis glabris. Vahl. l. c. p. 41. Cum priore. h

12. *tetragonus*, inermis, foliis ovatis integris glabris sessilibus, ramis tetragonis. Linn. suppl. 153. Habit. in Cap. b. spec. h

13. *polifolius*, inermis, flor. hermaphroditis axillaribus subsessilibus, fol. lanceolatis integerrimis subrus tomentoso-niveis. Vahl. In N. Zeelandia h

14. *valentinus*, inermis, flor. hermaphroditis quadrifidis trigynis, capsul. trilo-

ularibus, fol. subrotundo-ovatis suberenatis, Willd. p. 1066. Rh. pumilus. Cav. ic. 2. p. 65. t. 181. ex l. syn. Hab. in regni Valentini montibus Meca et Palomera. h

15. *cubensis*, inermis, fol. hermaphroditis, caps. trilocularibus, foliis rugosis integerrimis tomentosis. Lin. Jacq. hort. 3. 4. 49. et ejusl. Am. piet. t. 75. Hab. in fruticetis maritim. Cubae. Habitus Viburni Lantanae. Fructus capsularis? Ceanothus?

16. *carolinianus*, inermis, fol. ovali-oblongis integrisculis glabris, umbell. pedunculatis, flor. hermaphroditis 4 - andris 1-gynis. Michaux, Flor. 1. p. 153. Hab. in Carolina.

17. *minutiflorus*, fol. suboppositis ovalibus serratis, flor. minutissimis dioicis spiratis, stylo 3-fido. Michaux l. c. Hab. in Carolinae maritimis. Bacca 3-sperma.

18. *davuricus*, inermis, flor. quadrifidis dioicis, fol. oblongo-ovatis serratis venosis. Pall. ross. 2. p. 24. t. 61. Amman. rusc. t. 33. Hab. ad Argumum fluvium Davuriae. Simillimus R. cathartico, sed defectu spinarum distinctissimus. Willd. L

19. *alpinus*, inermis, florib. dioicis, fol. ovali-lanceolatis glanduloso-crenulatis. Jacq. Coll. 3. p. 15. Duham. ed. Nova. p. 37. t. 17. Hall. helv. n°. 833. t. 40. Hab. in Alpib. Dioicus calyce 4-fido, stig. 4 - fido, ut R. cathartici.

20. *pumilus*, inermis repens, flor. hermaphroditis, fol. petiolatis ovatis crenatis. Jacq. Collect. 2. p. 141. t. 11. Rh. rupestris. Scop. carn. n°. 264. t. 5. Hab. in monte Baldo, Carniolia. Differt a Frangula caulis apicis adhaerentibus.

21. *Frangula*, inermis, flor. monogynis hermaphroditis, fol. integerrimis. L. Flor. dan. t. 278. Duham. arb. 1. t. 100. Hab. in Europae borealis nemorosis humidiusculis. h

22. *latifolius*, inermis, flor. monogynis hermaphroditis, alvib. villosis, fol. ellipticis integerrimis. L'Herit. sert. p. 5. t. 8. Hab. in Azoribus in montib. St. Miguel R. Frangulae similissimus, sed calyces in R. Frangulae habet. L'Herit. h

23. *glandulosus*, inermis, flor. hermaphroditis racemosis, fol. ovatis obtuse serratis glabris basi glandulosis. Ait. Kew. 1. p. 265. Jard. de Malmaison. t. 14. Hab. in Madera et ins. Canariensis. h

24. *racemosus*, inermis fol. ovato - rotundis laevib. subtus tomentosis ciliariibus,

petiolis folisque ferrugineis. Duhamel. ed. nov. p. 48. Hab. ... Herb. Juss.

25. *cassinoides*, inermis, fol. ovatis coriaceis glaucis obsolete dentatis, ramulis angulatis, flor. axillariibus subsessilib. Lam. enc. 4. p. 474. Hab. ad St. Dominicam. Fol. albido - glauca, margine subrevoluta. Habitus Cassines, cujus forte species. Loc. cit. h

26. *Prinoides*, inermis, flor. polygamis, stylo subtriplici, fol. ovatis serratis. L'Her. sert. p. 6. t. 9. Celtis. Burm. afr. 242. t. 88. Hab. ad Cap. b. apci. h

27. *mystacinus*, inermis, flor. hermaphroditis, stigmatibus triplici, foliis cordatis, ramis cirrhiferis. Ait. 1. p. 260. Hab. in Abyssinia. Caulis fruticosus, cirrhis scandens. Folia brevissima petiolata cordata. Ait. h

28. *alnifolius*, inermis, flor. hermaphroditis, fol. ovalibus acuminatis serratis subtus reticulatis. L'Her. sert. p. 5. cfr. Rh. franguloides. Michaux, 1. p. 152. Hab. in Amer. septentr. ? Affin. R. alpino.

29. *sphaerospermus*, inermis, floribus hermaphroditis racemulosis, bacis subrotundis trilocularib. pellucidis, fol. oblongis serratis glabris. Swartz. Flor. insul. occid. 1. p. 499. Hab. in fruticetis montosis Jamaicae temperatioris. h

30. *hybridus*, inermis, flor. androgynis, fol. alternis oblongis acuminatis vix perennantibus. L'Herit. sert. R. Burgundicus. H. P. Hab. in hortis. †

31. *Alaternus*, inermis, floribus dioicis, stig. triplici, fol. serratis sempervirentibus. *Al. latifolius*, fol. ovato-oblongis aequaliter serratis. (R. Hispanicus.). *Al. balearicus*, folia rotundis spinoso-dentatis ramis subsinosis. Duham. ed. nov. p. 42. *Al. angustifolius*, fol. lanceolatis profunde serratis glabris. Ait. Kew. 1. p. 267. Hab. in Europa austr. h

32. *umbellatus*, caul. inermis, fol. oppositis ovato-acutis linearis, flor. umbellatis. Cavan. ic. 6. p. 2. t. 504. Hab. in N. Hisp. Fol. obscure cordata. Cal. crassus, 5-partitus: lacin. internè bifoveolatis.

33. *trinervis*, inermis, foliis alternis ovatis serrulatis trinerviis, subtus tomentosis, flor. hermaphroditis axillariibus. Cav. l. c. t. 505. f. 1. H. bit. in ins. Luxon, prope Manillam. Germ. cinctum foveolis 10. Stigma incrassata, 2. C.

34. *sanguineus*, fol. ovatis oblongisque linearis integerrimis, caule erecto, floribus

axillaribus fasciculatis hermaphroditis. Orteg. Dec. pl. p. 87. Hab. in Gallicia prope St. Jacob. urbem ad ripas etc. - Vernacule Sanguineo a caule et ramorum colore sanguineo sic nuncupatus. Cort. cum lacte decoctus optimum remedium contra scabiem.

35. *cubensis*, fol. ovatis dentatis lineatis, racem. axillaribus, bac. striatis, Rh. *lineatifolius*. Orteg. l. c. p. 89. Habitu in insul. Cuba. Fruct. 2-pedalis.

36. *lineatus*, inermis, flor. hermaphroditis, fol. ovatis lineatis repandis subtus reticulatis. Lin. Obs. it. t. 7. Zizyphus lineatus. Willd. Spec. p. 1102. Pluck. phyt. t. 122. f. 4? Encycl. bot. 4. p. 473. Hab. in India orient., China. Fol. aut tus subvelutina i venis nigrescentibus. Stigm. simplex. Fruct. bacca!

### \* \* \* *Aculeati.*

37. *capensis*, aculeis solitariis. fol. ovatis excisis integris glabris, umbellis axillaribus. Thunb. prod. 44. Hab. ad Cap. bon. spec. h. †

† *Oenoptia*. Cal. urceolatus, 5-fidus. Petala 5. Discus carnosus o. Drupa succosa, 2-locularis, altero loco saepius abortiente, 1-sperma.

38. *volubilis*, inermis, caule volubili, fol. ovatis repando-subcrenatis (integerrim. Lin.) striatis. Michaux, p. 153-154. Lin. suppl. p. 132. Jacq. ic. rar. 2. t. 336. Zizyphus volubilis. Willd. Sp. p. 1103. Hab. in Carolina et Ludoviciana.

Obs. Frutex flore Rhamni fructu Zizyphi. - Umbellae axillares. Willd. Racemi subterminales. Michaux. Flor. hermaphroditi. Aiton, Bor. dioici. Mich. Fol. integerrima. Linn. Willd. repando - subcrenata. Mich. undulato-serrata. Walter!

† † *Zizyphus*. Cal. patens, 5-fidus. Petala 5. Discus carnosus orbicularis, pistillum ambiens. Styl. 2. Drupa nunc 1-2-sperma. Fol. alternis. Flor. axillares.

39. *Lotus*, aculeis geminis, altero-recurvo, fol. ovato-oblongis obsolete crenatis. Willd. Z. *Lotus*, aculeis geminatis, foliis ovalibus glabris obsolete dentatis, fructu rotundiore. Lam. encycl. 3. p. 304. Desfontaines in Acad. Scient. 1789. p. 443. t. 21. et Flor. s. p. 200. Rhamnus *Lotus*. Lin. Shaw. afr. 631. f. 631. β? Mungo Parker iter. p. 85. vers. germ. Habitu in regno Tunetano et in interiore Africae. Fruct. edules. h.

40. *Napeca*, aculeis subgeminis recurvis, pedunc. corymbosis, flor. semidigynis, fol. ovatis obliquis subcrenatis utriusque laevib.

Willd. p. 1104. Rhamnus *Napeca*. Linn. Pluck. alm. 199. t. 216. f. 6. Rumph. 2. t. 37. Hab. in Zeylona. h.

41. *Jajuba*, aculeis solitariis recurvis, fol. subrotundo-ovatis obtusis sulcis tomentosis, pedunc. aggregatis, flor. semidigynis. Willd. Sonnerat. it. t. 54. Rumph. 2. t. 36. Hab. in India. Fruct. ovato-subrotundus. h.

42. *Xylopyrus*, caul. aculeato, aculeis recurvis, fol. ovatis subtus tomentosis, flor. corymbosis. Retz. obs. 2. p. 11. Zizyphus *rugosa*, acul. subgeminatis recurvis, fol. lato-ovalib. rugosis serrulatis, corymbis tomentosis pedunculatis dichotom. Lam. enc. 3. p. 319? Habitu in Ind. orient. ad radices montium. h.

43. *sincensis*, ramulis annorinis aculeis pubescentibus i vetustiorib. inermibus, fol. ovato-oblongis acute serratis. Lam. enc. 3. p. 318. Hab. in China? Petal. sub calyce reflexa.

44. *Ignaneus*, acul. subgeminatis, fol. ovatis acuminatis serratis nudis, racemulis axillarib. Linn. l. c. Rhamnus. Lin. Jacq. amer. p. 74. Ed. pici p. 40. Hab. in insulis Antillicis et ad Curaco. Lacerta ignana sub hoc frutice communiter degit.

45. *Oenoptia*, aculeis solitariis recurvis, fol. obliquis dimidiato-cordatis acuminatis subtus tomentosis, pedunc. aggregatis. Willd. p. 1105. Burm. zeyl. 131. t. 61. Hab. in Zeylona. h.

46. *Zizyphus* (vulgaris), acul. geminis, altero recurvo, fol. ovatis retusis dentatis glabris. Willd. Rh. *Zizyphus*. Linn. Pall. ross. 2. p. 24. t. 59. Hab. in Europa australi. h.

47. *mauritiana*, acul. geminis: altero recurvo, fol. oblong. obtusis subtus tomentosis, fructu oblongo. Lam. l. c. p. 319. Hab. in ins. Mauritiana. Antecedenti affinis, scil. fol. minus latis et fruct. oblongus acuminatus. h.

48. *rotundifolius*, acul. geminatis: altero recurvo, fol. subrotundo-ovalibus subtus tomentosis. Zizyphus. Lam. l. c. n.º. 9. Pluck. alm. 199. t. 197. f. 2. Burm. Zeyl. p. 132. In India, Zeylona. h.

49. *angulatus*, acul. geminatis rectis, fol. subrotundo-ovalib. subdentatis ntrinq. glabris ramis acute angulatis. Lam. l. c. p. 320. sub Zizypho. Hab. . . . Rami flexuosi, 4-goni: angulis prominentibus.

50. *Spina Christi*, acul. geminis rectis, fol. ovatis acutis dentatis glabris. Willd. † Alp.

Alp. aegypt. 16. t. 19. Pluck. 199. t. 197. f. 3.  
Hab. in Aethiopia, Palaestina. h

\* *Inermis*.

51. *peruvianus*, inermis, fol. ovato-rotundat. rariter dentatis subangulosis, petal. stellatis calyce majorib. Lam. enc. 3. p. 320. Hort. Par. Hab. in Peruv. Sempervirens.

† † † *Paliurus*. Flor. Zizyphi. Styli 3.  
*Drupa* exsucca, 3-locularis ala membranacea orbiculari cincta.

52. *Paliurus (australis)*, acul. geminatis: inferiore reflexo, flor. trigynis, drupa coriacea margine alata. Willd. Spec. 2. p. 103. sub Zizypho. Pall. Fl. ross. 2. p. 27. t. 64. *Paliurus aculeatus*. Lam. ill. t. 210. P. australis. Gaertn. t. 43. f. 5. Hab. in Europa austr. et ad Caucasum.

*Obs.* Tam ob fructus naturam, quam ob floris structuram Zizyphi et Paliuri ut distincta genera separari omnino merentur; verum cum magnoiniter 3. hoc genera (characterem artificiali solummodo distinguenda) extet affinitas, potius ea hic conjuncta manent, quam, in mentem system. veget., in diversis ordinibus collocanda, quod ob stylum 1. in *Rhamno* 2. in *Zizypho* et 3. in *Paliuro*, flor. dioicos in *Oenoptia* necessarium omnino esset.

533. *CONDALIA*. Cal. urecolatus, 5-fidus, persistens. Cor. o. *Discus* glandulosus. Stylus 1. *Drupa* ovata, nuce monosperma.

1. *microphylla*, spinis terminalibus et axillaribus, fol. ovatis subsessilib. Cav. ic. 6. p. 16. t. 525. Zizyphus myrtilloides. Ortega Decas plant. p. 119. Habit. in R. Chilensi. Flor. saepe 4-partiti, 4-andri. O. h

*Obs.* Rhamno aut potius Zizypho omnino affinis, et forte ejus solum species, sed stylo unico et petalis nullis differt. An hoc sufficit?

534. *OPHELIA*. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala. *Nectarium* 5, staminibus alternantia. *Bacca* 1-sperma.

1. *amentacea*. Roxb. Corom. n°. 158. t. 158. Hab. in montibus Carcassiensibus in Coromandelis. Fol. ovata, alterna. Racem. axillares.

535. *ELAEODENDRUM*. Cal. 5-10-phyllus: foliolis 5, aquamvis subrotundis concavis. Cor. 5-partita: laciniis ovato-lanceolatis concavis. *Nect.* linearis-subulata

petaliformia. *Drupa* exsucca, nuce 2-3-loculari. *Putamen* crassum, durum, 2-3-sulcatum.

1. *Argam*, spinosum, fol. lanceolatis obtusis. Schousb. Maroc. Ed. germ. p. 89. Willd. p. 1148. *Rhamnus siccus*. Lin. Commel. Hort. 1. t. 83. *Sideroxylon spinosum*. Lin. Cresc. copiose in sylvis in Barbariac provinc. austr. inter flumina Tansif et Suz. Ex nuculis oleum praeparatur oleo olivarum simile.

*Obs.* Cl. Schousboe loc. cit. ample et docte de hac arbore disseruit, et ad ejus observationes characterem genericum emendavit.

2. *orientale*, inermis, fol. lanceolatis acutis: venis rubris. Jacq. ic. rar. 1. t. 32. Willd. l. c. Habit. . . An congener *Rubentia*. Juss. gen. pl.?

3. *glaucum*, inermis, ellipticis subserratis acutis, cymis axillaribus dichotomis folia aequantilib. Vahl. symb. 2. p. 42. sub *Celastr.* Schrebera albena. Retz. obs. 6. p. 25. t. 3. Willd. Sp. 2. p. 1092. Hab. in Zeylona et Coromandelis. Vid. Roxb. Corom. 7. 2. p. 2.

536. *HÆNKEA*. Cal. 2-phyllus: altera biloba. Cor. urecolata. *Stigma* 3 - gonum. *Drupa* 1-sperma. *Nux* trilocularis.

1. *flexuosa*, ramis flexuosis, fol. ovato-lanceolatis, racemis axillaribus. Flor. Per. 3. p. 8. 231. Hab. in Andium montibus.

† † *Stamina petalis alterna. Fructus capsularis.*

537. *SENACIA*. Cal. minimus, 5-dentatus. Cor. 5-petala. *Caps.* sphaerica, pedunculata, 2-valvis, 4-sperma. *Sem.* angulata, nuda.

1. *undulata*. *Celastrus undulatus*. Lam. Willd. 2. p. 1104. Hab. in Bourbonia. A. d. Petit-Thouars.

538. *CELASTRUS*. Cor. 5-petala, patens. *Caps.* 3 - angularis, 3-locularis. *Sem.* calyptrata.

\* *Inermis, foliis integerrimis.*

1. *lucidus*, inermis, fol. ovalibus acutis nitidis marginatis, pedunc. axillaribus. Willd. Sp. 2. p. 1123. L'Herit. stirp. 1. p. 49. t. 25. Pluck. alm. 13p. t. 280. f. 4. An Cassine concava. Lam. enc. 1. p. 652? Hab. ad Cap. b. spec. h

2. *microphyllus*, inermis, fol. ovatis obtusis integerrimis, cymis terminalib. dichotomis. Lin. suppl. 154. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *bullatus*, inermis, fol. ovatis acutis inrgerimis, panic. terminali. Willd. l. c. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 1. Pluck. alm. 139. t. 28. f. 5. Hab. in Virginia. h

4. *laurinus*, inermis, fol. ovato-oblong. obtusis emarginatis integerrimis, cymis axillaribus. Willd. C. fol. oblongis integris, panic. axillarib. Thunb. prod. 42. Hab. ad Cap. b. spei. h

5. *rostratus*, inermis, fol. oblongo-ovatis inaequalib. integerrimis, corymbis dichotomis axillaribus, fructib. spinosis. W. Inermis, fol. oblongo-ovatis integris, panic. axillaribus, fructib. spinosis. Thunb. prod. 42. Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *octogonus*, inermis, fol. ellipticis angulosis subenerviis, peronantibus, capsulis bivalvib. monospermis. L'Habit. cert. angl. 7. Hab. in Peru. Fol. glauca. Semen arilatum bisulcum. L'Il. h

7. *filiformis*, inermis, fol. lanceolatis integerrimis, ramis filiformibus, pedunc. axillaribus unifloris. Linn. suppl. 153. Th. prod. 42. Hab. ad Cap. b. spei. h

8. *macrocarpus*, inermis, fol. oblongo-lanceolatis integerrimis, acumine emarginato, flor. aggregatis. Flor. Peruv. 3. p. 8. t. 230. f. b. Haenke. Prodr. Flor. Per. p. 65. Hab. in Muona nemoribus. Fruct. polygamus, dioicus. Caps. magna, obovata, saepius 1-sperma. Sem. arillosa, oligocinosa.

**\*\* Inermis, fol. dentatis.**

9. *Maytenus* (uncinatus), inermis ramis dependens, fol. lanceolatis serratis, acumine uncinato, pedunc. congestis unifl. C. Mayteous. Willd. p. 1127. Molln. Chil. Juss. gen. p. 449. Mayten. Faull. 3. p. 39. t. 27. Hab. in R. Chilensis campis et arvis. Arb. sempervirens. Caps. luteo-crocea, 2-3-locularis. Sem. arillo rubro involuta.

10. *scandens*, inermis, fol. oblongis acuminatis serratis, racemis terminalibus, caul. volubili, Willd. p. 1125. Deham. arb. 1. p. 221. t. 95. Hab. in Canada. h

11. *paniculatus*, inermis, fol. ovatis acuminatis obtusis serratis, panic. elongata terminali. Willd. l. c. Hab. in Ind. orient. Rami fusi punctati. Caps. tillocularis trilvalvis. Willd. h

12. *procumbens*, inermis procumbens, fol. ovatis serratis, flor. axillarib. subsolita-

riis. Lin. suppl. 153. Hab. ad Cap. bonae spei. h

13. *acuminatus*, inermis, fol. ovatis acuminatis serratis, pedunc. axillarib. uniflor. caul. erecto laxo. Lin. suppl. 154. Hab. ad Cap. b. spei. h

14. *cassinoides*, inermis, fol. ovatis acutis laxo dentatis perennantibus, flor. axillaribus. L'Her. cert. angl. p. 6. t. 10. Hab. in Canariis. h

15. *striatus*, inermis, ramulis erectis striatis, fol. ovatis acuminatis serratis, pedunc. sparsis uniflor. Thunb. jap. 68. Hab. in Japonia. Flor. sparsi pedunculati. Th. h

16. *cernuus*, inermis, fol. ovatis obtusis serratis, pedunc. axillarib. uniflor. cernuus. Thunb. prod. 42. Hab. ad Cap. b. spei. h

17. *undulatus*, inermis, fol. obovato-subcuneiformib. undato-dentatis, flor. axillaribus sessilibus. Thunb. Cum priore. h

18. *edulis*, inermis, fol. oppositis alternisque ellipticis serratis, cymis axillarib. dichotomis. Vahl. symb. 1. p. 21. Catla edulis. Forsk. descript. 63. Hab. in Arabia felici. h

19. *crenatus*, inermis, fol. ovatis crenulatis, cymis axillarib. Forst. prod. n. 113. Hab. in insulis Marchionis maris pacifici. h

20. *dilatatus*, inermis, fol. obovatis acuminatis apice serratis, florib. terminalibus. Willd. p. 1127. Thunb. in Act. Linn. Lond. 2. p. 332. Hab. in Japonia. h

21. *myrtifolius*, inermis, fol. ovatis serrulatis, flor. racemosis, caule erecto. L. Hab. in Virginia. h

22. *emarginatus*, inermis, fol. ovatis ovalibusque acuminatis apice emarginato, laeviter serrato-crenatis, pedunc. congestis 1-floris. Flor. Per. 3. p. 6. t. 229. Hab. in Andium nemorib. Frut. 20 = ulnaris polygamio-dioicus. Caps. crocea, 1-3-locular.

23. *verticillatus*, inermis, ramis aggregato-verticillatis, fol. oblongo-lanceolatis serratis, flor. racemosis, pedunc. 1-5-flor. Flor. Per. 3. p. 6. t. 229. Hab. in nemorib. Cuchero etc. Sempervirens, polygamio-dioicus. Caps. turbinata, 3-gona, 2-3-4-locular. Sem. arillo pulposo flavo subobovatis. Auctor. quaerunt, an C. octogonus. L'Her. eadem species sit?

24. *confertus*, inermis, ramis aggregato-verticillatis, fol. confertis ovalibus subrotundisque serrulatis, flor. congestis. Flor. Per. l. c. Hab. in Peruviae nemorib.



altis. Caps. 2-3-locularis, 2-3-valvis, valvulis patentibus reflexis. Sem. 2-3, arillo croceo, involuta. *h*

25. *tetragonus*, inermis, fol. ovatis serratis, ramis tetragonis. Thunb. prodr. 42. Hab. ad Cap. b. spec. *h*

26. *articulatus*, inermis, fol. rotundatis acuminatis, pedunc. axillaribus subtrifidis. Thunb. jap. 97. Hab. in Japonia. *h*

27. *alatus*, inermis, fol. oppositis brevibus sine petiolatis acuminatis serrulatis, ramis alatis. Willd. Thunb. jap. 98. Hab. in Japonia. *h*

\*\*\* *Spinosi, foliis integerrimis.*

28. *linearis*, spinosus, spinis foliosis, fol. linearibus integerrimis. Lin. suppl. Hab. ad Cap. b. spec. *h*

29. *integrifolius*, spinosus, spinis foliosis, fol. ovatis obtusis integerrimis, cymis lateralibus. Lin. suppl. 153. Hab. ad Cap. b. spec. *h*

30. *emarginatus*, spinosus, spinis foliosis, fol. obovatis emarginatis integerrimis, umbellulis pedunculatis. Willd. Spec. p. 1228. Hab. in India orient. Spini crassi juniores foliosi et floriferi. Pedunc. capitulatus. Caps. trilocularis trivalvis. Willd. *h*

\*\*\* *Spinosi, foliis dentatis.*

31. *phyllacanthus*, spinosus, spinis foliosis, fol. lanceolatis serratis perennantibus, flor. lateralibus. L'Her. sert. angl. 6. C. *senegalensis*. Lam. enc. 1. p. 654. Hab. in Senegal. *h*

32. *buxifolius*, spinis foliosis, ramis angulatis, fol. obtusis. Lin. R. ramis angulatis, fol. obovato-cuneiformibus obtusis, cymis lateralibus paucifloris. Lam. l. c. 661. Pluck. alm. t. 202. f. 3. Hab. in Aethiopia. Fol. obtusis. *h*

33. *multiflorus*, spinis inferioribus oblongissimis, ramis parvis subfoliosis, fol. obovato-rhomboides, cymis lateralibus multifloris. Lam. l. c. p. 801. C. *hispanicus*. H. P. Hab. in Africa ?

34. *pyracanthus*, spinis nudis, ramis teretibus, fol. acutis. Lin. Pluck. phyt. t. 126. f. 2. 3. Comm. hort. 1. p. 163. t. 84. Hab. in Aethiopia. *h*

35. *rotundifolius*, spinosus, fol. petiolatis subrotundis dentatis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spec. *h*

36. *parviflorus*, spinis nudis, fol. ovatis erectis, pedunc. filiformibus, fol. longio-

rib. Vahl. symb. 1. p. 21. Catha spinosa. Forsk. descr. 64. Hab. in Arab. felic. *h*

539. *EVONYMUS*. Cor. 5-petala. Caps. 5-gona, 3-locularis, 3-valvis, colorata. Sem. calyptrata.

1. *Tobira*, flor. quinquefidis, fol. obovatis retusis integerrimis. Willd. Sp. 2. p. 1130. Kaempf. amoen. fasc. 5. t. 797. Hab. in Japonia. *h*

2. *japonicus*, florib. quadrifidis, fol. subrotundo-ovatis dentatis. Willd. l. c. Lin. suppl. 154. Banks. Ic. select. Kaempf. t. 8. Hab. in Japonia. Fol. bipollicaria fere. *h*

3. *europaeus (vulgaris)*, flor. plerisque tetrandris 4-fidis, petal. oblongis pedunc. compressis multifloris, stigmatibus subulatis, fol. glabris. Ait. Kew. 3. p. 273. Hab. in Europ. sepib. *h*

4. *verrucosus*, flor. tetrandris, cortice verrucoso, pedunc. filiformib. teretibus subulatis. Ait. Flor. austr. 3. p. 48. t. 289. Hab. in Carniolae montosis asperis. *h*

5. *latifolius*, flor. plerisque 5-fidis, petal. ovalibus, pentandris, cortice laevi, pedunc. filiformib. teretib. multifloris. Ait. 1. p. 273. Jacq. Flor. austr. 3. p. 48. t. 289. Hab. in Silesia, Bohemia, Austria, Pannonia, Helvetia. *h*

6. *atropurpureus*, flor. tetrandris, pedunc. compressis multifloris, stigmatibus tetragonis truncatis. Ait. 1. p. 274. Jacq. hort. 2. p. 55. t. 126. E. flor. quadrifidis et quinquefidis, fol. lanceolatis nitidulis petiolatis, ramis laevib. Lam. enc. 2. p. 587. Hab. in Amer. boreali. *h*

7. *americanus*, pedunc. subulatis, fol. elliptico-lanceolatis serratis, ramis laevib. Hellen. diss. in Usteri delect. opusc. bot. 3. p. 95. E. virginianus, capr. verrucarum iuxta exasperata. Pluck. alm. 139. t. 115. f. 5. Hab. in Virginia. *h*

540. *PILOCARPUS*. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. Stamina sub germine inserta. Caps. quinque, basi cohaerent, 1-spermae, elasticae. Sem. arillata.

1. *racemosus*. Vahl. eclog. 1. p. 29. t. 10. Plin. Sp. p. 18. t. 127. Hab. in Moutserat, in albid. montib. Frut. ramis pendulis. Fol. elliptica. Priori generi affinis.

541. *POLYCARDIA*. Petala 5, rotundata. Cal. 5-lobus. Caps.

coriaceæ, 3-5-locularis: valvulis totidem semi-septiferis. *Semina* ad hilum semiarillata. (Flor. 3-4, ex apice foliorum nonnullorum (pedunc. foliiformium?) provenientes!

3. *phyllanthoides*. Lam. ill. p. 373. t. 132. Enc. bot. 5. p. 481. *P. madagascariensis*. Willd. Sp. 1121. Hab. in Madagascar. Frutex. Fol. oblongo-ovata, in floriferis apice emarginata.

+++ *Stamina petalis opposita.*  
*Fructus triloccus.*

542. HOVENIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala convoluta. *Stigma* 3-fidum. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis: loculis 1-spermis.

1. *dulcis*. Thunb. Flor. jap. p. 101. Lam. ill. t. 131. Kaempf. amoen. t. 809. Hab. in Japon. Arb. fol. ovatis serratis. Pedunculi carnosii, edules sapore dulci.

543. CEANOTHUS. *Petala* 5, succata formiata. *Bacca* (Caps.) sicca, 3-locularis, 3-sperma.

1. *americanus*, fol. ovalib. serratis subtus tomentosis, racemis axillari composito longe pedunculato. Lin. Michaux, Flor. 1. p. 154. Willd. Spec. 2. p. 1114. Mill. dict. 1. 86. Pluck. alm. t. 28. f. b. Hab. in Amer. septent. h

2. *microphyllus*, subdecumbens, fol. minutis subsessilib. integrisculis, corymbulis terminalib. Michaux, l. c. Hab. in sabulosis sylvæ. Georg. et Florid. Rad. uti præcedens, tuberosa, rubra. M.

3. *macrocarpus*, fol. cordato-embrotundis obtusis triplinerviis, corymb. axillarib. Willd. l. c. Cav. ic. 3. p. 38. t. 276. Hab. in N. Hispan. h

4. *asiaticus*, fol. ovatis acuminatis basi rinerviis, flor. axillaribus nemorosis. Lin. Cav. ic. 5. p. 24. t. 446. f. 1. Lam. ill. p. 89. t. 129? *Rhamnus asiatica*. Lam. enc. 4. p. 474. Hab. in Zeylona et Prope Guinapatam in ins. Luzonensi. Petala 5-nervata, lutescentia.

5. *circumscissa*, aculeis solitis recurvis, fol. oppositis bilariis obcordatis. Gaertn. de fr. 2. p. 110. t. 106. *Rhamnus circumscissa*. Lin. suppl. p. 152. Hab. in Ind. orient. dumetis et in ins. Mauritiis.

*Obs.* Ambigit inter Ceanothum et Rham.

num, priori tamen magis vicina videtur ob pericarpium exsuccum, pressione in valvulas regulares dehiscens. G.

6. *granulosus*, fol. ovato-oblongis acuminatis glabris nitidis medio subserratis, pedunc. brevib. dichotomis multifloris. Fl. Per. 3. p. 5. t. 228. f. a. Hab. in Peruv. nemorib. Neet. discus fungos. germen ambiens. Bac. subrotundo-turbinata. h

7. *pubescens*, fol. ovatis acuminatis pubescentib. acute serratis, pedunc. brevibus dichotomis multifloris. Flor. Peruv. l. c. p. 6. f. b. In Andium nemoribus. Bac. prioris, nigra.

8. *colubrinus*, fol. ovatis venosis petiolis ferrugineo-tomentosis caps. sphaericis. *Rhamnus colubrinus*. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1056. Com. hort. 1. p. 175. t. 60. Hab. in Amer. Callus nectariferus transversus inter basin staminum. Lin.

9. *reclinatus*, fol. ovatis integris multinerviis, ramis dependentib. L'Herit. sert. angl. p. 6. *Rhamnus ellipticus*. Ait. Swartz. Flor. 1. p. 497. Brown. jam. p. 172. t. 29. f. 2. In Jam. ic. montosis fruticetis, et in ins. St. Bartholomæi. Antecedenti affinis, cum quo fractu 3-cocco a *Rhamnis* differt. h

10. *africanus*, fol. lanceolatis enerviis, panic. terminali. Lin. Pluck. phyt. p. 126. f. 1. Seb. thes. t. 22. f. b. Hab. in Aethiop. Habitus parum recedit. Styl. ex 3bus condunati. h

11. *capsularis*, fol. ovato-cordatis acuminatis serratis, caps. 3-valvib. dehiscentibus. Forst. prodr. n°. 112. Cresc. in ins. Tabitiis. h

544. COLLETIA. *Cal.* urceolatus, 5-fidus, basi intus villosus v. plicatus. *Petala* 5, squamiformia, aut 6. *Bacca* sicca, 3-cocca, 3-partibilis, 3-sperma.

\* *Flor. petalis instructis.*

1. *obcordata*, fol. obcordatis integerrimis 3-nerviis, ramis flexilib. virgatis, petal. squamiformib. Vent. Hort. Cels. p. 92. t. 97. Hab. in Peruv. Sparium refert. Vere fl. h

2. *Ephedra*, aphylla, ramis erectis implexis apice spinosis, flor. in ramulorum nodis conglomeratis. Vent. Choix de Pl. p. 16. t. 16. Cum priore, cui affinis. *Ephedram* vocatur.

\*\* *Flor. apetalis.*

3. *serratifolia*, fol. ellipticis argute ser-

ratiz, flor. apetalis. Vent. l. c. p. 15. t. 15. Pariter in Peruv. Lycium sistit. h

4. *horrída*, fol. integerrimis, flor. apetalis. Willd. Sp. 2. p. 1113. C. spinosa. Lam. ill. t. 129. Hab. in Brasilia. Pedunc. 1-flori, mutantes. h

545. **PHYLICA**. *Perianthium* 5-partitum, turbinatum, (villosum). *Petala* nulla. *Squamæ* 5, stamina munientes. *Caps.* tricoeca, infera.

1. *ericoides*, fol. linear-lanceolatis glabris, ramis subumbellatis, capitulis terminalib. tomentosis. Thunb. prodr. 44. Willd. Sp. 2. p. 1108. Hab. in Arthiopia, et cum plerisque sequentibus, ad Cap. b. spei.

2. *parviflora*, fol. subulatis acutis scabris subpilis, ramis paniculato-multiflor. Lin. Thunb. prodr. p. 44.

3. *lanceolata*, fol. sparsis lanceolatis subtus tomentosis, capitulis terminalibus hirsutis. Thunb. prod. 44. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *bicolor*, fol. linearibus pubescentibus, calyc. communib. corolla brevioribus. Lin. Ad Cap. b. spei, in campis arenosis. Calyx communis, reiculato-venosus, squamis rubro-carinatis. h

5. *pubescens*, fol. linearib. acutis pilosis subtus tomentosis, flor. spicatis, bracteis villosis filiformib. Ait. Kew. 1. p. 268. Ph. capitata. Willd. p. 1109? Burm. afr. 121. t. 44. f. 3. Lam. ill. 127. f. 2? Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *criophoros*, fol. linearib. pilosiusculis subtus tomentosis, margine revolutis capitulis terminalibus, flor. tomentosis. Aiton. Kew. 1. p. 268. P. fol. lanceolat. acutis subtus tomentosis, capitulis terminalib. tomentosis. Thunb. prod. 44. Pluck. analib. 72. t. 445. f. 1. Ph. nitida. Lam.

7. *rosmarinifolia*, fol. linearibus planiusculis erectis, subtus incanis, capitulis ovatis tomentosis. Lam. l. c. Hab. . . Capitula majuscula, compacta, lanuginosa. †

8. *trichotoma*, fol. trigonis obtusis glabris, capitulis terminalibus. hirsutis, caul. trichotomo. Thunb. prodr. app. p. 187.

9. *axillaris*, fol. linear-lanceolatis subtus incanis, flor. distinctis, racemis foliosis terminalib. Lam. ill. 2. p. 77. Encycl. bot. 5. p. 289. Hab. . . Sequenti affinis, sed differt flor. axillaribus et solitariis. Rami pubescentes, albicantes.

10. *plumosa*, fol. linear-lanceolatis subpubescentibus, bracteis lanatis spica oblonga. Thunb. prod. 45. Lam. ill. t. 127. f. 4. Pluck. mant. 45. t. 342. f. 3. Hab. in Aethiopia. h

11. *villosa*, fol. linearibus superioribus villosis, flor. racemosis. Th. Hab. ad Cap. bon. spei. h

12. *imberbis*, fol. linearib. obtusis scabris, flor. terminalib. pubescentib. Linn. Erica africana flor. albis rorimarini. Schum. 2. t. 49. f. 5. Ph. Brunioides. Lam. ill. 2. p. 78. Hab. ad Cap. b. spei. h

13. *stipularis*, fol. linearib. stipulatis, flor. quinquenerviis. Lin. Capitulis terminalib. Thunb. prodr. 44. Burm. afr. 117. t. 43. f. 2. Cor. lutea.

14. *cordata*, fol. cordato-ovatis patentibus, caul. prolifico. Comm. rar. 62. t. 12.

15. *dioica*, fol. cordatis, flor. dioicis. L. Mant. 342. Cal. squamæ hirtæ pilis glaucogriseis. Var. fol. revolutis-linearib.

16. *buxifolia*, fol. ovatis sparsis ternisq. subtus tomentosis. Linn. Burm. afr. 119. t. 44. f. 1. Habit. in Aethiopia. h

17. *spicata*, fol. oblongicordatis acuminatis subtus tomentosis, spicis cylindricis, flor. longit. line. bractearum. Aiton. Kew. 1. p. 269. P. fol. cordato-sagittatis lanceolatis. Lin. suppl. 153. Lam. ill. t. 127. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Differt ab omnib. capitulo elongato in spicam villosam. h

18. *myrtifolia*, fol. ovatis acuminatis subtus candidissimis, flor. subsolitar. Poir. in encyc. bot. 5. p. 293. Hab. . . Fol. minuta. Bract. O.

19. *callosa*, fol. oblongis cordatis acuminatis pilosis subtus tomentosis, flor. subcapitatis. Ait. Kew. 1. p. 269. Linn. suppl. 153. Ph. reflexa. Lam. ill. 2. p. 79? Distincta. a P. cordata.

20. *paniculata*, fol. ovatis mucronatis superoe glabris nitidis subtus tomentosis, racemis foliosis paniculatis. Willd. p. 1112. Accedit ad P. callosam

21. *imbricata*, fol. cordato-ovatis glabris, flor. racemosis. Thunb.

22. *racemosa*, fol. ovatis glabris, flor. simplicib. paniculato-racemosis. L. Thunb. prod. 45. Nees cordata. Burm. Hab. juxta Cap. b. spei fuscas. h

23. *pinifolia*, fol. acerosis utrinque planis glaberrimis, flor. paniculato-racemosis

glabris. Lin. suppl. p. 153. *Beckea africana*, fol. linearib. canaliculatis. Burm. pr. p. 12. Hab. in Cap. b. spei summis montib. Frut. 5-6-petalis, habitu Tamarisci. Invol. commune o. Vid. Enc. bot. 5, p. 294.

*Obs.* Antecedenti speciei affinis, quacum ratione floris (ambarum fructus adhuc examinandus est) a ceteris Phyllicis differt, an ab iis hinc cum *Bergio* separari possunt duae hae species?

546. *BRUNIA*. Flores aggregati. Cal. superus, 5-partitus. Filamenta quibus petalorum inserta. Stigma 2-fidum. Caps. minima, 2-loculares.

1. *nodiflora*, fol. trigon. incurv. acutis, capitulis in ramis lateralibus terminalibus. Thunb. prod. 41. Willd. 2. p. 1141. Breyn. cent. 22. t. 10. Pluck. mant. 69. t. 346. f. 4. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei.

2. *paleacea*, fol. trigonis rectis arcte appressis, capitulis corymbosis palaceis, paleis flor. longiorib. Willd. p. 1142. Th. prod. 41. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *lanuginosa*, fol. trigonis patul. apice fuscis, capitulis globosis fastigiatis. Thunb. prod. 41. Pluck. alm. 361. t. 318. f. 4. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei. Similis *B. abrotanoidi*. h

4. *verticillata*, fol. trigonis obtusis glabris, ramulis verticillatis fastigiatis, capitulis terminalibus. Thunb. Lin. suppl. 156. Ad Cap. b. spei.

5. *deusta*, fol. trigonis glabris apice nigris, capitulis terminalib. Thunb. prodr. app. p. 187. Cum sequentib. ad Cap. b. spei.

6. *microphylla*, fol. ovato-trigonis carnosis glabris, capitul. terminalibus, ramis divaricatis. Thunb. l. c.

7. *laxa*, fol. trigonis, floribusque spicatis glabris. Thunb.

8. *alopecuroides*, fol. trigonis acutis glabris, capitul. lateralib. globosis glabris. Thunb. l. c.

9. *laevis*, fol. linearibus convexis incurvis, capitul. terminalib. Thunb.

10. *abrotanoides*, fol. lanceolatis glabris squarrosis, capitul. subfastigiatis. Th. Burm. afr. 266. t. 100. f. 1. *Levisanus capensis*, serpilli folio. Pet. gaz. g. t. 5. Pluck. mant. 69. t. 346. f. 7. Hab. in Aethiopia. Germen superum. Stylus 1, emarginatus.

11. *superba*, fol. triquetris filiformibus calloso-mucronatis patulis, ciliato-villosis. Hab. ad Cap. b. spei. h +

12. *fragarioides*, fol. triquetris adpressis margine ciliatis. Willd. p. 1143. Ad Cap. bon. spei. Fol. parva lineari-filiformia. h

13. *ciliata*, fol. ovatis acumineatis ciliatis. Lin. Sp. pl. 288. Hab. in Aethiopia. Germen superum. Stylus bifidus. h +

547. *STAAVIA*. Flores aggregati. Stam. calyci inserta. Styli 2, coaliti. Bacca 5-sperma corticata. Receptaculum paleaceo-villosum.

1. *radiata*, fol. lanceolato-trigonis patulis, calycis radio colorato, capitulo brevire. Th. prod. 41. Willd. Sp. 2. p. 1144. *Brunia radiata*, Pluck. L. mant. 47. t. 454. f. 7. Moris. 2. 6. t. 3. f. 43. Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *glutinosa*, fol. lineari-lanceolatis trigonis patulis, radio calycis colorato capitulo longiore. Thunb. prod. 41. Lin. sub *Brunia*. Pluck. mant. 119. t. 431. f. 1. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Similis praecedenti at discus major glutinosus. h

548. *PLECTRONIA*. Cal. turbinatus, 5-dentatus, persistens, clausus sinubus 2-squamis 5, villosis. Petala 5, calycis fauci inserta. Bacca infera, 2-locularis, 2-sperma.

1. *corymbosa*. Burm. prodr. P. ventosa. Willd. Spec. 2. p. 1152. Burm. afr. t. 94. Hab. ad Cap. b. spei. Arb. ramis 4-gonis. Fol. lanceolato-ovata.

549. *CARPODETUS*. Cal. turbinatus, germine adnatus, 5-dentatus: dentibus deciduis. Petala calyc. margini inserta. Stigma capitatum. Bacca semiinfera, sicca, medio annulata, 5-locularis.

1. *serratus*. Forst. gen. p. 33. t. 17. Willd. p. 1113. Hab. in N. Zealandia.

*Obs.* Hoc et antecedens genus *Rhamnis* affinis, ab iis fructu infero distincta.

550. *DIOSMA*. Cal. sub-5-partitus persistens. Cor. 5-petala. Nec-

*taria* 5, supra germen. *Caps.* 3  
s. 5, coalitæ. *Semina* calyptrata.

1. *oppositifolia*, fol. trigonis obtusis ciliatis, flor. terminalib. Th. prod. 43. Willd. Sp. 2. p. 1133. Pluck. alm. 136. t. 279. f. 4? Vid. D. scabra. Lam. enc. 2. p. 283. Habit. ad Cap. b. spei, cum sequentibus speciebus; quæ omnes parvi fructus sunt.

2. *obtusata*, fol. trigonis acutis punctatis, calyce, petalisque ciliatis, ramulis pubescentib. Th. prod. 84.

3. *linearis*, fol. linearib. obtusis glabris patulis, flor. terminalibus subsolitariis. Th.

4. *virgata*, fol. trigonis obtusis punctatis glabris, flor. subracemosis fastigiatis. Th.

5. *alba*, fol. trigonis acutis punctatis, bracteis calyceque ciliatis. Th.

6. *hirsuta*, fol. trigonis mucronatis hirsutis, flor. terminalib. subsolitariis. Thunb. Comm. rar. 3. t. 3.

7. *rubra*, fol. trigonis mucronatis glabris subtus bifariam punctatis, lacin. calycinis glabris. Th. Comm. rar. 2. t. 2. Pluck. mont. 68. t. 347. f. 4. Hab. in Aeth. Habitus juniperi. Fol. subtus punctis pertusa. An flor. rubri? Vid. Lam. enc. 2. p. 285.

8. *pectinata*, fol. trigonis acutis punctatis ciliatis. Th. Hab. ad Cap. b. spei. h

9. *erivoides*, fol. trigonis obtusis glabris, flor. terminalib. subsolitariis. Thunb. Pluck. amalt. 236. t. 279. f. 5. Hab. in Aethiopia. h

10. *hispida*, fol. trigonis muticis villosis-hispidis patulis, umbellis terminalibus. Th. D. capensis. Lin. Murr. syst. ed. 14. p. 239. Hab. ad Cap. b. spei. Siamina sterilia huic fere petaloidea sunt. h

11. *ciliata*, fol. lanceolatis carinatis ciliatis, umbellis terminalib. Th.

12. *bifurca*, fol. trigonis acutis hirsutis, racemis terminalib. subumbellatis.

13. *bifida*, fol. lanceolatis mucronatis punctatis glabris imbricatis, flor. capitatis, petal. bifidis. Willd. Sp. p. 1136. Jacq. coll. 3. p. 278. t. 20. f. 2.

14. *capitata*, fol. trigonis villosis-hispidis imbricatis, florib. apicato-capitatis. Th. Caulis prolixis, facie Bruniae notifloræ.

15. *villosa*, fol. lanceolatis villosis imbricatis, capitulis terminalib. Th.

16. *cupressina*, fol. ovatis trigonis glabris imbricatis, flor. terminalib. solitariis. Brunia uniflora. Lin. Spec. pl. 2. p. 289.

17. *imbricata*, fol. ovatis acutis ciliatis, umbellis terminalib. Th. Similis D. ciliatæ, sed Petala purpurea subrotunda.

18. *marginata*, fol. cordatis, inferiorib. ovatis, super. ioribus lanceolatis, umbellis terminalib. Th. Lin. suppl. 155.

19. *lanceolata*, fol. lanceolatis obtusis subpilis, flor. axillarib. geminis. Th.

20. *pubescens*, fol. lanceolato-trigonis muticis villosis imbricatis, umbellis terminalib. Hartogia ciliaris. Lin. Syst. Nat. p. 223. Pluck. alm. 197. t. 411. f. 3.

21. *latifolia*, fol. ovatis crenatis pubescentibus, pedunc. lateralib. unifloris, ramis subtomentosis. Th. prod. Lin. suppl. 154.

22. *crenata*, fol. ovatis crenatis subina punctatis, flor. axillarib. solitariis. Calycis fol. subulata, crenata.

23. *tetragona*, fol. ovatis carinatis ciliatis quadrifariam imbricatis, flor. terminalib. solitariis. Th. Lin. suppl. 155. Facile distinguitur fol. valde approximatis, quo caulis illis totus obtectus evadot.

24. *uniflora*, fol. oblongis subtus punctatis, flor. terminalibus, calycib. ciliatis. Th. Sert. hanov. 1. p. 16. t. 8. Flos huic speciei maximus.

25. *rugosa*, fol. ovatis rugosis villosis reflexis, umbellis terminalib.

26. *ovata*, fol. ovatis glabris marginatis, flor. axillarib. solitariis et geminis. Th. D. pulchella. Houttuyn. t. 21. f. 2.

27. *barbigeræ*, fol. cordatis acutis glabris, umbellis terminalib. Th. Lin. suppl. p. 155. Petal. barbata. Pistil. 1, flore longius.

28. *glandulosa*, fol. ovatis acutis carinatis hirsutis patulis, cal. villosis. Th. prodr. p. 187.

29. *betulina*, fol. subcuneatis crenatis subtus punctatis, flor. lateralibus solitariis. Hartogia (*betulina*). Berg. cap. 67.

30. *orbicularis*, fol. orbiculatis, ramis villosis.

31. *pulchella*, fol. ovatis glanduloso-crenatis glabris, flor. axillarib. geminis. Th. prod. 43. Fructus 3-locularis. Cornu terminata glandulis duobus. Polymor. humi genus sexu, nectariorum figura, capsularum numero, suscit divisionem in Dio-mata et Hartogias, sed utraque demum plures observationes retraxerunt in unum. Linn.

*Obs.* Hoc genus secundum ill. Jussieu ad familiam Rutaceam pertinet.

551. **BURSARIA.** *Cal.* inferus, 5-dentatus. *Petala* 5, linearia. *Stigma* simplex. *Caps.* cordata, compressa, 2-partibilis, disperma. *Sem.* reniformia.

1. *spinosa*, caul. fruticoso spinoso, fol. emarginatis, flor. racemosis. Cav. ic. 4. p. 36. t. 350. Hab. prope Jackson et Botany Bay N. Hollandiae. *Caps.* siliculam Thlasp. *Bursae* pastoris aequat, unde nomen. h

552. **GOUANIA.** *Polygama. Cal.* superus turbinatus, 5-fidus. *Petala* 5, squamiformia. (*Cor.* o. Lin.) obvolvencia *stamina*, (*Anthere* 5, sub calyptra tecta. L.) *Stigma* 3-fidum. *Fruet.* tripartibilis: *cocculis* 8. *capsulis* 3-gonis dorso saepius 2-alatis, 1-spermis non deliscentibus. Juss. (*Flor.* masculi hermaphroditis mixti.)

1. *domingensis*. Linn. G. elabra. Jacq. auct. piet. p. 128. t. 264. f. 96. Lam. ill. t. 845. Vahl. symb. bot. 3. p. 101. Habit. in St. Dominica. *Frut.* scandens habitu *Vitis* et *Paulliniae*.

553. **PITTOSPORUM.** *Cal.* deciduus. *Petala* 5, in tubum conniventia. *Caps.* 2-5-locularis, 2-5-valvis. *Semina* pulposa.

1. *undulatum*, fol. ovato-lanceolatis undulatis acutis nitidis, pedunc. teruis terminalib. trifloris. Vent. Hort. Cels. p. 76. t. 76. Habit. in ins. Canaria. *Frut.* sempervirens, viscoso-pulverulentus. *Fruet.* adhuc ignotus. *Pet.* oblonga odor fortis.

2. *coriaceum*, fol. obovatis obtusis coriaceis, caps. 2-valvibus. Aet. 3. p. 488. Willd. Sp. 2. p. 1145. Andrew. t. 151. Lam. ill. t. 144. Habit. in ins. Canariis. *Cor.* cacculea.

554. **LICANIA.** *Cal.* turbinatus, 5-fidus. *Petala* 6, fauci cal. inserta. *Drupa* oliviformis, carnosa. *Nux* ovata, fibris tecta, 1-locularis.

1. *incana*. Aubl. t. 45. Lam. ill. t. 122. *Hedyera* Schreb. gen. pl. p. 180. secundum quem *Cor.* o. Willd. Sp. 2. p. 1210. Hab. in

Guyana. Fol. alterna simplicia, stipulacea. Flor. parvi, spicati. *Drupa* punctata, edulis. h

555. **CALODENDRUM.** *Cal.* 5-partitus brevis. *Cor.* 5-partita, petalis lanceolatis, unguiculatis. *Stam.* 5-sterilia, petaliformia (*Nectar.* 5-phyllum Th.) *Caps.* 5-angularis, 5-locularis, 5-valvis: *loculis* 2-spermis.

1. *capense*. Th. prod. p. 44. Willd. Spec. 2. p. 1148. Lam. in Journ. d'Hist. natur. n°. 2. p. 56. t. 3. Dict. capensis. Lin. suppl. p. 232? Hab. ad Cap. b. spici. Arb. truncato crasso ob flor. paniculatis formosa. *Pet.* glandulosa. E *Dictamni* familia.

556. **CEDRELA.** *Cal.* marcescens. *Cor.* 5-petala, infundibuliformis, basi ad  $\frac{1}{3}$  receptaculo adnata. *Caps.* lignosa, 5-locularis, 5-valvis. *Sem.* deorsum imbricata, ala membranacea.

1. *odorata*, flor. paniculatis, fol. pinnatis. Willd. Sp. 2. p. 1147. Lam. ill. gen. t. 137. Brown. jam. 158. t. 10. f. 1. Hab. in Amer. merid. Arb. procera, frondosissima, adhuc junior allium recolens, et cujus lignum pariter odoratum, ad varia utensilia perutile. Flor. Per. 3. p. 9.

557. **HUMBOLDTIA.** *Cal.* 4-partitus. *Petala* 5. *Legumen* oblongum, compressum.

1. *laurifolia*. Willd. Spec. 2. p. 1147. *Batschia laurifolia*. Vahl. symb. 3. p. 39. t. 56. Hab. in Zeylona. Arb. ramis articulatis flexuosis inanib. Fol. pari pinnata 4 vel 5-juga. *Racemi* axillares solitarii vel gemini multiflori. Willd. h

558. **HUERTEA.** *Cal.* 5-dentatus, inferus. *Petala* ovata, sessilia. *Stigma* 2-fidum, acutum. *Drupa?* obovata. *Nux?* unilocularis.

1. *glandulosa*, fol. imperipinnatis. Fl. Per. 3. p. 5. t. 227. f. 2. Habit. in Peruviae nemorib. Arb. 30-ulnaris, coma frondosa, truncato crasso. *Pedicel.* bracteolis stipati. *Glandulae* 2, ad basin foliorum parium, et 2 ad basin singuli folii.

*Obs.* Auctores l. c. p. xxi. lancetborem ex *Rhamnii* familia putant, forte *Atallis* affiniore videtur.

559. CAMAX. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* rotata 5-loba. *Stigma* 3-4-fidum. *Bacca* (villosa) 4-locularis, polysperma.

1. *fraxinea*. Willd. Sp. 2. p. 1117. Rouporea gujanensis. Aubl. 1. p. 198. t. 78. Lam. ill. t. 121. Hab. in sylvis Gujanæ. Flor. parvi numerosi cum fol. pinnetis? verticillati. h

560. TODDALIA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stigma* capitatum. *Caps.* baccata, 5-locularis: loculis 1-spermis. (*Bacca* sicca. Lam.)

1. *aculeata*, caul. aculeato, fol. ovatis acuminiatis. Lam. ill. t. 139. Scopolia aculeata. Smith. Ic. ined. 1. p. 34. Willd. 2. p. 1115. Paullinia asiatica. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 69. f. 1. Schreb. Pluck. alm. 202. t. 35. f. 5. Hab. in India orient. Panic. racemosæ axillares. Willd. h

2. *inermis*, caul. inermi, foliol. obovat. obtusis. Willd. sub Scopolia. Lam. l. c. t. 139. f. 2. In ins. Borbonia? Corymb. terminalis. Willd. h

561. RUYSCHIA. *Cal.* 5-phyllus, involucreatus. *Cor.* 5-petala, reflexa. *Stylus* o. *Stigma* 4-5. *Bacca* sub-5-locularis, polysperma.

1. *clusiaefolia*, fol. obovatis integris aveniis, flor. bractea solitaria. Swartz. Fl. ind. ocul. 1. p. 502. Jacq. amer. 75. t. 51. f. 2. Willd. p. 1116. Hab. in Martiniac sylvis interioribus, in arborum truncis. h

2. *surubea*, fol. obovatis obtusis mucronatis venosis. Willd. *Souroubea*, fol. obovatis emarginatis apice denticulatis venosis, flor. bracteis tripartitis. Swartz. l. c. t. p. 504. Lam. ill. t. 135. Souroubea gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 244. t. 97. Lozanua pentacrina. Scop. Gmel. Hab. in sylvis Gujanæ ad ripas rivuli Gallion dicti. h

562. CORTESIA. *Cal.* inferus, 10-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 2-partitus. *Stigma* globoso-peltatum. *Bacca* disperma.

1. *cuneifolia*, caul. fruticoso ramosissimo, fol. alternis cuneiformibus trifidis, flor. solitariis. Cav. ic. 4. p. 53. t. 377. Hab. in Buenos-Ayres planitie Pampas. Flor. Mayo.

Obs. Hoc genus, honori Ferd. Cortesii, herois illius intrepidi ac imperii Mexici debellatoris, dicatum, ad familiam Boraginaceam aut Sebastianam pertinere videtur et secundum auctorem generi *Rocheportiae*. Sw. affine est.

563. EUPAREA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-12-petala. *Bacca* exsacca polysperma.

1. *amoena*. Gaert. sem. 1. p. 230. t. 50. f. 5. Willd. Sp. 2. p. 1183. Lam. ill. t. 133. Hab. in Nov. Holland. Procumbens, facie Nummulariæ. Flor. colore Anagallidis phoeniceæ. Caps. Tricentali proxima. Gaert.

564. ÆGICERAS. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Caps.* arcuata, unilocularis, univalvis, monosperma.

1. *majus*, fol. ellipticis acutis venosis, caps. cylindraceis arcuatis. Willd. Sp. 2. p. 1183. Gaert. sem. 1. p. 216. t. 46. f. 1. Rhizophora corniculata. Lin. Mangium fruticosum corniculatum. Rumph. 3. t. 77. Hab. in Moluccis. h

2. *minus*, fol. ellipticis obtusis subvenosis, caps. acinaciformib. Willd. Gaert. l. c. t. 46. f. 1. Rumph. 3. t. 82. Hab. in Moluccis. h

565. BILLARDIERA. *Petala* quinque. foliolis calycinis alternis. *Nectar.* nullum. *Stigma* simplex. *Bacca* supera polysperma.

1. *scandens*, pedunc. solitar. unifloris, fol. subhirsutis. Smith. N. Holl. 1. p. 1. t. 1. Hab. in N. Holland. h

566. MANGIFERA. *Cor.* 5-petala. *Drupa* reniformis.

1. *indica*, fol. oblongo-lanceolatis, flor. submonandris, drupa maxima reniformi. Lam. enc. 3. p. 667. Willd. Spec. 2. p. 1150. Jacq. coll. 4. p. 56. Icon. rar. v. 2. t. 337. Rumph. 1. t. 25. Alced. 4. t. 1. 2. Hab. in Ind. h

2. *taxiflora*, fol. ovato-lanceolatis subsessilibus, flor. pentandris, drupa ovata subrotunda. Hab. in ins. Mauritiis. h

3. *axillaris*, fol. ovato-oblongis obtusiusculis, panic. axillaribus, flor. decandris. Lam. l. c. Hab. in Ind. h

567. HIRTELLA. *Pet.* 5. *Filam.* longissima perspersa, spira-

lia. *Bacca* 1-sperma. *Stylus* lateralis. (Stam. 3 et 5.)

1. *americana*, racemis simplicib. axillarib. solitariis, pedunc. communi villosis, flor. pentandris, fol. oblongis acuminatis. Willd. Sp. 2. p. 1151. Sw. obs. 94. Aubl. t. 98. Hab. in Brasilia, Gujan. et Cajenn. h

2. *peruviana*, fol. oblongis acuminatis, racemis compositis pubescentibus, floribus triandris. H. *racemosa*. Flor. Peruv. 3. p. 5. t. 227. f. b. Cosmibuena prodr. Flor. Per. p. 10. t. 2. In Chinchoa nemorib. Drup. cuneiformis subplicata parum recurvata, hirsuta, 1-sperma. Styl. basi germinis. h

3. *triandra*, racemis compositis terminalibus solitariis, pedunc. communi pubescente, flor. triandris, fol. oblongis acuminatis. Willd. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 508. H. *americana*. Jacq. amer. p. 8. t. 8. Hab. in sylvia Jamaicae, Hispaniolae, Martinicae ad latera torrentium. h

4. *paniculata*, racemis compositis terminalibus aggregatis, pedunc. communi hirsuto, flor. pentandris, fol. ovalib. acutis. Willd. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 510. Hab. in Cajenna. h

5. *rugosa*, fol. ovato-acuminatis subnubilato-rugosis, pedunc. villosissimis, flor. fasciculatis. Hab. in Portorico. In specimine, communione a Dom. Thuillier, fol. aut superne vidda, inferne sparsim et ad nervos pilosa. Stam. 3. h

568. WALKERA. *Cal.* 5-partitus inferus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* 5. mono-sperma. *Nucis* reniformes.

1. *serrata*. Willd. Spec. p. 1145. Meesia serrata. Gaertn. acm. 1. p. 344. t. 70. f. 6. In Ind. orient. Fol. alterna. Corymbi terminales. Flor. parvi flavescentes. Willd. h

569. BARRERIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* rotata: laciniis scrobiculatis. *Filam.* dilatata. *Anth.* tetragonae, marginatae, marginibus coherentibus. *Fructus*...

1. *theobromaefolia*. Willd. Spec. 2. p. 1145. Paraquiba gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 123. t. 47. Lam. ill. t. 134. Hab. in sylvia prope flumen Sinemari Gujanae. Arbor 50-pedalis. Fol. alterna. Spica axillaris. h

570. GALAX. *Cor.* hypocrateriformis. *Cal.* 10-phyllus. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, elastica.

1. *aphylla*. Lin. excl. Synon. Gron. Virg.

Viticella. Mitch. gen. 24. Habit. in Virginia. h

571. LASIOPE TALUM. *Perianthium* 3-phyllum, (tomentosum) persistens. *Cor.* rotata, hispida (lanuginosa Andr.): laciniis ovatis incurvatis. *Antherae* bilobae, apice poris 2. *Caps.* auper a, 3-locularis, 3-valvis, dissepimento medio valvularum. Smith.

1. *ferrugineum*, fol. lineari-lanceolatis obtusis inaequaliter sinuatis, subtus lanuginosis, flor. racemosis axillarib. Andrew. t. 208. Smith. in Act. Soc. Lin. 4. p. 217. Hab. in N. Holl. ad portum Jackson, in paludosis. Plant. viminea, ramis extensis, tomento ferrugineo, fol. superficie excepta, undique tecta.

Obs. Quamvis in systemate artificiali forte indifferens videtur, quemnam locum planta quaedam occupet, tamen hoc (et sequens genus?) ob affinitatem inter plantas ericoideae, p. 174. (ubi ex improvisis omissum) collocandum est.

572. CRYPTANDRA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* tubulosa, limbo 5-fido: squamis 5, cucullatis inter segmenta. *Stam.* fauci inserta sub singulis squamis. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* supera, 3-valvis, 3-locularis e valvulis inflexis. *Sem.* solitaria compressa.

1. *australis*. Fruticulus ericoideus, fol. fasciculatis, florib. capitiatis extus aetosis. Smith. in Act. Soc. Lin. vol. 4. Hab. in Australia.

573. VENTILAGO. *Cal.* tubulosus. *Cor.* squamae stant. munientes, cal. inserta. *Caps.* supera, sphaerica, ala longissima terminata. *Sem.* solitarium.

1. *madraspatana*, scandens, fol. ovatis integerrimis glabris. Willd. in Nov. Act. Berol. v. 2. Fj. Sp. 2. p. 1106. Gaertn. 1. p. 213. t. 49. Roxb. Corom. 1. p. 55. t. 26. Rumph. 5. t. 2. In Indiae montosis et maritimis. h

2. *denticulata*, fol. ovatis erenatis pubescentib. Willd. in N. Act. Berol. 2. Hab. in Ind. prope Samulcotta. Genus e Malpighia familia videtur.

574. ERYCIBE. *Cal.* 5-dentatus,



inferus. Cor. 1-petala decemlobata. Styl. o. Stigma 5-sulcatum. Bacca 1-sperma.

1. *paniculata*, Roxb. Corom. t. 2. ic. Hab. in sylvis Coromandeliae montosis. Frutex scandens, junior fuliginoso-pulverulentus.

575. RIBES. Petala 5 et Stamina calyci inserta. Stylus 2-fidus. Bacca polysperma, infera.

\* RIBESIA. *Inermia*, for. racemosit.

1. *rubrum*, inermis, racemis glabris nuntantibus, flor. planis (petal. obcordatis), fol. obtuse quinquelobis, caule erecto. Willd. Sp. 2. p. 1153. Smith brit. 1. p. 263. Flor. dan. t. 667. Var. fructib. albis. Flor. lutescentes. Hab. sponte in Suecia et Anglia borealibus. h

2. *petraeum*, inermis, racemis pilosiusculis erectis, flor. planiusculis (petalis obtusis) rufis, fol. acuminato-lobatis inciso-dentatis, caule erecto. Willd. Smith. l. c. R. racemis florentib. erectis, fructescens pendul. Jacq. ic. 1. t. 49. Misc. 2. p. 36. Hab. in alpib. Carinthiacis, Syriacis, et in Silesia, Bohemia, etiam in Angliae montosis. h

3. *spicatum*, inermis, spicis erectis, petalis oblongis, bract. flore breviorib. Smith. l. c. p. 264. Robson. in Trans. of Linn. Soc. 3. p. 240. t. 21. Hab. in sylvis Angl. boreal. Fol. R. rubri, subtus magis tomentosa. Baccae R. rubri. An prioris var.? h

4. *trifidum*, inermis, fol. glabriusculis, racem. pubescentibus, flor. parvis petalis (purpureis) spatulatis, baccis hirsutis, cal. lacini. subtrifidis. Michaux, Flor. 1. p. 110. Hab. juxta Quebec et sinum Hudsonis.

5. *rigens*, inermis, racem. erectis, fol. reticulato-rugosis, subtus pubescentibus, racemis (etiam fructiferis) rigescentibus erectis, bacc. hispulis. Michaux, l. c. Hab. in Canada, ad amnem Mistassin.

6. *procumbens*, inermis, racem. erectis, flor. planiusculis, fol. obtuse lobatis, caule procumbente. Willd. p. 1154. Pall. ross. 2. p. 35. t. 65. Hab. in Davuriae muscicis umbris paludosis. h

7. *prostratum*, inermis, ramis reclinatoriis, racem. suberectis, bacc. hispulis. Lam. enc. 3. p. 48. L'Her. Stirp. 1. t. 2. R. glandulosum. Ait. Willd. p. 1154. Hab. in Amer. boreal. inc. Newfoundland. h

8. *alpinum*, inermis, racemis erectis, bracteis flore longioribus, fol. subtus laci-

dis. Flor. Dan. t. 668. Jacq. austr. t. 27. Hab. in montosis et subalpinis. Polygamia dioica. Bacc. insipidae.

9. *fragrans*, inermis, racemis erectis, cor. campanulatis, fol. obtuse trilobis, caule adscendente. Willd. p. 1155. Pall. Nov. Act. Acad. Petrop. 10. p. 377. t. 9. Hab. in Sibiria in montibus Mongoliae finitimis altioribus. Baccae rubicundae, suavisissimi saporis. h

10. *triste*, inermis, racem. pendulis, cor. planiusculis, fol. quinquelobis. Willd. Pall. in N. Act. Acad. Petrop. 10. p. 378. Hab. in Sibiria circa summa montium cacumina Jugi Jablennoi et in altioribus montibus Mongoliae finitimis. Bacc. parvae nigrae insipidae, scentes succo atro-rubro, ad tingenda vina praestantissima. Pall. l. c. h

11. *macrobotrys*, inermis, racemis longissimis pendulis hirsutis, fol. cordatis lobatis inciso-serratis, petiol. basi ciliatis. Fl. Peruv. 3. p. 12. t. 207. Hab. in Peruviae Andium nemorib. Fol. vitis viniferae habitu. Bacc. hirsuta, viridis.

12. *albifolium*, inermis, racemis fol. duplo longioribus, pendul. fol. subcordatis trilobis inciso-serratis petiol. ciliatis. Flor. Peruv. l. c. f. b. Hab. in nemorib. Munna locis frigidis. Flor. purpureascentes.

13. *punctatum*, inermis, racemis pendulis brevibus, fol. trilobis serratis subtus punctatis. Flor. Peruv. t. 233. f. a. In Chile collib. Bacc. rubra, punctata.

14. *albinervium*, inermis, fol. abbreviat. acute lobatis glabriusculis: nervis albidis, racem. recurvatis. Michaux. Hab. in Canada, ad amnem Mistassin. Baccae glabrae, rubrae. h

15. *recurvatum*, inermis, ramis recurvatis, fol. latiusculis acute lobatis pubescentibus glanduloso punctatis, racemis reflexis, tubulatis glabris (baccis nigris). Michaux, Flor. p. 110. Hab. ad ripas Latorum juxta sinum Hudsonis.

16. *nigrum*, inermis, fol. subtus punctatis, racem. laxis, flor. campanulatis, bract. pedicellis breviorib. Lam. enc. 3. p. 295. Fl. dan. t. 556. Hab. ad ripas fluvior. et sepea Graveolens. h

17. *pensylvanicum*, inermis, fol. utrinque punctatis, flor. racemosis subcylindricis, bract. pedicellis longiorib. Lam. l. c. R. floridum. Willd. p. 1156. Dill. elth. 324. t. 244. f. 315. Hab. in Pensylv. h

18. *glandulosum*, inermis, racem. brevibus, fol. coriace obtuse trilobis duplicato-serratis rugosis. Hab. in collib. sylva-

ticis Chile. Frutex biorgyalis glandulosus. Cal. glandulos., pubescens.

19. *viscosum*, inerme, racem. brevibus, fol. cordatis 5-lobis serratis asperis viscosis. Flor. Peruv. 3. p. 13. Habit. in Peruvine prærupis. Cal. flavus. Bacca dilute purpurea.

20. *cuneifolium*, inerme, pedunc. 2-3-floris, fol. cuneiformib., incisis. Habit. in Peruv. alpih. Fol. fasciculata. Bract. duae ad basin singuli floris. Habitus Grossulariae, fruct. magni. Flor. Per. l. c.

\* \* Grossularia, aculeata, pedunc. plerisque paucifloris, fruct. majusculis.

21. *Diacantha*, aculeis geminatis stipularibus, fol. cuneiformi-tripartitis dentatis, flor. racemosis. Willd. p. 1157. R. axillis hispidosis, racem. erectis, fol. cuneiformibus incis. Pall. ross. 2. p. 36. l. 66. Itin. 3. app. n°. 79. t. 2. f. 2. Habit. in glareosis saxosis, locisque salis Davuriae. Media inter Grossularias et Ribesias. Nonnunquam aculei desunt. h

22. *saxatile*, aculeis sparsis, fol. cuneiformib. obtuse trilobis, racem. erectis. Willd. Pall. Nov. Act. Acad. Petrop. 10. p. 376. Habit. in Sibiria in montib. graniosis Songariae. Species media inter R. alpinum et R. Diacantham, habitu Grossulariae, fructu Ribesii. h

23. *rotundifolium*, spina subaxillari, fol. suborbiculatis : lobis subrotundo-obtusis, pedunc. 1-floris, limbo calyc. tubuloso, bac. glabra. Michaux. p. 121. Hab. in Carol. montib. excelis.

24. *hirtellum*, spinula subaxillari, ram. subhispidis, fol. parvis semitrididis : lobis subdentatis, pedunc. 1-floris, bac. glabra rubra. Michaux. In Amer. boreal. saxosis, ad amnem Sagney. h

25. *gracile*, spina subaxillari, fol. petiol. gracilibus utrinque pubescentibus : lobis acutis dentato-incisis, pedunc. capillarib. subbifloris, cal. tubulato - campanulatis glabris. Michaux. l. c. Habit. in montib. Tennessee.

26. *reclinatum*, ramis subaculeatis reclinatoriis, pedunc. bractea triphylla. Linn. Hab. in Germania, Helvetia. h

27. *Grossularia*, ramis aculeatis, petiol. pilosis, bract. 2-phylla, bac. hirsutis (aut glabris). Linn. vid. Smith. brit. 1. p. 266. Hab. in Europ. sylvis et scopulis. Pill in fructu capitati. h

28. *Uva crispa*, ramis aculeatis, bac. glabris, pedicellis bract. monophylla. Hab. in Eur. boreali. Var. prioris? h

29. *oxyanthoides*, aculeis majoribus et subsolitariis ad gemmas, minoribus undique sparsis, bac. glabris subgeminis. Lamenc. 3. p. 51. Dill. elth. t. 139. l. 166. Habit. in Canada.

30. *lucustris*. R. oxyanthoides? spina subaxillari multiplici, caul. undique hispidulo, fol. ultra medium lobatis, petiol. villosis, bac. racemosis hispidis. Michaux, p. 111. Hab. ad lacus Mistassins.

31. *Cynosbati*, aculeis a passim sub gemmis, fol. molliter pubescentibus, racem. nutant-paucifloris, fol. erecto-campulatis, bac. aculeatis. Mich. l. c. Jacq. hort. 2. t. 123. Hab. in Canada. h

576. *HERERA. Petala 5, oblonga. Bacca 5-sperma, calyce cincta.*

1. *Helix*, fol. tri-quinquelobis : floralib. ovatis, umbella erecta. Willd. Spec. 2. p. 1179. In Eur. arboribus, muris aut saxis reptante scandens. Flor. zero autumn. h

2. *pendula*, fol. ovato-lanceolatis integris, umbel. subcapitatis, pedunc. longissimis pendulis. Swartz. Flor. ind. occ. 1. p. 512. Hab. in aliis montibus Jamaicae. h

3. *nutans*, fol. ellipticis coriaceis, umbel. nutantibus hemisphaericis, pedunc. erectiusculis. Swartz. l. c. p. 514. Hab. in montib. caeruleis Jamaic. austr. h

4. *terebinthinacea*, fol. septenatis ellipticis integerrimis, racemo terminali, pedunc. umbellatis. Willd. Vahl. symb. 3. p. 42. Hab. in sylvis et nemorosis Zeylonae. h

Obs. Familiae *Caprifoliae* affne genus.

577. *VITIS. Petala apice calyptratim cohaerentia, emarcida. Bacca 5-sperma, supera.*

1. *vinifera*, fol. lobatis sinuatis nudis aut tomentosis. (s. Apyrena, s. Corinthiaca. Bauh. hist. 2. p. 72. Ubicunque fere colitur. Var. bac. rubris, cui fol. tomentosa sunt. h

2. *palmata*, fol. palmatis glabris, lacini. incisis, umbel. racemosis. Vahl. symb. 3. p. 42. Hab. in Virginia. h

3. *indica*, fol. cordatis dentatis subtus villosis, cirrhis racemiferis. Linn. Sylvestris, sarmentis laete repentibus, uvis mi-

norib. nigris. Brown. jam. 178. Sloan. hist. a. t. 110. l. 4. Pluck. phyt. 249. f. 1. Hab. in Ind. utraque. h

4. *flexuosa*, fol. cordatis dentatis, subtus villosis, caul. flexuoso, panic. clouatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 332. Hab. in Japonia. h

5. *labrusca*, fol. cordatis subtrilobis dentatis subtus tomentosis. Lin. Plom. sp. 18. l. c. 259. f. 1. Hab. in Americis septentrionali. h

6. *vulpina*, fol. cordatis dentato-serratis utrinque nudis. Sp. Hab. in Virgin. h

7. *heterophylla*, fol. simplicib. incisotrilobis quinquelobisque serratis nudis. Th. jap. 101. Hab. in Japon. h

8. *laciniosa*, fol. quinatis : foliol. multifidis. Hab. .... Fol. parva eleganter incisa. h

9. *heptaphylla*, caul. scandente, fol. arptenatis ovatis integerrim. Hab. in Ind. orient. Similis *V. hederaceae*. Spicae simplices, subtomentosae : flor. verticillatis. Petal. apice cohaerentia. Siam. 5. h

10. *pinnata*, fol. pinnatis dentato-serratis glabris. Vahl. symb. 3. p. 43. Hab. ... Pedicelli umbellati. V. Rami purpurascetes. h

578. RORIDULA. *Cal.* 5-phyllum. *Petal.* 5. *Anther.* basi scrotiformes, apice poro 2 deliscentes. *Styl.* 1. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis.

1. *dentata* (verticillata). Lin. Lam. ill. t. 141. Irion verticillatum. Burman. Drosera Roridula. Thunb. Hab. ad Cap. bon. spci. Tota planta ut Drosera pilis glandulosissimis viscida. Fol. in caule suffruticoso verticillatim congesta, linearia, ciliata.

579. LAGOECIA. Umbella simplex. *Invol.* universale sub-8-phyllum; *partiale* 4-phyllum, capillaceo-pinnatum. *Cal.* superus 5-fidus : lacinis capillaceo-multifidis. *Petal.* 2-fida. *Sem.* 1, cal. coronatum.

1. *cuminoides*. Linn. Willd. p. 1184. Lam. ill. t. 142. Cuminum sylvestre, capitul. globosis. C. Bauh. Habit. in Graecia.

580. CLAYTONIA. *Cal.* 2-valvis.

*Cor.* 5-petala. *Stigma* 3-fidum. *Caps.* 3-valvis, 1-locularis, 3-sperma.

1. *virginica*, fol. lineari-lanceolatis, petal. integris. Ait. Kew. 1. p. 284. Willd. Sp. 2. p. 1185. Fol. linearibus, calycibus obtusis. Aiton. Pluck. alm. 272. t. 102. f. 3. Fol. lanceolatis, calycibus acutiusculis. Ait. Hab. in Virgin. sylvar. humidis et Nov. Angliae. Flor. albi, rubro-lineati. Lin. Fol. praelongo-linearis; flor. albedo-rosce. Michaux.

2. *caroliniana*, fol. brevi-ovalibus, in petiolum abrupte angustatis, flor. roseis. Michaux, Flor. 1. p. 2160. Hab. in montib. Carolin. Martio.

3. *sibirica*, fol. nervosis, radicalibus caulinisque ovatis, racemo secundo, petal. bifidis. Willd. p. 1186. Hab. in Sibir. Scap. declinatus. Fol. caulinis duobus oppositis, intraque Racemi duo. Flor. rubri. L.

4. *perfoliata*, fol. nerviis, radicalib. rhombico-ovatis, caulinis subconnatis, flor. umbellato-verticillatis, petalis integris. Willd. l. c. Down. ind. horti. cantab. p. 25. Hab. in Amer. bor. Fl. albi. C

581. SAUVAGESIA. *Cor.* 5-petala, fimbriata. *Cal.* 5-phyllum. *Nect.* 5-phyllum, cum petalis alternans. *Caps.* 3-locularis, 3-sulca, 3-valvis : valvis marginibus introflexis. (Stipula pennato-ciliata.)

1. *erecta*, caul. ramosissimo procumbente erectoque, fol. lanceolato-serrulatis lineatis, flor. subternis erectis. Flor. Per. 1. p. 11. Willd. Sp. 2. p. 1185. Jacq. amer. t. 51. f. 3. Ed. picta. t. 77. Hab. in Amer. Nectar. duplex : exterius pilis plurimis rubris, orbiculatum positus (Stam. sterilia ?) Interius foliolis 5. linearibus, petal. alternantib. distinctum. Fl. Per. l. c.

2. *nutans*, flor. nutantibus, nectarlo staminib. majore. Hab. in ins. Madagascar. Aubert.

*Obs.* Cum Viola familiam naturalem effecere videtur.

582. VIOLA. *Cal.* 5-phyllum. *Cor.* 5-petala, irregularis, postice cornuta (ant ecalcerata). *Anth.* apice membranula cohaerentes,

aut distinctæ. Caps. supera, 3-valvis, 1-locularis.

\* *Acaules.*

† *Viola*. Cor. calcarata. Anth. coherentes.

1. *palmata*, acaulis pubescens, fol. palmatis quinquelobis, lobis dentatis indivisib. Linn. Willd. Sp. p. 1159. Pluck. amalth. 129. t. 447. f. 1. Fol. nonnulla indivisa, reniformi-cordata. Michaux. Hab. in Virginia.  $\overline{\text{L}}$

2. *pedata*, acaulis, fol. pedatis septem-partitis: lacini linearilanceolatis integris. Michaux. Flor. 2. p. 151. Andrew. t. 153. Pluck. alm. 188. t. 114. f. 7. Hab. in Virginia. Fol. lacini dentatis. Willd.  $\overline{\text{L}}$

3. *pinnata*, acaulis, fol. multifidis, lacini lobatis. Willd. p. 1160. Gmel. sib. 4. p. 101. t. 40. f. 4. V. acaulis, fol. palmato-multifidis et laciniatis. Misc. tour. 3. p. 181. t. 5. f. 2. Hab. in Siberia et alpb. Europ.  $\overline{\text{L}}$

4. *sagittata*, acaulis, fol. oblongis acutis cordato-sagittatis serratis basi incis, flor. inversis. Ait. Kew. 3. p. 287. Hab. in Pensylv.  $\overline{\text{L}}$

5. *lanceolata*, acaulis, fol. lanceolatis crenatis. Gmel. sib. 4. p. 99. t. 49. f. 2. Hab. in Canada, Carolina, Siberia. Flor. albid.

6. *rotundifolia*, acaulis, fol. orbiculato-cordatis: sinu clauso subdentatis, petiolo pubescente, cal. obtuso. Michaux 2. p. 150. In Carol. montibus excelsis. Flor. lavi.

7. *obliqua*, acaulis, fol. cordatis acut. subplanis glabris, flor. erectis, petal. oblique flexis. Ait. l. c. Hab. in Pennsylvania, Virgin. Petala oblongo-ovata straminea, basi caerulea.

8. *cucullata*, acaulis, fol. cordatis acutiusculis glabris serratis basi cucullatis, flor. inversis, petal. oblique flexis. Ait. l. c. Andrew. Hab. in Amer. bor. Petal. oblonga caerulea: superum, infra medium albidum, venis violaceis, lateralia longiora, infra medium albidia barbata. Ait.  $\overline{\text{L}}$

9. *primulifolia*, acaulis, fol. oblongis subcordatis: petiol. membranaceis. Linn. Habit. in Siberia, Virginia. Fol. obtusissim, crenata, basi decurrentia per petiolum, ut in Prim. officinali. L.  $\overline{\text{L}}$

10. *philippica*, acaulis, fol. ovato-oblongis obtusis crenulatis petiolo longiori-

Lus, scap. 1-floris libracteatis. Cav. ic. 6. p. 19. t. 529. f. 2. Hab. in ins. Lugon.

11. *magellanica*, acaul., fol. reniformib. repandis villosis. Willd. Forster in Comment. Soc. Goett. 6. p. 41. t. 8. Habit. in Tierra del Fuego, locis uliginosis. Fl. amplius luteus, venis spadiceis.  $\overline{\text{L}}$

12. *hirta*, acaul., fol. cordatis acutis piloso-hispidis, stolonib. subnullis. Fl. dan. t. 618. Hab. in nemorib. Vere. Cor. majuscula dilute caerulea.

13. *palustris*, acaul., fol. reniformib. L. Fl. dan. t. 83. Allion. t. 2. f. 2. Moris. hist. 2. v. 5. t. 35. l. 5. Hab. in Europ. frigidiorib. et montosis turfosis humilib. Fol. subconvoluta. Fl. venos, diluti.  $\overline{\text{L}}$

14. *odorata*, acaul., fol. cordatis, stolonib. reptantib. Linn. Fl. dan. t. 309. f. V. martia alba. Bauh. pin. 199. Hab. in Eur. nemorib. et ad sepes. Fl. primo vere.  $\overline{\text{L}}$

\*\* *Caulscentes.*

15. *canina*, caul. adulescente adscendente canaliculato, fol. oblongo-cordatis, cal. acut. Roth. germ. I. II. p. 269. Hab. in apricis sylvis. Flor. per aestatem saepe apetalis. Roth.  $\overline{\text{L}}$

16. *montana*, caul. erectus, fol. cordat. oblongis. Linn. V. caul. lato, erecto, fol. ellipticis, crenatis, stipulis semipinnatis. Hall. helv. n.º 567. Moris. hist. 2. p. 475. s. 5. t. 7. f. 7.  $\beta$  *Persicifolia*, caul. erecto, fol. ovato-lanceolatis serratis, Roth. germ. II. p. 271. Hab. in alpb. Lapponiae, Austriae, Germaniae, Baldo.  $\overline{\text{L}}$

17. *lactea*, caul. adscendente tereti, fol. ovato-lanceolatis, stipul. inciso-serratis. Smith. Flor. brit. t. p. 247. Hab. in Angl. ericetis montosis. Fl. albedo-caerulei.  $\overline{\text{L}}$

18. *nummularifolia*, fol. subrotundis orbiter crenatis, stipul. lanceolatis serratis, caul. brevissimo bifloro. Vill. Dauph. 2. p. 663. Allion. ped. n.º 1640. t. 9. f. 4. Ejusd. Sp. t. 2. f. 2. Bocch. Mus. 2. t. 127. Habit. in alpb. Delphinatus et Pedenontanis.  $\overline{\text{L}}$

19. *cenisia*, caul. filiformibus indivisis, procumbentibus, fol. ovatis petiolatis, basi margine ciliatis, stipul. indivisis. Willd. p. 1165. Allion. ped. n.º 1641. t. 22. f. 6. Hab. in Genesii alpinis Bonche dictis. Floa magnus, caeruleus: calcare petalis brevior.  $\overline{\text{L}}$

20. *canadensis*, caul. erecto teretiusculo, fol. cordatis acuminatis dentatis glabris, stipulis integris. Ait. Kew. 3. p. 290. Hab. in Canad. et Carol. montib. albis.  $\overline{\text{L}}$

21. *striata*, caul. erecto semitereti, fol. ovatis cordatis acutis serratis, stipulis lanceolatis serrato-ciliatis. Ait. l. c. Hab. in Amer. bor. ¶

22. *pubescens*, caul. erecto villosulo tereti hinc planiusculo, fol. cordatis pubescentibus, stipulis oblongis apice serrulatis. Ait. Cum priora. ¶

23. *pennsylvanica*, villosulo-pubescent, caul. apice folioso, fol. late cordatis, stipul. membranaceis ovatis, subserratis. Michx. Flor. 2. p. 249. Hab. in Pensylv. umbrosis, juxta rivulos. Flor. lutei.

24. *hastata*, glabriuscula, caul. simplicissimis sursum foliosis, fol. alternis hastatis subpetiolatis, stipulis minutis denticulatis. Michx. l. c. Hab. in Carolin. montib. Fl. lutei.

25. *debilis*, caulescens, fol. subcordatis denticulatis, flor. (albi) longe pedunculatis, stipulis lanceolatis sublaevibus. Mich. p. 150. Cresc. in montib. Alleghensis.

26. *mirabilis*, subacaulis, caul. triquetro, fol. reniformi-cordatis, flor. caulinis apetal. Lin. Jacq. austr. t. 19. V. florib. radicalib. corollis abortientibus, raulin. apetalis semiofferis. Lin. Hort. cliff. 407. V. montana laetifolia, flores e radice. Dill. elth. 408. t. 303. f. 350. Hab. in Germaniae, Sueviae, nemorib. montosis. Cor. majuscula caerulea. ¶

27. *biflora*, caul. bifloro, fol. reniformibus serratis. Flor. dan. t. 46. V. alpina rotundifolia lutea. Bauh. pin. 199. Pluck. alm. t. 234. f. 5. Hab. in alpid. Fl. parvi, lutei. ¶

28. *uniflora*, caul. unifloro, fol. cordatis dentatis. Gmel. sib. 4. p. 101. t. 48. f. 5. Hab. in Siberia. ¶

29. *decumbens*, caulescens procumbens, fol. linearibus confertis, stipulis subulatis. Thunb. prod. 41. Hab. ad Cap. b. spri. Stipulae minutae subulatae acutae. Cor. caerulea. ¶

30. *tricolor*, caul. angulato glabro diffuso, fol. oblongis incisis, stipulis pinnatifidis. Lin. Hab. in cultis et sylvaticis. Cor. obscure violacea. Lab. inferius colore dilatiore basi macula flava. Cal. major. ☉

31. *bicolor*, erecta, cal. stipulisque ciliatis. Hoffm. grm. 2. p. 170. in Hercyn. Cor. caerulea.

32. *arvensis*, caul. angulato sulcato, fol. ovato-lanceolatis serratis, stipul. basi

incisis, cal. pubescente cor. sublongiore. V. bicolor. arvensis. Bauh. pin. R. 4b. germ. 2. p. 273. Hab. in agris et cultis. Petal. alba; infimum flavo-maculatum. ☉

33. *rothomagensis* (pilosa), diffusa hirta, fol. oblonge petiolatis subcordato-ovatis crenatis, bract. pinnatifidis; lacinia ultima majore subovato. Thunb. par. p. 454. Hab. in montosis prope Rouen Gallorum. Flor. pallide caerulei. V. tricolori similis sed diffusa debilior et undique pilosa. ¶

34. *lutea*, caul. triquetro simplici, fol. ovato-oblongis crenatis ciliatis, stipul. palmato-incisis. Smith. brit. p. 238. Hab. in Angliae pascuis montosis. Flor. lutei, nigro-radiati, rarius caeruleo-cretae. S. T. ¶

35. *grandiflora*, caul. triquetro simplici, fol. oblongiusculis, stipul. pinnatifidis. L. V. fol. imis subrotundis, raulin. ellipticis. Hall. helv. n°. 566. t. 17. V. montana lutea grandiflora. Bauh. Barr. ic. 692. Hab. in alpid. Helveticis, Pyrenaeis. Caul. ramosus, foliosus. Fl. maximus, flavus. ¶

36. *Zoyzii*, caul. brevissimo erecto, fol. subrotundis crenatis, stipul. integerrimis, pedunc. triquetris. Willd. V. oraulis, scapo subtriquetro striato unifloro, flore maximo nutante flavo, calcaribus subulato caeruleo petalis subaequali. Host. in Jacq. Coll. 4. p. 279. t. 11. f. 1. Barr. ic. 691. Halit. in alpid. Carinth. Similis V. grandiflorae. ¶

37. *pumila*, fol. ovato-ellipticis crenatis, glabris, stipul. serratis, caul. erecto. Vill. dauph. 2. p. 666. V. valderia. Allioni n°. 1644. t. 24. f. 32. Cresc. in monte Corrie in Delphin. ¶

38. *calcarata*, caul. abbreviato, fol. subrotundo-cordatis crenatis, stipul. subrotundis dentatis, nectariis calyce longioribus. Willd. V. alpina purpurea, exiguis fol. Bauh. pin. 199. Hab. in Pyrenaeis, Helveticis alpidibus. Caul. subnullus. Petal. subrotunda.

39. *cornuta*, caul. elongato, fol. ovatis subcordatis margine ciliatis, stipul. oblongis pinnatifidis, nect. subulatis cor. longioribus. Willd. Hab. in Pyrenaeis. Caul. longus, petala oblonga. Priori opposita.

40. *maculata*, caulescens, fol. ovatis crenatis rubus maculatis, pedunc. axillaribus solitar. fol. longiorib. Cav. ic. 6. p. 20. t. 330. Hab. in ins. Machvianis. Cor. patens lutea; petal. majus rubro-lineatum.

41. *rubella*, fruticosa, fol. ovato-acutis oblongis punctatis serratis, pedunc. solitariis axillaribus, fol. subaequalibus. Cav. l. c.

t. 531. f. 1. Hab. in St. Carlos de Chilas. Cor. rubella.  $\eta$

41. *capillaris*, fruticosa, fol. ovato-serratis serratis: basi inaequali, pedunc. axillaribus solitariis fol. longiorib. Cav. l. c. p. 21. t. 531. f. 2. Cresc. in Talehuano vicinis. Stipul. lanceolatae, serraturis capillaribus, internodiis saepe longiores. G. A. V. stipulari Sw. diversa.

42. *capensis*, suffruticosa, caul. erecto, fol. obovatis serratis. Hab. ad Cap. bon. spei.  $\eta$

43. *arborescens*, caul. fruticoso, fol. lanceolatis integerrimis. V. Hispania fruticosa longifolia. Tournef. inat. 421. Barr. t. 568. Hab. in Hispan.  $\eta$

\*\*\* *Floribus erectis, nec resupinatis.*

44. *stipularis*, caul. simplici repente, fol. ovato-lanceolatis crenatis glabris, stipulis ciliatis, pedunc. solitariis terminalib. Swartz. prod. 117. Habit. in Ind. occident. St. Christophoro.  $\eta$

45. *suffruticosa*, caul. procumbente, fol. lanceolatis subserratis confertis, cal. postice aequalibus. Hab. in Ind.  $\eta$

46. *oppositifolia*, caul. suffruticoso, fol. oppositis, flor. racemosis. Lin. Habit. in Cumana.  $\eta$

47. *Hybanthus*, arborescens scandens, aculeata, fol. oblongisobtusis glabr. Aubl. guj. 2. p. 811, t. 319. Hybanthus. Jacq. amer. 77. T. 175. f. 24. 25. Ed. pict. t. 260. Hab. in America meridion. Pedunc. multiflori.  $\eta$

*Obs.* Species hujus subdivisionis accuratius inquirendae, numme generi Ioniae s. Ionidio. Vent. (ut subgeneri hinc ad interium proposito) interii potius debeant. V. *diandra* dubia species.

†† *IONIA. Cal.* 5-phyllus: foliolis basi productis. Cor. subbilabiata: calcaro o. *Antherae* plerisque distinctae. *Stigma* simplex. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis: valv. medio seminisferis. (Ionidium. Vent. Jard. de Malmaison. p. 27.)

48. *Calceolaria*, hirsuta, fol. lanceolatis, petal. inferiorib. involutis. Ionidium. Vent. l. c. Willd. Sp. 2. p. 1172. Loefl. l. p. 284. Hab. in Amer. merid. et Cajen.

49. *glutinosa*, fol. alternis ovato-lanceolatis argute serratis. Vent. Hab. in Monte-Video.

50. *buxifolia*, fol. alternis obovat. integerrimis, margine revolutis. Vent. Hab. in ins. Madagasc. Juss.

51. *enneasperma*, caul. basi ramosisimo, fol. lanceolato-linearib. integerrimis. distantib. Lin. Burm. Zeyl. p. 195. t. 85. Rheed. g. t. 60. Hab. in Ind.  $\eta$

52. *stricta*, fol. oppositis lanceolatis integerrimis, stipulis brevissimis, pedunc. rectis, fol. breviorib. Vent. l. c. sub Ionidio. Hab. in St. Domingo.

53. *parviflora*, fol. ovatis serratis: inferioribus oppositis, superioribus alternis. Vent. Cav. ic. 6. p. 21. Habit. in America meridion.  $\eta$

54. *Ipecacuanha*, fol. ovalibus serratis glabris, petal. inferiore plano. Vent. sub Ionidio. V. fol. ovalib. margine subtusque pilosis. Lin. Pombalia. Vandell. fasc. pl. p. 7. t. 1. Hab. in Brasilia. Rad. Ipecacuanhae albae producere dicitur.  $\eta$

55. *verticillata*, fol. (verticillatis) oppositis lanceolatis integerrimis, stipul. petiolis longioribus, pedunc. cernuis longissimis. Ionidium Polygalae-folium. Vent. l. c. p. 27. t. 27. V. Viola verticillata. Orteg. Dec. pl. Soles verticillata. Sprengel in Schrad. Journ. bot. 2. 1800. p. 190. t. 6. Hab. in Amer. meridion.

583. *IMPATIENS. Cal.* 2-phyllus. Cor. 5-petala, irregularis, nectario cuneato. Anth. primo sub-cuneatae. Caps. supera, 5-valvis.

\* *Pedunculis unifloris.*

1. *bifida*, pedunc. unifloris solitar., fol. oblongis serratis, nectar. longissimis bifidis. Thunb. prod. 41. Willd. Sp. 2. p. 11. t. 73. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *chinensis*, pedunc. uniflor. solitariis, fol. oppositis ovatis, nectar. arcuatis. Lin. Hab. in China. Caul. ruber. Flos. purpureus.  $\odot$

3. *latifolia*, pedunc. uniflor. solitariis, fol. ovatis: serraturis lanceolatis, nectar. flore longiorib. Lin. Rheed. g. t. 48. Hab. in Ind.  $\odot$

4. *capensis*, pedunc. unifl. solitariis, fol. ovatis: crenis piliferis. Thunb. prod. 41. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *oppositifolia*, pedunc. unifloris aggregatis, fol. oppositis linearib. L. Rheed. g. t. 31. ? Hab. in Zeylon. arenosis.

6. *fasciculata*, pedunc. axillarib. uniflor. aggregatis, fol. oppositis lanceolatis. Lam.

Lam. enc. 1. p. 359. Rheol. g. t. 47. Hab. in Malab.

7. *cornuta*, pedunc. unifloris aggregatis, fol. lanceolatis, nectariis flore longioribus. Linn. Burm. zeyl. 41. t. 16. f. 1. Hab. in Zeylona. ☉

8. *Balsamina*, pedunc. unifloris aggregatis, fol. lanceolatis, superiorib. alternis, nectar. flore breviorib. Lin. Blackw. t. 581. Hab. sponte in Ind. Ubique colitur.

**\*\* Pedunculis multifloris.**

9. *biflora*, pedunc. bifloris, fol. ovatis serratis. Willd. 1. flor. fulvis maculis rubr. Walter. carol. 219. Hab. in Carolina. †

10. *triflora*, pedunc. solitariis trifloris, fol. lineari-lanceolatis, nectario arcuato flore longiore. Willd. Burm. zeylon. 41. t. 116. f. 2. Herm. par. 105. t. 105. Habite in Zeylonae paludosis.

11. *natans*, pedunc. trifloris solitariis, fol. lanceolatis, nectario brevissimo. Willd. Hab. in Ind. orient.

12. *Nolitangere* (palestris), pedunculis multiflor. solitariis, fol. ovatis, geniculis caulinis tumentib. Fl. dan. t. 588. p. Flor. fulvis, fol. minorib. argue dentatis. Mich. 2. p. 149. Habite in Europ. et Canad. nemoribus, locisque paludosis, humidis.

554. GRONOVIA, *Petala* 5 et *stamina* calyci campanulato inserta. *Bacca* sicca, monosperma, infera.

1. *scandens*. Linn. Jacq. ic. 2. t. 338. Coll. 3. p. 197. Hab. in Vera Cruce. Planta cucurbitacea. Caul. altissimus. Fol. urentia, pampinea. Lin. ¶

585. KUHNIA. Flos compositus. *Sem.* solitarium: pappo plumoso. *Recept.* nudum.

1. *Eupatorioides*, fol. lato-lanceolatis serratis, corymbis terminalib. Vent. Hort. Cels. p. 91. Linn. Fil. Dec. Pl. p. 21. t. 11. Gritonia. Gacrin. de sem. 2. p. 11. Habite in Pennsylvania.

2. *rosmarinifolia*, fol. lineari-lanceolatis integerrimis margine revolutis pedunc. terminalibus 1-floris. Vent. 1. c. Eupatorium caneens. Orteg. Dec. Pl. p. 34. Hab. in Ins. Cuba.

*Obs.* Genus e fam. plant. compositarum a corymbiferarum Juss. ob atheras *liberas* hac in classe obtinuit locum.

AMARANTHODEI (gen. 586-591). *Cal.* in hac familia persistens et saepe pericarpium vices dein gerit; in quibusdam squamis cinctus. *Cor.* 6. *Filam.* 5, nunc basi in urceolum connata (Genera talia potius hinc ad classem Monodelphiam amandanda), nunc libera, sculis aliis 5. (stam. sterilia quorundam) passim interjectis. *Styl.* simplex aut divis. *Cap.* 1-locularis, monosperma aut polysperma. *Fol.* plurimum integra, nunc alterna, nunc opposita, quibusdam stipulis distincta. *Flores* substantia sicca durabili gaudentes, capitati aut spicati, in genere *Amarantho* monoici in *Tresine* dioici sunt. Maxima *Amaranthorum* et *Caryophyllearum* officinas in perisperm. farinaceo; sed in his cor. polyptalis in illis nulla.

586. GOMPHRENA. *Cal.* 5-phyllus coloratus: exterior 3-phyllus: foliolis 2 conniventibus carinatis. *Petala* 5, rudia, villosa (Cor. potius 0?). *Nect.* cylindricum, 5-dentatum. *Cap.* circumscissa 1-sperma. *Stylus* semibifidus.

1. *globosa*, caule erecto, fol. ovato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunc. diphyllis. Linn. Willd. Sp. 2. p. 1321. Flor. globosis. Rumph. 5. p. 289. t. 100 f. 2. Rheede 10. t. 37. Hab. in Ind. Var. Capitulis rubris et argenteis. ☉

2. *perennis*, fol. lanceolatis, capitul. diphyllis, flos. perianthio proprio distinctis. Dill. elth. 24. t. 20. f. 22. Hab. in Bonaria. ¶

3. *hispida*, caule erecto, capitulis diphyllis, fol. crenatis. Rheed. mal. g. p. 141. t. 72. Hab. in Malabar. Flor. caeruleascentes.

4. *angustifolia*, fol. lineari-lanceolatis glabris, capitulis terminalib. oblongis subtriphyllis. Vahl. symb. 3. p. 45. In India orient. Habitus Gomphrenae, diversa tantum stylo unico. Vahl.

5. *vermicularis*, caul. repentibus, fol. subteretibus carnosiss., capitulis solitariis terminalibus oblongis. Swartz. obs. p. 107. Illecebrum *vermiculatum*. Linn. Herm. paradi. 15. t. 15. Pluck. alm. 2. t. 75. f. 9. Hab. in arenosis maritimis Americae calidioris. ¶

6. *brasiliensis*, caule erecto, fol. ovato-oblongis, capitulis pedunculatis globosis

aphyllis. Lin. Jacq. ic. rar. 2. t. 346. Coll. 2. p. 278. Hab. in Brasilia.  $\text{h}$

7. *serrata*, caule erecto brachiato, capitulis solitariis terminalibus sessilibus, calyce serratis. Linn. Sp. pl. 336. Habit. in Amer. An eadem ac *G. hispida*? vid. Lam. enc. 1. p. 120.

8. *interrupta*, caule erectiusculo, flor. spicatis sessilib. interruptis monogyn. Sw. obs. 108. L'Her. stirp. 1. p. 5. t. 3. Celosia procumbens. Jacq. ic. 1. p. t. 51. misc. 2. p. 344. Habit. in aridulis arenosis Jamaic. austr.  $\odot$

9. *flava*, pedunc. oppositis bifidis tricapitatis, capitulo intermedio sessili. Hort. cliff. 37. Hab. in Vera Cruce.

10. *arborescens*, arborescens, pilosa, subvolubilis. Lin. suppl. 173. Habit. in N. Granada. Bractee plures longitudine floris aggregati. Corollula cylindrica longitudine calycis. A. congeneribus valde diversa, tamen genuina. Lin.  $\text{h}$

587. *ACHYRANTHES*. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Squamulae 5, basi in tubum connatae, apice fimbriatae stam. alternae. Stigma 2-fidum. Sem. solitarium, cal. foliolis conniventibus obtectum. (Stipulae o.)

\* *Foliis oppositis.*

1. *argentea*, fol. subrotundo-ovatis acuminatis, subtus argenteis, calycib. reflexis apicem adpressis. Willd. Spec. 2. p. 1191. Lam. encyc. 1. p. 539. Bocc. sic. 16. t. 9. Pluck. alm. 260. f. 2. Hab. in Sicilia et ad Cap. b. spet.  $\odot$

2. *aspera*, fol. obovatis acutiusculis, basi attenuatis, calyc. reflexis spicem adpressis. Willd. A. *obtusifolia*, caul. erecto, fol. ovato-cuneiformibus obtusis pubescentibus, cal. glabris. Lam. 1. c. enc. 1. p. 539. Burm. zeyl. 16. t. 5. f. 3. Pluck. alm. 26. t. 10. f. 4. Mill. dict. t. 11. f. 2. Hab. in Zeylone, Jamaica. Planta est diuretica et antidiysenterica.  $\text{h}$

\* *frutescens*, caul. erecto, fol. ovatis calycibusque glabris. Lam. 1. c. An Rumph. amb. 6. t. 12. f. 1? Hab. in India. Frutex 5-6-pedalis. Spicae longae.

3. *lappacea*, caule fruticoso diffuso, fol. glabris ovatis acuminatis basi attenuatis, spica interrupta, flosculis lateralibus utriusque fasciculo setarum uncinato. Willd. p. 1192. A. atropurpurea. Lam. encyc. 1.

p. 546.  $\beta$ ? A. *styracifolia*, caul. herbaeceo, spic. albidis. Lam. Burm. zeyl. 47. t. 18. f. 1. Pluck. alm. 93. t. 82. f. 2. Rheod. 10. t. 59. Hab. in Ind. Ad latera florum lateralium utrinque penicillis purpureis, e setis rigidis uncinatis.  $\text{h}$

4. *echinata*, caule erecto pubescente, fol. ovatis acutis basi attenuatis subtus pubescentibus, spica interrupta, flosc. lateralib. utrinq. fasciculo setarum uncinato. Willd. Retz. obs. 2. p. 12. Hab. in Ind.  $\text{h}$

5. *muricata*, caule fruticoso patulo, fol. alternis laevibus, floribus spicatis remotis ovatis, cal. squarrosis. Lin. A. *alternifolia*. Mant. 50. et 344. Hab. in Aegypto, Arabia. Ferie Celosiae. Pistil. stigmat. bifido. Semen 1, nudum, durum. Linn.

6. *patula*, caule fruticoso patulo pubescente, flor. spicis orbiculatis echinato-uncinatis, (bract. 2, calyciformibus patulis.) Lin. suppl. 160. Habit. in India orient.  $\text{h}$

7. *prostrata*, caul. prostratis fruticosis, spicis oblongis, flosc. linearis utrinque fasciculato setarum uncinato. Lin. Hab. in Ind. Spicae e dichotomis pedunculatae, virides, apice purpurascentes.  $\text{h}$

8. *Monsoniae*, caul. ramosis tomentosis, fol. verticillatis subulatis pungentibus, spic. ovato-cylindricis tomentosis terminalibus. A. *pungens*. Lam. enc. 1. p. 546. Illecebr. Monsoniae. Lin. fl. Pluck. Mant. 11. t. 334. f. 4. et t. 357. f. 4. Hab. in India.

9. *sanguinolenta*, caule ramoso, fol. oppositis petiolatis ovato-acutis, spic. terminalibus congestis. Lam. enc. 1. p. 546. Linn. Sp. 2. p. 294. Illecebrum. Linn. Willd. p. 1204. Rumph. 7. t. 27. f. 2. Fol. rubre. Pistill. purpureum.  $\text{h}$

10. *brachiata*, caule erecto herbaceo brachiato, fol. oppositis glabris lanceolato-ovatis, spic. tomentosis lateralibus. Lin. Mant. p. 50. Illecebr. Lin. Willd. p. 1203. Pluck. alm. 11. t. 334. f. 5. Habit. in Ind. orient.  $\odot$

11. *halimifolia*, caul. repentibus dichotomis ramosissimis, fol. obovatis carnosissimis, capitulis axillaribus. Lam. enc. 1. p. 547.  $\beta$ . Burm. amer. 1. 21. f. 2. Hab. in Peru prope Limam.  $\text{h}$ . in Antillis.  $\text{h}$

12. *sarmentosa*, fol. ovatis acuminatis alternis, spicis axillaribus, caule infruticoso. Vahl. symb. 2. p. 44. Habit. in Ind. orient.  $\text{h}$

13. *polygonoides*, caule decumbente



tetragono, fol. ovato-cordatis, spicis laxis laevib. Retz. obs. 2. p. 12. Digera arvensis. Forsk. descript. 65. Hab. in Arabia felici, India.

14. *altissima*, caule suffruticeo scandente, panic. terminalibus axillaribusque ramosis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 522. Sloan. hist. 2. p. 142. t. 91. f. 2. Hab. in sylvis montium Jam. An Celosia? h

15. *nivea*, fol. verticillatis ovatis tomentosis, corymb. compactis dichotomis, flor. corollatis. Ait. Kew. 1. p. 286. Hab. in Canariis. h

16. *stellata*, fol. senis linearibus pelucido-maculatis, flor. corymboso-dichotomis. Willd. Hab. in Guinea. Stipulae numerosae membranaceae albae diaphanae lanceolatae setula terminatae. W. h

17. *corymbosa*, fol. quaternis linearib. mucronatis pubescentibus, flor. corymboso-dichotomis. Willd. p. 1196. Syst. Veg. p. 204. Polia arenaria. Loureiro. fl. coch. p. 204. Boec. mus. 44. t. 39. Pluck. alm. 134. t. 86. f. 6. Hab. in Zeylona. Tr

18. *tenuifolia*, fol. oppositis linearibus subulatis subtus carinatis, flor. corymbosis. Willd. Hab. in Sierra Leona.

19. *dichotoma*, caul. suffruticosis, fol. oppositis linearibus planis acutis, cyma dichotoma. Lin. Hab. in Virginia. Similis A. corymbosae.

20. *ficoideum*, caul. repentibus glabris, fol. lanceolatis in petiolum attenuatis, capitul. axillaribus pubescentibus. nitidis. Illecebrum. Lin. Willd. p. 1208. Gomphrena. Lin. S. N. Jacq. amer. ed. pict. t. 90. Hab. in Amer. littoribus, et in Hisp.

♂ ? *sessile*, caul. repentib. bifarie tomentosis, fol. lanceolatis subsessilibus, capit. oblongis glabris. Lin. sub Illecebro. Alternanthera. Forsk. Pluck. alm. t. 133. f. 1. Rumph. 6. t. 15. f. 1. Rheed. 10. t. 9. In Ind. Caul. purpureus. Fol. in tenellis serrata. Lin.

\* \* *Fol. alternis.*

21. *alternifolia* (globosa), caul. erecto, fol. echinis subglobosis, capit. oppositifolia. Lin. suppl. p. 159. Pluck. alm. t. 260. f. 1. In Ind. orient. ☉

22. *javanica*, caul. erecto subsimplici incano, fol. alternis oblongis tomentosis, spic. numerosis terminalibus. Illecebrum javanicum. Lin. Willd. p. 1205. Achyranthes slopecuroides. Lam. encyc. 1. p. 548. Iresine javanica. Burm. ind. 1. 65. f. 2.

♂. *persica*, fol. obovatis panic. terminali, spic. simplicib. longissimis. Burm. 1. c. t. 65. f. 1. sub Iserine. *Aerva* tomentosa. Forsk. secundum. Vahl. symb. 2. p. 44. Habit. in India. Cal. hyalinus: carina viridi. h

23. *bengalensis*, caul. erecto herbaceo, fol. alternis oppositis lanceolatis pubescentibus. Lin. Mant. sub Illecebro. Lam. enc. 1. p. 549.

24. *lanata*, caul. diffusis suberectis, fol. alternis ovatis petiolatis spic. lateralibus tomentosis. Lam. enc. 1. p. 548. Illecebr. Act. Willd. Burm. zeyl. t. 26. f. 1. Rheed. 10. t. 29. Hab. in Ind. Caul. rigidus, subtenuis, perum villoruz. Var. fol. rotundis. Retz. obs. bot. 2. 13. ☉

25. *Amaranthoides*, caule fruticoso diffuso, fol. alternis ovato-acutis petiolatis laevibus, spic. filiformibus terminalibus, flor. remotis. Lam. enc. 1. p. 549. Rumph. amb. 5. t. 83. f. 2. Halit. in ins. Java et Molluccis. Stigm. 5. *Amaranthus frutescens*. H. P. et Dumont-Courret. Bot. Cultiv. 1. p. 648. Digera frutescens. Juss. h

26. *ciliata*, caul. herbaceo, fol. alternis ovato-acutis glabris, petiol. ciliatis, spicis axillaribus filiformibus solitariis, flor. remotis subaequalibus. Lam. 1. c. Hab. in Ind. orient. Flor. antecedenti et fol. amaranthis similis. Lam.

538. **CELOSIA.** Cal. 3-phyllus, corollae 5-petae facie. *Stam.* basi nectario plicato conjuncta. *Capr.* horizontaliter dehiscens. *Styl.* 2-3-fidus. (Fol. opposita.)

1. *argentea*, fol. lanceolatis, stipul. subfalcatis, pedunc. angulatis, spicis scarioris Lin. Willd. Sp. 2. p. 1197. Knorr. del. 1. t. 11. Rheed. 10. t. 38. et ♂. t. 39. Fol. linearib. Hab. in China. ☉

2. *albida*, foliis linearibus lanceolatis, caule exstipulato, spicis ovatis, bracteis longitudine corollae. Willd. G. pyramidalis. Burm. ind. 65. t. 25. f. 1. Habit. in Ind. orientali. ☉

3. *margaritacea*, fol. ovatis, stipulis falcatis, pedunc. angulatis, spicis 3-artosis. Lin. Rheed. 10. t. 38. H. b. in Malabar. Simillima G. argenteae. Stamina purpurea. ☉

4. *cristata*, fol. oblongo-ovatis, pedunc. teretibus subulatis, spicis oblongis. Lin. Lam. ill. t. 168. f. 1. Rumph. 5. t. 84. Hab. in Asia. Var. fol. angustis et latis, et flor. flavis ac rubris. ☉

5. *comosa*, spicis cylindricis comosis, fol. lanceolatis. Retz. obs. 6. p. 26. Hab. in India orient. Spicae superne steriles et asepis divisae, comosae evadunt e bracteis minutis imbricatis. Caps. operculata disperma. Retz.

6. *paniculata*, fol. ovato-oblongis, caul. assurgente paniculato, spicis alternis terminalibus remotis. Lin. Sloan. hist. 1. 1. gr. f. 1. Hab. in Jamaicae occidentalis saxosis aridis. Caulis prostratus. Stigma trifidum. ☉

7. *nitida*, fol. ovato-deltoidibus attenuatis, spicis terminalibus ramosis, flor. distinctis, caul. aëriticoso. Vahl. symb. 2. p. 44. Sloan. hist. 1. p. 142. t. gr. f. 5. Hab. in India occident.

8. *coccinea*, fol. ovatis strictis inauriculatis, caul. sulcato, spicis multiplicibus cristatis. Lin. Hab. in Ind. ☉

9. *castrensis*, fol. lanceolato-ovatis lineatis acuminatissimis, stipulis falcatis, spicis cristatis. Lin. Barr. rar. t. 1195. Bocc. mus. 1. 66. Hab. in Ind. ☉

10. *corymbosa*, fol. linearibus verticillatis glabris, flor. corymboso-dichotomis. Willd. Retz. obs. 2. p. 13. Hab. in Ind. orientali. Similis Achyranthi corymbosae. Willd. An diversa? ☞

11. *caudata*, fol. ovatis, racemis compositis laxis longissimis, pistillo bifido, caule exstipulato. Vahl. symbol. 1. p. 21. Hab. in Arabia felici.

12. *trigyna*, fol. ovatis acuminatis planis, caule herbaceo, racemo laxo, bract. acariosis, pistillo trifido. Willd. Jacq. hort. 3. p. 12. t. 15. Lam. ill. t. 163. f. 2. Hab. in Senegallia. ☉

13. *virgata*, fol. ovatis acuminatis undulatis, caule suffruticoso, racemo laxo, bract. membranaceis, pistillo trifido. Willd. C. *virgata* fruticosa glabra, fol. caulinis spatulatis, racemis lanceolatis, flor. aggregatis spicatis. Jacq. ic. 2. t. 339. Collect. 2. p. 279. Hab. . . h

14. *polygonoides*, fol. cordatis, caule hispido, racemo spicato laxo, flor. trigynis. Retz. obs. 2. p. 12. Hab. in Malab. Capa. urceolata. ☞

15. *baccata*, fol. cordatis acuminatis, racemo spicato laxo, flor. trigynis, fructibus baccatis. Willd. Retz. obs. 5. p. 23. Hab. in Ind.

16. *gnaphaloides*, fruticosa lanata, fol. oppositis ovatis subtus albis, capitulo globoso-pedunculari. Lin. suppl. 161. Hab. in

Monte - Video in Brasilia. An Illecebrum? ☞

17. *nodiflora*, fol. cuneiformibus acutiusculis, spicis globosis lateralibus. Lin. Jacq. hort. t. 98. Burm. zeyl. 16. t. 5. f. 2. Pluck. alm. 27. t. 133. f. 2.

18. *elongata*, fol. ovalibus basi attenuatis incanis, spicis terminalibus longe pedunculatis nudis subcapitatis. Sprengel in Schrad. bot. Journ. 1800. p. 156. Hab. . . (H. P.)

19. *glauca*, fol. alternis lineari-lanceolatis carnosius canis, cor. unicolori limbo 5-leutato, stylo 3-partito. Wendland Hort. Herrenb. p. 4. t. 2. Hab. ad Cap. b. spic. Cap. 1-locularis, in 2 partes dehiscens, sem. ad repleto. h

Obs. An forte distincti generis? cum a Celosia differt: cor. 1 - petala nec 5 - petala, caps. perpendiculariter, nec transversim dehiscenae et stylis tribus.

80. ILLECEBRUM. Cal. 5-phyllus: laciniis apice fornicatis. Cor. o. Stigma simplex, aut bifidum. Caps. 5-valvis, 1-sperma.

1. *verticillatum*, fol. subrotandis, flor. verticillatis nudis, caul. procumbentibus. Lin. Fl. dan. t. 335. Hab. in Europae paucis udis, locis praescriptum arenosis. ☞

Obs. Inter omnes Linnæi species, dicti h. Gaertner (de fruct. et sem. 2. p. 218), solum I. *verticillatum* characteri generico Linnæano respondet, reliquæ ad Paronychiam, Achyranthem et Celosiam debent referri!

2. *aristatum*, flor. subs fasciculatis, fol. lanceolatis a-ricis aristatis. Ait. Kew. 1. p. 260. Hab. in Canariis. ☉

3. *canariense*, fruticosum, fol. ellipticis acutis, stipulis bracteisque ovatis brevioribus, panic. terminalibus dichotomis. Lin. suppl. 161. Hab. in Teneriffa. h

4. *cymosum*, caule ramoso erecto, fol. subteretibus glabris aristatis, flor. cymosis, bract. brevissimis. Villars de genere Illecebro, in Schrad. Journ. f. d. Bot. 1801. p. 406. cum ic. Lin. Willd. Sp. 2. . 1206. (etc. syn. quæ ad sequentem speciem pertinent.) Hab. in Hisp. et Mons-pellii. ☉

5. *echinatum*, caulih. prostratis, fol. obovato-acuminatis scabris, capitul. axillaribus celsissimis. Vill. l. c. p. 409. Desf.

atl. t. p. 204. Moris. s. 5. t. 29. f. 5. Bocc. sic. t. 20. f. 3. Hab. in Gallia meridionali, Lusitania et Barbaria.

6. *Paronychia*, flor. bracteis nitidis obvallatis, caul. procumbentibus, fol. laciniatis. Lis. *Paronychia nitida*. Gaertn. de fr. 2. p. 218. Hab. in Hisp. et Narbona, et in Delphinatu. Styl. bifidus.  $\overline{\text{L}}$

7. *polygonifolium*, caul. prostratis, fol. ovato-lanceolatis glabris, flor. lateralibus terminalibusque. Vill. l. c. Hab. in Delphinatu alpinis, etiam in Lusitan. in monte Estrella. Link.

8. *italicum*, fol. glabris oblongo-lanceolatis sursum bracteisque o. pressis, ramis erectis, flor. lateralibus terminalibusque. Vill. l. c. p. 470. (1. *Paronychia italica*.) Hab. in Italia et circa Marcellis. An prioris var. ?  $\overline{\text{L}}$

9. *narbonneuse*, caul. prostratis hirsutis, fol. lanceolatis acutis, margine scabris, flor. lateralibus. Vill. p. 411. l. argenteum. Pourr. Chlor. p. 321. Hab. prope Narbonnam. Cal. margine subpelluculo, dorsum hirsutis, intus nervis 3 distinctus. Priori affine.

10. *maritimum*, caulibus prostratis, fol. oblongis acutis, margine scabris, flor. lateralibus. Vill. Circa Aix a cl. Jussieu detectum. l. Polygonifolium S. *Paronychia* habitu simile. V.  $\overline{\text{L}}$

11. *lugdunense*, caul. prostratis ramosis, flor. hirsutis, fol. lanceolatis binis, bract. quaternis semilanceolato-linearibus. Vill. Hab. . .  $\overline{\text{L}}$

Obs. Hæc et antecedens species, dicit cl. Villars, *Herniarias* exacte referunt, quæ ulterius hinc examinari debent, an forte illius generis sint.

12. *serpyllifolium*, caul. nodosis ramosis prostrato-repentibus, fol. obovato-lanceolatis subcarnosis, margine ciliatis, flor. bracteis occultatis terminalibus. Vill. Dauph. 2. p. 358. Hab. ad litora flum. Duranæ, prope Grenoble, Gay, etc.

13. ? *Herniarioides*, caul. nodosis repentibus prostratis, fol. ovato-cordatis ciliatis, flor. terminalibus. Vill. in Journ. bot. p. 413. l. *Herniarioides*. Pourr. Chlor. p. 321. Fol. et bract. majores quàm in priore. Germen conicum. Styl. simplex.  $\overline{\text{L}}$

14. *capitatum*, flor. bract. nitidis occultatis capit. terminalia, caul. erectiusculis, fol. ciliatis, subtus villosis carinatis - oblongis appressis. Lob. ic. 420. Hab. in G. Narbonensi, Hispania, in collibus prope Montelimar et in Orientis.

15. *niveum*, caul. suberectis ramosissimis, fol. patentib. villosis, bract. maxim. flores occultantib. Enc. bot. 5. sub *Paronychia*. Borrel. ic. 687. et 725 ? Hab. in Gallia merid. et in Hispania.

16. ? *subulatum*, radice crassa, caule erectiusculo, fol. subulatis longis, florib. terminalib. Enc. bot. sub *Paronychia*. Hab. in Ind. Juss.

17. *divaricatum*, flor. bracteis subfasciculatis, pedunc. dichotomis paniculatis, foliis ovato-oblongis petiolatis. Ait. Kew. t. p. 291. Hab. in Canar.  $\odot$

18. *arabicum*, flor. sparsis congestis, bracteis nitidis æquantibus, caul. procumbentib. Corrigiola *alcockia*, fol. oppositis, stipulis hyalinis. Forsk. descr. 207. Hab. in Arabia. Simill. l. *Paronychia*. In Flor. non in capitula terminalia, et bract. non flore longiores. L.

19. *striatum*, caul. erecto cymoso ramoso, cal. aristatis. Enc. bot. 5. p. 25. sub *Paronychia*. Hab. . . Fol. subsapiculata. Rami magis denudati quàm in reliquis. l. c. A Commerson detectum.

20. *dichotomum*, caul. erecto pluries dichotomo, fol. distantibus oblongis multicis, flor. cymosis. Enc. bot. l. c. Hab. . . (Herb. Juss.) Caul. elongati subnudi.

21. ? *linearifolium*, caul. recto villosis, fol. linearibus longis capitula terminalib. Enc. bot. p. 26. sub *Paronychia*. In Herb. Juss. Bract. argenteæ. Capit. majuscula, passim sphaerica.

22. *frutescens*, caul. fruticoso dichotomo, fol. oppositis pulverulentis. L'Hérit. stirp. t. p. 75. t. 37. Hab. in aridis Limæ. An *Achyranthes* ?  $\overline{\text{h}}$

23. *alsinifolium*, caul. diffusis, foliis ovatis, florib. congestis, bracteis nitidis. Mant. Scop. del. ins. t. 13. Tournef. hist. 508. Hab. in Hispania.

Obs. Plures species hujus generis, accuratius adhuc examinaudi, vide sub genere *Achyranthis*.

590. **ANYCHIA**. Cal. connivens : laciniis oblongis, apice subsaccato. Cor. o. Filam. distincta : setulis nullis interpositis. Stigm. 2, oblonga. Caps. utricularis, non dehiscens. Sem. 1, subreniforme. (Fol. opposita, stipulacea. Stam. passim 3.)

1. *Herniariae*, humifusa pubescens, fol.

oblongo-ovalibus ciliatis aristatis. A Herminioles. Michaux, Flor. 2. p. 113. Hab. in arenosis Carolinar septentrionalis. Cal. laciniae acumine setaceo distinctae.

2. *Argyrocoma*, caespitosa procumbens subpubescens, fol. linearibus acutissimis, capit. fasciculato-terminalibus, cal. apice b. raris. Michaux, l. c. Hab. in Carolinae superioris rupibus. Illecebr. Paronychiae habitu.

*Obs.* Hoc ad genus, Illecebris valde affine, b. Michaux etiam retulit Querlam canalem, l. c. quam in planta sylvestri fere semper 5-andram et in culta saepe tantum 2-andram observavit.

591. *GYMNOCARPON*. Cal. 5-partitum, coloratus, persistens. Cor. o. Stam. 10: alterna sterilia. *Stigma* simplex. *Semen* 1, cal. indurato tectum.

1. *fruticosum*. *Trianthema* fruticosum. Vahl. symb. p. 32. G. decandrum. Gmel. syst. p. 493. Desf. Atl. 1. p. 203. Juss. gen. pl. Hab. in Aegypto et in deserto prope Casam. Diffusa, caul. nodosis. Fol. opposita subulata, stipulacea. Cal. purpureae.

592. *HAGEA*. Cal. 5-phyllus. *Petal* 5, emarginata. *Sylus* simplex. *Caps.* 3-gona, 1-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *Teneriffae*, caule herbaeaeo prostrato, fol. spatulatis subaeuminatis. Polycarpes. Lam. in Journ. d'Hist. nat. 2. p. 3. t. 25. Hab. in monte lamoso: Le Pic. ins. Teneriffae.

*Obs.* Ad evitacionem nominis conformitatis Polycarpesae cum Polycarpon, cuius habitum refert, el. Ventenat illud in inventoris memoriam Hortulani Lahaye commutavit.

2. *gnaphalodes*, caul. suffruticeo prostrato, fol. oblongis tomentosis, flor. terminalibus congestis. Schousb. Maroc. 1. p. 117. Roth. N. Bot. Beytr. p. 170. sub Illecebro. Polycarpesae microphylla. Cav. in Annot. de cencias natur. n.º. 7. p. 25. Hab. prope Magodore in arenosis.

*Obs.* Ob caps. 3-valvem et ob petala manifesta ab Illecebro differt, forte una alterave species ex Amaranthoides adhuc hujus loci sunt.

593. *GLAUX*. Cal. 1-phyllus, co-

loratus, 5-lobus. Cor. o. Caps. 1-locularis, 5-valvis, 5-sperma, cal. cinctus.

1. *maritima*. Linn. Flor. dan. t. 548. Hab. in Europ. et Americae maritimis, salis. ¶

594. *BUTTNERIA*. Cor. 5-petala. *Nectar.* 5-phyllum. *Filamenta* apice nectaris inserta. *Caps.* 5-cocca, muricata.

\* *Aculeatae.*

1. *scabra*, fol. lanceolatis dentatis basi subhastatis, rachis, petiolis cauleque angulato aculeatis. Willd. Sp. 2. p. 1117. Jacq. amer. p. 76. Hab. in Amer. merid. Sarmetosa, aculeis recurvis. h

\* *carthagenensis*, fol. ovatis, costa petiolisque aculeatis. Jacq. amer. ed. picta. p. 41. Hab. Carthagenae in monte Pops.

2. *tereticaulis*, fol. lanceolatis aemminatis integerrimis, rachis, petiolis cauleque tereti aculeatis. Willd. Sp. 1118. Lam. l. c. 1. p. 517. Cavan. diss. 5. p. 292. t. 149. f. 2. Hab. in Peru. h

3. *microphylla*, fol. ellipticis integerrimis emarginatis, aculeis stipularib. Willd. Jacq. hort. t. 29. Lam. anc. 1. p. 517. Cav. diss. 5. p. 292. t. 148. f. 2. Hab. in America. Rami flexuosi. Fol. remota, ovalia. h

4. *ovata*, fol. ovatis serratis, petiolis inermibus, ramis 5-angularibus aculeatis, caule erreto. Lam. enc. 1. p. 516. Cavan. diss. 5. p. 291. t. 149. f. 1. Habit. in Peru. h

5. *cordata*, fol. cordatis inermibus, pedunc. aubternis inaequalibus septemfloris. Flor. Peruv. 3. p. 9. Cav. diss. 5. p. 291. t. 150. Hab. in Provinciae Chancaey sepibus. Incolae fol. contusis ad morsus araneorum utuntur. h

6. *sulcata*, fol. cordato-ovatis serratis, costa petiolisque aculeatis, pedunc. geminis 3-5-floris. Flor. Per. 3. p. 10. In Peruv. praeruptis collidit. Pedunc. declinati, bracteis deciduis involuerati.

7. *hirsuta*, fol. cordatis acutis crenatis, costa petiolisque aculeatis, pedunc. congestis compositis. Flor. Per. l. c. Hab. in Andium montibus. Flor. umbellati, involuerati.

\* \* *Inermes.*

8. *herbacea*, fol. cordatis aemminatis, dentatis eglandulosis, caule inermi herba-

ceo. Willd. Roxb. corom. 1. p. 28. t. 29. Hab. in cacumine montium lud. ¶

9. *catalpaefolia*, fol. cordatis integerrimis, caule scandente inerme. Willd. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 21. t. 46. Hab. ad Caracas. ¶

595. *AYENIA*. *Cal.* inferus, 5-partitus. *Petala* 5, apice in stellulam connexa, unguibus capillaribus longis in coronæ formam arcuatis. *Glandule* 5, stamini-formes, erectæ, petal. disco insidentes. *Nectar.* cyathiforme, 5-fidum. *Stam.* sub petalis circa crenam inserta tisque recondita. *Caps.* depressa, 5-sulcata, 5-locularis, 5-valvis : valvulis bifidis, clastice dehiscens. *Sem.* solitaria. (Flor. Per. 3. p. 11.)

1. *pusilla*, foliis ovatis argute serratis, caul. prostratis. Flor. Per. 1. c. Cav. diss. 5. p. 289. t. 147. Sloan. jam. hist. 1. p. 209. t. 132. f. 2. Hab. in Jamaica et Peruviae præcruptis calidis. Suffrutescens habitu Poterii sanguisorbæ. *Caps.* 5-cocca, muricata.

2. *laevigata*, fol. ovatis integris glaberrimis, germine pedicellato, nectario decemfido radiato. Swartz. prod. 97. Hab. in Jamaica. ¶

3. *tomentosa*, fol. ovato-subrotundis tomentosis. L. Hab. in Cumana.

4. *magna*, fol. cordatis pubescentibus, florum germine sessili, nectario concavo. L. Hab. in Cumana. ¶

*Obs.* Hoc et antecedens genus potius ad eorum familiam, ad *Malvaceam* in classem *Monodelphiam* transportanda.

596. *GLUTA*. *Cal.* campanulatus, deciduus. *Petala* 5, inferne adglutinata columnæ (stipiti) germinis. *Filam.* apici columnæ inserta. *Germen* columnæ insidens. *Fruct.*...

1. *Benghas*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1120. Hab. in Java. Arbor. Fol. alterna sessilia. Pnct. terminalis. pedunculatis. Passifloris affinis. An potius ad *Gynandriam* pertinet? ¶

+ *MUSACEAE PENTANDRÆ*; genera 597-598.

597. *HELICONIA*. *Spatha* univer-

salis partialesque. *Cal.* 6. *Cor.* supera, 3-petala. *Nect.* 2-phyll. *Stigma* 1. *Caps.* trilocularis : loculis monospermis.

1. *caribæa*, fol. basi apiceque rotundatis, spadice erecto radicalibus, spathis distichis multifloris, nectarii folio superiore indiviso. Willd. Sp. 2. p. 1187. Lam. enc. 1. p. 421. Plum. gen. 50. f. 59. Hab. in ins. Caribæis. Corolla virescens. *Filam.* alba. ¶

2. *Bihai*, foliis basi apiceque acutis, spadice erecto radicalibus, spathis distichis multifloris, nectarii folio superiore trifido. Willd. Swartz. obs. 46. t. 5. f. 2. H. luteo-fusca. Jacq. hort. Schoenbr. 1. p. 25. Musa *Bihai*. Lin. Hab. in Amer. calidiore, locis subudis montosis. Habitus Musæ, 12-petalis. Corollæ croceæ, nectarium caeruleum. ¶

3. *humilis*, foliis basi angustatis apice acuminatis, spadice erecto flexuoso radicalibus, spathis distichis multifloris, nectarii folio superiore tridentato. Willd. 1. c. H. fol. basi angustatis, nervis simplicissimis, nect. adnato. Jacq. hort. Schoenbr. 1. p. 23. t. 48. 49. Musa *humilis*. Aubl. guj. 2. p. 931. Hab. ad Caracas et in Gujana. ¶

4. *prittacorum*, fol. basi rotundatis inflorescentiaque glaberrimis, spadice caulin. nectario lanceolato concavo. Andr. t. 124. Lin. suppl. 158. Hab. in Surinamo, Jamaica. Flor. coccinei, apice fuso. ¶

5. *hirsuta*, fol. basi rotundatis glaberrimis, spadice caulino flexuoso hirsuto, spathis distichis multifloris, nectario lanceolato. Willd. p. 1188. Linn. suppl. 158. Hab. in America merid. Germen hispidum. Cor. curva dipetala. Petalum superius complicatum hispidum, interius apice macula fusca notatum. ¶

\* *indica*, fol. utrinque attenuatis, spathis paucissimis multifloris. Lam. enc. 1. p. 426. Rumph. 5. t. 62. f. 2. In Ind. et in ins. Mollucis. ¶

598. *STRELITZIA*. *Spatha* universalis, partialesque. *Cal.* 6. *Cor.* supera 3-petala : lacin. majoribus subhastatis. *Nect.* 3-phyllum genitalia involvens. *Stigma* 3. *Caps.* 3-locularis : loculis polypermis.

1. *Reginæ*, foliis parallelo-costatis. Willd. Spec. 2. p. 1190. Ait. Kew. 1. p. 285.

t. 2. *Heliconia alba*. Lin. suppl. 157. Hab. ad Cap. b. spei. Folia radicalia petiolata oblonga, subtus glaucescentia. Petioli tripedales et ultra, scapi longitudine. Spatha margine purpureus. Petala lutea. Nect. caeruleum. Ait. ¶

2. *angusta*, fol. costatis reticulato-venosis. Willd. l. c. Thunb. prod. 45. *Heliconia Bihai*. Lin. suppl. 157. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

#### AROCYNEM. Contortae. L. (Gen. 599-628.)

Plantae perennes aut lignosae. Succus lacteus saepius acris, causticus. Fol. opposita, aut verticillata, rarissime, alterna, simplicia, indivisa, integerrima. Flor. plerumque extra-axillares. Cal. quinquepartitus imae corollae appressus. Cor. 1-petala, regularis. Tubus subnullus mediocris, longus: limbus 5-partitus; laciniis plus minus obliquis. Appendix corollina, (Nect. Linn.) processibus marginalibus forma variantibus; rarius nulla. Stamina. 5. Filam. brevissima aut longiuscula; plana, conniventia. Anth. cordatae 1. sagittatae, acuminatae 5. caudatae raro apice membranaceo obsusae, 2-locul. Pollen particulosus: particula plus minus cohaesibilibus, seu rarius intra singulos antherae loculos in clavulam solidam luteam concretus. Ex binis ejusdem Antherae clavulis pollinicis, altera a dextra, altera a sinistra suam dirigit extremitatem attenuatam in formam filamentum elastici; cujus ope adnectitur minutissimo corpusculo fusco, supra singulas rimulas stigmaticas adfixo. Istud autem corpusculum, sponte decidens s. avulsu, sibi appensus retinet binas clavulas pollinicas, ex binis antheris proximis prodeuntes. Ovar. unicum, oppo. in hisulcum, biloculare; ovalis ex axi propendentibus: peracta foecundatione plerumque bipartibile, rarius indivisum. Stylus unicus modo brevissimus, modo intra promissum Corollae tubum longus. Stigma: corpusculum crassum, attenuato s. coarctato Ovarii apici subsessiliter impositum, ad ambitum rimulis quinque stigmaticis, antheris alternantibus exaratum: seu plerumque tuberculum discoideum s. cylindraceum pelatatum stylum terminans, vario processu saepe superatum, ambitu solo viscida materie illinitum. Folliculi gemini, (alternis abortionem solitarii,) discretis rarissime maturitate tantum separabiles; 1-loculares, interiore facie dehiscentes, raro etiam utroque margine

tuncque bivalves: in paucioribus vero, baccatus seu drupaceus, 2-locularis; posterioris Nucis simpliciter gemina. Recept. in Folliculo 1-valvi ad suturam, qua dehiscente saepius fit liberum, positum, in 2-valvi ad alterum marginem: in aliis ex axi ortum habet. Sem. plura, propendentia s. retrorsum imbricata; modo coma basilari ascendente quasi papposa; modo membranacolata, seu etiam nuda; in Bacca Drupaeque interdum paucissima, rarissima etiam solitaria. Embryo Albumine carnosio inclusus, directione Seminis, rectus: Cotyledonibus Radicula cylindrica latioribus, plano-appressis. Rich. - A Linnaeo nonnulla genera rubiacea ex gr. *Gardenia*, *Genipa* perperam ad hanc familiam sunt relata. Quaedam in prima divisione secundum Jussieu collocata genera Apocynceis tantummodo affinis sunt, hinc ab aliquibus ab hac familia separantur.

† Fructus baccatus aut drupaceus.

#### 599. STRYCHNOS. Cor. tubulosa, 5-fida. Bacca 1-locularis, cortice lignoso.

1. *Nux vomica*, fol. ovatis, caule inermiti. Lin. Fl. zeyl. 91. Willd. Spec. 2. p. 1052. Roxb. eorom. 1. p. 8. t. 4. Blackw. t. 395. Hab. in Ind. Bac. polysperma. h

2. *colubrina*, fol. ovatis acutis, cirrhis simplicibus. Linn. Rheed. mal. 7. p. 10. t. 5. Blackw. t. 403. Rumph. 2. t. 37. Hab. in Ind. h †

3. *potatorum*, fol. oppositis ovatis, acut. quintuplinerviis venosis, cymis axillaribus. Willd. Roxb. 1. p. 9. t. 5? St. Tetan-kotta. Retz. obs. 2. p. 12. Hab. in montosis ad Madras. Corol. fauce villis albis clausa. Bacca magnitudine Cerasi monosperma. For. albus aromatici. h

Obs. Planta a Clar. Roxburg descripta forte nova species est, ob fol. simpliciter venosa. Willd.

4. *brachiata*; fol. oppositis ovatis oblongisque acuminatis 5-nerviis, caul. brachiato tereti, flor. corymbosis. Flor. Per. 2. p. 30. t. 157. Hab. in Peruv. nemoribus. Rami longissimi, penduli, granulosi. Pedunc. axillares. Cor. extus hirsuta. h

#### 600. IGNATIA. Cal. 5-dentatus. Cor. longissima, infundibuliformis. Drupa unilocularis, poly-

sperma. *Sem.* irregularia, angulata.

1. *amara*. Lin. suppl. 149. Willd. p. 1051. viti. Juss. gen. pl. Hab. in Ind. Arb. ramoissima, sarmentis scandentibus. Fol. ovata spinulosa. Panic. axillares. Fruct. oratus, magnitudine Pyri. Lin. h

601. THEOPHRASTA. *Cor.* campanulata: laciniis obtusis. *Caps.* pulposa, 1-locularis, globosa, maxima, polysperma.

1. *americana*, fol. longissimis repandodentatis acutiusculis. Lin. Willd. Spec. 2. p. 824. Eresia. Plum. gen. 8. ic. 126. Hab. in Amer. acquinoctiali. Fruct. pomi medioeris magnitudine, croceus, rugosus, sem. rubra carnea continens. Pulpa edulis. h

2. *longifolia*, fol. mucronato-dentatis acuminatis. Willd. Jacq. Coll. 4. p. 156. Ad Caracas in America. Fol. utrinque attenuata.

602. ANASSERA. *Cal.* parvus, 5-fidus. *Cor.* urceolata, 5-loba, intus villosa. *Stigma* didymum. *Caps.* oblonga, 2-valvis, 2-locularis.

1. *borbonica*, fol. ovatis obtusiusculis, corymbis lateralibus. Anasser. Lam. ill. 2. p. 46. Juss. gen. pl. p. 150. Hab. in Borbonia.

2. *moleccana*, fol. lanceolatis acutis, corymbis subterminalibus. Lam. l. c. Rumph. 7. p. 12. t. 7. Hab. in Molluccis.

603. FAGRÆA. Contorta. *Cal.* campanulatus 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: tubo longissimo. *Bacca* carnosa, 2-locularis, polysperma. *Sem.* globosa.

1. *zeylanica*. Thunb. N. G. pl. et in Act. Holm. 1782. p. 125. t. 4. Lam. ill. t. 67. Willd. Sp. 2. p. 810. Fol. opposita lobata, integra, stipulacea? An Rubiacis affinis? h

604. MELODINUS. Contorta. *Cor.* hypocrateriformis: fauce coronula 5-fida lacera. *Stigma* 2. *Bacca* carnosa, 2-locularis, po-

lysperma, magna. *Sem.* compressa.

1. *scandens*. Lin. suppl. p. 169. Willd. p. 1274. Lam. ill. t. 179. Hab. in N. Caledonia. Fol. oblongo-ovata. Planta revera digyna? h

605. RAUWOLFIA. Contorta. *Cor.* tubulosa, basi globosa. *Bacca* succulenta, disperma.

1. *nitida*, fol. quaternis lanceolatis acuminatis glaberrimis nitidis, flor. terminalibus. Willd. Sp. 2. p. 1217. Jacq. amer. dict. n. 2. Plum. gen. 19. ic. 236. f. 1. Hab. in Amer. merid. h

2. *canescens*, fol. quaternis oblongo-ovatis acuminatis pubescentibus, flor. terminalibus axillaribusque. Willd. R. hirsuta. Jacq. amer. ed. pict. t. 259. f. 17. Plum. ic. 263. f. 2. Pluck. phyt. 266. f. 2. Hab. in Jamaica, et in fruticulis Caribæum. Cymæ pedunculatæ in dichotomis caulis. Willd. h

3. *tomentosa*, fol. quaternis oblongis utrinque attenuatis tomentosis, flor. terminalibus et axillaribus. Jacq. amer. ed. pict. t. 46. Hab. Cartlagenæ in rupestribus. *Cor.* candida. Limbus cor. in R. pubescente obtusus, in R. tomentosa acutus. Willd.

4. *flexuosa*, fol. oblongis obovatisque angustis, racem. flexuosis paucifloris. Flor. Per. 2. p. 26. t. 102. Hab. in Peruv. frutic. Flor. in culta sæpe 4-andri. *Cor.* albolutea. l. c.

5. *macrophylla*, fol. obovatis ovatisque emarginatis integerrimisque, racem. erectis multifloris. Flor. Per. l. c. t. 102. f. b. Hab. in Peruv. collibus arenosis. *Cor.* lutescens. Stam. sæpe 4.

606. VALLESIA. *Cal.* minimus. *Cor.* hypocrateriformis, utrinque globosa. *Stam.* fauci inserta. *Drupæ* 2, divergentes. *Nux* striato-reticulata, 1-locularis.

1. *dichotoma*, fol. ovatis acutis undulatis, racemis dichotomis. Flor. Peruv. 2. p. 26. t. 151. Cresc. in ruderalis in Peruvia. h

2. *cymbæfolia*, fol. lanceolatis cymbæformibus apice incurvis. Orteg. Dec. p. 58. Rauwolfia glabra. Cav. ic. 3. p. 50. t. 297. Willd. p. 1218. Hab. in N. Hispan. *Cor.* alba.

607. *OPHIOXYLON*. *Cor.* tubulosa filiformis, medio incrassata: limbo 5-partito. *Stigma* capitatum. *Bacca* didyma, 2-locularis, 2-sperma. Planta polygama. Flor. masculi, hermaphroditis mixti, 2-andri. *Juss.*

1. *serpentinum*, fol. verticillatis, flor. terminalibus conglomeratis. *Lin. syst. ed. Reich.* 4. p. 329. *Rumph.* 7. t. 16. *Rheed.* 6. t. 7. *Lam. ill.* t. 842. f. 3. *Habit.* in Zeylona. *h*

2. *Ochrosia*, fol. verticillatis, florib. dichotome corymbos. *Ochrosia*. *Juss. gen. pl.* *Hab.* in ins. Borbonia. Priorem speciem ita adaequat habitum, ut vix genere mihi distingui videatur. *h*

608. *CARISSA*. *Cal.* brevis. *Cor.* tubulosa. *Stam.* inclusa. *Bacca*, 2-locularis: loculis 1-2-aut polyspermis.

\* *Spinosae.*

1. *Carandas*, foliis ovatis mucronatis reticulato-venosis, laciniis corollae lanceolatis. *Willd. Sp.* 2. p. 1219. *Lam. ill.* t. 118. f. 1. *Carandas*. *Rumph.* p. 7. t. 25. *Hab.* in Ind. *h*

2. *spinarum*, fol. ovatis acutis venosis, laciniis cor. lanceolato - oblongis. *Vahl. symbol.* 1. p. 22. *Lam. ill.* t. 118. f. 2. *Rumph.* 7. t. 19. f. 1. *Habit.* in India orientali. *h*

3. *salicina*, fol. lanceolato - oblongis mucronatis venosis, versus petiolum angustioribus, florib. fasciculatis subcorymbosis. *Lam. enc. bot.* 1. p. 554. *Hab.* in India. *Sonner.* An prioris var.? sed fol. multo angustiora et flor. ad dimidium minores. *Lam. h*

4. *Arduina*, fol. cordato-ovatis mucronatis subsessilibus, spinis apice bifidis. *Lam. l. c.* p. 554. *Arduina* hispidosa. *L. Willd. Sp.* 2. p. 1117. *Mill. ic.* t. 300. *Flor. albi.* *Bacca* dispersa. *Habit.* ad Cap. bon. spei. *h*

5. *edulis*, fol. ovatis acutis aveniis, ramis superne villosis, laciniis cor. lanceolato-linearibus. *Vahl. symb.* 1. p. 22. *Antura*. *Forsk. descr.* 63. *Hab.* in Arabia felici. *h*

\*\* *Inermes.*

6. *inermis*, inermis, fol. ovato-cordatis mucronatis aveniis. *Vahl. symb.* 3. p. 43. *Hab.* in Ind. orient. *h*

7. *mitis*, inermis, fol. lanceolatis attenuatis. *Vahl. symb.* 3. p. 44. t. 59. *Hab.* in Ind. orient. *h*

609. *GYNOPOGON*. Contorta. *Stigma* bilabiatum, apice villosum. *Drupa* nuce semibiloculari.

1. *stellatum*, fol. verticillatis ternis lanceolatis. *Forst. prod. n°.* 117. *Willd. Sp.* 2. p. 1221. *Hab.* in Societatis Americorum insulis. *h*

2. *Alyxia*, fol. verticillatis quinis obovatis. *Forst. prod. n°.* 118. *Hab.* in Norfolkiae insula. *h*

3. *scandens*, fol. oppositis ovatis cor-tatis. *Forst. prod. n°.* 119. *Hab.* in Societatis insulis. *h*

610. *CERBERA*. Contorta. *Cor.* infundibuliformis: tubo clavato. *Drupa* monosperma: nuce 2-loculari, 4-valvi.

1. *Ahova*, fol. ovatis acutis. *Willd. Sp.* 2. p. 1222. *C. laciniis* cor. undulatis, cal. foliolis reflexis. *Andrew.* t. 231. *Ahova* major. *Pis. bras.* 308. *Hab.* in Brasilia. *Cor.* flava. *h*

2. *ovata*, fol. ellipticis obtusis. *Willd. C. fol.* ovatis sparsis subsessilibus, flor. terminalibus subquinis. *Cav. ic.* 3. p. 35. t. 270. *Habit.* in N. Hispania. *Cor.* lutea. *Stigm.* clavatum, umbell. referens. *Cavan. h*

3. *parviflora*, foliis stellatis obovatis. *Forst. prod. n°.* 121. *Hab.* in ins. Americorum. *h*

4. *Manghas*, fol. lanceolatis: nervis transversalibus. *Linn. Petiv. gaz.* t. 16. f. 4. *Burm. zeyl.* 150. t. 70. f. 1. *Rumph.* 2. t. 81. *Hab.* in Indiis ad aquas. *h*

5. *undulata*, fol. lanceolatis utrinque attenuatis undulatis, cymis ramosis divaricatis axillaribus. *Andrew.* t. 130. *Cerb. maculata*, fol. maculatis, etc. *Willd. Sp.* p. 1223. *Ochrosia maculata*. *Jacq. ic. var.* 2. t. 321. *Hab.* in ins. Borbonia.

*Obs.* D. Andrew maculas in foliis tanquam praeternaturale quid et in speciminibus sicca nimia pressione forte ortas respicit. *Cor.* candida, ore amoen rubro.

6. *Thevetia*, fol. linearibus longissimis confertis, cor. lac. truncatis. *Jacq. amer.* 48. t. 34. *Pluck. alm.* t. 207. f. 3. *Hab.* in Cuba et Martinica rarius. Noces pro crepitaculis Americanorum inserviunt. *h*



\* *Peruviana*, fol. lineari - lanceolatis confertis longis, pedunc. brevissimis paucifloris. C. Thvetia. Flor. Peruv. 2 p. 27. Hab. in Peruvise memoribus e fructibus, Cascaribelluncupatis, Indi reticulas longas conficiunt quas strepitus causa in choreis ad collum et genus appendunt.

*Obs.* Hæc peruviana planta a priore diversa videtur. Germ. in hac 4-gonum, in illa, secundum Jacquin, subrotundum; stigm. in hac capitatum, acuminatum, denticulis so-recurvis ornatum, in illa capitatum subrotundum, apice bifido. Jacq. Pedunc. huic subcylindrici, breves in illa sæpius uniflori. J.

611. *GELSEMIUM*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo patente 5-lobo subæquali. *Caps.* compresso-plana 2-partibilis, 2-locularis. *Sem.* plana, valvularum marginibus adnexa. *Juss.*

1. *sempervirens*. Bignonia sempervirens. Lin. G. nitidum, scandens glaberrimum, fol. lanceolatis, flor. fasciculis axillaribus paucifloris, flor. luteis suaveolentibus. Michaux. Flor. 1. p. 120. Hab. in Amer. bor. maritimis. J.

† † *Fructus bifollicaris.*

\* *Semina nuda* 1. basi non comosa aut papposa, sæpe margine membranaceo aucta.

612. *VINCA*. Contorta. *Cor.* hypocrateriformis, fauce 5-gona. *Folliculi* 2, erecti, teretes, angusti. *Sem.* oblonga, nuda.

1. *minor*, caulib. procumbentibus, fol. oblongo-lanceolatis, margine glabris. Linn. Willd. Sp. 2. p. 1232. Blackw. t. 59. Hab. in sylvis. Sempervirens. J.

2. *herbacea*, caul. procumbentibus, fol. oblongo-lanceolatis edentulis, cal. ciliatis. Ruitabel. Pl. hong. p. 8. t. 8. Hab. in apricis arenosa et in calcariis prope Badam, vere. A.

3. *major*, caul. declinatis, fol. ovatis, junioribus margine ciliatis, flor. pedunculatis. Willd. Hab. in Gallia Narbonensi, Hispania, Helvetia, etc.

4. *lutea*, caule volubili, fol. oblongis. Lin. Amoen. acad. 4. p. 307. Catesb. car. 2. p. 53. p. 53. Hab. in Carolina. Facies Echitis. Willd. J.

5. *rosea*, caule suffrutescente erecto, flor. geminis sessilibus, fol. ovato-oblongis, petiolis basi bidentatis. Linn. Mill. dict. t. 186. Hab. in Madag., Java. Var. fol. villosis. J.

6. *parviflora*, caul. herbaceo erecto, fol. (rhomboides-) lanceolatis, flor. geminis involucriatis. Retz. obs. 2. p. 14. V. pusilla. Lin. suppl. 166. Murr. Comment. goett. 1772. p. 66. t. 4. f. 1. Hab. in Traquebariac hortis, vitum summum. Corol. Lithospermis officialis magnitudine et colore. C.

613. *MATELEA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* rotata. *Antheræ* in capitatum 5-gonum conjunctæ. *Stigma* dilatata. *Folliculus* 1, (altero sæpius abortivo) verrucosus, 5-gonous. *Sem.* plana, margine crenata.

1. *palustris*. Aubl. guj. 1. p. 278. t. 109. f. 1. Lam. ill. t. 159. Hostea viridiflora. Willd. Sp. p. 1274. Hab. in Gujan. paludosis. Fol. oblongo - ovata acuminata et (p. fol. latiora. Aubl. f. 2. Flor. axill. J.

614. *PLUMERIA*. Contorta. *Cal.* obtusus, minimus, deciduus. *Cor.* infundibuliformis, tubo subcurvo. *Stigma* 2 - fidum. *Folliculi* 2, deorsum flexi, longi ventricosi. *Sem.* oblonga, basi ala membranacea (crenato-dentata) aucta.

1. *rubra*, foliis ovato-oblongis, petiolis biglandulosis. Lin. Willd. p. 1242. Catesb. carol. t. 92. Ehret. t. 10. Hab. in Jamaica, Surinamo. Arb. procera ramosa.

2. *alba*, fol. lanceolatis revolutis, pedunc. superne tuberosis. Lin. Jacq. Amer. t. 174. f. 2. ed. picta. t. 38. Plumier. Sp. ic. 21. In Jamaica. Prioris habitu, sed parum ramosa.

3. *purpurea*, fol. oblongo-ovatis, margine revolutis, cor. rubris. Flor. Per. 2. p. 20. t. 137. Hab. in Peruv. hortis. Cor. quam in reliquis speciebus minor, fragrantissima: ore læviter lutescente. L. c. J.

4. *incarnata*, fol. ovato-oblongis acutis, cor. incarnatis disco fulvo. Flor. Per. J. c. t. 138. Cum priore. Flor. cymoso-umbellata. Nimis affinis sequenti dicitur. J.

5. *carinata*, fol. oblongo-ovatis acuminatis carinatis: marginibus planis rubris, cor. magnis tricoloribus. Flor. Per.

p. 27. Cor. in centro lutea, extus ad medium alba, superne rubescens. h

6. *tricolor*, fol. oblongis acutis, marginibus planis venosis, cor. tricoloribus. Flor. Per. t. 139. Cor. tubus ruber, fauces croceae, limbus albo-roseus.

Obs. Plumieriae nostrae, dicunt auctores Flor. Peruvianae, inter se differunt colore et magnitudine florum (quare forte varietates aut subspecies tantummodo sunt) et cum nec color, nec magnitudo speciem mutat, nobis satis visum est illas seorsim describere. Etiam cum iis potius Plumieria quam Plumeria dicendum est hoc genus, quod comprehendit arbores formosissimas et gratissimas.

7. *obtusata*, fol. lanceolatis petiolatis obtusis. Linn. Catech. car. 2. p. 93. t. 63. Plum. i. c. 232. Hab. in America calidiore. h

8. *pubica*, flor. limbo clausis. Jacq. amer. 37. Hab. in Amer. hortis, ubi, secundum Jacquinum, sub nomine *Donnellas* sive *Virgines*, eo quod nunquam explicentur corollae, quae flavescentes et omnium odoratissimae aul, coluntur.

6:5. CAMERARIA. *Cal.* minimus acutus. *Cor.* infundibuliformis: tubo utrinque ventricosus. *Anthera* filo longo terminata. *Folliculi* 2, basi utrinque bilobi, horizontales. *Sem.* imbricata membranae (alae) inserta.

1. *latifolia*, fol. ovatis acuminatis parallelo-costatis nitidis, flor. corymbois terminalibus. Willd. Sp. 2. p. 1245. Andr. t. 16. Mill. dict. Jacq. amer. 37. t. 182. f. 86. Plum. gen. 18. ic. 72. f. 1. Hab. in Amer. calidiore. Cor. alba: fundo flavescens. h

2. *seylanica*, fol. ovato-oblongis acuminatis parallelo-costatis, corymbis terminalibus, axillaribusque. Willd. Hab. in Zeylona. For. minores. h

3. *lutea*, fol. ovato-oblongis acuminatis reticulato-venosis, umbella pedunculata pauciflora. Willd. Lam. encyc. t. p. 566. C. *Tamaquarina*. Aubl. guj. t. p. 260. t. 102. p. *guyanensis* fol. ovatis acuminatis, floribus parvis axillaribus odoratis. Aubl. guj. t. p. 262. Hab. ad ripas amnis Galibensis Gujanae. h

4. *angustifolia*, foliis linearibus. L. Plum. gen. 18. ic. 72. f. 2. Hab. in America calidiore. h

6:6. TABERNEMONTANA. *Confortia*. *Cor.* hypocrateriform. tubus angulato-striatus, basi subgloboseus. *Folliculi* 2, horizontales. *Sem.* pulpae immersae. (Fol. opposita.)

1. *citrifolia*, fol. ovatis, floribus lateralibus glomerato-umbellatis. L. Jacq. amer. 38. t. 175. f. 13. ed. pict. Plum. gen. 18. ic. 248. f. 2. Hab. in America. h

2. *laurifolia*, fol. ovalibus obtusiusculis. Mill. dict. n.º 3. Jacq. amer. p. 39. Hab. in Jamaica. h

3. *echinata*, fol. ovato-oblongis acuminatis, flor. glomerato-umbellatis, fructibus echinatis. Willd. Aubl. guj. t. p. 263. t. 103. Hab. in Gujana. h

4. *grandiflora*, fol. caule dichotomo, calyceibus inaequalibus laxissimis. Mant. 53. Jacq. amer. 40. t. 31. Hab. Carthagenae. Cal. fol. alba: exteriora 2 cordata. h

5. *cymosa*, fol. ovato-lanceolatis, flor. cymosis. Jacq. amer. 39. t. 181. f. 14. Hab. Carthagenae. Fol. semipetalis. Folliculi rubescentes pulpae aurantia. h

6. *amygdalifolia*, fol. ovali-lanceolatis, staminibus tubum corollae superantibus. Willd. Jacq. amer. 39. t. 181. f. 15. Hab. in Carthagenae sylvaticis. h

7. *discolor*, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. axillaribus bifidis. Swartz. Fl. ind. occid. t. p. 535. Hab. in Jamaica. h

8. *persicariaefolia*, fol. lanceolatis acuminatis, flor. racemosis. Willd. p. 1246. Jacq. ic. rar. 2. t. 320. Collect. 4. p. 159. Hab. in insula Mauritiis. h

9. *arcuata*, fol. obovatis oblongis acuminatis, corymb. ternis multifloris, folliculis revolutis-arcuatis. For. Per. 2. p. 22. t. 143. Copiose in Peruviae nemoribus, ad Pozuzo vicinis: Arbor succo lacteo, copioso saevis, qui aeri expositus in gummi-resinam condensatur.

10. *Sananho*, fol. oblongis acuminatis, corymb. biquadrilibus, fructibus obovato-subrotundis acuminatis. Flor. Per. t. 144. In Peruv. nemoribus. Follic. obtuse digonali. Cor. tubus longissimus. h

11. *elliptica*, herbacea, fol. subternis lanceolatis. Thunb. jap. 131. Hab. in Japonia. Affinis T. Amsoniae. L. T.

12. *alternifolia*, fol. alternis, caule ar-

lorescentia. L. Rheed. 1. t. 43. Hab. in Malabar. h

617. *AMSONIA*. Contorta. *Cor.* infundibuliformis, fauce clausa. *Folliculi* 2, erecti. *Sem.* teretia nuda oblique truncatis. (Stigma margine annulari. *Fol.* alterna.)

1. *latifolia*, caule glabriusculo, foliis ovali-lanceolatis: superioribus acuminatis. Michaux. Flor. 1. p. 127. Tabernem. Amsonia. Lin. Willd. p. 1246. Hab. in umbrosis humidis sylv. Carolinae.

*Obs.* Cultae fol. minus acuminata et subglabra. M.

2. *angustifolia*, fol. angusto-linearibus crebris erectis pubescentibus. Michaux. l. c. A. ciliata. Walt. In Georgiae sabulosis apricis.

618. *URCEOLA*. Contorta. *Cor.* urceolata. *Nectar.* cylindricum integrum, germen cingens. *Folliculi* 2, 1-loculares, 2-valves. *Sem.* pulposa.

1. *elastica*. Roxb. in Asiat. researches. 3. p. 167. sq. Sprengel in Schrad. Journ. bot. 1800. 2. p. 236. Hab. in India. Flor. paniculati Succus here coagulatus, resinam offert elasticum, Kaoutchouk similem.

\* \* *Semina basi comosa s. papposa.*

619. *NERIUM*. Contorta. *Cal.* 5-partitus parvus, persistens. *Cor.* infundibuliformis, fauce coronula lacera. *Folliculi* conniventes longe acuminati.

1. *Oleander*, foliis lanceolatis angustis ternis, subtus costatis, cal. laciniis squarosis, nect. planis tricuspidatis. Willd. Sp. 2. p. 1234. Ait. Kew. 1. p. 206. Desfont. Atl. 1. p. 208. Lam. ill. 1. 174. Pulchra haecce Aruscule, per totam aetatem, flores, sponte rescit in India, et in Atlante ad fluviorum ipas. Val. flor. albis.

2. *odorum*, fol. lineari-lanceolatis ternis subtus costatis, laciniis calycinis erectis, ectariis multipartitis filiformibus. Willd. 1. 235. N. *odoratum*, - anth. superne lacinato-plumosis. Lam. cuc. 3. p. 456. Rheed. 9.

3. *β.* Flor. plenae. Herm. lugdb. 447. 449. Hab. in India orientali. Priore tenebris, et in caldariis colendum. h

3. *salicinum*, fol. lineari-lanceolatis

ternis nervis. Vahl. symb. 2. p. 45. Forsk. descr. 205. Hab. in Arabia felici. h

4? *obesum*, foliis oblongo-lanceolatis sparsis, subtus villosis. Vahl. symb. 2. p. 45. Forsk. descr. 205. Hab. in Arabia felici. h

5. *seylanicum*, fol. lanceolatis oppositis, ramis rectis. L. Burm. zeyl. 23. t. 12. f. 2. Hab. in India. h

6. *divaricatum*, fol. lanceolatis-ovatis, ramis divaricatis. L. Hab. in India. Flor. albi. ♂

7. *antidysentericum*, fol. ovatis acuminatis petiolatis, follic. apice connexis. Lam. enc. 4. p. 457. Burm. zeyl. 167. t. 77. Rheed. 1. t. 47. Hab. in Malabar, Zeylona, Russia. Flor. albi, odorati. h

8. *coronarum*, fol. ellipticis, pedunc. ex dichotomia ramorum geminis bifloris. Ait. Kew. 1. p. 297. Jacq. ic. rar. 1. t. 52. Coll. 1. p. 138. Burm. zeyl. 1. 59. Rumph. 4. p. 87. t. 39. Rheed. 2. t. 54. Hab. in India orientali. Corona petaloidea duplex. An *Tabernaemontana*? Lam. l. c. h

420. *STROPHANTHUS*. Contorta. *Cor.* infundibuliformis: laciniae longissime caudatae. *Coronulae* faucis dentibus 10 simplicibus.

1. *sarmentosus*, glaber sarmentosus, floribus sub-glomeratis terminalibus et lateralibus, antheris in filum productis. Decand. in Bulletin de Sciences par la soc. Philom. n° 64. p. 173. t. 8. f. 1. Hab. in Sierra-Leone in Africa. Flor. cum foliis nascuntur, magni, rubri. h

2. *laurifolius*, glaber erectus? fol. subternis, flor. glomeratis terminalibus (post folia nascentib.), anther. in filum productis. Decand. l. c. Hab. in Africa. Non sarmentosus. Var. fol. oppositis et ternatim verticillatis. h

3. *dichotomus*, ramis pedunculisque dichotomis, fol. mucronato-acuminatis. Decand. Hab. in India. Echites caudata, cor. infundibuliformibus: apicib. linearib. longissimis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1240. Burm. ind. t. 26. Anth. priorem.

β. *rotundata*, fol. ovato-rotundis. Nerium caudatum. Lam. cuc. 3. p. 458. Hab. in India. Arb.

4. *hispidus*, totus piloso-hispidus, anther. acutis mucis. Decand. l. c. t. 8. f. 2. In Africa. Loco supularum fasciculus pilorum adest. Lacin. cor. omnium longissimae ad 7 uncias. h

621. ECHITES. Contorta. *Folliculi* 2, longi, recti. *Sem.* coma instructa. *Cor.* infundibuliformis, fauce nuda. *Antherae* conniventes in conum.

1. *biflora*, caul. sarmentosis, fol. oblongis, pedunculis subbifloris. Jacq. amer. 38. t. 21. ed. picta. t. 28. Willd. Sp. 2. p. 1217. Plum. amer. 82. t. 96. Nerium sarmentosum, fol. oppositis oblongis acutis, subtus cinereis, tubo floribus dilatato. Brown. jam. 180. Hab. in Caribaeis, Flor. candidi cum fauce lutca. Pedunc. 1-4-flori. h

2. *quinquangularis*, pedunculis racemosis, fol. obovatis acuminatis. Jacq. amer. 32. t. 25. ed. picta. t. 32. Hab. in America meridionali. Flor. flavo-virescentes. Non lactescit. J. h

3. *annularis*, caule volubili, cor. hypocrateriformibus, tubo annulo elevato. Lin. suppl. 166. Hab. in Surinamo. Caul. scaber. Stigma annulo cinctum. L.

4. *tomentosa*, fol. cordato-oblongis acuminatis, cauleque hirtis, floribus racemosis pilosis. Vahl. symb. 3. p. 44. Hab. in Cajen.

5. *suberecta*, pedunc. multifloris, cor. cylindraceis extus hirsutis, fol. subovatis mucronatis subtus pubescentibus. Swartz. obs. 104. Andrew. t. 187. Jacq. amer. 34. t. 26. Sloan. jam. 89. hist. 3. p. 206. t. 130. f. 2. Hab. in Jamaica. Flor. lutei magni. Succus lacteus venenatus. h

6. *domingensis*, pedunc. racemosis, fol. cordato-ovatis rigidiusculis subtus discoloribus, caule volubili. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 529. Jacq. ic. rar. 1. t. 51. Collect. 1. p. 73. In fruticetis maritimis Jamaicae, Hispaniolae. h

7. *agglutinata*, pedunculis racemosis, fol. ovatis emarginatis acuminatis. L. Jacq. amer. 31. t. 23. ed. picta. t. 30. Hab. in fruticetis montosis in Domingo. Flor. parvi, candidi. h

8. *Asperuginis*, pedunculis racemosis, folliculis siliiformibus, fol. oblongis acutis superne asperis, caule volubili. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 531. Apocynum scandens, siliquarum externa parte vestibus haerente. Plum. ic. 26. Hab. in fruticetis siccissimis Jamaicae, Hispaniolae. Antecedenti similis. h

9. *torulosa*, pedunc. subracemosis, fol. lanceolatis acuminatis, follic. torulosis longioribus. Jacq. amer. 33. t. 27. ed. picta. t. 34. Swartz. obs. 105. Brown. jam. 181. t. 16.

f. 2. Lam. ill. t. 174. f. 1. Hab. in Jamaica. h

10. *umbellata*, pedunc. umbellatis, fol. ovatis obtusis mucronatis, caule volubili. Jacq. amer. 30. t. 22. ed. picta. t. 29. Sloan. jam. 89. hist. t. p. 207. t. 131. f. 2. Hab. in Jamaica. Flor. magni, albi, tubo longissimo viridant. Jacq.

11. *circinalis*, pedunc. axillaribus articulatis multifloris, laciniis corollae undulatis, fol. ellipticis, caule volubili. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 533. Hab. in sepibus montosis Hispaniolae. h

12. *floribunda*, racemis compositis corymbosis, fol. ellipticis acuminatis, costatis, ramis erectiusculis. Willd. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 534. Hab. in fruticetis, montium Jamaicae. h

13. *trifida*, pedunc. trifidis multifloris, fol. ovato-oblongis acuminatis. Jacq. amer. 31. t. 24. ed. picta. t. 31. Hab. in America. Flor. tubo longo purpurascens, limbo sordide virente. J. h

14. *repens*, pedunc. racemosis, fol. lanceolato-linearibus angustis, follicul. torulosis. Jacq. amer. 31. t. 28. ed. picta. t. 35. Hab. in Domingo rupestribus et ad marg. sylvarum. h

15. *corymbosa*, racemis corymbosis, staminibus eminentibus, fol. lanceolato-ovalibus. Jacq. amer. 34. t. 30. et picta. t. 37. Swartz. obs. 105. Hab. in sylvaticis insulae Domingo. h

16. *costata*, pedunc. cymosis, fol. elliptico-lanceolatis acuminatis. Forst. prod. n°. 123. Rheed. g. t. 14. Hab. insulis Societatis. h

17. *spicata*, spicis axillaribus, brevibus, staminibus eminentibus, fol. subovatis distichis. Jacq. amer. 34. t. 29. ed. picta. t. 36. Hab. in sylvis Caribaganae, ubi arbores vicinas ad 60 pedum altitudinem scandit. h

18. *siphilitica*, fol. ovatis subpetiolatis glaberrimis costatis, paniculis dichotomis, floribus spicatis. Lin. suppl. 167. Hab. in Surinamo. Decortum herbae Surinamensis in Siphilitide notissimum. h

19. *glandulosa*, fol. cordato-subrotundis acuminatis tomentosis glanduliferis, pedunc. racemosis. Flor. Per. 2. p. 19. t. 115. In Peruviae nemoribus. Plant. tomentosa. Caul. ad articulationes et folia ad cordaturam et per petiolis (et stipulas) glandulifera. h

20. *laxa*, fol. cordatis acutis, basi multiglandulosis, pedunc. longis laevis racemosis

paucifloris. Flor. Per. l. c. t. 131. f. b. Hab. in Pillao nemorib. Plant. parum villosa. Rami filiformes subvillosi. *h*

21. *acuminata*, glabra, fol. ovatis oblongisque acuminatis basi glandulis 5, racemis brevibus, pedicellis geminis. Flor. Per. t. 134. f. a. Cresc. in sylvis Chinchao ad Macora praedium. Cor. alba, extus purpurea.

22. *hirsuta*, fol. oblongo-ovalibus acuminatis basi excavatis, subtus villosis, racemis multifloris. Flor. Per. 2. p. 19. t. 136. In Peruviae nemorib. Fol. ad basin glandula 1-2-praelia. Cal. in flore acutus, in fructu obtusus. L. c.

23. *subsagittata*, fol. oblongo-sub-sagittatis acuminatis; angulis posticis obtusis, pedunc. paucifloris. Flor. Per. l. c. Cum priore. Fol. margine ciliata, basi glandulosa. L. c.

24. *puberula*, fol. ovali-lanceolatis basi utrinq. acutis subtus puberulis, flor. parvis fasciculato-corymbosis. Michaux. Flor. t. p. 740. L. *difformis*. Walt? In Carol. inferioris sylvis. Follic. graciles, 1/2 pedales.

25. *scholaris*, fol. subverticillatis oblongis, follic. filiformibus longissimis, umbellis compositis. L. Lignum scholare. Rumph. 2. t. 82. Rheede 1. t. 45. Hab. in India. *h*

*Obs.* Arbor ramis ad genicula tantum foliatis, cujus lignum ad varia utensilia adhibetur, inter alia ex eo tabulae conficiuntur, superficie altera figuris variis ornata, altera laevissima, in qua pueri in scholis scribere solent.

26. *truncata*, cymis pedunculatis subcaedosis, lobis corollarum truncatis. Lam. n. 2. p. 340. Catesb. Car. 2. p. 53. t. 51. Hab. in ins. Bahama. E. *biflorae* submillis firmatur. *†*

27. *lappulacea*, pedunc. racemosis bidentatis, flor. oppositis follic. utrinque hispidolappaceis. Lam. l. c. Plum. Spec. 2. t. 145. 2. t. 70. Burm. Amer. t. 26. Cresc. a Domingo. Cor. alba. *†*

28. *succulenta*, aculeis binis extrafo-  
aculis, fol. linearibus subtus tomentosis,  
rac. hypocrateriformibus. Lin. suppl. 67.  
25. ad Cap. b. spei. Filam. barbata. *h*

29. *bispinosa*, aculeis binis extrafo-  
liis, fol. lanceolatis glabris, cor. hypocrateriformibus. Lin. suppl. p. 107. Hab. ad 2. b. spei. Ver. prioris? Frutices hi hini-  
teriores succulentius laetescentes bispinosi,  
absque ulla fructificatione Euphorbia  
deres. L. *h*

622. *PERGULARIA*. Contorta. Nect. ambiens genitalia cuspidibus 5 sagittatis. Cal. hypocrateriformis: tubo cal. longiore. Folliculi 2, saepius asperi.

1. *glabra*, fol. ovatis acutis glabris, caula fruticoso. Willd. Spec. 2. p. 124. Flot. pergularis. Rumph. 5. t. 29. f. 2. Hab. in India. *h*

2? *edulis*, fol. ovatis integris glabris, caule herbaceo volubili. Thunb. prod. 38. Hab. ad Cap. b. spei. *†*

*Obs.* Est *Cynanchi* species secundum Andrew. Repos. p. 8. t. 185.

3. *tomentosa*, fol. cordatis tomentosis. L. Vahl. symb. 1. p. 23. Asclepias cordata. Forsk. descr. 49. Hab. in Arabia. *h*

4. *purpurea*, fol. cordatis glabris, cor. laciniis linearibus oblongis glabris, umbel. Vahl. symb. 3. p. 44. Asclepias (cordata). Burm. ind. 72. t. 27. f. 2. Hab. in India orientali, China

5. *japonica*, fol. cordatis glabris, cor. laciniis ovatis interne villosis, umbel. simplicibus. Thunb. jap. 111. Hab. in Japonia.

*Obs.* Cel. Andrew, qui hoc genus ad classem Gynandriam decandriam emendat, sequentem nectarii deest characterem: Nectarium duplex, genitalia involvens: squamulae exteriores 5 euspilatae, quinque interiores (quae vera filamenta?) membranae: singula occultans stamina (antheras?) duo alterna (quae tunc non pistillo uti in Gynandris sunt annexa. Secundum eundem P. *glabra* (eul fol. sere ovata sunt) et *japonica* eandem efficit speciem, ab eo P. *minor* denominatam et depictam, nec non P. *purpurea* a *tomentosa* haud diversa, quas sub nomine P. *odoratissima*, fol. senioribus subto-  
mentosis, cor. viridibus, conjunxit; vid. Ejus Rep. t. 185.

623. *PERIPILOCA*. Contorta. Cor. rotata 5-partita; corona (Nect.) urceolata 5-fida, faucem ambiens, setas 5 exrens. *Stigma* capitatum, 5-gonum. Folliculi 2.

1. *græca*, floribus interne hirsutis trinerviis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1248. Jacq. Misc. 1. p. 11. t. 1. f. 2. Lam. ill. t. 177. Hab. in Syria, Sibiria. Stigma 10-crenatum. *h*

2. *mauritiana*, fol. ovatis longe acuminatis, flor. racemosis, fruct. horizontaliter

patentib. Poir. in Enc. bot. 5. p. 188. Cyn. mauritanum. Lam. Enc. 2. p. 236. Rumph. 5. t. 10. Rheed. 9. t. 11. In India.

3. *Secamone*, floribus interne hirsutis paniculatis, fol. lanceolato-ellipticis. Secamone. Alp. aegypt. 133. t. 134. Hab. in Aegypto. Differt a praecedente primo intuitu floribus minutis copiosis, h.

4. *laevigata*, cor. glabris, laciniis obtusis, cymis trichotomis, fol. oblongo-lanceolatis venosis laevibus, caule glabro. Willd. Ait. Kew. 1. p. 301. P. puniceifolia caule fruticoso lento, fol. lanceolatis, Cav. ic. 3. p. 9. t. 217. Hab. in Canariis. Cor. interne luteo-viridis, laciniis macula fulva notatis. W. h.

5. *angustifolia*, cor. glabris, laciniis emarginatis, cymis trichotomis, fol. lanceolatis aveniis laevibus, caule glabro. Willd. p. 1249. Desf. Atl. 1. p. 209. P. fruticosa, fol. aveniis angusto-lanceolatis perennantibus, folliculis horizontalibus basi oppositis. Billard. ic. pl. Syric. 2. p. 11. t. 7. Hab. in Syria et Atlant. Cor. interne purpureascentis, in medio macula alba notata. h.

6. *esculenta*, glabra, fol. linearibus subulatis, racemis elongatis simplicibus, floribus interne nudis. Lin. suppl. 168. Roxb. corom. 1. p. 13. t. 11. Pluck. amal. 19. t. 359. f. 6. Hab. ad littora fluminum Zeylonae et Malabaricae. Var. latitudine foliorum. W. h.

7. *emetica*, cor. glabris, corymbis paucifloris axillaribus, fol. linearibus lanceolatis aveniis. Willd. p. 1250. Retz. obs. 2. p. 14. Willd. phytog. 1. p. 6. t. 5. f. 2. In Ind. h.

8. *indica*, spicis axillaribus imbricatis, fol. ellipticis obtusis mucronatis, caule glabro. Willd. p. 1251. Burm. zeyl. 18. t. 83. f. 1. Pluck. mant. 17. t. 359. f. 2. Hab. in Zeylona. h.

9. *capsularis*, fol. lanceolatis integerrimis oppositis, cymis axillaribus diffusis. Forst. profl. n.º. 126. Hab. in Nova Zelandia. +

10. *africana*, fol. ovatis acutis, flor. corymbosis, caule hirsuto. Willd. Jacq. misc. 1. p. 13. t. 1. f. 3. Comm. rar. 18. t. 18. Pluck. alm. 37. t. 137. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. purpurasc. Nect. album campanulatum, 5-gonum, ore todentato, vagina interior albida, cum nect. conglutinata ambiens pistillum. Jacq.

11. *tunicata*, fol. oblongis cordatis acuminatis, floribus umbellatis. Willd. ols. 2. p. 15. phytog. Retz. 1. p. 7. t. 5. f. 1. Hab. in Tranquebaria.

12. *sylvestris*, fol. subrotundo-ovatis reticulato-venosis, subus pubescentibus, floribus umbellatis. Retz. obs. 2. p. 15. Willd. l. c. t. p. 7. t. 5. f. 3. Hab. in sylvaticis Zeylonae. h.

13. *albicans*, fol. ovatis acuminatis, racemis paucifloris, caul. suberoso candidante. Encycl. bot. 5. p. 191. Hab. in India orient. Commers. Non confundi debet cum Cynancho tuberoso L. quocum cortice convenit. Fruct. ignotus. h.

14. *cordata*, fol. ovato-cordatis mucronatis, flor. axillaribus subumbellatis, pedunc. capillaribus. Enc. bot. l. c. Hab. in India. Sonner. P. indicæ affinis, sed tota glabra. h.

15. *parviflora*, fol. ovato-sublinearibus, flor. minimis subsessilibus, caul. volubili. Enc. bot. 5. p. 197. In India a Sonnerat lecta. Non confundenda dicitur eum Cynancho parviflora. Sw., cujus habitum refert. h.

16. *virgata*, fol. lanceolatis, flor. longe spicatis subnudis, caul. virgatis, ramis florantibus lateralibus. Enc. bot. l. c. In Ind. orient. Cor. albida, parva. h.

624. CYNANCHUM. Contorta. Cor. rotata. Nect. cylindricum, 5-dentatum, cor. fauce ambiens, simplex. Folliculi 2.

1. *viminale*, caule volubili perenni aphylo. L. Euphorbia viminalis. L. Spec. plant. 2. p. 649. Bass. Act. bonon. Alp. aegypt. 190. t. 190. Hab. in Africae maritimis et Indiae nemorosis. Caul. nudus, crassitudine calami. h.

2. *filiforme*, caule erecto simplicissimo, fol. linearibus, floribus verticillatis axillaribus. Lin. suppl. 169. C. fol. linearibus planis. Thunb. profl. 46. Hab. in Cap. b. spei.

3. *crispum*, caule erecto herbaceo, fol. lanceolatis crispis, floribus lateralibus. Thunb. profl. 46. Cum priore.

4. *tenellum*, caule herbaceo subvolubili, fol. ovato-oblongis. Lin. suppl. 168. Hab. in Nova Granada.

5. *obtusifolium*, caule volubili herbaceo, fol. oblongis apice rotundatis cum acumine, umbellis lateralibus. Lin. suppl. 169. cfr. Lam. enc. 2. p. 236. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. virides subumbellati. W. ☉

6. *capense*, caule volubili undique coniformi, fol. subcordato-ovatis, pedunculis multifloris.

multifloris. Lin. suppl. 168. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *acutum*, caule volubili herbaceo, fol. cordato-oblongis glabris. Apocynum latifolium. Clus. hist. 1. p. 125. Hab. in Sicilia, Hispania, Astracan. Cymae poliferae. W. T.

8. *rostratum*, caule petiolisque hirsutis, fol. cordato-oblongis, petalis lanceolatis planis. Vahl. symb. 3. p. 45. Hab. in insula Trinitatis. Cor. ante explicationem ovato-acuminato-rostrato.

9. *granulosum*, caule pedunculisque hirsutis, fol. cordato-ovatis acuminatis, petalis ovato-acuminatis. Willd. p. 1254. Cav. ic. 2. p. 14. t. 21. Hab. in America calidior. Caulis pilis rufis. Cor. maxima hujus generis, viridis, coriacea. T.

10. *nigrum*, caule volubili, fol. oblongo-cordatis glabris acutis, racemis simplicibus paucifloris. Willd. Cav. ic. 2. p. 45. t. 159. Hab. in Mexico. Cor. nigrae. T.

11. *racemosum*, caule volubili fol. ovato-cordatis glabris acuminatis, racemis simplicibus multifloris. Willd. Jacq. amer. 81. t. 54. ed. pict. t. 80. Hab. in Carthago. Cor. candidae, parvae. T.

12. *excelsum*, caule volubili, fol. glabris cordato-lanceolatis, caps. longis angustis acutis. Desf. Atl. 1. p. 212. Hab. in palmetis prope Tozer. Fol. glauca. T.

13. *Ipecacuanha*, caule volubili pubescente, fol. cordato-ovatis cuspidatis subtus abescentibus, umbell. simplib. paucifloris. Willd. Jahrb. d. Pharm. 1. 3. p. 3. C.

14. *mitiorum*, fol. ovato-lanceolatis, corymb. etc. Lam. enc. 2. p. 235. Asclepias rhombica. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1270.

15. *in Zeylone* sylvis et in ins. Franciae. ul. vim vomitoriam ad dosin 24. gr. ob-

16. *exceret*. Cal. lacini. actaeae.

17. *tomentosum*, caul. volubili tomentoso, fol. subcordato-ovalis mucronatis utis tomentosis, umb. subquincifloris. M. L. C. In Ind. orient.

18. *maritimum*, caule volubili, foliis latis hirsutis subtus tomentosis, pedunc. regatis. Jacq. amer. 81. t. 56. ed. pict. 2. Hab. in Terra Bomba Amer. merica. Cor. atropurpureae. h

19. *suberosum*, caule volubili hirsuto, ovato-cordatis acuminatis, corymbis aribus, laciniis cor. lanceolatis. Willd. elth. 300. t. 229. f. 256. Hab. in rica calidior. h

20. *carolinense*, caule volubili herbaceo, fol. ovato-cordatis acutis hirsutis,

flor. subumbellatis, cor. obtusis. Jacq. ic. 2. t. 342. Coll. 2. p. 288. Hab. in Carolina. T.

21. *obliquum*, caule volubili herbaceo hirsuto, fol. cordatis acutis villosis, florib. umbellatis, petalis obliquis ad oras revolutis. Jacq. ic. 2. t. 341. Collect. 1. p. 148. Hab. in Carolina. T.

22. *hirtum*, caule volubili fruticoso inferne suberoso fixo, fol. ovato-cordatis. L. Moris. S. 15. t. 3. f. 61. Hab. in America. T.

23. *crispiflorum*, caule volubili, foliis subtus villosis oblongis cordatis, sinu clauso, petalis apice crispis. Plum. ic. 210. t. 216. f. 1. Hab. in fructetis Jamaicae et ad isthmum Darien. h

24. *prostratum*, caule prostrato herbaceo, fol. reniformi-cordatis acutis subtus tomentosis. Willd. Cav. ic. 1. p. 5. t. 7. Hab. in Mexico. T.

25. *monspeliacum*, caule volubili herbaceo, fol. reniformi-cordatis acutis glabris. Cav. ic. 1. p. 44. t. 60. Jacq. ic. 2. t. 340. Collect. 2. p. 168. Hab. in Hispania et Narbonne maritima. h

26. *sibiricum*, caule volubili herbaceo, fol. articulato-cordatis glabris. Willd. in N. Act. herol. v. 2. t. 6. f. 1. Hab. in Sibiria. Non confundendum cum C. erecto.

27. *extensum*, caule volubili herbaceo, hirsuto, fol. reniformi-cordatis acutis, petalis acutis, margine hirsutis. Jacq. ic. 1. t. 54. Msc. 2. p. 353. C. cordifolium. Retz. obs. 2. p. 15. Hab. in India orientali. h

28. *reticulatum*, caule volubili, foliis acuminatis glabris planis, umbellis axillaribus. Willd. p. 1258. Retz. obs. 2. p. 15. Hab. in India orientali. h

29. *undulatum*, glabrum, caule volubili fol. oblongis acuminatis, basi attenuatis, undulatis, umbellis capitatis. Willd. Jacq. amer. 85. t. 58. ed. pict. t. 84. Hab. Carthago in monte de la Popa. Cal. cinereus. Cor. violacea. h

30. *parviflorum*, caule volubili filiformi, fol. ovatis apice subulatis, umbellis subsessilibus. Swartz. Fl. ind. occident. 1. p. 537. Plum. ic. 213. f. 1. Hab. in fructetis sylvaticis montosis Indiae occidentalis. h

31. *erectum*, caule erecto divaricato, fol. cordatis glabris. L. Jacq. hort. t. 38. In Syria. h

32. *hastatum*, fol. subhastato-lanceolatis auriculis rotundatis, flor. fasciculatis subsessilibus. Hab. in Africa.

30. *angustifolium*, caul. volubili, fol. linearibus angustis, umbellis longe pedunculatis. Hab. ad littora maris in Carolina. Michaux, Fl. Ex Herb. Rich.

† *Gonolobium*. Cor. rotata, 5-partita. Appendix (nectar. L.) brevissima, inclusa. Stylus discoideo-3-gonus. *Folliculi* ut plurimum costati seu angulati.

31. *macrophyllum*, sarmentis petiolisque hirsutis, fol. amplis abrupte acuminatis puberulis, cor. laciniis ovali-lanceolatis. Michaux, Flor. 1. p. sig. sub *Gonolobo*. Vincetoxicum gonocarpos. Walt. Hab. in Carolinae sylvis.

32. *hirsutum*, sarmentis petiolisque hirsutissimis, fol. sensim acuminatis utrinque pubescentibus, cor. laciniis ovali-lanceolatis. Michaux, l. c. Vincet. acanthocarpos. Walt. Cum priore. Follic. oblongi sparsim muricati.

33. *laeve*, sarment. glabriusculis, fol. subeonohleo-cordatis, folliculis laevibus. Michaux, l. c. sub *Gonolobo*. Hab. in dumetosis ripariis flum. Mississipi.

34. *obtusifolium*, fol. cordatis suborbiculatis subtomentosis mollibus. Hab. ex herbario Rich.

35. *planiflorum*, caul. volubili, fol. cordatis glabris subius tomentosis, pedunc. ahracemosi. L.<sup>s</sup> Jacq. amer. ed. pict. t. 81. Hab. in Carthagen. Amer. Flor. virentes. J.

36? *album*, caule volubili, fol. oppositis ovato-acutis inferne albis umbel. solitariis multifloris. Cav. ic. 4. p. 5. t. 310. sub *Asclep.* In Peru. Cor. rotata, sordide alba. Cornic. clausi, candidi. C.

†† *Vincetoxicum*. Cor. erecta. *Nectarium* aquamulas 5. callas 5, carnosos retortas sistens.

37. *Vincetoxicum* (vulgare), caule erecto, fol. ovatis acuminatis margine tenuissime ciliatis. Willd. Sp. p. 1268. sub *Asclepias*. Flor. dan. t. 849. Vincetoxicum officinale. Moench. method. p. 717. Hab. in montosis calcareis et in sylvaticis. T.

38. *nigrum*, caul. superne subvolubili, fol. ovatis basi barbatis. Lin. sub *Asclep.* Hab. in Italiae et Galliae meridionalis collibus. Cor. nigrescens. T.

*Obs.* Ob appendices uniformes solidas duae hae species cum *Cynanchis* majorem affinitatem habent, quam *Asclepiadibus*; an potius distinctum efficiant genus?

615. *APOCYNUM*. Cor. campanulata. Filamenta 5, cum staminibus alterna. Styl. subnullus. *Stigma* latum. Folliculi longi, lineares.

1. *filiforme*, caule decumbente herbaceo hirsuto, foliis lineari-filiformibus, floribus umbellatis. Thunb. prod. 47. Willd. 2. p. 1259. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *hastatum*, caule decumbente herbaceo, fol. hastatis. Thunb. l. c. A. minutum. Lin. suppl. 169. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. filiform. Umb. simplex subsericeo. T.

3. *androsamifolium*, caule rectiusculo herbaceo, fol. ovatis utrinque glabris, cymis terminalibus glabris. L. Dod. mem. 59. t. 5. p. 15. t. 3. f. 16. Hab. in Virginia, Canada. Flor. rosei, muscipae. T.

4. *cannabinum*, caule rect. herbaceo, fol. oblongis subius tomentosis, cymis lateralibus folio longioribus. Ait. Kew. 1. p. 301. Michaux. Flor. 1. p. 122. Moris. 1. 15. t. 3. f. 14. Hab. in Canada, Virginia. Cor. pallidiuscula virides. Fol. in cultu magis glabra. T.

5. *hypericifolium*, caule erectiusculo herbaceo, fol. oblongis cordatis glabris, cymis folio brevioribus. Aiton. p. 301. Jacq. hort. 3. p. 37. t. 66. Hab. in America boreali. T.

6. *venetum*, caule erectiusculo herbaceo, fol. elliptico-lanceolatis mucronatis, margine denticulato-scabris. Willd. Hab. in Adriatici maris insulis. T.

7. *paniculatum*, caule frutescente volubili, fol. ovato-lanceolatis acutis glabris, floribus terminalibus et axillaribus paniculatis. Lam. encyclop. 1. p. 212. A. Acouch. Aubl. guj. 1. p. 174. t. 107. Hab. in pratis Sinematiensibus Gujanae. T.

8. *umbellatum*, caule volubili frutescente, fol. ovatis acuminatis subius tomentosis, cyma terminali. Willd. Flor. purpurascens. Aubl. guj. 1. p. 275. t. 106. Hab. in Cajenna. T.

9. *tiliaefolium*, caul. volubili subfruticoso, fol. cordato-subrotundis acuminatis longe petiolatis. Lam. enc. 1. p. 214. Rheed. 9. t. 15. Rumph. 5. t. 175. f. 27. Hab. in India. Sonnerat. Flor. magni in fasciculo umbelliformi axillari.

10. *cotiniifolium*, fol. rotundatis obtusis petiolatis viridibus, flor. parvis corimbo terminalibus. Lam. l. c. p. 215. Hab. in ins. Java.



11. *reticulatum*, caule volubili perenni, fol. ovatis venosis. Rumph. 5. t. 40. Hab. in India. h

12. *cordatum*, caule volubili hirsuto, fol. ovatis subtus villosis. Thunb. prod. 47. Hab. ad Cap. b. spei. h

13. *lanceolatum*, caule volubili herbaceo striato glabro, fol. lanceolatis, umbella triflora. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *triflorum*, caule volubili herbaceo piloso, fol. lanceolatis, umbellis lateralibus subtrifloris. Thunb. Lin. suppl. 169. Hab. ad Cap. b. spei.

15. *lineare*, caule volubili, herbaceo glabro, fol. lineari-lanceolatis, floribus paniculatis. Thunb. A. fol. linearibus planis, umb. axillaribus compositis. Lin. suppl. 169. Hab. ad Cap. b. spei.

† *Quirivella*. Caps. ovalis, cal. tecta, 1-locularis, 5-valvis. Sem. ...? Flor. ...?

16. *frutescens*, caule erecto frutescente, fol. lanceolato-ovalibus, cor. acutis, fauce villosis. Lin. Willd. 2. p. 1260. Flor. Zeyl.

12. f. 1. *Quirivella zeylanica*, fol. ovato-lanceolatis subacuminatis, flor. racemosis axillaribus. Poir. in Enc. bot. vol. 6. (ined.)

23. Lam. enc. 1. p. 215. Kirwaet Zeylonensium. Hab. in Zeylona.

*Obs.* Hanc plantam non hujus generis, sed ejusdem familiae esse dicitur. In vivis se melioribus specimenibus hinc ulterius examinari debet.

6. **ASCLEPIAS**. Contorta. Cor. rotata, (saepius) reflexa. Nect. 5. ovata, concava, corneolum exsertentia. Anth. corneae longitudinaliter dehiscentes.

\* *Foliis nullis.*

*aphylla*, caul. aphylo. Thunb. prod. 47. Willd. Sp. 2. p. 1262. Hab. ad Cap. b. spei.

\* \* *Foliis oppositis planis.*

*undulata*, fol. sessilibus oblongis lanceolatis, undulatis glabris, petalis ciliatis. pl. 312. Comm. rar. 16. t. 16. Hab. ad b. spei. h

*crispa*, fol. corlato-lanceolatis unguis scabris oppositis, umb. terminalibus. suppl. 170. A. undulata, fol. revolutis pilosis. Syst. veg. p. 214. Comm.

17. 1. 17. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. purci. h

*pubescens*, fol. ovatis venosis nudis,

caule fruticoso pedunculisque villosis. J. Moris. 3. s. 15. t. 3. f. 35. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. purpurascens. h

5. *mucronata*, fol. oblongis mucronatis glabris, umbellis axillaribus. Thunb. prod. 47. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *procera*, fol. obovato-oblongis, petiolis brevissimis, cor. subcampanulatis. Ait. Kew. 1. p. 305. A. gigantea. Jacq. obs. 3. p. 17. t. 69. Houttuyn. 5. t. 44. Hab. in Persia. h

7. *gigantea*, fol. obovato-oblongis, petiolis brevissimis, laciniis cor. reflexis involutis. Ait. Kew. 1. p. 305. Rheed. 2. t. 37. Sch. thes. 1. t. 26. f. 1. Hab. in India orientali. Valde venenata. Nectarium laminas solidas conniventes sistit. Cor. albo-rubroque variegata. h

8. *grandiflora*, fol. petiolatis oblongis pilosis, caule simpliciter erecto, flor. axillaribus pedunculatis. Lin. suppl. 170. Habit. ad Cap. b. spei. Umb. nulla. Flores colore Fritill. Melaeagridis tessellati. L.

9. *carnosa*, fol. ovatis carnosissimis glaberrimis. Lin. suppl. 170. Hab. in China. †

10. *syriaca*, fol. ovalibus sulcatis tomentosis, caule simplicissimo, umbellis nutantibus. L. Blackw. t. 521. Hab. in Virginia, circa Astracan. Planta utilissima. Semen pro serico et caules lini adiuntur praeparari possunt.

† *illinoensis*, caule simpl., fol. lanceolato-oblongis sensim acutis subtus tomentosis, umbel. subnutantibus tomentosis. A. syriaca. P. Michaux. Flor. 1. p. 115. In pratis illinoensibus.

11. *obtusifolia*, foliis amplexicaulibus oblongis rotundato-obtusis undatis, umbel. terminali longius pedunculata glabra, corniculis exsertis. Michaux. l. c. Hab. a Virginia ad Carolinam.

12. *hybrida*, caul. simplicissimo subtomentoso, fol. petiolatis ovalibus puberulis, umbel. apyxis terminalibus. Michaux. A. variegata. Walt. Hab. in Carolina. Cor. purpurascens: limbo albente.

13. *amplexicaulis*, tota glauca, caul. decumbentibus simplicibus, fol. cordatis amplexicaulibus, corniculis delitescens, compresso-lingulatis. Michaux. p. 116. Hab. in pascuis aridis subulosis in Georgia. Fol. purpureo-venosa. Umb. e summis axillis et terminales.

14. *humistrata*, fol. sessilibus cordatis

oppositis, caul. prostrato, umbel. axillaris. Walt. Flor. carol. p. 105. Hab. in Carolina.

\* 15. *amoena*, fol. ovatis subtus pilosiusculis, caule simplici bifariam puberulo, umbellis nectarisque erectis. L. Michaux. Flor. p. 118. In America septentrionali. Habitus prioris. Petal. purpurea, append. longis roscis. M.

16. *purpurascens*, foliis ovatis subtus villosis, caule simplici, umbellis erectis, nectaris resupinatis. Dill. elth. 32. t. 28. f. 31. Hab. in Carolina. Affinis *A. syriacae*, ut sequens. T.

17. *variegata*, fol. ovatis rugosis nudis, caule simplici, umbellis subsessilibus; pedicellis tomentosis. L. Pluck. alm. 34. t. 77. f. 1. Hab. in Amer. boreali. T.

18. *curassavica*, fol. lanceolatis petiolatis glabris nudis, caule simplici, umb. erectis solitariis lateralibus. Mill. Swartz. obs. 106. Sloan. hist. 2. t. 129. Dill. elth. 34. t. 30. f. 33. Hab. in Curassao. Flor. aurantii, pulchri. Folliculi ad latera denticulati. h

19. *nivea*, fol. ovato-lanceolatis glabrisculis, caule simplici, umb. erectis lateralibus solitariis. L. Dill. elth. 33. t. 29. f. 32. Plum. sp. 2. ic. 30. Hab. in Virginia et America calidior. Cor. viridis nectar. nivea. Folliculi edentuli. T.

20. *laniflora*, fol. planis lineari-lanceolatis, caule fruticoso, umbellis lateralibus solitariis, cor. hirsutis. Vahl. symb. 1. p. 23. t. 7. Hab. in Arabia felici. h

21. *parviflora*, fol. lanceolatis acuminatis glabris oppositis basi attenuatis, caule anfractuoso erecto, umbellis lateralibus solitariis. Alt. Kew. 1. p. 307. Hab. in Carolina, Florida. T.

22. *incarnata*, caule erecto superne ramoso tomentoso; fol. lanceolatis utrinque subtomentosis lanuginosis, umbel. pluribus, origine geminis, cornic. exsertis. Michaux. p. 115. Jacq. hort. 1. 107. Hab. in Canada, Virginia, in pratis humilibus Illinoensis.

Obs. Colla, dicit Michaux. l. c., omnibus partibus minor, multo magis pubescit, et Willdenow. l. c. p. 1267. fol. determinat glabra.

β. *pulchra*, fol. lanceolatis subtus pubescentibus, caul. superne diviso, umbellis erectis geminis. Willd. p. 1267. Hab. in America boreali. T.

α. *debilis*, glaberrima, caule debili erecto simplici, fol. petiolatis ovali-lan-

ceolatis utrinque acutis membranaceis, pedicel. capillaribus. Michaux. p. 116. Hab. in Carol. aquosis umbris. Flor. albi.

24. *citrifolia*, fol. ovatis undulatis subtus discoloribus pubescentibus, umb. terminali, caul. erecto simplici. Willd. Jacq. ic. 2. t. 33. Collect. 2. p. 250. Hab. in Amer. T.

25. *decumbens*, fol. villosis, caule decumbente. L. Cron. virg. p. 27. Hab. in Virginia. T.

26. *lactifera*, fol. ovatis, caule erecto, umb. prolifris brevissimis. L. Hab. in Zeylona. Succ. instar lactis inservit. Burm. T.

27. *volubilis*, arborea volubilis, fol. oppositis planis ovatis integerrimis acuminatis umbellis erectis. Linn. suppl. 170. Hab. in Zeylona. h

28. *alexicaea*, caule volubili, fol. inferioribus cordatis, superioribus ovatis, umbellis sessilibus. Jacq. Collect. 2. p. 101. Rheed. 9. t. 13. Hab. in Zeylona. T.

29. *viminalis*, caule suffrutescente volubili filiformi, fol. oppositis lanceolatis glabris, umb. lateralibus multifloris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 539. Sloan. jam. 89. hist. 1. p. 207. t. 131. f. 1. Hab. in Jamaica austr. lis fruticetis sabulosis juxta rivos. T.

30. *laurifolia*, caule erecto, fol. subsessilibus ovali-lanceolatis sensim angustatis acutissimis glabris margine asperiusculis. Michaux. p. 117. Hab. in Georg. ad sinum Althamala. Cor. subtus viridescens, supra cum appendiculis purpurea. Affinis *A. amoenae*. L. et var. sequentis? M.

31. *paupercula*, caul. erectiusculo glabro oligophyllo, sursum nudo, fol. linearib. longissimis, umb. terminalib. paucifloris. Michaux. p. 118. A. lanceolata Walt. ? In Carol. infer. herbis humidis. Cor. rubella, append. lutea.

32. *graminea*, fol. linearib. graminis op. ostis, caul. ramoso, umbel. terminalib. cornicul. erectis mucronatis. Lam. enc. 1. p. 283. In India. Caul. tenuis, subangularis.

\*\*\* *Foliis lateralibus revolutis.*

33. *arborescens*, fol. revolutis ovatis, caule fruticoso subvillosa. Burm. afr. 31. t. 13. Hab. in Cap. b. spec. montibus. Cor. albae. h

34. *fruticosa*, fol. revolutis linearilanceolatis, caule fruticoso. Linn. Herm. Mill. dict. 1. 45. Pluck. alm. 36. t. 138. f. 2. β. *crassifolia*. L. Syn. Veg. p. 214. Hab. ad Cap. b. spec. Nect. compressa absque

angue, ejus loco auriculæ duæ, longiores, reflexæ. L. h

35. *sibirica*, fol. revolutis linearilanceolatis oppositis ternatisque, caule decumbente. Gamel. sib. 4. p. 77. n. 21. Murr. comment. goeting. 1779. p. 23. t. 7. Hab. in Sibiria. Var. fol. alternis, binis et ternis. T

36. *davurica*, fol. linearibus subulatis piloso-ciliatis oppositis, umb. pedunculatis axillariibus, calycib. pilosis. Willd. p. 1272. Hab. in Davuria. Distincta fol. brevioribus, flor. umbellatis lere magnitudine A. syriacæ. W. T

37. *setosa*, fol. linearibus revolutis oppositis, caule fruticoso. Vahl. symb. 1. p. 23. t. 8. A. setosa. Forsk. Hab. in Arabia felici. h

38. *filiformis*, caule erecto, fol. filiformibus, umb. lateralibus elongato-pedunculatis. Lin. suppl. p. 169. Thunb. prod. 47. lab. ad Cap. h. spei.

Obs. Acel. filiformis, Apoc. filiforme, Cyn. filiforme ut simillima inter se diversa floribus.

39. *verticillata*, fol. revolutis linearibus triticillatis, caule erecto. L. Pluck. mant. 17. 336. f. 4. Hab. in Virginia. Pedunc. oppositifolii. Flor. albi.

40. *mexicana*, fol. revolutis linearilanceolatis scnis, caule erecto. Willd. p. 1273. fol. verticillatis scnis lanceolatis. Cav. 1. p. 42. t. 58. Hab. in Mexico. S

\*\*\*\* *Foliis alternis.*

41. *longifolia*, caule decumbente foliis e sparsis prælongo-linearibus puberulis. Choux. p. 116. Var. fol. subverticillatim proximatis. In Georg. occidentalis sylv. genit. corollæ generatib. brevior et corulo orbata. M.

2. *Linaria*, fol. sparsis subulatis canalicatis, umb. lateralibus multifloris. Cav. 1. p. 42. t. 57. Hab. . . . T

3. *rubra*, fol. alternis ovatis, umb. ex cni pedunculo communi pluribus. L. Sp. Gron. virg. 27. Hab. in Virginia.

4. *tuberosa*, foliis alternis lanceolatis, caule divaricato piloso. L. Michaux. 1. p. 117. (qui fol. dicti sparsa.) m. lugdb. 646. t. 647. Dill. clh. 35. o. f. 34. Hab. in Amer. boreali. T

5. *floridana*, fol. alternis lanceolatis, subtus pubescentib. umbel. terdibus, caule simplice piloso. Lam.

enc. 1. p. 284. Pluck. Amalth. 18. t. 359. f. 47 Hab. in Florida. +

627. *CEROPEGIA*. Contorta. *Folliculi* 2 erecti. *Sem.* plumosa. *Cor.* urecolatæ limbus connivens.

1. *Candelabrum*, fol. ovatis mucronatis, umbelli pendulis, floribus erectis. Willd. Sp. 2. p. 1275. Rheed. g. t. 16. Hab. in Malabar. T

2. *tuberosa*, fol. ovatis acutis, umbel. erectis, radice repente tuberosa. Willd. Roxb. corom. 1. p. 12. t. 9. Hab. in Indiæ locis inculis. T

3. *bulbosa*, fol. obovato-ellipticis cuspidatis, umbellis erectis, radice bulbosa. Willd. l. c. Roxb. 1. p. 11. t. 7. Hab. in siccia nemorosis Indiac. T

4. *biflora*, fol. ovatis, pedunc. bifloris. Willd. Lin. Pl. 291. 110. Hab. in Zeylona. Flor. recte extensi. T

5. *juncæa*, fol. lanceolatis sessilibus, pedunc. ambifloris, caule carnosio. Willd. Roxb. 1. p. 12. t. 10. In Indiæ siccis inculis. Flor. maximi albo-virescentes striis purpureis pulchre variegati. W. T

6. *acuminata*, fol. lanceolatis longe acuminatis, umb. multifloris rectis, radice bulbosa. Willd. p. 1276. Roxb. 1. p. 12. t. 8. Hab. in Indiæ nemorosis siccis. T

7. *sagittata*, umb. subsessilibus, fol. sagittatis. L. Mant. 215. Lam. ill. t. 179. f. 1. Hab. in Cap. b. spei arenosis. Cor. coccinea subcylindrica basi minus ventricosa. T

8. *tenuifolia*, flor. umbellatis, fol. linearibus integerrimis. Thunb. prod. 37. Lam. l. c. f. 2. Pluck. mant. 17. t. 335. f. 5. Hab. in Cap. b. spei duris. Apud Willd. Sp. 2. p. 1276. male *tenuiflora* nuncupata.

628. *STAPELIA*. Contorta. *Cor.* rotata. *Nect.* duplici stellata tegente genitalia. *Folliculi* 2. *Sem.* plumosa.

\* *Cor. quinquesida*, laciniis margine pilosis.

1. *ciliata*, denticulis ramorum patentibus pedunculatis, corollis supra papillosis margine ciliatis, laciniis ovatis acutis planis. Masson. Sup. p. 9. n. 1. t. 1. Hab. in locis sicciis Cap. b. spei (ubi omnes species creseunt) infra Rockland Berg. Cor. flavescens. Willd. Sp. pl. 2. p. 1277. 294. h

2. *revoluta*, ramis tetragonis erectis denticulatis, dentibus patentibus, cor. glabra, lacinii ciliatis acutis revolutis. Mass. p. 12. n°. 10. t. 10. Cum priore. Denticuli caulis recti. Cor. paulo minor pallide violacea. h

3. *hirsuta*, caule aphylo tetragono, denticulis erectis, flore pedunculato, cor. hirsuta. Thunb. procl. 46. Jacq. misc. 1. p. 28. t. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. flavescens striis transversalibus atro-violaceis, lacinii apice et margine violaceis. W. h

4. *sororia*, ramulis divaricatis quadrangularibus, angulis dentatis, dentibus cernitis acutis incurvatis, cor. unicolori quinquefida, lacinii lanceolatis planis, villosis, margine ciliatis. Mass. p. 23. n°. 39. t. 39. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. nutantes, cor. unicolores. h

5. *grandiflora*, ramis quadrangularibus clavatis, angulis dentatis, dentibus remotis incurvatis, cor. magna plana quinquefida, lacinii lanceolatis acutis margine ciliatis. Mass. p. 13. n°. 11. t. 11. Hab. in locis calidis ad Sontags Rivier. h

6. *ambigua*, ramis erectis quadrangularibus clavatis, angulis dentatis remotis incurvatis, cor. magna plana quinquefida, lacinii lanceolatis hispidis, margine ciliatis. Mass. p. 13. n°. 12. t. 12. Hab. in desertis aridis Cap. b. spei. Distincta pedunculis multiflor. Cor. hispida rufo-purpurea, striis transversalibus atro-violaceis variegata. h

7. *pulvinata*, ramis ramulisque tetragonis reclinatis dentatis, cor. quinquefida plana, medio villosa, lacinii patentissimis rugosis acuminatis ciliatis. Mass. p. 13. n°. 13. t. 13. Hab. prope Camies Berg inter frutices. Cor. magna fundo elevato rufo vix villosa. Nect. atro-violacea.

8. *Asterias*, ramis pluribus erectis tetragonis dentatis, dentibus brevibus erectis, cor. magna quinquefida, lacinii lanceolatis margine revolutis ciliatis. Mass. p. 14. n°. 14. t. 14. Hab. ad Cap. b. spei in Karro. Nectaria albidula. h

9. *gemmiflora*, ramis pluribus erectis tetragonis dentatis, dentibus suberectis acutis, cor. plana scabra quinquefida, lacinii ovato-lanceolatis, margine ciliatis. Mass. p. 14. n°. 15. t. 15. Hab. in locis aridis inter frutices, ultra Platte-Kloof. Var. coe. punctis aureis sparsis. Ab omnibus satis distincta: lacinii cor. superne 5-nerviis, et coe. externe flava purpureo-maculata. h

10. *divaricata*, ramis pluribus tetragonis divaricatis glabris dentatis, dentibus

parvis suberectis, cor. glaberrima quinquefida, lacinii lanceolatis patentibus, margine revolutis ciliatis. Mass. p. 17. n°. 22. t. 22. Cor. Boraginis rubrocarnea. Nectaria aurantiaca. h

11. *rufa*, ramis ramulisque erectis tetragonis anguste dentatis, dentibus erectis, cor. quinquefida, lacinii triangularibus acutis rugosis, margine ciliatis. Mass. p. 16. n°. 20. t. 20. In locis calidis ultra Platte-Kloof. Cor. magnitudine floris Periplocae graecae. h

12. *acuminata*, ramis pluribus, suberectis tetragonis dentatis, cor. quinquefida plana glabra rugosa, lacinii caudato-acuminatis margine ciliatis. Mass. 17. t. 17. Hab. in Namaqualand. Cor. lacinii cuspidatis cineris, striis atro-purpureis undulatis apice atro-purpureis, margine albo ciliatis. W. h

13. *reclinata*, ramis pluribus tetragonis reclinatis dentatis, dentibus acutis patentibus, cor. quinquefida recurvata, lacinii patentibus replicatis fimbriatis. Mass. p. 19. n°. 28. t. 28. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. parva, atro-purpurea. Nect. flava. h

14. *elegans*, ramis pluribus confertis oblongis dentatis, dentibus patentibus acutis, cor. quinquefida, lacinii triangularibus hispidis, margine fimbriatis. Mass. p. 19. n°. 27. t. 27. Hab. ad Cap. b. spei in Karro. Cor. atro-violacea, fundo pentagono rufescente. Nect. flava. W. h

15. *caespitosa*, ramis confertis procumb. tetragonis dentatis, dentibus acutis patentibus, cor. quinquefida recurvata, lacinii patentibus replicatis ciliatis. Mass. p. 20. n°. 29. t. 29. Cum priore sub fruticibus. Cor. atro-purpurea, fundo circulari virescente. h

16. *arida*, ramis pluribus erectis tetragonis dentatis, dentibus patentibus acutis, floe. solitariis pedunculatis, cor. lacinii planis setaceis. Mass. p. 21. n°. 33. t. 33. Habitat in desertis siccis Kannaland. Coe. parva pallide flava, lacinii basi punctatis, fundo circulari flavo. Nect. albidula. h

17. *parviflora*, ramis tetragonis dentatis recurvatis, cor. parva, lacinii angustis planis patentibus margine ciliatis. Mass. p. 22. n°. 35. t. 35. In Namaqualand sub fruticibus. Coe. minima hujus generis, flavo-virescens, fusco-punctata. Nect. aurantiaca. h

18. *subulata*, cor. quinquefidis nutantibus, lacinii oblongis acuminato-cuspidatis pilosis, pilis secundis, ramis tetragonis atte-

totis antantibus sub apice floriferis. Willd. t. 283. Forsk. Cat. pl. Arab. p. 108. n.º. 193. b. 7. Hab. in Arabia felici. h

19. *concinna*, ramis ramulique erectis tragonis glaberrimis, angulis dentatis, dentibus erectis, cor. quinquefida plana ispida. Mass. p. 15. n.º. 18. t. 18. Hab. in orro. Cor. cinerea, striis undulatis fuscis usque candidis, fundo fusco distincta. h

20. *glandulifera*, ramis pluribus subectis tetragonis, angulis dentatis, dentibus rectis acutis, cor. plana glandulis seriacis lavatis tecta, lacinii ovato-lanceolatis cutis patentibus. Mass. p. 16. n.º. 19. t. 19. fab. circa Nord Olifant Rivier. Cor. sub-burea, pilis albis tecta. Nect. aurantiaca et nigra. h

\* *Cor. quinquefida, lacinii margine glabris.*

21. *pedunculata*, ramis pluribus divaricatis tetragonis subdentatis, pedunc. longissimis, cor. quinquefida, lacinii lanceolatis margine revolutis, angulis fimbriatis. Mass. p. 17. n.º. 21. t. 21. Hab. in regionibus nivalis Camies Berg. Cor. brunneo-purpurascens, variat colore lutescente. h

22. *aperta*, ramis pluribus divaricatis tetragonis dentatis, dentibus obtusissimis, pedunc. longiusculis, corolla quinquefida plana, lacinii ovatis obtusis rugosis. Mass. p. 23. n.º. 37. t. 37. Hab. in Namaqualand prope Koek-Fontain. Similis precedenti, pedunculo et ramis, sed flore distinctissima. Cor. purpurascens, lituris obscurioribus rugosa. Fundus cinerascens nigro-punctatus. h

23. *Gordonii*, ramis ramulique teretibus tuberculatis, tuberculis spinosis, pedunc. solitariis, cor. magna decemfida. Mass. p. 24. n.º. 40. t. 40. Hab. in Groot Namaqualand versus Orange Rivier. Cor. inter maximas hujus generis diametro fere triuncialis, plana rotata fusco-flavescens, centro albicante. Nect. nigra. An hujus generis? h

24. *pilifera*, ramis pluribus teretibus subleatis tuberculatis piliferis, flor. sessilibus solitariis. Mass. 17. n.º. 23. t. 23. Lin. suppl. 171. Hab. in Cap. desertia, collibus aridissimis. Cor. atro-purpurea circulo rubro in medio. Comeditur ab Hottentottis, quibus audit Gwaap. Mass. l. c. h

25. *caudata*, caule folioso, fol. lineariblongis, flore pedunculato, lacinii cor. linearibus. Thunb. prod. 46. Hab. ad Cap. b. spei. h

26. *articulata*, articulis ramorum oblongis teretibus reticulatis obsolete verru-

cosis, spinulis minutis, flor. subsessilibus cor. supra papillois, lacinii triangularibus. Ait. Kew. 1. p. 310. Mass. p. 20. n.º. 30. t. 30. Etulis cor. atra. Rami spicae femineae Zene Mays haud absimiles sunt. Sequenti affinis. h

27. *mammillaris*, cor. quinquefida glabris, lacinii lanceolatis, pedunc. cor. brevioribus, ramis medio floriferis erectis hexagonis tuberculatis, tuberculis spinosis. Willd. p. 1287. L. Mant. p. 216. Thunb. prod. 46. Burm. afr. 27. t. 11. †

28. *pruinosa*, ramis tetragonis dentatis, dentibus recurvatis, lacinii cor. planis ovatis pilosis. Mass. p. 24. n.º. 41. t. 41. Hab. in regionibus siccis Namaqualand inter frutices. h

29. *ramosa*, ramis pluribus erectis tetragonis dentatis, dentibus obtusissimis, flor. aggregatis subsessilibus, cor. lacinii lanceolatis acutis replicatis. Mass. p. 21. n.º. 32. t. 32. Hab. in regionibus Karro, circa aquas thermales. Cor. atro-purpurea, fundo circulari albidot Flor. proveniunt in callis extra dentes. h

30. *pulla*, subhexagona erecta, aculeis patentissimis, floribus sessilibus aggregatis, cor. lacinii lanceolatis, supra holosericeis replicatis. Ait. Kew. 1. p. 310. Mass. n.º. 31. t. 31. S. fasciculata. Thunb. 7. Hab. in locis calidis arenosis Karro. Flor. extra dentes quidem nec callo insident. W. h

31. *adscendens*, cor. quinquefida glabris, lacinii linearibus margine reflexis acutis, pedunc. cor. brevioribus, caule tetragono adscendente apice florifero. Willd. Roxb. corom. 1. p. 28. t. 30. Hab. in arenosis siccis Indiae orientalis. h

32. *quadrangula*, cor. quinquefida, flor. sessilibus, caule tetragono, ramis divaricatis apice floriferis, dentibus truncatis. Willd. Forsk. dease. 52. t. 6. Hab. in Arabia felici, et circa Mogadora in Barbaria. Schousb. Flor. conferri parvi terminales viridi-flavescentes. Succus non lacteus sed aqueus. h

33. *incarnata*, ramis erectis tetragonis dentatis, dentibus patentibus acutis, flor. subsessilibus, cor. lacinii lanceolatis planis. Mass. p. 22. n.º. 34. t. 34. Lin. suppl. 171. S. canla aphylo tetragono, denticulis patentibus, flore sessili, lacinii corollae obtusis. Thunb. prod. 46. Hab. campis siccis arenosis. Cor. incarnata, variat colore albo. Mass. Herba editae Africae. h

34. *punctata*, articulis ramorum oblongis subtetragonis dentatis, florib. fasciculatis, cor. lacinii lanceolatis acutis patentibus,

supra papillosis. Mass. p. 18. n°. 24. t. 24. Hab. in Cap. b. spei regionibus Namaqualand. Cor. laciniae albedo-incarnatae, sanguineo-punctatae. h

35. *geminata*, ramis oblongis subtetragonis dentatis, dentibus parvis, floribus geminatis, cor. lacinii lanceolatis acutis margine revolutis. Mass. p. 18. n°. 25. t. 25. Cor. aurantiaco-flava sanguineo-punctata. h

36. *decora*, articulis ramorum oblongis subteretibus, floribus geminatis, corollarum lacinii lanceolatis acutis, supra scabrosis, margine revolutis. Mass. p. 19. n°. 26. t. 26. Cor. laciniae flavae punctis scabris atropurpureis obsitae, fundus pentagonus palidus. h

37. *pulchella*, ramis pluribus reclinatis dentatis, dentibus acutis, floribus fasciculatis, cor. quinquesida, lacinii triangularibus acutis, centro orbiculato. Mass. p. 29. n°. 36. t. 36. Cor. flava sanguineo-punctata, lacinii apice fusciscentibus. h

38. *vetula*, ramis pluribus erectis tetragonis glabris, angulis dentatis, dentibus apice incurvatis, cor. plana glabra quinquesida, lacinii lanceolatis obtusis. Mass. p. 15. n°. 16. t. 16. Hab. in montibus ad Hex Rivier Cap. b. spei. Cor. profunde violacea, lineis transversalibus atro-violaceis, lacinii superne trinerviis. W. h

39. *verrucosa*, ramis pluribus suberectis, dentibus ramorum acutis decussatis, cor. plana verrucosa, medio parum elevati in pentagonum, genitalia ambiens, scabrum. Mass. p. 11. n°. 8. t. 8. Cor. flavescens sanguineo punctata. h

40. *irrorata*, ramis pluribus suberectis denticulatis, dentibus subpatentibus acutis decussatis, cor. plana rugosa, lacinii lanceolatis acutis. Mass. p. 12. n°. 9. t. 9. Cor. sulphurea sanguineo-maculata laciniarum apicibus purpureiscentibus. Differt a prioribus defectu verrucarum et circuli pentagoni floris. h

41. *mixta*, cor. quinquesidis rugosis, lacinii ovatis acuminatis, fundo circulari elevato papilloso, pedunc. longitudine cor. ramis tetragonis adscendentibus basi floriferis. Willd. p. 129. h

42. *variegata*, cor. quinquesidis rugosis, lacinii ovatis acutis, fundo circulari concavo rugoso, pedunculis cor. longioribus, ramis tetragonis adscendentibus basi floriferis. Willd. Jacq. misc. 1. p. 27. t. 4. Curt. mag. 26. Moris. s. 15. t. 3. f. 4. h

\*\*\* Corolla decemdentata.

43. *campanulata*, ramis pluribus sim-

plicibus erectis tetragonis dentatis, dentibus patentibus acutis, cor. decemfida campanulata scabra, tubo barbato. Mass. p. 11. n°. 6. t. 6. Cor. sulphurea maculis elevatis atropurpureis, fundo fusciscente, etiam externe maculata. W. h

44. *barbata*, ramis pluribus tetragonis pentagonisque confertis suberectis, dentibus ramorum acutis subpatentibus, cor. campanulata decemfida, lacinii acutis subpatentibus. Mass. p. 11. n°. 7. t. 7. Cor. campanulata, albedo-flavescens, maculis elevatis atropurpureis variegata, pilisque clavatis obsita. Willd. h

45. *venusta*, ramis tetragonis pentagonisque, ramulis patentissimis divaricatis, denticulis ramorum patentibus acutis, cor. decemfida, tubo glabro ampliato in orbiculum elevatum. Mass. p. 10. n°. 3. t. 3. Cor. sulphurea, limbo rubro punctato. h

46. *guttata*, ramis pluribus tetragonis pentagonisque confertis subpatentibus, dentibus ramorum acutis patentibus, cor. decemfida lacinii acutis tubo campaniformi-ampliato in orbiculum elevatum. Mass. p. 10. n°. 4. t. 4. Cor. sulphurea sanguineo-punctata. h

47. *humilis*, ramis pluribus quadri- & quinqueangulatis patentibus, cor. orbiculata decemfida, lacinii quinque longioribus, quinque brevioribus patentibus, pedunc. solitariis. Mass. p. 10. n°. 5. t. 5. h

48. *reticulata*, ramis pentagonis denticulatis, dentibus patentibus, cor. decemangulata, tubo intus barbato ampliato in orbiculum elevatum. Mass. p. 9. n°. 2. t. 2. Hab. in cavernulis rupium versus N. Olifants Rivier. Cor. limbus atropurpureus lineis albidis reticulatus, fundus et orbiculus elevatus purpurei. W. h

49. *clavata*, caule simplici crasso clavato reticulatum obsolete verrucoso, apice fructifero. Willd. p. 1295. Patterson. itin. t. 8. + Hab. in Cap. b. spei campis arenosis. Adhuc obscura, cujus fructus tantum notus est. W. h

Obs. Differentias specificas illos Massoni ex antopsis redditae Willdenovianis praetuli, forte melius accundum regulas artis exaratis.

GENTIANÆ (Gen. 619-636.) calyca sunt instructo persistente et cor. regulari, 5-partita, marcescente. Stam. cor. inserta, et ejus numero conformia (4-5). Stylus, forte in omnibus, unicus aut demum bifidus. Caps. 1-2-locularis,

2-valvis : valvis margine introflexis, semina plurima parva in valvis marginali inserta. Caulis plerisque herbaceus. Folia opposita, integra, plerisque amara. Flor. in quibusdam bracteati.

629. *SPIGELIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* infundibuliformis. *Caps.* didyma, 2-locularis, 4-valvis.

1. *Anthelmia*, caule herbaceo, foliis sessilibus summis 4 verticillatis. Lam. amoen. 5. t. 2. Willd. Sp. 2. p. 824. Hab. in Cajenna, Brasilia. Racemi terminales.

2. *fruticulosa*, caule fruticuloso, fol. ovatis petiolatis : summis quaternis. Lin. ill. p. 474. Hab. in Cayenna. *Cal.* 1-petalis.

3. *marilandica*, perennans, caule tetragono, fol. omnibus oppositis. L. Curt. mag. t. 202. Michaux. Flor. 1. p. 147. Catesb. carol. 2. t. 78. Hab. in Amer. boreali. Fol. sessilia, ovato-lanceolata.  $\bar{\eta}$

630. *OPHIORHIZA*. *Cor.* infundibuliformis. *Germen* 2-fidum. *Stigmata* 7. *Fructus* bilobus.

1. *Mungos*, fol. lanceolato-ovatis. Hab. in India orientali.  $\bar{\eta}$

2. *Mitrcola*, caul. acutangulo, fol. ovatis sessilibus. Michaux. 1. p. 148. Swartz. obs. 69. t. 3. f. 2. (nec. 1.) Cynoctonum sessilifolium. Gmel. syst. Hab. in Americae agrestib. et pascuis.  $\odot$

3. *subumbellata*, caule fruticoso, fol. lanceolatis acutis, umbellulis axillaribus trifidis. Forst. prod. n<sup>o</sup>. 66. Hab. in insula Otaheiti.  $\bar{\eta}$

631. *LISIANTHUS*. *Cor.* tubo ventricosus laciniis recurvatis. *Cal.* campanul., carinatus. *Stigma* capitulum bilobum. *Caps.* 2-locularis, 2-sulca, 2-valvis. *Sem.* numerosa subimbricata, margine minimo membranaceo cincta.

1. *longifolius*, ramosis, fol. lanceolatis acutis pubescentibus, caule tereti. Willd. Sp. 2. p. 826. Brown. jam. 137. t. 9. f. 1. Hab. in Jamaicae sylvis.  $\bar{\eta}$

2. *glaucofolius*, fol. oblongis sessilibus, pedunculatis elongatis unifloris. Jacq. ic. rar. t. 33. Col. lect. 1. p. 64. Hab. ... Fol. aenea subius glauca, cor. caeruleo.  $\bar{\eta}$

3. *exaltatus*, cor. subcampanulatis 5-fidis erectis, pedunc. longissimum terminali. Lam. ill. p. 478. Gentiana exaltata. Lin. Hab. in St. Domingo. Priori affinis.

4. *caeruleoescens*, fol. lanceolatis acutis glabris, caule tetragono. W. Aubl. guj. 1. p. 207. t. 82. Hab. in pratis humidis Gujanse.  $\odot$

5. *alatus*, fol. oblongis acuminatis glabris, caule tetragono salto. W. Aubl. p. 204. t. 80. Hab. in Cajennae et Gujanse locis inculcis.  $\odot$

6. *Chelonoides*, glaber, fol. oppositi<sup>2</sup> subconnatis oblongis, panicula terminali dichotoma racemosa. Lin. suppl. 134. Hab. in Surinami et Cajennae aliis arenosis.

7. *purpurascens*, fol. sessilibus glabris, flor. paniculatis, caule tetragono. Willd. Aubl. guj. 1. p. 201. t. 79. Lam. ill. t. 207. f. 2. Hab. in fissuris rupium Gujanse. Cor. ercnuae, incurvae.  $\odot$

8. *grandiflorus*, fol. ovatis acuminatis sessilibus, florib. paniculatis, cor. limbo undulato. Willd. L. fol. connatis ovato-oblongis acutis, flor. virescentibus. Aubl. guj. 1. p. 205. t. 81. Hab. in humidis Gujanse, Cajennae.  $\odot$

9. *exsertus*, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. trichotomis, genitalibus longissimis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 346. Hab. in jugis montium caeruleorum Jamaicae.  $\bar{\eta}$

10. *frigidus*, fol. ovatis acuminatis, panicula terminali trichotoma, cor. ventricosus, laciniis subrotundis Swartz. l. c. Hab. in regione muscosa monte la Soufrière ins. Dominicae. Diversus a L. alato, quod flores erecti nec penduli et folia petiolata nec sessilia. S.  $\bar{\eta}$

11. *latifolius*, foliis lanceolato-ovatis acuminatis, pedunc. trichotomis, laciniis cor. erectis, genitalibus inclusis. Swartz. Fl. ind. p. 348. Hab. in montibus aliis Jamaicae. Simillimus L. exserto, diversissimus genitalibus inclusis. S.  $\bar{\eta}$

12. *umbellatus*, fol. elongatis obovatis, flor. terminalibus umbellatis, laciniis cor. brevissimis obtusis erectis. Swartz. p. 550. Hab. in alpinis Jamaicae occidentalis.  $\bar{\eta}$

13. *corymbosus*, fol. ovato-lanceolatis subpetiolatis, caule tereti striato, corymbis terminalibus. Flor. Per. 2. p. 14. t. 124. L. glaber. Smith. ic. ined. 1. p. 29. t. 29. Willd. p. 828. Hab. in Peruviae nemorib. Cor. lutea. l. etiol. brevis, connati.

14. *calygonus*, foliis lanceolato-ovatis breviter petiolatis, caule obsolete 4-gono, pedunc. 1-floris, cal. 5-gono. Flor. Per. l. c. t. 126. In Peruviae montib. frigidis. Cor. subrugeas, rosea rubra.  $\bar{\eta}$

15. *viscosus*, fol. oblongis breviter petiolatis venosissimis, caule 4-gono sulcato,

corymb. terminalib. viscosis. Flor. Pernv. l. c. t. 125. Hab. in altis locis Munna. Cor. luteo-viridis: lacinae subrotundo-cordatae.

16. *revolutus*, fol. lanceolatis petiolatis, margine revolutis, caule 4-gono striato, corymb. terminalibus. Flor. Pernv. t. 127. In Munna montib. frigidis. h

17. *cordifolius*, dichotomus, fol. cordatis, acuminatis, petiolis brevibus, flor. terminalibus quandoque geminis. Brown. Jam. 137. Lin. Mant. p. 43. In Jamaica. h

18. *acutangulus*, fol. sessilibus, inferiorib. cordatis, superiorib. ovatis, caule 4-gono, panic. dichotoma. Flor. Per. 2. p. 14. t. 129. f. a. Hab. in Panatabuarum montib., locis meridionalib. Cor. lutea subrigens, tub. ocurvato. ©

19. *ovalis*, fol. ovatis aveniis breviter petiolatis, caule tereti, pedunc. corymbosis dichotomis. Flor. Per. 2. p. 13. Hab. in Peruv. nemorib. Cor. viridi-lutea. Caps. pendulae. Caul. virgati. h

20. *carinatus*, fol. subrotundo-ovatis trinerviis sessilibus, foliolis calycinis carina sursum ampliata. latis, Lam. enc. 3. p. 659. t. 107. f. 3. Hab. in Madagascar. h

21. *trinervius*, pubescens, fol. ovatis mucronatis trinerviis, flor. laxo paniculatis terminalibus. Enc. 3. p. 630. ill. p. 476. Hab. in Madagascar. h

22. *campanulaceus*, fol. ovatis acutis petiolatis, flor. terminalib. subinaequilibus. Lam. ill. p. 476. Enc. bot. 3. p. 660. Hab. in Amer. meridionali. Cor. magna. Stam. incurva: 2 breviora? ©

23. *parvifolius*, caule soboliformi, fol. linearibus, corymb. terminali paucifloro. Lam. ill. l. c. Cum priore. Caul. simpl. Fol. minuta, erecta. Flor. parvi, infundib.

632. *CHIRONIA*. Cal. 5-partitus, subcampanulatus. Cor. subrotata. Pistillum declinatum. Stam. tubo corollae indentia. Anthera decemum spirales. Pericarpium 4-loculare.

1. *trinervia*, herbacea, calycinis foliolis membranaceo-cariautis. L. Willd. Sp. 2. p. 1165. Burm. zeyl. 145. t. 67. Hab. in Zeylona. ©

2. *Jasminoides*, herbacea, fol. lanceolatis, caule tetragono, calycib. subulatis. Lam. ill. p. 479. t. 108. f. 2. Hab. ad Cap. b. spec.

3. *Lychnoides*, caule simplici, foliis lineari-lanceolatis, interno liis longioribus. Hab. ad radices montium Cap. b. spec. Cal. foliola carinata. Cor. purpurea.

4. *uniflora*, caule simplici virgato anguloso, fol. lineari-lanceolatis internodiis subbrevioribus, flor. magno terminali. Lam. enc. 2. p. Fj. ill. p. 480. t. 108. f. 3. Hab. ad Cap. b. spec.

5. *Melampyrisifolia*, fol. lanceolatis sessilibus lateralibus decurrentibus, cal. tubo brevior. Lam. ill. p. 479. Cum priore.

6. *nudicaulis*, herbacea, fol. oblongis obtusiusculis, caul. subdiphyllis simplicissimis unifloris, cal. dentibus setaceis. Lin. suppl. p. 151.

7. *campanulata*, herbacea, fol. sublinearibus, calycib. longitudine corollae. L. Hab. in Canada. Caul. ramis longis. Fol. lanceolato-linearibus, laevia. Flor. solitarii, purpurei. L.

8. *gracilis*, ramis laxis setaceo-elongatis 1-floris, fol. lineari-setaceis, cal. setaceo cor. subaequali. Michaux. Flor. 1. p. 146. In Carol. inferiore. Caul. debilis. Cor. rosea: lacin. obovalibus.

9. *paniculata*, erecta firma, fol. lanceolato-linearibus, panic. brachiata multiflora subfastigiata, cal. subulato 2-cor. semibrevis. Michaux. l. c. Cum priore. Caul. lincis 4 subquadrangulus.

10. *angularis*, caule erecto marginato 4-angulo, fol. amplexicaulib., corymb. multifloro, cal. lacin. lanceolato-linearibus. Michaux. Lin. Sp. pl. Hab. in Virginia et Carol. inferioris uliginosis subulosis.

11. *linoides*, fol. linearibus glabris, caule herbaceo fastigiato ramoso. Thonb. Breyn. cent. 175. t. 90. Hab. io Capitis b. Spec. herbis. h

12. *baccifera*, fol. linearibus lanceolatis glabris, caule fruticoso ramosissimo, fructu haecato. Thunb. prod. 35. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spec. Caulis 4-gonus.

Obs. Stigm. peltatum. Bacca 1-locularis, polysperma: *Roesslinia* tetragona. Moench. Method. plant. Suppl. p. 211.

13. *frutescens*, fruticosa, fol. lanceolatis subtomentosis, calycib. campanulatis. L. Mill. dict. t. 37. Lam. ill. t. 108. f. 1.

14. *decussata*, fruticosa subtomentosa, fol. decussatis oblongis lato-linearibus, esul. globosis quinquepartitis. Vent. hort. Cels. p. 31. t. 31. Hab. ad Cap. bon. Sp. Flor. magni. Caul. et cal. magis tomentosus. Sappamarus. Prioris var. ? h



† *Chloroideae.*

14. *calycosa*, fol. oblongo-obovalibus, flor. solitarii subseptempartitis, cal. foliaco corollam superante. Michaux. l. c. p. 147. *C. dichotoma* Walter? In Carol. infer. creta. Cor. laciniis obovales.

15. *chloroides*, caul. subleucumbente, fol. lanceolatis crectis, flor. 7-13-partitis, laciniis oblongis. Michaux. *Chlora dodecandra*. Lin. Willd. Sp. v. 3, p. 341. Hab. in Novboraco et N. Caesarea.

633. *ERYTHRAEA*. Cal. appressus, subpentagonus, 5-dentatus. Cor. infundibuliformis: tubo longo. *Antherae*, post anthesin, spiratiter tortae. *Stigmata* 2 approximata; rarius simplex. *Caps.* sublinearis, 1-locularis. *Recept.* 2, extantia. (Richard. Cat. hort. med. paris.)

\* *Flor. sessilibus.*

1. *Centaurium*, foliis oblongo-ovalibus basi rosaceis congestis, caule elongato, flor. fasciculato-paniculatis, basi squamis 1-2 cinctis. Gent. *Centaurium*. Lin. *Chironia* Cent. Willd. Flor. dan. t. 617. *Centaurium* vulgare. Rafn. Schum. Seeland. p. 68. Hab. in sylvis. Var. flor. albis.

β. *grandiflora*, major, limbo majusculo concavo petalis latis. In pratis humidis passim. An hujus loci *Centaur.* *Erythraea*. Rafn. Schousboe?

α. *chilensis*, fol. lanceolatis, caul. dichotomo corymboso. Willd. Sp. a. p. 1067. sub *Chironia*. Gent. peruviana. Lam. enc. a. p. 642. Few. Peruv. a. t. 35. Hab. in regn. Chilensis et Peruviae. Fol. 1-nervia. Lam. ☉

3. *conferta*, pumila stricta ramosa, fol. ovalibus obtusis, flor. sessilibus fasciculatis confertis, cal. cor. tubum ad dimidium aequante. Hab. in Hispania. Ex Herb. Richardi.

4. *spicata*, fol. lanceolato-oblongis, ramis dichotome paniculatis, flor. subsucculentis, cal. bracteisque cor. subaequalibus. *Chironia* spicata. Willd. p. 1067. In Europae australioris pratis humidis herbosis, et in Barbaria. Stigma capitatum, integrum.

\*\* *Flor. pedicellatis.*

5. *ramosissima*, subpumila ramosissima, fol. brevioribus, caul. geniculis aequalibus, flor. subdichotomis basi squamis desti-

tutis. *Chironia* Gerardi. Schmidt Flor. bohem. t. n<sup>o</sup>. 131. Gent. palustris. Lam. Vaill. par. t. 6. f. 1.

β. *inaperta*, pumila simplex ramosaque foliosa, fol. ovatis, flor. ternis limbo connivente acuto. Hujus loci *Chir. inaperta*. Willd. Gent. pusilla. Lam. Vaill. t. 6. f. 2. Hab. in pascuis.

6. *lutcola*, patule ramosa setacea, fol. linearibus angustis, cal. patulo cor. subaequali. Cum priore rarius. Pedunc. elongati solitarii. Cor. 4-fida? lutea. Anth. non tortiles?

7. *maritima*, herbacea, fol. oblongo-lanceolatis, caule dichotomo corymboso, tereti, flor. pedunculatis digynis. *Chironia*. Willd. Cav. ic. 3. p. 49. t. 266. f. 1. In Europae australis maritimis. Cor. lutea. β. *tingitana*, caul. compressiusculo, fol. trinerviis. Schousboe. p. 85.

8. *pyrenaica*, fol. ovato-lanceolatis erectis, cor. laciniis lanceolatis. Hab. in Pyrenaeis. Cor. alba, Rich.

9. *linearifolia*, cor. infundibuliformi, stylo longo simplici, fol. linearibus subuninerviis. Lam. enc. a. p. 641. sub *Centiana*. Bocc. Mas. a. t. 43. Barrell. ic. 423. Hab. in Europa australi, Hispania etc. Rad. fusiformis. Flor. purpureae. Lam.

634. *VOHIRIA*. Cor. hypocrateriformis, tubo longissimo utrinque tumido, limbo 5-fido, laciniis ovatis patentibus. *Antherae* in fauce tubo subsessiles. *Stigma* simplex. *Caps.* 1-locularis bivalvis. *Sem.* numerosa, scobiformis.

1. *caerulea*, flor. geminatis, cor. laciniis rotundatis. Lam. ill. p. 431. sub *Vohiria*. Aubl. guj. t. p. 21. t. 83. f. 2. Lila caerulea. Willd. Sp. p. 1071. Hab. in Gujanae sylvis. T.

α. *rosea*, flor. geminatis, cor. laciniis acutis. Lam. t. 109. Aubl. l. c. t. 83. f. 1. Lam. ill. t. 109. L. rosea Willd. Cum priore.

5. *spathacea*, caul. multifloro, bract. subspathaceis, cor. laciniis oblongis. Lam. ill. p. 431. Hab. in Gujana.

4. *breviflora*, caul. subtrifloro, fol. membranaceis, cor. tubo cal. duplo longiore. Lam. ill. Cum priore. Richard. Caul. 2-pollinaris.

5. *uniflora*, caul. subphylo 1-floro, cor. 1-ciu. acutis. Lam. l. c. Gentiana.

6. *aphylla*. Jacq. amer. t. 60. f. 3. Hab. in Martinicae sylvis humentibus. Incolis vetustarum arborum truncos cavos, in quibus tractu temporis aliqua humi portio fuit collecta, quo sensu parasitica posset vocari. Jacq.

## DIGYNIA.

635. GENTIANA. Cor. 1 - petala. Caps. 2-valvis, 1-locularis, Receptaculis 2, longitudinalibus.

\* *Corollis 5-g-fidis subcampanulatis.*

1. *lutea*, fol. latis ovatis nervosis, cor. subquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. L. Mat. med. p. 75. Mill. dict. Willd. Sp. 2. p. 1331. Froelich. de Gent. p. 15. Asterias. Rencal. spec. 64. t. 61. Hab. in alpinis et subalpinis pratis. Fol. Veratri. Rad. magna carminativa.

2. *purpurea*, cor. subquinquefidis campanulatis striato-punctatis verticillatis, cal. membranaceis spathaceis. Froel. p. 18. Andrew. t. 117. Flor. dan. t. 50. G. punctata. Villars. delph. 2. p. p. 522. Hab. in alpinis Helveticis, Sabaudis, Pyrenaeis, Delphinatus, Norvegicis.  $\mathcal{T}$

3. *pannonica*, cor. subsexfidis campanulatis punctatissimis verticillatis, cal. coriaceis truncatis. Froel. p. 21. Fol. caulinis laeocoleis acuminatis. Jacq. austr. 2. t. 136. G. punctata. Jacq. obs. 2. p. 17. t. 39. Moris. 2. 12. t. 4. f. 3. In alpinis. A. sequente differt: cor. laciniis subrotundovatis nec ovatis acutiusculis. Willd.

4. *punctata*, cor. subsexfidis campanulatis punctatissimis verticillatis, cal. membranaceis truncatis. Froel. l. c. p. 24. Jacq. austr. 5. t. 28. G. purpurea. Villars. Moris. 2. 12. t. 4. f. 2. Hab. in alpinis.  $\mathcal{T}$

5. *campanulata* (*immaculata*), cor. septemfidis campanulatis striatis immaculatis, cal. septemfidis. Murr. syst. 269. Jacq. anst. 5. p. 43. app. t. 29. G. alpina major, flor. flavis punctis crenatis. Baub. pin. 187. Hab. in alp. Carinthiae Garten, et in alpinis Aquilejensibus.  $\mathcal{T}$

6. *septemfida*, cor. campanulatis septemfidis quinquefidisque, laciniis intermedium ciliatis. Froel. p. 47. Pall. ross. 2. p. 101. t. 92. f. 1.

7. *asclepiadea*, cor. quinquefidis campanulatis oppositis axillaribus subsessilibus,

foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis. Froel. Jacq. austr. 2. 328. Lam. ill. t. 109. f. 3. G. asclepiadis folio. Baub. pin. 187.  $\beta$ . *plicata*, caule 1-floro. Schmidt. Hab. in montosis Helvetiae, Austriae, Italiae, Hispaniae, etc.

8. *montana*, cor. quinquefidis campanulatis, fol. cordatis sessilibus. Forst. prod. n. 133. Hab. in Zeelandia.

9. *cruciata*, cor. quadrifidis imberbibus, flor. verticillatis sessilibus, fol. decussatis connato-vaginantibus. Jacq. austr. t. 372. Tretortrhiza. Rencalm. spec. 74. t. 73. Hab. in montosis apricis et sylvaticis.  $\mathcal{T}$

10. *macrophylla*, flor. quinquefidis sessilibus verticillatis, fol. radicalibus caulum inferne subnulum aequantibus. Froel. Gent. p. 31. Pall. ross. 2. p. 108. t. 96. G. flor. confertis terminatricibus, cor. 4-5-fidis lanceolatis, caule procumbente media parte nudo. Gmel. sib. 4. p. 104. t. 52. Hab. in Sibiria praescritum orientaliore.  $\mathcal{T}$

11. *adscendens*, cor. quinquefidis campanulatis subsessilibus axillaribus, fol. acutis: radicalibus lanceolatis elongatis. Froel. p. 43. G. decumbens. Lin. suppl. 174. Pall. ross. t. 94. Gmel. sib. t. 51. f. 4. cxcl. synonym. In montosis apricis Sibiriae.  $\mathcal{T}$

12. *triflora*, cor. campanulatis quinquefidis aggregato-sessilibus, fol. linearibus, flor. alternis productis. Froel. p. 38. Pall. ross. t. 93. f. 1. Hab. in Sibiria orientali, in alpinis Transbaicalensibus.  $\mathcal{T}$

13. *frigida*, cor. campanulatis quinquefidis terminalibus sessilibus binatis, laciniis obtusis, fol. lineari-oblongis nervosis. Willd. p. 137. Froel. p. 39. Icon. Haenke in Jacq. Coll. 2. p. 13. Schmidt. in Roemer. Archiv. 1. p. 144. 2. f. 2. In alpinis summis Styriacis, Carpathicis. A sequente diversa.  $\mathcal{T}$

14. *algida*, cor. campanulatis quinquefidis terminalibus pedunculatis subnatis, laciniis acutis, fol. lanceolatis trinerviis. Willd. p. 137. Pall. ross. 2. p. 107. t. 95. Pall. itin. 3. app. n. 82. t. 1. f. 6. Hab. in alpinis ad Jeniscam, ad lacum Baical et inque Camtschatka.  $\mathcal{T}$

15. *saxosa*, cor. quinquefidis campanulatis, fol. spathulatis. Lin. suppl. 175. Forst. in Act. holm. 1777. p. 184. t. 5. Hab. in rupibus maritimis. N. Zeelandiae.  $\mathcal{T}$

16. *Pneumonanthe*, cor. 5-fidis campanulatis axillaribus pedunculis, fol. lineari-lanceolatis obtusis. Flor. dan. t. 209. Michaux. Flor. 1. p. 176. In Europae et Americae pratis humidis. Cor. speciosa. Filam. connata.  $\mathcal{T}$

17. *Saponaria*, caul. cylindrico asperiusculo, fol. ovali-lanceolatis, flor. fasciculatis sessilibus, cor. quinquefidis lacin. cum acumine obtusis. Michaux. Flor. 1. p. 176. Catesb. car. 1. t. 70. Willd. p. 1338. In Amer. boreal. sylvarum herbosis. Habitat *G. cruciatae*. Cal. lacin. foliaceae. Cor. majusculae plicae internae in lacinulam desinunt. M.

18. *puberula*, caule asperiusculo, fol. lineari-lanceolatis undulosis calycibusque ciliatis flor. sessilib. terminalib. 5-fidis. Mich. l. c. Hab. ad confluentem fluv. Ohio et Mississipi. G. Pneumnanthe affinis. Cor. majusculae lacin. obtusae.

19. *angustifolia*, caule simplici gracili 2-floro, fol. angusto-linearib. patulis, cor. quinquefidis lacin. in denticulum lacerum desinentib. Mich. p. 177. Hab. in Carol. inferior. pratis. Cor. magna.

20. *villosa*, cor. quinquefidis campanulatis ventricosis, fol. villosis. Froel. Gent. p. 36. Hab. in Virginia. Cor. extus pallida, intus lineato-varia. †

21. *ochroleuca*, cor. quinquefidis campanulatis verticillatis subpedunculatis, fol. ovato-lanceolatis trinerviis laevibus. Froel. p. 35. Pluck. alm. 166. t. 186. f. 1. Hab. in Virginiae, Carolinae locis humidis. †

22. *linearis*, cor. quinquefidis campanulatis obtusiusculis terminalibus congestis sessilibus, fol. linearibus acutiusculis. Froel. p. 37. In Pennsylvaniae vallibus montanis. †

23. *quinqueflora*, cor. quinquefidis tubuloso-campanulatis terminalibus subquinis, caule ramosissimo alato, fol. amplexicaulis. Froel. p. 51. G. quinquefolia. Lin. Hab. in Pennsylvania, Carolina. Statura *G. Amarella*. ☉

24. *aurea*, cor. subquinquefidis campanulatis verticillatis, fol. ovatis, caule inferne ramoso. Froel. p. 54. G. involocrata. Roub. in Act. Haf. 10. p. 434. t. 1. f. 2. A. B. Flor. dan. t. 344. ☉

25. *glauca*, cor. quinquefidis campanulatis sessilibus, fol. ovatis rotundatis. Pall. ross. 2. t. 93. f. 2. Hab. in Camtschatkae alpinis et in insulis Beringii. Caul. digissalis, simplicissimus. Cor. e glauco caeruleo. W. †

\*\*\* *Cor. infundibuliformibus nudis decemfidis.*

26. *altaica*, cor. decemfida infundibuliformi, lacinis alternis minoribus serrulatis, caule florib. brevior. Pall. ross. 2. p. 109. t. 97. f. 1. Froel. p. 62. *G. grandiflora*. Laz-

mann. in Comment. N. Petrop. 18. p. 526. t. 6. f. 1. Hab. in Sibiriae alpinis summis Altaicis ad nives. †

27. *pyrenaica*, cor. decemfida infundibuliformi, caule inferne ramoso, fol. lanceolato-linearibus. Froel. p. 61. Gouen. illust. 7. t. 2. f. 2. Cresc. in Pyrenaeis. †

\*\*\* *Cor. nudis quinquefidis.*

28. *grandiflora* (acaulis. L.), cor. quinquefida campanulata, caul. quadrangulum subaequante, fol. ovato-lanceolatis trinerviis. Vill. delph. 2. p. 525. Froel. Gent. p. 57. Lam. enc. 2. p. 637. Ciminalis longiflora. Moench. meth. p. 514. Anth. connatae. Plant. culta caulescens. †

29. *angustifolia*, fol. oblongo-linearibus nerviis, cor. campanulata excedente. Villars. l. c. p. 526. Bar. ic. 110. *G. caulescens*. Lam. enc. 2. p. 638. Valde amara. Anth. quoque connatae.

30. *alpina*, fol. ovideis subcarneis nerviis obtusis, cor. campanulata caul. elongato aequante. Vill. l. c. t. 10. Praecedentibus minor. Fol. vere rotunda. V. Cresc. cum priorib. in Alpibus, germanicis, italicis et gallicis.

31. *longiflora*, cor. subquinquefida infundibuliformi caul. longiore, fol. confertis sublinearibus. Lam. ill. p. 495. Hab. in Sibiria. Cor. 2. unc. longa.

32. *serpyllifolia*, cor. 5-fida infundibuliformi lobis subintegerrimis acutiusculis, fol. ovatis obtusis. Lam. enc. 2. p. 540. Cam. hort. 1. 15. f. 1. Barr. ic. t. 101. f. 1. Hab. in Italia.

33. *brachyphylla*, fol. lanceolatis subrotundis brevissimis, cor. infundibuliformi. Vill. delph. 2. p. 528. Barr. ic. 103. 2. Hab. in summis alpinis Delphinatus. Cor. aurca, dentata.

34. *elongata*, cor. quinquefida infundibuliformi, caule elongato filiformi subnudo unifloro, cal. oblongo aequali, fol. radicalibus aggregatis. Haenke in Jacq. Coll. 2. p. 82. t. 1. f. 3. *G. unidra*. Georg. it. 1. p. 203. t. 1. f. 2. Hab. in alpinis.

35. *verna*, caul. simplici pumilo, cor. quinquefida infundibuliformi caulem excedente, fol. ovatis acutiusculis radicalibus confertis majoribus. L. Cor. crenata, lacin. basi appendiculatis. Smith. Brit. t. p. 285. Engl. bot. t. 493. Barr. ic. 109. f. 1. *G. bavarica*. Jacq. obs. 3. p. 19. t. 71. Barr. 109. f. 2. *Ericula*. Rencul. spec. 75. t. 68. f. 2.

31. *utriculosa*, multicaulis, fol. radicalib. ovatis rosaceis, cor. quinquefidis hypocrateriformibus, cal. plicato-carinatis. L. Barr. ic. 48. 122. f. 2. Hab. in Germaniae australioris, Helvetiae, Italiae et Galliae pratis montanis et subalpinis. ☉

32. *bavarica*, cor. quinquefida infundibuliformi, laciniis obtusis serratis, fol. ovatis obtusis, radicalib. confertis imbricatis, caulinis minoribus. Froel. Gent. p. 71. Villars. delph. 2. t. 10. Schmidt. in Rœmer. Archiv. 1. p. 17. t. 5. f. 12. Gentianella elegantissima bavarica. Cam. hort. 65. t. 15. f. 1. Barr. ic. 101. In alpinibus.

33. *pumila*, cor. quinquefida infundibuliformi subserrata, fol. lanceolato-linearibus. Jacq. Obs. 2. p. 29. t. 46. Ej. Flor. austr. 4. t. 302. In Alpi. Una cum antecedente *G. verna* nimis affinis. ☿

34. *imbricata*, cor. quinquefida infundibuliformi caulem superante, fol. imbricatis ovatis acutis margine scabris. Froel. p. 74. Cam. hort. t. 15. f. 2. Barr. ic. f. 2. Hab. in alpinibus Helvetiae, Carinthiae. ☿

35. *prostrata*, cor. quinquefida infundibuliformi, caul. unifloro prostrato, fol. obtusis subimbricatis. Haenke in Jacq. Coll. 2. p. 66. t. 17. f. 2. Hab. in summis alpium Salisburgensium. ☿

36. *nivalis*, caul. multifloro, cor. quinquefidis infundibuliformibus, ramis alternis unifloris, fol. cauliculis lanceolatis. Froel. p. 83. Flor. dan. 17. Hall. helv. 1. 17. ☿. caule elongato filiformi subramoso. Froel. Barr. ic. 509. f. 2. ☿. caule humili subunifloro. Barr. ic. 101. f. 2. Hab. in summis alpinibus. ☉

37. *aquatica*, cor. quinquefidis infundibuliformibus terminalibus sessilibus, fol. margine membranaceis. L. Pall. ross. 2. p. 109. t. 57. f. 2. *G. humilis aquatica verna*. Amm. ruth. 4. t. 1. f. 1. Hab. in Sibiria, Japonia, China ad aquas. ☉

38? *Scilloides*, caule unifloro prostrato ramoso, fol. obovatis obtusis trinerviis, cor. infundibuliformibus quinquefidis, bracteis binis. Linn. suppl. 175. Hab. in insulis Azoricis. Limbus planus limberbis luteus.

39. *Amarelloides (kentuckensis)* caul. 4-gono, fol. semi-amplexicaulib. ovalibus, flor. subternis pedicellatis, cor. (subluta) 5-fida, lacin. lanceolatis setaeo-acuminatis. Michaux. Flor. 1. p. 175. Hab. in monticulis Kentucky. Sequente paulo minor. Cor. obsolete lutea, mucosa, fauc. glabra. M.

\*\*\*\* *Cor. sauce squamis, capillaceo-multifidis acutis, 4-5-fidis.*

40. *Amarella*, flor. fasciculato-subumbellatis, cor. hypocrateriformib. 5-fidis sauce barbatis, tubo transversim crispo, cal. lacin. aequalibus, fol. ovato-lanceolatis. Flor. dan. t. 328. Var. flor. 4-fidis. Smith. brit. t. p. 237. Autumno frequens in sylvaticis, et pascuis cal. carcis. Sapor valde amarus. Huc pertinet *G. germanica*. Willd.

41. *lanceifolia*, cor. hypocrateriformib. 4-5-partitis barbatis acutis: laciniis lanceolatis acutis, fol. lanceolatis. Rafn. Flor. Dan. Schumacher. Flor. Saelland. p. 80. *G. Amarella*. Willd. p. 1347. Hippiion axillare. Schmidt. Habit. in Europ. septentrionalis pratis. Aug. Sept. Cor. minor quam in priore. Rad. flava. Willd.

42. *uniflora*, cor. quinquefida hypocrateriformi barbata, laciniis ovatis acutis, fol. ovatis acutis, caule simplicissimo unifloro. Willd. Hippiion Gentianella. Schmidt. l. c. p. 23. t. 3. f. 4. In pascuis humidis alpinis Sudetorum et Bavariae. ☉

43. *obtusifolia*, cor. quinquefidis hypocrateriformibus haratis, tubo calyce subaequali breviori, fol. lanceolatis obtusis, Hippiion obtusifolium. Schmidt. bohem. n°. 126. Roem. arch. 1. p. 22. t. 2. f. 3. Hab. in summis montium jugis Bavariae inque Sudetis. ☉

44. *uliginosa*, cor. subquinquefidis hypocrateriformibus acutis sauce barbatis, calycib. subaequalibus, fol. ovato-lanceolatis, caule ramoso tetragono basi subulato. Willd. p. 1347. *G. Amarella*. Willd. prol. Berol. n°. 293. Hab. in Marchiae Electoralis pascuis udis. ☉

45. *pratensis*, cor. subquinquefidis hypocrateriformibus obtusis sauce barbatis, cal. laciniis inaequalibus, fol. lanceolatis. Froel. Gent. p. 83. Flor. Dan. t. 328. *G. campestris*. Pall. ross. 2. p. 103. Hab. in Russia, Sibiriae et Daniae pratis et humidis. ☉

46. *campestris*, cor. quadrifidis hypocrateriformibus obtusis sauce barbatis, cal. laciniis duabus maximis. Froel. p. 71. Flor. dan. t. 357. Hab. in pascuis montanis, sylvat.

47. *auriculata*, cor. quadrifidis quinquefideque campanulatis intus villosis, cal. laciniis alternis cordatis. Pall. ross. 2. p. 101. t. 92. f. 1. In Sibiria, Camtschatka, etc. ☉

48. *tenella*, cor. quadrifidis hypocrateriformibus sauce barbatis, caule subdichotomo, pedunc. longissimis, fol. subovatis

obtusiusculis. Froel. p. 66. Roth. Act. Hafn. 40. p. 436. t. 2. f. 6. Flor. dan. t. 38. *G. tetragona*. Lam. Hab. in alpinis Norvegiae inque Islandia. Cal. laciniarum subrotundo-ovatae acutae, duae majores et latiores. Willd. ♂

49. *glacialis*, cor. quadrifidis hypocrateriformibus fauce barbata, caule inferne ramoso lolioso. Froel. p. 98. Villars. delph. 2. p. 532. *G. tenella*. Towson Travels in Hungary. t. 14. Hippiion longepedunculatum. Schmidt. l. c. p. 21. t. 3. f. 5. Hab. in summis alpinis.

50. *dichotoma*, cor. quinquefidis campanulatis fauce barbata, caule dichotomo, pedunc. longissimis, fol. subovatis acutis. Froel. p. 100. Pall. ross. 2. p. 110. Gmel. sib. 4. p. 105. t. 51. f. b. Hab. in Sibiria. ♂

51. *nana*, cor. quinquefidis campanulatis fauce barbata, caul. subdichotomis, pedunc. elongatis, fol. ovatis obtusis. Froel. p. 102. Jacq. Misc. 1. p. 161. t. 10. f. 3. Hab. in summis alpinis Carinthiae et Salisburgi ♂

52. *carinthiaca*, cor. quinquefidis rotatis fauce barbata, caul. dichotomis, pedunc. longissimis, fol. ovatis obtusis. Froel. de Gent. p. 103. Swertia carinthiaca Jacq. misc. 2. p. 53. t. 6. In alpinis Carinthiacis et Salisburgensibus. ♂

53. *sulcata*, cor. quinquefidis rotatis fauce squamosis, calycisque laciniis lanceolatis, fol. linearibus obtusis. Willd. p. 1351. Swertia sulcata. Roth. in Art. Haf. 10. p. 418. t. 1. f. 4. Flor. dan. 1. 343. Hab. in Islandia. An a sequente diversa? ♂

54. *rotata*, cor. quinquefidis rotatis, fauce squamosis, laciniis ovatis, cal. lacini. oblongo-ovatis, fol. ovato-lanceolatis acutiusculis. Willd. Cor. quinquefidis rotatis, fauce squamosis, fol. linearibus lanceolatis. Froel. p. 105. Swertia rotata. Lin. Gmel. sib. 4. t. 52. f. 2. Pall. ross. t. 89. Hab. in Sibiria. ♂

\*\*\*\*\* Cor. quadrifidis hypocrateriformibus, fauce nudis.

55. *ciliata*, cor. quadrifidis, laciniis serratis medio inciso-ciliatis, fol. lanceolatis linearibusque, caule flexuoso angulato. Froel. p. 109. Jacq. austr. t. 113. Hab. in montibus. ♀

56. *crinita*, cor. quadrifidis, laciniis inciso-ciliatis, fol. lanceolatis acutis, caula erecto tereti. Froel. p. 112. Hab. in Amer. boreali.

57. *barbata*, cor. quadrifidis, laciniis

serrulatis medio inciso-ciliatis, fol. linearibus acuminatis, caule acutangulo stricto. Froel. p. 114. Pall. ross. 2. t. 92. f. 2. Hab. in Sibiria et in pratis alpinis Caucasi. ♂

58. *detonsa*, cor. quadrifidis, laciniis apice crenulatis, margine utrinque bidentatis, fol. linearibus acutis caule erecto. Froel. p. 116.

636. SWERTIA. Cor. rotata. Nectariferi poro ad basin laciniarum corollae. Caps. unilocularis, 2-valvis.

\* Corolla ecalcarata.

1. *perennis*, cor. quinquefidis, pedunc. tetragonis subulatis, caule indiviso, fol. radicalibus ovalibus. Willd. Sp. 2. p. 1329. Jacq. austr. t. 243. Hab. in alpinis et locis montosis humidis.

2. *difformis*, cor. quinquefidis terminali scissila, pedunc. longissimis, fol. linearibus. L. Hab. in Virginia. Flor. albi.

3. *decumbens*, cor. quinquepartitis, fol. linearibus lanceolatis, caule decumbentibus. Vahl. symb. 1. p. 24. Parnassia polynectaria. Forst. descr. 207. Icon. t. 5. f. 6. Hab. in Arabia felici.

4. *dichotoma*, cor. quadrifidis, pedunc. nutantibus, fol. ellipticis, caule ramoso. Willd. Gmel. t. 53. f. 3. Pall. ross. 2. t. 91. Hab. in Sibiria. ♂

5. *tetrapelata*, cor. quadrifidis, fol. lanceolatis nervosis, caul. simplic. Pall. ross. 2. p. 59. t. 90. Hab. in Camtschatka. ♂

\*\* CERATIA. Cor. subcampanulata, basi corniculata exsertens.

6. *corniculata*, flor. quadrifidis, cor. subcampanulata, tubo deorsum quadricalcarato. Michx. Flor. t. p. 97. Gmel. Sibir. 4. t. 53. f. 4. Pall. ross. 2. t. 90. f. 1. Hab. in Sibiriae et Canadac paludosis. Flos. flavo-virens. ♂

7. *umbellata*, cor. quadrifidis, quadricornibus, fol. lanceolato-linearibus connatis, flor. terminalib. umbellatis. Flor. Peruv. 3. p. 21. t. 242. f. b. Hab. in Andium alpinis. Cal. corollae luteae. ♂

CONVOLVULACEAE pentandri-digyni. (Gen. 637 - 643.)

637. FAIKIA. Cal. subinflatus, 5-partitus, 5-angularis. Cor. campanulata, emarginata crenata (crenato-decempartita. Andr.)

*Styli* divaricati. *Stigm.* subglobosa, lanata. *Sem.* 4, globosa, arrillata, in fundo calycis. *Andrew.*

1. *repens*, fol. cordatis longe petiolatis, caul. sarmentoso. *Andrew.* *Repos.* t. 257, qui bene observavit hoc genus non ad *Hexandrium* pertinere, ad quam retulit Linne, fil., Willd. *Sp. tom.* 2. p. 248. *Itab.* ad Cap. bon. *Sp. Convolv.* exacte refert, sed fructu a convolvulaceis differre videtur.

638. *EVOLVULUS. Cal.* 5-phyllus. *Cor.* rotato-campanulata: lobis submarginatis. *Styli* 2, profunde bifidi: lacinias capillaribus divergentibus. *Stigm.* simplicia. *Caps.* 2-locularis, 4-valvis, 4-sperma. *Sem.* bina. (*Sem.* solitarium. Lin.) *Flor. Peruv.*

1. *nummularius*, fol. subrotundis, caul. repente, flor. subsessilibus. Lin. Willd. *Sp.* 2. p. 1516. Jacq. *amer. pict.* 1. 260. f. 23. *Slova. hist.* 1. p. 157. t. 99. f. 2. *Hab.* in Jamaicae pratis. ☉

2. *villosus*, fol. oblongo-ovalibus, caul. procumbentibus, pedunc. longis bifloris. *Flor. Per.* 3. p. 30. t. 251. f. b. *Hab.* in Peruv. collib. arenosis. *Fol.* perpendicularia. *Cor.* caeruleo-violacea. ☞

3. *incanus*, fol. ovatis acutis, caul. procumbentibus, pedunc. brevibus 1-2-floris. *Flor. Peruv.* l. c. p. 30. t. 252. (*E. sericeus*.) Cum priore. Suffruticosus, dense sericeus. *Cor.* caerulea, extus villosa. ☞

4. *gangeticus*, fol. cordatis obtusis mucronatis petiolatis villosis, caule diffuso, pedunc. unifloris. L. *Amoen. acad.* 4. p. 306. n°. 121. *Hab.* in India.

5. *emarginatus*, fol. reniformibus repandis. Linn. *suppl.* p. 186. *Burm. ind.* 77. t. 30. f. 1. In India orientali. ☉

6. *alsinoides*, fol. oblongo-obovatis obtusis glabrescentibus petiolatis, pedunc. trifloris. Willd. p. 1517. *Rheed.* 11. t. 64. *Hab.* in Malabar, Zeylona. ☉

7. *hirsutus*, fol. ovatis sessilibus utrinque hirsutis, caul. pilosis cespitosis, pedunc. subunifloris. Lam. *Encyc.* 3. p. 38. *Ejuid.* ill. t. 216. f. 2. *Burm. Zeyl.* 11. t. 6. f. 1. et t. 9. f. 1. *Pluck. aln.* 116. t. 9. f. 1. *Hab.* in India orientali. ☉

8. *linifolius*, foliis lanceolatis villosis sessilibus, caule erecto, pedunc. trifloris

longis. L. *Amoen.* 4. p. 306. n°. 122. *E. fol.* lanceolatis villosis sessilib., caul. erecto piloso, pedunc. longis submultifloris. Lam. l. c. p. 537. *Ej.* ill. t. 216. f. 1. *Brown. jam.* 152. t. 10. f. 2. *Hab.* in Jamaica. *Cor.* subbulbosa caerulea.

9. *sericeus*, foliis lanceolatis sessilibus subtus sericeis, pedunc. brevibus unifloris. Swartz. *Fl. ind. occid.* 1. p. 576. *Brown. jam.* t. 10. f. 3. *Hab.* in sabulosis arboribus Jamaicae. Simillima *E. linifolio*, sed distinguitur pedunc. brevissimis unifloris. S. ☉

β? *Commerstoni*, flor. axillarib. subsessilibus solitariis albis, fol. parvis linearilanceolatis. *Convolvulus* Commers. *vid.* Lam. *enc.* 3. p. 538. In Montevideo.

639. *DICHONDRA. Cal.* 5-partitus; lacinias subspathulatis. *Cor.* brev. campanulata, 5-partita. *Stigma* peltato-capitata. *Caps.* subcompressa, partito-didyma, 2-locularis: loculis 1-spermis. *Sem.* globosa.

1. *carolinensis*, pubescens, fol. absque emarginatura reniformibus (senior-biculatis?) utrinque viridibus, cal. villis ciliatis. Michaux. *Flor.* 1. p. 136. Dimidiata repens. Gmel. *Hab.* in Carolina. *Styl.* 1, sed profunde bipartitus. M.

2. *repens*, fol. reniformibus emarginatis subtus pubescentibus. Willd. *Sp.* 2. p. 1353. Smith. *ic. ined.* 1. p. 8. t. 80. Lam. *ill.* t. 183. *Sibthorpia* evolulacea. Lin. *Suppl.* p. 288. *Hab.* in N. Grenada et N. Zeelandia.

β? *peruviana. D. repens*, caul. gliformi, repente, fol. reniformibus emarginatis, subtus nervosis sericeis. *Flor. Peruv.* 1. p. 22. In Peruviae ruderalis. *Cor.* albido-lutea. *Fruct.* dispermus, membrana tenui evalvi tectus. l. c.

\* *sericea*, fol. reniformibus retusis subtus sericeis. Swartz. *Flor.* 1. p. 556. Willd. p. 556. *Hab.* in Jamaica et in Ins. Mauritiis. ☞

640. *CRESSA. Cal.* 5-phyllus. *Cor.* hypocrateriformis. *Filum.* tubo insidentia. *Cap.* supra 2-valvis, t. s. 4-sperma, basi debiscens.

1. *cretica*, cor. imberbibus, capsulis monospermis. Retz. *obs.* 4. p. 24. Willd. p. 1320. Lam. *ill.* t. 183. Desf. *Atl.* 1. p. 220. *Lysimachiae* spicatae purpureae affinis. *Pluck. aln.* 236. t. 43. f. 6. *Hab.* in Cretae litoribus salis, et ad maris litora prope Tuncum, Cnerea, pubesc.

2. *indica*,

2. *indica*, cor. apicibus barbatis, capsulis tetraspermis. Retz. obs. 4. p. 23. Hab. in Indiæ calidis. Similis *C. cretica*. ☉

641. *NAMA*. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-partita. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis. *Recept.* 2-lamellatum. *Sem.* numerosa.

1. *jamaicensis*, caul. decumbente, fol. obovatis, flor. solitariis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1326. Lam. ill. t. 184. Brown. jam. t. 18. f. 2. Hab. in Jamaica, in saxosis. *Cor.* 5-crenata, longitudine cal. Br. ☉

642. *HYDROLEA*. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* rotata, aut campanulata. *Filam.* basi (et *Antherae*) cordata. *Sylli* longi divergentes. *Stigmata* capitato-peltata. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis.

\* *Spinosae.*

1. *spinosa*, fol. lanceolatis hirsutis, flor. terminalibus. Willd. Sp. 2. p. 1327. Aubl. Guj. 1. p. 281. t. 110. Hab. in Amer. meridionali. Fol. viscosa. L. Flor. interdum 6-fidi, 6-andri, et caps. 3-stylis, 3-locularis. Juss.

♂ ? *trigyna*, spinosa, fol. oblongis hirsutis, flor. 3-gynis axillaribus. Swartz. Flor. ind. occ. t. p. 558. Hab. pro Vera-Cruz et in Acapulco viciniis.

*Obs.* Cavanilles icl. pl. v. 6. p. 19. hanc et priorem in unam conjunxit, quia stylo-rum numerus (secundum eundem) in eadem planta variat a 2 ad 4, et quis hae plantae in reliquis conveniunt.

2. *caroliniana*, spinosa, fol. lanceolatis longis, flor. subsessilibus axillaribus. Michaux. Flor. p. 177. H. quadrivalvis. Walz. Hab. in aquis stagnantibus. H. spinosae similis dicitur, sed non ita ramosa. Flor. 1-5 fasciculati.

\*\* *Inermes.*

3. *Zeylanica*, caul. inermi, flor. subracemosis, fol. lanceolatis glabris. Vahl. Symb. 2. p. 46. *Nama zeylanica*. Lin. Flor. zeyl. t. 2. *Steris javanica*. Mant. p. 54. Lam. ill. t. 184. Burm. ind. t. 36. f. 3. Rheed. 10. t. 28. In Ind. orientali. ☉

4. *urens*, flor. paniculatis (parvis), apicis conjugatis dichotomisque, fol. duplicato-dentatis cordatis, superiorib. ovalibus. Flor. Per. 3. p. 21. t. 243. Hab. in Peruv. praeruptis calidis, 2-3-orgyis,

lenae hirsuta. *Cor.* violacea limb. extus hispido. ☿

5. *crispa*, flor. panicul. (magnis), apicis conjugatis, fol. multifloris crispis incisoserratis. Flor. Per. p. 22. t. 244. f. 2. In Andium nemorib. ad margines Pozuzo fluvii. *Cor.* magna alba campanulata. ☿

6. *dichotoma*, flor. solitariis e dichotomis, fol. oblongo-spathulatis. Flor. Per. l. c. fig. b. Hab. passim in lucu uci urbis arenosis et argillosis. Viscosa. Fol. supra retrossum aspera. *Cor.* alba, lincis caeruleo-violaceis maculatis. ☉

643. *CUSCUTA*. *Cal.* 4-5-fidus. *Cor.* 4-5-fida. *Caps.* 2-locularis, basi circumscissa. *Sem.* bina. (Stam. passim. 4. Embryo spiralis. G. Nect. s. squamae in corol. basi quibusdam.)

1. *vulgaris*, flor. subsessilibus, cor. 4-5-andra fauce nuda, stigmatib. acutis. *C. europaea*. Lin. Smith. Flor. brit. 1. p. 282. Flor. dan. t. 199. Engl. bot. t. 378. Hab. in agris, ad aepes, in plantis parasitica, quas extinguit, hinc valde nociva.

2. *corymbosa*, flor. pedunculatis corymbosis, cor. ovatis 4-fidis 4-andris fauce nudis, stigm. capitatis. Flor. Peruv. t. p. 69. t. 115. f. b. Hab. in Peruviae cultis, praesertim supra Melicag. sativam.

3. *Epithymum*, minor, flor. sessilibus, staminib. squama crenatis munitis, stigm. simplicib. L. Smith. l. c. p. 283. Engl. bot. t. 35. Flor. dan. t. 427. *C. europaea*. Lam. enc. 2. p. 229. *C. europaea*. ♂ Willd. Sp. p. 502. In plantis humilioribus, praesertim in pratis, parasitica. A. vulgari distinctissima; etiam multo tescior, col. rubella. ☉

4. *odorata*, flor. congestis sessilib., cor. campanulatis, basi squamis imbricatis, stigm. capitatis. Flor. Per. l. c. t. 105. f. a. Hab. in Lima argetibus et versuris. Cal. albus punct. purpureis maculatus.

5. *americana*, flor. pedunculatis umbellatis, stigm. capitatis, cor. tubulose limbo patente. Lin. Jacq. Amer. ed. picta. t. 17. *C. surinamensis*. Schill. lepr. t. 2. Sloan. hist. jam. 1. t. 128. f. 1. Hab. in sepiis et fruticesis Caribaeorum. Flor. parvi aggregati flavescentes. Nectar. e squam. 5, imbricatis infra stamina, cor. aduata. Jacq.

6. *chinensis*, flor. paniculatis, 5-fidis, cal. anguloso longitudine corollae. Lam. ill. 1. p. 36. Enc. bot. 2. p. 229. Hab. in

China. Flor. subsparsi in pedunc. ramosis. Cor. fere globosa, albid. Styli brevissimi, stig. subcapitata. Lam.

7. *africana*, flor. pedunculatis, pedunc. unifloris, cor. quinquelobis. Willd. p. 703. C. americana. Thunb. prod. p. 32. Hab. in Cap. b. spec. arboribus. Pedunc. uniflori bractea lanceolata suffulti.

*Obs.* Hanc in Myria aethiopa crescentem vidit Linnæus et sub nomine *Schreberæ* descripsit. Willd.

8. *monogyna*, flor. pedunculatis monogynis. Vahl. symb. 2. p. 32. Tournet. Cor. 45.  $\beta$ ? *lupuliformis*, flor. racemosis. Krock. sides. n.º. 251. t. 36. Ruxb. Cent. 1. p. 15. t. 23. (Secundum Willdenow.) Hab. in Oriente.  $\beta$  in Silesia et Mospelii. Facies C. americanæ, et omnia duplo majora. V.

9. *reflexa*, racemis numerosis, cor. 5-partita: lacinii reflexis. Roxburgh. corom. 2. p. 2. t. 104. Hab. in India. Cresc. durante cælo frigido.

644. *LINCONIA*. *Cal.* laciniae bracteæformes, per paria oppositæ: exteriores minores. *Cor.* (*Cal.* Juss.) basi urceolata, 5-fida: laciniiis palcaeformibus, canaliculatis, basi foveatis. *Caps.* semi infera, 2-locularis, 2-partibilis: loculis 1-spermis.

1. *alopecuroides*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1206. Herm. afr. 7. Hab. in montosis aqueis Cap. b. Sp. Frutex abietiformis. Fol. linearia, triquetra, subverticillata.

\* *peruviana*, fol. verticillatis subdenis linearibus sessilibus hirsutis basi connatovaginis. Lam. enc. 3. p. 527. Hab. in Peru.

645. *VELEZIA*. *Cal.* gracilis, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala, parva. *Caps.* 1-locularis, apice 4-valvis. *Sem.* plurima, receptaculo filiformi, centrali affixa.

1. *rigida*. L. Willd. Sp. 2. p. 1329. Barr. rer. t. 1018. Boec. mus. 2. t. 43. Hab. in Europ. australi: Hispania et in Barbaria prope Mascar. Desf. atl. 1. p. 221. Caul. ramosissimus. Cor. parva limbo roseo. Siam. 5-6. ©

646. *VAULIA*. *Cal.* 5-phyllu. *Cor.* 5-petala. *Caps.* infera, unilocularis, polysperma.

1. *capensis*. Thunb. Diss. Nov. gen. c.

c. Willd. Sp. 2. p. 1356. Russelii. Linn. suppl. 175. Hab. ad Cap. b. spec. sabulosis. Statura Silenis. Fol. opposita. Fl. ex summis ramis 2-3. Petala et Antheræ nivæe. Th.

647. *CARMONEA*. *Cal.* persistens, 5-partitus. *Cor.* rotata. *Styl.* capillares. *Drupa* globosa, 6-locularis. *Sem.* solitaria.

1. *heterophylla*, fol. alternatim fasciculatis, flor. racemosis. Cav. ic. 5. p. 438. Hab. in ins. Luzon. etc. Fol. oblongo-ovata, nunc integra, nunc apice tridentata. h

648. *ROCHEFORTIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* infundibuliformis, fance aperta. *Fructus* 2-locularis, polyspermus.

1. *cuneata*, fol. cuneiformibus obovatis integris. Swartz. Fl. ind. occident. 1. p. 554. Hab. in Jamaicae saxosis aridulis montosis. h

2. *ovata*, fol. ovatis emarginatis. Swartz. l. c. p. 554. Hab. in Jamaicae fruticetis lapiosis. h

649. *HEUCHERA*. *Petala* 5. *Caps.* 2-rostris, 2-locularis.

1. *americana*, viscosa-pubescentia, scapis subnullis, thyrsis elongato, fol. radicalibus longe petiolatis semptenlobis. Murr. Comm. Gott. 3. p. 66. Cortusa americana, flora aequalide purpurea. Herm. parad. 131. t. 131. H. Cortusa. Michaux. t. p. 171. Habit in America boreali. Petala purpurascencia. T

2. *villosa*, minor villosissima, fol. acute lobatis, panicul. capillarib. laxiflora. Michaux. t. p. 172. Cresc. in Carol. infer. montibus. Flor. parvi, albi.

650. *GUMILLEA*. *Cal.* campanulatus, 5-fidus. *Cor.* o. Germen semibifidum. *Caps.* 2-locularis, polysperma, birostris.

1. *auriculata*, fol. impari-pinnatis. Flor. Per. 3. p. 23. t. 24. Habit in Peruviae nemorib. juxta Munnae picum.

651. *BUMALDA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Styli* villosi. *Caps.* 2-locularis, birostris.

1. *trifolia*, fol. oppositis ternatis. Thunb. jap. p. 114. Ej. Diss. bot. 1. p. 63. Hab. in Japoniae montibus. Raccem. terminalia. h

652. *ULMUS*. *Cal.* campanulata 5-fidus. *Cor.* o. *Caps.* (Nux)



Samara. G.) compressa, membranacea-alata. (Stam. etiam 4 et 8. Flor. conglomerati.)

1. *campestris*, foliis duplicato-serratis basi inaequalibus, flor. subsessilibus conglomeratis pentandris, fructib. glabris. Willd. Sp. pl. 2. p. 134. Lam. ill. t. 185. *β. latifolia*, fol. subtus pubescentibus. Cresc. in campestribus, ad vias publicas. Rami divaricati, nonnulli quasi penduli. *h*
  2. *suberosa*, fol. duplicato-serratis basi subaequalibus, flor. subsessilibus conglomeratis tetrandris, ramulis suberoso-alatis. Willd. *U. hollandica* quorund. videtur. *U. campestris* plerumq. autor. et Linnæi? *β. fruticosa*, humilis, fol. parvulis pubescentibus. Cum priore, *β. ad sepes*. Rami virgati, erecti, ramuli subdistichi. *h*
  3. *alata*, ramis utrinque alato-suberosis, fol. oblongo-ovalibus sensim acutis, basi subaequalibus, fructu pubescente-ciliato. Michaux. p. 173. *U. pumila*, Walt. ? Arb. metoeris, fol. carpineae. Hab. in Virginia et Carolina inferiore.
  4. *fulva*, fol. ovali-oblongis longissime acuminatis utrinque pubescentibus, gemmis lana densa fulva tomentosis, flor. sessilibus. Michaux. Fl. 1. p. 172. Hab. in Americæ frigidioris regionalib. in montibus Alleghaniis. Succus sub cortice viscosus (unde incolis Sliperi-clm.) *h*
  5. *effusa*, fol. duplicato-serratis basi inaequalibus, flor. octandris pedunculatis effusis, fructib. margine ciliatis. Willd. *U. campestris*. Flor. dan. t. 632. *U. montana*. With. Smith. brit. 282. *U. ciliata*. Ehrh. Hab. in nemoribus, sepius. Fol. latiora, quam in præcedente, minusque aspera. Sm.
  6. *americana*, ramis lacivibus, fol. serraturis uncinato-acuminatis, flor. pedicellatis, fructib. villo densissimo subbratis. Michaux. Flor. 1. p. 172. Hab. in Amer. boreali. Stam. 5-8. Fol. subtus pubescentia.
  7. *nemorialis*, fol. oblongis glabriusculis aequaliter serratis basi subaequalibus, flor. sessilibus. Air. Kew. 1. p. 320. Hab. in Amer. boreali. *h* +
  8. *pumila*, fol. aequaliter serratis 1 basi aequalibus. Pall. ross. 1. p. 76. t. 48. Hab. in Sicilia. *h*
- Obs.* Statura, dicit Pallas l. c., hujus speciei sæpe certat cum quercu. Rami divaricati. Stipul. ferrugineae, membranaceo-racæ. Samaræ s. nuculae glabrae, apice nigræ. Sequens quæ in horto Celsii colitur diversa species videtur.

\* *microphylla*, fol. (parvulis) incisogerratis basi attenuatis subaequalibus, ramis virgatis. *U. pumila*, *β. transbaicalensis*. Pall. 1. c. fig. A. B. C. E. Fol. conferta lanceolato-ovata Euphr. officinalis, var. sylvestris, fere similia, sed paullo majora, sub lente tenuiter pubescentia. *h*

9. *chinensis*, sempervirens? fol. (subparvis) coriaceis nitidis brevi serratis ovatis basi obliquis. *U. pumila* quorundam. Thé de l'abbé Gallois per ironiam. (Cels.) Hab. in China. Colitur in hortis et (durante hyeme) in frigidariis, Statura humilis. Fol. lacte viridia, rigida ex ovato sublanco-lata. *h*

10. *integrifolia*, fol. integerrimis, stam. 7-9. Roxb. Corom. 1. p. 56. t. 78. In montib. chinensib. Ind. orient. Arb. magna. Cal. 4-5-6-fidus. R.

653. *PLANERA*. Polygama. Cal. membranaceus, subcampanulatus, 4-5-fidus. Cor. o. *Stigm.* 2, oblonga, glandulosa, recurvo-divergentia. Caps. (Nux?) subglobosa, membranacea, 1-locularis, non dehiscens, sut. laevis, aut squamulosa (non alata), 1-sperma. Masculi floris intermixti stam. 4-6. (Frondescencia et Floratio Ulmi, cui valde affinis. Michaux.)

1. *aquatica*, fol. petiolatis oblongo-ovalibus basi obtusis, aequaliter serratis, caps. scabra. Michaux. Flor. 2. p. 248. Pl. aquatica. Gmel. Syst. p. 150. Hab. ad ripas fluv. Ochio, Mississippi et Carol. Vere.

2. *Richardi*, fol. subsessilibus oblongo-ovalibus crenato-dentatis basi emarginatis, caps. laevi. Michaux. l. c. Ulmus polygamus. Richard. Rhamnus carpinifolius. Pallas Flor. ross. 1. t. 60? Habitat circa mare Caspium.

654. *CELTIS*. Polygama. Cal. 5-partitus. Cor. o. *Styli* divaricati, crassiusculi. *Drupa* monosperma. Flor. masculi (inferioris) cal. 6-partitus et Stam. 6. (Folia saepius obliqua. Filam. elastica?)

1. *australis*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, fructu solitario. Lam. enc. 4. p. 136. C. fructu nigricante. Tournef. Scopoli Delic. 2. p. 97. t. 18. Duhamel. Arbr. 1. p. 143. t. 53. Hab. in Europa australi et Barbaria. Arb. magna, cujus fructus mense Jan. maturescunt. Lign. durum, nigrescens.

2. *occidentalis*, fol. oblique ovatis serratis acuminatis, fructu solitario. Lam. l. c. Mill. diet. t. 88. Gaertn. de fr. 1. p. 374. t. 77. f. 3. Scop. l. c. p. 100. C. fol. inferioribus ternis, superioribus solitariis. Michx. 2. p. 249. Hab. in Amer. boreali, copiose ad Mississipi. Drupa cerasiformis obscure purpurea.

β? *tenuifolia*, fol. tenuioribus minus acuminatis, dentib. majoribus basi magis rotundatis; vid. Enc. bot. l. c. p. 137 et 138. Cresc. in Ludoviciana; colitur in H. P. An distincta?

3. *Tournefortii* (lutea), fol. parvis ovatis crenato-serratis: junioribus subcordatis, basi obliquis, fructu luteo. Enc. bot. l. c. C. orientalis minor, fol. minoribus et cerasioribus, fructu luteo. Tournef. iter. 2. p. et t. 45. C. orientalis. Mill. dict. n.º 3. Hab. in oriente, nunc in hortis colitur. Lign. candidum. Arb. statura Pruni. T. h

4. *orientalis*, fol. ovato-lanceolatis, basi oblique cordatis serrulatis subtus villosis, panic. axillaribus. Enc. bot. l. c. Rhecl. 4. t. 40. Retz. obs. bot. 6. p. 34. Hab. in Indiae montosis humidis, ad fluv. ripas. T.

5. *cordata*, fol. latius oblique cordatis acuminatis subpubescentibus, pedunc. subulioribus. C. crassifolia. Lam. enc. l. c. p. 138. Hab. in Amer. sub nomine imposito in hortis colitur. Fol. serraturae acutae et fere spinulosae.

6. *sinensis*, fol. lato-ovatis crenatis glaberrimis venis prominentibus. Hab. in Sina. Ex hort. Celsii. Fol. majuscula, obtusa.

7. *micrantha*, fol. oblique cordatis ovato-lanceolatis serrulatis superne scabrescentibus. Swartz. Prodr. p. 53. Ejusd. Flor. 2. p. 549. Brown. jam. p. 173. t. 12. f. 2. Ait. Kew. 3. p. 437. Rhamnus micranthus. Lin. Plum. gen. ic. 206. Hab. in Antillis. C. orientali affinis, sed fol. superne scabra, nec subus incano-tomentosa et magis serrulata. Sw.

8. *Lima*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis oblique cordatis serratis superne scaberrimis. Swartz. Prodr. p. 53. et Flor. p. 545. cfr. Enc. bot. 4. p. 140. Hab. in Ind. occidentali. Priori affinis, sed scabritie singulari differt. Sw.

Obs. Ad Celtes quoque refertur el. Swartz Rhamnum iguaneum. Lin. sub nomine. C. aculeata, cui affinis videtur Celtes integrifolia. Lam. enc. l. c., quae fol. integerrimis et styliis mollis distinguitur, sed vix hujus generis est.

655. *HERNIARIA*. Cal. 5-partitus. Cor. o. Filam. 5-sterilia cum staminibus alternis. Caps. 1-sperma.

1. *glabra*, herbacea glabra, glomerulis multifloris spicaeformibus. Lam. enc. 3. p. 124. Willd. Sp. 2. p. 1296. Flor. dan. t. 529. Hab. in apricis, arenosis, siccis. Pallescens, diffusa.

2. *hirsuta*, herbacea hirsuta, glomerulis parvis paucifloris. Lam. l. c. Banb. hist. 3. t. 379. f. 1. Priore rariore in arenosis.

3. *incana*, fruticulosa, fol. ovato-oblongis pilosis, cal. piloso-incanis. Lam. l. c. Hab. in Europa australi. Rami densi, decumbentes. Flor. fasciculati, axillares.

Obs. Forte non diversa ab *H. lenticulata* L., quae vero pro plagis dubia habetur; vid. Litter. Vahlj ad el. Willdenow. in Sebrad. bot. Journ. 1799. v. 1. p. 285.

β? *capensis*, suffruticosa, hirsuta, fol. ovatis. *H. lenticulata*. Thunb. prodr. p. 48. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *alpina*, fol. obovatis acutis glabris margine ciliatis, floribus glomeratis quinquefidis hirsutis. Willd. p. 1297. *H. alpina*, glomerulis paucifloris hirsutis, radice crassa sublignosa. Villars. delph. 2. p. 556. *H. alpestris*, flor. 4-5-fidis etc. Lam. enc. 3. p. 125. Hab. in alpinis Delphinatus et Helvetiae. T.

5. *fruticosa*, fol. ovalib. congestis acutiusculis hirsutis, flor. glomeratis quadridis. hispido-hirsutis, caule fruticoso. Willd. Loh. ic. 85. Hab. in Hispania et Gall. meridionali. Rad. crassiuscula.

6. *polygonoides*, glabra, caule erecto dichotomo, fol. ovatis cuspidatis, flor. terminalibus. Willd. p. 1298. Cavan. ic. 2. p. 27. t. 131. H. erecta. Desf. Atl. 1. p. 214. Illecebrum suffruticosum. Lin. Hab. in Hispania et in collib. prope Mascar.

*ATRIFLICINA*. Gen. 556-63. *pentandra*, flor. incompletiis s. cor. o, parvis, conglomeratis. Sem. 1.

656. *ATRIPLEX*. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Styl. 2-partitus. Sem. 1, depressum. Flor. feminini intermixti, quibus: Cal. 2-phyllus. Sem. 1, compressum. (Hac nota a sequente genere differt.)

1. *Halimus*, tota, argenteo-glaucis, cael. fruticoso, ramosissimo, fol. deltoideis

integris. Lin. *Halimus latifolius*, Bauh. Hab. in Hispania, Lusitania, Anglia, Siberia, Barbariae et Virginiae maritimis. Fol. subcornosa, persistentia, aliquando basi dentata.  $\eta$

2. *odorata*, cinereo-glaucis, caul. fruticoso, ramis angulatis, fol. petiolatis basiatis, spica simplici fructigena crassa supingui. An *A. albicans*. Alt. Kew. 3. p. 430? Hab. ad Cap. b. sp. Col. in hortis. Florescul. ex pallescente subpurpurei. Cal. fruct. inflatus subcornosus complicatus. Olor satis gratus uti fruct. Cucum. Melo.  $\eta$

3. *mollis*, caul. fruticoso erecto, fol. lanceolatis carnosissimis, cal. fructus rotundatis integerrimis. Desf. Atl. 2. p. 392. Hab. in Barbariae desertis. Facies sequentis. Cal. planus membranaceus maximus. D.

4. *portulacoides*, albedo-glaucis diffusa, caule fruticoso, fol. subpetiolatis obovatis. L. Sowerb. engl. bot. t. 261.  $\beta$ . Pluck. Alm. Gr. t. 61. f. 4. Hab. in Oceani septentrionalis littoribus.  $\eta$

5. *glauca*, caule suffruticoso procumbente, fol. ovatis sessilibus integerrimis: inferioribus subdentatis. L. Diff. elth. 46. t. 40. f. 46. Barr. var. 1145. t. 733. Hab. in Galliae australis, Hispaniae et Barbariae maritimis.  $\eta$

6. *rosea*, caule herbaceo, fol. inconis serratis (profunde sinuatis), fructibus quadrangularibus dentatis. A. sylvestris, fructu roseo compresso. Bauh. pin. 119. Hab. in Europa australiore.  $\odot$

Obs. Cal. fructus lobato-dentatus: laciniis lateralibus truncatis quadrangularibus. Link in Schrad. Journ. 1800. p. 55.

$\beta$  ? *foliosa*, caul. herbaceo, rhombo-oblongis sinuato-dentatis, fruct. triangularibus acutis. Link. l. c. Hab. cum praecedente ad littora Tagus in Lusitania.  $\odot$

Obs. An cum sequente tantummodo prioris varietas? vid. Lam. enc. 1. p. 274.

7. *sibirica*, caule herbaceo, fol. deltoideis angulatis, calycibus fructus exius muricatis. Hab. in Siberia. Magniudo *A. hortensis*. Fol. infra argentea. Flor. albi. Gmel.  $\odot$

8. *tatarica*, caule herbaceo, fol. deltoideis sinuato-dentatis undulatis alternis. Hab. in Tataria. Altitudo humana.  $\odot$

9. *hortensis*, caule erecto herbaceo, fol. triangularibus. Blackw. t. 55. et 552.  $\beta$ . *A. hortensis* rubra. Bauh. pin. 119. Habitat sponte in Tataria.  $\odot$

10. *laciniata*, caule herbaceo, fol. deltoideis densatis subtus argenteis. Hab. ad

Europae et Virginiae septentrionalis littora marina. Tota tecta quasi epidermide sceudente. Spicae terminales hermaphroditae antheris lacte rubris. Flor. feminei axillares gemini. L.  $\odot$

$\beta$  ? *sinuata*, caul. herbaceo, fol. deltoideis hastatis sinuatis subtus argenteis cal. seminum spicatis muricatis. Hoffm. Flor. Germ. 2. p. 277. *A. laciniata*. Lam. enc. 1. p. 275? Moris. 2. 5. 1. 32. f. 17.

11. *bengalensis*, caul. herbaceo erecto? fol. oblongo-deltoideis subhastatis obtusis. Lam. l. c. p. 276. Hab. in Bengaliam. Fol. viridi rubescunt.  $\odot$

12. *hastata*, caul. herbaceo erecto, cal. valv. faemineis magnis membranaceis reticulatis, margine dentibus longe setaceis. Smith. in Engl. bot. Hoffm. l. c. Moris. 2. 5. t. 32. f. 14. Hab. in Europa frigidiore. Genuina *A. hastata* paucis tantum nois videtur.

13. *patula*, procumbens, caul. herbaceo patulo, fol. triangulari-lanceolatis, cal. sem. triangularibus acutis margine et disco dentatis. Smith. Engl. bot. *A. hastata*. Curt. Fl. Lond. *A. virgata*. Scop. Del. insub. 2. p. 14. t. 7? Hab. in cultis et ruderalibus.

14. *virgata*, caul. herbaceo patulo, fol. lanceolatis, ramis decussatis. Hoffm. Germ. 2. p. 277. Schkubr. Handb. 3. t. 347.

15. *nitens*, caul. erecto herbaceo, fol. nitidis: inferioribus sagittatis crosso-dentatis acuminais, mediis hastatis, supremis lanceolatis, cal. sem. 3-angularibus integris. Hoffm. l. c. p. 278. Schk. l. c. t. 358. Hab. in Germaniae sepibus. E. maximis.

16. *alba*, caul. erecto ramosissimo herbaceo, fol. ovatis, flor. axillaribus glomeratis, cal. fructus angulatis dentatis laevibus. Scop. l. c. t. 8. Hab. . . .  $\dagger$

17. *littoralis*, caule herbaceo erecto, fol. omuib. linearibus integerrimis subdentatisque longis. A. angustissimo et longissimo folio. Herms. lugd. 79. Hab. in Europae littoribus maris.  $\odot$

18. *marina*, caule herbaceo erecto, fol. crassiusculis linearibus serratis. A. angustifolia dentata. Pct. herh. t. 7. f. 4. Hab. in Angliae, Sueciae littoribus maris. Puilla, vix palmaris.  $\odot$

19. *pedunculata*, caule herbaceo divaricato, fol. lanceolatis obtusis integris, calycibus faemineis pedunculatis. L. Engl. bot. t. 232. Flor. dau. t. 304. Pluck. alm. Gr. t. 36. f. 1. Hab. in maritimis.  $\odot$

Obs. Thunbergius hoc genus cum sequente combinavit.

659. *CHENOPODIUM*, *Cal.* 5-phyllus, 5-gonus. *Cor.* o. *Sem.* 1, lenticulari, superum.

\* *Foliis angulosis.*

1. *Bonus Henricus*, fol. triangulari-sagittatis integerrimis, apicis compositis aphyllis axillaribus. *L.* Willd. Sp. 2. p. 1999. Flor. dan. t. 579. Hab. in Europae ruderalis.  $\odot$

2. *micronatum*, fol. triangulari-hastatis obtusis mucronatis, racemis foliosis. Thunb. prod. 48. Hab. ad Cap. b. spec.

3. *triandrum*, fol. cordato-sagittatis, apicis terminalib. aphyllis interruptis. Forst. prod. n. 129. Hab. in Nova Zeelandia.

4. *urbicum*, fol. triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis, cauli approximatis longissimis subaphyllis. Flor. dan. t. 1148. Hab. in plateis et ruderalis.  $\odot$

5. *Atriplicis* (purpurascens), foliis rhombico-ovatis lanceolatisque, inferioribus sinuato-dentatis, paniculis axillaribus ramosis, caule erecto. Ait. Kew. 5. p. 311. *Lan. suppl.* p. 171. Ch. purpurascens. Jacq. hort. 3. p. 43. t. 80. Fol. summaefarina tecta. *Lam. enc.* t. p. 156. Hab. in China. *Facies*. *Atriplicis* hortensis rubrae. Flor. tres ad quinque in racemulo sessilis sanguinei. *Cal.* pentagonus.  $\odot$

6. *rubrum*, fol. cordato-triangularibus obtusiusculis sinuato-dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis, caule brevioribus. Flor. dan. t. 1149. Curt. Lond. ic. Moris. hist. 2. t. 31. Hab. in Europae cultis, ruderalis. Adulca rubet diffusa. Fol. nidita, crassa. Sem. minutissima.  $\odot$

7. *murale*, fol. ovatis inaequaliter dentatis acutis nitidis, racemis corymbosis nudis, caule ramoso patulo. Willd. Bergeret. Phyt. ic. Desf. Atl. 2. p. 214. Hab. in Europae et Algeriae muris aggeribusque. Fol. longe petiolata.

8. *guineense*, fol. ovatis inaequaliter dentatis acutis, racemis subramosis nudis erectis, caule simplici erecto. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 345. Hab. in Guinea.  $\odot$

9. *Quinoa* (chilensis), fol. triangulari-ovatis obsolete dentatis, junioribus pulverulentis, racemis confertis petiolo breviorib. Willd. p. 1381. Feuill. peruv. t. 110. Hab. in Chili. Venarum folii par infimum est longe protractum ut inde facies folii triplinervi. *W.*  $\odot$

10. *serotinum*, fol. deltoideis sinuato-dentatis rogois glabris uniformibus, racemis terminalibus. *L.* Hab. in Hispania, Gallia, Aeglia, Sibiria.  $\odot$

11. *album*, fol. rhombico-ovatis erosis postice integris 1 summi oblongis, racemis erectis. Hab. in agris Europae passim. Sem. laevissima nec punctata. Smith. Planta matura albae. *L.*

12. *viride*, fol. lanerolata rhombicoideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. *L.* Hab. in Europae cultis, agris. Caul. erectus, viridis, angulis purpurascens.  $\dagger$

\* *scifolium*, fol. hastato-sinuatis erosis postice integris 1 superioribus oblongis integerrimis, sem. punctatis. Smith. brit. r. p. 276. C. viride. Curt. Lond. ic. C. serotinum. Huds. Hab. in simetis et ruderalis circa Londinum. Ramor. axillae purpurascens. An C. viride auctorum? C. viride. *L.* ut varietatem C. albi, considerat cl. Smith.

13. *punctatum*, fol. (albo-punctatis) imis rhombico-ovatis sinuatis, supremis ellipticis, racem. lateralibus apicatis foliosis. Scop. Delic. insubr. 2. p. 26. t. 11. Hab. . . . Fol. rubro colore tingunt aquam, in qua maeerantur. *S.*

14. *hybridum* (angulatum), fol. cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis divaricatis nudis. Curt. Flor. Lond. ic. C. angulatum. Enc. bot. 1. p. 194. C. stramonii folio. Vaill. paris. 36. t. 7. f. 2. Hab. in Europae cultis, ruderalis. *Fotens.*  $\odot$

15. *Botrys*, fol. oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. Botrys. Dod. Hab. in Europae australis arenosis.  $\odot$

16. *ambrosioides*, fol. lanceolatis dentatis, racemis foliatis simplicibus. Moris. 2. 5. t. 35. f. 8. Hab. in Mexico, Lusitania.  $\odot$

17. *multifidum*, fol. multifidis; segmentis linearibus, flor. axillaribus sessilibus. Dill. elth. 78. t. 65. f. 77. Hab. in Bonaria.  $\dagger$

18. *anthelminticum*, erectum, fol. ovato-oblongis rariter dentatis, racemis aphyllis, flor. 3-gynis. Lin. Michaux. p. 173. Hab. in Pennsylvania, Bonaria et in Kentucky ruderalis.  $\dagger$

19. *glaucum*, fol. ovato-oblongis repandis subhis glaucis, racemis nudis simplicibus glomeratis. Flor. dan. t. 1151. 8 ? concinnatum. Thuill. Paris. p. 125. Baub. hist. 2. p. 472. t. 473. Hab. ad Europae fima, in fossis passim et glareosis.  $\odot$

\* *Foliis integerrimis.*

20. *Vulvaria* (olidum), fol. integerrimis rhombico-ovatis, flor. conglomeratis axillaribus, caul. diffuso. Flor. dan. t. 1152.

Curt. Lond. ic. C. fructidum. Lam. enc. 1. p. 196. *Atriplex foetida*. Bauh. Garosmus. Dod. 616. Hab. in Europae cultis oleracis, ad vias in ruderatis.

20. *polyspermum*, fol. integerrimis ovatis, cymis dichotomis aphyllis axillaribus, sem. subnudis. Flor. dan. t. 1153. Blitum majus polyspermum a seminis copia. Moris. hist. 2. t. 30. f. 6. Hab. in Europae cultis. Caulis etiam erectus. ☉

21. *caudatum*, fol. ovatis obtusis integerrimis, panicula nuda terminali elongata, caule simplici erecto. W. Jacq. ic. 2. t. 344. Col. 2. p. 325. Hab. in Guinea. ☉

22. *acuminatum*, fol. ovatis acuminatis integerrimis, panicula nuda terminali. Willd. in N. Act. berol. 2. t. 5. f. 2. Habit. in Sibiria. C. sepium affinis.

23. *laterale*, fol. caulibus lanceolatis obtusis, ramorum oblongis, pedunc. lateralibus solitariis unifloris. Ait. Kew. 1. p. 313. Hab. . . . ☉

24. *scoparium*, fol. planis lineari-lanceolatis margine ciliatis, flor. glomeratis axillaribus. Willd. p. 1306. Oxyria. Dod. pempt. 151. Hab. in Graecia, Japonia, China, Cerniolin. ☉

25. *villosum*, fol. linearibus integris planis villosis nullissimis incanis, racem. lanatis. Lam. enc. 1. p. 196. Hab. . . Salsolam refert.

26. *maritimum*, fol. subulatis carnosissimis semitartebus, floribus glomeratis axillaribus. Flor. dan. t. 489. Moris. 5. t. 33. f. 3. Hab. in Europae maritimis. ☉

27? *oppositifolium*, fol. subulatis oppositis, glomerulis foliis axillaribus. Willd. p. 1307. Lin. suppl. 172. Salsola oppositiflora. Pall. it. 2. p. 735. t. O. Hab. in Sibiriae aridis limosis ad Jaikum.

28. *aristatum*, ramosissimum, fol. lanceolatis subcarnosis, integerrimis, corymbis dichotomis aristatis axillaribus. L. C. fol. ex lineari-lanceolatis, racemis conjugatis dichotomis nudis, apice setaceis. Gmel. sib. 3. p. 83. t. 15. f. 1. R. Hab. in Sibiria, Virginia. Panicula magna divaricatissima. ☉

658. BETA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Sem. reniforme, intra substantiam baseos calycis.

1. *vulgaris*, flor. congestis, fol. inferioribus ovatis. Ait. Kew. 1. p. 315. Willd. 2. p. 1308. Gaertn. de fr. 1. t. 75. f. 5. Hab. aponte Europ. australioris maritimi, nunc ubique colitur. ☉

2. *patula*, flor. congestis, fol. omnibus lineari-lanceolatis, ramis divaricatis. Ait. l. c. Hab. in Madera. Caulis vix pedalis ramosissimus. ☉

3. *Cicla*, flor. ternis radicalibus petiolatis, caulibus sessilibus, spicis lateralibus longissimis. Mill. dict. n°. 2. Hab. in Lusitania ad Tagum. ☉

4. *maritima*, flor. geminis, caul. decumbentibus, fol. triangularibus petiolatis. Mill. dict. n°. 1. Hab. in littoribus maris. ☉

Obs. Typus genuinus B. vulgaris et ciclae videtur.

5. *trigyna*, flor. ternis trigynis, cal. corollinis. Walds. Hungar. p. 34. t. 35. Inventa ad hortos pagi Pazoa in Hungaria in comitatu Syrmecensi. Flor. in spicis longis ante anthes in nutantib. digesti. †

659. SALSOLA. Cal. 5-phyllus, basi capsularis. Cor. o. Styli 2-3. Caps. 1-sperma. Sem. cochleatum. (Cal. fructus in quibusdam margine membranaceo cinctus.)

1. *Kali*, herbacea decumbens, fol. subulatis spinosis, calycibus marginatis axillaribus. L. Willd. Sp. 2. p. 1310. Flor. dan. t. 818. Moris. 2. 5. t. 33. f. 11. Hab. in littoribus maris. ☉

2. *Tragus*, herbacea erecta, fol. subulatis spinosis laevibus, calycibus ovatis. L. Hab. in Europa australi. ☉

3. *rosacea*, herbacea, foliis subulatis mucronatis, calycib. explanatis. Rosacea, caule erecto ramoso, fol. alternis conico-subulatis mucronatis, membran. corollinis purpureis. Cav. ic. 3. p. 44. t. 286. Buxb. cent. 1. t. 14. f. 2. Hab. ad Asiae septentrionalis salinas et in Arce Alonensi in Hispania. ☉

4. *caroliniana*, herbacea decumbens glabra, fol. dilatato-subulatis spinoscentibus, cal. fructiferis latius explanatis. Michx. Flor. 1. p. 174. Walt. Hab. ad littora in Carolina. Affinis rosaceae. Gemmae fructificantes valde turgidae. M.

5. *Soda*, herbacea patula, fol. inermibus. L. Jacq. hort. t. 68. Hab. in Europae australis salis. ☉

6. *sativa*, diffusa herbacea, fol. retectibus glabris, flor. conglomeratis. L. Cav. ic. 3. p. 46. t. 291. In Hispaniae australis maritimis. ☉

7. *spicata*, herbacea, fol. oblongis obtusis semiteretibus, flor. ternis axillaribus

subspicantis. Willd. S. falsa. Cav. ic. 3. p. 46. t. 260. Hab. in Hispania. ☉

8. *altissima*, herbacea erecta ramossissima, fol. filiformibus acutiusculis basi pedunculatis. L. Buxb. cent. 1. p. 21. t. 31. f. 2. Hab. ad Salinas Italiae, Saxoniae, Astracani. ☉

9. *trigyna* (triflora), herbacea erecta, foliis filiformibus obtusis carnosius, flor. axillaribus sessilibus ternis, stylo trifido. S. altissima. Cav. ic. 3. p. 46. t. 289. Hab. in Hispania. ☉

10. *salsa*, herbacea erectiuscula, fol. linearibus subcarnosis mucicis, calycibus succulentis diaphanis. L. Jacq. hort. 3. p. 44. t. 83. Hab. in maritimis. ☉

11. *americana*, humilis, subdecumbens, flor. confertioribus. Michaux. 1. p. 174. Ad ostium dum. St. Laurentii.

12. *nudiflora*, sublignosa adscendent, fol. filiformibus carnosius, flor. glomeratis, fol. glomerulorum longitudine. Willd. p. 131. Hab. in India orientali, ad maris littora. ☉

13. *flavescentes*, sublignosa erecta, fol. teretibus pubescentibus, flor. subglomeratis. Willd. Cav. ic. 3. p. 45. t. 288. Hab. in Hispaniae montibus Orcellitanis. ☉

14. *hirsuta*, herbacea diffusa, fol. teretibus obtusis tomentosis. Flor. dan. 187. Hab. in Daniae et MonsPELLI maritimis. ☉

15. *laniflora*, herbacea, fol. teretibus pubescentibus, flor. axillaribus, antheris coloratis. Willd. Pall. it. 2. app. 101. tab. P. Hab. in Sibiria circa Saratschik. Cal. excrecescens in paleas acutas longissimas, laminaibus lateralibus roscis.

16. *arenaria*, caul. diffuso, fol. linearibus pilosis, cal. fructus lacinii membranaceis scariosis venosis ovato-oblongis obtusis. Kochia arenaria. Roth. N. bot. Beytr. p. 175. S. arenaria. Ejusd. Flor. germ. 2. app. p. 575. Willemetia. Maerkl. Chenopodium. Flor. Wetteravica. p. 355. Camphorosma monspeliaca. Pollich. Palat. n°. 126. Hab. in regionib. Rhenanis, Germ. australioris. Cal. laciniae post anthesin (quod in multis *salsolis* observis) in alas 5 rotatas alidas, venis purpureis pictas inerescunt.

17. *hyssopifolia*, herbacea, fol. linearibus planis, glomerulis florum axillaribus leavis. Willd. Pall. it. 1. app. n°. 107. t. 1. Kochia. Roth. Hab. in Sibiriae campis siccis salsis ad Rhymnum. ☉

18. *canescens*, caul. suffruticoso folioso, fol. linearibus acutis tomentosis planis argenteo-scriceis. Hort. Per. Chenopodium sinense.

Willemet in Essais de Medecine et d'Hist Nat. 3. p. 233. Hab. . . . Rami juniores argei.

19. *diffusa*, herbacea tomentosa decumbens, fol. lanceolatis. Thunb. prodr. p. 48. S. sericea. Ait. Kew. 1. p. 317. Chenolen diffusa. Willd. Sp. 2. p. 1203. Thunb. Diss. bot. r. p. . . Hab. ad Cap. b. sp. maritima. Fol. opposita, argenteo-tomentosa cum acumine carnosio. Styl. filiformis, 2-fidus.

20. *polycelos*, sublignosa diffusa, fol. oblongis, calycibus marginatis glomeratis coloratis. L. Boeck. mus. 2. p. 34. t. 34. Barr. rar. 214. t. 275. Hab. in Siciliae, Hispaniae maritimis.

21. *prostrata*, frutescens, fol. haeribus pilosis iuvenibus. L. Gmel. sib. 3. t. 18. f. 2. Jacq. austr. t. 209. Hab. in Asia boreali, Hispania, Austria, Helvetia, Sibiria. ☉

22. *monandra*, caule herbaceo ramoso carnosio subaphyllo, fol. teretibus carnosius, flor. monandris. Willd. Pall. it. 3. app. 83. t. M. f. 1. Hab. in Sibiria ad lacum Altan, inque desertis Astrachanensibus. ☉

23. *vermiculata*, frutescens, fol. fasciculatis teretibus filiformibus, floralibus ovatis acutis carnosius. Willd. S. mycrophylla. Cav. ic. 3. p. 45. t. 287. Barr. rar. 501. t. 215. Hab. in Hispania, Lusitania et Sibiria. ☉

24. *arbuscula*, fruticosa, fol. fasciculatis teretibus basi attenuatis in curvis, flor. solitariis sparsis. Willd. Pall. it. 1. app. n°. 102. t. K. Hab. in deserto Tatarico ad ripas Lacus salsi Inderiensis. ☉

25. *aphylla*, fruticosa subaphylla, ramis flosculorum rudimento coopertis. Lin. suppl. 173. Caroxylon Salsola. Thunb. Diss. Nov. pl. gen. Hab. ad Cap. b. sp. in omni Karro. Prut. altitudine humana aphyllus valde irregularis L. ☉

26. *arborescens*, frutescens, fol. semicylindricis, inferioribus conjugatis. Lin. suppl. 173. Hab. in Sibiria. Caul. adscendentes albi. Cal. scarioso-roscei. ☉

27. *fruticosa*, fruticosa, fol. carnosius teretibus obtusis imbricatis mucicis. Engl. bot. t. 635. Chenopodium fol. linearibus teretibus carnosius, caule fruticoso. L. Hort. cliif. 86. Hab. in maritimis Galliae, Hispaniae, Angliae, Lusitaniae, Persiae. Sempervirens. Bract. teruae. ☉

28. *indica*, fruticosa, fol. linearibus carnosius semiteretibus, floralibus oblongis obtusis. Willd. p. 1317. Hab. in India orientali. ☉

28. *sedoides*, suffruticosa, fol. teretibus filiformibus ciliatis, flor. glomeratis axillaribus. Willd. Pall. itin. 1. app. n°. 108. L. M. f. 1. 2. Hab. in Sibiriae humidis salsis. †

29. *muricata*, fruticosa patula, ramulis hirsutis, cal. spinosis. L. S. monobractea. Forsk. descr. 55. *Bassia muricata*. Allion. Misc. taur. 3. 177. t. 4. f. 2. Buxb. cent. 3. t. 49. Hab. in Europa australi, Aegypto. Cal. bini, congesti. †

30. *camphorosmoides*, fruticosa spinosa ramosissima, fol. glabris alternis filiformibus cum fasciculis axillaribus. Desfont. Atl. 1. p. 218. Kali orientale fruticosum spinosum, camphoratae-folius. Tourn. Cor. 18. Hab. in incolis prope Flemsen. †

31. *brevifolia*, fruticosa ramosissima, fol. ovatis confertis brevissimis pubescentibus. Desf. l. c. Boe. sic. 5p. In arenis prope Caesarem. Fol. uti in *Sedo acri*. D.

32. *mollis*, fruticosa, ramis patentibus, fol. teretibus carnosius glaucis obtusis. Desf. l. c. Cum priore. Fol. glabra, succosa Sedi *albi* fol. simillima. D.

33. *oppositifolia*, fruticosa, fol. subulatis inermibus oppositis. Desf. Atl. 2. p. 219. Moris. s. 5. t. 33. S. *fruticosa*. Cav. ic. 3. t. 285. Hab. in agro Tunetano. Cal. fructus membranaceae roae latae flabelliformes in campanam conuidentes. D. Styl. bifidus. C.

34. *verticillata*, fruticosa erecta, fol. oppositis linearibus semicylindricis, flor. subverticillatis. Schousboe. Maroc. s. p. 123. Hab. prope Magadore. Fructus nondum observatus. †

35. *glauca*, fruticosa, erecta glaberrima, fol. semiteretibus filiformibus, cal. solitariis bracteatis, fructib. exsertatis hyalinis. Bicherst. Tableau, etc. Kali orientale fruticosum altissimum, flor. stam. purpureis. Tournef. Cor. p. 38. Hab. in praecipitibus montium inter Kubam et veterem Schamachiam. †

36. *Echinus*, fruticosa glabra, fol. subulatis muticis, apiculis divaricatis floriferis. Bill. Svr. 2. p. 10. t. 5. *Anabasis spinosissima*. Lin. suppl. p. 171. Willd. Sp. p. 1319. Hab. in Aegypto, Persia in monte Libano. Ob fructum potius hujus generis.

37. *platyphylla*, caul. herbaceo ramosissimo, fol. lato-lanceolatis sinuato-dentatis, flor. paniculatis trigynis, cal. fructus margine orbiculari hinc emarginato. Michaux. Flor. s. p. 174. S. radiata. Desf. in Annal. du Mus. 2. p. 28. t. S. *atriplicifolia*.

Sprengel, *Kochia* Roth. N. bot. Beytr. p. 177? Hab. in Amer. septentrionali. Sub nomine *Sals. Chenopodioides* et latifolia hinc inde colitur. Ob folia, habitus a ceteris omnino alienus est.

Obs. Genus *Salsolae*, nonnullis speciebus *Chenopodiis* affine, iterum recognosci debet et forte dividendum. Cl. Roth. nonnullas species ab hoc genere secundum characterem sequentem separat:

**Kochia**. Cal. 1-phyllus, campanulatus, 5-fidus: in fructu in marginem foliaceum 5-petaliformem excresecens: fauce clausa dentibus 5, triangularibus. Cor. o. Stylus 5, brevis. Stigm. 2-3, longa. Caps. 1-locularis: 1-2-sperma. Semeu incurvum.

660. **ANABASIS**. Cal. 3-phyllus. Cor. 5-petala. Bacca 1-sperma, calyce cincta.

1. *aphylla*, aphylla, caule ramoso articulo, articulis emarginatis, ramis apice floriferis. Willd. Sp. 2. p. 1318. *Salsola articulata*. Cav. ic. 3. p. 43. t. 284. Buxb. cent. 3. p. 11. t. 18. Hab. ad maris Caspii littora et circa Tripolim. †

2. *cretacea*, aphylla, caul. numerosis caespitosus simplicissimis articulis basi floriferis, articulis emarginatis. Willd. Pall. it. 1. app. n°. 109. t. N. Hab. in Sibiria. †

3. *foliosa*, fol. subclavatis. L. *Salsola clavifolia*. Pall. it. 2. p. 486. Hab. ad mare Caspium. ©

4. *tamariscifolia*, fol. subulatis, pericarpis exsuccis. L. Cav. ic. 3. p. 42. t. 283. Hab. in Hispania. Stigm. 3, obtusa. †

661. **ANREDERA**. Cal. 2-partitus, dorso carinatus. Cor. o. Styl. 2-fidus. Sem. 1, cal. compresso membranaceo-bialato tectum.

1. *spicata*. Just. Gen. pl. Gmel. Syst. p. 454. *Basella vesicaria*, fol. subcordatis, petunc. simplicibus, fruct. orbiculato-compressis vesicariis. Lam. enc. 1. p. 382. Hab. in Peruvia. Caul. scandens. Flor. spicati alterni.

662. **BOSEA**. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Bacca 1-sperma.

1. *Yervamora*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1322. Lam. ill. t. 122. Frutex peregrinus horto Bosiano *Yervamora* dictus. Walt. hort. p. 24. t. 50. Hab. in ins. Canariis. †

663. MICROTEA. *Cal.* 5-phyllus, patens. *Cor.* 5. *Drupa* sicca, echinata.

1. *debilis*. Swartz. Flor. ind. oed. t. p. 543. Lam. ill. t. 182. Willd. p. 1309. *Schollera*. Robt. in Act. hagn. 2. t. p. 210. Hab. in Caribaeis, ins. St. Eustachii, etc. Caul. diffusus. Fol. ovata. Racemi secundi filiformes. ☉

664. PHYLLIS. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stigmata* hispida. *Sem.* 2, oblonga, axi filiformi annexa.

1. *Nobla*, stipulis dentatis, fruct. pendulis. L. Bill. Eth. t. 299. f. 386. Lam. ill. t. 186. Hab. in Canariis. Flor. corymbosi. ♀

665. COPROSMA. Polygama. *Cal.* minimus, 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Sylli* longi, basi coherentes. *Bacca* infera, 2-sperma. (*Stam.* etiam 6-7.)

1. *Lucida*, pedunc. compositis. Lin. suppl. p. 178. Forst. gen. n. 69. Murr. Syst. veg. p. 290. Hab. in N. Zeelandia. Similis Phyllidi, glaberrima. Fol. opposita, ovata. Stipul. interfoliacea. L.

2. *foetidissima*, flor. solitariis. Lin. l. c. Lam. enc. 2. 98. Ej. ill. t. 854. Cum priore.

*Obs.* Hoc genus, ulterius examinandum, ab ill. Juss. inter Rupiaecae, eum priore, colloatum est.

666. PANAX. Polygama. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* infera, cordata, 2-sperma. *Cal.* in flore Masc. integer.

1. *simplex*, foliis alternis lanceolatis serratis, umbell. compositis. Forst. Flor. austral. p. 75. Hab. in N. Hollandis.

2. *trifolia*, paucilla, rad. subrotunda, fol. ternis: foliolis subsessilibus. Michaux. Flor. Trew-Ehr. t. 6. f. 2. Hab. in Pennsylvania et Novaeboraeae. Fol. glabra nitida, passim quina.

3. *quinquefolia*, rad. fusiformi, fol. ternis: foliol. quinis petiolatis. Michaux. l. c. p. 256. Trew-Ehr. t. 6. Lam. enc. 2. p. 713-714. Planta celebris ob radicem Ginseng s. Ninjin.

4. *attenuata*, fol. ternatis quinatisve:

foliol. ovatis attenuatis erenatis, caul. arborescente. Swartz. Flor. 2. p. 552. Hab. in Ind. occident. in monte la Souffire, Guedeloupe et in ins. St. Christophe.

5. *arbores* (australasia), fol. septenatis dentatis glabris, umb. composita, caul. arbores. Lin. suppl. p. 442. Hab. in N. Zeelandia.

6. *undulata*, fol. 6-8-tenatis lanceolato-ovatis acuminatis subundulatis, subtus ferrugineo-pubescentibus, flor. paniculatis, caul. arbores. Anbl. gujan. 2. p. 949. t. 360. F. Morototoi. Ej. et Gmel. Syst. II. p. 466. Hab. in Gujanac sylv. et ad St. Domingo. Arb. 60-100-pedalis, apice foliosa, tota aromatica. Fruct. compress. cordati pubescentes.

7. *fruticosa*, fol. supradecompositis dentato-ciliatis, caul. fruticoso. Lin. Rumph. amb. 4. t. 33. Hab. in ins. Ternat. Altitudine humana, vi diuretica gaudet.

667. CUSSONIA. Involucr. o. *Cal.* 1-phyllus truncatus crenatus. Petala 5, oblonga acuta. Fructus didymus, 2-ocularis cal. stylisque coronatus.

1. *thyrsioides*, fol. quinatis: foliol. simplicibus cuneatis ternatisque apice dentatis. Thunb. Diss. acad. 1. p. 12. et N. act. Ups. 3. t. 12. Lam. ill. t. 187. Willd. Sp. 2. p. 1355. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *apicata*, fol. septenis: foliol. simplicibus lanceolatis ternatisque apice serratis. Thunb. l. c. Act. Ups. t. 3. Cum priore.

*Obs.* Hoc genus a Thunbergio inter umbellatas collocatum, a Jussieu rectius una eum praecedente ob semina pericarpio inclusa, ad fam. Aralias refertur.

~~~~~  
UMBELLATAE familiam exhibent, primo obtutu ab aliis facile dignoscendam, ob flores umbellatim dispositos, et fructus inferos, nudos, in semina duo, ex axe centrali filiformi pendula, bipartibiles. Umbellae sunt aut simplices s. flores in pedunculo communi sessiles, aut compositae s. in umbellulas radiatim pedicellatas divisae; nonnullae anormales sunt s. a forma communi aberrantes. Utracque sunt vel nudae, vel involuatae. Flores constant ex calyce integro aut quinque-dentato, minimo; corolla 5-petala, aequali, aut radiata: petalis exterioribus majoribus. Stamina adsunt 5 et

stylis 2. Lagoccia unico tantum gaudet stylo. Plures flores in eadem umbella abortiunt ob stylorum defectum, qui polygami denominantur. Caul. plerisque herbaceus, et folia composita sunt. Diversae harum plantarum partes, praecertim semina, gaudent qualitate calida, aromatica, nonnumquam caustica, imo venenata; radices quarundam edules sunt.

GC8. ERYNGIUM. Flor. capitati. Involucr. polyphyllum. Cal. proprius, 5-phyllus, superus. Cor. 5-petala. Recept. paleaceum. Fruct. coronatus, 2-partibilis. (Fol. Cardui.)

* *Foliis lacinatis.*

1. *campestre*, fol. radicalibus petiolatis ternatis: caul. inferiorib. pinnato-lanceolatis, caul. superne ramosissimo. L. Schousb. Maroc. p. 135. Willd. Sp. 2. p. 1758. Jacq. austr. t. 155. Flor. dan. t. 554. *β. lusitanicum*, latifolium. Tournef. 327. Hab. in incultis, ad vias ubique. $\overline{\text{U}}$

2. *Bourgati*, fol. omnib. digitatis lacin. suborbiculatis, capitul. subrotundis paleis subulatis integris. An. Kew. 1. p. 326. Gouan, ill. p. 7. t. 3. Hab. in Gallia australi, in Helvetia. Fol. quoad formam ut in Ger. columbino. Involucr. subulata 9-11-phylla. Capit., rarius unicum, amethystinum. Lam.

3. *amethystinum*, fol. radicalibus trifidis basi subbipinnatis, bracteis linearibus spinis interjectis. Moris. 2. 7. t. 35. f. 2. Schousb. Maroc. ed. germ. p. 122. Hab. in Syriae montibus et 10 campis prope Tingitalem. Nomen coloream plantae exprimit. $\overline{\text{U}}$

4. *rostratum*, fol. caulinis pinnatis: radicalibus polymorphis, involucr. inaequalibus, capitulis apice rostratis. Cav. ic. 6. p. 34. t. 552. Hab. in maris Chilensis litore prope Talcahuano urbem. Col. plant. luteo ellus.

5. *monocephalum*, fol. amplexicaulibus canaliculatis laxe pinnatis, involuero patentissimo rigido. Cav. l. c. p. 35. t. 553. Hab. in Mexico. Flor. violacei. Involucr. compositum, 30-phyll.

6. *triquetrum*, fol. radicalib. trilobis inciso-spinosis, caul. digitato-palmatis, flor. corymbosis, involucr. 3-4-phylo subulato-canaliculatis, pedicellis triquetris. Desf. Atl. 1. p. 225. t. 54. Hab. in Barbariae arvis. Col. plant. amethystinus. $\overline{\text{U}}$

7. *rigidum*, fol. palmato-lacinatis, bract. rigidis pinnatis pungentibus, caul.

crasso. Lam. enc. 4. p. 752. E. Spinalba. Vill. Delph. 2. p. 660. t. 17. Hab. in Galliae alpib., locis incultis. Capit. magna, oblonga, bract. 9-10 pinnatifidis, albidis, spinosis cincta. A sequente omnino diversum.

8. *alpinum*, fol. radicalibus integris cordatis, caulinis lobatis sublacinatis, bracteis mollihus pinnatifido-ciliatis caerulescentib. Lam. l. c. p. 753. Jacq. ic. rar. t. 94. Hab. in alpibus. $\overline{\text{U}}$

9. *caeruleum*, fol. radicalibus cordato-ovatis, caulinis palmatis, involucri foliolis quinque subulatis basi utriusque spinula minima armatis, paleis mucronatis. Tableau d. prov. sur la côte occidentale de la mer Caspienne. n^o. 7. Manting. Phytogr. p. 455. Moris. 2. 7. t. 37. f. 13. Hab. in coll. et apricis prov. Schirvanensis. $\overline{\text{U}}$

10. *maritimum*, fol. radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capit. pedunculatis, paleis tricuspidatis. L. Moris. 2. 7. t. 36. f. 6. Hab. in mariis. Rad. longissima. Col. pl. glaucus aut albicans. $\overline{\text{U}}$

β. ? aquifolium, fol. ovatis acutis spinosis amplexicaulibus, involucr. 6-7-phylo, fol. intus caeruleis. Cav. Annal. de ciencias natur. n^o. 7. p. 32. E. *maritimum*. Flor. Dan. t. 875. \dagger

11. *helicifolium*, fol. obovatis dentato-spinosis, margine cartilagineis, caul. dichotomo, involucr. foliaceis, paleis tricuspidatis. Cav. ic. 6. p. 225. t. 51. Lam. enc. 4. p. 757. Hab. in Barbaria et Lusitania.

12. *dichotomum*, fol. radicalibus cordato-oblongis crenatis, umbel. dichotomis, capit. florum rotundo involucr. breviori, paleis tricuspidatis. Desf. Atl. 1. p. 126. t. 55. In collib. incultis circa Mascā. Affina E. *plano*, sed omni parte minus. Capit. parva. D.

13. *corniculatum*, fol. radicalibus ellipticis sublanceatis petiolatis: caulinis parvis pinnatifido-lacinatis, caul. trichotomo, involucr. inaequalibus, paleis integris. Lam. l. c. p. 758. Tournef. Inst. p. 327. Hab. in Lusitania. Capitul. numerosa, cincta involucr. 5-6-phylo cujus fol. 3 caeteris longiora cornicula mentientia. Lam.

14. *planum*, fol. radicalibus cordato-ovalibus planis crenatis petiolatis caulinis scissilibus, capit. ovatis pedunculatis. Lam. enc. 4. p. 753. Jacq. Austr. t. 397. Barr. ic. 1174. Hab. in Russia, Polonia, Austria et Gallia meridionali? Capit. et pedunculū amethystini.

15. *tricuspidatum*, fol. radicalibus cordatis: caulinis palmatis, auriculis retroflexis, paleis tricuspidatis. L. Willd. p. 1357. Desf. Atl. 1. p. 224. E. Bocconi, fol. radicalibus cordato-subrotundis crenatis apice subincisis: caulinis inferioribus trifidis; superioribus digitatis, paleis tricuspidatis. Lam. l. c. E. capitulis Psyllii. Bocce. Sic. t. 47. Moris. a. 7. t. 36. f. 12. Hab. in Euro. australi, Barb. et Oriente.

16. *creticum*, fol. caulinis digitatis spinosis brevissimis subreflexis, caul. superne corymboso, involucr. subhexaphyllis. Lam. l. c. p. 754-755. Tournef. Cor. p. 23. Hab. in ins. Candia. Col. pl. amethystinus.

17. *glomeratum*, fol. pinnato-laciniosis: lacinia angustis spinosis, thyrso terminali, capit. globosis subglomeratis. Lam. l. c. Cum priore et in Oriente. Rad. longa, apice crassa. Capit. minuta numerosa. Invol. foliola 6, lineari-subulata. L.

18. *dilatatum*, fol. pinnatifidis apice dilatatis trifido-laciniosis spinosis, involucr. hexaphyllis margine spinosis. Lam. l. c. Barrel. ic. 36. Bocce. Mus. t. 71. Hab. in Hispania, Lusitania et Barbaria. An ab E. amethyst. satis diversum?

19. *lateriflorum*, fol. lanceolatis nervosis integerrimis, caul. ramisque flexuosis, capit. lateralib. sessilibus echinatis. Lam. l. c. p. 756. Gramen orientale spicatum, etc. Tournef. cor. p. 39. Cenchrus frutescens. Lin. ? Hab. in Oriente. Species omnium valde singularis. Caul. flexuosus, sursum ramosissimus.

20. *virgatum*, fol. ovatis inciso dentatis remotissimis, caul. virgato tenui apice corymboso. Lam. l. c. Hab. . . Caul. gracilis. Fol. fere ut in V. Teucrium. Paleae breves 3-dentatae. L.

21. *Galioides*, minutum, fol. sessilibus digitatis spinosis minimis, caul. debili dichotomo, capit. sessilibus. Lam. l. c. Moris. hist. 3. p. 167. n. 19. In Portugaliae humidis. Galium refert ob fol. quasi verticillata. L.

22. *tenuis*, fol. spinosis: radicalib. inaequaliter dentatis: caulinis digitatis, foliolis angusto-lanceolatis, involucr. subulatis serrato-spinosis capit. longioribus, paleis tricuspidatis. Desf. Atl. 1. p. 227. Lam. enc. 4. p. 755. Clus. hist. 2. p. 159. ic. Tsbern. ic. 694. Hab. in Hispaniae et Barbariae collib.

23. *odoratum*, fol. inferioribus oblongis dentato-spinosis, superioribus subdigitatis, caul. dichotomo, capit. sessilibus, invol.

brevissimis. Lam. l. c. Tournef. inst. 327. Hab. in Lusitania, locis humidis. Pal. subtridentatae. Medium inter antecedens et sequens. L.

24. *pusillum*, fol. radicalibus oblongis dentatis, caul. dichotomo, capit. sessilibus. Lin. Desf. Atl. 1. p. 223. Moris. a. 7. t. 36. f. 11. Clus. hist. 2. p. 158. ic. Cresc. in Hispania oriente et Algeriae pratis humidis. Paleae rigidae simplices apice spinosae. T.

25. *serratum*, fol. oblongis serratis: floralib. pinnatis brevibus, capit. globosis involucri longioribus. Cav. ic. 6. p. 36. t. 554. Hab. in Mexico. Germ. hispidum.

26. *humile*, pedunc. radicalibus fol. 2. oppositis, fol. radicalib. ovatis petiolo brevioribus: caulinis sessilibus oblongis serratis, involucr. 10-phyllis tricuspidatis. Cav. ic. 6. p. 37. t. 856. f. 1. Hab. in regno Quinensi. Fol. serraturae in setulam desinunt.

27. *subacaule*, fol. radicalibus ovatis subcrenatis intermixtis longe pedunculatis, pedunc. nudis radicalibus. Cav. ic. l. c. fig. 2. In Nov. Hispania.

28. *ovalifolium*, simplex, fol. ovalibus dentatis, capitulis omnib. pedunculatis involucri paulo-breviorib., paleis tricuspidatis. Michaux. 1. p. 161. Hab. in Carolinae subhumidis.

29. *nudicaule*, fol. radicalib. oblongo-spathulatis serratis ciliatisque, caul. nudo, involucr. longitudine capitulorum. Lam. l. c. p. 778. Ill. gen. t. 187. f. 2. Hab. in Monte-Video. Commers. Fol. radicalia rosacea congesta. Pal. simpl.

30. *foetidum*, pumilum graveolens, fol. spinuloso-serratis: radicalibus cuneato oblongis rosaceo-congestis, caul. dichotomo, paleis longissimis lineari-lanceolatis. Michaux. Flor. l. c. Lam. enc. 4. p. 758. Sloan. jam. hist. 1. p. 264. t. 156. f. 3 et 4. Herm. Lugd. t. 277. Hab. in Amer. boreali et meridionali. Odor valde ingratus. ♂

* * *Bromeliae-folia*: fol. integerrimis margine ciliato-spinulosis.

31. *aquaticum*, fol. gladiatis ciliato-spinosis: floralibus indivisis brevissimis. Lam. l. c. p. 758. E. Uccifolium. Michaux. Flor. 1. p. 164. Jacq. ic. rar. t. 347. Moris. a. 7. t. 37. f. 27. Hab. in Americae paduclos. Paleae lanceolatae, indivisae.

32. *virginiannum*, fol. gladiatis serrato-spinosis: floralibus dissectis reflexis, caul. apice corymboso. Lam. l. c. p. 759. E. aquaticum. Michaux. p. 163. Pluck. Alma.

t. 366. f. 3. Hab. in Virginia et Carolina.
Palcae 3-5-cuspidatae.

33. *longifolium*, fol. gladiatis ciliato-spinosis; floribus brevissimis 3-5-fidis, caul. apice dichotomo. Cav. ic. 6. p. 36. t. 555. Hab. in imp. Mexicano. Capit. globosa, cicere minima. Palcae integrae. C.

34. *cbracteatum*, fol. gladiatis subintegerrimis, caul. superne trichotomo, capitulis cylindricis nudis. Lam. enc. 4. p. 759. Hab. circa Paraguay in Monte-Video et Bonaria. Commers.

669. ARCTOPUS; *Umbella simplex*, involuicello monophyllo 4-partito spinoso magno cincta. Flosa plures in disco masculi, 4 in radio faeminei. Cal. 5-dentatus. *Petalata* integra, oblonga. *Fruct.* 4, in involuicello connivente reconditi. *Flor.* masculi in distincta planta: involucro 5-phylo. Juss. (Habitus *Eryugii*.)

1. *echinatus*. L. Reich. Syst. pl. 4. p. 360. Lam. ill. t. 855. Burm. Afr. p. 1. t. 1. (Max.) Hab. in Aethiopia. Flor. inter fol. terminales. Fol. conferta, sinuata, ciliata, supra spinosa. ¶

670. EXOACANTHA. *Involucr.* spinosum. *Involucl.* dimidiata. *Flor.* omnes hermaphroditi, aequales. *Sem.* 1. ovata, striata.

1. *heterophylla*, fol. pinnatis: foliolis radicalibus ovatis dentatis incis, caulinis lanceolatis acutis. Billardiere Pl. Syriacae. p. 10. t. 2. Lam. ill. t. 150. Willd. 2. p. 1379. Hab. prope Nazareth. ♂

671. ECHINOPHORA. *Flor.* laterales masculi: centrali hermaphrodito. *Sem.* 1, involuicello immersum.

1. *spinosa*, foliolis subulato-spinosis integerrimis, trifidisque. Cav. ic. 2. p. 24. t. 127. Willd. Sp. 2. p. 1378. Smith. brit. 1. p. 203. Hab. ol. littora maris, praesertim Mediterranei. ¶

2. *tenuifolia*, fol. incis inermibus. Column. cephr. 1. p. 18. t. 101. Moris. 2. g. t. 1. f. 2. Hab. in Apuliae maritimis apricis, salis. Fol. radicalia ampla, 3-pinnata. Lam. ¶

672. HYDROCOTYLE. *Umbella* simplex: *Involucr.* 4-phyllum.

Petalata integra. *Sem.* semiorbi-culato-compressa.

1. *vulgaris*, fol. peltatis orbiculatis undique emarginatis, umbel. 5-floris. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1360. Flor. dan. t. 50. Curt. Lond. ic. Hab. in paludosis et inundatis, etiam in Jamaica. Umb. e centro saepe prolifera. ¶

β? *verticillata*, fol. peltatis ovalibus, umbell. verticillatis. Thunb. l. c. 1. 3. Hab. . . . Similis *vulgari* dicitur; sed. fol. majora, petioli longiores, et umbel. verticillatae. †

2. *natans*, fol. reniformibus repondo-crenatis natantibus. Thunb. Dess. aead. p. 472. Cyrill. Pl. rar. Nesp. t. 6. Hab. in Italia.

3. *tribotys*, fol. peltatis subrotundo-reniformibus bicerenatis, umb. radiis 3 longissimis, flor. verticillatis subquinis.

4. *umbellata*, fol. peltatis crenatis, umbellis multifloris. L. pedunculatis. Michaux. Flor. 1. p. 161. Hab. in Americae humidis. Differt a prima flosculis non 5, sed pluribus quam viginti, in umbellam simplicem digestis. L.

5. *bonariensis*, fol. subpeltatis reniformi-subrotundis crenatis, umbella composita, radiis ramosis apice lateribusque floriferis. Lam. l. c. enc. 3. p. 147. Cav. ic. 5. p. 60. t. 488. H. *multiflora*. Flor. Per. 3. p. 24. t. 246? Hab. in arenosis maritimis Bonariae versus Monte-Video o Limaee humidis. Umb. composita, prolifera. C.

6. *americana*, fol. reniformibus sublobatis crenatis, umbel. paucifloris sessilibus. Lam. l. c. Michaux. p. 162. Hab. in Amer. et in India orientali. β. gracilis, conl. filiformi stricto, fol. minorib. Michaux.

7. *hirsuta*, hirsuta, fol. reniformibus lobatis crenatis, flor. verticillatis, verticillis quadrifloris. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 460. Hab. in sylvis montiosis Hispaniolae locis humilibus umbrosis. ¶

8. *triflora*, fol. reniformibus crenatis, pedunc. trifloris. Flor. Per. 3. p. 245. Hab. in Chile locis humidis. Caul. repens. Sem. villosa.

9. *globiflora*, fol. reniformi subrotundis duplicato-crenatis, umb. globois multifloris. Fl. Per. l. c. p. 25. t. 247. In Pernu. nemorib. et humidis versus Munna. Hirsuta. Caul. purpureo. ¶

10. *gracilis*, fol. peltatis sinuatis crenatis umbell. 6-floris. Flor. Per. 3. p. 26. t. 247. In Peruv. stagnatis. Pusilla. Caul. filiform. villosus. $\overline{\text{E}}$

11. *quinqueloba*, fol. peltatis quinquelobis lobis acutis duplicato-serratis, umbel. globosis verticillatis. Flor. Per. 2. p. 25. t. 248. Hab. in Peruvia nemorib. Villosa. \odot

12. *moschata*, fol. reniformibus septemlobatis serratis villorib., umbellis multifloris. Forst. prod. n^o. 135. Hab. in Nova Zeelandia.

13. *citriodora*, fol. reniformib. 7-9-sinuatis crenatis hirsutis, umb. parva multiflora. Flor. Per. p. 26. In reg. Chilens. campis humidis et umbrosis. Fol. fricata odorem Melissae aut Citri exhalant. $\overline{\text{E}}$

14. *incrassata*, fol. reniformib. 7-9-sinuatis crenato-serratis: serraturis incrassatis albicantib., umb. multifloris globosis. Fl. Per. l. c. In Peruviae umbrosis. Caul. purpureus.

15. *acutifolia*, fol. cordatis acutis sinuatis crenatis, umb. simplicibus globosis multiradiatis. Flor. Per. p. 25. t. 248. Cresc. c. priore. Subvillosa.

16. *asiatica*, fol. reniformibus dentato-crenatis. L. Petiolis scapisque fasciculatis. Lam. enc. 3. p. 152. Thunb. prod. 49. Rumph. 5. t. 169. f. 1. Rhed. 10. t. 46. Hab. in India orientali et Cap. b. sp. ? $\overline{\text{E}}$

β ? *lanata*, fol. semilunatis crenatis basi truncatis, petiolis scapisque fasciculatis. Hab. cum priore, cujus tantum var. ?

17. *Sibthorpioides*, fol. cordato-orbiculatis obsolete lobatis crenatis, scapis subsolitariis petiolis longiorib. Lam. l. c. p. 153. Hab. in ins. Franciae. Fol. minima.

18. *Ficarioides*, tota glabra, fol. cordato-subrotundis obsolete angulosis laevibus, petiolis scapisque glabris, umbel. anquinquefloris. Lam. l. c. Cresc. c. priore. Fol. parva undulata. Flor. 5, minuti subcapitati.

19. *repanda*, fol. rotundato-cordatis (majusculis) subaniculo-repandis: petiolis (nervisque) pilosis, capitulo pedunculato trifloro villosa. H. *Ficarioides*. Michaux. p. 161. Hab. in udis Car. infer. \dagger

Obs. A priore diversa videtur. Ceterum tres haec species H. asiaticae omnino affines, et ulterius examinandae.

20. *erecta*, fol. cordatis crenatis, scapis paucifloris longitudine petiolorum. Linn. suppl. 177. Hab. in Jamaica.

21. *villosa*, tomentosa, fol. cordatis integerrimis tomentosis, villosis. Linn. suppl. 175. Centella villosa. Lin. Moen. acad. 6. afr. 98. Mercurialis afro. L. Mant. 298. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. volubilis. Dioscorae facie. Caul. prostrati apice foliosi floriferique.

22. *glabrata*, glaberrima, fol. obovatis s. lanceolatis acutis trinerviis glaberrimis. Linn. suppl. 175. Centella glabrata, fol. lanceolatis. L. Hab. ad Cap. b. spei.

23. *Ranunculoides*, fol. quinquepartitis incis, umbellis simplicibus. Willd. p. 136. Hab. in Mexico. Caul. repens geniculatus.

24. *Saniculaefolia*, fol. ternatis subpalmatis, lobis crenatis, lateralibus bipartitis, umbella composita. Lam. enc. 3. p. 147. t. 188. f. 4. Cav. ic. 5. t. 488. f. 2. Hab. in Bonaria.

25. *Solandra*, tomentosa, fol. cuneiformibus ovatis septemdentatis. Linn. suppl. 176. H. tomentosa, fol. obovatis dentatis tomentosis. Thunb. prod. 49. Solandra capensis. L. Hab. ad Cap. b. spei. $\overline{\text{h}}$

26. *tridentata*, tomentosa, fol. linearicuneiformibus apice tridentatis. Linn. suppl. 176. H. fol. cuneatis trifloris villosis. Thunb. Diss. bot. 2. p. 412. t. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Simillima priori.

27. *triloba*, caul. suffrutesco, fol. cuneiformibus trilobatis glabris. Thunb. Diss. acad. p. 412. t. 3. Hab. ad Cap. bon. spei.

Obs. An forte una cum priore *Azorellae* species, cujus habitum refert ?

28. *lineata*, minuta glaberrima, fol. crassiusculis lineatis-cuneatis transversim lineatis, umbella pedunculata. Michaux. Flor. 1. p. 162. Hab. in Carol. inferioris inundatis. Affinis H. chinensi. L.

29. *sinensis*, fol. linearibus, umbellis multifloris. Thunb. Diss. acad. 2. p. 411. Hab. in China.

30. *linifolia*, fol. linearilanceolatis subfalcatis, umbel. paucifloris. Thunb. Diss. acad. 2. p. 411. Lin. suppl. p. 176. Hab. ad Cap. b. spei. Chinensis. L. ? cfr. Thunb. l. c.

31. *virgata*, glaberrima, fol. semiteretibus sulco exaratis internodiis longioribus. Linn. suppl. 176. Lam. enc. 3. p. 148. t. 188. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Var. humilior, involucri triphyllis. Lam. l. c.

Obs. An haec tres posteriores revera species diversae ?

673. AZORELLA. Umbella simplex. Cal. 5-mentatus. Petala 5, ovato-oblonga, obtusa. Fructus subglobosus, striatus, calyce persistenti coronatus. Involucrum 3-5-phyllum.

1. *linarifolia*, fol. sparsis linearibus, caul. elongato, umbel. composita. Cav. l. c. t. 485. Hab. in N. Hollandia, prope portum Jackson. Fruct. striis exasperatis. An Hydrocotyle?

2. *crassifolia*, caespitosa, fol. imbricatis crassis glaberrimis ovatis apice reflexis, umbel. multiflora. A. caespitosa. Cav. ic. 5. p. 57. t. 484. f. 2. Hab. in regn. Chilensis montib. altissimis. Fere omnia species caespitosa sunt. Planta, uti sequens substantia resinosa onusta.

3. *Chamitis*, caespitosa, fol. congestis vaginantibus integerrimis basi setosis, flor. solitariis. *Chamitis integrifolia* Gaertn. de fr. t. p. 54. t. 22. Bolax. fol. ovatis integerrimis. Commers. Lam. ill. gen. t. 189. f. 1. A. filamentosa. Vahl. Willd. Sp. 2. p. 1365. Hab. in Terra del Fuego, in montibus freii Magellanici.

Obs. Praeter flores solitarios huic speciei adhuc singulare, quod fructus non raro tripartibilis et trispermus, quo natura umbellae defectum compensare voluisset. G.

4. *trifurcata*, fol. trifidis, petiolis nudis. Vahl. symb. 3. p. 48. (A. *caespitosa*.) Lam. ill. t. 189. f. 2. Bolax. Juss. *Chamitis trifurcata*. Gaertn. sem. t. p. 54. t. 22. f. 4. Hydrocotyle gummiifera. Lam. enc. 3. p. 156. f. 7. c.

5. *gummiifera*, fol. brevioribus densissime imbricatis. Lam. enc. l. c. ill. t. 189. f. 2.

† FRAXOSA. Petala inaequalia. Fruct. ovatus. Involucr. 8-phyllum. Flor. Peruv. 3.

6. *corymbosa*, fol. imbricatis cuneiformibus trifidis minimis. Flor. Per. 3. p. 27. t. 250. In Peruviae alpib. humilib. Facie Lycopodii. Flor. solitariis. Cor. albidolutescens.

7. *spinosa*, fol. cuneiformibus trifidis spinosis. Flor. Per. l. c. In regn. Chilens. aridis et fruticosis.

8. *multifida*, fol. obovato-cuneiformibus multifidis. Flor. Per. l. c. p. 27. t. 249. f. 2. Hab. in Andium alpib. Sem. fulvescentia.

9. *crenata*, fol. obovatis: lacinii acute

crenatis. Flor. Per. l. c. fig. c. In Peruv. collib. frigidis. Sem. purpurascens.

10. *cladophisa*, fol. ovatis cuneiformibusque inciso-terratiss. Flor. Per. l. c. t. 250. f. b. Hab. in Peruv. collib. frigidis. Involucr. polyphyllum piloso-ciliatum.

11. *reniformis*, fol. reniformibus crenatis pilosissimis. Flor. Peruv. 3. p. 26. t. 249. Hab. in Peruviae umbris. Sem. fusca.

674. SPANANTHE. Umbella simplex. Cor. aequales. Involucr. subheptaphyllum. Petala lanceolata, patentia. Fructus ovalis, in dorso 3-striatus.

1. *paniculata*, caul. erecto, fol. latis triangularibus acuminatis crenatis basi barbosis. Willd. p. 1363. sub Hydrocotyle. Spananthe. Jacq. Icon. rar. 3. p. 247. Coll. 3. p. 247. Hab. circa Caracas. ☉

675. BOWLESIA. Umbella simplex triflora. Flosc. fertiles paralleli. Petala aequalia. Fruct. 4-gonus, subpyramidalis. Sem. extus concava.

1. *palmata*, fol. palmatis multipartitis lobis laciniatis: lateralib. bipartitis. Flor. Per. 3. p. 28. t. 251. f. a. Hab. in Peruviae collib. arenosis. Succosa, bispida ex actis 4-6 stellatis. ☉

2. *lobata*, fol. lobatis longe petiolatis. Flor. Per. l. c. fig. b. Hab. in Peruviae alpibus Andium. Setae. pag. fol. super. 3-5-fasciculatae, reliquae octonae, stellatae. Pl. procumbens. ☉

3. *incana*, fol. reniformibus crenato-lobatis. Flor. Per. l. c. t. 268. f. a. Hab. in Peruviae collib. Procumbens. Setae 5-6-fasciculatae, reliquae 12 stellatae.

676. SANICULA. Umbellae confertae, subcapitatae. Fructus aculeatus. Flor. disci abortientes.

1. *europaea*, f. l. radicalib. simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. Flor. dan. t. 283. Engl. bot. t. 98. Hab. in sylvis. ☉

2. *canadensis*, fol. radicalibus compositis: foliolis ovatis. Thunb. prod. 49. Hab. in Virginia et ad Cap. b. spei. ☉

3. *erithimifolia*, fol. decompositis linearibus, umbellis trifidis. Willd. in Act. Berol. v. 2. Arctedia squamata. Pallas. in N. Act. Petrop. 10. p. 308.

4. *marilandica*, florc. masculis pedunculatis, hermaphroditis sessilibus. Jacq. collect. 2. p. 293. Icon. rar. 2. t. 348. Hab. in Marilandia, Virginia. ☞

677. *ASTRANTIA*. *Involuc.* partialia latiuscula, lanceolata, patentia æqualia, petalis longiora, colorata. *Flor.* plurimibortientes.

1. *Epipactis*, fol. quinquelobis obtusis serratis, involucri oblongis obtusis serratis, Willd. Sp. 2. p. 1367. Scop. carn. n°. 301. t. 6. Jacq. aust. 5. p. 32. app. t. 11. Hab. in sylvis montanis et subalpinis Carinthiae, Pannoniae. ☞

2. *major*, fol. radicalibus quinquelobis, lobis trifidis acutis dentatis, involucri linearis lanceolatis integerrimis. Willd. p. 1368. Hab. in alpinis Helvetiae, Hetruriae, Bohemiae, Pyrenaeis. ☞

3. *carniolica*, fol. radicalibus quinquelobis, lobis oblongis acutiusculis subtrifidis mucronato-dentatis, involucri integerrimis. Willd. Jacq. austr. 6. app. t. 10. Hab. in alpinis Carnioliae, Carinthiae. ☞

4. *minor*, fol. radicalibus digitatis, fol. septenis novenis lanceolatis acutis profunde dentatis. Willd. Lam. enc. t. p. 320. t. 191. f. 2. Hab. in alpinis Helvetiae, Pyrenaeis. ☞

5. *heterophylla*, fol. caulinis integris ovatis aristato-serratis sessilibus, involucri apice ciliato-serratis. Willd. in N. Act. Berol. v. 2. Hab. in Sibiria.

6. *ciliaris*, fol. lanceolatis serrato-ciliatis. Linn. suppl. 177. Jacone capensis. Berg. Act. ups. 3. p. 187. t. 10. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. simplex junceus, apice divisus in paucos ramos floriferos. L.

678. *BUPLEURUM*. *Involucra* umbellulae majora, 5-phylla. *Petal.* (flava) involuta. *Fructus* subrotundus, compressus, striatus. (Fol. integerrima.)

* *Herbacea.*

1. *rotundifolium*, involucri coadunatis, universalis triphylla. Linn. Blackv. t. 95. Lam. ill. t. 189. f. 1. Hab. inter segetes. ☉

2. *stellatum*, involucri coadunatis, universalis triphylla. Linn. B. fol. gramineis, involucri peculiari octies emarginato. Hall. herb. n°. 771. t. 18. Hab. in alpinis Helvetiae. ☞

3. *petraeum*, involucri subpentaphyllis coadunatis, universalis pentaphyllo, fol. caulinis cordato-lanceolatis amplexicaulibus, radicalibus linearibus. Willd. Sp. 2. p. 1370. Pluck. phytog. t. 50. f. 5.

4. *graminifolium*, involucri heptaphyllis, universalis subtriphylla, fol. radicalibus linearibus, scapis monophyllis. Vahl. symb. 3. p. 48. B. petraeum. Jacq. Coll. 1. p. 209. Icon. rar. 1. t. 56. Vill. delph. 2. p. 576. t. 14. Hab. in montibus Galliae, Italiae, Carinthiae. ☞

5. *angulosum*, involucri pentaphyllis orbiculatis, universalis triphylla ovato, fol. amplexicaulibus cordato-lanceolatis. L. Perfoliata alpina. Hab. in Pyrenaeis. β. in Vallis alpina. Var. β. fol. angustissima striata. L. ☞

6. *pyrenaicum*, involucri pentaphyllis subrotundis emarginatis coadunatis, universalis triphylla, basi inciso, fol. lanceolatis cordatis amplexicaulibus. Willd. Gouan. illust. p. 8. t. 4. f. 1. 2. Hab. in Pyrenaeorum monte Laurenti. ☞

7. *longifolium*, involucri pentaphyllis ovatis, universalis subpentaphyllo, fol. ovatis amplexicaulibus. Hab. in Germania, Thuringia, inque monte Jura Helvetiae. ☞

8. *falcatum*, caul. flexuoso, involucri pentaphyllis acutis, universalis subpentaphyllo, fol. lanceolatis, caul. flexuoso. L. Jacq. austr. t. 158. Hab. in collibus et sylvaicis calcareis, gypsaceis, frequens. Fol. radicalia ovata. ☞

9. *exaltatum*, involucri utroque subpentaphyllo minimo, fol. omnibus linearibus: inferioribus elongatis, caul. erecto paniculato. Tablaen de la mer Caspienne, etc. no. 8. In pratis montosis et collibus sicioribus, etiam Taurinae.

10. *caricifolium*, involucri pentaphyllis cuspidatis, universalis monophyllo lanceolato, fol. linearibus basi attenuatis. Willd. B. gramineum. Villars. delph. 2. p. 575. Hab. in montibus Delphinatus, Vallisae. ☞

11. *Odontites*, umbell. lateralibus oppositifoliis subsessilibus: radiis inaequalibus, involucri pentaphyllis lanceolato-linearibus coloratis longioribus. Desf. Atl. t. p. 209. Jacq. hort. t. 91. Coll. 3. p. 68. J. Bauh. hist. 4. p. 201. ic. Hab. in alpinis Vallisae, Italiae rupestrib. et inter Earbariae segetes. ☉

12. *semicompositum*, fol. lanceolatis mucronatis: inferioribus obtusis, involucri subulatis:

subulatis : partiali flor. longiore, umbel. radiis inaequalibus, sem. aspero. Desf. l. c. p. 250. Gouan. ill. g. t. 7. f. 1. Hab. in Hispania, Monspelii et in Algeriac arvis. Var. fol. eaul. inferiorib. lanceolatis acutis. D. ☉

13. *procumbens*, caul. procumbente, fol. linearis-subulatis, ramulis paniculatis, involucl. subovatis acutis brevissimis, sem. rugoso. Desf. l. c. Hab. prope Tuncum. Affine B. tenuissimo. T.

14. *ranunculoides*, involucl. pentaphyllis lanceolatis longioribus : universali triphylo, fol. caulinis lanceolatis L. Jacq. Collect. 3. p. 66. Park. theat. t. 338. Hab. in Helvetia et Pyrenaeis. T.

15. *rigidum*, caule dichotomo subnudo, involuclis minimis acutis. Hab. Monspelii. Fol. lanceolata, nervosa, rigida. Involucl. 3-phyllum.

16. *tenuissimum*, umbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtrifloris. Engl. bot. t. 478. Flor. dan. t. 1090? Column. cephe. t. p. 85. t. 247. Moris. s. g. t. 14. f. 4. Hab. in Germania, Anglia, Gallia, Italia. Caul. ramosissimus. Fol. linearis. Umbellulae axillares. L. ☉

17. *baldense*, caule erecto ramoso, fol. linearibus, involuclis subtetraphyllis inaequalibus umbella brevioribus, involuclis pentaphyllis. Willd. Turra. giorn. p. 47. t. 1. Hab. in montanis subalpinis Croatiae, Carnioliae et in monte Baldo. T.

18. *Gerardi*, caule erecto ramosissimo, fol. linearibus acuminatis involuclis pentaphyllis linearis-subulatis umbella longioribus. Willd. Jacq. austr. 3. t. 256. B. junceum. Hab. in Gallia, Italia, Palatinatu, Austria. ☉

19. *junceum*, caule erecto paniculato, fol. linearibus, involuclis triphyllis longitudine umbellae, involucl. pentaphyllis. Willd. Hab. in Gallia, Italia, Helvetia, Germania. ☉

20. *nudum*, caule ramoso aphylo, fol. radicalibus decompositis planis incis, involuclis involuclisque lanceolato-oblongis. Ait. Kew. t. p. 331. Hab. ad Cap. b. spec. T.

* * Frutescentia.

21. *arborescens*, frutescens, fol. oblongis integerrimis petiolatis. Willd. Hab. ad Cap. b. spec. h.

22. *fruticosum*, frutescens, fol. lanceolato-obovatis integerrimis sessilibus. Willd. B. fol. obverse ovatis in petiolum

attenuatis. Hort. cliff. 104. Hab. in Celliae australis et Orientis saxosis maritimis. h

23. *frutescens* (hispanicum), frutescens, fol. striatis linearis-subulatis rigidis, infloresc. ramosa, involucl. subpentaphyllis, involucl. umbellula brevior. Desf. l. c. p. 251. Cav. ic. 2. t. 106. B. angustifolium hispanicum. Barret. t. 2255. Hab. in collib. incultis prope Flemsen.

24. *gibraltarium*, fruticosum, fol. rigidis lanceolatis obliquis erectis mucronatis, involucl. reflexis. Desf. p. 233. Lam. enc. t. p. 520. B. coriaceum. L'Herit. Stirp. t. 67. Willd. Sp. p. 1377. B. obliquum. Vahl. Hab. in Hispan. prope Gibraltari et in Cap. Bon. dicto apud Tuncanos. Affine priori. Fol. utrinque glauca.

25. *plantagineum*, fruticosum, fol. perennantibus lanceolatis nervosis mucronatis, ramis floriferis ramosis striatis, involucl. subulatis adpressis. Desf. p. 233. t. 37. Hab. in Atlante prope Dongie. Involucl. univ. 5-phyllum. h

26. *caulescens*, fruticosum, fol. ovali-lanceolatis obtusis nervosis subsessilibus. Schousboe. p. 113. Hab. in fruticeto prope Magadore. Glabrum, glaucescens. Involucl. univ. 5-phyllum. Priori affine.

27. *spinosum*, frutescens, ramis paniculae senilibus nudis spinoscatibus, fol. linearibus. Linn. suppl. t. 8. Gouan. illust. p. 8. t. 2. f. 3. Habitat in Hispania. Panicula deflorata in spinas transiens more Alyssi spinosi. L. h

28. *difforme*, frutescens, fol. vernalibus decompositis planis incis, aestivalibus filiformibus angulatis trifidis. L. B. fruticans, fol. filiformibus trifidis. Thunb. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spec. Fol. hyemalia Petroselinii, aestivalia Spartii. L. h

679. HERMAS. Polygama. Involucl. universale 3-12-phyllum : partiale 2, 1-laterale. Umb. hemisphaerica; radiis (flor. masculis deciduis) truncatis. Umbellulae laterales flor. masculis tantummodo instructae. Sem. suborbiculata, compressa, stria longitudinali elevato. (Fol. tomentosa.)

1. *depauperata*, fol. cordato-oblongis supra nudis subamplexantibus, axillis superioribus et involucl. lanuginosis. Lam. enc. 3. p. 121. Linn. mant. p. 299. Barret. t. 71. f. 2. Bupleurum villosum. L. Sp.

pl. 2. p. 343. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequentibus omnibus.

2. *gigantea*, fol. ovato-lanceolatis supra lanuginosis subius tomentosis obsolete crenatis. Lin. suppl. p. 435. Lam. l. c. Bupleurum. Thunb. prodr. p. 50. sub Bupleuro. Fol. Verbasci. Caul. 4-pedalis.

3. *capitata*, fol. ovatis inciso-crenatis subius tomentosis, umbel. capitatis. Thunb. prodr. l. c. Lin. suppl. p. 435. Pl. parva. Fol. fere ut in Dryade octopetala. Umb. radii non truncati. Lam. enc. 3. p. 122.

4. *quinquedentata*, caul. glabro, fol. ovatis quinquedentatis subius tomentosis, umbel. solitaria. Lin. suppl. l. c. Fol. parva.

5. *ciliata*, caul. glabro, fol. ovatis ciliatis subius tomentosis, umbel. pluribus. Lin. suppl. p. 436.

680. CAUCALIS. Cor. ut plurimum radiata: disci masculi. Petala inflexo emarginata. Fructus setis hispidus. Involuerum polyphyllum integrum, aut nullum.

1. *grandiflora*, involueris singulis pentaphyllis: foliolo unico duplo majore, petalis exterioribus maximis. Jacq. austr. t. 54. Willd. p. 1383. Hab. in Europa inter segetes. ☉

2. *daucoides*, umbellis trifidis aphyllis, umbellulis trispermis triphyllis. Jacq. austr. t. 157. Moris. s. g. t. 14. f. 6. Hab. in arvis. Nomen haud aptum. Involueri universalis loco villus adest albidus.

3. *latifolia*, umbella universali trifida: partialibus pentaspermis, fol. pinnatis serratis. Jacq. hort. t. 128. Hab. in Germania, Helvetia, Gallia, Oriente inter segetes. Foliol. lanceolata. Flor. rubri.

4. *mauritania*, involuero universali monophyllo, partialibus triphyllis. L. Walth. hort. 127. Hab. in Mauritania. ☉ †

5. *maritima*, humilis pubescens, lacinii foliorum obtusiusculis, umbellis involucriatis bifidis, fructibus ovatis crassis, aculeis inaequalibus flavescentibus. Lam. enc. 1. p. 65. Cav. ic. 2. p. 1. t. 10. C. pumila. Vahl. Willd. Daucus muricatus. β. L. Hab. in maritimis Europae australioris et Barbariae. Caul. fusco-tomentosus. Pedunc. subradicales. ☉

6. *orientalis*, umbellis patentibus, foliolis partialibus supradecompositis lacinia- tis: lenticulis linearibus. Moris. s. g. t. 14.

f. 5. Bellon. it. lib. 3. t. 200. Hab. in Oriente. Semina setis exstantibus apice viscoso-glandulosis. L. ☉

7. *capensis*, caule humillimo aspero, involueris et involucriis triphyllis, fructibus globosis muricatis. Lam. enc. 1. p. 657. C. africana. Thunb. prodr. p. 49? Hab. ad Cap. b. spei.

8. *platycarpus*, umbellis trifidis, involueris et involucriis triphyllis, umbellulis dispermis. Lam. enc. 1. p. 650. Gouan. 8. monsp. 285. Moris. s. g. t. 14 f. 2. Colum. ecphr. 1. t. 94. f. 2. Hab. in Gallia australi, Italia. Fruct. magnus purpurascens.

9. *leptophylla*, involuero universali subnullo, umbella bifida, involucriis pentaphyllis. L. Hab. in Europa australiori inter segetes. Fructus setis fulvis 2, flavis distinctus. Habitu C. Daucoidis.

10. *humilis*, caul. retrorsum hispido, umbel. bicaudata, involuero 0, involucriis subpentaphyllis, fructibus elongatis pilis confertis pelmo-uncinatis. Desf. Atl. 1. p. 239. Jacq. hort. 2. t. 195. C. parviflora. Lam. Enc. 1. p. 656. Hab. in Galliae meridionalis et Barbariae segetibus. Involuer. partiale heptaphyllum. Desf. Sem. setis flavescentibus. An ab antecedente diversa?

11. *Anthriscus*, caul. elongato, ramis erectiusculis, foliol. ovato-lanceolatis pinnatifidis, involuero universali subnullo. Tordylium Anthriscus. Lin. Jacq. Austr. t. 261. Curt. Lond. ic. Torilis Gaertn. Hab. ad sepes, in ruderalis. Involuer. universale observavi vix ullum, quod ab aliis polyphyllum affirmatur.

12. *arvensis*, involuero universali subnullo, seminibus ovatis, stylis reflexis, fol. decompositis, foliolo caetero linearilanceolato, caul. ramosissimo. Ait. Kew. 1. p. 334. C. helvetica. Murr. syst. veg. p. 276. Jacq. hort. 3. p. 12. t. 16. C. infesta. Curtis. Lond. ic. C. segetalis. Thuillier. Hab. in agris. Pedalis, ramis congestis. An hujus loci Scandix infesta. Lin.? ☉

13. *nodosa*, caul. prostrato, umbellis simplicibus sub-sessilibus, seminibus exterioribus hispidis. Lin. sub Tordyllo. Jacq. Austr. app. t. 24. Engl. bot. t. 199. Hab. ad margines agrorum, etc. Sem. latere interiora tantum tuberculata.

681. DAUCUS. Cor. subradiata. Flosculi disci abortivi. Fructus pilis hispidus. (Umbella fructus contractus, infundibuliformis.)

1. *Carota*, seminibus hispidis, petiolis

ultus nervosis, folior. laciniis angustioribus acutis. Lam. enc. t. p. 634. Flor. lan. t. 723. *β. sylvestris* flosc. centrali rubro sterili. Hab. in pascuis, arvis.

β. polygamus, umbel. flosculis marginalibus pluribus masculis. Gouan. illustr. par. Jacq. hort. 3. t. 38. Hab. in Hispania. Sem. pilis longioribus instructa dicuntur.

Obs. Vili adhuc varietatem *D. Carotac* locis siccis colliculosis lectam, involucri aciniis integerrimis distinctam; occurrit quoque in Argentorati agris post segetem rar. memorabilis a b. Hermanno *exigua* lenominata, caul. brachiato divaricato.

* *maritimus*, involucri. brevibus dissectis, umbellis parvis, fol. tenuiter dissectis glabris lucidis, caul. subnudo. Lam. t. c. D. Carota. *β. Smith.* brit. 1. p. 300. Hab. in Angliæ et Galliae meridionalis maritimis. An distincta species?

2. *mauritanicus*, seminibus hispidis, flosculo centrali sterili carnoso, receptaculo communi crasso hemisphaerico, fol. atis glabris, foliol. ovatis incisus dentatis. Lam. 1. c. Moris s. g. t. 13. f. 4. Hab. in Hispania, Italia, Mauritania. Conf. *D. grandiflorus*. Desf. Atl. s. p. 243.

β. lucidus, fol. lucidis, caule hirtotriolitis laevibus. Linn. suppl. 179. *D. hispanicus* seminibus aculeatis, flosculo centrali sterili nullo, caule nitido. Gouan. illustr. g. Moris 3. s. g. t. 13. f. 4. Hab. in Italia, Hispania, Mauritania. *β*

3? *gummifer*, involucri. bracteaefornibus simplicibus latis membranaceis ad atera coloratis, fol. laciniis ovatis incisulentatis. Lam. Bocc. Mus. t. 20. Hab. in apudosis, maritimis Europ. australioris.

4. *grandiflorus*, caul. piloso, fol. decompositis: foliolis linearibus, umbel. ateralibus, fol. brevioribus, sem. aculeis peltato-stellatis. Desf. Atl. 1. p. 240. t. 59. Hab. in Algeriae segetibus. Facie *Cauc. grandiflorae*. Petala in ambitu maxima.

5. *parviflorus*, fol. multiflorum pinnatis: pinnulis inferiorum ovato-oblongis incisus: superiorum linearibus acutis. caul. scabro, umbel. distinctis, petal. minutissimis flavescens. Desf. Atl. 1. p. 241. t. 60. Hab. ad littora prope Arzew. Petal. minima flavescens. Sem. tertia, apice peltata.

6. *aureus*, caul. dichotomo piloso scabro, cor. radiantibus flavis, acul. rigidis, apice peltato uncinatis. Desf. p. 242. Hab. inter segetes circa Mascar. Petal. in ambitu majora. *⊙*

7. *crinitus*, foliol. verticillatis multifloram pinnatifidis rigidulis acutis, involucri. apice multipartitis, semine crinito. Desf. p. 242. t. 62. Park. Theatr. 133. In Atlanta et in collib. incultis prope Mascar et Flema. Sem. setae longae molles violaceae aut albae. Flor. contriti aromatici. *D.*

8. *Gingidium*, radiis involucri planis: laciniis recurvis. Linn. *Gingidium*. Matth. Comm. p. 372. t. 373. Bocc. sic. ic. 40. Moris. s. g. t. g. f. 10. Hab. Monspeli. *⊙* *†*

9. *muricatus*, seminibus triglochidi-aculeatis. L. Desf. Atl. p. 243. Moris s. g. t. 54. f. 4. Herm. par. t. 111. Col. ech. 1. p. 95. t. 94. Hab. in Mauritania, in arvis. Fol. fere Cari Carvi. Cor. ante anthesin purpurascens. Sem. crassa Caucalidis, aculeis validis. *D. ‡*

10. *hispidus*, caul. hispido, pil. inferioribus retroversis, fol. subbipinnatis: foliol. ovatis inciso-lobatis villosis, acul. sem. peltato-stellatis. Desf. p. 243. t. 63. Hab. in rupium fissuris ad maris littora. Petala flava. Affin. *D. maritimo*.

11. *glaberrimus*, glaber, fol. pinnatis foliol. ovatis incisus: terminali trilobis: lac. obtusis, umbellul. distinctis, sem. muricatis. Desf. p. 244. t. 64. Crete, in sylv. Palmarum prope Tozzar. Umbel. parva, umbellul. distinctae in pedunc. longis, facie Ammos.

12. *copticus*, flor. aequalibus, fol. tripinnatis glabris, foliol. linearibus angustissimis, caul. laevi. Lam. enc. s. p. 635. Ammi copticum. Lin. Jacq. hort. t. 196. Hab. in Aegypto. Sem. uti in ceteris *Daucis*.

13. *setifolius*, caul. laevi, fol. setaceis pubescentibus, sem. semicylindricis: angulis ciliato-erhinatis. Desf. 1. p. 244. t. 65. Sem. turgida, cinerea, pubescentia. An *Visnaga*? Hab. in collib. prope Mascar.

14. *alatus*, seminib. angulis membranceis hispidis, flore parvo luteo. Poir. ii. 9. p. 235. Crete. ad maris littora prope La-Calle.

682. A M M I. *Umbella laxa*. Involucra pinnatifida. Cor. radiata: omnes hermaphrodita. Fructus laevis, striatus.

* V I S N A G A.) *Daucoidea*, umbel. decorata concava.

1. *Visnaga*, fol. decompositis subuliformibus, sem. inter strias villosis, umbel.

universali basi coalita. Lin. Willd. p. 1391. sub Dauco. Vismaga daucoides. Gaertn. de fr. 1. p. 92. t. 107. Lab. ic. 716. Hab. in Gallia, in Oriente et in Barbaria. Radix umbellae, calore exsiccata, ad denticulalpia adhibetur. Schousb. Hinc Gallis *Herbe aux cure-dents*.

2. *Meoides*, fol. multifidis capillaceis, petiolis canaliculatis. Ammi anethifolium. Lam. 1. c. Dauc. Meoides. H. Par. Hab. in Oriente. Sem. glaberrima. \odot

** *Umbel. laxa subdivariata.*

3. *majus*, fol. inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, superioribus multifidis linearibus. L. Blackw. t. 447. Willd. p. 1392. Hab. in Europae australis et Orientis vinctis, arvis. \odot

4. *glaucofolium*, fol. bipinnatis: foliolis pinnatis trifurcatis linearibus albo-acuminatis. Villars. Delph. 2. p. 592. Dauc. petraeus glaucofolius. Bauh. hist. 3. p. 58. Hab. in Gallia meridionali et circa Parisios. \odot

5. *divaricatum*, sem. striatis ovatis, caul. ramoso divaricato, umbel. radiis subrefloris. Gmel. Syst. N. L. II. p. 474. sub Dauco. Walt. Flor. Carol. p. 114. Hab. in Amer. boreali. Pedale. Sem. glaberrima, profunde striata.

6. *capillaceum*, fol. omnibus capillaceo-multifidis. sem. glabratis. Michaux. Flor. 1. p. 165. Hab. in Carolinae campestris. Statura Am. copticis. L. \dagger

7. *daucifolium*, fol. supradecompositis, foliol. tripartito-pinnatifidis acutis. Willd. p. 1393. Scop. corn. n. 342. t. 10. Crithmum pyrenaicum. Hori. cliff. 94. Hab. in Pyrenaeis, Carniolia. \odot

683. **ARTEDIA.** *Involucrum* pinnatifidum. *Cor.* radiate. *Flor.* disci masculi. *Fructus* compressus, margine lobis membranaceo-scariosis cinctus.

1. *squamata*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1389. Lam. ill. t. 163. Hab. in Libano. Fol. multipartita - tenuia. Sem. non hispidia, sed disco glabra striis elevatis, margine lobato-alata, magna. \odot

684. **BUNIMUM.** *Cor.* uniformis. *Umbella* conferta. *Fructus* ovatus.

1. *Bulbacastanum*, fol. uniformibus, petioli subaequalibus, involucri polyphylo. Willd. p. 1394. Flor. dau. t. 220. E. minus

fol. uniformibus, involucri polyphylo fructib. subcylindricis apice crassioribus, stylis reflexis deciduis. Gouan. ill. 10. Moris. 5. 9. p. 334. t. 2. f. 1. Hab. in sylvaticis, agris et arvis. Rad. edulis.

2. *majus* (ternatum), fol. caulinis ternatis subsessilibus angustis linearibus, involucri. 3. B. *majus* fruct. ovatis; styl. persistentibus. Gouan. ill. p. 10. Willd. p. 1394. hujus loci. Hab. in Gallia, frequens mihi obvium in pascuis et arbutis prope Montd'or in Auvergne Gall.

3. *flexuosum*, caul. basi attenuato, flexuoso, involucri subtriphylo. Smith. brit. 1. p. 301. B. Bulbacastanum. Curt. Lond. ic. Involucri. 1-3 -phyllum, saepe nullum. Sm.

3. *aromaticum*, foliol. filiformibus, involucri subhexaphylo, involucri. triphyllis. Lin. Mant. p. 218. Hab. in Creta et Syria. Sem. ovata, minuta, torulis 5, scabrisculis. L.

685. **CONIUM.** *Involucella* dimidiata, subtriphylla. *Fructus* subglobosus, 5-striatus, utrinque crenatus.

1. *maculatum*, caule ramosissimo maculato, seminibus striatis Jacq. auct. t. 176. Willd. Sp. 2. p. 1395. Curt. Lond. ic. Hab. in agris, ruderalis. \odot

2. *rugosum*, seminibus rugosis. Thunb. profl. 50. C. suffruticosum. Berg. cap. 77. Hab. ad Cap. b. spec.

3. *rigens*, seminibus submuricatis, pedunculis sulcatis, foliol. canaliculatis obtusis. L. Hab. ad Cap. b. spec. littora maris. Caul. brevis, rigens. \dagger

4. *africanum*, seminibus muricatis, petiolis pedunculisque laevibus, foliolis planiusculis. Jacq. hort. t. 194. Hab. in Africa. Glaucum. Odor Apii graveolentis. L. \odot

5. *dichotomum*, caul. sulcato dichotomo, sem. oblongis compressis sulcatis tuberculosis. Desf. Atl. 1. p. 246. t. 66. Hab. inter aegetes prope Mascar. Sem. profunde sulcata.

686. **SELINUM.** *Fructus* ovali-oblongus, compresso-planus, in medio striatus. *Involucrum* reflexum. *Petala* cordata, aequalia. *Cal.* integer.

1. *sylvestre*, caule laevi, radice fusiformi multiplici. Willd. Sp. p. 1396. Lin.

appl. 180. Flor. dan. t. 412. Moris. 2. 9.
17. f. 2. Hab. in Hereynia, Gallia. ☞

2. *palustre*, sublactescens, caule striato, adice fusiformi subdivisa, radiis umbellae ispidis. Willd. Flor. dan. t. 257. Engl. bot. 229. S. sylvestre. Jacq. austr. t. 152. S. Tysselinum. Crantz. austr. p. 170. Bauh. hist. n. Europae septentrionalis paludibus. ☞

3. *austriacum*, caule sulcato, involuero universali polyphylo, foliol. cuneiformibus incis. Willd. Jacq. austr. t. 71. S. regentum. Vill. delph. 2. p. 636. S. petiolis agenticis et viridibus striis lineatis, semine latis albidis. Crantz. fasc. 3. p. 43. t. 14. 2. Hab. in montosis Austriae, Italiae, Galliae. ☞

4. *sibiricum*, fol. tripinnatis, involuero universali partiali. decoloribus cuneaphyllis. Letz. obs. 2. p. 16. Hab. in Sibiria. ☞

5. *lineare*, caul. sulcato-striato, foliol. innatisidis: lacin. linearibus. Schumacher. Flor. Zeeland. p. 95. Hab. in Dania, in sgeribus. Caul. strictus, bipedalis. Fol. aginae membranaceae, glaucae. Involucra etiaceo-capillacea. S.

6? *Carvisolia*, caule sulcato neutanulo, involuero universali evanito, foliolis ancoelatis incis. apice callosos mucronatis, pistillis fructus reflexis. Jacq. austr. t. 16. Gmel. sib. t. p. 204. t. 48. Carvisolia. Will. t. 5. f. 2. Vill. Dauph. 2. p. 629. Obcm. margine membranacea. Hab. in Germania, Helvetia, Sibiria, Austria. ☞

7. *appianum*, caul. tereti striato: involuero universali monophyllo, fol. vaginis implexicaulis, erectis, foliolis filiformibus mucronatis. Viviani Flor. ital. fragm. t. x. Hab. inter saxa montium Carrarae. Habitu rigido.

8. *Chabraei*, caule tereti striato, involuero universali nullo, vaginis foliorum axis, foliolis filiformi-linearibus. Willd. fa. q. aust. t. 1. 72. Puccidannum Carvisolia. Vill. delph. 2. p. 630. Hab. in nemoribus Germaniae, Galliae, Italiae. ☞

9. *Seguieri*, caule subtereti striato, involuero universali nullo, foliol. trifidis acerbis mucronatis. Willd. Jacq. hort. 61. Seguier. ver. 2. p. 41. t. 13. Hab. in Italia, Carniolia. Caul. quadripedalis laevis non striatus, nisi in summitate. ☞

10. *Monnieri*, umbellis confertis, involucro universali reflexo, seminum costis pumque membranaceis. Jacq. hort. t. 62. Hab. in Gallia australi. ☉

11. *decipiens* (frutescens), caule lignoso inferne nudo, fol. inferioribus bipinnatis, pinnulis lanceolatis integris incisisque serratis. Schrad. et Wendl. sert. hannov. fasc. 3. p. 23. t. 13. Hab. .. Involuc. polyphyllum, foliolis latis lanceolato-cuneiformibus trifidis, margine membranaceis. W. h

12. *canadense*, nitens glaberrimum, fol. bipinnatis: foliol. multipartitis: laciniis lanceolatis, fructib. ovalibus. Michaux. Flor. 1. p. 165. An Athamanta chinensis. Lin. 2 Hab. ad ostium flum. St. Laurentii.

13. *Oreoselinum*, fol. triplicato-pinnatis: foliolis ovato-acutis inciso-serratis divaricatis. Athamanta. Lin. Jacq. austr. t. 68. Oreoselinum nigrum. Delarbre. Flor. de la Auvergne. 1. p. 428. Hab. in collibus ardis et ad vinearum margines. Sem. rotundata.

14. *Cervaria*, fol. pinnatis, inciso-angularis, sem. oblongis. Athamanta. Lin. Hort. Cliff. p. 22. S. fol. pinnis semilobatis circumscissatis. Hall. belv. n. 804. Roth. germ. 2. p. 354. Jacq. austr. t. 69. Oreoselinum elaphobosum. Delarbre l. c. p. 429. Hab. in montosis agrorum et vinearum versans, etc.

687. *MULINUM. Umbella simplex.*
Involuer. polyphyllum. *Fructus* (turgidus) ovatus, profunde sulcatus: angulis rotundis. *Petala* Intescentia. *Cal.* denticulatus.

1. *proliferum*, foliis trifidis vaginantibus: laciniis subulatis, umbel. prolifera. Selinum. Cav. ic. 5. p. 58. t. 486. f. 1. Hab. in Americae meridion. portu Desado. Rad. tortuosa.

2. *microphyllum*, frutescens, fol. minutis numero. assinis tripartitis: petiolis caul. ambidentibus. Cav. l. c. p. 59. fig. 2. Cum priore. h

3. *spinosa*, fol. quinquepartitis: lacin. lanceolatis acumine pungente, petiol. basi caulem vaginantibus. Cav. l. c. t. 487. f. 1. Hab. in altissimis montibus regni Chilensis. in Cordillera. Cal. haec major.

4. *acaule*, fol. ovatis inferne attenuatis, umbel. radianli sessili. Cav. l. c. t. 487. f. 2. Cresc. prope port. Desado. Umb. in centro fol. sedens. Fruct. omnium maximus. Fol. super terram expansa.

Obs. Plantae haec toto habitu a Selinis differunt, quare eas sub distincto genere separavi.

688. **ATHAMANTA**. *Involucr.* polyphyllum. *Fructus* ovato-oblongus, pubescens, striatus. *Petala* inflexa, emarginata. *Cal.* integer.

1. *Libanotis*, fol. bipinnatis planis, umbella hemisphaerica, seminibus hirsutis. L. Jacq. austr. t. 392. Willd. p. 1400. Engl. bot. t. 138. Pluck. alm. 129. t. 173. β . pyrenaica. Jacq. hort. 2. t. 197. Hab. in Succiae, Germaniae pratis siccis apricis. \mathcal{T}

2. *sibirica*, fol. pinnatis inciso-angulatis. Gmel. sib. I. p. 186. t. 40. f. 1. 2. Hab. in Sibiria. Flor. subtus rubri. \mathcal{T}

3. *condensata*, fol. subpinnatis foliolis dorsum imbricatis, umbella lentiformi. Hab. in Sibiria. Germina villosa. Antherae et receptacula flosculorum purpurea. L.

4. *incana*, tota pubescens incana, fol. supradecompositis, foliolis cuneiformibus quadridentatis, umb. multiradiata globosa. Willd. p. 1402. Hab. in Sibiria.

Obs. Similis praecedenti, sed tomento tenui incano, caule crassiore, foliorum forma et parvitate distincta. W.

5. *sicula*, fol. inferioribus nitidis, umbellis primordialibus subsessilibus, seminib. pilosis. Hab. in Sicilia. Fol. inferiora nitida, superiora villosa. Caulis pubescens. \mathcal{T}

6. *Matthioli*, foliolis capillaceis, stylis persistentibus erectis, seminibus oblongis hirsutis. Willd. p. 1403. Jacq. ic. rar. 1. t. 57. A. foliolis elongato-subcuneatis, sem. ovato-acutis striatis hirsutis suaeolentibus. Wulf. in Jacq. Coll. 1. p. 211. Libanotis rupestris Scop. carn. n. 315. t. 9. Villers. 2. p. 648. Dalech. hist. p. 758. f. 759. Hab. in Croatia, Carniola et Delphinatu. Rad. longissima

7. *cretensis*, foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis. Jacq. austr. t. 62. Hab. in Helvetia, Austria, Carniola. \mathcal{T}

8. *annua*, fol. multipartitis: lacinii linearibus tertiusculis acuminatis. Myrrhis tenuifolia annua cretica, semine laxe luteo alba pub. scente. Moris. hist. 3. p. 303. Hab. in Creta. Var. *Cretensis*? \odot

689. **PEUCEDANUM**. *Fructus* ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. *Involucra* brevissima. (Caul. altus. Fol. multifido-linearia.)

1. *officinale*, fol. quinques tripartitis filiformibus linearibus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1405. Gmel. sib. 1. t. 41. Hab. in Europae

australioris pratis pinguib. Flor. flavescentes. \mathcal{T}

* *gallicum*, fol. quadri-quinques partitis linearibus - acuminatis (sublan. colato - linearibus), flor. albis. P. gallicum. Tourn. Hist. d. pl. de Paris. v. 2. p. 478. Hab. in sylvaticis, praesertim prope Fontainebleau. Caul. altus, basi fibris aridis cinctus. \mathcal{T}

2. *arenarium*, fol. subquadripinnatis, umbellis pedunculatis 5-7-fidis, involuc. universali subnullo. Plantar. hongar. p. 18. t. 20. Hab. in clivis arenosis Pestini. Altitude spectabilis. Rad. profundissime penetrat. Cor. flava. Accedit ad P. officinale.

3. *italicum*, fol. tripartitis, foliol. linearibus longissimis. Mill. dict. n. 2. P. officinale. β . Lin. A prima specie diversum videtur, ob fol. tripartita tantummodo: foliolis 3-plo fere longiorib., etiam multo latioribus.

4. *serotinum*, caul. altissimo, fol. quinques partitis, foliol. ternatis confluentibus. P. tenuifolium. Enc. bot. 5. p. 228. Colitur in Hort. Parisiensi. Cor. flavescent. Foliol. basi confluant, apice divergunt.

5. *alpestre*, foliolis linearibus ramosis. Lin. Hort. Cliff. Hab. ... \dagger

6. *capillaceum*, fol. bipinnatis, lacinii capillaceis sulcatis. Thunb. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei, c. sequente.

7. *tenuifolium*, fol. bipinnatifidis, lacinii lanceolatis oppositis alternisque marginatis. Thunb.

8. *sibiricum*, foliolis linearibus acutis, umbellis primordialibus sessilibus. Willd. p. 1406. Hab. in Sibiria. Fol. supradecompositis, foliolis longis linearibus acutis in petiolum partialem decurrentibus. W. \mathcal{T}

9. *japonicum*, fol. quinques tripartitis, foliol. cuneiformib. trifidis. Thunb. jap. 117. Hab. maritimis Japoniae.

10. *Silva*, foliolis pinnatifidis: lacinii oppositis, involucro universali diphylo. L. Jacq. austr. t. 15. Riv. t. 59. Hab. in Helvetiae, Narbonne, Germaniae, Angliae, subhumid. Caul. foliola lanceolata, quasi carinata: extimis coadunatis. Flor. lutei, exus albid. L. Involucr. etiam 0. \mathcal{T}

11. *alsaticum*, fol. pinnatifidis: lacinii trifidis obtusiusculis, involucro polyphylo. Jacq. austr. t. 70. Hab. in Alsatie, Austriae, Palatinatus dumetis humidiusculis. Petala lutea. \mathcal{T}

12. *aureum*, fol. tripartitis, foliolis caulinis linearibus - lanceolatis, radicalibus

oblongis multifidis. *Alt. Kew. 1. p. 341.*
Hab. in Canariis. ♂

13. *nodosum*, foliis alternatim multifidis, caul. nodoso. *L. Hab. in Creta.*

14. *geniculatum*, fol. subrotundo reniformibus crenatis. *Forst. prod. Hab. in Nova Zeelandia.*

690. **CRITHMUM.** *Involucr. polyphyllum. Fructus ovalis, compressus. Florculi æquales.*

1. *maritimum*, fol. lanceolatis carnosiss. *L. Jacq. hort. t. 187. Hab. ad maris litora. h*

2. *latifolium*, fol. cuneiformibus fissis. *Alt. Kew. 1. p. 342. C. fol. pinnatis, foliolis sessilibus obovatis lobatis, lobis dentatis. Linn. suppl. 180. Hab. in maritimis Teneriffae et Salvagae. Sesquipedale. Flor. lutei. ♂*

3. *canariense*, fol. carnosiss bipinnatis basi ample vaginantibus. *Cav. in Annal. d. scientias natur. p. 35. Hab. prope Teneriffae.*

691. **CACHRYS.** *Involucra polyphylla. Fruct. magnus subovatus, angulatus aut laevis, suberoso-corticatus.*

1. *odontalgica*, fol. radiclesibus supradecompositis tomentoso-canis, caule audo umbellifero, seminibus cortice suberoso laevissimo. *Linn. suppl. 181. Willd. Sp. p. 1409. Pall. it. 3. app. n.º 75. t. p. f. 1. 2. 3. Hab. in desertis Sibiriae inter Wolgam et Jaicum. Radix longissima saporis acerrimi unde gaudet vi sialagoga. L. ¶*

2. *Libanotis*, fol. bipinnatis, pinnis oppositis linearibus subpinnatifidis, seminibus sulcatis glabris. *Vahl. symb. 3. p. 49. C. semine fungoso sulcato plano minore, fol. Peucedani angustis. Moris. s. g. t. 1. f. 6. Umb. t. 3. f. 3. Hab. in Sicilia. ¶*

3. *laevigata*, fol. supradecompositis ferulaceis, laciniis setaceis brevibus, seminibus laevibus non sulcatis glabris. *Lam. enc. 1. p. 256. C. peucedanoides. Desf. Atl. 1. p. 250. C. Morisoni. Vahl. Willd. p. 1409. C. semine fungoso laevi, fol. ferulaceis. Moris. umb. 63. t. 3. f. 1. Hab. in Hispania, Gallia australi, Italia et Algeriae agcis. ¶*

4. *humilis*, fol. supradecompositis glabris 1 foliol. linearibus trifidis mucronatis, seminibus glabriusculis. *Schousb. Maroc. ed. germ. p. 119. Hab. prope Cap Spartel.*

5. *microcarpos*, fol. tripartito-decompositis: foliol. setaceis, seminibus glabris: striis crenatis. *Tableau de la mer Caspienne. n.º. 9. Moris. s. g. t. 1. f. 1. Hab. ad marginem lapidosum rivorum in montosis inter Kubam et Schamachiam. ¶*

6. *sicula*, fol. (glauca) pinnatis: foliolis linearibus acutis divaricatis, seminibus ovalis sulcatis hispidis. *Moris. s. g. t. 1. f. 3. Umb. t. 3. f. 2. Boec. sic. 37. t. 18. Hab. in Sicilia, Hispania et Barbaria. Semina crassissima, sulcata, hispida. ¶*

7. *taurica*, fol. bipinnatis, foliolis linearibus acutis, seminibus sulcatis suberculatis. *Willd. Hab. in Tauria, inque Sibiria. Sem. triplo minora quam in praecedentibus. Planta dioica W.*

8. *cretica*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis serratis, seminibus sulcatis asperis. *Lam. enc. 1. p. 257. C. cretica Angelicae folio asphodeli radice. Tournet. cor. 23. Hab. in Creta. ¶*

9. *panacisfolia*, fol. pinnatis ternatisque, foliolis oblongis crenatis villosis, seminibus hirsutis. *Vahl. symb. 1. p. 25. C. pavinacea. Lam. enc. 1. p. 257. C. tomentosa. Desf. Atl. 1. p. 249. Moris. s. g. p. 267. t. 1. f. 4. C. ungarica 1 anacis folio. Tournet. ins. 325. Boec. sic. 1. t. 1. Hab. in Castilia nova, Sicilia, Barbaria. ¶*

10? *crispa*, fol. multifidis, dichotomis foliol. linearibus, caul. humili subdichotomo, sem. alis tenuibus undulato-crispis. *Hab. ... Ex hort. b. Monnici Versaliensi. Pulchra. Cor. lutea. Sem. parvula, oculo nudo scabra. An Lascrpium?*

692. **FERULA.** *Involucr. universale caducum; parziale polyphyllum. Fructus ovalis, compresso-pianus, striis utrinque 3. (Caul. ut plurimum altissimus.)*

1. *communis*, foliolis linearibus longissimis simplicibus. *L. Willd. p. 1411. Desf. Atl. 1. p. 251. Moris. s. g. t. 25. f. 3. Hab. in Europa australi et in Barbaria. cfr. Lam. enc. 2. p. 454.*

2. *sibirica*, foliolis lineari-lobulatis teretibus, involucro universali nullo. *Willd. Pall. itin. 2. app. n.º. 104. t. N. Hab. in Sibiriae locis arenosis humiliusculis. ¶*

3. *glauca*, fol. supradecompositis: foliolis lanceolato-linearibus planis subtus glauca. *L. Hab. in Sicilia, Italia. ¶*

4. *rablensis*, fol. subquadripinnatis, foliolis linearibus planis angustissimis trifidis

simplicibusque. Willd. Jacq. Coll. 4. p. 312. Hab. in Cœrithia. $\overline{\text{T}}$

5. *tingitana*, fol. laciniosis: lacinulis tridentatis: inæqualibus nitidis. F. folio latissimo lucido. Herin. par. 155. t. 16. Moris. s. g. t. 15. f. ult. Hab. in Hispania, Barbaria. Fol. uti in Apio Petro-clino. Lam. enc. $\overline{\text{O}}$

6. *Ferulago*, fol. pinnatifidis: pinnis linearibus planistriatis. L. Desf. Atl. p. 251. Moris. s. g. t. 15. f. 1. Hab. in Sicilia et Barbaria.

7. *orientalis*, foliorum pinnis basi nudis, foliolis setaceis. Hort. Tournef. itin. 3. p. 219 t. 219. Hab. in Oriente.

8. *Meoides*, foliorum pinnis utrinque appendiculatis, foliolis setaceis. Lin. Laserpitium orientale, folio nuci, flore luteo. Tournef. cor. 23. Hab. in Oriente.

9. *nodiflora*, fol. linearibus angustissimis, umbell. peduncularis ad nodos verticillatis. Lam. enc. 3. p. 456. Moris. s. g. t. 15. f. 1. Jacq. austr. 5. apposit. p. 78. Burrel. ic. t. 835. Hab. in Carn. et Europ. meridionali.

10. *sulcata*, foliol. linearibus, umbell. primordiali sessili lateralibus brevioribus, sem. longe ellipticis profunde sulcatis. Desf. Atl. t. 251. p. 67. Hab. in Algeriae collib. incolis. Priori affinis. $\overline{\text{T}}$

11. *canadensis*, lucida canadensis. Lin. Hab. in Virginia. $\overline{\text{T}}$ +

12. *Asafoetida*, foliolis alternim sinuatis obtusis. L. Kaempf. amoen. 535. t. 516. Phil. transact. v. 75. an. 1765. Hab. in Persia. Olor alliaceus. Rad. succus condensatus sub nomine indito notus. $\overline{\text{T}}$

13. *persica*, fol. supradecompositis, fol. multifidis acutis decurrentibus, umbella primordiali sessili. Willd. Hab. in Persia. $\overline{\text{T}}$

693. *LASERPITIUM*. Fructus oblongus: angulis membranaceis. Petala inflexa, emarginata, patentia.

1. *latifolium*, fol. oblique cordatis dentatis, dentibus mucronatis, seminum alis crispis. Willd. p. 1414. Jacq. austr. t. 146. L. foliolis oblique cordatis crenatis, crevis mucronatis, umbella alba. Lam. enc. 3. p. 127. Moris. s. g. t. 19. f. 1. Hab. in Europ. nemoribus siccis. $\overline{\text{T}}$

2. *Libanotis*, fol. ovatis serratis, terminalibus inciso-lobatis, sem. alis lævibus. Willd. L. umb. purpurea. Lam. l. c. Riv. t. 21. Moris. s. g. t. 19. f. 6. Hab. in Italia. $\overline{\text{T}}$

3. *capense*, foliolis ovatis integris mucronatis. Thuub. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei.

4? *trilobum*, foliolis trilobis incis. L. Pluck. phyt. 223. s. 7. Hab. in Gargano monte, foliola basi cordata. $\overline{\text{T}}$

5. *aquilegifolium*, foliolis obtusis basi ovatis lobatis. Jacq. austr. 2. t. 147. Hab. in collibus saxosis Austriac. Fructus alis membranaceis brevibus quinis instructa, interjectis quatuor angustioribus. Jacq. Fruct. oblongo-ellipticus, costatus apicerygius: Siler aquilegifolium. Gaertn. de fr. t. 1. p. 92. t. 21. $\overline{\text{T}}$

6. *gallicum*, foliolis cuneiformibus trifidis, lacinii oblongis obtusiusculis, apice calloso-mucronatis. Willd. Pluck. phytog. t. 128. f. 6. Hab. in Europa australi. $\overline{\text{T}}$

7. *angustissimum*, foliolis cuneiformibus tri-quinquefidisque, lacinii lanceolatis acuminatis. Willd. p. 1416. Hab. in Europa australi?

8. *triquetrum*, fol. ovato-oblongis aut alato-pinnatifidis, foliol. ovato-lanceolatis serratis, petiolis late membranaceis. Vent. Hort. Cæs. p. 397. t. 97. Hab. Constantinopoli. Surco gummi-resino: o scaret. $\overline{\text{T}}$

9. *formosum*, foliol. pinnatifidis, lacinii linearibus cuspidato-mucronatis. Willd. l. c. Pluck. phytog. t. 199. f. 1. Hab. in Europa australi. $\overline{\text{T}}$

10. *angustifolium*, foliolis lanceolatis obtusis mucronatis integerrimis sessilibus. Moris. s. g. t. 19. f. 9. Pluck. alm. 207. t. 198. f. 4. Hab. in Europa australi. $\overline{\text{T}}$

11. *aureum*, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis sessilibus, terminalibus bi-trifidis. Willd. Tournef. cor. 23. Hab. in Oriente.

12. *prutenicum*, hispidum, foliolis lanceolatis integerrimis: extimis coalitis. Jacq. austr. t. 153. Rivin. pent. t. 21. Hab. in Borussia, Germania, Austria. Involucr. reflexa. $\overline{\text{T}}$

13. *dauricum*, foliolis pinnatifidis, lacinii linearibus, involuero universali polyphyllo pinnatifido, caule maculato: Willd. Jacq. hort. 3. t. 38. Ligusticum ferulaceum. Allion. ped. n^o. 1319. t. 60. f. 1. Hab. in Sibiria et in alpiibus Italiae. $\overline{\text{T}}$

14. *silaifolium*, foliolis pinnatifidis, lacinii lanceolatis, involuero universali subnullo, caule glabro. Willd. Jacq. austr. app. t. 44. Hab. in Carnioliae et Austriac saxosis asperis. $\overline{\text{T}}$

15. *Aciphylla*, caule vaginato, petiolis foliorum dilatatis, fol. digitatis linearibus elongatis mucronatis. Linn. suppl. 181. *Aciphylla squarrosa*. Forst. char. gen. p. 135. t. 88. Hab. in Nova Zeelandia.

16. *peucedanoides*, foliis linearilanceolatis venoso-ariatis distinctis. Jacq. ic. 2. t. 350. Jacq. Collect. 1. p. 220. Seg. veron. 3. p. 227. t. 17. Pluck. alm. t. 16. f. 1. β . Foliis linearibus angustissimis. W. Hab. in Baldi Carnioliae et Croatiae alpinis. Rad. crassa. $\overline{\text{T}}$

17. *Siler*, foliis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. L. Jacq. austr. t. 145. *Siler montanum*. Moris. 4. g. t. 3. f. 1. β . *Siler angustifolium*. Bauh. pin. 167. Moris. 1. c. f. 2. Hab. in Austria, Helvetia, Gallia. $\overline{\text{T}}$

Obs. Sem. sulcata absque membranulis. L. Alae acm. angustissimae. Lam.

18. *Archangelica*, fol. decompositis, foliolis ovatis bi-trifoliolae dentatis subtus hirsutis. Willd. Jacq. ic. t. 1. 58. Coll. 1. p. 214. Doul. pempt. 3. g. t. 3. 8. Hab. in rupibus umbrosis Carnioliae, Croatiae. $\overline{\text{T}}$

19. *Chironium*, foliis oblique cordatis, petiolis hirsutis. Blackw. t. 134. Moris. 4. g. t. 17. f. 1. Hab. Monapeli. $\overline{\text{T}}$ \dagger

20. *Lucidum*, foliis supradecompositis linearisubulatis glabris, involucri universalibus pinnatis. Ait. Kew. 1. p. 345. Hab. in Helvetia. \odot

21. *ferulaceum*, fol. anpradecompositis, foliolis linearibus. L. Tournef. it. 2. p. 111. et t. 121. Hab. in Oriente. $\overline{\text{T}}$

22. *hirsutum* (Halleri), fol. anpradecompositis hirsutis, foliolis multifidis, involucri polyphylli fol. margine membranaceis apice ciliatis. Willd. L. fol. subhirsutis quadripinnatis circumscriptione triangularibus, foliolis parvis multipartitis. Lam. 3. p. 423. L. Halleri. Allion. pedem. n. 1315. Vill. delph. 2. p. 625. L. Panax. Gouan. illic. 13. Hall. helv. n. 795. t. 19. Hab. in alpinis. Distinctum a *Thapsia Asclepium*. $\overline{\text{T}}$

23. *scabrum*, fol. supradecompositis scabris, foliolis elongato-tridentatis, vaginis petiolorum dentatis laxis, involucri polyphylo. Willd. Cav. ic. 2. p. 72. t. 190. Hab. in Hispania. Simile precedenti. Styli decidui. \odot

24. *Thapsioides*, glabrum, fol. multifarium decompositis, foliolis rigidulis nitidis subulatis. Desf. Atl. 1. p. 252. Hab. in Atlantic. Cor. lutea. Sem. crassa. $\overline{\text{T}}$

25. *Meoides*, caul. glabro, petiol. bipidis, fol. multifarium decompositis, folior. confertis aciformibus. Desf. 1. c. p. 253. J. B. hist. 3. p. 37. Hab. in monte Lazar Algeriae. Fol. maxima denso cespite. Cor. lutea. Umb. laterales primordiali longiores. $\overline{\text{T}}$

26. *Daucoides*, glaberrimum, fol. imis bipinnatis: caulinis pinnatis, foliolis linearibus, sem. alis denticulatis. Desf. Atl. 1. c. t. 20. *Caucalis virgata*. Poir. it. 151. In Barbariae maris littoribus. Umb. fructifera excavata.

27. *Fontanesii*, glabrum, caul. subdichotomo, fol. inferioribus longe petiolatis: foliolis angustolinearibus, umbellulis distinctis. L. *peucedanoides*. Desf. p. 255. t. 71. Hab. in arvis prope Sibiam.

28. *gummiferum*, glabrum, fol. planis, foliolis angustis rigidulis, umbel. hemisphaericis distinctis, cor. candidis. Desf. 1. c. t. 77. L. *Thapsiiforme*. Botero Phytogr. Lusit. n. 19. t. 205. Hab. in Barbaria et Lusitania in cultis aridiss. Rami succum glutinosum et graveolentem fundant. D.

29. *polygamum*, fol. pinnatis, foliolis pinnatifidis brevibus, umbel. polygama, seminib. coronatis. Lam. enc. 3. p. 425. Oree, in Barbaria. Poir. Habit. Seleni, cal. Oenanthe, et semina Laserpitii. Styli longi persistentes. L.

30. *simplex*, seapo nudo apophyllo simplici, fol. pinnatis multifidis acutis linearibus, umb. semiglobosa. Lin. Jacq. Misc. 2. t. 2. *Ligusticum*. Vill. Delph. t. 14. Allioni. t. 71. Hab. in Alpibus. $\overline{\text{T}}$

694. HASSELIQUISTIA. Cor. radiatae, disci masculae s. abortivae. Petala incurvato-bifida. Sem. umbellae exteriora orbiculata crenata, interiora haemisphaerica urceolata.

1. *aegyptiaca*, fol. pinnatis 1 foliolis pinatifidis. Lin. suppl. p. 199. Willd. Sp. p. 1379. Jacq. hort. t. 87. Hab. in Arabia Aegyptio. Caul. teret. villosus. L. \odot

2. *cordata*, fol. inferiorib. ternatis foliol. ovatis crenatis, superiorib. cordatis simplicibus. Lin. Jacq. hort. 2. p. 91. t. 193. Hab. ... Caul. flexuosus. \odot

Obs. Genua sequenti nimis affine.

695. TORDYLIUM. Cor. radiatae, omnes hermaphroditae. Fructus suborbiculatus, margine callosus,

crenatus aut laevis planus. *Involucra* (longa) indivisa.

1. *syriacum*, involucris umbella longioribus. L. Willd. p. 1381. Hab. in Syria. ☉

2. *officinale*, involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis lacinatis. L. Hab. in Anglia, Narbone, Italia, Sicilia. Flor. carnei.

3. *peregrinum*, seminibus sulcatis rugosis plicatis, involucro universaliter monophylla subrisido. Caulis hispanica. Cam. hort. 37. t. 11. Hab. in Oriente. D.

4. *apulum*, umbellulis remotis, fol. pinnatis: pinnis subrotundis lacinatis. Jacq. hort. t. 53. T. *apulum* minimum. Column. cephr. t. p. 122. t. 124. Hab. in Italia, Apuliae incultis.

5. *maximum*, umbellis confertis radiatis, foliolis lanceolatis inciso-serratis. L. Jacq. austr. t. 142. Hab. in ruderalis, sepibus. ☉

6. *sifolium*, umbellis confertis radiatis, fol. pinnatis, foliol. oblongis serratis. Scop. Car. p. 194. t. 8. Willd. p. 1383. Hab. in Carnioliae alpinis. Petala rubra.

7. *humile*, fol. inferioribus pinnatis: foliol. lobatis incis, caul. inferne piloso, involuc. minimis sericeis, sem. margine crenatis. Desf. Atl. l. p. 235. t. 58. Hab. in Tunetia inter segetes prope Hamamelif.

8. *absinthifolium*, incanum, fol. decompositis: foliolis cuneiformibus trifidis, cor. subuniformibus, fructu villosa. Vent. Choix de Pl. p. 22. t. 22. sub Heracleo. Hab. in Oriente, Persia. Involucr. parva, aequalia.

696. **HERACLEUM.** *Fructus* ellipticus, emarginatus, compressus, striatus, marginatus. *Cor.* difformis, inflexo-emarginata. *Involucrum* caducum.

1. *Sphondylium*, fol. pinnatis, foliolis quinque pinnatifidis acutis dentatis, cor. subuniformibus. Willd. Sp. p. 1421. Blackw. t. 540. Sphondylium. Riv. t. 4. Hab. in pratis, ad vias. ☉

2. *flavescens*, fol. pinnatis, foliolis quinque oblongis pinnatifidis acuminatis dentatis, margine scabris, floribus radiatis. Willd. l. c. H. angustifolium. Jacq. austr. 2. p. 46. t. 173. Hab. in Austria. ☉

3. *angustifolium*, fol. cruciatio-pinnatis: foliolis linearibus, cor. flosculosis. β. *son-*

sifolium, folior. pinnis longissimis. Jacq. austr. 2. p. 46. t. 174. Hab. in Suecia, Anglia, Germania. Flor. uniformes. ☉

4. *elegans*, foliolis decussive pinnatifidis dentatis. Willd. p. 1422. Jacq. austr. 2. p. 175. Hab. in Austria. ☉

5. *sibiricum*, fol. pinnatis: foliolis quinque intermedii sessilibus, coroll. uniformibus. L. Gmel. sibir. 1. p. 128. t. 50. Hab. in Sibiria. Caul. profunde sulcatus, hispidus. Folior. vaginae basis barba alba densa. ☉

6. *Panaces*, fol. pinnatis: foliolis quinque intermedii sessilibus, flor. radiatis. Hab. in Apenninis, Sibiria. Fol. subtus tomentosa, et pedunc. laeves nec scabri.

7. *tuberosum*, fol. pinnatis, foliolis septenis, floribus radiatis. Molina Chil. ed. germ. p. 115. Hab. in Chili, in collibus arenosis. ☉

8. *austriacum*, fol. pinnatis utrinque rugosis scabris, flor. subradiatis. Jacq. austr. t. 61. Hab. in Austriae alpinis. ☉

9. *lanatum*, fol. ternis petiolo nervisque subtus lanato-villosis: foliolis amplis subrotundo-cordatis: subpalmato-lobatis, fruct. orbiculatis. Michaux. Flor. 1. p. 166. Hab. in Canada.

10. *alpinum*, fol. simplicibus cordatis obsolete lobatis serratis. Willd. Sphondylium fol. subrotundis glabris, obtusae semilobis. Hall. helv. n. 810. Barr. ic. 55. Hab. in Helvetiae alpinis. Scapus nudus. Fol. Ficus. L. ☉

β. *pyrenaicum*, fol. simplicibus cordato-palmatis, subtus tomentosis, fruct. orbicularibus. Lam. enc. 1. p. 403. Hab. in Pyrenaeis. +

11. *pumilum*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis glabris, caule prostrato. Vill. delph. 2. p. 640. t. 14. H. minimum. Lam. enc. 1. p. 403. Hab. in alpinis Delphinarum. ☉

697. **LIGUSTICUM.** *Fructus* oblongus, 5-sulcatus utrinque. *Corol.* aequalis. *Petala* involuta integra. *Cal.* 5-dentata.

1. *Levisticum*, fol. magnis multiplicibus: foliolis superne incis, L. Blackw. t. 275. Willd. p. 1424. Moris. 2. g. t. 3. f. 1. Angelica paludifolia. Lam. enc. 1. p. 173. Hab. in Apenninis Liguria. ☉

2. *scoticum*, fol. biternatis, foliolis subrhombeis inciso-serratis. Flor. dan. t. 207.

Michaux. 1. p. 166. Legtif. p. 159. Pluck. alm. t. 66. f. 2. Angelica scotica. Lam. l. c. Hab. ad littora maris in Anglia, Scotia, Suecia, Dania, Canada. Aromaticum. $\overline{\text{L}}$

3. *aquilegifolium*, fol. tritermatis, foliolis trifidis dentatis, stylis divaricatis persistentibus. Willd. p. 1425. *Danac aquilegifolia*. Allion. perh. m. n.º. 1392. t. 63. Hab. in saxosis apricis Taurinensium. $\overline{\text{L}}$

4. *peloponense*, fol. multilicato-pinnatis, foliolis pinnatim incis. Jacq. au t. 5. p. 33. app. t. 13. *Athamania Golaka*. Hacquet. carniol. p. 14. t. 5. Hab. in Peloponnesia, Caruoliensis, Rhæticis et Gebennicis montibus nemorosis. Fol. maxima. Caul. 3-4-pedalis. $\overline{\text{L}}$

5. *cicutafolium*, fol. decompositis, foliol. obtusis univervosis, ramis divaricatis. Vill. Delph. 2. p. 612. t. 15. L. apiculata. Lam. enc. 3. p. 577. Till. Pis. p. 98. t. 39. f. 2. Hab. in sylvaticis apricis Delphinatus. Facie Oreselin. Petala alba.

6. *austriacum*, fol. bipinnatis: foliolis confluentibus incis. integerrimis. Jacq. austr. t. 151. Allion. pedum. t. 43. l. Gmelini. Vill. delph. 2. p. 610. t. 13. Hab. in Italiae, Galliae, Austriae, Silesiae alpinis. $\overline{\text{L}}$

7. *cornubiense*, fol. radicalibus decompositis incis. caulinis ternatis lanceolatis integerrimis, acuminum sulcis obsolete. Smith. ic. pict. pl. rar. fasc. 2. p. 11. t. 11. Ej. Brit. 1. p. 310. Petiv. herb. brit. 26. f. 9. Hab. in Cornubia (Cornwal in Anglia) dumetis et ad sepes. Rad. resina flava scutet. S.

8. *pyrenaicum*, fol. supradecompositis, foliolis pinnatifidis, laciniis linearibus mucronatis, involucri universali subnullo deceluo, costis seminum membranaceis glabris. Willd. Gouan. illust. p. 14. t. 10. f. 2. Hab. in Pyrenæis; etiam in montibus Vogesiensibus lectum a D. Nestler. $\overline{\text{L}}$

9. *candicans*, fol. supradecompositis, foliolis cuneiformibus incis. glabris, involucri universali diphylo subfoliaceo, costis seminum membranaceis glabris. Ait. Kew. 1. p. 348. Hab. . . . $\overline{\text{L}}$

10. *peregrinum*, umb. primariae involucri subnullo, lateraliu basi membranaceo: radiis subramosis. Jacq. hort. 3. p. 15. t. 18. *Apium hortense magnum*, petroselinii sapore. Bauh. hist. 3. p. 99. Hab. in Lusitania. Conf. cum n.º. 6. Folia tripartita: laciniis cuneatis incis. glabris petroselinii, sed majoribus. Petioli lateribus membrana alba. L. Pet. flavescentia. $\overline{\text{O}}$

11. *balearicum*, fol. pinnatis: foliolis infimis auc. is foliolo. L. Hab. in Balearibus, Romæ. $\overline{\text{O}}$

12. *Gingidium*, fol. pinnatis, foliolis rhombico-cordatis obliquis crenatis obtusis. Forst. prod. 140. *Gingidium montanum*. Forst. char. gen. 41. t. 2. Hab. in montibus Novæ Zealandiæ.

13. *longifolium*, fol. biternatis, radicalibus decompositis, foliolis linearilanceolatis integerrimis. Willd. p. 1428. Moris. 2. g. t. 15. f. 1? Hab. in Siliia. $\overline{\text{L}}$

14. *actææfolium*, fol. duplicato-tripartitis, foliolis ovalibus aequaliter dentatis, involucriis setaceis, fruct. subalato-cos-tatis. Michaux. L. c. Cresc. ad ripas flum. St. Laurentii.

15? *barbinode*, caul. laevi: nodis barbatis, fol. biternatis (plerisque), fruct. ovalibus margine utroque subdipertis. Mich. p. 107. Hab. in Carol. superiore.

16. *pusillum*, annuum, fol. biternatis multipartitis, umbellulis 3-5-floris, fruct. subscabris. Michaux. Flor. 1. p. 186. Hab. in sabulosis aridis Carolinae.

17? *bulbosum*, psillum, radice globosa, caul. debili diphylo, fol. laterali tripartito, pinnulis divisis. Michaux. p. 168. Hab. ad ripas prope Knoxville. Martio solo uivoso floret. M. An distinctum genus?

698. **ANGELICA.** *Fructus* subrotundus, solidus, utrinque 3-alat. stylis reflexis. *Cor.* aequales: petalis incurvis.

1. *Archangelica*, foliorum impari lobato. Flor. dan. t. 206. Blackw. t. 46. Willd. Sp. 2. p. 1428. Hab. ad rivulos. $\overline{\text{O}}$

2. *sylvestris*, foliolis aequalibus ovato-lanceolatis serratis. Habit. in subhumidis sylvaticis, Caul. laevis rore cæscio. $\overline{\text{L}}$

3. *Razoulii*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis serratis decurrentibus. Gouan. illust. 13. t. 6. Eocc. mus. tab. 99. Hab. in Pyrenæis. $\overline{\text{L}}$

4. *verticillaris*, fol. divaricatisimis: foliolis ovatis serratis, caule pedunculis verticillato. Jacq. hort. t. 130. Hab. in Italia? Caul. humanæ altitudinis et ultra, rore glaucescente. $\overline{\text{L}}$

5. *atropurpurea*, extimo foliorum pari cosdato: foliolo terminali petiolato. L. Corn. canad. 198. t. 199. Lam. enc. 1. p. 172. Hab. in Canada. Caul. atropurpureus. Pe-

tala extus ferruginea, intus purpurascens. Flor. parvi viridi-rubundi. Lam. \mathcal{E}

6. *triquinata*, foliis incisio-dentatis: imperi rhombeo sessili, lateralibus decurrentibus. Michaux. 1. p. 168. Hab. in Canada. Petiol. 3-partitus.

7. *lucida*, foliis aequalibus ovatis inciso-serratis. Jacq. hort. 3. p. 16. t. 24. Corn. canad. t. 197. Moris. s. g. t. 3. f. 8. Hab. in Canada. \mathcal{E}

699. *SIUM*. Fructus subovatus, compressus, striatus. Involucrum polyphyllum. Petala cordata.

1. *filifolium*, fol. filiformibus, involucris elongatis. Thunb. prod. 50. Willd. p. 1431. Conium tenuifolium. Vahl. symb. 3. p. 49. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *latifolium (sulcatum)*, caul. elongato sulcato angulato, fol. pinnatis: foliolis lanceolatis aequaliter serratis, umbella terminali. L. Hort. cliff. 98. Flor. Jacq. austr. t. 68. Engl. bot. t. 201. Willd. 2. p. 1437. Hab. in rivulis paludosis. \mathcal{E}

Obs. Fol. radicalia primo vero sunt supradecomposita et bipinnata, caulina vero et quae aestate gignuntur simpliciter pinnata. Willd. Haec et sequens species plurimum confunduntur.

3. *angustifolium (incisum)*, caul. ramoso striato: fol. pinnatis: foliol. inciso-lobatis umbellis axillaribus pedunculatis, involucrio universali pinnatifido. Jacq. austr. t. 67. Engl. bot. t. 139. S. nodiflorum. Flor. dan. t. 247. Hab. in aquosis. Involucrum integrum.

Obs. Nomen triviale Lin. hujus et prioris speciei mutari debet, cum ab omnibus fere auctoribus haec duae plantae ob nomina haec incongrua commutentur.

4. *nodiflorum*, (delile), caul. procumbente, fol. pinnatis: fol. ovatis umbellis axillaribus sessilibus. Moris. hist. s. g. t. 5. f. 3. Hab. ad ripas fluviorum. Involucrum saepe deest, aut 1-phyllum.

5. *repens*, caule repente, foliolis subrotundis dentato-angulatis. Jacq. austr. 3. p. 34. t. 260. Hab. in pratis humidis et inundatis.

Obs. Sison inundatum huic simile sed in S. repente, folia sunt latiora obtusiora uniformia, et umb. quadriradiatae involucrio universali instructae. Willd. p. 1433.

6. *Sisarum*, fol. pinnatis: fol. floralibus ternatis. L. β ? *Ninsi*, fol. serratis pinnatis, ramis ternatis, caul. bulbifero. Lam. enc. 1. p. 405. Burm. ind. 1. 29. f. 1. Blackw. t. 514. Kaempf. amoen. 817. t. 818. Hab. in China. \mathcal{E}

7. *rigidius*, fol. pinnatis: foliolis lanceolatis subintegerrimis. Moris. s. 12. t. 7. f. 1. Hab. in Virginia. Caul. rigidulus, et foliola.

8. *lineare*, fol. pinnatis: foliol. sublanccolato-linearibus subseratis. Michaux. Flor. p. 167. In aquis Canadae. Priori affinis. Involucrum oligophyllum. Umb. radiis brevibus. M.

9. *japonicum*, fol. pinnatis, foliolis incis, umb. terminalibus. Thunb. jap. 128. Hab. in Japonia. Caul. flexuosus. Fol. infima maxima. Th.

10. *Falcaria*, foliolis linearibus decurrentibus connatis. Jacq. austr. t. 257. Falcaria. Riv. pent. t. 47. Moris. s. g. t. 8. f. 1. Hab. in agris, inter segetes.

Obs. A nonnullis auctoribus distinctum genus hac ex specie constituitur.

11. *grandiflorum*, fol. bipinnatis, foliolis subrotundis inciso-dentatis. Thunb. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei.

12. *paniculatum*, fol. bipinnatis, foliolis linearibus inciso-pinnatifidis. Hab. ad Cap. b. spei.

13. *patulum*, fol. bipinnatis, foliolis trifidis, ramis diffusis. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *graecum*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis serratis summis confluentibus. Willd. Ligusticum graecum, folio a li. Tournef. cor. 23. Hab. in Graecia. Flor. lutei.

15. *decumbens*, fol. bipinnatis, foliolis trifidis, caule decumbente. Thunb. jap. 128. In Japonia.

16. *siculum*, fol. radicalibus ternatis, caulibus bipinnatis. Jacq. hort. t. 131. Zan. hist. 78. t. 108. Hab. in Sicilia, et in collib. Algeriae. Petala lutea. \mathcal{E}

17. *asperum*, fol. tripinnatis, pedunc. pedicellisque scabris. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei, cum a sequentibus.

18. *hispidum*, fol. tripinnatis, petiolis pedunculisque scabris. Thunb.

19. *villosum*, fol. tripinnatis, lacinias ovatis inciso-serratis villosis. Thunb.

700. *SISON*. *Fructus* ovatus, striatus. *Involucra* sub-4-phylla.

1. *trifoliatum*, fol. omnibus trifoliatis: foliol. dentatis: inferiorib. ovalibus dentatis, pedunc. geminis, fructib. oblongis. Michaux. Fl. p. 168. In Canada superiore.

2. *marginatum*, fol. pinnatis, superioribus quinatis: foliol. sessilibus lanceolatis integerrimis, involucri nullis. Michaux. Hab. in udis Carolinae.

3. *Amomum*, fol. pinnatis, umbellis erectis. L. Jacq. hort. 3. t. 17. Blakw. t. 442. Willd. Sp. 2. p. 1436. Sium aromaticum. Lam. enc. 1. p. 405. Hab. in Galliae, Angliae lutosi et in Carnioli. Umb. universalis 4-fida, radio quarto centrali. L. ♂

4. *segetum*, caul. junceo, fol. pinnatis, umbellis cernuis. Jacq. hort. 1. 134. Engl. bot. t. 228. Smith. brit. 1. p. 316. Hab. in Angliae agris et in Helvetia, in solo luto calcareo subhumido. Sm. ♂

5. *Ammi*, fol. tripinnatis: radicalibus linearibus: caulinis setaceis: stipularibus longioribus. Hab. in Lusitania, Apulia, Aegypto. Fol. radicalia linearia, suprae-composita, plaua: foliolis replicato-imbricatis. L. ♂

6. *inundatum*, repens, umbellis bifidis. Flor. dan. 1. 80. Sium fol. radicalibus capillaribus multifidis, caulinis pinnatis, ultima plana trilobata. Hall. bot. n. 780. Hydrocotyle inundatum. Smith. brit. 1. p. 250. Moris. 6. g. 1. g. f. 5. β. Fol. omnibus capillaribus, caul. subrecto. Schumacher Zae-land. 1. p. 50. Hab. in inundatis. ♂

7. *verticillatum*, foliolis verticillatis capillaribus. L. Light. scot. 2. t. 45. Sium verticillatum. Smith. brit. 1. p. 314. Engl. bot. t. 365. Moris. Seet. 3. t. 7. f. 10. Hab. in Anglia, Gallia, in Pyrenaeis, in pratis humilibus salis.

8. *salsum*, fol. radicalibus compositis, foliolis subverticillato-fasciculatis lanceolatis, caule apophyllo, ramis umbelliferis dichotomis. Lin. suppl. 181. Pencedanum redivivum. Pall. Act. petrop. 1775. 2. p. 252. t. 8. f. 1 - 3. Sium nudicaule. Lam. enc. 1. p. 407. Hab. in Sibiria locis salis limosis aridissimis circa Wolgam. Fol. evanidis caul. nudus ex ramulis umbelliferis cum bracteis subulatis. ♂

9. *sylvaticum*, fol. radicalibus longe petiolatis decompositis, foliolis tripartitis: lacinis cuneatis incisis, caul. subaphyllo.

Brotero Phytogr. Lusit. n. 18. Hab. in Lusitaniae umbrosis.

10. *crinitum*, fol. omnibus tripinnatis capillaribus, involucri decomposito-setacris. Pall. 1. c. p. 250. t. 7. Hab. in Sibiria. ♂

701. *HUANACA*. *Cal.* denticulis minimis, persistens. *Petala* lanceolata, patentia. *Fruct.* ovatus, acutus, lincis tribus striatus. *Involuer.* universale 2-phyllum, tripartitum longum, partiale polyphyllum.

1. *acaulis*, petiol. elongatis 3-phyllis, fol. setaceis quadripartitis. Cav. ic. 6. p. 18. t. 528. f. 2. Hab. in Americae meridion. portu Desado. Pet. luteo-rubra. Umb. 2. laterales longius pedunculatae, masculae. C.

702. *BURON*. *Involucra* polyphylla. *Fructus* ovatus, striatus, villosus et glaber.

* Herbacea.

1. *macedonicum*, caul. ramosissimo pubescente, foliolis rhombico-ovatis, inciso-dentatis, dentibus acuminatis, umb. numerosissimis seminibus hirtis. Ait. Kew. 1. p. 351. Willd. Sp. 2. p. 1439. Blakw. t. 389. Hab. in Macedonia, Mauritania et Conchinchina. Umbel. numerosae albae. ♂

2. *rigidius*, glabrum, foliolis linearibus. L. Bocc. Mus. 2. p. 84. t. 76. Barr. ic. 77. Hab. in Sicilia. Flor. flavescentes. Ferulam relert.

** Fruticosa.

3. *tortuosum*, caul. fruticoso nodoso, ramis tortuosis divaricatis, involucri minimo, seminib. globosis striatis hirsutis. Desf. Ait. 1. p. 250. t. 73. Hab. in regno Tunetano prope Kerkran, ubi densa caespite creseit, odoremque aromaticum spirat. D. h

4. *Galbannum*, foliolis ovato-cuneiformibus acutis argute serratis, umbellis paucis, sem. glabris caule frutescente glauco. Ait. Kew. 1. p. 352. Pluck. alm. 31. t. 12. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Umbellae densae, magnae. h

5. *laevigatum*, foliolis lanceolatis obtusissimis et obsolete sinuque crenatis, seminibus glabris, caule frutescente. Ait. Kew. 1. p. 352. Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *gummiferum*, foliolis incisae acuminatis interioribus latioribus, seminibus glabris,

caule frutescente. Ait. Kew. 1. Comm. hort. 2. p. 115. t. 58. Hab. in Aethiopia. ♀

703. CUMINUM. *Fructus* ovatus, striatus. *Umbellulae* 4. *Involucra* 4-fida : foliolis simplicibus et trifidis.

1. *Cymium*. Lin. Cav. ic. 4. p. 36. t. 360. Moris. s. g. t. 2. Fol. laciniae lineares. Hab. in Aegypto, Aethiopia. ☉

704. OENANTHE. *Flosculi* difformes : in disco sessiles, steriles. *Fructus* striatus, retusus, suberoso-corticatus, coronatus calyce et pistillo. (Umbel. globosae.)

1. *stulosa*, solonifera, fol. caulinis pinnis filiformibus fistulosis, involuc. universali subnullo. Flor. dan. t. 846. Engl. bot. t. 361. Moris. s. g. t. 7. f. 8. Hab. in Europae fossis et paludibus. ♀

2. *crocata*, fol. omnibus multifidis obtusis subaequalibus. Jacq. hort. 3. p. 32. t. 55. Hab. in paludibus. Venenata, imprimis radia, succo croceo scatens. ♀

3. *prolifera*, umbellularum pedunculis marginalibus longioribus ramosis masculis. Jacq. hort. 3. p. 35. t. 62. Moris. s. g. t. 7. f. 5. Hab. in Sicilia, Apulia. ♀

4. *globulosa*, fol. biplinnatis, fructibus globosis. Gouan. illustr. 18. t. 9. Sem. crassa ovata, vix striata. Desf. p. 258. Hab. in Lusitania et in regn. Tuncetano. ♂

5. *virgata* (stylosa), radicib. tuberosis, foliol. radicalibus argute incis, ramis virgatis. Poir. ii. 2. p. 133. Enc. bot. 4. p. 529. Hab. in Barbisria. Priori affinis. Styli longissimi.

6. *nodiflora*, caul. prostrato, fol. bipinnatis planis, umbell. lateralibus, fructu sulcato scabro. Schousb. Maroc. p. 120. Hab. in Barbar. arenosis juxta fluvios. Involucr. univers. subnullum. ☉

7. *puceolanifolia*, fol. omnibus linearibus, radicalibus bipinnatis, caulinis pinnatis, involucro universali nullo, radicem napulis ovatis sessilibus. Poll. pal. n°. 172. Fig. 3. Oen. filipenduloides. Thuill. Hab. in pratis uliginosis. Radices nonnullis in regionib. Gallicis (Anjou) a pueris comeduntur.

8. *pimpinelloides*, foliolis radicalibus cuneatis fissis; caulinis integris linearibus

longissimis, simplicibus. Haec. carn. 10. t. 3. Hab. Montupellii et in Europa australi. ♀

9. *inebrians*, foliorum inferioribus pinnis ovatis, superiorum linearibus, petiolis angulatis. Thunb. prod. 49. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *tenuifolia*, fol. bipinnatis, pinnis linearibus, summis indivisis. Thunb. prod. 49. Hab. ad Cap. b. spei, cum tribus sequentibus.

11. *ferulacea*, fol. supradecompositis, pinnaulis subulatis sulcatis. Thunb.

12. *interrupta*, fol. interrupte bipinnatis, lacinis lucido-serratis. Thunb.

13. *exaltata*, caule striato, seminaibus turbinatis striatis. Thunb. prod. 50.

14. *filiformis*, fol. simplicibus filiformibus retusis, flor. pedunculatis. Lam. ill. t. 281. f. 2. Enc. bot. 4. p. 529. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. pedalis, tortuosus, subnudus.

15. *carolinensis*. Oc. *filiformis*, fol. omnibus simplicibus filiformibus fistulosis. Walt. Flor. Carol. p. 113. +

705. PHELLANDRIUM. *Flosculi* disci minores. *Fructus* ovatus, laevis; coronatus perianthio et pistillo.

1. *aquaticum*, caulis foliorumque ramificationibus divaricatis. Flor. dan. t. 1154. Hab. in fossis. ♂

706. CICUTA. *Fructus* subovatus, sulcatus. *Involucr.* 0 : parziale 3-5-phyllum.

1. *virosa*, umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis. Flor. dan. t. 208. Blackw. t. 574. Hab. in paludibus. Fol. pinnata : foliola lanceolata ternata, acuta serrata. Rad. tuberosa succo croceo. ♀

2. *bulbifera*, fol. foeniculae eis, ramis verticillatis bulbiferis. Michaux. Flor. 1. p. 165. Hab. in Virginiae et Canadae aquis.

3. *maculata*, foliorum serraturis mucronatis, petiolis membranaceis apice bilobis. Pluck. alm. 31. t. 76. f. 1. Hab. in Virginiae aquis. ♀

707. ÆTHUSA. *Involucr.* universale 0. *Involucella* dimidiata,

3-phylla, pendula. *Fructus* striatus.

1. *Cynapium*, fol. pinnatis, foliol. pinnatifidis nitidis. Blackw. t. 517. Curt. Flor. Lond. ic. t. 18. Hab. inter glera, et arvis et in montosis. ☉

Obs. Planta nociva et fere venenata cum Apio petroselino aut Chaerophyllos. Scand. cerefolio. In commutari potest sed odore et sapore insipido, praeter notas generis, distinguitur.

708. MEUM. *Cal.* obsoletus. *Petala* inflexa integra. *Involucr.* universale 1-phyllum: partiale paucifolium sublaterale. *Fruct.* elliptico-oblongus utrinque tricostratus.

1. *heterophyllum*, fol. radicalibus pinnatis: foliolis ovatis incis, caulinis multipartito-setaceis, caul. ramosissimo. Moench. meth. p. 86. Aethusa Bunius. Lin. Willd. p. 1446. Jacq. hort. t. 198 Seseli Bunius. Vill. Delph. 2. p. 588. Moris. s. 9. t. 2. f. 16. Hab. in Pyrenaeis et in agris Delphinatus. Flor. parvi flavescentes. Fol. inferiora lucida. Caul. ad nados purpurascens.

2. *Mutellina*, caul. subnudo, fol. duplicato-pinnatis, pinnulis semipinnatis: lobulis lanceolatis. Hall. helv. n.º. 63. sub seseli. Gaertn. de fruct. t. p. 106. t. 23. Phellandrium Mutellina. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1444. Jacq. Flor. Austr. 1. t. 56. Hab. in Alpibus. ☿

3. *Athamanta*, fol. omnibus multipartito-setaceis, vaginis petiolorum dilatatis venaricosis, involucrio generali monophyllo. Ait. Kew. 1. p. 354. Aeth. Meum. Lin. Willd. p. 1447. N. athamanticum. Jacq. austr. t. 303. Smith. Flor. brit. 1. p. 303. Ligusticum Meum. Crantz. austr. 308. Roth. germ. II. p. 322. Hab. in alpihus et montosis in pratis.

4? *fatium*, fol. omnibus multipartito-setaceis, vaginis petiolorum angustis, involucrio generali polyphyllo. Ait. Kew. 1. p. 355. sub Aethusa. Hab. ... ☿

709. CORIANDRUM. *Cor.* radiata: *Pet.* inflexo-emarginata. *Involucr.* univer. 1-phyllum; Partialia dimidiata. *Fructus* sphaericus.

1. *sativum*, fructibus globosis. Lin.

Willd. Sp. p. 1448. Engl. bot. t. 67. Hab. in agris. *Cal.* stylique persistente.

2. *testiculatum*, fructibus dilymis, Pluck. alm. 120. t. 169. f. 2. Moris. s. 7. t. 2. f. 2. Hab. in Europae australis agris. *Cal.* et styli decidui. ☉

710. MYRRHIS. Umbella composita. *Involuc.* erecta. *Fruct.* oblongus profunde sulcatus: angulis submembranaceis.

1. *odorata*. Scandis odorata. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1449. Jacq. Flor. austr. append. t. 37. Odorata. Rivini. Penn. t. 57. Chaerophyllum. Lam. enc. 1. p. 68. Hab. in sylvis montosis. Sapor praesertim fructus, qui magnus, amarus. ☿

711. SCANDIX. Umbella simplex. Flor. radiati. *Involucr.* polyphylum, emarginatum aut pinnato-incisum. *Fruct.* rostro longissimo terminatus, subpilosus.

1. *chilensis*, foliolis integris ovato-lanceolatis. Molina Chil. Willd. Sp. 2. p. 1449. Hab. in regno Chilensi. +

2. *Pruten*, foliolis multifidis seminibus majoribus subglabris. Jacq. Flor. austr. t. 363. Flor. dan. t. 844. Hab. frequens in agris inter segetes. *Involucr.* foliol. emarginata et incisa.

3. *australis*, foliolis multifidis, seminibus rostro attenuato incanis pilosioribus, flor. radiatis. Lin. Anisomarathrum. Col. cephr. 1. t. 90. Hab. in Europa australi et Creta.

Obs. Priori similis, pro cuius varietate a nonnullis sumitur, sed omnibus partibus tenuior, nec involucrio ita emarginata.

4? *grandiflora*, umbell. subsexfidis, sem. rostro aciculari hispidulo, petalo exteriora maximo. Lam. enc. 1. p. 686. sub Chaerophyllo. S. sem. pedunculo villosio brevioribus. L. Tournet. cor. 23. Hab. in Oriente.

5. *pinnatifida*, involucrio pinnatifidis, fol. digitatis, laciniis multifidis. Vent. Hort. Cel. p. 14. t. 14. Hab. in Persia, inter Amadem et Therun.

712. OLIVERIA. Umbella simplex. *Involucr.* polyphyllum longius. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 2-partita. *Fruct.* ovato-tereti hirsutus.

1. *decumbens*. Vent. Hort. Cels. p. 21

t. 21. Cresc. circa Bagdad, ubi ab Olivier, entomologo celebri inventa est haec species. Fol. 3-5-fida. Olor fere Thymi. V. ☉

713. **ANTHRISCUS**. Umbella composita a. *Involucella* lanceolata erecta. *Fruct.* ovatus pilis scaber, rostro glabro.

1. *vulgaris*, seminib. ovatis hispidis, caul. laevi, umbel. sublateralibus, petiol. margine villosulo-ciliato. Scandix Anthriscus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1450. Jacq. austr. t. 154. Caulis scandicina. Roth. germ. 2. p. 312. Chaerophyllum. Lam. enc. 1. p. 606. Hab. in Eurap. praesertim australioris aggeribus, ad sepes inter segetes. Vere. ☉

2. *nodosa*, seminib. subcylindricis hispidis, caule hispido, geniculis tumidis. L. Mant. 356. sub scandice. Moris. 5. g. t. 10. f. 4. Hab. in Sicilia, Germania et circa Perisios.

3. *trichosperma*, seminib. hirsutissimis pilis semine duplo longioribus. Lin. Mant. 57. sub scandice. Hab. in Aegypto. Caul. plures, obliqui. Folia bipinnata, foliolis ovato-lanceolatis, inciso-serratis, margine scabris. Flor. confarctis, caruci.

714. **CHEROPHYLLUM**. *Involuc.* reflexum, concavum. *Petala* inflexo-cordata. *Fructus* oblongus, laevis, aut striatus, glaberrimus.

* *Cerofolium*, seminib. laevibus. *Involuc.* universale passim 1-2-phyllum.

1. *sylvestre*, caule striato, geniculis tumidiusculis, sem. laevibus. Jacq. austr. t. 149. Willd. Sp. 2. p. 1452. Hab. in Europae pomariis et cultis. Magna ramosissima odore tetra. Sem. dein fusca.

2. *verticillatum*, glaberrimum, foliis variis: radicalib. pinnatis: fol. majusculis cordatis subuliquis serratis, ceteris decompositis. Hab. in Europa. Hort. Paris. Praeter fol. radicalis priori simile, sed minus.

3. *sativum*, seminib. laevibus, umbell. lateralib. subsessilibus, involuc. universali foliiformi. Scandix cerofolium. Lin. Willd. p. 1450. Blackw. t. 236. Hab. sponte in agris Europae australis, frequens in hortis pro usu culinari colitur. Sem. nitida, dein nigrescentia.

4. *procumbens*, seminib. nitidis laevibus, fol. decompositis, caul. procumbente scandix procumbens. Lin. Moris. 5. g. t. 11. (f. n.) Hab. in Virginia. Umb. radiis ut plurimum tribus. Sem. tenuia, nigrescentia.

5. *glaberrimum*, fol. radicalibus 2-3-ternatis: foliol. ovatis obtusis; caul. lanceolatis, involuc. submonophyllo, sem. laevibus acutis. Desf. Atl. 1. p. 260. t. 74. sub scandice. Hab. in Atlante prope Flemsen. Umb. fol. oppositae, pedunculatae.

** *Seminib. striatis*. (Chaerophyllum.)

6. *bulbosum*, caule laevi, geniculis tumido, basi hirtio. Jacq. austr. t. 63. Plack. calim. 249. t. 206. f. 2. Hab. ad saepes. Radix turbinata 2, obovata. Caulis serpedalis.

7. *aristatum*, caule laevi geniculis tumido, seminibus hirtis biaristatis. Thunb. jap. 219. Hab. in Japonia. Caul. striatus glaber. Involucra subulata. Sem. oblonga, alba-villosa. Th.

8. *temulum*, caule maculato scabro: geniculis tumidis. Jacq. austr. t. 63. Curt. Flor. Lond. 3c. Moris. 5. g. t. 10. f. 7. Hab. ad arvos, vias et sepes. Umbellae virgines cernuae. Sem. striata. L. ☉

9. *capense*, caule laevi aequali, seminibus sulcatis, foliolis trifidis glabris. Thunb. procl. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *scabrum*, caule aequali, foliolis incisis acutis hirtis, pedunc. scabris. Thunb. jap. 219. Hab. prope Jedo in Japonia.

11. *palustre*, fol. tripinnatis latis, foliol. inciso-serratis, fruct. biaristatis divergentibus. β. *hirsutum*, fol. hirsutis. Lin. Willd. p. 1455. Lam. enc. 1. p. 683. Jacq. austr. t. 148. Moris. 5. g. t. 10. f. 6. Hab. in montosis, praesertim ad rivulos.

12. *aromaticum*, caule aequali, foliolis cordatis serratis integris, fructib. biaristatis. Jacq. austr. t. 150. Boec. mus. 2. p. 29. t. 19. β. Myrrhis orientalis angelicae folio tuberosa radice. Tournef. cor. 22. Hab. in Eusasia, Misnia, Austria, Silesia. Fol. Aegopodii Podagrariae. ¶

13. *canadense*, fol. ternatis, foliolis ovato-acutis subincisis. Sism. canadense. Lin. Willd. p. 1436. Myrrhis canadensis. Riv. pent. t. 51. Gaertn. de fr. 1. p. 109. Hab. in Amer. septentrionali. Sem. breviuscula, subobliqua.

14. *Claytoni*, foliol. oblongo-ovalibus subpinnatifido-lobatis, umbella paucifida divaricata, fruct. laevigatis. Myrrhis. Michaux. Flor. 3. p. 170. Hab. in montib. Alleghani.

15. *coloratum*, caule aequali, fol. supradecompositis, involucellis coloratis. L. Jacq. hort. t. 51. Moris. 5. g. t. 10. f. 6. Hab. in Illyria. Caul. hirsutus. Involucella ovata,

ovata, acuminata, luteo-colorata ut in *Bupleurio*. Cor. lutea.

16. *aureum*, caule aequali, foliolis incis, seminib. coloratis sulcatis muticis. Jacq. austr. t. 61. Rupp. jcn. 3. p. 282. t. 5. Hab. in Germania, Helvetia. Semina flava subis 4, obtusis, remotis. $\overline{\text{T}}$

17. *arborescens*, fruticosum. L. Syst. 6. Hab. in Virginia. Fol. Chaerophylli sylvestris, ampla, supradecomposita, pinnis patentissimis. L. h. \dagger

715. **IMPERATORIA.** *Fructus* subrotundus, compressus: medio gibbus, margine alato cinctus. *Petala* inflexo-emarginata.

1. *Ostruthium*. L. Blackw. t. 29. Hab. ad radices alpium Helvetiae, Austriae, Alverniae. Fol. teraeta, latiuscula, serrata. Involucr. uno alterove foliolo tenuissimo. $\overline{\text{T}}$

716. **SESEL.** *Umbellae* globosae. *Involucr.* foliolo uno alterove. *Fructus* ovatus, striatus.

1. *filifolium*, foliis filiformibus, caule flexuoso erecto. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *pimpinelloides*, caule declinato, umbellis nubilibus nutantibus. L. Meun. nutans. Moench. meth. p. 86. Hab. in Europa australiore. Fol. pinnata, pinnis multifidis, segmentis alternis. Caul. primo decumbens, sub florescentia ferme erectus foliolo uno alterove 1 petiolo membranaceo, spatulaeformi. Semina ovalia striis 3, elevatis. Lin. $\overline{\text{T}}$

3. *leucospermum*, caul. erecto flexuoso fol. setaceis, involucr. submonophyllo, involucl. foliolis basi connatis, radiis umbel. germinibusque tomentosis. Plant. hongar. p. 92. t. 98. Cresc. in montib. apricis calcaereis Eudae. Fruct. sulcatus, coronatus. Umbellulae primo nutantes. Rad. resinosa. L. c.

4. *montanum*, petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, fol. caulinis angustissimis. Blackw. t. 436. p. *multicaule*, fol. bipinnatis, foliolis linearibus simplicibus trifidisque, involuclis subulatis. Retz. obs. 3. p. 27. Jacq. hort. 2. p. 59. t. 129. Mrum nudicaule. Moench. method. p. 86. Hab. in Galliae, Italiae collibus. Caul. terra laevis. L. $\overline{\text{T}}$

5. *striatum*, petiolis rameis membranaceis emarginatis, caule striato, pinnulis anbulatis sulcatis. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *glaucum*, petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris 1 foliolis singularibus binatisque canaliculatis laevibus petiolo longioribus. Jacq. austr. t. 144. Moris. 3. p. 273. s. g. t. 2, 4. Hab. in Gallia, Austria, Carniolia. Caul. striatus. $\overline{\text{T}}$

7. *aristatum*, petiolis rameis membranaceis laxis integerrimis, fol. supradecompositis, foliolis lanceolatis aristatis, fructibus ovatis. Ait. Kew. 1. p. 359. Hab. in Pyrenaeis. $\overline{\text{T}}$

8. *annuum*, petiolis rameis membranaceis ventricosis emarginatis. Jacq. austr. t. 55. S. hiennae. Crantz. Villars Delph. 2. p. 585. Moris. 3. s. g. t. 8. Hab. in Pannonia, Gallia, Germania. Caul. subsulcatus. Rad. crassa, non annua. Flor. albicanti-subviolacei. $\overline{\text{T}}$

9. *Chaerophylloides*, petiolis rameis membranaceis ventricosis integris, caule dichotomo paniculato, fol. supradecompositis glabris. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *Ammoides*, caul. ramosissimo, fol. radicalibus foliolis imbricatis. L. Jacq. hort. t. 52. Hab. in Lusitania, Italia. \odot

11. *tortuosum*, caule rigido divaricato ramosissimo. Oenanthe striata rigida. L. Hort. cliff. Hab. in Europa australi. Var. foliolis cuneatis. $\overline{\text{T}}$

12. *Turbith*, involucreo universali monophyllo, seminib. striatis villosis stylatis. Amoen. acad. 4. p. 310. Hab. in Europa australi. $\overline{\text{T}}$

13. *Hippomarathrum*, involuclis connato-monophyllis. Jacq. austr. t. 141. Hab. in Avariae, Carnioliae, Germaniae saxoniae. $\overline{\text{T}}$

14. *pyrenaeum*, fol. duplicato-pinnatis; foliolis incis acutis, involuclis setaceis umbellula longioribus Gouan. illustr. p. 11. Hab. in Pyrenaeis.

15. *Saxifragum*, caule filiformi divaricato, fol. duplicato-ternatis linearibus, umbellis subsessilib. L. Sp. pl. 374. Pimpinella saxifraga tenuifolia. Bauh. pin. 160? Conf. Vill. Delph. 2. p. 537. Hab. ad Locum Genevenssem inque Germania. $\overline{\text{T}}$ \dagger

16. *elatum*, caule elongato geniculis callosis, fol. bipinnatis 1 foliolis terebibus, fructibus scabris. Gouan. illustr. 16. t. 8. Hab. in Austria, Gallia. Fruct. perianth. coronatus. Vill. Delph. p. 580.

* *carvisolium*, fol. bipinnatis, lacin. decussatis linearibus, rumis erectis, seminib.

lucibus. Vill. Delph. 2. p. 586. Hab. in Delphinatu. Involucr. 2-3-phyllum. Involucr. 5-7-phyllum.

717. **THAPSIA.** (Involucra o.) *Fructus* oblongus, membrana cinctus. *Petala* flava.

1. *villosa*, foliolis dentatis villosis basi coudunatis. Willd. p. 1464. Moris. t. 9. t. 18. f. 3. Hab. in Hispania, Lusitania, Galloprovincia, Ceto Monspelensi. $\bar{\tau}$

2. *foetida*, foliolis multifidis basi angustatis. Blackw. t. 459. Moris. 2. 9. t. 18. f. 7. Hab. in Hispania. $\bar{\tau}$

3. *polygama*, fol. decompositis, foliolis acutis, involuero apice pinnatifido. Desf. Atl. t. p. 201. t. 75. Hab. prope Bone ad littora. Flor. centrales evanidi.

4. *Asclepium*, fol. digitatis + foliolis bipinnatis setaceo-multifidis. Moris. 2. 9. t. 18. f. 9. Colum. ephr. t. p. 87. t. 85. Hab. in Apulia, Oriente. $\bar{\tau}$

5. *garganica*, fol. glabris pinnatis: foliolis pinnatifidis + lacinis lanceolatis. Gouan. illustr. 18. t. 10. Magnol. monsp. t. 286. Hab. in Barberia, Gargano Apuliac. $\bar{\tau}$

6. *trifoliata*, fol. ternatis ovatis. Hab. in Virginia.

718. **PASTINACA.** *Fructus* ellipticus, compresso-planus. *Petala* involuta, integra.

1. *lucida*, fol. simplicibus cordatis lobatis lucidis acute crenatis. Jacq. hort. t. 199. Gouan. illustr. 19. t. 11, 12. Hab. in Europa australi. $\bar{\tau}$

2. *sativa*, fol. simpliciter pinnatis. Lin. Willd. Sp. p. 1466. *Pratensis*, fol. pinnatis glabris + foliolis ovato-oblongis incisobatis, exterioribus trilobis. Flor. Dan. t. 1406. *P. sativa*. Mill. dict. Blackw. t. 379. Hab. in pratis.

3. *arvensis*, fol. pubescentibus pinnatis, fol. ovatis sublobatis + impari trilobo. Hab. in agris cultis inter segetes. *P. sativa* quorundam. *P. sylvestris*. Mill. ? Videtur distincta species, cum minor sit, fol. minus lobata; etiam loco natali differat.

4. *Opopanax*, fol. pinnatis + foliolis basi antica excisis. L. Gouan. illustr. p. 19. t. 13, 14. Hab. in Italia, Sicilia et Syriat. Petioli subbispidi. $\bar{\tau}$

4. *dissecta*, fol. caulibus supradecompo-

sitis: ramis subpinnatis; foliolis dissectis. Vent. Hort. Cels. p. 78. t. 78. Hab. in Oriente. Subpilosa. Involucr. universale. Flor. aurci.

719. **SMYRNIUM.** *Fructus* subcompressus, gibbosus, (-nigrescens) striatus. *Petala* acuminata, carinata.

1. *perfoliatum*, fol. caulinis simplicibus amplexicaulibus, caul. alato. L. Willd. p. 1467. Plant. rar. Hungar. t. 23. Moris. 2. 9. t. 4. f. 2. Fol. inferiora composita. Enc. bot. 3. p. 666. Hab. in Italia, Hispania, Ungaria et Creta. Flor. vere. Fol. caul. flava. $\bar{\sigma}$

2. *aegyptiacum*, foliis floralibus binis simplicibus cordatis integerrimis. Hab. in Aegypto.

3. *laterale*, fol. caulinis ternatis incisis serratis, umbellis lateralibus sessilibus. Thunb. prod. 51. Hab. a Cap. b. spei.

4. *Olusatrum*, fol. caulinis ternatis petiolatis serratis. Blackw. t. 408. Hab. in Scotia, Wallia, Gallia, Hispania, Belgio. Foliola rhomboidea. $\bar{\sigma}$

5. *apiifolium*, fol. caulinis cuneiformibus obtusis trifidis dentatis. S. creticum paludarii folio. Tournef. cor. 23. Hab. in Creta. Involucr. universale et partiale nullum. W. +

6. *cordatum*, fol. radicalibus suborbiculato-cordatis crenatis: caulinis petiolatis trifoliatis: supremis 3-partitis, umb. radiis brevibus. Michaux. Flor. t. p. 170. Hab. in sylvis montosis Carolinae.

7. *aurum*, fol. biernatis lobo medio 3-5-gono ovali-lanceolatis serrulatis, umbel. brevi radiata. Michaux. Hab. in Carolinae montibus. Flor. plerique abortiunt. Mich. Flosc. omnes fertiles. L.

8. *atropurpureum*, fol. omnibus ternatis + foliolis ovato-acutis serratis, flor. atropurpureis. Lam. enc. bot. 3. p. 667. Hab. in Amer. septentrionali.

9. *integerrimum*, fol. caulinis duplicato-ternatis integerrimis. L. Michaux. p. 171. Hab. in Virginia. Fol. fere Aquilegiae, tritermatis, glauco-viridia. Umb. radii pauci, setaceo-elongati.

10. *nodiflorum*, fol. ternatum divisis: foliolis ovatis serratis, ramulis verticillato-paniculatis laxis. Allioni. n. 1347. t. 72. Ligusticum. Villars. Willd. Sp. p. 1425. Angelica paniculata. Lam. enc. t. p. 172

Hab. in alpib. Delphin. et Helvetiae. Sem. subrotunda, gibba, nigricantia.

720. *ANETHUM*, *Fructus* subovatus, compressus, striatus, *Petalata* involuta, integra, (Hava.)

1. *graveolens*, annuum, fructibus compressis. L. ☉

2. *segetum*, subparvum, fol. caulinis tribus, fructibus ovalibus. Hab. in Lusitania et Gallia. ☉

3. *Foeniculum*, perenne, fruct. ovatis Riv. t. 60. Hab. in cultis oleracis. ☞

721. *CARUM*, *Fructus* ovato-oblongus, striatus, *Involucrum* sub-1-phyllum. *Petala* carinata, inflexo-emarginata.

1. *Carvi*, caule ramoso, vaginis foliorum ventricosus, involucri partiali nullo. Willd. Sp. 2. p. 1470. Flor. Dan. t. 1091. Jacq. austr. t. 393. Hab. in pratis. Fruct. aromaticus. ☉

2. *simplex*, caule simplicissimo, vaginis foliorum adpressis, involucri partiali polyphylo. Willd. l. c. Hab. in Sibiria. Umbellulae capitatae.

722. *PIMPINELLA*, *Fructus* ovato-oblongus. *Petala* inflexa. *Stigma* subglobosa. Umbellulae subglobosae, primo nutantes.

1. *Saxifraga*, caule striato glabro, fol. pinnatis glabris, radicalibus foliolis subrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. Willd. Sp. pl. 2. p. 1471. Engl. bot. t. 407. Flor. dan. t. 609. Hab. in pascuis siccis, ad vias in rupestribus. ☞

2. *nigra*, caule striato pubescente, fol. pinnatis pubescentibus, radicalibus foliolis subcordatis incisus obtusis dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. Willd. Hab. in Germaniae siccis. Radix vulnegrata caeruleo lactescit. ☞

3. *magna*, fol. uniformibus pinnatis, foliolis omnibus lobatis, impari trifido. Jacq. austr. t. 396. Engl. bot. t. 408. Flor. dan. t. 1155. Hab. in pratis, sylvaticis. Var. *Flor. rubris* 1. P. rubra quorundam.

* *media*, fol. pinnatis, foliolis radicalibus subcordatis subtrilobis serratis, caulinis inciso-angulatis. Hoffm. Flor. germ. t. p. 146. Jacq. austr. t. 397. P. orientalis. Gouan. ill. t. 15? Cum priore.

4. *lutea*, fol. pinnatis pubescentibus 1 so-

liolis cordatis dentatis antice excisis, pedunc. filiformibus paniculatis. Desf. Atl. 1. p. 265. Hab. in Atlantic. Fol. P. *magnae*, radicalia pubescentia. Odor. aromaticus.

5. *dissecta*, fol. omnibus pinnatis, pinnis multipartitis, segmentis subfalcatis acutis. Reiz. obs. 3. p. 30. t. 2. P. genevensis. Vill. Delph. 2. p. 604. Hab. in pratis, sylvaticis. ☉? C. hircina. Roth.

6. *Fragium*, fol. pinnatis erectis, foliolis cuneatis incisus, summis simplicibus, seminibus hirsutis. Vill. Delph. 2. p. 605. Tragium alterum Dioscoridis. Calum. Phytob. p. 75. t. 17. ed. Plancii. Hab. in Delph. ad pedem mont. St. Just. Foliol. prioris anni pubescentia rotundata, dein 3-5-fida.

7. *peregrina*, foliis radicalibus pinnatis crenatis: summis cuneiformibus incisus, umbellis nullilibus nutantibus. Jacq. hort. t. 231. Column. ecphr. 1. p. 108. t. 109. Hab. in Italiae pascuis sterilibus. ☞

8. *Anisum*, fol. radicalibus trifidis incisus. Involucr. 1-phyllum. Fruct. pubesc. Anisum vulgare. Gaertn. 1. p. 102. Hab. in Aegypto et hinc inde colitur. ☉

9. *villosa*, fol. radicalibus bipinnatis: foliolis crenatis basi cuneatis, petalis (crassis) seminibusque villosis. Schoub. p. 125. Hab. in arenosis regionis Tingitanæ. Rad. tuberosa albidæ. Invol. o. ☞

10. *Subonoides*, foliis radicalibus 2-3-pinnatis: caulinis mediis alterius compositis, petiolo latissimo duplo brevioribus, umbel. numerosissimis, sem. villosis. Brotero Phytograph. Lusitan. Fasc. 1. Hab. in Lusitaniae collibus calcariibus.

11. *dichotoma*, pedunc. oppositifoliis, fol. floriferis bitrifidis, petiolis alato-membraceis. L. Mant. 58. Hab. in Hispania. Petiolis aucti membrana alba.

12. *dioica*, pumila, umb. numerosissimis compositis simplicibusque, rad. fusiformi, fol. multifidis, linearibus. Jacq. austr. 1. t. 28. P. glauca. Thuill. Sescii pumilum. Lin. Sp. pl. 2. p. 373. Hab. in Austria, Gallia, Helvetia. ☞

13. *glauca*, fol. supradecompositis, caul. angulato ramosissimo. Lin. Gouan. ill. p. 16. Tragoselinum, caul. crasso subcato divaricato. Hall. helv. n°. 788. ? Hab. in Gallia, Italia, Helvetia, Hungaria.

Obs. Similis priori, sed differt statura 2-3-plove altiore, fol. 3-4-plo-pinnatis, umbel. omnibus compositis, ramis non paucis oppositis et floresc. seriore. Plant. rar. Hong. p. 73. t. 72.

14. *capensis*, fol. supradecompositis: lacinii acutis, caul. striato. Thunb. Prodr. p. 51. Hab. ad Cap. b. spec.

15. *leptophylla*, fol. multifido-sctaeis, caul. elongato sublichotomo, umbel. trifida. Habit. in Ins. St. Dominica. Caul. tenuis. Fol. tenuissima, petiol. non membranaceus.

723. **APIUM.** *Fructus* ovatus, striatus. *Involucr.* 1-phyllum. *Petala* aequalia.

1. *Petroselinum*, foliis caulinis linearibus, involucrellis minutis. Lin. Willd. p. 1475. β . *crispum*, fol. radicalibus amplioribus crispis, Mill. dict. n^o. 2. Hab. in Sardinia juxta scaturigines. σ

2. *graveolens*, caul. sulcato, fol. caulinis cuneiformib. Flor. dan. t. 790. L. W. ect. t. 180. β . *dulce*, fol. cretici, petiolis longissimis, foliolis quinquelobatis serratis. Mill. dict. n^o. 5. Hab. in humidis, salsis praesertim maritimis. σ

724. **EGOPODIUM.** *Petala* inaequalia. *Fructus* ovato-oblongus, costatus. *Involucr.* 0.

1. *Podagraria*, fol. caulinis summis ternatis ovatis. L. Flor. dan. t. 607. Hab. ad sepes et in pomariis. τ

TRIGYNIA.

725. **SEMFCARPUS.** *Cal.* inferus quinquefidus. *Cor.* 5-petala. *Nux* reniformis, receptaculo magno carnosio depresso inserta.

1. *Anacardium*, (longifolium), fol. longis lanceolatis utrinque acutis, racemis terminalibus subpaniculatis. Lam. enc. 1. p. 134. Lin. suppl. p. 182. Willd. Sp. p. 1476. Rumph. Amb. 1. t. 70. Roxb. Corom. 1. p. 13. t. 12. Habit. in montosis, sylvaticis Indiae. Arb. magna, praestat Anacard. officinarium.

2. *latifolium*, foliis altero is petiolatis ovatis subtus pubescentibus. Lam. l. c. Hab. in Ind. orientali. η

726. **RHUS.** *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Bacca* 1-perma.

* Foliis pinnatis.

1. *Coriaria*, fol. pinnatis, foliolis ellipticis obtuse dentatis, subtus villosis. Willd.

Sp. p. 1477. L. W. ect. t. 122. R. petiolos inter foliola ultima subulatus. Ehrh. Hab. in Europa australi, Syria, Palaestina. η

2. *typhinum*, fol. pinnatis, foliolis lanceolatis acuminatis argute serratis, subtus pilosiusculis. Willd. arb. 288. Hab. in Virginia. Spica crassa, purpurasc. η

3. *javanicum*, fol. pinnatis ovatis acuminatis serratis, subtus tomentosis. Hab. in China. Ex bacis contusis et aqua coctis, sinenses extrahunt oleum, quo pro vernice utuntur. Lour. η

4. *semialatum*, fol. pinnatis serratis, petiolis extimtis internodiis, membranaceis. Merr. in Comm. goett. 6. 1784. p. 27. t. 3. Hab. prope Macao. An diversum a Rh. javanico. η

5. *glabrum*, fol. pinnatis lanceolatis serratis utrinque nudis, floribus hermaphroditis. Ait. Kew. 1. p. 365. β ? viridiflorum. Forstn. Hab. in Americae septentrionalibus altioribus ad agros et sepes. η

6. *elegans*, foliis pinnatis lanceolatis serratis, utrinque nudis, flor. dioicis. Ait. Kew. 1. p. 366. R. glabrum panicola speciosa coccinea. Catesb. carol. app. 4. t. 4. Hab. in Carolina australi. η

7. *Vernix*, foliis pinnatis integerrimis annuis opacis alatis, petiolo in tegro aequali flor. dioicis. Toxicodendron fol. alatis, fructu rhomboide. Dill. elth. 39. t. 292. f. 377. Pluck. alm. 45. t. 145. f. 1. Hab. in America septentrionali, Japonia. η

8. *succedaneum*, fol. pinnatis integerrimis perennantibus lucidis: petiolo integro aequali. L. Hab. in Japonia, China. Affine Rh. Vernix. Fol. bujus majora. Fructus magnitudine Cerasi, nec albus. L. η

9. *Copallinum*, fol. pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulado. Pluck. alm. 318. t. 56. f. 1. Hab. in America septentrionali. η

10. *alatum*, fol. pinnatis, foliolis ovatis apice serratis, petiolis internodiis omnibus alatis. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. spec. η

11. *pauciflorum*, fol. pinnatis, foliolis alternis decurrentibus cuneiformibus apice serratis, panicula sessili pauciflora. Linn. suppl. 181. Hab. ad Cap. b. spec. η

12. *Metopium*, fol. pinnatis quinatis integerrimis subrotundis glabris. L. Metopium fol. subrotundis pinnatis-quinatis, racemis alaribus. Brown. jam. 177. t. 13. f. 1. Sloan. hist. 2. p. 50. t. 199. f. 3. Hab. in Amer. η

13. *stratum*, fol. impari pinnatis : foliolis integerrimis ovato-lanceolatis subtus tomentosis, racemis maximis, laccis striatis. Flor. Per. 3. 29. t. 252. Hab. in Chincho nemorib. Cort. succus tincturam atram præbet.

14. *lineatifolium*, foliolis ovatis dentatis linearis, racem. axillaribus, bæcc. striatis. Ortega Dec. pl. p. 83. Hab. in ins. Cuba. Bipedale. h

15. *pumilum*, pulescens, fol. pinnatis multijugis : foliolis ovalibus incidentatis, subtus tomentosis. Michaux. Flor. 1. p. 182. Hab. in Carol. superiore. Altitudine pedali. Fruct. holoscrieus.

16. *digitatum*, scandens, fol. pinnatis, foliolis oblongis integerrimis glaberrimis. Linn. suppl. 184. Fol. quinatis, caule scandente cirrhifero. Thunb. Hab. ad Cap. b. speci. h +

** *Foliis ternatis.*

17. *cirrhiflorum*, scandens, fol. ternatis, foliolis integerrimis glabris. Linn. suppl. 184. Hab. ad Cap. b. speci. h

18. *tridentatum*, scandens, fol. ternatis, foliolis incanis serratis, serraturis tribus ad quinque. Linn. suppl. 184. R. caule cirrhifero scandente. Thunb. prod. 52. Cum priore. h

19. *radicans*, fol. ternatis : foliolis petiolatis ovatis nullis integerrimis, caule radicante. L. Duham. arb. 2. t. 98. Hab. in Virginia, Canada. Dioicum. h

β? *Toxicodendron*, fol. ternatis : foliolis petiolatis angulatis pubescentib., ecul. radicante. Cornut. canad. 96. t. 97. Barr. ic. 228. Cum præcedente cresc., cujus vix varietas videtur. h

20. *aromaticum*, fol. ternatis, foliolis sessilibus ovato-rhombis inciso-serratis pilosiusculis. Ait. Kew. 1. p. 367. Conf. Michaux. Flor. 1. p. 184. Hab. in Carolina superiore et Kentucky. h

21. *suaveolens*, foliis ternatis, foliolis sessilibus ovato-rhombis, inciso-serratis glabris. Ait. Kew. 1. p. 368. Myrica trifoliata. Lin. ? Hab. in America boreali. h

22. *dentatum*, fol. ternatis, foliolis obovatis mucronato-dentatis glabris, caule scabro. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. speci. h

23. *sinuatum*, fol. ternatis, foliolis ovatis obtusis sinuatis subtus villosis. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. speci. h

24. *cuneifolium*, fol. ternatis, foliolis sessilibus cuneiformibus glaberrimis septemdentatis, dentibus mucronatis. Linn. suppl. 183. Hab. ad Cap. b. speci. h

25. *incisum*, fol. ternatis, foliol. sessilibus cuneiformibus inciso-pinnatifidis subtus tomentosis venosis, calycibus tomentosis. Linn. suppl. 183. Fol. Myricæ quercifoliae. h

26. *albidum*, fol. ternatis : foliolis sessilibus cuneiformibus crenatis utrinque cano-tomentosis, petiolis marginatis. Schouw. Maroc. ed. germ. p. 128. Hab. in collib. arenosis prope Mogadore. Vernac. *Tassa*. Cultum canitum et tomentum exuit. Bæc. dulcescentes rubrae. h

27. *tomentosum*, fol. ternatis : foliolis subpetiolatis rhombeis angulatis oratisque subtus tomentosis. L. Pluck. alm. 319. t. 219. f. 7. Comm. hort. 1. p. 279. t. 92. Fol. majuscula fere ut in Sal. Capræa.

28. *villosum*, fol. ternatis, foliolis obovatis integerrimis sessilibus utrinque pilosis. Ait. Kew. 2. p. 368. Linn. suppl. 183. R. folio subrotundo integro molli et incano. Pluck. alm. 319. t. 219. f. 8. Cano tomento a reliquis distinguitur.

29. *pubescens*, foliis ternatis, foliolis obovatis mucronatis glabris, ramis villosis. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. speci. h

30. *viminale*, fol. ternatis, foliol. longissimis linear-lanceolatis integerrimis glabris basi attenuatis, intermedio subpetiolato. Ait. Kew. 1. p. 366. Vahl. symb. 3. p. 50. Willd. p. 1484. R. *lanceum*. Linn. suppl. 184 ? Hab. ad Cap. b. speci. Panicula supradecomposita, fol. brevior. Semper-virens. h

31. *angustifolium*, fol. ternatis : foliolis petiolatis linear-lanceolatis integerrimis, (subseriatisque) subtus tomentosis. L. fol. subtus argenteis acutis et margine incis. Pluck. alm. 319. t. 219. f. 6. Hab. in Aethiopia Sempervirens. Fol. ovato-lanceolata. h

32. *rosmarinifolium*, fol. ternatis : foliolis sessilibus linearibus revolutis subtus ferrugineis. Vahl. symb. 3. p. 50. Burm. str. 251. t. 91. f. 1. Hab. ad Cap. b. speci. h

33. *Thesera*, spinosum, fol. ternatis, foliolis sessilibus lanceolatis integerrimis, petiolis dilatatis. Rh. pentaphyllum. Desf. Atl. 1. p. 267. t. 77. Rhamnus pentaphyllus. Lin. Bæcc. sic. t. 21. Hab. in Sicilia et Eubæa. Sempervir. Flor. dioici.

34. *Oxyacanthoides*, spinosum, foliis

ternatis glabris : foliol. angusto-cuneiformibus apice trilobis integrisque flor. dioicis. Dumont. Cours. Bot. Cultiv. 3. p. 568. Hab. in Africa. Spinae axillares demum foliosae.

35. *Crataegiforme*. Rh. *Oxyacantha*, caul. fruticoso inermi, fol. ternatis catis, foliol. ovato-cuneatis : medio longiore. Cav. in Annal. de scienc. nat. p. 36. †

36. *laevigatum*, fol. ternatis : foliolis sessilibus lanceolatis laevibus. Hab. ad Cap. b. spei. Panic. longa, tenuissima sempervir. h

37. *lucidum*, fol. ternatis, foliolis obovatis retusis glabris. Thunb. prod. p. 52. Cav. ic. p. 27. t. 132. Pluck. alm. 39. t. 218. f. g. Burma. afr. 259. t. 91. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei, inque Mexico. Sempervirens. h

38. *glaucum*, fol. ternatis : foliolis obovatis, nonnullis glauco-pulverulentis. Elegans species. Foliol. parvula, nitida emarginata : 2 inferiora minora. Semperv.

39. *undulata*, fol. ternatis : foliol. glabris obovatis undulatis, petiol. canaliculatis dilatatis. Ex Hort. Celsii. Foliol. majus passim subrhomboidale apice in nonnullis subincisis. Diversum a R. suaveolente. Semperv.

40. *aequale*, fol. ternatis : fol. omnib. magnitudine aequalibus subsensib. obovato-lanceolatis integris, caul. petiolisque puberulis. Hinc inde collitur. Fol. majuscula cum parvo mucrone.

41. *lanceum*, fol. ternatis : fol. lanceolatis glabris integerrimis, flor. paniculatis. Foliola 2 inferiora paullo minora, forma aequalia : angulo recto distantia; margine subrevoluta mucronata. Panic. fol. longior. An Rh. *lanceum*. Linn. suppl. p. 184. aut Thunb. profr. p. 52 ?

Obs. Tres posteriores species (forte quoque ex Cap. b. spei) accuratius examen adhuc merentur, an forte cum una alterave jam cognita eadem sint nec ne.

*** *Foliis simplicibus.*

42. *Cotinus*, fol. simplicibus obovatis. Jacq. austr. t. 210. R. racemis plumosis, fol. ovatis. Hall. helv. n°. 827. Hab. in Lombardia, Carniola, Helvetia, Sibiria, Austria. h

43. *atrum*, fol. simplicibus ovato-oblongis. floribus polygamis. Forst. prod. 142. Hab. in N. Caledonia. h

727. **VIBURNUM.** Cal. 5-partitus,

superus. Cor. 5-fida. Bacca aut Drupa 1-sperma.

* *Foliis integerrimis.*

1. *Tinus*, fol. integerrimis ovatis opacis; ramificationibus venarum subtus villosoglandulosis. L. Willd. Sp. 2. p. 1486. Curt. Magaz. t. 38. Hab. in Lusitania, Hispania, Italia et Barbaria. h

2. *lucidum*, fol. coriaceis ex ovato sublanco-latis nitentibus integerrimis. V. Tinus, var. β. Ait. Kew. p. 370. Hab. in Hispania. Caul. humilis. Cor. majuscula lactea exius rubescens. Caul. subquadrangularis.

3. *rugosum*, foliis lato-ovatis rugosis subtus hirtis, involucr. universim 7-phyllo. V. Tinus. Var. hirta. Ait. ? Hab. in ins. Canariis. Flor. sub finem hyemis. Caul. satis altus, ramis subangulatis pilosis. Flor. subodorati congesti. Huc V. Tinus. Var. latifolia et V. strictum Hortul.

4. *Tinoides*, fol. ellipticis glabris integerrimis, ramis cymisque teretibus hirsutis. Linn. suppl. 184. Hab. in America meridionali. h

5. *villosum*, fol. integerrimis ovatis, subtus incano-villosis. Swartz. fl. ind. occid. t. p. 564. Hab. in montibus Jamaicae. h

** *Fol. serratis aut crenatis.*

6? *scandens*, fruticosum scandens, fol. oblongis serratis, cymis terminalibus, ramis terminatis flore maximo. Linn. suppl. 184. V. virens. Thunb. jap. 123. Hab. in Japonia. Stamina 10. styli et fructus ignoti. Thunb. h †

7. *nudum*, fol. ovalib. subrugosis margine revolutis obsolete crenulatis. Ait. Kew. t. p. 370. V. fol. integerrimis lanceolato-ovatis. Lin. Sp. pl. 383. Mill. ic. 183. t. 274. Hab. in Virginia. Cymae in hac nudae, s. non involucae. h

8. *prunifolium*, fol. ovatis ovalibusque glabris argute serratis, petiolis marginatis. Ait. Kew. t. p. Pluck. alm. 249. t. 46. f. 2. Hab. in Virginia, Canada. Fol. tenuia, laete viridia. h

9. *davuricum*, fol. ovatis serratis punctato-pilosis, cymis dichotomis paucifloris. Pall. ross. 2. p. 30. Lonicera mongolica. Pall. ross. 1. p. 59. t. 38. Gmel. sib. 3. t. 25. Hab. in Davuria. h

10. *dentatum*, fol. ovatis dentato-serratis plicatis, fruct. subglobois, Lucidum, fol.

utrinque glabris suborbiculatis. Ait. Kew. 1. p. 372. Pubescent. fol. ovalibus acuminatis subtus villosis. Alt. l. e. Michaux. Flor. 1. p. 179.

17. *plicatum*, fol. ovatis obtusis denticulatis serratis plicatis. Thunb. in Act. soc. Linn. 2. p. 332. V. dentatum. Thunb. jap. 122. Hab. in Japonia. h

18. *erosum*, fol. ovatis acuminatis erososerratis glabris. petiolis tomentosis. Thunb. jap. 124. Hab. in Japonia. h

13. *Lantana*, fol. cordatis serratis venosis subtus tomentosis. In Europae sylvis β . *canadensis*, fol. latioribus minus tomentosis crenatis. β . grandifolium. Ait.

14. *Lantanoides* (subdecumbens), petiolis nervisque pulverulento-tomentosis, fol. suborbiculato-cordatis abrupte acuminatis denticatis, cymis sessilibus. fruct. ovatis. Michaux. Flor. 1. p. 179. Hab. in sylvis ad rupes in Canada. Priori affinis, sed humilior caul. subprocumbentibus. M. h

15. *tomentosum*, fol. ovatis acuminatis serratis venosis subtus tomentosis, umbellis lateralibus. Thunb. jap. 123. Hab. in Japoniae sylvis variis inter Miaco et Jedo. h

16. *hirtum*, fol. ovatis serratis villosis, petiolis hirtis. Thunb. Hab. in Japonia. h

17. *acerifolium*, fol. cordato-ovatis aut trilobis acuminatis argute serratis, petiolis glandulosis pilosis. Willd. Veni. Hort. Cels. p. 72. t. 72. Hab. in Virginia. Facie fere grossulariae. Petioli basi stipulis linearibus. h

18. *orientale*, fol. trilobis acuminatis grosse obtusiuscule denticatis, petiolis glandulosis glabris. Willd. p. 1450. Pall. ross. 2. t. 58. fig. H. Hab. in Imeretiae subalpinis. Affine praecedenti. h

19. *Opulus*, fol. trilobis acuminato-denticatis, petiolis glandulosis glabris. Willd. p. 1450. Flor. dan. t. 661. β . *roseum*, cyma globosa, flor. pleno. Hab. in sylvis. h

20. *dilatatum*, fol. obovatis acuminatis inaequaliter denticatis villosis. Thunb. jap. 124. Hab. in Japonia. Canlis cinereis, et pedunculis tomentosis. Stylus simplex. Thunb. \dagger h

21. *macrophyllum*, fol. obovatis acuminatis denticatis glabris. Thunb. jap. 125. Hab. in Japonia. h

22. *cuspidatum*, fol. ovatis cuspidatis serratis villosis. Thunb. Cum priore. Umb. supradecomposita terminalis, flor. raiantibus. Thunb. h

23. *Lentago*, fol. lato-ovatis acuminatis argute serratis, petiolis marginatis erisis. Ait. Hab. in Canada. Kalm. Cym. sessilis. h

24. *cassinoides*, fol. ovatis lanceolatisque crenatis glabris, petiolis carinatis glandulatis. Lin. V. fol. parvulis cuneato-obovalibus crenato-denticatis coriaceis, cymis arcte sessilibus. Michaux. Flor. 1. p. 179. Hab. in umbratis sylvarum, juxta rivos Carolinae infer. et Georgiae. h

25. *nitidum*, fol. linear-lanceolatis supra nitidis absciete serratis integrisve. Ait. Hab. in America boreali. h

26. *laevigatum*, fol. lanceolatis laevibus remote serratis basi integerrimis. Ait. Cassine Peragua. Lin. Habit. in Carolina, Virginia.

728. CASSINE. Cal. 5-partitus. Petala 5. Bacca 3-sperma.

1. *capensis*, ramulis 4-gonis, fol. petiolatis ovatis retusis crenatis, panicula folio brevior. Thunb. prod. 52. Willd. Sp. 2. p. 1452. Burm. afr. 23p. t. 85. Dill. clth. 315. t. 236. f. 305. Hab. ad Cap. b. spec. h

2. *Colpoon*, fol. petiolatis ovatis crenatis, panicula longitudine folii. Thunb. prod. 52. Evonymus Colpoon, Sor. quadri-fidis, fol. ovalibus saepius integerrimis. L. Mant. p. 210. Hab. ad Cap. b. spec. An a priore satis diversa? h

3. *barbara*, fol. sessilibus serrato-denticatis cordato-oblongis, ramulis quadrangulis. Lin. Hab. ad Cap. b. spec. h \dagger

4. *Maurocenia*, fol. sessilibus integerrimis obovatis coriaceis integerrimis convexis, flor. axillaribus confertis. Lam. enc. 1. p. 653. Maurocenia Frangularia. Mill. dict. n^o. 1. Dill. clth. t. 121. f. 147. Pluck. alm. t. 158. f. 2. In Aethiopia. h

5. *concaea*, fol. alternis subpetiolatis subrotundis integerrimis superne concavis, pedunc. simplicibus axillaribus. Lam. enc. 1. p. 652. Pluck. alm. t. 280. f. 4. C. humilis quorund. Hab. in Africa. Caul. subterruosus. An eadem ac Celestus lucidus?

6. *laevigata*, fol. aeternis subpetiolatis oblongo-ovatis obtusis integerrimis planiusculis, pedunculis axillaribus racemosis. Lam. enc. 1. p. 652. Hab. in Cap. b. sp. Truncus cortice nigro. Bacca, uti in antecedentibus; trigona. Celestus affinis. h

7. *oleifolia*, foliis alternis petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis marginatis,

corymb. minimis axillarib. Lam. l. c. Cum priore. Ram. juniores angulati, glabri.

8. *xylocarpa*, fol. petiolatis ovatis subsessilib. pedunc. dichotomis fol. breviorib. fruct. ovatis. Venz. Choix d. Pl. p. 27. t. 23. Hab. in Antillis, ins. St. Thomæ. h

729. *SAMBUCUS*. Cal. 5-partitus. Cor. 5-fida. Bacca. 3-sperma.

1. *Rubus*, cymis tripartitis, stipulis foliaceis ovatis, caule herbaceo. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1494. Flor. dan. t. 1155. Hab. in Europa magis australi, et in Barbaria locis depressis. h

2. *nigra*, cymis 5-partitis, stipul. 2. utrinque setaceis, foliis pinnatis, foliolis ovatis serratis, caule arboreo. Flor. dan. t. 545. Engl. bot. t. 476. *β. laciniata*, fol. bipinnatis, pinnis ternatis, foliol. lanceolatis incis. Retz. obs. 3. p. 30. Hab. in Europa et Japonia. Var. fructu nigro et albo. h

3. *canadensis*, stipul. nullis, cymis quinquepartitis, foliis subbipinnatis foliol. oblongo-ovalib. nitidis glabris, caule frutescente. Michx. Flor. 1. p. 181. Hab. in Canada. Flores in S. nigra, sed Baccae parvae atro-rubrae dulces. Willd. h

4. *pubescens*, cyma subracemosa, cortice verruculoso, fol. terminalib. quinatis: foliol. ovali-lanceolatis subtus pubescentibus. Michx. l. c. Hab. in altis montib. Pennsylvan. Canadæ et Carolinæ. Affinis sequenti; fruct. etiam rubri, sed fol. nunquam ternata. M.

5. *racemosa*, racemis compositis ovatis, caule arboreo. Jacq. Icon. rar. 1. t. 59. Hab. in montibus sylvaticis. Baccae rubrae. h

6. *japonica*, fruticosa, cymis tripartitis, stipulis nullis. Thunb. jap. 125. Hab. in Japonia. Cyma supradecomposita trichotoma nuda absque bracteis. Germen superum. Stigma capitatum. Tb. h

Obs. Uterius examinanda est hæc species, quæ ob germen superum saltem non hujus generis est.

730. *SPATHIELIA*. Cal. 5-phyllus. Pet. 5. Caps. 3-gona, 3-loculari. Sem. solitaria.

1. *simplex*. Lin. Lam. ill. t. 209. Spathe caudice simplici, fronde pinnata comosa, racemo simplicissimo luxu terminali, Brown,

jam. 187. Sloan. hist. 2. p. 28. t. 171. Hab. in Jamaica. h

731. *STAPHYLEA*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. inflata, connatae. Nuxes 2, globosæ cum catrice.

1. *occidentalis*, fol. duplicato-pinnatis, capsulis trigonis, seminibus solitariis, caule arboreo. Swartz. prod. 55. Fl. ind. occid. 1. p. 566. Hab. in Jamaicæ campetribus montium. h

2. *pinnata*, fol. pinnatis. Hab. in Europæ australioris succulentis. Styli duo. Styli 2, sæpius 3. h

3. *heterophylla*, fol. ternatis quinatis, pinnatisque serratis. Flor. Per. 3. p. 29. t. 253. In Andium nemorib. Caps. unica non inflata, subtriloba. Hab. Sambuci.

4. *trifolia*, fol. ternatis. Hab. in Virginia. h

732. *TAMARIX*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 1-locularis, 3-valvis. Sem. coma instructa.

1. *gallica*, flor. pentandris, apicis lateralibus, fol. lanceolatis amplexicaulibus imbricatis. Willd. Sp. p. 1498. *β. canescens*, fol. cauleque tomentoso-canis. Pall. ross. 2. p. 72. t. 79. Hab. in Gallia, Hisp. Italia, Russia. *β.* in desertis salis maris Caspii. h

2. *africana*, fol. imbricatis minimis, flor. pentandris, apice veteti densissima, peduncul. squamosis, stylo trifido. Desf. Atl. 1. p. 269. Hab. in Algeria ad maris littora. Affinis priori. Spica crassior. Flor. 2-4-plo majores. h

3. *articulata*, flor. pentandris, apicis lateralibus, fol. brevissimis vaginatis. Willd. Vahl. symb. 2. p. 48. t. 32. Thuja aphylla. L. Hab. in India orientali, Arabia. h

4. *songarica*, flor. octandris decandrisque, fol. filiformibus carnos. Pallas in Act. Petrop. 10. p. 374. t. 10. f. 4. Hab. in Sibiria locis salis Songariae. h

5. *germanica*, flor. decandris, apicis terminalibus, fol. sessilibus lineari-lanceolatis. Willd. p. 1499. Mill. ic. t. 262. f. 2. Hab. in inundatis, ad Eum. ripas. h

β? *caspica*, caule herbaceo annuo, flore minore. Pall. ross. 2. t. 80. f. B. C. Ad mare Caspium. Var. videtur differre ob caulem herbaceum. Willd.

733. REICHELIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanulata 5-fida. *Caps.* 3-locularis circumscissa polysperma. *Sem.* receptaculo maximo adherentia.

1. *palustris*. Aubl. guj. 1. p. 285. t. 111. Hab. in Gujanæ ad rivulorum ripas. Caul. plures tripedales. Fol. alterna integerrima. Flor. cærulei, axillares. ¶

734. SALMASIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Syl.* o. *Capsula* 3-locularis, 3-valvis polysperma.

1. *racemosa*. Willd. p. 150a. Tachibota sojanensis. Aubl. guj. 1. p. 287. t. 112. Lam. ill. t. 208. Hab. in sylvis Gujanæ. Frutex ramis hirsutis rufescentibus. Fol. alterna oblonga acuminata integerrima glabra. Flor. albi. W. h

735. MALESHERBIA. *Cal.* inferus persistens. *Petala* lauci cal. infra incisuras insidentia. *Nect.* *Coronula* 10 squamis, membranaceis 2-4-crenatis, petalis alternis. Anth. incumbentes basi excavatæ. *Syl.* infra apicem geminis orbiculatim affixi. *Stigm.* capitata. *Caps.* apice trivalvis. *Sem.* plura affixa receptac. 3, linearibus, per caps. parietem decurrentibus.

r. *thyrsiflora*, fol. lineari-lanceolatis sinuatis dentatis, cal. tubuloso-ventricoso. Flor. Per. 3. p. 30. t. 154. Gynoplena tubulosa. Cav. ic. 4. p. 52. t. 315. Hab. in Peruv. argillosis aridis, calidis. Foetida, hirsutissima. Cal. et petala lutea utrinque villosa, marcescunt. h

a. *linearifolia*, fol. sublinearibus sessilibus ciliatis villosis, cal. infundibuliformi. Cav. l. c. t. 376. Hab. in montib. Chilensisibus. Cal. tomentosus. Petal. luteo-alba.

736. TURNERA. *Cal.* 5-fidus, infundibulif. exterior diphyllus. *Petala* 5, calyci inserta. *Stigmata* multifida. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis.

1. *ulmifolia*, flor. sessilibus petiolaribus, foliis basi biglandulosis. L. Hort. cluss. t. 10. Willd. Sp. 2. p. 1503. Sloan. jam. hist. t. 127. f. 4. 5. *angustifolia*, flor. sessilibus petiolaribus, fol. lanceolatis

rugosis acuminatis. Curt. mag. t. 281. Hab. in Jamaica, et in America calidiore. ¶

2. *Pumilea*, flor. sessilibus petiolaribus, fol. eglandulosis. Lin. Per. gaz. 59. t. 38. f. 9. Sloan. l. c. t. 127. f. 6. Hab. in Jamaica campis sabulosis aridis. ☉

3. *rupestris*, pedunculis axillaribus bisetis, fol. linearibus serratis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 289. t. 113. f. 1. Hab. in rupibus locis humidis Gujanæ. h

4. *sidoides*, pedunc. axillaribus bisetis, fol. obovato-cuneatis serratis. Hab. in Brasilia. Caul. palmatis.

5. *frutescens*, pedunc. axillaribus bisetis, fol. lanceolatis acuminatis æqualiter serratis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 290. t. 113. f. 2. Hab. in fissuris rupium Gujanæ. h

6. *rugosa*, pedunc. axillaribus aphyllis, flor. pentagynis, fol. oblongis eroso-dentatis rugosis. Willd. Piriqueta villosa. Aubl. guj. 1. p. 298. t. 117. Burcardia. Schreb. Hab. in Gujanæ et Cajennæ maritimis arenosis. ☉

7. *cistoides*, pedunc. axillaribus aphyllis, fol. apice serratis. Lin. Plum. spec. 7. icon. 150. f. 1. Sloan. hist. 1. 1. 127. 7. Hab. in America meridionali. Caulis digitalis. Bractee nullae. ☉

8. *racemosa*, racemis terminalis elongatis, foliis ovatis dentatis. Jacq. hort. vindob. 3. t. 94. Hab. Pedunc. longissimi uniflori. ☉

9. *gujanensis*, racemo terminalib. paucifloro nullo, fol. linearibus serratis basi biglandulosis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 291. t. 114. Hab. in Gujanæ pratis paludosis. ☉

737. TELEPHIUM. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, receptaculo inserta. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis.

1. *Imperati*, fol. alternis. Lam. ill. t. 213. Desf. Atl. 1. p. 270. Tournef. inst. 128. Hab. in Galloprovincia, Helvetia, et Barbaria ad maris littora. ¶

2. *oppositifolium*, fol. oppositis. Shaw. afr. 572. f. 572. Hab. in Barbaria. †

738. CORRIGIOLA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Sem.* 1, triquetrum.

1. *Telephifolia*, caul. diffuso procumbente, fol. oblongo-ovatis, ramis aphyllis, seminib. polygonis. Pourret Chlor. Narbon. p. 20. (Vid. Act. Tulosa, v. 2.) Hab. ad rupes prope Boulou. ¶

2. *littoralis*, decumbens, fol. linearibus, flor. pedunculatis, calycibus marginem membranacea. Willd. Sp. 2. p. 1506. Lam. ill. t. 213. Flor. dan. t. 334. Moris. s. 5. t. 20. f. 1. Hab. in Galliae, Germaniae, Helvetiae et Barbariae arenosis. Humifusa, ramis centrifugis. ☉

3. *capensis*, flor. sessilib., calycib. viridibus. Willd. p. 1507. C. littoralis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. ☉ †

739. PHARNACEUM. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 3-locularis, polysperma.

1. *Cerviana*, peduncul. subumbellatis lateralibus, folia linearia aequantibus. L. Willd. p. 1587. Lam. ill. t. 214. f. 1. Gmel. sib. 3. t. 20. f. 2. Cerviana. Minuart. monogr. 1. Trichlis. Hall. Alsine. Pluck. mant. g. t. 332. f. 11. Hab. Rostockii, in Russia, Hispania, Guinea, Asia. ☉

2. *sperguloideus*, fol. fasciculatis verticillatis linearibus acuminatis, umbel. terminalibus paucifloris. Enc. bot. 5. p. 260. Lam. ill. t. 214. f. 2. Hab. in India.

3. *lineare*, umbellis inaequalibus, fol. linearibus, oppositionibus remotis. Linn. suppl. 185. Hab. ad Cap. b. spei.

4. *teretifolium*, fol. filiformibus mucronatis, umbellis lateralibus, caule erecto frutescente. Thunb. prod. 53. Hab. ad Cap. b. spei. h

5. *microphyllum*, tomentum, pedunc. umbellatis, fol. ovatis teretiusculis obtusis lana intertextis. Linn. suppl. 185. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *marginatum*, fol. ovatis marginatis obtusis, flor. axillaribus sessilibus. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *Mollugo*, pedunc. unifloris lateralibus, flor. longitudine foliorum, caule depresso. Burm. ind. 31. t. 5. f. 4. Burm. zeyl. 13. t. 7. Hab. in India orientali. ☉

Obs. Simillima Illecebro ficoideo. Fructificatio simillima Mollugini verticillatae. Petala vero simillima Glino lotolii. L.

8. *glomeratum*, flor. glomeratis, caul. flexuoso, fol. linearibus. Linn. suppl. 185. Pluck. mant. 163. t. 331. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

9. *serpyllifolium*, pedunc. unifloris,

fol. ovatis. Linn. suppl. 186. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

10. *quadrangulare*, subfruticosum, fol. linearibus quadrifariam imbricatis. Linn. suppl. 185. Hab. ad Cap. b. spei. Ericaefacie. Flor. albidus virides. L. h

11. *incanum*, pedunc. communibus longissimis, fol. linearibus, stipulis pilosis. Linn. suppl. 186. Hab. in Africa. Caul. prolikerus. Rami stipulis tunicatis. h

12. *albans*, pedunc. communibus longissimis, fol. linearibus exstipulatis. Linn. suppl. 186. Pluck. phytog. t. 304. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. h

13. *dichotomum*, pedunc. axillaribus elongatis dichotomis, fol. verticillatis linearibus. Linn. suppl. 186. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

14. *distichum*, racemis bipartitis flexuosis, foliis sublinearibus pubescentibus. Pluck. mant. g. t. 332. f. 4. Mollugo racemosa. Lam. ill. Hab. in India orientali.

15. *cordifolium*, racemis bipartitis terminalibus, fol. obcordatis. Hab. ad Cap. b. spei.

16. *bellidifolium*, fol. ovato-spathulatis, caul. nudo, racem. paniculatis dichotomis. Enc. bot. 5. p. 262. Plum. Amer. t. 21. f. 1. Sloan. jain. t. 129. f. 2. Hab. in Jamaica, Guinea. Facie a ceteris differt speciebus.

740. ALSINE. Cal. 5-phyllus. Petala 5, aequalia. Caps. supera, 1-locularis, 3-valvis, polysperma. Recept. centrale liberum.

1. *media*, caul. latere alterno piloso, petalis bipartitis, fol. ovato-cordatis. Flor. dan. t. 525. Curt. Lond. ic. Lam. ill. t. 214. Holosteum Alsine. Swartz. obs. 118. Stellaria media. Smith. Flor. Brit. 2. Hab. in cultis. Stamina numero a 3-7 variant. ☉

* *prostrata*, fol. oblongis, caul. prostrato dichotomo, flor. 5-andro. Forsk. aegypt. p. 207. Hab. in Aegypto.

† *SEGETELLA*. Fol. stipulacea. Petala integra. Stam. passim 3 et 4.

2. *viscosa*, caul. paniculato folisque pubescentibus, petal. cal. brevioribus. Schreb. Hoff. Flor. gerin. p. 148. Aren. tenuifolia. Flor. dan. t. 389. Hab. in collinis et arenosis Lipsiae, Sillesiae. Flor. 3-andri.

3. *segetalis*, glabra, petalis integris, fol. subulatis subsecundis. Län. A. segetalis graminæis fol. unum latus spectantibus. Vaill. paris. 8. t. 3. f. 3. Hab. inter segetes passim. (Stipul. membranaceae incisae. Stam. 3-4.)

4. *mucronata*, petalis integris brevibus, fol. setacis, calycibus aristatis. Hab. in Helvetia, Gallia. ☉

Obs. Genus dividendum, aut potius supprimendum et ejus species pro petalorum forma tum Stellaris tum Arenariis inscendae, a quibus numero staminum inconstante tantum differre videntur.

741. DRYPIS. *Cal.* 5-dentatus. *Petal.* 5. *Caps.* circumscissa, monosperma.

1. *spinosa*. Jacq. hort. 49. Lam. ill. t. 214. Mich. gen. 24. t. 23. Hab. in Mauritania, Italia, Istria. Petala angusta. Fol. subulata, subtrigona, mucronata.

742. SAROTHTHA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis, colorata.

1. *gentianoides*. Lam. ill. t. 215. Gentiana caule ramisque ramosissimis, fol. subulatis minimis. Gron. Virg. 29. Pluck. mant. 43. t. 349. f. 2. *Hypericum*. Mich. 2. p. 79. Hab. in Virginia, Pennsylvania. ☉

743. BASELLA. *Cal.* 6. *Cor.* 7-fida: laciniis 2 oppositis latioribus, tandem baccata. *Sem.* 1.

1. *rubra*, fol. planis, pedunc. simplicib. L. Willd. p. 1513. Sahb. hort. rom. 2. t. 98. Rheed. 7. t. 24. Hab. in India. ☉

2. *alba*, fol. ovaris undatis, pedunculis simplicibus folio longioribus. Pluck. atm. t. 63. f. 1. Hab. in China, Amboina. ☉

3. *lucida*, fol. subcorbatis, pedunculis confertis ramosis. In India. ☉

4. *cordifolia*, fol. cordato-subrotundis, pedunc. simplicibus folio brevioribus. Lam. enc. 1. p. 377. Hab. in India orientali.

744. PORTULACARIA. *Cal.* 2-phyllus. *Petal.* 5. *Sem.* 1, alato-triquetrum.

1. *afra*. Jacq. Coll. 1. p. 160. t. 22. Claytonia Portulacaria, caule arborco erecto.

L. Mant. 211. Dill. elth. 120. t. 101. f. 120. Hab. in Africa. h

TETRAGYNIA.

745. PARNASSIA. *Cal.* 5-partitus. *Petal.* 5. *Nectar.* 5, cordata, ciliata apicibus globosis. *Caps.* 4-valvis, 2-locularis. *Recept.* parietalia. *Sem.* membranaceo-marginata. G.

1. *palustris* (europaea), foliis radicalibus cordatis, nectariis multisetis. Engl. bot. t. 89. Flor. dan. t. 584. Hab. in pratis uliginosis. Aug. Stamina primo germine incumbunt, polline disperso eriguntur. ☉

2. *caroliniana*, fol. radicalib. suborbiculatis, nect. (appendicibus perigynicis) trisetis. Michaux. Flor. 1. p. 184. Hab. in Carolinae udis. ☉

3. *asarifolia*, radical. reniformibus petalis unguiculatis appendicibus trifidis. Vent. Malma. p. 39. t. 39. Hab. in Amer. septentrionali. Ex maximis. ☉

PENTAGYNIA.

746. ARALIA. *Insolucr.* umbellulæ. *Cal.* superus, 5-dentatus. *Petal.* 5. *Bacca* coronata 5-sperma.

* Foliis integris.

1. *arboorea*, canl. arborco, fol. simplicibus, umbel. radiis 1-glandulosis. Län. Willd. 2. p. 1518. Jacq. Schoenbr. 1. p. 26. t. 51. Hab. in Jamaica.

2. *capitata*, arboorea, fol. simplicibus ellipticis integerrimis, paniculis terminatis, florib. sessilibus capitatis. Swartz. prod. 55. Jacq. amer. 89. t. 61. ed. pict. Hedera capitata. Smith. ic. pict. 1. p. 4. t. 4. Hab. in subalpinis Antillarum, Jamaicae, etc. h

3. *cordata*, herbacea, caule angulato villosa inermi, fol. simplicibus cordatis. Thunb. jap. 127. Hab. in Japonia. ☉

* * Foliis lobatis

4. *japonica*, frutescens, fol. lobatis. Thunb. jap. 128. Banks. ic. Kämpf. t. 10. Hab. in Japonia. h

* * * Foliis digitatis.

5. *pentaphylla*, arboorea aculeata, fol.

quinatis. Thunb. jap. 128. Cum priore, in Japonia. *h*

6. *Sciodaphyllum*, arborescens, foliis digitatis, foliolis numerosissimis inaequalibus, racemo longissimo simplici nutante, pedunc. umbellatis. Willd. p. 1519. Swartz. prod. 51. *Sciodaphyllum*. Brown. jam. 195. t. 19. f. 1. Hab. in sylvaticis montium altissimorum caeruleorum Jamaicae. *h*

*** *Foliis supradecompositis et decompositis.*

7. *spinosa*, arborescens, caule foliisque aculeatis, panicul. ramosissima umbel. numerosa. Michaux. Flor. 1. p. 186. Comm. hort. 1. p. 89. t. 47. Hab. in Virginia. *h*

8. *chinensis*, caule petiolisque aculeatis, foliolis inermibus villosis. Rheed. 2. t. 26. Hab. in China. Caul. in summitate tantum fulvus. *h*

9. *hispida*, humilis suffruticosa, caul. petiolisque acutis hispidis, foliol. ovatis inermibus incis-serratis glabris. Vent. Hort. Cels. p. 41. t. 41. Michaux. Flor. 1. p. 185. Hab. in America boreal. a Quebec ad sinum Hudsonis. Fol. subius albricantia. Umb. pedunculatae terminales et axillares. *h*

10. *humilis*, caul. annuo, fol. imparipinnatis, foliolis coriatis serratis acutis, flor. umbellatis. Cav. ic. 4. p. 7. t. 313. Hab. in N. Hispania. Caul. tuberculis fuscis variegatur.

11. *racemosa*, caule herbaceo laevi, fol. glabris, pedunc. axillaribus ramosis umbellatis. Willd. p. 1521. Michaux. p. 185. Coldenad. 74. t. 75. Floris. s. r. t. 2. f. 9. Hab. in Canada et alius Aleghanis montib. Foliol. coriata. *h*

12. *nudicaulis*, caule subnullo, foliis ovatis ternatis. L. Pluck. alm. 98. t. 138. f. 5. Hab. in Virginia. Caul. et fere nullus. Scapus apophyllus, trifidus, s. umbellulas tres ferens. L. *h*

747. GLOSSOPETALUM. *Cal.* semiinferus, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala, petalis ligula adnata instructis. *Bacca* 5-sperma.

1. *glabrum*, fol. glabris. Willd. Sp. 2. p. 1521. *Goupia* glabra. Aubl. guj. 1. p. 246. t. 116. Lam. ill. 1. 217. Hab. in Gujana. *h*

2. *tomentosum*, fol. tomentosa. Willd. Aubl. guj. 1. p. 256. Hab. in Gujana. *h*

748. STATICE. *Cal.* 2-phyllus,

integer, plicatus, scariosus. *Petalu* 5. *Sem.* 1, superum.

* *ASMERIA. Scapo simplice, flor. capitatis, cal. communi polyphylo.*

1. *Armeria*, scapo (subhumili) piloso, fol. gramineis flaccidis. Hoffm. Flor. germ. p. 150. Engl. bot. t. 226. Hab. in montibus. In hortis ad arcuum margines ornandos saepe colitur.

β? *humilis*, fol. linearibus brevibus rigidiusculis, bract. plerisque acutis: infimis acutis. Link. in Schrad. Journ. 1800. p. 61. St. hispanica minima juniperi folio, majore flore. Tournef. inst. p. 341. Hab. in Lusitaniae monte Gerez.

2. *arenaria*, caul. scapo longo, bract. 2-3 capitulo longiorib. fol. linearib. rigidulis glabris. Hab. in arenosis. (Copiose prope Fontainebleau.) A priore, specie distincta videtur. Hujus loci videtur *Statice* elongata Hoffm. l. c., qui vero folia dicta laeva.

3. *cespitosa*, scapis brevibus aggregatis capitatis, fol. accrosis. Cav. ic. 1. p. 38. Quer. hisp. 6. t. 15. f. 1. S. fol. accrosis, propaginib. numerosis congestis. Ortega Dec. p. 121. S. juniperifolia. Vahl. symb. 1. p. 25. Hab. in Hispaniae montib. Carpentanis et Lusitaniae littoribus.

4. *alliacea*, scapo simplici capitato, fol. lineari-lanceolatis acutis trinerviis. Willd. p. 1526. Schousb. Maroc. p. 131. S. *alliacea*, scapo junceo capitato, fol. linearibus acutis, inferne angustatis. Cav. ic. 2. p. 6. t. 109. Hab. in Hispaniae montibus et locis arenosis region. Tingitanae.

5. *cephalotes*, scapo simplici capitato, fol. lanceolatis 9-nerviis. Schousb. p. 132. S. squamulis calycinis ovatis acuminatis. Ait. Kew. 1. p. 383. S. *Pseud-Armeria*. Murr. syst. Veg. 300. Desf. Atl. 1. p. 274. Hab. in Algarbia et Barbaria. Lacin. perianthii seta longa terminatae. *h*

6. *lusitanica*, scapo simplici capitato, fol. ovato-lanceolatis. Poirret. it. St. *scorzonerifolia*, fol. linearibus lanceolatis acutis trinerviis. Link. l. c. p. 60. Tournef. inst. p. 341. Jacq. hort. Vind. t. 42. Hab. in Barbaria et in Lusitania prope Cabo de Roca. Planta magna speciosa. Flor. coccinei.

* *LYMONIUM. Flo.* sparsis in scapo paniculato aut spicato s. caule folioso.

7. *fasciculata*, caul. frutescente inferne

nudo, scapo simplici capitato, fol. fasciculatis linearib. canaliculatis recurvis. Vent. Hort. Cels. p. 38. t. 38. Hab. in Lucania ad littora maris. Caul. interae nudus.

8. *graminifolia*, scapo paniculato, ramis triquetris, fol. linearibus canaliculatis. Ait. Kew. 1. p. 383. Hab. . .

9. *Limonium*, scapo paniculato tereti, fol. laevibus nerviis undulatis, sub apice mucronatis. L. Flor. dan. t. 315. Engl. bot. t. 102. *Limonium maritimum majus*. Bauh. pin. 192. Hab. in Europae et Virginiae maritimis. Flor. cyanei.

10. *Gmelini*, scapo paniculato angulato, fol. oblongo-ovatis emarginatis planis cartilagineo-marginatis subus mucronatis. Willd. p. 1524. Gmel. sib. 2. p. 220. t. 50. Hab. in Sibiria locis salis. Simillima praecedenti, sed fol. firmiora obovata et flor. duplo minores. W. \mathcal{E}

11. *scoparia*, scapo paniculato tereti, fol. oblongo-ovatis coriaceis mucronatis, subus punctatis. Willd. Hab. in Sibiria. Simill. sequenti sed non pilosa, scapi fere ut in *S. Limonio*. W. \mathcal{E}

12. *latifolia*, scapo paniculato ramossimo scabro, foliis pubescentibus, pilis fasciculato-stellatis. Smith. in Act. Soc. Linn. Lond. 1. p. 250. *S. Coriaria*. Pall. fl. sibir. Hab. in Sibiria. Habitu ad *S. Limonium* accedit. \mathcal{E}

13. *oleaeifolia*, scapo paniculato, ramis angulato-alatis, fol. lanceolatis mucronato-cuspidatis marginae cartilagineis. W. p. 1525. Scop. del. 1. n. 11. t. 10. Barr. ic. t. 790. Hab. in Italia, Hispania.

14. *incana*, scapo paniculato, fol. lanceolatis trinerviis subundulatis apice mucronatis, paniculae ramis triquetris. L. Vahl. symb. 1. p. 25. Hab. in Arabia, inque Sibiria. Fol. radicalia, elliptico-lanceolata, incana, mucronata. \mathcal{E}

15. *aureiculifolia*, scapo simplici ramosoque tereti, spicis lateralibus terminalibusque secundis, fol. spatulatis acutis. Vahl. symb. 1. p. 25. Schousb. Maroc. p. 133. *Limonium lusitanicum aureulae* urti folio. Thurnef. inst. 342. Hab. ad littora maris Barbariae. \mathcal{E}

16. *cordata*, scapo paniculato, fol. spatulatis retusis. Barr. ic. 805. Hab. ad maris Mediterranei littora. \mathcal{E}

17. *scabra*, fol. radicalibus obovato-oblongis obtusis, ramis scabris. Thunb. prod. 54. Hab. ad Cap. b. spei.

18. *tetragona*, scapo paniculato tetragono, fol. obovatis. Thunb. prod. 54. Cum priore.

19. *reticulata*, scapo paniculato prostrato, ramis sterilibus retroflexis nudis, fol. cuneiformibus mucis. Engl. bot. t. 328. Smith. brit. 1. p. 312. Pluck. alm. 221. t. 42. f. 4. Boec. sic. 1. 44. β . *dichotoma*, caule aphylo dichotomo, fol. spatulatis glabris, petalis basi coalitis. Cavan. diss. 1. p. 37. t. 50. Hab. in Melita, Hispania, Anglia et Sibiria. Flor. terminales fasciculati caerulei. Sm. \mathcal{E}

20. *echioides*, fol. radicalibus obovatis, scapo paniculato, flor. remotiusculis sessilib. subarenatis. Desf. Atl. 1. p. 274. Willd. p. 1527. Gouan. ill. t. 2. f. 4. Magnol. bot. 157. ic. Hab. Montepeli et in Barbaria prope Mascar; ad rupes. Petal. angustissima. Cal. bracteae tuberculosa involutus. Desf. \odot

21. *globulariaefolia*, fol. acuminatis horizontalibus, paniculae racem. terminalib. secundis. Desf. l. e. Barrelet. 793 et 794. *S. ramosissima*. Poir. it. 2. p. 122. Hab. ad thermas prope Bone. Flor. albi. Fol. variant: radical. spatulatis.

22. *spatulata (glauca)*, fol. radicalibus spatulatis obtusis glaucis integerrimis longe petiolatis, scapo tereti, flor. racemosis secundis. Desf. Atl. 1. p. 275. Cresc. in rupibus prope la Calle. Scap. superne ramosus: ramis paniculatis. D. \mathcal{E}

23. *speciosa*, scapo ramoso tereti, ramis ancapitibus alatis, floribus imbricatis, fol. obovato-cuspidatis mucronatis, marginae cartilagineis. Willd. p. 1527. Gmel. sibir. 3. p. 221. t. 91. f. 1. Hab. in Tataria. \mathcal{O}

24. *tatarica*, scapo ramoso divaricato, ramis triquetris, flor. distantibus, fol. lanceolato-obovatis mucronatis. Willd. Boerb. lugdb. 1. p. 76. t. 76. Hab. in Tataria. Var. flor. rubri et albi. \mathcal{O}

25. *Echinus*, scapo paniculato, fol. subulatis mucronatis. L. Buxb. cent. 2. p. 18. t. 10. Hab. in Graeciae et Mediae desertis. Fol. imbricata, apice mucronato-spinosa.

26. *acerosa*, fol. linearibus subulatis rigidis pungentibus, scapo simplici apicato. Willd. in N. Act. Berol. 2. Hab. in Galatia.

27. *Aeruxosa*, scapo dichotomo corymboso - fastigiato, spicis capitis, flor. imbricatis, fol. lanceolato-cuneiformibus obtusis mucronatis trinerviis. Willd. p. 1528. *S. rosea*. Pall. it. 3. p. 260. Hab. in Sibiria. \mathcal{E}

38. *purpurata*, caule subfoliato, foliis obovato-cuneatis trinerviis mucronatis. L. Thunb. prod. 54. S. peregrina. Berg. cap. 80. Hab. ad Cap. b. spei. Cal. purpurascens, radiis 5, sanguineis. Cor. purpurascens.

39. *longifolia*, caule paniculato scabro erecto, fol. obovato-linearibus. Hab. ad Cap. b. spei. †

30. *minuta*, caule suffruticoso foliato, foliis confertis cuneatis glabris muticis, acap. paucifloris. Boer. sic. 26. t. 13. f. 3. Desf. Atl. p. 275. Pluck. alm. t. 200. f. 3. Hab. ad mare Mediterraneum et in Barbaria. Caul. caespitios. h

31. *pectinata*, caule ramisque paniculatis triquetris, fol. obovatis petiolatis, spica secundis. Ait. Kew. t. p. 385. Hab. in Canariis. h

32. *suffruticosa*, caule fruticoso et superne nudo ramoso, capitulis sessilibus, fol. lanceolatis vaginantibus. L. Gmel. sibir. 2. p. 216. t. 88. f. 2. 3. Hab. in Sibiria. h

33. *monopetala* (scabra), caule fruticoso folioso, flor. solitariis, fol. linearilanceolatis vaginantibus. L. Boer. sic. 33. t. 17. Limonium fol. Halimi. Tournef. Inst. 342. Hab. in Sicilia, in Barbar. in arenis salis. Gallas saepe fert. Fol. glauci aspera. h

34. *axillaris*, caule fruticoso folioso, panic. spicatis axillaribus, fol. lanceolatis vaginantibus. Vahl. symb. 1. p. 76. t. 9. Forsk. descr. p. 58. Hab. in Arabia felici. h

35. *cylindrifolia*, caule fruticoso dichotomo, fol. teretibus vaginantibus. Vahl. L. c. t. 12. Hab. in Arabia, inque Africa boreali. h

36. *linifolia*, caule fruticoso prostrato, flor. paniculatis secundis, fol. linearibus. Linn. suppl. 187. Thunb. prod. 64. Hab. ad Cap. b. spei. h

37. *aurea*, caule fruticoso folioso ramoso, fol. subulatis. S. Limonium calycibus aureis. Avum. ruth. 172. t. 18. f. 2. Hab. in Dauria campis montosis. Cor. eleganter flava. h

38. *serulacea*, caule fruticoso ramoso, ramulis imbricatis paleis apice pilo terminatis. Pall. h. 3. p. 314. Desf. Atl. 1. p. 276. Moris. s. 15. t. 1. f. 23. Pluck. alm. 221. t. 29. f. 4. Hab. in Barbaria, Lusitania, Hispania, in maritimis. Ramuli imbricati paleis minutissimis. Flor. subimbricati, lutei. h

39. *pruinosa*, caule flexuoso ramoso sursuraceo. S. *aphylla*. Forsk. Habit in Palestina. Caul. flexuosus.

40. *sinuata*, caule herbaceo ancipiti, fol. radicalibus lyratis, caulinis linearibus. Willd. Desf. Atl. 1. p. 276. Clus. cur. 33. t. 33. β. Limonium africanum, caule alato, foliis integris hirsutis, petalo pallide flavo, calyce amoeno purpureo. Mart. cent. 84. t. 84. Schousb. Maroc. t. p. 134. Hab. in Sicilia, Palaestina, Africa. Cal. violacei. Cor. favescentes. †

41. *aegyptiaca*, caul. herbaceo, fol. radicalibus alternis pinnatifido-sinuatis, cor. lacini intermediis linearib., perianth. communi bicorni. Viviani Hort. Di Negro. Hab. in Aegypto.

42. *lobata*, fol. sinuatis, caulibus teretibus aphyllis. Hab. in Africa. Cal. albi. Cor. caerulear.

43. *spicata*, caule nudo simplicissimo, spicis sessilibus alternis, fol. radicalibus sinuato-pinnatis. Gmel. sib. 2. p. 224. t. 91. f. 2. Willd. 2. p. 1532. Hab. in Persia. Radix tuberosa. Cal. et Petala albiola. Gmel.

44. *mucronata* (crispa), caule crispo, fol. ellipticis integris, spicis secundis. Linn. suppl. p. 187. P'Herit. stirp. 1. p. 95. t. 13. Limonium peregrinum appendicibus crispis alactum. Pluck. alm. 222. Hab. in Barbaria ad versuras. Fol. radicalia petiolata elliptica mucronata. Spicae dimidiatae. Cor. rubescentes.

749. LINUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. 5-valvis, 10-locularis. Sem. solitaria. (Filam. basi coacta.)

* *Folii alternis.*

1. *usitatissimum*, calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, fol. lanceolatis alternis, caule subsolitario. In cultis.

β. *humile*, cal. capsulisque mucronatis, petalis emarginatis, fol. lanceolatis alternis, caule ramoso. Mill. pict. n^o. 2. Habit. in Europa australi. ☉

γ. *perenne*, calycib. capsulisque obtusis, fol. alternis lanceolatis integerrimis, caul. albis numerosis. Engl. bot. t. 40. Smith. brit. 1. p. 333.

δ. *procumbens*, sylvestre caeruleum perenne procumbens flore et capitulo minore. Raj. angl. 3. p. 362. Hab. in Sibiria

et Anglia. Fol. subrecurva. Pet. subemarginata. $\overline{\text{T}}$

3. *grandiflorum*, caul. basi ramoso, fol. angusto-lanceolatis, flor. laxo paniculatis, caps. mucronatis. Desf. Atl. 1. p. 278. t. 76. Hab. in arvis prope Mascara. Sp. pulcherrima petal. maximis roseis. D.

4. *viscosum*, calycibus acuminatis, fol. lanceolatis; pubescentibus quinquenerviis, margine glandulosis. Willd. Linum sylvestre latifolium, caule viscoso, flore rubro. Benth. pin. 214. Hab. in montib. Bononiensibus, Sumano, Augustae vindelicorum, Ingolstadt. An var. sequens? $\overline{\text{T}}$

5. *hirsutum*, calycibus basi nervoso-ariatis hirsutis acuminatis sessilib. alternis, fol. alternis hirsutis: ramis oppositis. Jacq. austr. t. 31. Scop. carn. ed. 2. t. 11. Lam. l. c. p. 520. Moris. a. 5. t. 26. f. 5. Hab. in Austriacae, Tatariae graminosis. Fol. floralia et calyces ciliati setis brevissimis, glandulosis. L. $\overline{\text{T}}$

6. *aquilinum*, fol. alternis lanceolatis, pedunculis bifloris. Molin. chil. ed. germ. 126. Feuill. peruv. 2. t. 22. Hab. in montibus Chili. $\overline{\text{T}}$

7. *narbonense*, calycib. acuminatis, fol. lanceolatis sparsis strictis scabris acuminatis, caul. tereti basi ramoso. Cal. magni, latere membranacei, apice quasi mucrone subulato instructi. L. $\overline{\text{T}}$

8. *reflexum*, calycib. acuminatis, fol. ovato-lanceolatis acuminatis reflexis laevibus, flamm. connatis. Ait. Kew. 1. p. 387. Hab. in Europa australi. $\overline{\text{T}}$

9. *tenuifolium*, calycibus acuminatis margine glandulosis, fol. sparsis linearisetaeis retrorsum scabris. L. Jacq. austr. t. 215. Hab. in collib. aridis. Cor. rubro-caerulea.

10. *bicolor*, caul. simplicissimo, fol. confertis margine scabris, cor. lutea, fundo caeruleo, striis purpureis. Schousb. p. 135. In Barbaria.

11. *angustifolium*, foliol. calycinis ellipticis subtrinerviis capsulisque acuminatis, fol. linearis-lanceolatis trinerviis, caul. numerosis. Smith. brit. 1. p. 344. l. *angustifolium*. Huds. Engl. bot. t. 381. Cresc. in parvis praecipue maritimis in Anglia. Julio habius. L. *tenuifolii*, sed cal. nequaquam glanduloso-ciliatis. Styli subelavati. Sm. $\overline{\text{T}}$

12. *decumbens*, caul. adscendente filiformi, fol. sparsis erectis subulatis laevibus mucronatis, flor. pedicellatis, cal. ovatis acutis. Desf. Atl. 1. p. 278. t. 79. Hab. in

regno Tunetano in arvis. Flor. primo veris. Cor. rosea. D.

13. *Selaginoides*, caulibus suffruticosis diffusis procumbentibus, fol. filiformibus conferto-sparsis, flor. sessilibus terminatilibus. Lam. enc. 3. p. 504. Hab. in Brasilia in Montevideo. $\overline{\text{H}}$

14. *prostratum*, flor. solitariis lateralibus brevissime pedunculatis, fol. alternis, caulib. prostratis ramosissimis. Lam. enc. 3. p. 504. Hab. in Peru in collibus siccis prope Limam. Fol. ovato-oblonga simillima illi Polygalae vulgaris. L.

15. *gallicum*, caul. ramosissimo, calycib. subulatis acutis, fol. linearis-lanceolatis alternis, paniculae pedunculis bifloris, flor. subsessilibus. Ger. prov. 422. t. 15. f. 1. Hab. Mouspeli, circa Nans et in collib. prope Genuam. Viviani. Pistilla interdum tria.

16. *maritimum*, caul. sub simplici, calycibus ovatis acutis muticis, fol. lanceolatis trinerviis: inferiorib. oppositis. Jacq. hort. t. 154. In Austria ad Thermas badenses, Mouspeli in Oriente et in Italia ad stagna marina. $\overline{\text{T}}$

17. *corymbiferum*, fol. lanceolatis confertis erectis trinerviis retrorsum asperis, ramis filiformibus, corymbosis, cal. subulato-mucronatis. Desf. Atl. 1. p. 279. t. 80. Hab. in Atlantae prope Majane. Cor. lutea. L. usitatissimi magnitudine.

18. *tenuis*, fol. linearib. acutis, ramis laxo paniculatis filiformibus, flor. pedicellatis, cal. mucronato corollis quadruplo brevioribus. Desf. l. c. t. 81. Hab. in Algeriae collib. Differt a L. gallico coroll. quadruplo majoribus. \odot

19. *virgatum*, cal. linearis-subulatis acutis, fol. linearis-lanceolatis alternis, caul. ramoso virgato. Schousb. Maroc. ed. germ. 1. p. 176. Hab. in argetib. et ad versoras prov. Illahae. Cor. lutea. Flor. 1-laterales.

20. *alpinum*, calycib. rotundatis obtusis, fol. linearibus acutiusculis subreflexis, caulibus declinatis. Jacq. austr. 4. t. 321. Zanon. hist. p. 246. t. 107. Lam. enc. 3. p. 521. Hab. in Austriae alpinis. Flor. caerulei. $\overline{\text{T}}$

21. *austriacum*, calycib. rotundatis obtusis, fol. linearibus acutis rectiusculis. L. Hab. in Austria inferiore, Palatinatu. \odot

22. *virginianum*, calycib. acutis alteris, capsulis muticis, panicula filiformi, fol. alternis lanceolatis: radicalib. ovatis. L. Hab. in Virginia, Pennsylvania ad Carolinam. Fol. linearis-lanceolata sparsa rarius opposita. Michaux. Flor. 2. p. 36.

21. *monopetalum*, cor. monopetalis quinquefoliis. Sieph. cann. mosq. n°. 214. Hab. in Russiæ sylvis trans Oceanum. Refert. L. flayum. †

22. *strictum*, flor. glomeratis terminalib. calycib. subulatis, fol. lanceolatis strictis mucronatis: margine scabris. L. Desf. Atl. 1. p. 278. L. sessiliflorum. Lam. enc. 3. p. 523. Hab. in Europa australi, et Barbária. ♂

β. *alternum*, caul. superne corymboso, flor. alternis. Lam. l. c. Schousb. p. 138.

γ. *spicatum*, caul. simplicissimo, flor. spicatis. Lam. Tournef. p. 340. In Lusitania.

23. *monogynum*, fol. alternis linearilanceolatis trinerviis, caule suffruticoso. Forst. prod. n°. 145. Hab. in N. Zealandia. ♀

24. *suffruticosum*, fol. linearib. acutis scabris, caul. suffruticosis. Lin. Cavan. ic. 2. p. 5. t. 108. Barcl. ic. 1231. Hab. in regno Valentino. ♀

25. *salsaloides*, caul. basi fruticulosus imbricato-foliosis, superne nudiusculis filiformibus, fol. subulatis triquetris. Lam. enc. 3. p. 521. β. *crispum*, Lin. sylvestre fruticosum crispum hispanicum, parvo flore albo. Barcl. ic. 795. Hab. in Hispania. Rad. lignosa, magna. Caps. minimae, acuminatae. Fol. brevia. Lam.

26. *striatum*, fol. alternis subovatis: nervo marginibusque decurrentibus, flor. terminalib. Walt. Flor. Carol. p. 118. Gmel. Syst. N. Lin. II. p. 514. Hab. in America. Distincta species fol. majusculis brevi-ovatis erectis Camp. hybridac fere similibus.

27. *arborescens*, fol. cuneiformibus, caul. arborescentibus. Schrech. in Nov. Act. A. N. C. III. p. 478. Alp. exot. 19. t. 13. Hab. in Creta, Italia. ♀

28. *campanulatum*, fol. spatulatis: basi utrinque punctata glandulosa, L. flor. subsessilib. cal. longis acutis. Lam. enc. 3. p. 524. Willd. p. 15 in L. sylvestre luteum, fol. subrotundis. Bauh. pin. 212. Lob. ic. 414. Barcl. ic. 820. Hab. in Galloprovinciae montibus, in Italia et in Russia, locis aridis.

29. *flavum*, cal. suberrato-scabris lanceolatis subsessilib. panie. ramis dichotomis. Jacq. austr. 3. t. 214. Lam. l. c. Hab. in Austria et Oriente. Petal. flava, lineis croceis. Var. prioris?

** Foliis oppositis.

30. *africanum*, foliis oppositis linearilanceolatis, flor. terminalibus pedunculatis. Hab. ad Cap. b. spei. Petala lutea unguibus villosis. ♀

31. *aethiopicum*, fol. oppositis ovatis mucronatis, caule fruticoso. Thunb. prod. 57. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

32. *nodiflorum*, fol. floriferis oppositis lanceolatis, flor. alternis sessilibus calycib. longitudine foliorum. Lin. l. luteum ad singula genicula florulum. Bauh. pin. 214. Moris. 5. t. 6. f. 11. Column. cephr. 2. t. 89. Hab. in Italiae pratis argillosis. Cor. flavescens.

33. *catharticum*, fol. oppositis ovato-lanceolatis, caule superne dichotomo, cor. acutis. Engl. bot. t. 182. Cur. Lond. ic. Blackw. t. 368. Hab. in nemorosis et pascuis succulentis. Flor. albi, nondum evoluti penduli. ☉

34. *setaceum*, caul. dichotomo paniculato, fol. setaceis suberrato-scabris subverticillatis, cal. foliolis ovato-lanceolatis dilatis. Brotero Phytogr. Lusit. n°. 22. t. 6. Hab. in collib. calcareis circa Coimbram Lusitania.

35. *quadrifolium*, foliis quaternis L. Houttuyn. G. t. 46. f. 1. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei.

36. *verticillatum*, fol. verticillatis. Boeckm. 2. p. 49. t. 42. Barr. t. 1206. Habitat in Italia. Calyc. et fol. superiora villosa.

37. 50. *ALDROVANDA*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 5-valvis, 1-locularis, 10-sperma.

1. *vesiculosa*. Lin. Lam. ill. t. 220. Lenticula palustris indica, fol. subrotundis binis capillamentis ad imum barbatis. Pluck. alm. 211. t. 41. f. 6. Hab. in Italiae et Indiae padulosis.

2. 51. *DROSERA*. Cal. 5-fidus. Petala 5. Caps. 1-locularis: apice 3-5-valvis. Sem. pluriuma. (Styli etiam 6. Fol. pilis glandulosis obsita.)

1. *acaulis*, flore radicali exscapo solitario, fol. oblongis. Lin. suppl. 188. Willd. Sp. 2. p. 1543. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *rotundifolia*, scapis radicalis, fol. orbiculatis. Flor. dan. t. 1028. Roth. germ. II.

p. 373. Hab. in Europae, Americae paludosis. Stylis 6. Smith. ☉

3. *longifolia*, scapis radiatis, fol. obovatis oblongis, stigmatib. emarginatis. D. *intermedia*, scap. adscendentibus, fol. ovalibus. Hayne apud Schrad. bot. Journ. 1800. p. 37. Moris. s. 15. t. 4. f. 2. Hab. in locis uliginosis. Var. styl. 9. Smith. Fol. elliptica. ☉

4. *anglica*, fol. oblongis obtusis, flor. 8-gynis, caps. 4-valvibus. Smith. Flor. Brit. t. p. 347. D. *anglica*, scapis radiatis erectis, fol. obverse lanceolatis, stigmatib. clavatis. Roth. N. Bot. Beytr. p. 184. Moris. s. 15. t. 4. f. 1. D. *longifolia*. Hayne l. c. p. 40. et plur. auctor. Hab. in paludosis. Styl. 3, profunde bifidi. H.

5. *cuneifolia*, scapis radiatis calycibusque hirsutis, fol. obovato-cuneiformibus. Willd. p. 1544. Hab. ad Cap. b. spei. D. rotundifolia sed major. Fol. reticulato-venosa crassiuscula.

6. *Burmanni*, scap. radiatis calycibusque glabris, fol. spatulatis sessilibus. Vahl. symb. 4. p. 50. Burm. zeyl. t. 94. f. 2. Hab. in Zeylona et Corinchina. A praecedente distincta 1 fol. tenuioribus trinerviis, scapo glabro, flor. minorib. W.

7. *capensis*, scapis radiatis, fol. lanceolatis subtus scabris. D. fol. ad radicem longissimis, flor. spicatis. Burm. afr. 209. t. 75. f. 1. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spei. Radix exserens fila spiralia. Flor. violacei.

8. *Lusitanica*, scapis radiatis, fol. subulatis subtus convexis, flor. subumbellatis decandris. L. Moris. s. 15. t. 4. f. 4. Pluck. alm. 323. t. 127. f. 2. Cav. in Annal. d. scienc. natur. p. 43. Hab. in Lusitania.

9. *cistiflora*, caule simplici folioso, fol. lanceolatis. L. Burm. afr. 210. t. 75. f. 2. Breyn. prodr. 3. t. 22. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. fundus et Stamina nigra. Stylis nigri, apice dichotomi usque in capillos. L.

10. *indica*, caule ramoso folioso, fol. linearibus. Burm. zeyl. 207. t. 94. f. 1. Rheed. 10. t. 20. Hab. in India.

11. *peltata*, caule subramoto, fol. triangularibus longe petiolatis peltatis. Willd. p. 1546. Hab. in N. Hollandia. Caul. flexuosus (foliosus.) Racemus terminalis. W.

12. *pedata*, foliis pedatis. Cresc. cum priore. Née. Vidi in Herbario D. Thibaut. Fol. laciniae longe distant, longissimae, di-

chotomae glandulosae; petiol. longissimi. Flor. corymbosi. An hujus generis?

752. GISEKIA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 5, approximatae, subrotundae, 1-spermae.

1. *pharmacioides*. L. Lym. ill. t. 227. Koereutera molluginoides. Murray. in Comm. N. Goett. 3. p. 67. t. 2. f. 1. Hab. in India orientali. Caul. decumbentes. Umb. multiflora. Flor. deorsum penduli. L.

753. LAROCHEA. Cal. 1-phyllus, 5-fidus. Cor. 1-petala inlunuliformis, 5-fida. Squamae 5 ad basin germinis. Caps. 5.

1. *coccinea*, fol. ovatis planis cartilagineo-ciliatis, basi connato-vaginantibus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1547. sub *Crassula*. Decand. et Redout. Plant. grass. ic. Knorr. Delic. t. t. B. 2. Brall. succ. 5. p. 7. t. 50. Flor. terminales aggregati tubo longo.

2. *falcata*, fol. oppositis subconnatis glabris, in salcem inflexis. Rorher. Decand. l. c. ic. Grass. retroflexa. Meerb. ic. pl. Lugd. Hab. uti prior ad Cap. b. sp. Flor. glomerato-corymbosi in pedunc. dichotomis axillarib. Cor. coccinea 1 tubo breviusculo pallido.

Obs. Genus hocce dicatum memoriae D. Delaroche, auctoris monographiae de Ixiis et Gladiolis.

754. CRASSULA. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Squamae 5 nectariferae ad basin germinis. Caps. 5. (In aliquibus speciebus una pars demitur aut additur.)

* *Frutescentes.*

1. *cymosa*, fol. linearib. cartilagineo-ciliatis connato-vaginantibus, caule fruticoso, cyma terminali. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1548. C. fol. perfoliatis lanecolato-subulatis ciliatis patulis, caule simplici, panicula composita. Thunb. prod. p. 55. Hab. ad Cap. b. spei cum plerisque speciebus. L.

2. *Aava*, fol. planis connato-perfoliatis laevibus, flor. corymboso-paniculatis. L. Burm. afr. 38. t. 27. f. 2. Pluck. alm. 340. t. 314. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. H.

3. *pubescens*, fol. connatis ovatis acutis villosis, caule ramoso, florib. corymbosis. Lin. suppl. 190. Hab. ad Cap. b. spei. H.

4. *pruinosa*, foliis subulatis pruinosis scabris, flor. corymbosis, caule fruticoso. Mant. Co. Hab. in Cap. b. spec. h

5. *scabra*, fol. oppositis patentib. connatis scabris ciliatis, caule retrorsum scabro. L. Dill. elth. 117. t. 99. f. 117. Pauc. composita.

6. *corallina*, fol. connatis deltoideis obtusis, caule tecto, flor. umbellatis. Lin. suppl. 188. Hab. ad Cap. b. spec. h

Obs. C. *vestita* et *corallina* mira structura foliorum, similes Corallinis Zoophytorum. L.

7. *vestita*, fol. connatis deltoideis obtusis, caule tecto, floribus terminalibus capitatis. Lin. suppl. 188. Hab. ad Cap. b. spec. h

8. *argentea*, fol. connatis ovatis integris argenteis, caule tecto, corymbo supradecomposito. Lin. Hab. ad Cap. b. spec.

9. *perfoliata*, fol. lanceolato attenuatis cras in connatis canaliculatis, subus convexis. L. Mill. dict. Plant. grass. ic. Dill. elth. 114. t. 96. f. 113. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spec. h

10. *perforata*, fol. opposito-perfoliatis ovatis, caule simplici, flor. pedunculato-subverticillatis. Lin. suppl. 190. Caul. rubicundi nodiuseculi. Flor. glomerati parvi.

11. *fruticulosa*, fol. oppositis subulatis acutis patentibus subrecurvatis, caule fruticoso. Lin. p. C. *caffra*. L. Mant. 222. Flor. parvi, albi, campanulati.

12. *ramosa*, fruticosa, foliis subulatis supra planis connato-perfoliatis laevibus patentissimis, pedunc. elongatis, flor. cymosis. Ait. Kew. 1. p. 360. C. dichotoma. Lin. suppl. 188. h

13. *mollis*, fol. connatis tereti-trigonis glabris mollibus remotis, caule recto simplici, panicula trichotoma supra decomposita. Thunb. prop. 55. Hab. ad Cap. b. spec.

14. *tetragona*, fol. subulatis aut incurvis obsolete tetragonis patentibus, caule erecto arborescente radicante. L. Plant. grass. ic. Pedunc. dichotomi. Cor. alba. Brall. succ. 5. p. 18. t. 11. f. 47. Hab. in Aethiopia. Caul. radicat fibris. Cyma trifida, remosissima, fastigiata. Cor. albae. L. h

15. *muricata*, fol. connatis trigonis ciliato-serratis, ramis tetragonis, caule frutescente. Thunb. prod. 45. Hab. ad Cap. b. spec. h

16. *imbricata*, fol. ovatis acutis quadrifarium imbricatis laevibus, floribus axillaribus sessilibus. Ait. Kew. 1. p. 393. Hab. ad Cap. b. spec. h

17. *obvallata*, fol. connatis oppositis sublanecolatis culttratis approximatis. Lin. Mant. 61. Plant. grass. ic. Simillima sequenti. Petala spathulata, apice aristata globo, ut in sequenti, nec explicanda. L. Caul. et fol. subpurpurascens.

18. *cultrata*, fol. oppositis obovatis subcultratis obliquis connatis integerrimis. Ait. Kew. 1. p. 393. Dill. elth. 115. t. 97. f. 114. Hab. in Aethiopia. h

19. *portulacacea*, fol. ovalibus carnosissimis oppositis punctatis, caul. arboresco, flor. paniculatis. Lam. enc. 2. p. 172. Plant. grass. ic. Cor. magna carnea. Facie Clayton Portulacariae.

20. *obliqua*, fol. oppositis ovatis obliquis integerrimis acutis distinctis, margine subcartilagineis. Ait. Kew. p. 393. Hab. ad Cap. b. spec. h

21. *spathulata*, fol. petiolatis cordato-subrotundis acutiusculis tenuiter crenatis, corymbis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 395. Plant. grass. ic. Hab. ad Cap. b. spec. Cor. patens rubra. h

22. *punctata*, fol. oppositis ovatis punctatis ciliatis, inferioribus oblongis. L. Corymbi axillares brevissimi fastigiati. Cor. alba. h

23. *perfoliata*, fol. connato-perfoliatis cordatis punctatis. Scop. Del. iusubr. 3. p. 12. t. 6. C. perfoliata. Lam. enc. 2. p. 11. ill. t. 220. f. 2. Plant. grass. Fol. margine rubentis.

24. *marginalis*, caule fruticoso, fol. cordatis perfoliatis acuminatis planis patentibus intra marginem punctatis. Ait. Kew. 1. p. 366. Hab. ad Cap. b. spec. h

25. *cordata*, caule fruticoso, fol. petiolatis cordatis obtusis integerrimis, cymis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 396. h

26. *laetea*, caule fruticoso, fol. ovatis basi attenuatis connatis integerrimis, intra marginem punctatis, cymis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 406. Plant. grass. ic. Cyma magna subhyssoides. Flos. terminalis saepius 6-petalus.

27. *arborescens*, fol. subrotundis carnosissimis supra punctatis, caule arboresco. C. Oylelou. Murr. syst. veg. 305. Jacq. misc. 2. p. 295. t. 19. h

38. *rupestris*, fol. connatis ovatis integris glabris, corymbo supradecomposito. Lin. suppl. 189.

39. *pinnata*, fol. pinnatis, caule arboreo. Lin. suppl. 191. Hab. in China. η

**** Herbacea.**

30. *spinosa*, caule simplicissimo, fol. mucronatis, flor. sessilibus lateralibus. L. Gmel. sib. 4. p. 173. t. 67. f. 2. Cotyledon spinosa. Murray. in Nov. Comm. Goett. tom. 7. p. 33. t. 5. Hab. in Sibiria.

31. *retroflexa*, fol. connatis oblongis remotis planis, caule simplici, cyma composita, pedicellis retrofractis. Lin. suppl. p. 188. Var. flore rubro et luteo.

32. *lineolata*, caule herbaceo, fol. cordatis sessilibus, pedunc. subterminalibus axillaribus approximatis umbelliformibus. Ait. Kew. 1. p. 331. \odot

33. *centauroides*, caule herbaceo dichotomo, fol. sessilibus oblongo-ovatis cordatis planis, pedunculis axillaribus unifloris. Ait. Kew. 1. p. 392. Caul. brachiatus.

34. *dichotoma*, caule herbaceo dichotomo, fol. sessilibus ovato-oblongis canaliculatis recurvatis, pedunculis axillaribus unifloris. Ait. Kew. 1. p. 392. Herm. lugdb. 550. t. 553. Hab. in Aethiopia. \odot

35. *glomerata*, parvula, caule herbaceo dichotomo scabro, fol. ovato-lanceolatis crassis, flor. ultimis fasciculatis. L. Plant. grass. ic. Caul. palustris, scaber, purpurascens. Flor. conferti in capitula, ut in Valeriana, Sclerantho. Petala calyce triplo minora. L. Var. caul. scabrido.

36. *pulchella*, caule herbaceo dichotomo, fol. ovato-oblongis carnosius reflexis, flor. in dichotomis pedunculatis, pedunculis turbinatis. Ait. Kew. 1. p. 392. Affinis priori, differt: cor. calyce fere longioribus.

37. *strigosa*, caule herbaceo erecto dichotomo, fol. obovatis strigosis, pedunculis unifloris. L. Syst. Veg. p. 252. Hab. in Aethiopia.

38. *muscosa*, caule herbaceo prostrato, fol. oppositis ovatis gibbis imbricatis, flor. sessilibus solitariis. L. C. fol. connatis ovatis acutis quadrifariam imbricatis, flor. lateralibus. Thunb. prod. 54. Hab. in Aethiopia et ad Cap. h. spec.

39. *pyramidalis*, fol. connatis ovatis obtusis quadrifariam lacumbentibus, capi-

tulis sessilibus. Lin. suppl. p. 189. Planta pulchra quadrangularis.

40. *columnaris*, caule pollicari, fol. rotundis imbricatis, fasciculo subrotundo terminali. Lin. suppl. 191. Burm. afr. 19. t. 9. f. 2.

41. *hemisphaerica*, fol. connatis subrotundis ciliatis hemisphaerice imbricatis, caule aphylo thyrsifloro. Thunb. prod. 57.

42. *aloides*, fol. ovatis distinctis acutis ciliatis, caule simplici pilosiusculo, racemo composito, ramis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 394. Pedunc. divisi in cymas trieliotomas.

43. *capitella*, fol. oblongo-lanceolatis acutis connatis ciliatis, caule laevi, racemo elongato, flor. fasciculatis subsessilibus. Ait. Kew. 1. p. 394. Lin. suppl. 190. \odot

44. *Cotyledonis*, fol. connatis oblongis tomentosis ciliatis, caule subnudo, flor. corymbosis aggregatis. Lin. suppl. 190.

45. *barbata*, foliis connatis articulatis barbatis hemisphaericis imbricatis, caule subrotundo, flor. verticillatis. Lin. suppl. p. 188.

46. *ciliata*, fol. oppositis ovalibus planiusculis distinctis ciliatis, corymbis terminalibus. Lin. Plant. grass. ic. Dill. elch. 116. t. 98. f. 116. Hab. in Aethiopia et Cap. h. spec. Cor. flava.

47. *odoratissima*, fol. oppositis amplexicaulis, linearibus ciliatis, flor. capitatis. Andrew Repos. t. 26. Ad Cap. h. spec. Flor. lutei, odoratissimi praesertim nocte.

48. *thyrsiflora*, fol. perfoliatis ovatis ciliatis patulis, corymbo composito annuato. Lin. suppl. p. 90.

49. *spicata*, fol. connatis linearibus subulatis, scapo subnudo, spica verticillata, verticillis inferioribus remotioribus. Lin. suppl. p. 189.

50. *subulata*, fol. subulatis teretibus patentibus, caule herbaceo. L. Pet. gaz. t. 89. f. 8. Herm. lugdb. t. 552.

51. *acutifolia*, fol. oppositis carnosius tereti-subulatis patentibus, cyma parva pedunculata. Lam. enc. 1. p. Plant. grass. ic. Hab. . . Differt a priore flor. pedunculo nudo insidentibus.

52. *alternifolia*, fol. serrato-dentatis planis alternis, caule simplicissimo, flor. pendulis. L. Burm. afr. 58. t. 24. f. 1. Hab. in Aethiopia.

53. *rubens*, fol. fusiformibus sublepressis, cyma quadrifida foliosa, flor. sessilibus, staminibus reflexis. L. Plant. græc. ic. Scilicet caule hirsuto, ramis simplicibus, floribus in alis sessilibus. Hall. hist. n^o. 960. Scheuchz. it. 1. p. 48. t. 6. f. 3. 4. Lachenal. Act. helv. 7. p. 331. t. 11. Hab. in sylvaribus et ad rupes. Facie Sedi.

54. *cespitosa*, caule subdiviso, foliis globosis-subrotundis imbricatis, flor. terminalibus sessilibus. Willd. p. 1560. Cav. ic. 1. p. 50. t. 69. f. 2. Hab. in Hispania. ☉

55. *minima*, fol. petiolatis subrotundis integris, pedunc. unifloris. Thunb. prod. 57.

56. *moschata*, caule herbaceo procumbente, fol. connatis oblongis acutis, pedunculis axillaribus unifloris, flor. tetrandris. Willd. p. 1561. Forst. in Comment. Soc. Gott. 9. p. 26. Hab. in Terra del Fuego.

Obs. Forte a Crassulis distincta ob singularem filamentorum situm. Willd.

57. *verticillaris*, caule herbaceo, fol. patentibus, flor. verticillatis aristatis. L. Tillæa erecta. Hort. ups. 24. Hab. in Europa australi. Caul. ramosissimus, diffusus. ☉

58. *expansa*, fol. semicylindrico-subulatis supra canaliculatis patentibus, pedunc. axillaribus solitariis unifloris, caul. dichotomis. Ait. Kew. 1. p. 390.

59. *dentata*, foliis petiolatis cordatis, dentatis. Thunb. prod. p. 57.

60. *nudicaulis*, fol. subulatis radiculibus, caule nudo. Dill. elth. 116. t. 99. f. 155. Hab. in Aethiopia. ☿

61. *tecta*, foliis connatis ovatis obtusis cinereo-lamellosis, acapo nudo, capitulo terminali. Lin. suppl. 150.

62. *cephalophora*, fol. connatis lineariblongis obtusis integris, capit. lateralibus pedunculatis. Linn. suppl. 150.

63. *montana*, fol. connatis ovatis acutis ciliatis, caule subnudo, flor. aggregatis. Lin. suppl. 189.

64. *turrata*, f. l. connatis quadrifariam imbricatis ovato-oblongis acutis ciliatis. Lin. suppl. 189. ☉

65. *alpestris*, fol. connatis ovatis acutis quadrifariam imbricatis, capitulis pedunculatis, caule folioso. Lin. suppl. 189.

66. *marginata*, fol. connatis ovatis marginae membranaceis, pedunculis unifloris, caule debili. Thunb. prod. 58.

67. *tomentosa*, villosa-scabra, foliis connatis lanceolatis villosis ciliatis, caule subnudo terminato, spica verticillata. Lin. suppl. p. 190. Thunb. prod. 56.

68. *crenulata*, fol. connatis lanceolatis punctato-crenulatis, caule folioso, corymbo decomposito. Lin. suppl. 189.

69. *deltoidæa*, fol. connatis deltoidibus patulis acutis, caule tecto, flor. corymbosis. Lin. suppl. 189. Fol. ut in Menembr. deltoidæo.

70. *orbicularis*, sarmentis proliferis determinate foliosis, foliis patentissimis imbricatis ciliatis. Plant. græc. ic. Dill. elth. 119. t. 100. f. 118. Caul. nullus, sed propagines repentes orientes e fol. rosulis. Dec.

71. *sparsa*, fol. alternis subspathulatis acutis integerrimis, racemo composito. Ait. Kew. 1. p. 395.

72. *diffusa*, fol. ublongis basi attenuatis remote crenatis, pedunc. oppositis foliis axillaribusque solitariis. Ait. Kew. 1. p. 395.

73. *prostrata*, decumbens pellucida, fol. lanceolatis acutis. Thunb. prod. p. 54.

74. *pellucida*, fol. subpetiolatis ovato-lanceolatis, filiformi diffuso-pellucido. Thunb. prod. 54. Dill. elth. 152. t. 100. f. 119. Hab. ad Cap. b. ap. cum prioribus.

755. COMMERSONIA. Cal. monophyllus, corollifer. Petala 5. Nect. 5-partitum. Caps. 5-locularis, echinata.

1. *echinata*. Linn. suppl. 189. Lam. ill. t. 218. Rumph. 3. t. 119. Hab. in insulis Societatis. Arbor fol. alternis oblique ovatis, subius canis. Flor. minuti paniculati cani. L. h

756. SIBBALDIA. Cal. to-fidus. Petala 5, calyci inserta. Styli 6 latere germinis. Sem. 5.

1. *procumbens*, fol. ternatis 2 foliolis superne glabris subtus pilosis, flor. corymbosis, petal. lanceolatis acutis longitudine calycis. Willd. in Act. Soc. Ber. 2. S. procumbens, fol. tridentatis. Lin. Flor. Lapp. 111. Flor. dan. t. 32. Hab. in alpidibus. ☿

2. *parviflora*, procumbens, fol. ternatis 2 foliolis utrinque strigoso-pilosis tri-

dentatis, flor. glomerato-capitatis, petal. obovatis, cal. duplo brevioribus. Willd. in Act. Soc. Ber. v. 2. *Fragaria orientalis*, flore luteo minimo. Tournef. Cor. 21. Hab. in Capadocia.

3. *erecta*, erecta, foliolis linearibus multifidis. Gmel. sib. 3. p. 186. Amm. ruth. 112. t. 15. Hab. in Sibiria.

4. *altaica*, erecta, foliis linearifloribus tripartitis. Willd. p. 1567. Lin. suppl. 191. Pall. in Act. petrop. 1773. t. 18. f. 2. Hab. in alpinis Altaicis Sibiriae, Flor. purpurei. T.

DE/CAGYNIA.

57. SCHEFFERA. Cal. 5-dentatus, superus. Petala 5. Caps. 8-10-locularis: localis monospermis.

1. *digitata*. Forst. gen. 23. Willd. p. 1568. Lerm. ill. t. 221. Hab. in N. Zealandia. Arealiae species. Dryand.

POLYGYNIA.

58. MYOSURUS. Cal. 5-phyllus, deciduus, basi porrectus. Nect. (Petala) 5, lingulata, petaliiformia. Sem. numerosa, in receptaculo longo caudæformi.

1. *minimus*, fol. integerrimis linearibus.

Flor. dan. t. 406. Lam. ill. t. 221. Hab. in collibus apricis et agris. Vete. Variat stam. 5-8. Petala antheriformia. ©

59. CERATOCEPHALUS. Cal. 5-phyllus, persistens. Petala 5, poro ad ungue mellifero, squamula tecto. Semina plurima, per paria dorso adnata rostro urinaeiformi. Receptaculum demum elongatum, spicaeforme.

1. *falcatus* saepe erecto 1-floro, fol. radicalibus euneiformib. tripartito-multifidis. Ceratocephala spicata. Moench. meth. pl. p. 218. Ranunculus falcatus. Lin. Willd. Sp. II. 2. p. 13. Rcn. ceratocephalus. Moric. 2. 4. t. 28. f. 22. Boec. sic. t. 14. f. 3. Jacq. Flor. austr. 1. 48. Habitat inter segetes Europ. australioris et in Oriente. Quoad seipsum antecedenti generi affinis. Var. Stam. 5-8. ©

Obs. An euni Myosuro conjungi potest?

60. ZANTHORHIZA. Cal. 5. Petala 5. Nectaria 5, pedicellata. Caps. 5, monospermæ.

1. *apiifolia*. L'Herit. stirp. 1. p. 79. t. 38. Hab. in Nova Georgia et Carolina. Frutex humilis. Fol. Flor. atro-violacei paniculati. h

MONOGYNIA.

Execa quaedam. Prinos. Rubiae et Crucianellæ nonnullae. Pavetta pentandra. Oldenlandia pentandra. Loranthe quaedam species. Cornus albidæ. Frankenia laevis. Polycnemum oppositifolium. Cnossalpinia Crista, pentandra. Cassia pilosa, serpens, nictitans. Chamaecrista, Guilandinae & Hyperantherae quaedam. Ceratonia Siliqua. Bombax pentandrum. Polygonum amphibium, Lappathifolium. Samara floribunda, pentandra. Passerina pentandra. Trianthema crystallina. Citharexylum pentandrum.

DIGYNIA.

Apocynese, nonnulla genera secundum Linné. Oldenlandia digyna. Zizyphi (Rhamnus). Cissus hederacea, Ampelopsis, stans (Vitis arborea. L.) Brunia nodiflora, palaeacea (quæ digynæ). Polygonum filiforme. Scleranthus annuus. Trianthema 5-andra. Polygonum virginianum, etc.

TRIGYNIA.

Polygonum ocreatum. Hydrolea trigyna. Miuartha montana. Arenaria rubra,

tenuifolia. Rhamnus Paliurus. Celastrus. Euphorbia antiquorum, maculata, articulata, cyparissias? Arelia capitata. Salsola salsa, fruticosa. Xylophyllae. Lin.

P E N T A G Y N I A.

Spergula arvensis, pentandra. Cerastium pentandrum, semidecandrum. Suriana maritima. Mesembryanthemum pinnatifidum. Erodium. Actinophyllum pentandrum. Maherniae. Lin.

P O L Y G Y N I A.

Ranunculus hederaceus.

C L A S S I S V I.

H E X A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

761. MUSA. *Spatha* supera. *Cor.* 2-petala : petalo altero erecto 5-dentato, altero concavo nectarifero. *Stam.* 6 quorum nunc 1, nunc 5 perfecta (ex LINNÆO); *Bacca* oblonga, triquetra, polysperma.

1. *paradisica*, spadice nutante, flor. masculis persistentibus. Lin. Trew. Ehr. 1. 18-20. M. cliffortiano. Læo. Mus. 1. t. 1. *fructu* maiore. Plum. N. genera p. 24. Hab. in utraque India et Africa. In caldariis communiter colitur. $\overline{\text{E}}$

2. *sapientum*, candide maculato, spadice nutante, flor. masculis deciduis. Lin. Trew. Ehr. 4. t. 21-23. Sloan. Jam. hist. 2. p. 147. Hab. in Amer. orientali.

3. *troglodytarum*, spadice erecto, spathis deciduis. Lin. M. uranoscopus. Rumph. 5. p. 137. t. 61. f. 2. Hab. io Moluccis. Fruct. parvus, irregularis rubicund. striis nigricantibus. $\overline{\text{E}}$

4. *coccinea*, spadice erecto, flor. capitatis, spat. confertis coccineis maximis apice luteis. Andrew. 1. 47. Hab. in China, Sumatra, Java, etc. *Stam.* 5. Germen ovatum, laeve. Stigm. capitatum, laeve.

5. *humilis*, spadice suberifloro, bacca violacea. Aubl. Guj. 2. p. 931. Hab. in Gujana. \dagger

Obs. De priore hujus generis specie consuli meretur C. Melicus Pflanzen-Physiologische Beobachtungen. 1803. Secundum ejus autorumque observationes hoc genus melius ad Pentandriam transferri debet.

762. URANIA. *Cal.* 6. *Cor.* tripetala. *Nectar.* 2-phyllosum : foliolo altero bifido. *Caps.* infera, trilocularis, polysperma. *Semina* biserialia, arillo tecta.

1. *speciosa*. Willd. Sp. pl. II. 1. p. 7. *Ravenalia* madagascariensis. Sonner. it. ind. 1. 124. 125. Jus. gen. Jacq. hort. Schoenh. 1. t. 93. Hab. in Madagascariæ locis paludosis. Arbor facie Musæ vel Heliconiæ, altissima. $\overline{\text{h}}$

763. BROMELIA. *Cal.* 3-fidus, superus. *Petala* 3. *Squamæ* nectarifera ad basin petali. *Bacca* trilocularis.

1. *Ananas*, fol. ciliato-spinosis mucronatis, spica comosa. L. Willd. Sp. pl. p. 7. Comm. hort. 1. t. 57. Trew. Ehret. 1. 2. Blackw. 1. 567. *fr.* *inermis*, fructu comoso, fol. inermibus. *Ananas* lucide virens, folio vix serrato. Dill. elth. 25. t. 21. f. 22. A. lucida. Mill. dict. n. 4. Hab. in Amer. australi. Flor. violacei. $\overline{\text{h}}$

2. *Pinguin*, fol. ciliato-spinosis mucronatis, racemo terminali. Jacq. amer. ed. picta. t. 91. Trew. Ehr. 1. 51. *Pinguin*. Dill. elth. 320. t. 240. f. 311. Hab. in Jamaica, Barbados. Pro æpibus-vivis adhibetur. $\overline{\text{h}}$

3. *incarnata*, fol. serrato-spinosis obtusis cum acumine, racemo simplici flexuo o, bract. inferiorib. maximis lanceolatis. Flor. Pertiv. 3. p. 32. 1. 252. Hab. io Andium nemorib. supra arbores. Petal. purpureo-violacea. Bacc. canescens.

4. *sphacelata*, fol. ensiformib. acutissimis ciliato-aculeatis, spic. axillarib. conico-truncatis, bract. medio sphacelatis.

flor. Peruv. l. c. In regn. Chilens. umbrosis et subhumidis. Bract. basi albescens. Pet. purpurea.

5. *bicolor*, fol. ensiformib. ciliato-aculeatis: interiorib. puniceis, flor. aggregato-conicis, bract. oblongis. Flor. Peruv. l. c. p. 31. Hab. in R. Chilens. litiorib. supra saxa, Bacc. incana. Pet. caerulea.

6. *Karatas*, fol. erectis, flor. acanthis sessilibus aggregatis. Jacq. amer. Hort. 31. 32. Hab. in Amer. meridionali. Stolones inter folia, peracto fructu, radicanes, propagantes plantam.

7. *lingulata*, fol. serrato-spinosis, obtusis, spicis alternis. Plum. gen. 26. ic. 64. f. 1. Cum priore. Hab. in Amer. meridionali. h

8. *bracteata*, fol. serrato-spinosis, bracteis ovato-lanceolatis, scapo elongato, racemo composito, racemulis subdivisis, flor. sessilibus. Swartz. Houst. reliq. p. 7. t. 16. Hab. in rupestribus et in Jamaica et Vera Cruce. Bract. coccineae. h

9. *paniculigera*, fol. serrato-spinosis bracteis lanceolatis, racemo composito, racemulis subdivisis, flor. pedunculatis. Swartz. Fl. ind. occid. t. p. 585. Hab. in America. Bracteae lato-lanceolatae semipedales, coccineae. h

10. *chrysantha*, fol. serrato-spinosis, bracteis lanceolatis dentatis, racemo subcomposito fol. brevioris, flor. pedunculatis. Willd. p. 5. Jacq. Schoenb. t. p. 28. t. 55. Hab. ad Caracas. Bract. flavescens densatae. h

11. *humilis*, subcaulis, flor. aggregatis sessilibus, axillis stoloniferis. Jacq. Misc. 2. p. 325. Ic. rar. t. 1. 60. Hab. . . h

12. *Acauga*, panicula diffusa, fol. ciliato-spinosis mucronatis recurvatis. Caraguata. Pis. bras. 90. t. 91. Moris. 8. 4. t. 22. f. 7. Hab. in Brasilia. h

764. **PITCAIRNIA**. *Cal.* 3-phyllus semispermus. *Petala* 3. Squama nectarifera ad basin petalorum aut o. *Stigmata* 3, contorta. *Caps.* 3, introrsum dehiscens. *Sem.* alata, aut utrinque in setam longam terminata.

1. *bromeliatfolia*, fol. ciliato-spinosis, pedunculis germinibusque glaberrimis. Ait. Kew. t. p. 401. Schneev. ic. fasc. 4. t. 15. L'Herit. sect. angl. p. 7. t. 11. Hepetis an-

gustifolia. Swartz. prod. 55. Hab. in Jamaica, ad rupes umbrosas. h

2. *angustifolia*, fol. ciliato-spinosis, pedunculis germinibusque tomentosis. Ait. Kew. t. p. 401. Hab. in insula St. Cruce. h

3. *latifolia*, fol. integerrimis, basi sub-spinosis. Ait. l. c. Wendl. Hort. Herrenh. t. 3. Bromelia nudicanlis. Lin. Habit. in Amer. meridion. Flor. spicatis coccinei. Fl. byeme.

4. *lanuginosa*, scapo racemoso-spicato simplicissimo, fol. angustis ensiformibus subtus lanuginosis ultra basin aculeatis. Flor. Per. 3. p. 35. t. 258. Hab. ad Poruza nemora supra saxa. Flor. violacei. Tr

5. *pulverulenta*, scapo paniculato composito, fol. ensiformib. subtus pulverulentis: inferioribus petiolatis. Flor. Per. 3. p. 36. t. 259. In Andium pemonibus. Flor. punice.

6. *paniculata*, scapo paniculato, panicula decomposita, fol. ensiformib. serrato-aculeatis pulverulentis. Flor. Per. l. c. t. 260. Cor. coccinea. Hab. in Andium montibus.

7. *ferruginea*, scapo paniculato, panicula diffusa, fol. ensiformib. aculeatis, flor. recurvo-falcatis. Flor. Per. l. c. Hab. in collib. aridis prope Limam urbem. Cor. subpurpurea.

† *Cal. infero, tripartito. Anther. incumbentibus linearibus. Caps. valvis septiferis. Flor. Per. (Pourretia.)*

8. *crystallina*, spica maxima thyrsoides, fol. ensiformib. aculeatis, cal. lanatis. Pourretia lanuginosa. Flor. Peruv. 3. p. 33. t. 258. Hab. in Peruviae nemorosis et collibus. Cor. obscura viridis. Ex spica gummi crystallinum undique profluit. *loc. cit.*

9. *pyramidata*, spica pyramidata, fol. ensiformib. margine purpureis aculeatis, cor. luteo-virentibus. Flor. Peruv. p. 34. sub Pourretia uti sequens. Hab. in Peruv. montibus supra saxa.

10. *coarctata*, spica composita coarctata, fol. ensiformib. aculeatis, cor. luteis ad basin macula purpurea. Flor. Per. l. c. Rencalmia. Fewill. 3. p. 59. t. 39. Puya. Molln. Hist. Chil. Puya Chilensis. Gmel. syst. II. p. 553. Hab. in regn. Chilensis collib. aridis. Chilensis caule substantia suberoso, ad vascula varia formanda utuntur. Tr

765. **GUZMANNIA**. *Cal.* inferus tripartitus: laciniis convolutis. *Petala* 3, in tubum convoluta.

Antherae in cylindrum coalitæ.
Caps. 3-locularis, trivalvis. *Sem.*
 numerosa, oblonga, nuda.

1. *tricolor*, scap. tricolore, fol. iner-
 mibus. Flor. Peruv. 3. p. 39. t. 261.
 Pourretia sympagantera. Syst. veg. Flor.
 Peruv. et Chil. p. 82. Hab. in Peruviae
 montib. ad arborum truncos. Cor. alba,
 ephemera. \mathcal{T}

766. *ÆCHMEA*. *Cal.* inferior
 (aut squama germen amplectens)
 monophyllus. cyathiformis sub-
 trifidus: *superior* tripartitus cor-
 riaceo-scarious: laciniis margine
 convolutis. *Petala* 3. *Squamæ* 2,
 ad basin singuli petali. *Caps.* 3-
 locularis, 3-valvis. *Sem.* oblo-
 vata, pulpa molli nidulantia.

7. *paniculata*, scap. paniculato-race-
 moso, fol. ensiformibus carinatis aculeatis.
 Flor. Per. 3. p. 37. t. 264. Hab. in Andium
 nemorib. supra arbores. Cor. luteo-virens.
 Flor. marcescendo spiralliter convoluti.

767. *TILLANDSIA*. *Cal.* 3-fidus,
 persistens, subconvolutus. *Cor.* 3-
 fida, campanulata. *Caps.* 1-3-
 locularis. *Sem.* comosa.

7. *utriculata*, culmo penicillato, fol.
 amplioribus attenuatis basi ventricosis, spica
 assurgenti compressa brachiata, flor. sub-
 sessilibus. Brown. jam. 1804. Willd. Sp. II.
 p. 11. Hab. in Americæ meridionalis arbo-
 ribus. \mathcal{T}

2. *serrata*, fol. superne serrato-spinosis,
 spica comosa. Plum. gen. 10. ic. 7a. f. 1.
 Hab. in America meridionali.

3. *lingulata*, fol. lanceolato-lingulatis
 integerrimis: basi ventricosis. Jacq. amer.
 92. t. 62. Ed. picta. t. 92. Plum. gen. 10.
 ic. 74. Sloan. jam. 77. hist. 1. p. 189. t. 110.
 In Amer. meridion. arborib. vetustis para-
 sitica.

4. *tetrantha*, erecta, scapo flexuoso,
 pedunc. ex spatulis quadrifloris reflexis.
 Flor. Peruv. 3. p. 39. t. 265. Hab. in Andium
 nemorib. supra arbores et saxa. Petal. vio-
 lacea.

Obs. Utriculus ab omnium foliorum con-
 volutione formatus aqua repletur, quam
 per plures dies retinet.

5. *rubra*, panic. simpliciter rubra, spic.
 indivisa, fol. ensiformibus subacuminatis,

Flor. Peruv. In Peruv. præruptis calidis ad
 Tarmæ tractus. Petal. purpureo-vioacea.

6. *maculata*, panic. composita, spic.
 subdivisis, fol. lanceolato-ensiformibus
 maculatis. Flor. Peruv. 3. p. 40. t. 267.
 In Andium nemorib. supra saxa et arbores.

Obs. Etiam in hac specie aqua pluvialis
 in folior. uracolo colligitur. Supra parietes
 et templorum porticus ab indis transfertur,
 ubi, ornamenti causa, viget. l. c.

7. *biflora*, scap. racemoso, flor. gemi-
 nis, fol. ensiformib. acutis. Flor. Per. p. 41.
 t. 268. Cum priore. \mathcal{T}

8. *parviflora*, panic. simpliciter spicul. 3-
 7, flor. distichis, fol. subulatis basi am-
 plissima. Flor. Per. l. c. t. 269. Petal. albidia.
 Fol. canescens, squam. furfuraceis. \mathcal{T}

9. *heptantha*, spic. septemflora disticha,
 petal. albis apice violaceis, fol. ensiformib.
 subulatis acutissimis. Flor. Per. p. 41. In
 Peruv. præruptis calidis.

10. *purpurea*, panic. polystachia rosa-
 cea, flor. distichis, fol. ensiformi-subu-
 latis recurvis. Flor. Per. t. 270. Hab. in
 saxosis et arenosis locis, et collibus. Pet.
 lamina purpurea.

11. *sessiliflora*, scapo spicato simpliciter,
 flor. solitariis sessilibus, fol. sublingulatis
 retusis. Flor. Per. 3. p. 42. t. 271. In Peruv.
 locis calidis. Flor. bract. concavis suffulti. \mathcal{T}

12. *tenuifolia*, spicis alternis imbricat-
 is, flor. distichis, fol. linearifiliformibus
 erectis, apice setaceis. Swartz. fl. ind. occ. 1.
 p. 592. Plum. gen. 37. ic. 23a. f. a. Sloan.
 jam. t. 122. f. 1. Cum priore.

13. *flexuosa*, spicis laxis flexuosis, flor.
 distichis remotissimis, foliis lanceolato-
 linearibus reclinalis, caule apice subdiviso.
 Swartz. p. 590. T. *tenuifolia*. Jacq. amer.
 p. 97. t. 63. Ed. p. Hab. in arborum ramis
 Jamaicae et Carthagenae.

14. *setacea*, spica simpliciter, spatibus di-
 stichis imbricatis, fol. linearifiliformibus
 reclinalis glabris. Swartz. l. c. Hab. in Ja-
 maicae arboribus. Similis T. *tenuifoliae*. \mathcal{T}

15. *paniculata*, fol. radicalibus brevissi-
 mis, culmo subnudo, ramis subulicis
 ascendentibus. L. Plum. gen. 27. ic. 237.
 Hab. in America meridionali.

16. *fasciculata*, spicis lateralibus dis-
 tichis imbricatis, fol. lanceolato-subulatis
 erectis strictis. Fl. ind. occid. 1. p. 586. T.
clavata. Lam. Hab. in maritimis Jamaicae,
 arboribus adhaerens. Swartz. l. c. \mathcal{T}

17. *nutans*, spicis subdivisis nutantibus, flor. distinctis ovatis, fol. ovato-lanceolatis membranaceis, canle subnudo. Swartz. Fl. ind. oecid. t. p. 586. Hab. in mortuis Jamaicae ad arborum ramos. $\overline{\text{U}}$

18. *polystachya*, culmo spicis imbricatis lateralibus. L. Plum. gen. 37. Hab. in Amer. calidior.

19. *monostachya*, fol. linearibus canaliculatis reclinatis, culmo simplici imbricato, spica simplici. L. Plum. gen. 37. ic. 238. f. 1. Hab. in America meridionali. Flor. nivei.

20. *pruinosa*, spica simplici, spathis imbricatis, fol. lanceolato-linearibus reclinatis, spathisque squamuloso-tomentosis. Swartz. Flor. ind. oecid. t. p. 593. In arborum ramis vetustis Jamaicae. Non confundenda cum *T. recurvata* Sw. $\overline{\text{U}}$

21. *canescens*, spicis subternis, fol. linearibus cretius caulem aequantibus inanis. Swartz. Flor. t. p. 595. Hab. ad maris littora Jamaicae in arboribus. *T. polystachya* proxima. $\overline{\text{U}}$

22. *angustifolia*, spicis fasciculatis, fol. lineari-lanceolatis suberectis glabris caulem superantibus. Swartz. l. c. Hab. in Jamaica et Hispania. Distinguenda a *T. polystachya*. $\overline{\text{U}}$

23. *capillaris*, canl. dichotomo, pedunc. subunifloro capillari, fol. triplo longiori glabro, fol. lineari-subulatis. Flor. Per. p. 42. 271. In Peruv. locis calidis, frequens in muris et supra saxa, arbores. Caespitosa, squamis furfuraceis densis tecta. Sequenti affinis.

24. *recurvata*, pedunc. bifloro, fol. paullo longiori leproso, fol. subulatis declinatis erectisque. Flor. Per. t. 271. Lin. Sp. pl. 2. p. 7. Sloan. Jam. hist. t. p. 190. t. 127. f. 1. Hab. in Jamaicae et Peruviae locis calidiorib. supra arbores. saxa et parietes. Cal. purpurasc. Pet. violacea. $\overline{\text{U}}$

25. *virescens*, pedunc. 1-floro longitudine fol.; bract. solitaria convoluta, fol. lineari-subulatis. Flor. Peruv. p. 43. t. 270. Caps. virgescens.

26. *Usneoides*, pedunc. 1-floro brevi, canl. ramoso filiformi flexuoso pendulo, fol. subulato-filiformibus. Flor. Peruv. p. 43. *T. usneoides*, filiformis ramosa intorta scabra. Lin. Willd. l. c. p. 15. Sloan. l. c. t. 122. f. 2 et 3. Cuscuta. Pluck. alm. t. 26. f. 5. Hab. in America.

Obs. Incolae hac planta contra haemorrhoidas utuntur. Etiam ad varias res, na-

tura praesertim fragiles, transportandas frequenter sumitur.

768. XEROPHYTA. Cor. 6-partita aequalis, tribus laciniis exterioribus angustioribus. *Stigm.* clavatum. *Caps.* scabra, infera, 3-locularis, polysperma.

1. *pinifolia*. Juss. Willd. Sp. II. p. 15. Lam. ill. gen. t. 225. Hab. in Madagascar. Arida, ramis alternis. Fol. linearis, pungentia. $\overline{\text{H}}$

769. BURMANNIA. Cal. prismaticeus, coloratus, 5-fidus: angulis membranaceis. *Petala* 3. *Caps.* 3-loculari, recta. *Sem.* minuta.

1. *disticha*, spica gemina. Burm. zeyl. 50. t. 20. f. 1. Willd. p. 16. Hab. in Zeylonae paludosis. $\overline{\text{U}}$

2. *biflora*, flor. gemino. L. Mill. dict. n°. 2. Hab. in Virginiae paludosis.

770. TRADESANTIA. Cal. 3-phyllus. *Petala* 3. *Filamenta* villosis articulis. *Caps.* 3-locularis.

1. *virginica*, erecta, fol. lanceolatis glabris, flor. umbellato-congestis terminalibus. Willd. Sp. II. p. 16. Moris. s. 15. t. 2. f. 4. Hab. in Virginia. Flor. pubescentes. $\overline{\text{U}}$

2. *rosea*, erecta, fol. lanceolatis (gramineis), umbel. terminalibus paucifloris involucri longioribus. Vent. Hort. Cels. p. 24. t. 24. Michaux. Flor. t. p. 193. Hab. in Carolinae et Georgiae sabulosis subudis. Fol. longa. Cor. rosea. \odot

3. *latifolia*, canl. erecto simplici, fol. lanceolato-ovatis, flor. terminalibus subumbellatis involucris. Flor. Peruv. 3. p. 44. t. 272. Hab. in Peruviae collibus, et in montibus Lima. Cal. hirsutus, viscosus. Petal. violacea. Styl. incurvus. \odot

4. *crassifolia*, erecta, fol. ovatis margine et subtus lanatis, flor. umbellato-congestis terminalibus. Willd. p. 17. Cav. ic. t. p. 54. t. 75. Hab. in Mexico. Caul. lanatus, ramosus. Flor. maxim. $\overline{\text{U}}$

5. *erecta*, erecta, fol. ovatis basi angustatis glabris, pedunculo terminali nudo bifido racemoso. Willd. Cav. ic. t. p. 53. t. 74. Jacq. ic. rar. 2. t. 354. Coll. 4. p. 114. *T. undulata*. Vahl. Act. Haf. 2. P. 2. p. 27. t. 3. *T. lida*. Roth. catal. bot. 1. p. 42. Cum priore.

6. *discolor*, aculis laevis, bracteis equitantibus compressis, fol. lanceolatis carnosius subtus coloratis. Smith. Icon. pict. p. 10. t. 10. Swartz. l. c. p. 607. L'Herit. sert. du gl. p. 8. t. 12. Hab. in America meridionali, in regionibus sinu Mexicano proximis. ☞

7. *malabaria*, erecta laevis, pedunc. solitariis longissimis. Sp. pl. 412. Rheed. g. t. 63. Hab. in Malabar. ☞

8. *nervosa*, scapo unifloro. L. Mant. 223. Hab. in Surate? Caul. diffus. Stamina 6; pilis violaceis. Stylus apice hamosus.

9. *divaricata*, caule dichotomo, fol. ovato-lanceolatis glabris, vaginis villosis, florib. paniculatis, filamentis glabris. Vahl. eclog. 1. p. 34. Commelina hexandra. Aubl. gujan. 1. p. 35. t. 12. Hab. ad fluviorum ripas Gujanae, Cajenae, inque insula Trinitatis.

10. *geniculata*, procumbens hirsuta. L. T. caule paniculato, basi repente. Jacq. numer. 94. t. 64. Plum. ic. 116. f. 2. Hab. in America meridionali. ☞

11. *monandra*, diffusa, fol. ovatis acuminatis, pedunc. axillaribus multifloris, flor. monandris. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 597. Hab. in nemoribus montium Hispaniolae occidentalis. Filam. huic et a sequentibus glabra sunt. ☞

12. *multiflora*, erecta ramosa, fol. cordatis margine vaginisque ciliatis, pedunc. confertis axillaribus, flor. triandris. Swartz. l. c. p. 569. Hab. in umbrosis sylvaticis montium Jamaicae.

13. *cordifolia*, repens filiformis, fol. cordatis, pedunculis terminalibus solitariis multifloris. Swartz. Flor. i. p. 601. Hab. in montibus altis Jamaicae, locis umbrosis graminosis humidis. ☞

14. *procumbens*, caule procumbente radicante, fol. ovatis basi ciliatis vaginatis, pedunc. cymosis axillaribus, flor. 6-andris. Willd. Sp. p. 19. T. *multiflora*. Jacq. ic. 2. t. 355. Ej. Collect. 3. p. 226. Hab. ad Caracas. ☞

15. *parviflora*, repens, fol. ovato-oblongis; floriferis subcordatis, pedunc. umbellatis axillaribus. Flor. Peruv. 3. p. 43. t. 272. f. 2. Hab. in Peruvia. Filam. 3. glabra, 3-lirsuta. Fol. subtus purpurascens.

16. *axillaris*, caule ramoso basi repente, flor. sessilibus lateralibus. L. Pluck. alm. 135. t. 174. f. 3. Rheed. 10. t. 13. Hab. in India. Fol. linearia, vaginis coloratis longius ciliatis. Stylus clavatus. ☞

17. *formosa*, fol. oppositis connatis. T. *nodiflora*, caule simplici flexuoso, foliis brevissimis margine et vagina villosis, flor. axillarib. sessilibus glomeratis. Lam. enc. 2. p. 367. Hab. ad Cap. b. spei. Stylus apice barbatus.

18. *cristata*, repens laevis, spathis diphyllis imbricatis. Jacq. Hort. t. 137. Commelina cristata. L. Hab. in Zeylona. Filam. pilis caeruleis cor. breviora. Stylus clavatus. Stigma tubulosum, crenatum. ☞

19. *papilionacea*, repens laevis, spathis triphyllis imbricatis. Burm. ind. 17. t. 7. f. 1. Hab. in India. Spatha refert florem papilionaceum. Cor. violacea. Stam. breviores. ☞

ZANONIA. Cal. 3-partitus. Cal. 3-petala, demum haecans. Filam. villosa. Anth. geminae uniformes. Caps. 3-locularis, corolla laccante inclusa. Zan. *bibracteata*. Cramer Eumer. pl. p. 95.

19. *Zanonia*, erecta, fol. lato-lanceolatis, pedunc. lateralibus solitariis medio geniculatis, bract. geminis. Swartz. prodr. p. 57. Willd. p. 17. Commelina Zanonia. Lin. Z. graminea perfoliata. Plum. gen. 38. Sloan. hist. 1. t. 147. f. 1. Hab. in Jamaicae australioris nemorib. et in Guiana. Caul. altissimus.

771. POLLIA. Cor. infera, 6-petala. Pet. 3-exteriora majora. Bacc. polysperma.

1. *japonica*. Thunb. Dist. acad. 1. p. 13. Flor. japon. p. 138. Caul. articulatus villosus-asperatus. Flor. verticillato-corymbosi. Th. Hab. in Japonia.

772. MNASIUM. Spatha 2-valvis multiflora. Cal. 2-partitus. Cor. 1-petala, tubo brevissimo, tridentata. Antherae foliolo terminatae. Stigm. 3, spiraliter contorta.

1. *padulosum*. Willd. Sp. II. p. 22. Rapaia padulosa. Aubl. guj. 1. p. 305. t. 118. Lam. ill. t. 276. Hab. in sylvis padulosis Gujanae. Habitat Pontederiae. Cal. squamis imbricatis. Cor. flava. ☞

773. PONTEDERIA. Cor. 1-petala, 6-fida, bilabiata. Stamina 3, apici, tubo corollae inserta. Caps. 3-locularis.

1. *rotundifolia*, fol. orbiculato-cordatis. Lin. suppl. 192. Willd. l. c. Hab. in

Surinamo. Cor. sexfida inequalis, facie floris neutri Centauraeae cyani. L.

2. *azurea*, fol. subrotundo-ellipticis, basi petiolique incrassatis, flor. spicatis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 607. Hab. in fossis Jamaicae. T.

3. *vaginalis*, fol. cordatis, racemo cernuo. Pluck. alm. 215. t. 215. f. 4. Rumph. amb. 6. p. 178. t. 75. f. 1. Rheed. mal. 11. t. 44. Hab. in Indiae orientalis aquis. T.

4. *limosa*, fol. cordato-ovatis, scapis lateralibus unifloris, flor. triandris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 611. Sloan. hist. 1. t. 149. f. 1. Hab. ad ripas limosae fluviorum Jamaicae, Hispaniolae. T.

5. *cordata*, fol. oblongo-cordatis, flor. spicatis. Lam. ill. t. 225. Les Liliacées. t. 72. Moris. 3. 15. t. 4. f. 8. Hab. in Virginiae aquis. T.

6. *hastata*, fol. hastatis, flor. umbellatis. L. Conf. Willd. p. 24. Pluck. alm 326. t. 220. f. 8. Moris. 3. 15. t. 4. f. 7. Hab. in India. T.

774. **HÆMANTHUS**. *Involucr. polyphyllum, multiflorum. Cor. 6-partita, supera. Bacca 3-lobularis.*

1. *coccineus*, fol. linguiformib. planis laevib. humi adpressis bifariis, umb. coarctata fastigiata involucri breviori, limbo patulo. Ait. Kew. 1. p. 304. Willd. p. 24. Comm. hort. 2. p. 127. t. 64. Les Liliacées. t. 29. Hab. ad Cap. b. spei. T.

2. *coarctatus*, fol. linguiformi-oblongis planis laevibus apice callosis erectis, umb. coarctata fastigiata invol. breviori, limbo erecto. Willd. p. 25. Hab. ad Cap. b. spei. T.

3. *punicus*, fol. oblongis ellipticis acutis retusis undulatis, umb. coarctata fastigiata, limbo staminibusque erectis. Ait. Kew. 1. Willd. p. 404. Dill. clib. 167. t. 140. f. 2. Trew. Ebrēt. t. 44. Hab. ad Cap. b. spei. T.

4. *multiflorus*, fol. elliptico-lanceolatis acutis concavis erectis, umbella multiflora involucri longiore, pedunculis articulis, limbo patulo, staminibus adscendentibus. p. 25. Seda mus. 1. p. 20. t. 12. f. 1. 2. 3. Swert. floril. 1. f. 3. Moris. 3. 12. t. 12. f. 11. Rndb. clys. 2. p. 210. f. 3. Hab. in Sierra Leone. T.

5. *tigrinus*, fol. linguiformibus planis glabris margine ciliatis depressis, umbella coarctata, limbo staminibusque erectis. Willd. H. *tigrinus*, fol. oblongis ciliatis subtus maculatis scapo maculato, umb.

coarctata. Jacq. Schoenh. 1. p. 29. t. 56. Hab. ad Cap. b. spei. T.

6. *quadrivalvis*, fol. oblongis basi angustatis planis patulis superne villosis, margine ciliatis, involucri tetraphyllo umbella coarctata longiore, limbo staminibusque erectis. Willd. Jacq. 1. c. p. 30. t. 58. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. superne apicem versus albo-villosa. W.

7. *pubescens*, fol. oblongo-lanceolatis, undique hirsutis, umbella fastigiato-rotundata, limbo staminibusque erectis. Ait. Kew. 1. p. 404. Lin. suppl. 193. Hab. ad Cap. b. spei. T.

8. *ciliaris*, fol. lanceolatis glabris ciliatis, involucri lato umbella rotundata breviori, limbo reflexo. Ait. Kew. 1. p. 404. Amaryllis ciliaris. Lin. suppl. 195. Bceyn. cent. 1. 39. Hab. ad Cap. b. spei. T.

9. *albiflos*, foliis ellipticis acutiusculis planis glabris margine ciliatis, involucri tetraphyllo umb. rotundata breviori, limbo patulo. Willd. p. 27. Jacq. hort. Schoenh. 7. p. 31. t. 59. Hab. ad Cap. b. spei. T.

10. *toxicarius*, fol. bifariis oblongis planiusculis glabris, pedunculis spatha floreque longioribus. Ait. Kew. 1. p. 405. Amaryllis dinicha. Lin. suppl. 195. Patter. iter. t. 1. Hab. ad Cap. b. spei in regione Rogge-Veld. Flor. incarnati. T.

11. *lancaeifolius*, fol. ellipticis basi attenuatis depressis planis glabris, margine ciliatis, pedunc. spatha floreque longioribus, limbo patente. Willd. Jacq. Schoenh. 1. p. 31. t. 60. Hab. ad Cap. b. spei. T.

12. *carinatus*, fol. linearibus carinatis. Mill. Cum priore. †

13. *pumilio*, foliis linearibus lanceolatis erectis glabris, pedunc. spatharum florumque longitudine, limbo patenti. Willd. H. *pumilio*, fol. linearibus lanceolatis glabris falcatis, umbella pauciflora. Jacq. 1. c. p. 32. t. 61.

14? *spiralis*, fol. setaceis, scapo filiformi basi spirali flexuoso, involucris subulatis umbella uni-quadriflora brevioribus. Ait. Kew. 1. p. 405. Crinum tenellum. Jacq. ic. rar. 2. t. 363. Collea. suppl. p. 43. Cr. spirale. Andrew. t. 92. Ad Cap. b. spei. T.

775. **MASSONIA**. *Cor. infera limbo 6-partito. Filamenta collo tubi imposita. Capsula 3-alata 3-lobularis polysperma.*

1. *latifolia*, fol. subrotundis patentibus, laciniis corollae patulis. Ait. Kew. 1. p. 405.

t. 3. Willd. Sp. II. p. 28. Thunb. Diss. Nor. pl. gen. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *angustifolia*, fol. oblongo-lanceolatis erectis, lacinis cor. reflexis. Ait. Kew. t. p. 405. t. 4. M. *lanceolata*. Thunb. Flor. umbellati.

3. *violacea*, fol. ovatis, erectis, flor. racemoso-corymbosis. Andrew. t. 46. Ad Cap. b. spei.

4. *undulata*, fol. lanceolatis undulatis glabris. Hab. in Cap. b. spei interiore.

5. *echinata*, fol. ovatis mucicatis pilosis. Lin. suppl. 113. Hab. in Cap. b. spei, ad margines montis Bocklands-Berg. Flor. glomerati inter folia. T

776. GALANTHUS. *Petala* 3, concava. *Nectarium* ex petalis 3, parvis, emarginatis. *Stigma* simplex.

1. *nivalis*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 29. Jacq. austr. t. 330. Hab. in nemorosis et in pratis Europae australioris. Flor. primo vere. T

777. LEUCOIUM. *Cor.* campaniformis, 5-partita, apicibus incrassata. *Stigma* simplex.

1. *vernum*, spatha uniflora, stylo clavato. Jacq. austr. t. 312. Lam. ill. t. 230. f. 1. *Nivaria*. Moench. meth. p. 229. Hab. in sylvis.

2. *aestivum*, spatha multiflora, stylo clavato. Jacq. austr. t. 202. Lam. ill. t. 320. f. 2. Hab. in Europa austral.

3. *autumnale*, spatha monophylla biflora, petal. ovatis apice tridentatis, stylo filiformi. Schousb. Maroc. p. 139. Label. ic. 124. Hab. in Hispania, Lusitania et Barbariae locis aridis. Flor. autumnis sub finem. M. octobr.

4. *trichophyllum*, spatha diphylla biflora, petal. lanceolatis acutis stylo filiformi. Schousb. l. c. p. 140. Cresc. in Barbaria in campis aruosis region. Tingitanæ prope Schnarf el Kanb. Fl. januario.

778. STRUMARIA. *Cor.* hexapetala patens. *Styl.* infra medium incrassatus, s. cum filamentis coherens. *Stigma* 3-fidum. *Cap.* infera subrotunda 3-locularis.

* *Styli struma cum filamentis connata.*

1. *linguae-folia*, fol. linearibus ensiformibus rotundato-obtusis planis, scapo ter-

retti, superne compresso, stam. longitudine corollae. Willd. Sp. 2. p. 31. S. *linguae-folia*, stylistruma cum filamentis connata nuncque acuta, fol. linguaciformibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 356. Collect. suppl. 45. Hab. ad Cap. b. spei cum sequentibus speciebus. *Cor.* candida apicibus virescens. T

2. *truncata*, fol. linearibus ensiformibus rotundato-obtusis planis, scapo compresso, staminib. cor. longioribus. Willd. S. *truncata*, styli struma cum filam. connata superne truncata. Jacq. ic. rar. 2. t. 357. *Cor.* candida externe basi rubicunda. T

3. *rubella*, fol. linearibus oblique flexis, petalis planis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 356. Collect. suppl. 46. Spathae violaceae. *Cor.* incarnata. T

4. *angustifolia*, fol. linearibus planis, germine triglanduloso. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 356. Collect. suppl. 48. Spathae rubicundae. *Cor.* candida externe linea rubicunda.

* * *Styli struma a filamentis libera.*

5. *undulata*, foliis linearibus oblique flexis, petalis undulatis. Willd. p. 32.

6. *filifolia*, fol. filiformibus, petalis acutis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 361. Coll. 3. p. 222. Leucium strumosum. Ait. Kew. t. p. 407. t. 5. Crinum tenellum. Lin. suppl. 194.

779. TULBAGIA. *Cor.* infundibulif. Limbo 6-fido. *Nectarium* coronans faucem, 3-phyllum: foliolis bifidis magnitudine limbi. *Cap.* supera.

1. *alliacea*, nectario monophyllo sexdentato, fol. ensiformibus, flor. cernuis. Thunb. prod. 60. Jacq. hort. 2. p. 52. t. 115. Hab. ad Cap. b. spei. T

2. *cepeacea*, nectario triphylo, foliis linearibus, flor. erectis. Thunb. prod. 60. Antherae acules infra os tubi, tres superiores alternae. T

780. NARCISSUS. *Petala* 6, aequalia: *Nectarium* (cor. limbo interiore) infundibuliformi, 1-phylo. *Stam.* intra nectarium.

1. *poeticus*, spatha uniflora, nectario rotato brevissimo scarioso (rubro) crenulato, fol. margine inflexis. Engl. bot. t. 275. N. angustifolius. Curt. mag. t. 193. Hab.

in G. Narbonensi, Italia, Helvetia, Germania, Anglia. $\overline{\text{T}}$

9. *biflorus*, spatha biflora, nect. rotato brevissimo membranaceo crenato (albido), fol. acute carinatis, margine inflexis. Smith. Flor. brit. 1. p. 354. Curt. Mag. t. 197. Engl. bot. t. 276. N. poiteus. Huds. Hab. in Angliae campivarenosis. Pet. ochroleuca. Nect. margine albido. S.

3. *incomparabilis*, spatha uniflora, nectario campanulato plicato crispo, petalis dimidio brevioribus, fol. planis. Curt. mag. 121. Nonpareille. Park. theat. 68. Hab. in Hispania, Lusitania. $\overline{\text{T}}$

4. *Pseudo-Narcissus*, spatha uniflora, nectario campanulato erecto crispo, aequante petala ovata. L. Mill. dict. n^o. 11. Scop. carn. 2. p. 205. Engl. bot. t. 17. Dod. pempt. 227. f. 12. Hab. in Eur. austr. pratis et montosis. $\overline{\text{T}}$

5. *bicolor*, spatha uniflora, nectario campanulato margine petalo crispo aequante petala. Gouan. illustr. 22. Rudb. elys. 2. p. 70. f. 7. Hab. in Europa australi, in Pyrenaeis. $\overline{\text{T}}$

6. *minor*, spatha uniflora, nectario obconico erecto crispo sextifido, aequante petala lanceolata. Sp. pl. 415. Curt. mag. 6. Bauh. hist. 2. p. 597. Hab. in Hispania. $\overline{\text{T}}$

7. *moschatus*, spatha uniflora, nectario cylindrico truncato subrepando, aequante petala oblonga. L. Barr. ic. Rudb. elys. 2. p. 69. f. 6. Hab. in Hispania. $\overline{\text{T}}$

8. *triandrus (pyrenaeus)*, spatha subuniflora nectario campanulato crenulato, dimidio brevioribus petalis, staminib. ut plurimum ternis. L. Curt. mag. t. 48. Rudb. elys. 2. p. 72. f. 12. Hab. in Pyrenaeis. Stamina sex, quorum tria breviora, 2 nonnullis observata. $\overline{\text{T}}$

9. *orientalis*, spatha subbiflora, nectario campanulato trifido emarginato, petalis triplo brevioribus. Rudb. elys. 2. p. 52. f. 2. Hab. in Oriente. $\overline{\text{T}}$

10. *Amancaes*, spatha 3-6-flora, nectario magno campanulato repando sexlobato crenulato, stam. cernuis, fol. ensiformibus. Flor. Per. 3. p. 51. t. 231. f. 2. Hab. in collibus Limaee etc. Flor. magni, luteo-sulphurei, fragrantissimi. $\overline{\text{T}}$

11. *trilobus*, spatha submultiflora, nectario campanulato subtrifido integerrimo, petalis dimidio brevioribus. Sp. pl. 417. Rudb. elys. 2. p. 61. f. 3. Hab. in Europa australi. Similis N. longuillae. $\overline{\text{T}}$

12. *odorus*, spatha subbiflora, nectario campanulato sexfido laevi, dimidio petalis brevioribus, fol. semicylindricis. Curt. mag. t. 76. N. fol. juncis carinatis, scapo unifloro, scypho seriebus emarginato. Hall. herb. n^o. 1251. Rudb. elys. 2. p. 60. f. 7. Hab. in Europa australi. Var. spatha uniflora et multiflora. $\overline{\text{T}}$

13. *biflorus*, spatha biflora, nectario brevissimo scarioso. Curt. mag. 197. Dod. pempt. 227. f. 2. Park. theat. 74. t. 75. f. 1. Hab. in Hispania, Anglia. $\overline{\text{T}}$

14. *calathinus*, spatha multiflora, nectario campanulato subaequante, petala fol. planis. Sp. pl. 416. Rudb. elys. 2. p. 60. f. 5. Hab. in Europa australi, Oriente. Nectar. longitudine petalorum. $\overline{\text{T}}$

15. *Tazetta*, spatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis alterne latioribus brevioribus, foliis planis. Willd. p. 39. Desf. Atl. 1. p. 282. Knorr. del. 1. t. N. 3. Rudb. 57. f. 11. Hab. in G. Narbonensis, Lusitaniae, Hispaniae maritimis subhumidis. Petal. apice flocculo lanato.

16. *dubius*, spatha multiflora, nectario campanulato truncato triplo petalis ovatis aequalibus brevioribus. Willd. p. 40. Gouan. illustr. p. 22. Rudb. 2. t. 51. f. 2. Hab. Montspeli. Tazetta duplo humillior. Folia linearia. Nectar. campanulatum album integerrimum triplo brevius petalis. G. $\overline{\text{T}}$

17. *viridiflorus*, spatha multiflora, nectar. campanulato brevissimo, petal. linearibus, fol. teretibus fistulosis. Schousb. l. c. t. 11. Cresc. in locis elevatis saxosis, humidis juxta Tingidem. Scapus teres, floriferus primum prodit, dein folia. Petal. cinereo-viridia. Flor. oct., novembr.

18. *serotinus*, spatha multiflora, nectar. brevissimo integro crenulato, petal. lanceolatis, fol. linearib. canaliculatis. Schousb. Maroc. t. p. 141. Desf. Atl. 1. p. 281. N. autumnalis minor. Clus. hist. t. 252. Hab. in Europa australi et in Barbaria. Scap. subanceps. Petal. nivea. Flor. autumn.

19. *Bulbozodium*, spatha uniflora, nectario turbinato petalis majore, genitalibus declinatis. L. Curt. mag. t. 88. Rudb. 2. p. 55. f. 5. Les Liliacées. Hab. inter Ulyssiponem et Hispalim. Fol. subulata. $\overline{\text{T}}$

20. *longuilla*, spatha multiflora, nectario campanulato brevi, fol. subulatis. L. Curt. mag. t. 15. Hab. inter Hispalim et Gades, inter Guadalouppam et Toletum, et in Oriente locis uliginosis. $\overline{\text{T}}$

781. *PANCRATIUM*. Cor. infundibuliformis: tubo longo. Petala 6. Nectar. (cor. limbus interior) 12-fidum. Stam. nectario imposita.

1. *zeylanicum*, spatha uniflora, petalis reflexis. L. Willd. Sp. II. p. 41. Herm. lugdb. 691. t. 693. Comm. hort. 1. p. 75. t. 38. Rudb. p. 179. f. 2. Hab. in India. \mathcal{T}

2. *mexicanum*, spatha biflora, fol. lanceolatis, nectarii dentibus sex staminiferis, intermediis simplicibus. Willd. p. 42. P. spatha biflora. L. Hort. cliff. 133. Dill. rhil. 299. t. 222. f. 289. Hab. in Mexico et Carolinae inundatis. Michaux. Stam. calycem subaequantia. \mathcal{T}

3. *humile*, spatha biflora, fol. filiformibus, nectarii dentibus sex obtusis bifido-emarginatis non staminiferis. Willd. Cav. ic. 3. p. 4. t. 207. f. 2. Hab. in Hispania. Flor. absque fol. octobri. \mathcal{T}

4. *caribaeum*, spatha multiflora, fol. lanceolatis. L. Hort. cliff. 133. Mart. cent. 27. t. 27. Hab. in Jamaica, Caribaris. \mathcal{T} +

5. *maritimum*, spatha multiflora, petalis planis, fol. lingulatis, stam. brevissimis. Mill. t. 197. Cavan. ic. 1. p. 41. t. 56. Les Liliacées. t. 8. Salisb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 70. t. 9.

β ? *carolinianum*, spatha multiflora, fol. linearibus, staminibus nectarii longitudine. L. Caterb. carol. 2. app. 5. t. 5. Rumph. 6. t. 70. f. 2. Hab. in Hispania et Gallia meridionali et β . in utraque India. Stylus declinatus. Filam. inflexa. \mathcal{T}

6. *fragrans*, spatha multiflora, fol. ellipticis, nectarii dentibus sex staminiferis, intermediis nullis. Willd. p. 43. Salisb. l. c. p. 72. t. 11. Trew. Ehret. t. 28. Hab. in Barbados. \mathcal{T}

7. *littorale*, spatha multiflora, foliis lineari-lanceolatis, nectarii dentibus sex staminiferis, spatio intermedio repando. Willd. p. 43. Salisb. p. 74. t. 13. Jacq. hort. 3. p. 41. t. 75. et amer. pict. t. 101. Trew. Ehret. p. 6. t. 27. Hab. in insula Terra-Bomba dicta Americae calidioris. \odot

8. *speciosum*, spatha multiflora, fol. ellipticis, nectar. dentibus sex staminiferis, intermediis simplicibus acutis. Willd. p. 44. P. Cor. tubo triangulo rure striato. Salisb. Act. p. 73. t. 12. Hab. . . \mathcal{T}

9. *declinatum*, spatha multiflora, scapo compresso ancipiti, cor. laciniis tubum excedentibus, fol. lingulatis. Jacq. amer. col. picta. t. 102. Jacq. hort. 3. p. 11. t. 10.

Commel. hort. t. 87. Hab. in Antillis. Scap. demum declinatus.

Obs. An *P. caribaeum*. Lin. eadem species? Vid. Enc. bot. 4. p. 733.

10. *illyricum*, spatha multiflora, fol. lanceolatis, nect. dentibus sex acutis bifidis non staminiferis. Willd. p. 45. P. spatha multiflora, fol. ensiformibus, staminibus nectario longioribus. Salisb. l. c. p. 74. t. 14. Seb. thes. 1. p. 17. t. 8. f. 1. Hab. in Galliae maritimis. \mathcal{T}

11. *amboinense*, spatha multiflora, fol. cordato-ovatis acutis, nectarii dentibus sex acutis bifidis non staminiferis. Willd. Rudb. elys. 2. p. 238. f. 17. Hab. in Amboina. \mathcal{T}

12. *croceum*, spatha triflora, fol. lingulatis incurvis, tubo corollae incurvo. Enc. bot. 4. p. 735. Hab. in Peruvia. Cor. crocea. An diversum a n^o. 16? +

13. *ringens*, spatha subquinquesflora, flor. ringentibus, nectar. brevi, staminib. corollae longitudine, foliis ensiformibus acuminatis. Flor. Peruv. 3. p. 53. Colitur in Peruviae hortis. Petala reflexa, alba. Nect. viride. \mathcal{T}

14. *flavum*, spatha multiflora, stamin. cor. longioribus, tubo nectario coarctato, petal. p. tubo-reflexis. Flor. Peruv. 3. p. 54. t. 284. Hab. in Peruv. collib. arcuosis. \mathcal{T}

15. *coccineum*, spatha multiflora, stamin. cor. longitudine, tubo nect. tenui, petal. erectis. Flor. Peruv. l. c. t. 285. Hab. in collib. ad Tarmae oppidi tractus. Cor. coccinea. \mathcal{T}

16. *recurvatum*, spatha 1-3-flora, tubo nectar. gracili recurvato, fol. ensiformib. carinatis. Flor. Peruv. l. c. t. 285. In Peruviae praeruptis. Bulb. exus purpurascens. Cor. cernua, purpureo-lutescens. \mathcal{T}

17. *luteifolium*, spatha multiflora, flor. dependentibus, fol. lanceolato-oblongis latis. Flor. Peruv. l. c. t. 284. Habitat in Peruv. Andium nemorosis humidis. Petal. luteo-rubra, apice viridia. \mathcal{T}

18. *viridiflorum*, spatha 4-5-flora, limb. nect. longitudine petalor., fol. ensiformibus. Flor. Per. p. 55. Hab. in Peruv. nemorib. et locis petrosis. Flor. magni, pulchri.

19. *variegatum*, spatha 4-flora, flor. longissimis, nect. limbo brevissimo, denticulis furcatis retroflexis. Flor. Peruv. l. c. Flor. spinhamnei, cernui, ex luteo, roseo albo-viridique colore variegati. \mathcal{T}

782. *GRINUM*. *Cor.* supera, infundibuliformis, semisextida: tubo filiformi, limbo patulo recurvato: laciniis subulatis canaliculatis. *Filamenta* fauci tubi inserta, discreta. (*Semina* ad basin *cor.* vivipara. *Andrew.*)

1. *asiaticum*, fol. linearibus acuminate carinatis, floribus sessilibus, tubo limbo longiore, spatha diphylla. Willd. Sp. II. p. 45. Mill. dict. t. 110. *Amaryllis* vivipara. Lam. enc. 1. p. 123. Hab. in Malabar, Zeylona, America. Bulbi intra capsulas generantur. L. ¶

2. *americanum*, fol. oblongo-lanceolatis, margine glaberrimis, apice coarctato-unguiculato, flor. pedicellatis, tubo limbo brevior. Ait. Kew. 1. p. 413. C. radice fasciculari. L'Hérit. sert. angl. 8. Comm. rar. t. 14. Dill. elth. t. 161. f. 195. Hab. in Amer. *Cor.* limbus reflexus.

3. *erubescens*, fol. lanceolatis cartilagineo-crenatis apice producto explanato, flor. sessilibus, tubo limbo longiore. Ait. Kew. 1. p. 413. Les Liliacées. t. 27. C. Commelinii, *cor.* apicibus introscissum uncinatis, fol. linearibus canaliculatis. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 40. t. 202. Commel. rar. 15. t. 15. Hab. in America calidiore. ¶

4. *giganteum*, fol. flaccidis undulatis, flor. sessilibus umbellatis, petalis concavis. *Andrew.* 1. 169. Hab. in Africa prope Sierra Leone. Pet. albidia. Stam. et pistil. declinata.

5. *urceolatum*, spatha multiflora, flor. campanulato-urceolatis pendulis, tricoloribus, fol. oblongis petiolatis. Flor. Peruv. 3. p. 58. t. 287. Hab. in Andium nemorib. prope Pozuzo. *Cor.* a medio ad basin lutra, superne viridis, marginibus albidia. ¶

6. *bracteatum*, fol. oblongo-lanceolatis basi attenuatis, margine cartilagineis glabris, apice subcallosis; flor. pedicellatis, tubo limbo brevior, spathis numerosis longioribus. Willd. p. 47. Hab. . . ¶

7. *nervosum*, fol. subrotundis nervosis, filamentis basi dilatatis petiolatis. L'Hérit. sert. angl. 8. *Amaryllis* rotundifolia. Lam. enc. 1. p. 124. Rumph. G. t. 10. f. 1. Hab. in Philippinis. Scapus multiflorus polyphyllus. ¶

783. *AGAFANTHUS*. *Cor.* infera, infundibuliformis, regularis, sexpartita.

1. *umbellatus*, scapo fol. linearibus longiore, flor. umbellatis, tubo brevissimo.

Willd. II. p. 47. Les Liliacées. t. 4. L'Hérit. sert. angl. *Mauhlia* linearis, fol. linearibus scapo brevioribus. Thunb. prod. Go. Mill. ic. t. 210. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

2. *ensifolius*, scapo fol. lanceolatis brevior, flor. racemoso-umbellatis. *Mauhlia* ensifolia. Thunb. prod. Go. t. 3. Cum priore. ¶

784. *EUSTEPHIA*. *Cor.* supera tubulosa cylindracea bifida. *Nect.* fovea 6 in tubo corollae. *Filam.* tricuspidata, discreta.

1. *coccinea*, Cav. ic. 3. p. 20. t. 238. Hab. . . Habitat Ceyloni, sed nectarius et staminibus distincta. Fol. linearis. Flor. nutantes umbellati. W. ¶

785. *CYRTANTHUS*. *Cor.* supera incurva, tubulosa, clavata, sexfida: laciniis ovato-oblongae. *Filamenta* tubo inserta, apice conniventia.

1. *angustifolius*, fol. linearibus canaliculatis, *cor.* tubo cylindraceo. Willd. p. 48. Ait. Kew. 1. p. 414. Curt. mag. t. 271. *Crinum* angustifolium. Lin. suppl. 195. *Amaryllis* cylindracea. L'Hérit. sert. angl. 15. Hab. ad Cap. b. spei. Fl. purpurei. ¶

2. *ventricosus*, fol. linearibus planis strictis, *cor.* tubo ventricosus, staminibus ascendentibus. Willd. p. 49. C. angustifolius. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 40. t. 76. Hab. ad Cap. b. spei. *Cor.* limbus planus. ¶

3. *obliquus*, fol. lineari-lanceolatis obtusis planis oblique flexis, *cor.* tubo obverse conico. Willd. *Andrew.* t. 265. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 39. t. 75. *Crinum*. Lin. suppl. 195. *Amaryllis* umbellata. L'Hérit. sert. angl. 15. t. 16. Flor. coccinei, limbo virescente. ¶

786. *AMARYLLIS*. *Cor.* varia hexapetaloidea irregularis. *Filamenta* fauci tubi inserta declinata (aut recta) inaequalia proportionem vel directionem.

* *Spatha uniflora*.

1. *lutea*, spatha uniflora, corolla campanulata aequali, staminibus strictis. Lin. Syst. Veg. 329. Willd. Sp. t. p. 50. *Colonicum* luteum majus. Barb. pin. 60. Hab. in Hispania, Italia, Thracia. Flor. autumnno. Flor. lutei.

2. *Atamasco*, spatha bifida uniflora, *cor.* campanulata aequali, pistillo declinato.

Les

Les Liliacées. t. 31. Catesb. ear. 3. p. 12. t. 12. Pluck. alm. 220. t. 42. f. 3. Moris. 4. t. 24. f. 4. Hab. in Virginia. Fl. vere. Flor. albidis subsessiles.

3. *aurca*, spatha 1-flora, cor. campanulata patentiuscula, stam. erectis, stylo declinato, bulbo bulbis ovallato. Flor. Peruv. 3. p. 56. t. 286. f. a. Hab. in arvis, inter segetes in Peru. ¶

4. *flammea*, spatha 1-flora, cor. lacinii semiconvolutis superne patentibus reflexis, genitalibus brevibus erectis. Flor. Peruv. 3. l. c. fig. b. Feuill. Obs. t. 3. p. 29. t. 21. Cum priore, cui valde affinis dicitur. Cor. flammeo-coccinea. ¶

5. *pumilio*, spatha diphylla uniflora, cor. infundibuliformi aequali, lacinii revolutis, staminib. inclinat, alternis brevioribus. Ait. Kew. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. alba notata, interne lineis sex rubris. Sigma trifidum, laciniae lineares tubicundae apice albae. Ait.

6. *tubispatha*, spatha monophylla tubulosa bifida uniflora, periclyculo spatha duplo longiore. L'Herit. sert. angl. 9. Hab. in Bonaria. ¶

7. *tubiflora*, spatha uniflora diphylla, cor. infundibuliformi, tubo longissimo. L'Herit. sert. angl. 10. Feuill. peruv. 3. p. 29. t. 20. Hab. in Lima, Chancas arenosis. ¶

8. *maculata*, spatha uniflora diphylla lineari, flore pedunculato, genitalibus declinatis. L'Herit. sert. angl. 10. Hab. in regno. Chilensi. Scapus punctis lineatis maculatus. ¶

9. *chilensis*, spatha uni-vel biflora subbifolia, flor. pedunculata, fol. linearibus. L'Herit. sert. angl. 11. Feuill. peruv. 3. t. 21. Cum priore. Flor. purpurei. ¶

10. *clavata*, spatha uniflora diphylla tubulata, cor. clavata. L'Herit. sert. angl. 11. Willd. p. 52. Hab. in Africa australi. ¶

11. *formosissima*, spatha uniflora, cor. inaequali, ringent. petalis tribus genitalibus declinatis. L. Les Liliacées. t. 5. Dill. elib. 195. t. 162. f. 196. Rudb. 2. f. 10. Hab. in America meridionali. Flor. purpureae, fol. anteriores. ¶

** *Spatha biflora*.

12. *reginae*, spatha subbiflora, cor. basi tubulosus campanulatus quinquepartis, fauce tubi hirsuta. L'Herit. sert. 12. Mill. dict. t. 24. Hab. in Caribaeis. ¶

13. *speciosa*, spatha subbiflora, cor. erectis basi tubulosus campanulatis semi-

quinquefidis, fauce tubi glabra. L'Herit. sert. angl. 12. A. clava. Jacq. Schoenb. t. 67. A. purpurea. Ait. Willd. p. 51. L. suppl. 195. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. sanguineo-purpurei magni umbellati. L. ¶

14. *linearis*, fol. linearibus, cor. campanulatis, lacinii duabus angustioribus. Willd. Cinnam. lineare. Lin. suppl. 195. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. magni, albi. ¶

15. *equestris*, spatha subbiflora, pedicellis erectis sparsis brevioribus, tubo elliptici horizontali, limbo oblique patulo sursum curvo, fauce pilosa. Ait. Kew. 2. p. 417. Jacq. Schoenb. 1. p. 33. t. 63. Herm. parod. 194. t. 194. Merian. surinam. t. 22. Hab. in America calidior. ¶

16. *reticulata*, spatha subbiflora, cor. basi tubulosus nutantibus, fauce tubi glabra, scapo compresso, fol. oblongis basi attenuatis. Ait. Kew. 2. p. 411. Andrew. t. 179. Hab. in Brasilia. ¶

17. *tatarica*, spatha subbiflora, cor. subcampanulatis profunde sexpartitis, lacinia suprema angustissima, inferiore novata acuminata, fol. linearibus scapo longioribus. Willd. p. 54. Pall. itin. 3. app. n°. 85. t. 13. f. 1. Hab. in Siberia. Cor. fere hexapetala.

*** *Spatha multiflora*.

18. *Belladonna*, cor. erectiusculis hexapetalis lacinii planis, scapo compresso, fol. acute canaliculatis obtuse carinatis claberrimis. Ait. Kew. A. spatha multiflora, cor. campanulatis aequalibus ungue reflexis, genitalibus declinatis. L. Seb. thes. 1. p. 25. t. 17. f. 1. Hab. in Caribaeis, Barbados, Surinamo. Bulbus viridis. Cor. campanulata, incarnata 1 fundo viridi-allieante. Pet. 3. interiora basi ciliata. Styl. ruber. Lin. +

19. *miniata*, spatha 2-4-flora, cor. campanulatis ringentibus: lacinia suprema retrodextra; infima angustiori, genital. decumbentibus. Flor. Peruv. 3. p. 57. Hab. in Andium nemorib. ad vicius et in hortis. Cor. incarnato-miniata. Bulbus scetus et aeri expositus statim minii colorem acquirit. L. c. ¶

20. *bicolor*, spatha 6-12-flora, cor. subcampanulatis rubris apice virescentibus nectar. bicornibus. Flor. Per. 3. p. 57. Hab. in praeruptis Tarmac, etc. ¶

21. *vittata*, flr. pedicellatis, cor. cuneiformi-infundibuliformibus, perianthium exteriorum rachibus interiorum margine adnatis, scapo tereti, stigmatibus sulcatis.

Ait. Kew. 1. p. 418. Curt. mag. 1. 129. Les Liliacées. t. 10. L'Herit. ser. t. 15. \overline{T}

22. *falcata*, flor. umbellatis longius pedunculatis sexpartitis, fol. falcatis, margine cartilagineo muricato discolor. L'Herit. ser. t. 33. Crinum falcatum. Jacq. hort. 3. p. 34. t. 60. Hab. ad Cap. b. spec. \overline{T}

23. *ornata*, flor. sessilibus, cor. basi tubulosis, tubo spathis limboque longiore curvo, limbi laciniis oblongis aristatis, lacinia infima divaricata, concava. Ait. p. 418. Hab. in Guinea. \overline{T}

24. *longifolia*, flor. pedicellatis, spatha 12-20-flora, cor. basi tubulosis, tubo curvo brevi, limbi laciniis lanceolatis obtusis, fol. lato-subulatis canaliculatis apice floccidis. Ait. p. 419. Ehret. pict. t. 13. Jacq. ic. 2. t. 362. Herm. par. ad. t. 195. Hab. ad Cap. b. spec. \overline{T}

25. *montana*, spatha multiflora, fol. linearibus subulatis, petalis alternis mucronatis, genitalibus erectis. Willd. ic. pl. 57. 2. p. 5. t. 1. Hab. in altis montibus Libani. Cor. caerulea. Singularis seapo folioso, spatha terminali multiflora et axillariibus unifloris. Willd. p. 56. \overline{T}

26. *zeylanica*, spatha multiflora, cor. rectinatis, tubo filiformi longissimo; laciniis uncinatis. L'Herit. ser. angl. 53. A. bulbisperma pericarpio bulbifero. Buron. prod. 19. A. lineata. Lam. enc. 1. p. 123. Crinum zeylanicum. Lio. Ehret. pict. 5. f. 2. Trew. Ehret. t. 13. Tulipa javann. Rumph. 5. t. 105. Hab. in India orientali. Flor. odorati, candidi, striis purpureis. \overline{T}

27. *revoluta*, flor. pedicellatis, cor. basi tubulosis, tubo filiformi brevi curvo, fol. linearibus angustis canaliculatis longis ab ortu floccidis. Ait. Kew. 1. p. 419. Hab. ad Cap. b. spec. Flor. suavicolores. \overline{T}

28. *latifolia*, spatha multiflora, flor. pedicellatis basi tubulosis, fol. oblongo-lanceolatis. L'Herit. ser. angl. 14. Rheed. 11. t. 39. Rudb. f. 12. Hab. in Indiae arcuosis. \overline{T}

29. *aurea*, spatha multiflora, cor. basi tubulosis sexpartitis, laciniis linearibus undulatis, genitalibus declinatis, cor. longioribus. L'Herit. angl. p. 14. Les Liliacées. t. 61. Jacq. Schoenb. 1. p. 38. t. 73. Hab. in China. Fol. linearia. Cor. lutea. Limbi laciniæ linearis-lanceolatae apice incrassatae subuncinatae. Ait. \overline{T}

30. *orientalis*, spatha multiflora, flor. pedicellatis sexpartitis pedunculatis æquiprioribus irregularibus, germinibus cuneiformibus angulatis. Ait. Kew. 1. p. 420. Jacq. Schoenb. 1. p. 39. t. 74. Moris. s. 4.

t. 10. f. 35. Brunswickia. Heist. monog. c. 86. Hab. ad Cap. b. spec. Fol. linguiformia. \overline{T}

31. *sarniensis*, spatha multiflora, cor. revolutis, genitalibus erectis. L. Ehret. select. t. 9. f. 3.

32. *capensis (sarniensis)*, spatha multiflora, cor. patentissimis apice reflexis, genitalibus rectiusculis cor. longioribus, fol. ensiformi-linearibus. Jacq. Schob. 1. p. 34. t. 65. Hab. in Japonia, nunc in Sarnia insula Angliæ, ubi per naufragium deportata. \overline{T} . ad Cap. b. spec.

33. *Fothergillii*, spatha multiflora, cor. hexapetala revoluta, gene al. erectis, fol. linearibus subcanaliculatis obtusis glaucis. Andrew. t. 165. Hab. in China.

Obs. Ob cor. relictam et stam. recta cum pignore distinctum efficere mereatur genus.

33. *marginata*, petalis oblongis revolutis, genitalibus rectiusculis cor. longioribus, fol. linguatis humi adpressis cartilagineo-marginatis. Willd. p. 59. Jacq. Schoenb. 1. p. 34. t. 65. Hab. ad Cap. b. spec. Fol. Haemanthi coccinei. W. \overline{T}

34. *curvisolia*, petalis oblongis undulatis revolutis, genitalibus cor. longioribus rectiusculis, fol. strictis linearibus ensiformibus canaliculatis. Willd. Jacq. 1. c. 1. p. 33. t. 64. Ad Cap. b. spec. \overline{T}

35. *undulata*, petalis linearibus canaliculatis undulatis, genitalibus deflexis cor. brevioribus, stigmatibus obsolete. Ait. 1. p. 420. Jacq. hort. 3. p. 11. t. 13. \overline{T}

36. *radiata*, petalis lanceolatis undulatis erectis, genitalibus deflexis divergentibus cor. duplo longioribus, stigmatibus obsolete. Andrew. t. 95. Hab. in China. Facis Gloriosæ; at stigm. integrum.

37. *humilis*, spatha tri- seu quadriflora, petalis lanceolatis subringenti-patentibus, apice undulato-reflexis, infimo divaricato, genitalibus adscendentibus petal. brevioribus, fol. linearibus obtusis glabris nudis plinis. Willd. p. 60. Jacq. Schoenb. 1. p. 36. t. 63.

38. *flexuosa*, spatha multiflora, petalis lanceolatis subringenti-patentibus, apice undulato-reflexis, infimo divaricato, genitalibus adscendentibus petalis brevioribus, fol. linearibus obtusiusculis concavis punctato-punctatis. Willd. Hab. ad Cap. b. spec.

39. *radula*, spatha multiflora, petalis patentissimis, infimo divaricato, fol. scissis ad oras muricato-asperis prostratis. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 35. t. 68.

40. *striata*, spatha multiflora, cor. campanulatis aequalibus apice reflexis, fol.

subovatis, dorso striatis. Jacq. hort. Hab. ad Cap. b. apsi. $\overline{\text{T}}$

41. *crispa*, spatha pauciflora, petalis patentissimis crispis, fol. linearibus angustissimis. Jacq. Schoenb. 1. p. 37. t. 72. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. minutissimi. $\overline{\text{T}}$

42. *stellaris*, spatha multiflora, cor. patentibus planis, tubo brevissimo, stam. inaequalibus divaricatis cor. brevioribus, stylo recto, fol. linearibus erectis. Willd. p. 61. A. spatha multiflora, petalis patentissimis, tribus alternis infra medium barbatis, fol. linearib. erectis. Jacq. Schoenb. 1. p. 37. t. 71. Hab. ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

43. *caspia*, spatha multiflora, cor. campanulatis, tubo brevissimo, filam. erectis cor. longioribus, fol. lanceolatis undulatis. Willd. p. 62. Crinum caspium. Pall. itin. a. app. n^o. 105. t. O. $\overline{\text{T}}$

Obs. Genus hocce speciosas complectens species, quoad corollae formam, divisionem et staminum directionem forte divisi debet.

787. MILLA. *Cor.* infundibuliformis, limbo sexpartito plano. *Antherae* fauci insertae. *Germen* pedicellatum. *Cap.* supera.

1. *biflora*. Cav. ic. 2. p. 26. t. 106. Milles. Willd. Sp. 11. p. 62. r. 1. uncatis laxa. *Cor.* magna alba Sisyriachi.

788. BULBUCODIUM. *Cor.* infundibuliformis hexapetala: angustibus angustis staminiferis. *Caps.* supera.

1. *vernum*. Retz. obs. 2. t. 1. Rudb. dlys. 2. p. 128. f. 2. Hab. in Hispania, Helv., Gall. et Russia. $\overline{\text{T}}$

789. SOWERBEA. *Cor.* infera, hexapetala. *Filam.* tria biantherifera, tribus sterilibus interstinctis.

1. *juncea*. Smith. in Act. Soc. Lin. v. 2. Hab. in Australasia. Herba inodora, juncea, radice fibrosa. Scapus nudus umbellifer.

790. ALLIUM. *Cor.* 6-partita, patens. *Spatha* multiflora. *Umbella* congesta. *Caps.* supera. (Flor. capitati aut umbellati.)

* *Fol. caulina plana. Umbella capsulifera.*

1. *Ampeloprasum*, caule planifolio um-

bellifero, umbella globosa staminib. tricuspidatis, petalis carina scabris. Linn. Willd. Sp. II. p. 63. Smith. brit. 1. p. 315. Rudb. dlys. 2. p. 152. f. 1. Hab. in Oriente et in insula Holms Angliae. Fol. unc. 5. sfera lata margine denticulato-s. alba. Sm. $\overline{\text{T}}$

2. *Porrum*, caule planifolio umbellifero, staminib. tricuspidatis, radice tunicata, fol. basi vaginantib. Blackw. 1. 421. Hab. in vineis Helvetiae et in hortis colitur. $\overline{\text{T}}$

3. *lineare*, caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspidatis cor. duplo longioribus. L. diet. n^o. 4. Gmel. sibir. 1. p. 56. t. 13 et 14. f. 1. Hab. in Sibiria. $\overline{\text{T}}$

4. *enaveolens*, scapo nudo teretiusculo, fol. linearibus carinatis, umb. subrotunda, staminib. subulatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 364. Collect. 2. p. 305. Hab. in Austria. $\overline{\text{T}}$

5. *deflexum*, caule planifolio umbellifero, staminib. tricuspidatis, longitudine corollae, fol. angusto-linearibus, scapo declinato. Willd. p. 65. Hab. . . $\overline{\text{T}}$

6. *rotundum*, caule planifolio umbellifero, staminib. tricuspidatis, umb. subglobosa, flor. lateralibus nutantibus. Hab. in Europa austr. $\overline{\text{T}}$

7. *Victorialis*, caule planifolio, umbellifero, umb. rotundata, staminib. lanceolatis. Blackw. t. 644. Hab. in alpinis. Flor. flavescent.

8. *subhirsutum*, caule planifolio umbellifero, fol. inferioribus hirsutis, staminib. subulatis. L. fol. radicalibus subhirsutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. Hall. atl. 18. Hab. in Africa, Italia, Hispania, Oriente. $\overline{\text{T}}$

9. *magicum*, caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, staminib. simplicibus. L. Sauv. monsp. 18. Hab. . . Fol. radicalia canaliculata ampla. $\overline{\text{T}}$

10. *obliquum*, caule planifolio umbellifero, staminib. filiformibus flore triplo longioribus, fol. obliquis. L. Jacq. ic. rar. 1. t. 67. Misc. 2. p. 308. Gmel. sibir. 1. p. 49. t. 9. Hab. in Sibiria. Umb. globosa, primo nutans. $\overline{\text{T}}$

11. *ramosum*, caule subplanifolio umbellifero, staminib. subulatis longioribus, umb. globoso, fol. linearibus subconvexis. L. Gmel. sib. 1. p. 52. t. 11. f. 2. Cum priore. E medio caule ex alia, folio opposito, ramus nudus, longitudine caulis. L.

12. *tataricum*, caule planifolio umbellifero, foliis semicylindricis, staminibus

simplicibus, umb. plana. Lin. suppl. p. 166. Hab. in Sibiria. Caul. teres, semipedalis. ¶

13. *roseum*, caule planifolio umbellifero, umb. fastigiata, petalis emarginatis, staminibus brevissimis simplicibus. Desf. Atl. 1. p. 287. Magn. monsp. 11. t. 10. Rudb. clys. 2. p. 166. f. 17. Hab. Monspeli, Penedemonti in vineis et in arvis Algeriae. Flor. magis rubri. ¶

14. *graminifolium*, caul. umbellifero, umb. subglobosa, stam. simplicibus cor. longioribus, fol. angusto-linearibus basi vaginantibus. Hab. prope Dax (Départ. des Landes) Thore. Caul. ultra pedalis. Cor. campanulata; carina rubra. Cum sequente non confundi debet.

15. *appendiculatum*, caul. umbellifero, stam. subulatis, petalis internis basi auriculatis, fol. angusto-linearibus subcrinatis. Hab. in Pyrenaeis supra saxa. Flor. inodori albi. Ramond.

* * *Fol. caulina plana. Umbella bulbifera.*

16. *sativum*, caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminib. tricuspidatis. L. Moris. 4. t. 15. f. 9. Hab. in Sicilia. ¶

17. *Scorodoprasmum*, caule planifolio bulbifero, fol. crenulatis; vaginis encipitibus, staminib. tricuspidatis. L. Hab. in Oelandia. ~~Dasyl. P.~~

18. *arenarium*, caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, spatha mutica, staminibus tricuspidatis. L. Flor. dan. t. 250. Rupp. Flor. jen. ed. Hall. 154. t. 2. f. 2. Hab. in Thuringia, Helvetia, Scania. Caul. ante anthesin cernuus. Petal. carina scarbiuscula. ¶

19. *carinatum*, caule planifolio umbellifero, staminibus subulatis, spatha acuta longissima. A. umbella bulbifera, vagina bicorni, fol. carinatis. Hall. all. 27. t. 2. f. 2. Lob. ic. 156. Hab. in Germania, Helvetia, Carniola. Spatha longissima. ¶

* * * *Fol. caulina teretia. Umbella capsulifera.*

20. *Sphaerocephalum*, caule teretifolio umbellifero, fol. semiteretibus, staminibus tricuspidatis corolla longioribus. Mich. N. gen. 25. t. 24. f. 2. Hab. in Italia, Sibiria, Helvetia, Germania. ¶

21. *compartum*, caul. teretifolio, spatha brevissima abrupte acuminata, capit. sphaerico bulbis confertissimis. Thuill. Flor. Paris. p. 167. Hab. in sepib. et dumetis circa Parisiis. Flor. purpurascens. A. *vilculi* affine.

22. *pauciflorum*, caule subteretifolio umbellifero, umb. globosa, staminib. simplicibus cor. longioribus, spatha subulata. L. Hab. in Europa australi. Facie A. *sphaerocephali*. ¶

23. *Pallasii*, caule subteretifolio umbellifero difformi, staminib. simplicibus corollam aequantibus, stylo brevissimo. Murr. Com. goett. 6. 1775. p. 32. t. 3. Hab. in Sibiria. Cor. exigua purpurea. ¶

24. *descendens*, caule subteretifolio umbellifero, pedunc. exterioribus brevioribus, staminib. tricuspidatis. L. Hall. all. n°. 11. t. 2. f. 1. Rudb. clys. 2. p. 160. f. 20. Hab. in Helvetia. ¶

25. *moschatum*, caule teretifolio umbellifero, umb. fastigiata subexserta, petalis acutis, staminib. simplicibus, fol. setaceis. L. Bauh. prodr. 28. t. 28. Rudb. clys. 2. p. 166. Hab. in Galloprovinciae, Narbonae, Hispaniae apricis elevatis.

26. *flavum*, caule teretifolio umbellifero, flor. pendulis, petalis ovatis, staminibus corolla longioribus. L. Jacq. austr. t. 141. Rudb. clys. 2. p. 157. f. 6. Hab. prope Fontainebleau, Monspeli, in Austria. Caul. foliosus, rore glauco. Stam. simplicia. ¶

27. *pallens*, caule subteretifolio umbellifero, flor. pendulis truncatis, staminibus simplicibus cor. aequantibus. Gouss. illustr. 24. Colum. ecphr. 2. p. 6. t. 7. f. 2. Hab. in Italia, Hispania, Monspeli, Pannonia. Cor. campanulata, truncata, alba. Stylus vix ulius.

28. *paniculatum*, caule subteretifolio umbellifero, pedunc. capillaribus effusi, staminibus simplicibus, spatha longissima. L. Scop. carn. ed. 2. n°. 38. A. fol. teretibus, vagina bicorni, umbella pendula suave purpurea. Hall. opus. n°. 25. cum ic. Hab. in Sibiria, Austria, Italia, Helvetia, Carniola, Oriente. ¶

29. *odoratissimum*, bulbo tunicato poroso, fol. linearibus subulatis crassiusculis, spatha brevi aequadrifida, flor. umbellatis non bulbiferis. Desf. Atl. 1. p. 289. t. 83. Hab. in arenis deserti prope Oissam et Tozzar. Flor. hyeme. ¶

30. *vineale*, caule teretifolio, bulbifero, staminib. tricuspidatis. L. A. radica multiplici, fol. fistulosis, capite sphaerico, bulbifero, staminibus alternis trifidis. Hall. beiv. n°. 1221. Hab. in Germania, Helvetia et Anglia in pascuis et inter segetes. Spatha decidua. Stam. setis liliabus longis, extra florem eminentibus. L. ¶

31. *oleraceum*, caule teretifolio bulbifero, fol. strabris semiteretibus subtus sulcatis, staminibus simplicibus L. Hall. all. n°. 26. f. 2. Hab. in Suecia, Germania, Helvetia, Ingrida. Spatheae foliola basi ventricosa. ¶

*** *Folia radicalia. Scapus nudus.*

32. *nutans*, scapo nudo anripiti, fol. linearibus planis, staminib. tricuspidatis. L. Porrum scapo antequam floruerit, nutante. Gmel. sibir. 1. p. p. 55. t. 12. Hab. in Sibiria. Stam. dentes obliquantur. Var. setate et loco, ut vix dignoscatur. L. ¶

33. *ascalonicum*, scapo nudo tereti, fol. subulatis, umb. globosa, staminibus tricuspidatis. L. Moris. 2. 4. t. 14. f. 3. Hab. in Palestina. Statura fere A. *Schoenoprasii*. Petala ovato-lanceolata, caerulea. Stam. alterna latissima.

34. *senescens*, scapo nudo anripiti, fol. linearibus subtus convexis laevibus, umb. ambrotunda, staminib. subulatis. Lin. Gmel. sibir. 1. p. 53. t. 11. f. 2. Hab. in Sibiria, Sicilia, Silesia, Helvetia. ¶

35. *illyricum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus lanceolatis planis, umb. fastigiata, staminib. subulatis. Willd. p. 76. Jacq. ic. 2. t. 365. Collect. 3. p. 273. Hab. in vineis et olivetis Austriae littoralis. ¶

36. *odorum*, scapo nudo teretiusculo, fol. linearibus ranalculatis subtus angulatis, umb. fastigiata. L. Hab. in Europa australi. Cor. albae, odoratae. Germen punctis extravatis. ¶

37. *inodorum*, scapo nudo subtriquetro, fol. linearibus planis subtus carinatis, umb. fastigiata florifera, staminib. simplicib. Hab. in Carolina. Simile sequenti, sed duplo major. W. ¶

38. *angulosum*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umb. fastigiata. L. Jarq. aust. 5. p. 11. t. 423. Gmel. sibir. 1. p. 58. t. 14. f. 2. Bauh. hist. 2. p. 564. t. 164. Hab. in Sibiriae, Germaniae humidiusculis et montosis. ¶

39. *fragrans*, scapo tereti, fol. linearib. carinatis obtusis contortis, pedunc. nudis, staminib. planis. Vent. Hort. Cels. p. 26. t. 26. Hab. in Africa. Umb. laxa. Flor. albi, atriis purpureis, magni.

40. *striatum*, scapo nudo subtriquetro fol. linearibus subtus striato-sulcatis brevioribus, umb. fastigiata, petalis obtusis, staminibus simplicibus. Willd. p. 77. Jacq.

ic. 2. t. 366. Collect. suppl. 5t. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

41. *narcissiflorum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus subulatis longiore, umb. fastigiata, petalis murrionatis, staminibus simplicibus. Willd. A. caule nudo tereti, umbella terminali inclinata, petalis lanceolatis, staminibus simplicibus brevioribus. Villars. delph. 2. p. 258. t. 6. Hab. in Galliae australis montibus. ¶

42. *pedemontanum*, scapo subtriquetro, fol. linearibus obtusis, umb. pauciflora. Willd. A. nigrum. Allion pedrm. n°. 188t. t. 25. f. 1. Hab. in alpinis Pedemontanis. ¶

Obs. Ab A. nigro distinctum: fol. linearibus, umb. paucifloris, odore quum A. nigrum plane inodorum. Willd.

43. *nigrum*, scapo nudo tereti, fol. lanceolatis, umb. hemisphaerica, petalis patentibus, staminibus simplicibus. Willd. p. 78. Retz. obs. 1. p. 15. et 6. p. 27. A. *multitubosum*. Jacq. aust. 2. p. 9. t. 10. A. *monsperisulanum*. Gouan. illust. 23. t. 16. Desf. Atl. t. Hab. Algeriar et in Galloprovincia. ¶

44. *canadense*, scapo nudo tereti, fol. linearibus, capitulo bulbifero. L. Kalm. it. 3. p. 79. Cir. Michaux. Flor. 1. p. 194. Hab. in Canada. ¶

45. *mutabile*, scapo tereti, fol. superne subsericeo-convolutis flaccidis, umbel. submultiflora, stamin. simplicibus. Mirb. l. c. p. 195. Hab. in Georgia meridionali. Interdum capitulum totum bulbiferum. M.

46. *ursinum*, scapo nudo triquetro, fol. ovato-lanceolatis petiolatis, umb. fastigiata. L. Flor. dan. t. 57. Hab. in nemorosis et pratis humidis. Verr.

47. *clusianum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus planis riliatis, umb. pauciflora, petalis obovatis concavis. Retz. Willd. p. 79. Moly Minas. Clus. hist. 1. p. 192. fig. Hab. in Europa australi. Bulbus pisi magnitudine, ovato-turbinatus. Cor. caudata. Stam. simplicissima. ¶

48. *triquetrum*, scapo nudo, foliisque triquetris, staminib. simplicibus. D. Rudb. elys. 2. p. 159. f. 16. Desf. Atl. t. p. 288. Hab. in Hispania, circa Northonam, et in Algeria. Fol. Sparganii, valde carinata. Cor. alba. ¶

49. *Cepa*, scapo nudo inferne ventricoso longiore fol. teretibus. L. Hab. ... ¶

50. *Moly*, scapo nudo subcylindrico, fol. lanceolatis sessilibus, umb. fastigiata. L. Moly flavo flore. Swert. flor. 1. t. 60. f. 22

Hab. in Hungaria, Baldo, Monspelii, Pyrenaeis. \mathcal{T}

51. *tricoccum*, scapo nodo semitereti, fol. lanceolato-oblongis planis glabris, umb. globosa, seminibus solitariis. Ait. Kew. 1. p. 428. Hab. in America boreali. \mathcal{T}

52. *fitulosum*, scapo nudo adaequante folia teretibus ventricosa. L. β ? A. alialeum. Pall. itin. 2. app. o^o. 108. Hab. in β . in Siliria. \mathcal{T}

53. *Schoenoprasum*, scapo nudo adaequante folia teretibus subulato-filiformia. L. A. radice multiplici, fol. radicalibus teretibus, scapi longitudine, flor. umbellatis cylindricis. Hall. helv. n^o. 1226. Flor. dan. t. 971. Hab. in alpestribus Sibiriae, Oclandiac. \mathcal{T}

54. *sibiricum*, scapo subnudo tereti, fol. semiteretibus, staminibus subulatis, petal. lanceolatis acutis. Willd. p. 82. Murr. Comment. goett. 6. 1775. p. 33. t. 4. A. roseum. Krock. Siles. t. 43. Buxb. cent. t. 45. Hab. in Sibiria et in montibus Silesiac. \mathcal{T}

55. *stellerianum*, scapo nudo tereti, fol. semicylindricis, umb. densis, staminibus subulatis cor. longioribus. Willd. Gmel. sib. 1. p. 63. t. 16. f. t. 2. Hab. in Sibiria ad Jeniscam fluvium. \mathcal{T}

56. *capillare*, scapo nudo tereti, fol. capillacis, umb. pauciflora, petalis lanceolatis acutis. Willd. Cavan. ic. 3. p. 4. t. 206. f. 1. Hab. in regno Valentino. \mathcal{T}

57. *setaceum*, scapo nudo tereti, fol. setaceo-subulatis ciliato-serratis, petal. ovato-lanceolatis apice emarginatis. Plant. Hongar. p. 70. t. 68. Hab. in lapideosis apricis in Hungaria. Ventr. spathe in mucronem productae.

58. *tenuissimum*, scapo nudo tereti, fol. lineari-subulatis, umbella pauciflora, petalis subrotundato-ovatis obtusis. Willd. Gmel. sibir. 1. p. 61. t. 15. f. 2. 3. Hab. in Sibiria.

59. *gracile*, scapo nudo tereti longissimo, fol. linearibus canaliculatis, staminibus subulatis basi connatis. Ait. Kew. 1. p. 429. Hab. in Jamaica. Fol. narcissina. Petala inferne cum staminibus connata in tubum viridem. A.

60. *Chamae-Moly*, scapo nodo subnullo, capsulis cernuis, fol. planis ciliatis. L. Cav. ic. 3. p. 4. t. 207. f. 1. Moris. 2. 4. t. 16. f. 6. Desf. Atl. 1. p. 288. Hab. in Italia, Hispania et Algeria. \mathcal{T}

791. *LILIUM*. Cor. 6-petala. campanulata: linea longitudinali

nectarifera, laciniis saepius reflexis. Caps. valvulis pido cancellato connexis.

* *Cor. campanulatis erectis.*

1. *cordifolium*, fol. cordatis petiolatis. Willd. Sp. pl. 11. t. p. 84. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 332. Hemerocallis cordata. Thunb. Flor. jap. 143. Kämpf. t. 76. Hab. in Japonia. \mathcal{T} +

2. *longiflorum*, fol. sparsis lanceolatis, cor. tubulato-campanulatis, caule glabro. Thunb. l. c. p. 333. L. candidum. Thunb. jap. p. 133. Hab. in Japonia prope Nagasaki et Misao. Caul. teret. nodulosus. Differt a sequente: fol. basi latioribus, cor. triplo longiori cylindrica. A. L. bulbifero cor. maxima alba. Th. Conf. Andrew Rep. p. 194.

3. *candidum*, fol. lanceolatis sparsis basi attenuatis, cor. campanulatis intus glabris. Curt. mag. t. 278. Knorr. del. 1. tab. L. Blackw. t. 11. β . *peregrinum*, fol. sparsis, cor. campanulatis cernuis, petalis basi angustioribus. Mill. dict. n^o. 2. Hab. sparsis in Palaeisina, Syria, Gades, Helvetia. Odor gratus, quod non in cactis.

4. *japonicum*, fol. sparsis lanceolatis, cor. cernuis subcampanulatis. Thunb. jap. 133. Hab. in Japonia. Flor. terminalis reflexo-cernui. Cor. campanulata albidia palmaris.

5. *lanceifolium*, fol. sparsis lanceolatis, cor. erectis subcampanulatis. Thunb. Act. Lin. Lond. 2. p. 333. L. bulbiferum. Thunb. Flor. jap. p. 134. Hab. in Japonia. Caul. angulatus hirsutus. Cor. parvae unguiculares albae. Axillae foliorum superiorum bulbiferae. Th.

6. *bulbiferum*, fol. sparsis trinerviis, cor. campanulatis erectis: intus scabris. Jacq. Flor. austr. t. 226. Hab. in Europa australiore. \mathcal{T}

β . *croceum*, fol. sparsis 5-nerviis, pedunc. simplicibus, bulbis o, petal. interne macul. nigris variegatis. Col. in hortis. Conf. Vill. 2. p. 275. An huc potius Jacq. Fl. austr. t. 226?

** *Cor. revolutis.*

7. *Catesbaei*, fol. sparsis lineari-lanceolatis, caule unifloro, cor. erecta, pet. longe unguiculatis margine undulatis, apice reflexis. Willd. l. c. p. 86. Walt. carol. 153. Michaux. 1. p. 797. L. spectabile. Salisb. Icoo. rar. 5. t. 3. L. carolinianum. Lam. enc. 3. p. 514. Catesb. t. 58. Hab. in Carolinae humilissculis. \mathcal{T}

8. *speciosum*, fol. sparsis ovatis petiolatis; caule ramoso, ramis unifloris, floris

acruo, cor. revolutis intus papilloso-dentatis. Willd. Thunb. Act. Lin. Lond. 2. p. 33a. Kaempf. t. 47. Hab. in Japonia. \mathcal{T}

9. *pomponium*, fol. sparsis linearibus subulatis, flor. reflexis, cor. revolutis intus papilloso-dentatis. Willd. p. 87. Mill. dict. n^o. 5. et ic. t. 65. f. 2. Knorr. del. 1. t. 4. L. fol. sparsis linearibus subulatis, apice caulis nudiusculo. Lam. enc. 3. p. 514.

β . *angustifolium*, fol. linearibus sparsis, pedunc. longissimis. Mill. dict. n^o. 6. Hab. in Pyrenaeis, Sibiria. \mathcal{T}

10. *chalcædonicum*, fol. linearibus lanceolatis sparsis, flor. reflexis, cor. revolutis intus punctatis. Willd. L. fol. sparsis lanceolatis, caule usque ad apicem folioso. Lam. l. c. Hab. in Persia, Carniolia. \mathcal{T}

11. *superbum*, fol. imis verticillatis, cæteris sparsis, flor. racemoso-pyramidalibus reflexis, cor. revolutis. Lam. enc. 3. p. 515. Trew-Ehret. 2. t. 11. Catesb. t. 56. Hab. in America septentrionali. \mathcal{T}

12. *Nartagon*, fol. verticillatis ovato-lanceolatis, flor. reflexis, cor. revolutis. Willd. p. 38. Jacq. austr. t. 351. Knorr. del. 1. t. 6. β . L. flor. reflexis, alterum bisutum. Bauh. pin. 87. Hab. in sylvis. Vere. \mathcal{T}

13. *carolinianum*, glaberrimum, fol. enerviis subverticillatis obovatis, ramis floriferis crassis ternatis, cor. reflexis maculosis. Michaux. Flor. 1. p. 197. In herbosis humidis Car. inferioris.

14. *canadense*, fol. verticillatis linearibus, flor. reflexis, cor. revolutis campanulatis. Willd. Michaux. t. p. 197. B. rar. 778. t. 195. Moris. s. 4. l. 20. f. 9. Rudd. elys. 2. p. 177. f. 5. Catesb. t. 11. Hab. in Canada, et montib. Alleghanis Carolinæ et Virginiae. Pedunc. terni. Cor. basi flavæ, punctis atris.

15. *maculatum*, fol. sparsis et verticillatis lanceolatis glabris, cor. campanulatis intus maculatis, limbo reflexo. Thunb. in Act. Lin. Lond. 2. p. 334. L. canadense. Thunb. jsp. 135. Hab. in Japonia. Cor. campanulata, limbo reflexo, incarnata, intus maculis purpureis. \mathcal{T}

16. *camtschatcense*, fol. verticillatis, flore erecto, cor. campanulata, petalis sessilibus. L. Hab. in Canada, Camtschatca. \mathcal{T}

17. *philadelphicum*, fol. verticillatis, flor. erectis, cor. campanulata, petalis unguiculatis. L. Mill. dict. n^o. 13. et ic. t. 165. f. 1. Hab. in Canada. \mathcal{T} \dagger

792. *FRIILLARIA*. Cor. 6-petala (campanulata, supra ungues cavitate nectarifera. Stam. longitudine corollæ. Sem. plana.

* *Caps. trigonis. Bulbo uno super alterum.*

1. *persica*, racemo nudiusculo, foliis obliquis. L. Les Liliacées. t. Hab. in Persia? Racem. longus. Flor. violacei, penduli.

2. *verticillata*, fol. verticillatis linearibus lanceolatis, caule unifloro. Willd. p. 91. Hab. in Sibiria. Fol. exsiccata apice crispantur ac si cirrho essent instructa. \mathcal{T}

3. *pyrenæica*, fol. infimis oppositis, flor. nonnullis folio interjectis. L. Hab. in Pyrenæis, Russia. \mathcal{T}

4. *Meleagris*, fol. alternis linearibus canaliculatis, caule unifloro. Willd. Flor. Dan. t. 972. Hab. in pratis Europa australioris.

Obs. Var. flor. albis (*præcox*), luteis maximis (*italica*) et atropurpureis (*serotina*.)

5. *latifolia*, fol. alternis oblongo-lanceolatis planis, caule unifloro. Willd. p. 92. Hab. ... Colitur in hortis. Ful. viridia, stig. obtusa canaliculata. \mathcal{T}

6. *plantagina*, fol. radicalib. ovalibus nervosis petiolatis, caul. lanceolatis, caul. 1-floro. Lam. enc. 2. p. 550. Habit. in Oriente. \dagger

** *PTILUM*. L. (*Imperialis*. Juss.) Scapus apice foliosus. Caps. angulis 6-scutis. Flor. et Sem. Friuillariæ. Rad. tuberosa, basi fibrosa.

7. *imperialis*, flor. sub coma foliosa cernuis, fol. linearibus lanceolatis integerrimis. Curt. mag. t. 194. Ptilium. Lin. Hort. Cliff. p. 119. Frit. racemo comoso inferne nudo. Lin. Willd. p. 90. Imperialia coronata. Le Bot. culiv. 1. p. 447. Hab. in Oriente, Persia. Var. quoad color. floris et fol. albo-variegata.

β . *lulca*, major, flor. luteis patentioribus interne non striatis. Lam. enc. 2. p. 549. Tournef. 372.

793. *EUCOMIS*. Cor. infera, 6-partita, persistens, patens. Fil. basi in nectarium adnatum connata. Caps. 3 locularis. Sem.

ovata. (Scapus coma foliosa distincta.)

1. *nana*, scapo clavato, fol. lato-lanceolatis acutis. Ait. Kew. 1. p. 43a. Jacq. hori. Schoenb. s. p. 47. t. 92. Coll. 4. p. 213. *Fittillaria nana*. L. Hab. ad Cap. b. spei, cum *sequentibus*.

2. *bifolia*, scapo clavato, fol. ellipticis acutis geminis humi adpressis. Willd. Sp. pl. p. 92. Jacq. ic. a. t. 449. Collect. 4. p. 215.

3. *regia*, scapo cylindrico, fol. linguiformibus obtusis humi adpressis. Ait. Kew. s. p. 433. Frit. regia. Dill. elth. t. 92. f. 109. *Basilea coronata*. Lam. enc. 1. p. 38a.

4. *undulata*, scapo cylindrico, foliis ovato-oblongis undulatis patentibus, comae fol. longitudine fere racemi. Ait. Kew. 1. p. 433. *Ornithogalum undulatum*. Thunb. prod. 62.

5. *punctata*, scapo cylindrico, fol. oblongo-lanceolatis catenulatis patentibus, comae fol. brevibus, racemis longissimis. Ait. Kew. 1. p. 433. L'Herit. sert. angl. 18. t. 18. *Asphodelus comosus*. Houttuyn. t. 83. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

796. UVULARIA. Cor. 6-petala, erecta. Nect. fovea baseos petali *Pil.* brevissima. (Flor. solitarii axillares.)

* *Stylus* setaceus. *Stigm.* 3, longa. *Caps.* compresso-trigona, 3-locularis. *Sem.* 4 hilum attilata.

1. *hirta*, fol. amplexicaulib. hirtis, caule villosa. Thunb. Fl. jap. p. 36. Habit. in Japonia. Caul. pilis longis hirsutus. Flor. ignoti. †

2. *lanceolata*, fol. perfoliatis ovato-lanceolatis acuminatis. Ait. Kew. 1. p. 434. Corn. canad. t. 41. Hab. in America boreali. ¶

3. *perfoliata*, fol. perfoliatis ovatis, caps. truncato. Michaux. p. 199. Moria. s. 13. t. 4. f. 12. Hab. in Virginia, Canada. ¶

4. *puberula*, fol. utrinque concoloribus ovalibus, basi rotundatis subamplexicaulibus, caps. sessilibus ovata. Michaux. Flor. 1. p. 199. Hab. in Carolinae montib. altis.

5. *sessilifolia*, fol. sessilibus lanceolato-ovalibus subtus glaucis, caps. stipitata ovata. Michaux. l. c. Hab. in Canada. ¶

6. *cirrhosa*, foliis sessilibus cirrhosis. Thunb. jap. 136. Hab. in Japonia. ¶

* *Styphnolobos*. Cor. 6-petala subcampanulata. *Stigmata* brevissima. *Bacca* subglobosa, laevigata, carthaceo. *Sem.* hilo nudo. Michaux.

7. *amplexifolia* (*distorta*), fol. amplexicaulibus, pedicel. solitariis, medio distorto - geniculatis. Michaux. Flor. 1. p. 200. (*Streptopus distortus*.) *Uvularia*. Lin. Willd. Sp. II. p. 94. n°. 1. Moria. s. 13. t. 4. f. 11. Hab. in Europae montibus et in Canadae sylv. umbris. ¶

8. *rosea*, fol. amplexicaulibus serrulato-ciliolatis, anth. brevibus bicornibus. Michaux. p. 201. t. 18. sub *Streptopo*. Hab. in Carolinae et Canadae montibus. Flor. rosei.

9. *lanuginosa*, incana, fol. sessilibus subcordatis, pedicell. geminatis. Michaux. l. c. Hab. in altis montibus Carol. meridionalis. Flor. majusculi, virescentes.

795. GLORIOSA. Cor. 6-petala, undulata, reflexa. *Stylus* obliquus, apice trifidus.

1. *superba*, fol. cirrhiferis. L. Andrew. t. 129. Methonica. Herm. lugd. 688. t. 689. Les Liliacées. t. 26. Habit. in Malabar. Petala lanceolata, longa, lateribus undulata, coccinea, prope basin reflexa. Genitalia deflexa. ¶

2. *simplex*, fol. acuminatis. L. Hab. in Seocal. Fol. non cirrhosa. Flor. caerulei.

796. ERYTHRONIUM. Cor. 6-petala, campanulata: *Nectario* tuberculis 2, petalorum alternorum basi adnatis.

1. *Dens canis*. L. Gmel. sib. t. p. 39. t. 7. E. fol. ovato-oblongis glabris nigromaculatis. Gron. virg. p. 151. Hab. in Europa australi, Sibiria et America septentrionali. ¶

797. TULIPA. Cor. 6-petala, campanulata. *Stylus* nullus.

1. *sylvestris*, caule unifloro glabro, flore (unicolore) subnatis, petalis acutis apice barbatis, fol. laeocollatis. Willd. II. p. 95.

2. *turcica*, flore erecto petalis lanceolato-acuminatis, fol. lanceolato-linearibus. Roth. catal. 1. p. 45. Willd. l. c. Hab. in pratis Filam. basi villosa. Var. flor. pleno. ¶

3. *suaveolens*, parvula, caule unifloro pubescente, flore erecto, petalis obtusis glabris, fol. ovato-lanceolatis. Willd. p. 97. Roth. catal. bot. 1. p. 45. Lobel. ic. 127.

Hab. in Europa australi. Hyeme aut primo vere ab anthophyllis in collis colitur. Cor. flavo-coccinea variegata. \mathcal{T} .

3. *Celsiana*, caul. 1-floro glabro, flor. erecto (luteo), fol. lanceolato-linearibus canaliculatis, petiol. glabris. Les Liliacées, t. 38. Hab. in Oriente? Magnitudine prioris. Colitur in Horto Celsii.

4. *Clusiana*, caul. 1-floro glabro, flor. erecto (albo), petal. folisque oblongo-acutis glabris: infimo vaginante. Les Liliacées, t. 37. Tulipa persica praecox. Clus. posh. p. 9. ic. In Persia? Petal. 3 interiora, basi rubescentia: unguiculo violaceo.

5. *Gesneriana*, caule uniflora glabro, flore (versicolore) erecto: petalis obtusis glabris, fol. ovato-lanceolatis. Willd. p. 97. Hab. sponte in Cappadocia et in Russia. \mathcal{T} .

6. *biflora*, floribus erectis planiusculis, caule diphylo bi- a. triflora, fol. linearisubulatis. Linn. suppl. 146. Pall. jt. 3. app. n.º 86. t. D. F. 3. Hab. ad Wol am locis desertis maxime argillosis, imo saluginosis. Magnitudine Orn. hog. lutei. Petala tria exteriora linearilongata dilute cyanea a. virescentia, interiora alba basi macula magna fulva. L.

7. *Breyneana*, caule multiflora polyphylo, foliis linearibus. L. Breyne. cent. 1. 36. Rudb. elys. f. 11. Hab. ad Cap. b. spei. \mathcal{T} .

798. *ALBUCA*. Cor. 6-petala. interioribus conniventibus, exterioribus patulis, (dorso saepius viridi-coloratis). Stylus triquetus. Sem. plana.

* *Staminibus tribus fertilibus.*

1. *altissima*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, fol. subulatis canaliculato-convolutis. Dryander. in Act. holn. 1784. p. 292. Jacq. ic. rar. 1. t. 36. Coll. 2. p. 264. Hab. ad Cap. b. spei, cum caeteris speciebus. \mathcal{T} .

2. *major*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, fol. linearilanceolatis, planiusculis. Dryand. l. c. p. 293. Jacq. ic. rar. 2. t. 443. Collect. suppl. 96. Les Liliacées, t. 69. Ornithogalum canadense. L. Sp. pl. 1. p. 308. Moris. 2. 4. t. 24. f. 7. Petala exteriora flava, apice et basi macula viridi notata, flavo-marginata, interiora albido-flavescentia. \mathcal{T} .

3. *minor*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis linearisubulatis canaliculatis. Dryand. l. c. p. 294.

4. *lutea*. β . Lam. enc. 1. p. 76. Herm. parad. 209. t. 209. Flor. lutei. \mathcal{T} .

4. *flaccida*, fol. lanceolato-linearibus flaccidis, racemo brevi, pedunc. patentissimis, flor. nutantibus, filamentis alternis sterilibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 444. Collect. 4. p. 291. \mathcal{T} .

5. *viridiflora*, fol. linearibus canaliculatis foris villosis, racemo pauciflora, pedunc. patentibus, flor. nutantibus, filamentis sterilibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 446. Collect. suppl. 98. Petala exteriora laeteviridia, interiora luteo-virescentia.

6. *coarctata*, petalis interioribus apice fornicatis, fol. glabris, pedunc. longitudine bractearum. Dryand. l. c. p. 295. Fol. linearisubulata.

* * *Staminibus omnibus fertilibus.*

7. *fastigiata*, pet. interioribus apice fornicatis, fol. linearibus planiusculis, scapo fol. breviora, pedunc. longissimis patentibus. Willd. Dryand. l. c. p. 296. Flor. albi. Pet. exteriora linearilongata, interiora ovalioblonga, paulo breviora.

8. *candata*, fol. lanceolato-linearibus canaliculatis strictis erectis, pedunc. patentissimis. Jacq. ic. rar. 2. t. 442. Collect. 4. p. 203.

9. *setosa*, fol. lanceolato-linearibus, pedunculis patentissimis, floribus erectis, squamis bulbi apice setosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 440. Collect. suppl. p. 100. Flor. erecti.

10. *aurea*, fol. lanceolato-linearibus, pedunc. floribusque erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 441. Collect. 4. p. 202. Petala aurea.

11. *abyssinica*, pet. interioribus apice fornicatis, fol. linearilanceolatis canaliculatis strictis, pedunc. flor. cernuo brevioribus, bract. linearisubulatis flore longioribus. Willd. p. 101. Hab. in Abyssinia? Petala flavo-viridia. W.

12. *fragrans*, fol. linearilanceolatis canaliculatis glabris, pedunc. patentissimis, flor. cernuis, filament. omnibus fertilibus, bulbo depresso. Jacq. Schenb. 1. p. 44. t. 84. Hab. ad Cap. b. spei. Habitus fere Antherici. \mathcal{T} .

13. *viscosa*, petal. interioribus apice fornicatis, fol. pilosis glandulosis. Dryand. Jacq. ic. 2. t. 445. Collect. suppl. 99. Lin. suppl. 196.

14. *spiralis*, floribus nutantibus, fol. spiralibus villosis-scabris. Lin. suppl. 196. Jacq. ic. rar. 2. t. 499. Collect. suppl. 100.

Hab. ad Cap. b. spei in summitate montis Ribeca Castel. \mathcal{T} .

799. GETHYLLIS. *Cor.* 6-partita, tubo filiformi longissimo. *Cal.* o, nisi vagina oblique truncata. *Th.* *Bacca* clavata, radicalis, unilocularis.

1. *spiralis*, fol. linearibus spiralibus glabris, limbi laciniis ovato-oblongis. Lin. suppl. 198. Thunb. Diss. acad. 1. p. 14. Pappi spiralis. Thunb. in Act. lund. 1. sect. 2. p. 111. Ad Cap. b. spei, cum sequentibus. \mathcal{T} .

2. *ciliaris*, foliis linearibus spiralibus ciliatis, limbi laciniis ovato-oblongis. Lin. suppl. 198. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 41. t. 70. \mathcal{T} .

3. *villosa*, fol. linearibus filiformibus spiralibus villosis, limbi laciniis ovato-oblongis. Lin. suppl. 198.

4. *plicata*, fol. linearibus utrinque attenuatis plicato-nervosis piloso-ciliatis, laciniis limbi lanceolatis. Willd. p. 105. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 42. t. 80. Hypoxis plicata. Lin. suppl. 197. Hab. in collibus arenosis. *Cor.* flava extus virescens. \mathcal{T} .

5. *lanceolata*, fol. lanceolatis planis, limbi laciniis lanceolatis. Hab. ad Cap. b. spei. \mathcal{T} .

Obs. Gethyllides habent faciem Colchici. Flor. enim fruct. proferunt absque foliis. Sp. pl.

800. CURCULIGO. *Cor.* 6-petala. plana. *Spatha* 1-valvis. *Stylus* brevissimus. *Stigmata* 3, divergentia. *Caps.* 1-locularis, 4-sperma, spongiosa, rotata.

1. *orchioidea*. Roxb. cornu. 1. p. 14. t. 13. Gaert. sem. 1. p. 61. t. 16. Willd. II. p. 105. Orchis amboinica major. Rumph. 6. p. 116. t. 54. f. 1. Hab. in Indiae locis umbris incubis, prope Samboab. Fol. lineari-ensiformia. Flor. flavi longe pendulati. \mathcal{T} .

801. HYPOXIS. *Spatha* 2-valvis. *Cor.* 6-partita, persistens, supina. *Caps.* elongata, basi angustior. *Sem.* subrotunda nuda.

1. *erecta*, pilosa, scapo subquadrifloro fol. lineari-lanceolatis breviori, pedunculo flore duplo longioribus. Willd. Sp. II. p. 106. Ornithogalum hirsutum. L. Sp. pl. ed. 1. p. 366. Hab. in Virginia, Canada. Ornithog. refert. Fol. lunci pilosi. \mathcal{T} .

2. *sobolifera*, pilosa, scapo subquadrifloro, fol. lineari-lanceolatis patentibus longitudine scapi, pedunculis flore duplo longioribus. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 372. Collect. suppl. 51. Cum priore, cui valde affinis. Hab. ad Cap. b. spei. \mathcal{T} .

3. *villosa*, villosa, scapo subquadrifloro fol. lineari-lanceolatis breviori, pedunculis flore brevioribus, fructibus cylindricis. Willd. p. 107. Lin. suppl. p. 198. Jacq. ic. rar. 2. t. 367. Collect. suppl. 51. Ad Cap. b. spei. Var. magnitudine.

4. *decumbens*, pilosa, scapo subbifloro decumbente fol. lineari-lanceolatis breviori. II. pilosa, capsulis clavatis. L. Mill. dict. 1. 39. f. 2. Hab. in campis arenosis montium Jamaicae.

5. *obliqua*, scapo subtriflora hirsutis, fol. lineari-lanceolatis acuminatis subobliquis. Jacq. ic. rar. 2. t. 371. Collect. suppl. 54. Andrew. t. 195. Habit. ad Cap. b. spei. Rad. fibrosa. Ornith. minimum quadrantenus refert.

6. *aquatica*, fol. linearibus, scapis umbelliferis 2. unifloris. Lin. suppl. 197. In Cap. b. spei fossis. Flor. in aliis solitarii hermaphroditi, in aliis umbellati mares. L. \mathcal{T} .

7. *minuta*, fol. triquetris carnosis glabris, scapis bifloris. Lin. suppl. 197. Thunb. prod. 59. Helonia minuta. L. Mant. p. 225. Hab. ad Cap. b. spei locis glareosis. *Cor.* patens nivea. Styl. 1, membranacei geminae adhaerentes in figuram pyramidalem. \dagger

8. *alba*, parvula, fol. teretibus glabris, scapis subbifloris, petalis immaculatis. Lin. suppl. 198. Jacq. Collect. 4. p. 135. t. 2. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei. \mathcal{T} .

9. *ovata*, fol. ovato-lanceolatis integris glabris, scapis unifloris. Lin. suppl. 197. Thunb. prod. 60. Hab. ad Cap. b. spei. Flos pulchellus albus. \mathcal{T} .

10. *veratrifolia*, scapo unifloro fol. oblongo-ellipticis glabris plicato-nervosis breviori. Willd. p. 109. H. plicata. Jacq. ic. rar. 2. t. 367. Collect. suppl. p. 55. \mathcal{T} .

11. *stellata*, scapo unifloro fol. lineari-lanceolatis laxis carinatis glabris breviori, petalis basi maculatis. Lin. Suppl. 197. Jacq. ic. rar. 2. t. 368. Collect. 4. p. 134. Andrew. t. 101. Amoryllis capensis. L. Sp. pl. 420. Hab. ad Cap. b. spei. Macula nigricans ad ungues petalorum.

ρ ? *elegans*, scapo stricto aequali, petal. intus albis basi macula lata nigra imbricata. Andrew. t. 236. *Cor.* magna patens ut in prioribus.

12. *linearis (aurea)*, fol. lanceolato-linearib. glabris canaliculatis longioribus scapo 1-floro. Andrew. t. 171. Cor. magna, intus aureo-rubra, extus viridis.

13. *serrata*, foliis canaliculatis glabris elliptico-serratis, scapis unifloris. Lin. suppl. 297. Thunb. prod. 60. Jacq. ic. rar. 2. t. 369. Collect. 4. p. 134. Fabricia serrata. Thunb. Hab. ad Cap. b. spec. ¶

14. *juncea*, fol. canaliculatis pilosis intertremis scapis unidloris. Smith. spicil. t. 16. Hab. in Carolinae turfosis. ¶

15. *sessilis*, pilosa, acaulis, fructificationibus subradicalibus. Sp. pl. 439. Dill. elth. 298. t. 220. f. 287. Hab. in Carolina. ¶

802. **ERIOSPERMUM. Cor. 6-petala**, campanulata, persistens. *Filamenta* basi dilatata. *Caps. 3*-locularis. *Semina* lana involuta.

1. *latifolium*, fol. subrotundis acuminatis, basi cucullatis. Willd. II. p. 110. Jacq. ic. 2. t. 420. Collect. suppl. 73. Ornithogalum capense, fol. cordato-ovatis. L. Ornith. radice tuberosa cyclaminis folio, flor. pallide caeruleo. Brey. Cent. t. 41. Rudb. 1. p. et f. 148. Hab. ad Cap. b. spec. Cum sequentibus. Racemus pedunculis patulis plus quam decies flore longioribus. ¶

2. *lancaefolium*, fol. ovato-lanceolatis margine subundulato involuto. Willd. E. fol. lanceolatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 421. Coll. suppl. 72. Racemus pedunculis triplo flore longioribus erecto-patentibus. W.

3. *parvifolium*, fol. ellipticis obtusis planis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 422. Coll. suppl. 74. Pedunculi rectangule-patentes flore quadruplo longiores. W.

803. **ORNITHOGALUM. Cor. 6-petala**, erecta, persistens, supra medium patens. *Filamenta* basi dilatata aut subulata. *Caps. sub*-rotunda, angulata, 3-locularis. *Sem. subrotunda*, nuda.

1. *uniflorum*, scapo diphylo, fol. oppositis, pedunculo unifloro, petalis exterioribus lanceolatis retusis, interioribus ellipticis duplo latioribus. Willd. Sp. II. p. 111. Nov. Act. Petrop. XVIII. t. 6. f. 3. Hab. in Sibirie montibus. Ruffert O. luteum, sed flos triplo major. Stigmata tria, lutea.

2. *fibrosum*, radical. fibrosis intertextis, fol. subquinis radicalibus subulatis canaliculatis, scapo 1-floro brevissimo. Desf. Atl. 1. p. 294. Habitat in arenosis prope Kerwan. Cor. flava extus viresc.

3. *buthiferum*, scapo folioso unifloro, fol. alternis linearibus subulatis basi buthiferis, radicalibus filiformibus, petalis aequalibus acutis. Willd. p. 112. Lin. suppl. 299. Pall. itin. 2. app. n°. 106. tab. O. Hab. in aridis limosis ad Wolgam et Jaicum. ¶

4. *bonariense*, fol. radicalib. longia angustis, spatha diphylla brevi, flor. umbellatis (albido-purpurascens). O. *spathaceum*. Poir. in Enc. bot. 4. p. 618. Hab. in pascuis maritimis in Bonaria s. Buenos-Ayres. Commers. Flor. parvi, striati.

5. *spathaceum*, scapo subtereti, spatha univalvi, umbella pedunculata subtriflora. Hayne in Usteri N. Bot. Annal. 15. Stück. p. 11. t. 1. Willd. p. 112. O. Haynii. Roth. O. minimum. Fl. dan. t. 612? Hab. in nemorosis humidiusculis prope Hamburgum et in ducatu Oldenburgensi. Scap. folio lanceolato spathiformi instructus. Flor. flavi.

6. *bohemicum*, scapo folioso subunifloro, fol. alternis lanceolatis, radicalibus filiformibus, pedunc. pilosiusculis; petalis aequalibus lanceolatis obtusiusculis. Willd. Ant. bohem. 2. p. 121. icon. Hab. in saxonia udis Bohemiae. ¶

7. *luteum (pratense)*, scapo anguloso diphylo, pedunc. umbellatis simplicibus glabris. L. O. *pratense*, scapo polyphylo, pedunc. simplicibus triquetris glabris. Pers. in Usteri N. Bot. Annal. 5. Stück. p. 8. t. 2. f. 1.

8. *sylvaticum*, majus, scapo diphylo pedunculis simplicibus triquetris glabris Pers. in Usteri N. Annal. 5. St. p. 7. t. 1. f. 1. O. luteum. Fl. dan. t. 612. Hab. in Pomariis, pratis. β. in sylvis.

8. *minimum (arvense)*, scapo angulato diphylo, pedunc. pubescentibus umbellatis ramosis. L. O. *arvense*, scapo polyphylo, pedunc. ramosis teretiusculis tomentosus. Pers. l. c. p. 8. t. 1. f. 2. Hab. in arvis. Vere. Diversissimum a praecedente, pro quo a plurimis habetur.

9. *circinatum*, hirsutie canescens, fol. linearibus recurvatis canaliculatis, radical solitario, caulinis tribus, caule tri-4. quadrifloro. Lin. suppl. 199. Pall. itin. 3. app. n°. 85. t. D. f. 2. Hab. in siccis limosis nitrosis versus Astrachan. Similimum O. minimo. Vagina laxa fibrosa reticulata fer-

in G. Narbonensi, Italia, Helvetia, Germania, Anglia. $\overline{\text{T}}$

2. *biflorus*, spatha biflora, nect. rotato brevissimo membranaceo crenato (albido), fol. acute carinatis, margine inflexis. Smith. Flor. brit. 1. p. 354. Curt. Mag. t. 197. Engl. bot. t. 276. N. potius. Huds. Hab. in Angliæ campis arenosis. Pet. ochroleuca. Nect. margine albido. S.

3. *incomparabilis*, spatha uniflora, nectario campanulato plicato crispo, petalis dimidio brevioribus, fol. planis. Curt. mag. 121. Nonpareille. Park. theat. 68. Hab. in Hispania, Lusitania. $\overline{\text{T}}$

4. *Pseudo-Narcissus*, spatha uniflora, nectario campanulato erecto crispo, æquante petala ovata. L. Mill. dict. n°. 11. Scop. carn. 2. p. 295. Engl. bot. t. 17. Dod. pempt. 227. f. 12. Hab. in Eur. austr. pretis et montosis. $\overline{\text{T}}$

5. *bicolor*, spatha uniflora, nectario campanulato margine patulo crispo æquante petala. Gouan. illustr. 22. Rudb. elys. 2. p. 70. f. 2. Hab. in Europa australi, in Pyrenæis. $\overline{\text{T}}$

6. *minor*, spatha uniflora, nectario obconico erecto crispo sextifido, æquante petala lanceolata. Sp. pl. 415. Curt. mag. 6. Bauh. hist. 2. p. 557. Hab. in Hispania. $\overline{\text{T}}$

7. *moschatus*, spatha uniflora, nectario cylindrico truncato subrepando, æquante petala oblonga. L. Barr. ic. Rudb. elys. 2. p. 69. f. 6. Hab. in Hispania. $\overline{\text{T}}$

8. *triandrus (pyrenæicus)*, spatha subuniflora nectario campanulato crenulato, dimidio brevioribus petalis, staminibus plurimum ternis. L. Curt. mag. t. 48. Rudb. elys. 2. p. 72. f. 12. Hab. in Pyrenæis. Stamina sex, quorum tria breviora, a nonnullis observata. $\overline{\text{T}}$

9. *orientalis*, spatha subbiflora, nectario campanulato trifido emarginato, petalis triplo brevioribus. Rudb. elys. 2. p. 59. f. 2. Hab. in Oriente. $\overline{\text{T}}$

10. *Amancaes*, spatha 3-6-flora, nectario magno campanulato repando sexlobato crenulato, stam. cernuis, fol. ensiformibus. Flor. Per. 3. p. 51. t. 281. f. 2. Hab. in collibus Limæ etc. Flor. magni, luteo-sulphurei, fragrantissimi. $\overline{\text{T}}$

11. *trilobus*, spatha submultiflora, nectario campanulato subtrifido integerrimo, petalis dimidio brevioribus. Sp. pl. 417. Rudb. elys. 2. p. 61. f. 3. Hab. in Europa australi. Similis N. longuilla. $\overline{\text{T}}$

12. *odorus*, spatha subbiflora, nectario campanulato sextifido laevi, dimidio petalis brevioribus, fol. semicylindricis. Curt. mag. t. 76. N. fol. junceis carinatis, scapo unifloro, scypho sexies emarginato. Hall. herb. n°. 1251. Rudb. elys. 2. p. 60. f. 7. Hab. in Europa australi. Var. spatha uniflora et multiflora. $\overline{\text{T}}$

13. *biflorus*, spatha biflora, nectario brevissimo scarioso. Curt. mag. 197. Dod. pempt. 223. f. 2. Park. theat. 74. t. 75. f. 1. Hab. in Hispania, Anglia. $\overline{\text{T}}$

14. *calathinus*, spatha multiflora, nectario campanulato subæquante, petala fol. planis. Sp. pl. 415. Rudb. elys. 2. p. 60. f. 5. Hab. in Europa australi, Oriente. Nectar. longitudine petalorum. $\overline{\text{T}}$

15. *Tazetta*, spatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis alterne latioribus brevioribus, foliis planis. Willd. p. 39. Desf. Atl. 1. p. 289. Knorr. del. t. 1. t. N. 3. Rudb. 57. f. 11. Hab. in G. Narbonensis, Lusitaniæ, Hispaniæ maritimis subhumidis. Petal. apice flocculo lanato.

16. *dubius*, spatha multiflora, nectario campanulato truncato triplo petalis ovatis æqualibus brevioribus. Willd. p. 40. Gouan. illustr. p. 22. Rudb. 2. t. 51. f. 2. Hab. Mospeli. Tazetta duplo humilior. Folia linearia. Nectar. campanulatum album integerrimum triplo brevius petalis. G. $\overline{\text{T}}$

17. *viridiflorus*, spatha multiflora, nectar. campanulato brevissimo, petal. linearibus, fol. teretibus fistulosis. Schousb. l. c. t. 11. Cresc. in locis elevatis saxosis, humidis juxta Tinnidem. Scapus teres, floriferus primum prodit, dein folia. Petal. cinereo-viridia. Flor. oct., novembr.

18. *serotinus*, spatha multiflora, nectar. brevissimo integro crenulato, petal. lanceolatis, fol. linearib. canaliculatis. Schousb. Maroc. 1. p. 141. Desf. Atl. 1. p. 283. N. autumnalis minor. Clus. hist. t. 259. Hab. in Europa australi et in Barbaria. Scap. subantheris. Petal. nigra. Flor. autumn.

19. *Bulbo-odum*, spatha uniflora, nectario turbinato petalis majore, genitalibus declinatis. L. Curt. mag. t. 88. Rudb. 2. p. 75. f. 5. 7. Læc. Libanæ. Hab. inter Ulyssiponem et Hispalim. Fol. subulata. $\overline{\text{T}}$

20. *longuilla*, spatha multiflora, nectario campanulato brevi, fol. subulatis. L. Curt. mag. t. 15. Hab. inter Hispalim et Gades, inter Guadaloupam et Toletum, et in Oriente locis uliginosis. $\overline{\text{T}}$

781. *PANCRATIUM*. Cor. infundibuliformis: tubo longo. Petala 6. Nectar. (cor. limbus interior) insiduum. Stam. nectario imposita.

1. *zeylanicum*, spatha uniflora, petalis reflexis. L. Willd. Sp. II. p. 41. Herm. lugdb. bot. t. 693. Comm. hort. 1. p. 75. t. 38. Rudb. p. 179. f. c. Hab. in India. \mathcal{T}

2. *mexicanum*, spatha biflora, fol. lanceolatis, nectarii dentibus sex staminiferis, intermediis simplicibus. Willd. p. 42. P. spatha biflora. L. Hort. cliff. 133. Dill. elul. 299. t. 222. f. 289. Hab. in Mexico et Carolinae inundatis. Michaux. Stam. calycem subaequantia. \mathcal{T}

3. *humile*, spatha biflora, fol. glifor-
mibus, nectarii dentibus sex obtusis bifido-
marginatis non staminiferis. Willd. Car.
ic. 3. p. 4. t. 207. f. 2. Hab. in Hispania.
Flor. absque fol. octobri. \mathcal{T}

4. *caribaeum*, spatha multiflora, fol.
lanceolatis. L. Hort. cliff. 133. Mart. cent. 27.
t. 27. Hab. in Jamaica, Caribaeis. \mathcal{T} +

5. *maritimum*, spatha multiflora, petalis
planis, fol. lingulatis, stam. brevissimis.
Mill. t. 197. Cavan. ic. 1. p. 41. t. 56. Les
Liliacées. t. 8. Salisb. in Act. Soc. Lin.
Lond. 2. p. 70. t. 9.

β ? *carolinianum*, spatha multiflora, fol.
linearibus, staminibus nectarii longitudine.
L. Caesb. carol. 2. app. 5. t. 5. Rumph. 6.
t. 70. f. 2. Hab. in Hispania et Gallia me-
ridionali et β . in utraque India. Stylus de-
clinatus. Filam. inflexa. \mathcal{T}

6. *fragrans*, spatha multiflora, fol. ellipti-
cis, nectarii dentibus sex staminiferis,
intermediis nullis. Willd. p. 43. Salisb. l. c.
p. 72. t. 11. Trew. Ehret. t. 28. Hab. in
Barbados. \mathcal{T}

7. *littorale*, spatha multiflora, foliis
linearibus lanceolatis, nectarii dentibus sex
staminiferis, spatio intermedio repando.
Willd. p. 43. Salisb. p. 74. t. 13. Jacq.
hort. 3. p. 41. t. 75. et amer. pict. t. 101.
Trew. Ehret. p. 6. t. 27. Hab. in insula
Terra-Bomba dicta Americae calidioris. \odot

8. *speciosum*, spatha multiflora, fol.
ellipticis, nectar. dentibus sex staminiferis,
intermediis simplicibus acutis. Willd. p. 44.
P. Cor. tubo triangulo rare striato. Salisb.
Act. p. 73. t. 12. Hab. . . \mathcal{T}

9. *declinatum*, spatha multiflora, scapo
compresso ancipiti, cor. laciniis tubum ex-
cedentibus, fol. lingulatis. Jacq. amer. ed.
picta. t. 102. Jacq. hort. 3. p. 11. t. 10.

Commel. hort. t. 87. Hab. in Antillis.
Scap. demum declinatus.

Obs. An *P. caribaeum*. Lin. eadem spe-
cies? Vid. Enc. bot. 4. p. 733.

10. *illyricum*, spatha multiflora, fol.
lanceolatis, nect. dentibus sex acutis bifidis
non staminiferis. Willd. p. 45. P. spatha
multiflora, fol. ensiformibus, staminibus
nectario longioribus. Salisb. l. c. p. 74. t. 14.
Seb. thes. 1. p. 17. t. 8. f. 1. Hab. in Gallias
maritimis. \mathcal{T}

11. *amboinense*, spatha multiflora, fol.
cordato-ovatis acutis, nectarii dentibus sex
acutis bifidis non staminiferis. Willd. Rudb.
elys. 2. p. 238. f. 17. Hab. in Amboina. \mathcal{T}

12. *croceum*, spatha triflora, fol. lin-
gulatis incurvis, tubo corollae incurvo.
Enc. bot. 4. p. 735. Hab. in Peruvia. Cor.
crocea. An diversum a n^o. 167? +

13. *ringens*, spatha subquinqueflora,
flor. ringentibus, nectar. brevi, staminib.
corollae longitudine, foliis ensiformibus
acuminatis. Flor. Peruv. 3. p. 53. Collitur
in Peruviae hortis. Petala reflexa, alba.
Nect. viride. \mathcal{T}

14. *flavum*, spatha multiflora, stamin-
cor. longioribus, tubo nectario coarctato,
petal. p. tubo-reflexis. Flor. Peruv. 3. p. 54.
t. 284. Hab. in Peruv. collib. arenosis. \mathcal{T}

15. *coccineum*, spatha multiflora, stam-
cor. longitudine, tubo nect. tenui, petal.
erectis. Flor. Peruv. 1. c. t. 285. Hab. in
collib. ad Tarmae oppidi tractus. Cor. coc-
cinea. \mathcal{T}

16. *recurvatum*, spatha 1-3-flora, tubo
nectar. gracili recurvato, fol. ensiformib.
carinatis. Flor. Peruv. 1. c. t. 285. In Pe-
ruviae praeruptis. Bulb. cernuus purpurascens.
Cor. cernuus, purpureo-lutescens. \mathcal{T}

17. *latifolium*, spatha multiflora, flor.
dependentibus, fol. lanceolato-oblongis
latis. Flor. Peruv. l. c. t. 284. Habet in
Peruv. Andium nemorosis humidis, Petal.
luteo-rubra, apice viridia. \mathcal{T}

18. *viridiflorum*, spatha 4-5-flora,
limb. nect. longitudine petalor., fol. ensi-
formibus. Flor. Per. p. 55. Hab. in Peruv.
nemorib. et locis petrosis. Flor. magni,
pulchri.

19. *variegatum*, spatha 4-flora, flor.
longissimis, nect. limbo brevissimo, den-
ticulis furcatis retroflexis. Flor. Peruv. l. c.
Flor. spithamei, cernui, ex luteo, roseo
albo-viridique colore variegati. \mathcal{T}

782. *CRINUM*. *Cor.* supera, infundibuliformis, semisexlida: tubo filiformi, limbo patulo recurvato: laciniis subulatis canaliculatis. *Filamenta* fauci tubi inserta, discreta. (*Semina* ad basin *cor.* vivipara. *Andrew.*)

1? *asiaticum*, fol. linearibus acuminatis carinatis, floribus sessilibus, tubo limbo longiore, spatha diphylla. Willd. Sp. II. p. 45. Mill. dict. t. 110. *Amaryllis* vivipara. Lam. enc. 1. p. 123. Hab. in Malabar, Zeylona, America. Bulbi intra capsulas generantur. L. G.

2. *americanum*, fol. oblongo-lanceolatis, margine glaberrimis, apice coarctato-unguiculato, flor. pedicellatis, tubo limbo brevior. Ait. Kew. 1. p. 413. C. radice fasciculari. L'Hérit. sert. angl. 8. Comm. rar. 14. t. 14. Dill. clib. t. 161. f. 195. Hab. in Amer. *Cor.* limbus reflexus.

3. *erubescens*, fol. lanceolatis cartilagineo-crenatis apice producto explanato, flor. sessilibus, tubo limbo longiore. Ait. Kew. 1. p. 413. Les Liliacées. t. 27. C. Commelini, *cor.* apicibus introrsum uncinatis, fol. linearibus canaliculatis. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 40. t. 202. Commel. rar. 15. t. 15. Hab. in America calidiore. G.

4. *giganteum*, fol. flaccidis undulatis, flor. sessilibus umbellatis, petalis concavis. Andrew. 1. 169. Hab. in Africa prope Sierra Leone. Pet. albidis, Stam. et pistil. declinata.

5. *urceolatum*, spatha multiflora, flor. campanulato-urceolatis pendulis, tricoloribus, fol. oblongis petiolatis. Flor. Peruv. 3. p. 58. t. 287. Hab. in Andium nemorib. prope Pozuzo. *Cor.* a medio et basin lutea, superne viridis, marginibus albidis. G.

6. *bracteatum*, fol. oblongo-lanceolatis basi attenuatis, margine cartilagineis glabris, apice subcallosis; flor. pedicellatis, tubo limbo brevior, spathis numerosis longioribus. Willd. p. 47. Hab. ... G.

7? *nervosum*, fol. subrotundis nervosis, filamentis basi dilatatis petiolatis. L'Hérit. sert. angl. 8. *Amaryllis* rotundifolia. Lam. enc. 1. p. 124. Rumph. G. t. 20. f. 1. Hab. in Philippinis. Scapus multiflorus polyphyllus. G.

783. *AGAPANTHUS*. *Cor.* infera, infundibuliformis, regularis, sexpartita.

1. *umbellatus*, scapo fol. linearibus longiore, flor. umbellatis, tubo brevissimo.

Willd. II. p. 47. Les Liliacées. t. 4. L'Hérit. sert. angl. *Mauhlia* linearis, fol. linearibus scapo brevioribus. Thunb. prod. 60. Mill. ic. t. 210. Hab. ad Cap. b. spei. G.

2. *ensifolius*, scapo fol. lanceolatis brevior, flor. racemoso-umbellatis. *Mauhlia* ensifolia. Thunb. prod. 60. t. 3. Cum prior. G.

784. *EUSTEPHIA*. *Cor.* supera tubulosa cylindracea bifida. *Nect.* foveæ 6 in tubo corollæ. *Filam.* trienspidata, discreta.

1. *coccinea*. Cav. ic. 3. p. 20. t. 238. Hab. ... Habitus *Cyrtanthi*, sed nectaris et staminibus distincta. Fol. linearis. Flor. nutantes umbellati. W. G.

785. *CYRTANTHUS*. *Cor.* supera incurva, tubulosa, clavata, sexfida: laciniæ ovato-oblongæ. *Filamenta* tubo inserta, apice conniventia.

1. *angustifolius*, fol. linearibus canaliculatis, *cor.* tubo cylindraceo. Willd. p. 48. Ait. Kew. 1. p. 414. Curt. mag. t. 271. *Crinum* angustifolium. Lin. suppl. 195. *Amaryllis* cylindracea. L'Hérit. sert. angl. 15. Hab. ad Cap. b. spei. Fl. purpurei. G.

2. *ventricosus*, fol. linearibus planis strictis, *cor.* tubo ventricoso, staminibus ascendens, Willd. p. 49. C. angustifolius. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 40. t. 76. Hab. ad Cap. b. spei. *Cor.* limbus planus. G.

3. *obliquus*, fol. lineari-lanceolatis obtusis planis oblique flexis, *cor.* tubo obverse conico. Willd. Andrew. 1. 255. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 39. t. 75. *Crinum*. Lin. suppl. 195. *Amaryllis* umbella. L'Hérit. sert. angl. 15. t. 16. Flor. coccinei, limbo virescente. G.

786. *AMARYLLIS*. *Cor.* varia hexapetaloidia irregularis. *Filamenta* fauci tubi inserta declinata (aut recta) inæqualia proportionem vel directionem.

* *Spatha uniflora*.

1. *lutea*, spatha uniflora, corolla campanulata aequali, staminibus striatis. Lin. Syst. Veg. 329. Willd. Sp. 1. p. 50. *Colchicum* luteum majus. Benth. pin. 60. Hab. in Hispania, Italia, Thracia. Flor. autumnno. Flor. lutei.

2. *Atamasco*, spatha bifida uniflora, *cor.* campanulata aequali, pistillo declinata.

Les

Les Liliacées. t. 31. Catesb. cor. 3. p. 12. t. 12. Pluck. alm. 200. l. 48. f. 3. Moris. 4. l. 1. 24. f. 4. Hab. in Virginia. Fl. vete. Flor. albidis subsessiles.

3. *aurea*, spatha 3-flora, cor. campanulata patentiuscula, stam. erectis, stylo declinato, bulbo bulbillicis obvallato. Flor. Peruv. 3. p. 56. t. 285. f. a. Hab. in urvis, inter segetes in Peru. $\overline{\text{T}}$

4. *flammea*, spatha 3-flora, cor. laciniis semiconvolutis superne patentibus reflexis, genitalibus brevibus erectis. Flor. Peruv. 3. l. e. fg. b. Feuill. Obs. t. 3. p. 29. t. 21. Cum priore, cui valde affinis dicitur. Cor. flammeo-coccinea. $\overline{\text{T}}$

5. *pumilio*, spatha diphylla uniflora, cor. infundibuliformi aequali, laciniis revolutis, staminib. inclinat, alternis brevioribus. Ait. Kew. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. alba notata, interne lineis sex rubris. Sigma trifidum, laciniae lineares rubicundae apice albae. Ait.

6. *tubispatha*, spatha monophylla tubulosa bifida uniflora, pedunculo spatha duplo longiore. L'Herit. ser. angl. 9. Hab. in Bonaria. $\overline{\text{T}}$

7. *tubiflora*, spatha uniflora diphylla, cor. infundibuliformi, tubo longissimo. L'Herit. ser. angl. 10. Feuill. peruv. 3. p. 29. t. 20. Hab. in Lima, Chuscaae arenosis. $\overline{\text{T}}$

8. *maculata*, spatha uniflora diphylla lineari, flore pedunculato, genitalibus declinatis. L'Herit. ser. angl. 10. Hab. in regno. Chilensi. Scapus punctis lineatis maculatus. $\overline{\text{T}}$

9. *chilensis*, spatha uni-secu biflora subbifolia, flor. pedunculatis, fol. linearibus. L'Herit. ser. angl. 11. Feuill. peruv. 3. t. 21. Cum priore. Flor. purpurei. $\overline{\text{T}}$

10. *clavata*, spatha uniflora diphylla subulata, cor. clavata. L'Herit. ser. angl. 11. Willd. p. 52. Hab. in Africa australi. $\overline{\text{T}}$ +

11. *formosissima*, spatha uniflora, cor. inaequali, ringente. petalis tribus genitalibus declinatis. I. Les Liliacées. t. 5. Dill. elih. 195. t. 162. f. 196. Rudb. 2. f. 10. Hab. in America meridionali. Flor. purpureae, fol. anteriores. $\overline{\text{T}}$

** *Spatha biflora*.

12. *reginae*, spatha subbiflora, cor. basi tubulosus campanulatis quinquepartis, fauce tubi lacinata. L'Herit. ser. 12. Mill. dict. t. 24. Hab. in Caribaeis. $\overline{\text{T}}$

13. *speciosa*, spatha subbiflora, cor. erectis basi tubulosus campanulatis semi-

quinquefidis, fauce tubi glabra. L'Herit. ser. angl. 12. A. elata. Jacq. Schoenb. t. 62. A. purpurea. Ait. Willd. p. 53. L. i. suppl. 195. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. sanguineo-purpurei magni umbellati. L. $\overline{\text{T}}$

14. *linearis*, fol. linearibus, cor. campanulatis, laciniis duabus angustioribus. Willd. Crinum lineare. Lin. suppl. 195. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. magni, albi. $\overline{\text{T}}$

15. *equestris*, spatha subbiflora, pedicellis erectis sparsis brevioribus, tubo filiformi horizontali, limbo oblique paulo sursum curvo, fauce pilosa. Ait. Kew. 2. p. 417. Jacq. Schoenb. 1. p. 33. t. 61. Herm. parad. 194. t. 194. Merian. surinam. t. 22. Hab. in America calidior. $\overline{\text{T}}$

16. *reticulata*, spatha subbiflora, cor. basi tubulosus nutantibus, fauce tubi glabra, scapo compresso, fol. oblongis basi attenuatis. Ait. Kew. 1. p. 417. Andrew. t. 179. Hab. in Brasilia. $\overline{\text{T}}$

17. *tatarica*, spatha subbiflora, cor. subcampanulatis profunde sexpartitis, lacinia suprema angustissima, inferiore obovata acuminata, fol. linearibus scapo longioribus. Willd. p. 54. Pall. itin. 3. app. n^o. 85. t. D. f. 3. Hab. in Sibiria. Cor. fere hexapetala.

*** *Spatha multiflora*.

18. *Belladonna*, cor. erectiusculis hexapetalis laciniis planis, scapo compresso, fol. acute canaliculatis obtuse corinatis clu- bertinis. Ait. Kew. A. spatha multiflora, cor. campanulatis aequalibus ungue reflexis, genitalibus declinatis. L. Seb. thes. 1. p. 25. t. 17. f. 1. Hab. in Caribaeis, Barlados, Surinamo. Bulbus viridis. Cor. campanulata, incarnata: fundo viridi-allicante. Pet. 3. interiora basi ciliata. Styl. ruber. Lin. +

19. *miniata*, spatha 2-4-flora, cor. campanulatis ringentibus: lacinia suprema retrodextra; infima angustiori, genital. decumbentibus. Flor. Peruv. 3. p. 57. Hab. in Andium nemorib. ad versuras et in hortis. Cor. incarnato-minia. Bulbus acetosus et acri expositus statim minii colorem acquirit. L. e. $\overline{\text{T}}$

20. *bicolor*, spatha 6-12-flora, cor. subcampanulatis rubris apice virescentibus nectar. bicoribus. Flor. Per. 3. p. 57. Hab. in praeruptis Tarmae, etc. $\overline{\text{T}}$

21. *vittata*, flor. pedicellatis, cor. enei-formi-infundibuliformi, petalorum exteriorum rachibus interiorum margine adnatis, scapo tereti, stigmatibus sulcatis.

Ait. Kew. 1. p. 418. Curt. mag. t. 129. Les Liliacées. t. 10. L'Herit. ser. t. 15. \overline{T}

22. *falcata*, flor. umbellatis longius pedunculatis sesquialtiis, fol. falcatis, margine cartilagineo muricato discolor. L'Herit. ser. t. 15. Crinum falcatum. Jacq. hort. 3. p. 34. t. 60. Hab. ad Cap. b. spei. \overline{T}

23. *ornata*, flor. sessilibus, cor. basi tubulosis, tubo spathis limboque longiore curvo, limbi laciniis oblongis aristatis, lacinia infima divaricata, concava. Ait. p. 418. Hab. in Guinea. \overline{T}

24. *longifolia*, flor. pedicellatis, spatha 12-20-flora, cor. basi tubulosis, tubo curvo brevi, limbi laciniis lanceolatis obtusis, fol. lato-subulatis canaliculatis apice flaccidis. Ait. p. 419. Ehret. pict. t. 13. Jacq. ic. 2. t. 362. Herm. patad. t. 195. Hab. ad Cap. b. spei. \overline{T}

25. *montana*, spatha multiflora, fol. linearibus subulatis, petalis atherinis mucronatis, genitalibus erectis. Willd. ic. pl. syr. 2. p. 5. t. 1. Hab. in altis montibus Libani. Cor. caerulea. Singularis seapo folioso, spatha terminali multiflora et axillaribus unifloris. Willd. p. 56. \overline{T}

26. *zeylanica*, spatha multiflora, cor. reclinatis, tubo filiformi longissimo; laciniis uncinatis. L'Herit. ser. angl. 13. A. bulbisperma pericarpio bulbifero. Burm. prol. 59. A. lineata. Lam. enc. 5. p. 123. Crinum zeylanicum. Lin. Ehret. pict. 5. f. 2. Trew. Ehret. t. 13. Tulipa javana. Rumph. 5. t. 105. Hab. in India orientali. Flor. odorati, candidi, strobis purpureis. \overline{T}

27. *revoluta*, flor. pedicellatis, cor. basi tubulosis, tubo filiformi brevi curvo, fol. linearibus angustis canaliculatis longis ab ortu flaccidis. Ait. Kew. 5. p. 419. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. suavicolescentes. \overline{T}

28. *latifolia*, spatha multiflora, flor. pedicellatis basi tubulosis, fol. oblongo-lanceolatis. L'Herit. ser. angl. 14. Rheed. 11. t. 39. Rudb. f. 12. Hab. in Indiae arenosa. \overline{T}

29. *aurea*, spatha multiflora, cor. basi tubulosis sesquialtiis, laciniis linearibus undulatis, genitalibus declinatis, cor. longioribus. L'Herit. angl. p. 14. Les Liliacées. t. 61. Jacq. Schoenb. 1. p. 38. t. 73. Hab. in China. Fol. linearia. Cor. lutea. Limbi laciniis linearibus lanceolatis apice incrassatae subuncinatae. Ait. \overline{T}

30. *orientalis*, spatha multiflora, flor. pedicellatis sesquialtiis pedunculis sesquialtiis irregularibus, germiibus cuneiformibus angulatis. Ait. Kew. 1. p. 420. Jacq. Schoenb. 1. p. 39. t. 74. Moris. 2. 4.

t. 10. f. 35. Brunszwigia. Heist. monog. c. 89. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. linguiformia. \overline{T}

31. *sarniensis*, spatha multiflora, cor. revolutis, genitalibus erectis. L. Ehret. select. t. 9. f. 3.

β . *capensis* (*sarniensis*), spatha multiflora, cor. patentissimis apice reflexis, genitalibus rectiusculis cor. longioribus, fol. cuneiformi-linearibus. Jacq. Schoenb. 1. p. 34. t. 66. Hab. in Japonia, nunc in Sarnia insula Angliae, ubi per naufragium deportata. β . ad Cap. b. spei.

32. *Fothergillii*, spatha multiflora, cor. hexapetala revoluta, gene al. erectis, fol. linearibus subcanaliculatis obtusis glaucis. Andrew. t. 163. Hab. in China.

Obs. Ob cor. radiatam et stam. recta cum pice distinetum effecere meretur genus.

33. *marginata*, petalis oblongis revolutis, genitalibus rectiusculis cor. longioribus, fol. linguatis humi adpressis cartilagineo-marginatis. Willd. p. 59. Jacq. Schoenb. 1. p. 34. t. 66. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. filamentis coccineis. W. \overline{T}

34. *curvisolia*, petalis oblongis undulatis revolutis, genitalibus cor. longioribus rectiusculis, fol. strictis linearibus ensiferibus canaliculatis. Willd. Jacq. 1. c. t. p. 33. t. 64. Ad Cap. b. spei. \overline{T}

35. *undulata*, petalis linearibus canaliculatis undulatis, genitalibus deflexis cor. brevioribus, stigmate obsoleto. Ait. 1. p. 420. Jacq. horti. 3. p. 11. t. 13. \overline{T}

36. *radiata*, petalis lanceolatis undulatis erectis, genitalibus deflexis divergentibus cor. duplo longioribus, stigmate obsoleto. Andrew. t. 95. Hab. in China. Facit Gloriosae; at stigm. integrum.

37. *humilis*, spatha tri- seu quadriflora, petalis lanceolatis subringenti-patentibus, apice undulato-reflexis, infimo divaricato, genitalibus adscendentibus petal. brevioribus, fol. linearibus obtusis glabris nudis planis. Willd. p. 60. Jacq. Schoenb. 1. p. 36. t. 63.

38. *secuosa*, spatha multiflora, petalis lanceolatis subringenti-patentibus, apice undulato-reflexis, infimo divaricato, genitalibus adscendentibus petalis brevioribus, fol. linearibus obtusiusculis concavis pustulato-punctatis. Willd. Hab. ad Cap. b. spei.

39. *Radula*, spatha multiflora, petalis patentissimis, infimo divaricato, fol. facis ad oras muricato-asperis prostratis. Jacq. horti. Schoenb. 1. p. 35. t. 68.

40. *striata*, spatha multiflora, cor. campanulatis aequalibus apice reflexis, fol.

subovatis, dorso striatis. Jacq. hort. Hab. ad Cap. b. spsi. \mathcal{T}

41. *crispa*, spatha pauciflora, petalis patentissimis crispis, fol. linearibus angustissimis. Jacq. Schoenb. 1. p. 37. t. 22. Hab. ad Cap. b. spsi. Flor. minutissimi. \mathcal{T}

42. *stellaris*, spatha multiflora, cor. patentibus planis, tubo brevissimo, stam. inaequalibus divaricatis cor. brevioribus, stylo recto, fol. linearibus erectis. Willd. p. 61. A. spatha multiflora, petalis patentissimis, tribus alternis infra medium barbatis, fol. linearib. erectis. Jacq. Schoenb. 1. p. 37. t. 71. Hab. ad Cap. b. spsi. \mathcal{T}

43. *caspia*, spatha multiflora, cor. campanulatis, tubo brevissimo, filam. erectis cor. longioribus, fol. lanceolatis undulatis. Willd. p. 62. Crinum caspium. Pall. itin. 8. app. n^o. 105. t. O. \mathcal{T}

Obs. Genus hocce speciosas complectens species, quoad corollae formam, divisionem et staminum directionem forte dividi debet.

787. *MILLA*. Cor. infundibuliformis, limbo sexpartito plano. *Antherae* fauci insertae. *Germen* pedicellatum. *Cap.* supera.

1. *biflora*. Cav. ic. 2. p. 26. t. 196. *Milla*. Willd. Sp. 11. p. 62. Fol. lineatis laxa. Cor. magna alba Sisyriachi.

788. *BULBOCODEUM*. Cor. infundibuliformis hexapetala: unguibus angustis staminiferis. *Caps.* supera.

1. *vernium*. Retz. obs. 2. t. 1. Rudb. elys. 2. p. 128. f. 2. Hab. in Hispania, Helv., Gall. et Russia. \mathcal{T}

789. *SOWERBEA*. Cor. infera, hexapetala. *Filam.* tria biantherifera, tribus sterilibus interstinctis.

1. *junceae*. Smith. in Act. Soc. Lin. v. 2. Hab. in Australasia. Herba inodora, junccea, radice fibrosa. Scapus nudus umbellifer.

790. *ALLIUM*. Cor. 6-partita, patens. *Spatha* multiflora. *Umbella* congesta. *Caps.* supera. (Flor. capitati aut umbellati.)

* *Tol. caulina plana. Umbella capsulifera.*

1. *Ampeloprasum*, caule planifolio um-

bellifero, umbella globosa staminib. trienspidatis, petalis carinis scabris. Lin. Willd. Sp. 11. p. 63. Smith. brit. 1. p. 355. Rudb. elys. 2. p. 151. f. 1. Hab. in Oriente et in insula Holms Angliae. Fol. unc. 2. fere lata margine denticulato-4 alba. Sm. \mathcal{T}

2. *Porrum*, caule planifolio umbellifero, staminib. trienspidatis, radice uncinata, fol. basi vaginantib. Blackw. t. 421. Hab. in vicia Helvetiae et in hortis colitur. \mathcal{T}

3. *lineare*, caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus trienspidatis cor. duplo longioribus. L. diet. n^o. 4. Gmel. sibir. 1. p. 56. t. 13 et 14. f. 1. Hab. in Sibiria. \mathcal{T}

4. *snawcolens*, scapo nudo teretiusculo, fol. linearibus carinatis, umb. subrotunda, staminib. subulatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 364. Collect. 2. p. 305. Hab. in Austria. \mathcal{T}

5. *deflexum*, caule planifolio umbellifero, staminib. trienspidatis, longitudine corollae, fol. angusto-linearibus, scapo declinato. Willd. p. 65. Hab. in Austria. \mathcal{T}

6. *rotundum*, caule planifolio umbellifero, staminib. trienspidatis, umb. subglobosa, flor. lateralibus nutantibus. Hab. in Europa austr. \mathcal{T}

7. *Victorialis*, caule planifolio, umbellifero, umb. rotundata, staminib. lanceolatis corollae. Blackw. t. 544. Hab. in alpinis. Flor. saescent.

8. *subhirsutum*, caule planifolio umbellifero, fol. inferioribus hirsutis, staminib. subulatis. L. fol. radicalibus subhirsutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. Hall. alt. 18. Hab. in Africa, Italia, Hispania, Oriente. \mathcal{T}

9. *magicum*, caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, staminib. simplicibus. L. Sauv. monsp. 18. Hab. ... Fol. radicalia canaliculata ampla. \mathcal{T}

10. *obliquum*, caule planifolio umbellifero, staminib. filiformibus flore triplo longioribus, fol. obliquis. L. Jacq. ic. rar. 1. t. 62. Misc. 2. p. 309. Gmel. sibir. 1. p. 49. t. 9. Hab. in Sibiria. Umb. globosa, primo nutans. \mathcal{T}

11. *ramosum*, caule subplanifolio umbellifero, staminib. subulatis longioribus, umb. globosa, fol. linearibus subconvexis. L. Gmel. sib. 1. p. 52. t. 11. f. 1. Cum priore. E medio caule ex alia, folio opposito, ramus nudus, longitudine caulis. L.

12. *tataricum*, caule planifolio umbellifero, foliis acmelyndricis, staminibus

31. *oleraceum*, caule teretifolio bulbifero, fol. scabris semiteretibus subtus sulcatis, staminibus simplicibus L. Hall. all. n.º. 26. f. 2. Hab. in Suecia, Germania, Helvetia, Ingrid. Spathae foliola basi ventricosa. $\overline{\text{L}}$

**** *Folia radicata. Scapus nudus.*

32. *nutans*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus planis, staminib. tricuspidatis. L. Porrum scapo antequam floruerit, nutante. Gmel. sibir. 1. p. 55. t. 12. Hab. in Sibiria. Stam. dentes obliterantur. Var. aetate et loco, ut vix dignoscatur. L. $\overline{\text{L}}$

33. *ascalonicum*, scapo nudo tereti, fol. subulatis, umb. globosa, staminibus tricuspidatis. L. Moris. 2. 4. t. 14. f. 3. Hab. in Palestina. Statura fere A. Schoenoprasii. Petala ovato-lanceolata, caerulea. Stam. alterna latissima.

34. *senescens*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus subtus convexis lacribus, umb. subrotunda, staminib. subulatis. Lin. Gmel. sibir. 1. p. 53. t. 11. f. 2. Hab. in Sibiria, Silicia, Sillesia, Helvetia. $\overline{\text{L}}$

35. *illyricum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus subtus planis, umb. fastigiata, staminib. subulatis. Willd. p. 76. Jacq. ic. 2. t. 365. Collect. 3. p. 273. Hab. in vineis et olivetis Austriae littoralis. $\overline{\text{L}}$

36. *odorum*, scapo nudo teretiusculo, fol. linearibus esculiculis subtus angulatis, umb. fastigiata. L. Hab. in Europa australi. Cor. albae, odoratae. Germen punctis excavatis. $\overline{\text{L}}$

37. *inodorum*, scapo nudo subtriquetro, fol. linearibus planis subtus carinatis, umb. fastigiata florifera, staminib. simplicib. Hab. in Carolina. Simile sequenti, sed duplo major. W. $\overline{\text{L}}$

38. *angulosum*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus euncaliculis subtus subangulatis, umb. fastigiata. L. Jacq. aust. 5. p. 12. t. 423. Gmel. sibir. 1. p. 58. t. 14. f. 2. Haub. hist. 2. p. 564. t. 564. Hab. in Sibiriae, Germaniae humidiusculis et montosis. $\overline{\text{L}}$

39. *fragrans*, scapo tereti, fol. linearib. corinatis obtusis contortis, pedunc. nudis, staminib. planis. Vent. Hort. Cult. p. 26. t. 26. Hab. in Africa. Umb. laxa. Flor. albi, striis purpureis, magni.

40. *striatum*, scapo nudo subtriquetro fol. linearibus subtus striato-sulcatis brevioribus, umb. fastigiata, petalis obtusis, staminibus simplicibus. Willd. p. 77. Jacq.

ic. 2. t. 366. Collect. suppl. 51. Hab. ad Cap. b. spei. $\overline{\text{L}}$

41. *narcissiflorum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus subulatis longiore, umb. fastigiata, petalis mucronatis, staminibus simplicibus. Willd. A. caule nudo tereti, umbella terminali inclinata, petalis lanceolatis, staminibus simplicibus brevioribus. Villars. delph. 2. p. 258. t. 6. Hab. in Galliae australis montibus. $\overline{\text{L}}$

42. *pedemontanum*, scapo subtriquetro, fol. linearibus obtusis, umb. pauciflora. Willd. A. nigrum. Allion pedem. n.º. 1881. t. 25. f. 1. Hab. in alpinis Pedemontanis. $\overline{\text{L}}$

Obs. Ab A. nigro distinctum: fol. linearibus, umb. paucifloris, odore quum A. nigrum plane inodorum. Willd.

43. *nigrum*, scapo nudo tereti, fol. lanceolatis, umb. hemisphaerica, petalis patentibus, staminibus simplicibus. Willd. p. 78. Retz. obs. 1. p. 15. et 6. p. 27. A. multibulosum. Jacq. aust. 1. p. 9. t. 10. A. mopsalitanum. Gouan. illust. 24. t. 16. Desf. Atl. 1. Hab. Algeriae et in Galloprovincia. $\overline{\text{L}}$

44. *canadense*, scapo nudo tereti, fol. linearibus, capitulo bulbifero. L. Kalm. it. 3. p. 79. Cfr. Michaux. Flor. 1. p. 194. Hab. in Canada. $\overline{\text{L}}$

45. *mutabile*, scapo tereti, fol. superne sulcatisaecco-convolutis saeculis, umb. l. submultiflora, stam. simplicibus. Mich. l. c. p. 195. Hab. in Georgia meridionali. Interdum capitulum totum bulbiferum. M.

46. *ursinum*, scapo nudo triquetro, fol. ovato-lanceolatis petiolatis, umb. fastigiata. L. Flor. dan. t. 57. Hab. in nemorosis et pratis humidis. Vere.

47. *clusianum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus planis ciliatis, umb. pauciflora, petalis obovatis concavis. Retz. Willd. p. 79. Moly Minas. Clus. hist. 1. p. 192. 66. Hab. in Europa australi. Bulbus pisi magnitudine, ovato-turbinatus. Cor. candida. Stom. simplicissima. $\overline{\text{L}}$

48. *triquetrum*, scapo nudo, foliisque triquetris, staminib. simplicibus. D. Rudb. elys. 2. p. 159. f. 16. Desf. Atl. 1. p. 288. Hab. in Hispania, circa Narthosum, et in Algeria. Fol. Sparganii, valde carinata. Cor. alba. $\overline{\text{L}}$

49. *Cepa*, scapo nudo inferne ventricoso longiore fol. teretibus. L. Hab. ... $\overline{\text{L}}$

50. *Moly*, scapo nudo subcylindrico, fol. lanceolatis sessilibus, umb. fastigiata. L. Moly flavo flore. Swert. flor. t. 1. 60. f. 20

Hab. in Hungaria, Ballo, Monspeli, Pyrenaeis. \mathcal{T}

51. *triccocum*, scapo nudo semitereti, fol. lanceolato-oblongis planis glabris, umb. globosa, seminibus soliteris. Ait. Kew. t. p. 428. Hab. in America boreali. \mathcal{T}

52. *fistulosum*, scapo nudo adaequante folia teretia ventricosa. L. β ? A. altaicum. Pall. itin. 2. app. n. 108. Hab. ... β . in Sibiria. \mathcal{T}

53. *Schoenoprasum*, scapo nudo adaequante folia teretia subulato-filiformia. L. A. radice multiplici, fol. radicalibus teretibus, scapi longitudine, flor. umbellatis cylindricis. Hall. helv. n. 1226. Flor. dan. t. 971. Hab. in alpestribus Sibiriae, Oelandiae. \mathcal{T}

54. *sibiricum*, scapo subnudo tereti, fol. semiteretibus, staminibus subulatis, petal. lanceolatis acutis. Willd. p. 82. Murr. Comment. goett. 6. 1775. p. 33. t. 4. A. roseum. Krock. Siles. t. 43. Buxb. cent. t. 45. Hab. in Sibiria et in montibus Silesiae. \mathcal{T}

55. *stellerianum*, scapo nudo tereti, fol. aemicylindricis, umb. densis, staminibus subulatis cor. longioribus. Willd. Gmel. sib. 1. p. 63. t. 16. f. 1. 2. Hab. in Sibiria ad Jeniseum fluvium. \mathcal{T}

56. *capillare*, scapo nudo tereti, fol. capillaceis, umb. pauciflora, petalis lanceolatis acutis. Willd. Cavan. ic. 3. p. 4. t. 206. f. 1. Hab. in regno Valentino. \mathcal{T}

57. *setaceum*, scapo nudo tereti, fol. setaceo-subulatis ciliato-serratis, petal. ovato-lanceolatis apice emarginatis. Plant. Hongar. p. 70. t. 68. Hab. in lapidosis apricis in Hungaria. Valvul. spatulae in mucronem productae.

58. *tenuissimum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus subulatis, umbella pauciflora, petalis subrotundo-ovatis obtusis. Willd. Gmel. sib. 1. p. 63. t. 15. f. 2. 3. Hab. in Sibiria.

59. *gracile*, scapo nudo tereti longissimo, fol. linearibus canaliculatis, staminibus subulatis basi connatis. Ait. Kew. 1. p. 429. Hab. in Jamaica. Fol. narcissina. Petala inferne cum staminibus connata in tubum virideum. A.

60. *Chamae-Moly*, scapo nudo subnullo, capsulis cernuis, fol. planis ciliatis. L. Cav. ic. 3. p. 4. t. 207. f. 1. Moris. 2. 4. t. 16. f. 6. Desf. Atl. 1. p. 288. Hab. in Italia, Hispania et Algeria. \mathcal{T}

791. *LILIUM*. Cor. 6-petala, campanulata: linea longitudinali

nectarifera, laciniis saepius reflexis. Caps. valvulis pido cancellato connexis.

* *Cor. campanulatis erectis.*

1. *corlifolium*, fol. cordatis petiolatis. Willd. Sp. pl. II. 1. p. 84. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 332. Hemerocallis cordata. Thunb. Flor. jap. 143. Kämpf. t. 76. Hab. in Japonia. \mathcal{T} +

2. *longiflorum*, fol. sparsis lanceolatis, cor. tubulato-campanulatis, caule glabro. Thunb. l. c. p. 333. L. candidum. Thunb. jap. p. 133. Hab. in Japonia prope Nagasaki et Misao. Caul. teres nudo-lulosus. Differt a sequente: fol. basi latioribus, cor. triplo longiori cylindrica. A. L. bulbifero cor. maxima alba. Th. Conf. Andrew Rep. p. 194.

3. *candidum*, fol. lanceolatis sparsis basi attenuatis, cor. campanulatis intus glabris. Curt. mag. t. 278. Knorr. del. 1. tab. L. Blackw. t. 11. β . *peregrinum*, fol. sparsis, cor. campanulatis cernuis, petalis basi angustioribus. Mill. dict. n. 2. Hab. sponte in Palaestina, Syria, Gades, Helvetia. Odor gratus, quod non in caeteris.

4. *japonicum*, fol. sparsis lanceolatis, cor. cernuis subcampanulatis. Thunb. jap. 133. Hab. in Japonia. Flor. terminales reflexo-cernui. Cor. campanulata albidula palmari.

5. *lanceifolium*, fol. sparsis lanceolatis, cor. erectis subcampanulatis. Thunb. Act. Lin. Lond. 2. p. 333. L. bulbiferum. Thunb. Flor. jap. p. 134. Hab. in Japonia. Caul. angulatus hirsutus. Cor. parvae unguiculares albae. Axillae foliorum superiorum bulbiferae. Th.

6. *bulbiferum*, fol. sparsis trinerviis, cor. campanulatis erectis: intus scabris. Jacq. Flor. austr. t. 226. Hab. in Europa australiore. \mathcal{T}

β . *croceum*, fol. sparsis 5-nerviis, pedunc. simplicibus, bulbis o, petal. interna macul. nigris variegatis. Col. in hortis. Conf. Vill. 2. p. 275. An hue potius Jacq. Fl. austr. t. 226?

** *Cor. revolutis.*

7. *Catesbaei*, fol. sparsis linearibus lanceolatis, caule unifloro, cor. erecta, petal. longe unguiculatis margine undulatis, apice reflexis. Willd. l. c. p. 86. Walb. carol. 123. Michaux. 1. p. 197. L. spectabile. Salisb. Icon. rar. 5. t. 5. L. carolinianum. Lam. enc. 3. p. 514. Catesb. t. 58. Hab. in Carolinae humidiusculis. \mathcal{T}

8. *speciosum*, fol. sparsis ovatis petiolatis; caule ramoso, ramis unifloris, aggre

cernuus, cor. revolutis intus papilloso-dentatis. Willd. Thunb. Act. Lin. Lond. 2. p. 332. Kaempf. t. 47. Hab. in Japonia. \mathcal{T}

9. *pomponium*, fol. sparsis linearibus-subulatis, flor. reflexis, cor. revolutis intus papilloso-dentatis. Willd. p. 87. Mill. dict. n^o. 5. et ic. t. 65. f. 2. Knorr. del. 1. t. 4. l. fol. sparsis linearibus-subulatis, apice caulis nudiusculo. Lam. enc. 3. p. 514.

10. *angustifolium*, fol. linearibus sparsis, pedunc. longissimis. Mill. dict. n^o. 6. Hab. in Pyrenaeis, Sibiria. \mathcal{T}

11. *chalcidonicum*, fol. linearibus-lanceolatis sparsis, flor. reflexis, cor. revolutis intus punctatis. Willd. l. fol. sparsis lanceolatis, caule usque ad apicem folioso. Lam. l. c. Hab. in Persia, Carnolia. \mathcal{T}

12. *superbum*, fol. imis verticillatis, caeteris sparsis, flor. racemoso-pyramidaliter reflexis, cor. revolutis. Lam. enc. 3. p. 515. Trew-Ehret. 2. t. 11. Catesb. t. 56. Hab. in America septentrionali. \mathcal{T}

13. *Nartagon*, fol. verticillatis ovato-lanceolatis, flor. reflexis, cor. revolutis. Willd. p. 88. Jacq. austr. t. 355. Knorr. del. 1. t. 6. f. 1. flor. reflexis, alterum hirsutum. Bauh. pin. 87. Hab. in sylvis. Vere. \mathcal{T}

14. *carolinianum*, glaberrimum, fol. nervosis subverticillatis obovatis, ramis floriferis crassis ternatis, cor. reflexis maculosis. Michaux. Flor. 1. p. 197. In herbosis humidis Car. inferioris.

15. *canadense*, fol. verticillatis linearibus, flor. reflexis, cor. revolutis campanulatis. Willd. Michaux. 1. p. 197. B. rr. rar. 778. t. 125. Moris. 1. 4. t. 20. f. 9. Rudb. elys. 2. p. 177. f. 5. Catesb. t. 11. Hab. in Canada, et montib. Alleghaniis Carolinae et Virginiae. Pedunc. terni. Cor. basi flavae, punctis atris.

16. *maculatum*, fol. sparsis et verticillatis lanceolatis glabris, cor. campanulatis intus maculatis, limbo reflexo. Thunb. in Act. Lin. Lond. 2. p. 334. l. canadense. Thunb. jap. 135. Hab. in Japonia. Cor. campanulata, limbo reflexo, incarnata, intus maculis purpureis. \mathcal{T}

17. *camtschatcense*, fol. verticillatis, flore erecto, cor. campanulata, petalis sessilibus. L. Hab. in Canada, Camtschatca. \mathcal{T}

18. *philadelphicum*, fol. verticillatis, flor. erectis, cor. campanulata, petalis unguiculatis. L. Mill. dict. n^o. 13. et ic. t. 165. f. 1. Hab. in Canada. \mathcal{T} +

792. FRITILLARIA. Cor. 6-petala (campanulata, supra ungues cavitate nectarifera. Stam. longitudine corollae. Sem. plana.

* *Caps. trigonis. Eulbo uno super al-terum.*

1. *persica*, racemo nudiusculo, foliis obliquis. L. les Liliacées. t. Hab. in Persia? Racem. longus. Flor. violacri, penduli.

2. *verticillata*, fol. verticillatis linearibus-lanceolatis, caule unifloro. Willd. p. 91. Hab. in Sibiria. Fol. exsiccata apice crispantur ac si cirrho essent instructa. \mathcal{T}

3. *pyrenaeica*, fol. infimis oppositis, flor. nonnullis folio interjectis. L. Hab. in Pyrenaeis, Russia. \mathcal{T}

4. *Meleagris*, fol. alternis linearibus canaliculatis, caule unifloro. Willd. Flor. Don. t. 972. Hab. in pratis Europa australioris.

Obs. Var. flor. albis (*praecox*), luteis maximis (*italica*) et atropurpureis (*serotina*.)

5. *latifolium*, fol. alternis oblongo-lanceolatis planis, caule unifloro. Willd. p. 92. Hab. ... Colitur in hortis. Fol. viridia, stigm. obtusa canaliculata. \mathcal{T}

6. *plantaginea*, fol. radicalibus ovalibus nervosis petiolatis, caulibus lanceolatis, caul. unifloro. Lam. enc. 2. p. 550. Habit. in Oriente. +

* * Ptilium. L. (*Imperialis*. Juss.) Scapus apice foliosus. Caps. angulis 6-angulis. Flor. et Sem. Fritillariae. Rad. tuberosa, basi fibrosa.

7. *imperialis*, flor. sub coma foliosa cernuis, fol. linearibus-lanceolatis integerrimis. Curt. mag. t. 194. Ptilium. Lin. Hort. Cliff. p. 119. Frit. racemo comoso inferne nudo. Lin. Willd. p. 90. Imperialis coronata. Le Bot. cult. 1. p. 447. Hab. in Oriente, Persia. Var. quoad color. floris et fol. albo-variegata.

19. *lutea*, major, flor. luteis patentioribus, interne non striatis. Lam. enc. 2. p. 549. Tournef. 372.

793. EUCOMIS. Cor. infera, 6-partita, persistens, patens. Fil. basi in nectarium adnatum connata. Caps. 3-locularis. Sem.

ovata. (Scapus coma foliosa distincta.)

1. *nana*, scapo clavato, fol. lato-lanceolatis acutis. Ait. Kew. 1. p. 432. Jacq. hort. S. boenb. t. p. 47. t. 92. Coll. 4. p. 213. Fritillaria *nana*. L. Hab. ad Cap. b. spec. cum sequentibus.

2. *bifolia*, scapo clavato, fol. ellipticis acutis geminis humi adpressis. Willd. Sp. pl. p. 92. Jacq. ic. a. t. 449. Collect. 4. p. 215.

3. *regia*, scapo cylindrico, fol. linguiformibus obtusis humi adpressis. Ait. Kew. t. p. 433. Frit. *regia*. Dill. elth. t. 92. f. 109. Basilica coronata. Lam. enc. 1. p. 382.

4. *undulata*, scapo cylindrico, foliis ovato-oblongis undulatis patentibus, comae fol. longitudina fere racemi. Ait. Kew. 1. p. 433. Ornithogalum undulatum. Thunb. prol. 62.

5. *punctata*, scapo cylindrico, fol. oblongo-lanceolatis canaliculatis patentibus, comae fol. brevibus, racemis longissimis. Ait. Kew. 1. p. 433. L'Herit. sert. angl. 18. t. 18. Asphodelus comosus. Houttuy. t. 83. Hab. ad Cap. b. spec. ¶

794. UVULARIA. Cor. 6-petala, erecta. Nect. fovea baseos petali Fil. brevissima. (Flor. solitarii axillares.)

* Stylus setaceus. Stigm. 3, longa. Caps. compresso-trigona, 3-locularis. Sem. ad hilum articulata.

1. *hirta*, fol. amplexicaulib. hirsutis, caule villosa. Thunb. Fl. jap. p. 36. Hab. in Japonia. Caul. pilis longis hirsutus. Flor. ignoti. †

2. *lanceolata*, fol. perfoliatis ovato-lanceolatis acuminatis. Ait. Kew. 1. p. 434. Corn. canad. t. 41. Hab. in America boreali. ¶

3. *perfoliata*, fol. perfoliatis ovatis, caps. truncata. Michaux. p. 399. Moris. a. 13. t. 4. f. 12. Hab. in Virginia, Canada. ¶

4. *puberula*, fol. utrinque concoloribus ovalibus, basi rotundatis subamplexicaulibus, caps. sessili ovata. Michaux. Flor. s. p. 399. Hab. in Carolinae montib. altis.

5. *sessilifolia*, fol. sessilibus lanceolato-ovalibus subtus glaucis, caps. stipitata ovata. Michaux. l. c. Hab. in Canada. ¶

6. *cirrhosa*, foliis sessilibus cirrhosis. Thunb. jap. 136. Hab. in Japonia. ¶

* STREPTOPUS. Cor. 6-petala subcampanulata. Stigmata brevissima. Bacca subglobosa, laevigata, carthacea. Sem. hilo nudo. Michaux.

7. *amplexifolia* (*distorta*), fol. amplexicaulibus, pedicel. solitariis, medio distorto - geniculatis. Michaux. Flor. s. p. 200. (Streptopus *distortus*.) Urularia. Lin. Willd. Sp. II. p. 94. n°. 5. Moris. a. 13. t. 4. f. 51. Hab. in Europae montibus et in Canadae sylv. umbrosis. ¶

8. *rosea*, fol. amplexicaulibus serrulato-ciliolatis, anther. brevibus bicornibus. Michaux. p. 201. t. 58. sub Streptopo. Hab. in Carolinae et Canadae montibus. Flor. rosei.

9. *lanuginosa*, inaequa, fol. sessilibus subcordatis, pedicel. geminatis. Michaux. l. c. Hab. in altis montibus Carol. meridionalis. Flor. majusculi, virrescentes.

795. GLORIOSA. Cor. 6-petala, undulata, reflexa. Stylus obliquus, apice trifidus.

1. *superba*, fol. cirrhiferis. L. Andrew. t. 129. Methonica. Heron. lugd. 688. t. 689. Les lilâscées. t. 26. Hab. in Malabar. Petala lanceolata, longa, lateribus undulata, coccinea, prope basin reflexa. Genitalia deflexa. ¶

2. *simplex*, fol. acuminatis. L. Hab. in Senegal. Fol. non cirrhosa. Flor. caerulei.

796. ERYTHRONIUM. Cor. 6-petala, campanulata: Nectario tuberculis 2, petalorum alternorum basi adnatis.

1. *Dens canis*. L. Gmel. sib. s. p. 39. t. 7. E. fol. ovato-oblongis glabris nigromaculatis. Gron. virg. p. 151. Hab. in Europa australi, Sibiria et America septentrionali. ¶

797. TULIPA. Cor. 6-petala, campanulata. Stylus nullus.

1. *sylvestris*, caule unifloro glabro, flore (unicolore) subnante, petalis acutis apice barbatis, fol. lanceolatis. Willd. II. p. 95.

β ? *turcica*, flore erecto petalis lanceolato-acuminatis, fol. lanceolato-linearibus. Roth. catal. 1. p. 45. Willd. l. c. Hab. in pratis Filam. basi villosa. Var. flor. pleno. ¶

2. *suaveolens*, parvula, caule unifloro pubescente, flore erecto, petalis obtusis glabris, fol. ovato-lanceolatis. Willd. p. 97. Roth. catal. Lot. 1. p. 45. Lobel. ic. 127.

Hab. in Europa australi. Hyeme aut primo vere ab anthophyllis in olis colitur. Cor. flavo-coccinea variegata. \mathcal{T}

3. *Celsiana*, caul. 1-floro glabro, flor. erecto (luteo), fol. lanceolato-linearibus canaliculatis, petiol. glabris. Les Liliacées. t. 38. Hab. in Oriente? Magnitudine prioris. Colitur in Horto Celsii.

4. *Clusiana*, caul. 1-floro glabro, flor. erecto (albo), petal. foliisque oblongo-acutis glabris: infimo vaginante. Les Liliacées. t. 37. Tulipa persica praecox. Clus. posth. p. 9. ic. In Persia? Petal. 3 interiora, basi rubescentia: unguicula violaceae.

5. *Gesneriana*, caule unifloro glabro, flore (versicolore) erecto, petalis obtusis glabris, fol. ovato-lanceolatis. Willd. p. 97. Hab. sponte in Cappadocia et in Russia. \mathcal{T}

6. *biflora*, floribus erectis planiusculis, caule diphylo bi- et trifloro, fol. linearibus subulatis. Linn. suppl. 196. Pall. jt. 3. app. n.º 86. t. D. f. 3. Hab. ad Woi am loeis desertis maxime argillosis, imo saluginosis. Magnitudine Orn. hog. lutei. Petala tria exteriora lanceolata dilute cyanea et virescentia, interiora alba basi macula magna fulva. L.

7. *Breyntiana*, caule multifloro polyphylo, foliis linearibus. L. Breynt. cent. t. 36. Rudb. elys. f. 11. Hab. ad Cap. b. spei. \mathcal{T}

798. *ALBUCA*. Cor. 6-petala. interioribus connatis, exterioribus patulis, (dorso saepius viridi-coloratis). Stylus triquet. Sem. plana.

* *Staminibus tribus fertilibus.*

1. *altissima*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, fol. subulatis canaliculato-convolutis. Dryander. in Act. botan. 1784. p. 292. Jacq. ic. rar. t. 1. 36. Coll. 2. p. 264. Hab. ad Cap. b. spei, cum caeteris speciebus. \mathcal{T}

2. *major*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, fol. linearibus lanceolatis, planiusculis. Dryand. l. c. p. 293. Jacq. ic. rar. 2. t. 443. Collect. suppl. 96. Les Liliacées. t. 69. Ornithogalum canariense. L. Sp. pl. 1. p. 308. Moris. 2. 4. t. 24. f. 7. Petala exteriora flava, apice et basi macula viridi notata, flavo-marginata, interiora albedo-flavescentia. \mathcal{T}

3. *minor*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis linearibus subulatis canaliculatis. Dryand. l. c. p. 294.

4. *lutea*. β . Lam. enc. t. p. 26. Herm. 1. arad. 209. t. 209. Flor. lutei. \mathcal{T}

4. *flaccida*, fol. lanceolato-linearibus flaccidis, racemo brevi, pedunc. patentissimis, flor. nutantibus, filamentis alternis sterilibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 444. Collect. 4. p. 291. \mathcal{T}

5. *viridiflora*, fol. linearibus canaliculatis foris villosis, r. cerno paucifloro, pedunc. patentibus, flor. nutantibus, filam. alternis sterilibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 446. Collect. suppl. 98. Petala exteriora lacteoviridia, interiora luteo-virescentia.

6. *coarctata*, petalis interioribus apice fornicatis, fol. glabris, pedunc. longitudine bracteiarum. Dryand. l. c. p. 295. Fol. linearibus subulata.

* * *Staminibus omnibus fertilibus.*

7. *fastigiata*, pet. interioribus apice fornicatis, fol. linearibus planiusculis, scapo fol. breviora, 10 lunc. longissimis patentibus. Willd. Dryand. l. c. p. 296. Flor. albi. Pet. exteriora linearilobata, interiora ovali-obovata, paulo breviora.

8. *candata*, fol. lanceolato-linearibus canaliculatis stricto erectis, pedunc. patentissimis. Jacq. ic. rar. 2. t. 442. Collect. 4. p. 293.

9. *setosa*, fol. lanceolato-linearibus, pedunculis patentissimis, floribus erectis, squamis bulbi apice setosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 440. Collect. suppl. p. 100. Flor. erecti.

10. *aurea*, fol. lanceolato-linearibus, pedunc. floribusque erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 441. Collect. 4. p. 292. Petala aurca.

11. *abyssinica*, pet. interioribus apice fornicatis, fol. linearibus canaliculatis strictis, pedunc. flor. cernuo brevioribus, bract. linearibus subulatis flore longioribus. Willd. p. 101. Hab. in Abyssinia? Petala flavo-viridia. W.

12. *fragrans*, fol. linearibus lanceolatis canaliculatis glabris, pedunc. patentissimis, flor. cernuis, filam. omnibus fertilibus, bulbo depresso. Jacq. Schoenb. 1. p. 44. t. 84. Hab. ad Cap. b. spei. Habitus fere Antherici. \mathcal{T}

13. *viscosa*, petal. interioribus apice fornicatis, fol. piloso-glandulosis. Dryand. Jacq. ic. 2. t. 445. Collect. suppl. 99. Lin. suppl. 196.

14. *spiralis*, floribus nutantibus, fol. spiralibus villosis-scabris. Lin. suppl. 196. Jacq. ic. rar. 2. t. 499. Collect. suppl. 100.

Hab. ad Cap. b. spei in summitate montis
Ribecks Castell. $\overline{\text{T}}$

799. **GETHYLLIS.** *Cor.* 6-partita,
tubo filiformi longissimo. *Cal.*
o. nisi vagina oblique truncata.
Th. *Bacca* clavata, radicalis,
unilocularis.

1. *spiralis*, fol. linearibus spirilibus
glabris; limbi laciniis ovato-oblongis. Lin.
suppl. 198. Thunb. Diss. acad. 1. p. 14. Pa-
piris spiralis. Thunb. in Act. lund. 1. sect. 2.
p. 111. Ad Cap. b. spei, cum sequentibus. $\overline{\text{T}}$

2. *ciliaris*, foliis linearibus spirilibus
ciliatis, limbi laciniis ovato-oblongis. Lin.
suppl. 198. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 41.
t. 90. $\overline{\text{T}}$

3. *villosa*, fol. linearibus filiformibus spi-
ralibus villosis, limbi laciniis ovato-ob-
longis. Lin. suppl. 198.

4. *plicata*, fol. linearibus utrinque at-
tenuatis plicato-nervosis pilosis ciliatis,
laciniis limbi lanceolatis. Willd. p. 105.
Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 42. t. 80. Hy-
poxis plicata. Lin. suppl. 197. Hab. in colli-
bus arenosis. *Cor.* flava extus virescens. $\overline{\text{T}}$

5. *lanceolata*, fol. lanceolatis planis,
limbi laciniis lanceolatis. Hab. ad Cap. b.
spei. $\overline{\text{T}}$

Obs. Gethyllides habent faciem Colehici.
Flor. enim fruct. proferunt absque foliis.
Sp. pl.

800. **CURCULIGO.** *Cor.* 6-petala,
plana. *Spatha* 1-valvis. *Stylus*
brevissimus. *Stigmata* 3, diver-
gentia. *Capr.* 1-locularis, 4-
sperma, spongiosa, rotata.

1. *orchioides*. Roxb. corom. 1. p. 14.
t. 13. Gaert. sem. 1. p. 61. t. 16 Willd. II.
p. 105. Orchis amboinica major. Rumph. 6.
p. 115. t. 54. f. 1. Hab. in Indiae locis
umbrosis incultis, prope Samalcoah. Fol.
linearibus ensiformibus. Flor. flavi longe pe-
dunculati. $\overline{\text{T}}$

801. **HYPOXIS.** *Spatha* 2-valvis.
Cor. 6-partita, persistens, su-
pera. *Capr.* elongata, basi an-
gustior. *Sem.* subrotunda nuda.

1. *erecta*, pilosa, seapo subquadriflo-
ro fol. linearibus lanceolatis brevioribus, pedunc.
flores duplo longioribus. Willd. Sp. II.
p. 105. Ornithogalum hirsutum. L. Sp. pl.
ed. 1. p. 366. Hab. in Virginia, Canada.
Ornithog. refert. Fol. lunci pilosi. $\overline{\text{T}}$

2. *sobolifera*, pilosa, seapo subquadriflo-
ro fol. linearibus lanceolatis patentibus
longitudine scapi. pedunculis flore duplo
longioribus. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 372.
Collect. suppl. 53. Cum priore, cui valde
affinis. Hab. ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

3. *villosa*, villosa, seapo subquadriflo-
ro fol. linearibus lanceolatis brevioribus, pe-
dunculis flore brevioribus, fructibus cylin-
draceis. Willd. p. 107. Lin. suppl. p. 198.
Jacq. ic. rar. 2. t. 307. Collect. suppl. 51.
Ad Cap. b. spei. Var. magnitudine.

4. *decumbens*, pilosa, seapo subbiflo-
ro decumbente fol. linearibus lanceolatis bre-
vioribus. H. pilosa, capsulis clavatis. L. Mill.
dict. t. 39. f. 2. Hab. in campis arenosis
montium Jamaicae.

5. *obliqua*, seapo subtriflora hirsutis, fol.
linearibus lanceolatis acuminatis subobliquis.
Jacq. ic. rar. 2. t. 371. Collect. suppl. 54.
Andrew. t. 195. Hab. ad Cap. b. spei.
Rad. fibrosa. Ornith. minimum quadrantenus
refert.

6. *aquatica*, fol. linearibus, seapis um-
belliferis s. unifloris. Lin. suppl. 197. In
Cap. b. spei fossis. Flor. in aliis solitarii her-
maphroditi, in aliis umbellati mares. L. $\overline{\text{T}}$

7. *minuta*, fol. triquetris carnosis gla-
bris, seapis h. foliis. Lin. suppl. 197. Thunb.
prod. 59. Helonias minuta. L. Mant. p. 225.
Hab. ad Cap. b. spei locis glareosis. *Cor.*
patens nivea. Siliis 3, membranaceis geminis
adhaerentes in figuram pyramidalem. \dagger

8. *alba*, parvula, fol. teretibus glabris,
seapis subbifidis, petalis immaeulatis. Lin.
suppl. 198. Jacq. Collect. 4. p. 135. t. 2. f. 1.
Hab. ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

9. *ovata*, fol. ovato-lanceolatis integris
glabris, seapis unifloris. Lin. suppl. 197.
Thunb. prod. 60. Hab. ad Cap. b. spei.
Flos pulchellus albus. $\overline{\text{T}}$

10. *veratrifolia*, seapo unifloro fol. ob-
longo-ellipticis glabris plicato-nervosis bre-
vioribus. Willd. p. 109. H. plicata. Jacq. ic.
rar. 2. t. 367. Collect. suppl. p. 55. $\overline{\text{T}}$

11. *stellata*, seapo unifloro fol. linearibus
lanceolatis laxis carinatis glabris brevioribus,
petalis basi maculatis. Lin. Suppl. 197. Jacq.
ic. rar. 2. t. 368. Collect. 4. p. 134. Andrew.
t. 101. Amaryllis capensis. L. Sp. pl. 430.
Hab. ad Cap. b. spei. Macula nigricans ad
ungues petalorum.

β ? *elegans*, seapo striato aequali, petal.
intus albis basi macula lata nigra fimbriata.
Andrew. t. 236. *Cor.* magna patens ut in
prioribus.

12. *linearis (aurea)*, fol. lanceolato-linearib. glabris canaliculatis longioribus scapo 1-floro. Andrew. t. 171. Cor. magna, iatus aureo-rubra, extus viridis.

13. *serrata*, foliis canaliculatis glabris elliptico-serratis, scapis unifloris. Lin. suppl. 197. Thunb. prod. 60. Jacq. ic. rar. 2. t. 369. Collect. 4. p. 134. Fabricia serrata. Thunb. Hab. ad Cap. b. spec. T.

14. *juncea*, fol. canaliculatis pilosis integerrimis scapis unilioris. Smith. spicil. t. 16. Hab. in Carolinae turfosis. T.

15. *sessilis*, pilosa, acaulis, fructificationibus subradicalibus. Sp. pl. 439. Dill. elib. 298. t. 220. f. 287. Hab. in Carolina. T.

802. **ERIOSPERMUM**. Cor. 6-petala, campanulata, persistens. *Filamenta* basi dilatata. *Caps.* 3-locularis. *Semina* lana involuta.

1. *latifolium*, fol. subrotundis acuminatis, basi cucullatis. Willd. II. p. 110. Jacq. ic. 2. t. 420. Collect. suppl. 73. Ornithogalum capense, fol. corollato-ovatis. L. Ornith. radice tuberosa cyclaminis folio, flore pallide coerulesco. Breyn. Cent. t. 41. Radd. 1. p. et f. 14. Hab. ad Cap. b. spec. Cum sequentibus. Racemus pedunculis patulis plus quam decies flore longioribus. T.

2. *lanceacifolium*, fol. ovato-lanceolatis margine subundulato involuto. Willd. E. fol. lanceolatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 421. Coll. suppl. 72. Racemus pedunculis triplo flore longioribus erecto-patentibus. W.

3. *parvifolium*, fol. ellipticis obtusis planis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 422. Coll. suppl. 74. Pedunculi rectangule-patentes flore quadruplo longiores. W.

803. **ORNITHOGALUM**. Cor. 6-petala, erecta, persistens, supra medium patens. *Filamenta* basi dilatata aut subulata. *Caps.* subrotunda, angulata, 3-locularis. *Sem.* subrotunda, nuda.

1. *uniflorum*, scapo diphylo, fol. oppositis, pedunculo unifloro, petalis exterioribus lanceolatis retusis, interioribus ellipticis duplo latioribus. Willd. Sp. II. p. 111. Nov. Act. Petrop. XVIII. t. 6. f. 3. Hab. in Sibiriae montibus. Refert O. luteum, sed flos triplo maior. Stigmata tria, lutea.

2. *fibrosum*, radical. fibrosis intertextis, fol. subquinis radicalibus subulatis canaliculatis, scapo 1-floro brevissimo. Desf. Atl. 1. p. 294. Habitat in arenosis prope Kerwan. Cor. flava extus viresc.

3. *bulbiferum*, scapo folioso unifloro, fol. alternis linearibus-subulatis basi bulbiferis, radicalibus filiformibus, petalis aequalibus acutis. Willd. p. 112. Lin. suppl. 199. Pall. itin. 2. app. n°. 106. tab. O. Hab. in aridis limosis ad Wolgam et Jaicum. T.

4. *bonariense*, fol. radicalib. longis angustis, spatha diphylla brevi, flor. umbellatis (albido-purpurascens). O. *spathaceum*, Poir. in Enc. bot. 4. p. 618. Hab. in pascuis maritimis in Bonaria t. Buenos-Ayres. Commers. Flor. parvi, striati.

5. *spathaceum*, scapo suberecti, spatha univalvi, umbella pedunculata subtriflora. Hayne in Usteri N. Bot. Annal 15. Stück. p. 11. t. 1. Willd. p. 112. O. Haynii. Roth. O. minimum. Fl. dan. t. 612? Hab. in nemorosis humidiusculis prope Hamburgum et in ducatu Oldenburgensi. Scap. folio lanceolato spathiformi instructus. Flor. flavi.

6. *bohemium*, scapo folioso subunifloro, fol. alternis lanceolatis, radicalibus filiformibus, pedunc. pilosiusculis; petalis aequalibus lanceolatis obtusiusculis. Willd. Act. bohem. 2. p. 127. icon. Hab. in saxosis udis Bohemiae. T.

7. *luteum (pratense)*, scapo anguloso diphylo, pedunc. umbellatis simplicibus glabris. L. O. *pratense*, scapo polyphylo, pedunc. simplicibus triquetris glabris. Pers. in Usteri N. Bot. Annal. 5. Stück. p. 8. t. 2. f. 1.

8. *sylvaticum*, majus, scapo diphylo pedunculis simplicibus triquetris glabris Pers. in Usteri N. Annal. 5. St. p. 7. t. 1. f. 1. O. luteum. Fl. dan. t. 612. Hab. in Pomaniis, pratis. 9. in sylvis.

8. *minimum (arvense)*, scapo angulato diphylo, pedunc. pubescentibus umbellatis ramosis. L. O. *arvense*, scapo polyphylo, pedunc. ramosis teretiusculis tomentosis. Pers. l. c. p. 8. t. 1. f. 2. Hab. in arvis. Vere. Diversissimum a praecedente, pro quo a plurimis habetur.

9. *circinatum*, hirsutie canescens, fol. linearibus recurvatis canaliculatis, radicali solitario, caulinis tribus, caule tri-4. quadrifloro. Lin. suppl. 199. Pall. itin. 3. app. n°. 85. t. D. f. 2. Hab. in siecla limosis nitrosis versus Astrachan. Simillimum O. minimo. Vagiva laxa fibrosa reticulata fer-

ruginea folium et scapum quasi cucullo circumdans. L. $\overline{\text{C}}$

10. *paradoxum*, caulescens, fol. multifida ciliatis, scapo racemoso paucifloro, cor. campanulatis, flam. lanceolatis. Willd. p. 115. Jacq. Collect. suppl. 81. t. 1. Hab. ad Cap. b. spei. Planta florifera aphylla. Fructus ignotus. — Forte proprii generis planta. Willd. $\overline{\text{C}}$

11. *fimbriatum*, fol. linearibus ciliatis, scap. subbifloro, bract. pedunc. subaequalibus. Willd. in Act. Soc. Berol. v. 3. Pall. in N. Act. Petrop. 10. p. 309. Hab. in Tauria.

12. *niveum*, racemo paucifloro, petalis lanceolatis, fol. filiformibus canaliculatis, filamentis subulatis. Ait. Kew. 2. p. 440. Hab. ad Cap. b. spei. $\overline{\text{C}}$

13. *umbellatum*, flor. corymbosis, pedunculis altioribus, filamentis basi dilatatis. O. stipulis maximis, petiolis lateralibus longissimis. Hall. helv. n.º. 1215. Hab. in Poinariis, arvis.

14. *pyrenaicum*, racemo longissimo, petalis linearibus, flam. dilatatis, pedunc. floriferis patentibus: bracteis scapo approximatis. Lin. Engl. bot. t. 499. Jacq. Fl. austr. t. 103. Hab. in alpibus Helvetiae, Carniolae et in pratis Germaniae, Angliae. Flor. albo-virescentes.

15. *lacteum*, flam. alternis ad basin leviter marginatis, racemo pyraminato denso longo, fol. lanceolatis planis ad apicem conniventibus, ad oras villosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 434. Collect. suppl. 76. Hab. ad Cap. b. spei.

16. *ovatum*, fol. ovatis integris glabris, racemo ovato. Thunb. prod. p. 62. Hab. ad Cap. b. spei.

17. *ciliatum*, fol. ovatis acutis ciliatis, flor. racemosis. Lin. suppl. 199. Hab. ad Cap. b. spei. Cum 4-sequentib.

18. *crenulatum*, fol. oblongis obtusis ciliatis, flor. racemosis crecis. Lin. suppl. 198. O. unifolium. Retz. obs. 2. p. 17.

19. *pilosum*, fol. linearibus ensiformibus ciliatis, flor. racemosis, pedunculis incurvis. Lin. suppl. 199. Thunb. prod. 61.

20. *revolutum*, flam. subulatis, fol. sublinearibus planiusculis glabris, scapo flexuoso racemoso, petalis ad oras revolutis. Jacq. Schoenb. t. p. 46. t. 89.

21. *conicum*, racemo conico, flam. subulatis, bracteis membranaceis longitudine pedunculorum, fol. lanceolatis planis

marginibus villosis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 423. Collect. 3. p. 232.

22. *narbonense*, racemo oblongo, flam. lanceolatis membranaceis, pedunculis floribusque patentibus. L. Hab. in Galliae australis et Italiae, Sibiriae, Germaniae agris.

23. *latifolium*, racemo longissimo, flam. subulatis, pedunculis flore multoties longioribus, fol. lanceolatis. Willd. p. 119. Jacq. ic. rar. 2. t. 424. Collect. 2. p. 318. Hab. in Arabia, Aegypto. Flos albus.

24. *altissimum*, racemo longissimo, flam. subulatis, pedunc. flore duplo longioribus, fol. oblongis apice convolutis cuspidatis. O. giganteum, scapo racemose longissimis, bracteis subulatis brevibus. Jacq. Schoenb. 1. p. 45. t. 87.

25. *scilloides*, racemo longissimo, flam. subulatis, pedunc. longitudine flor., bracteis pedunculorum longitudine, fol. linearibus lanceolatis laxis, apice convolutis. Willd. O. filamentis subulatis, fol. subensiformibus apice candelatis, racemis longissimis cylindricis. Jacq. Schoenb. 1. p. 46. t. 88.

26. *longibracteatum*, racemo longissimo, bracteis pedunculis fere duplo longioribus, fol. lanceolatis ensiformibus. Murr. Syst. 327. Jacq. hort. t. 29. O. bracteatum. Thunb.

27. *japonicum*, racemo spicato cylindrico longissimo, scapo striato. Thunb. isp. 157. Fol. radicalia linearia plana scapo breviora. Cor. purpureo-caerulea patens persistens.

28. *comosum*, racemo brevissimo, bracteis lanceolatis longitudine florum, petalis obtusis, filamentis subulatis. Amoen. acad. 4. p. 312. O. fol. linearibus canaliculatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 426. Collect. 2. p. 313. Rudb. elys. 2. p. 435. f. 1.

29. *pyramidale*, racemo conico, flor. numerosis adscendentibus, petalis elliptico-oblongis planis, staminib. lanceolatis aequalibus, stylo brevissimo. Ait. Kew. 1. p. 441. Jacq. ic. rar. 2. t. 425. Coll. 2. p. 317. Rudb. elys. f. 4. Hab. in collib. Lusitaniae.

30. *tenellum*, flam. subulatis, scapo filiformi late racemoso, bracteis pedunc. duplo brevioribus, fol. linearibus canaliculatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 427. Collect. 2. p. 316. Petala lactea lanceolata, linea flavescenti.

31. *odoratum*, filamentis lanceolatis, racemo longo, fol. lanceolatis-linearibus superne planis humi prostratis. Jacq. ic. 2. t. 432. Collect. suppl. 78. Andrew. t. 260

Petala lutescentia linea medio viridi notata. *Grac.* ad Cap. b. spei. c. sequentib.

32. *suaveolens*, filamentis lanceolatis racemo brevi, fol. linearibus canaliculatis longitudine scapi. Jacq. ic. rar. 2. t. 431. Collect. 2. p. 316.

33. *secundo*, filamentis lanceolatis, racemo brevi secundo, fol. sublinearibus ad apicem acutum fornicatis, ad oras cartilagineo-muricatis erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 433. Collect. suppl. 79. O. maculatum. Thunb. prod. 62?

34. *fuscatum*, filamentis lanceolatis tribus latioribus, racemo oblongo, fol. paucis lineari-cuneiformibus, scapo triplo brevioribus, capsulis alato-trilobis. Jacq. ic. rar. 2. t. 440. Coll. suppl. 80.

35. *barbatum*, filamentis subulatis, fol. subgeminis subulatis, petalis tribus alternis ad apicem barbatis. Jacq. Schoenb. 1. p. 47. t. 91.

36. *polyphyllum*, racemo paucifloro, filamentis subulatis, petalis linearibus obtusis, apice calloso-inflexis, fol. lineari-subulatis semirectis. Willd. p. 123. Jacq. ic. 2. t. 430. Collect. suppl. 79. Racemus brevis.

37. *juncifolium*, filamentis sublanco-latis, racemo longissimo, foliis subulatis plurimis. Jacq. Schoenb. 1. p. 46. t. 90.

38. *rupestre*, fol. filiformibus carnosis, scapo paucifloro, flor. reflexis. Thunb. prod. 62. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

39. *arabicum*, corymbo multifloro, filamentis subulatis, cor. late campanulata, petalis exterioribus obsolete tridentatis. Ait. Kew. 1. p. 412. O. flor. corymbosis, pedunculis scapo humilioribus, filam. sub-emarginatis. L. Poir. in Enc. bot. 5. p. 616? Rudb. clys. 2. p. 130. f. 1. Besl. 5. t. 12. f. 1. Hab. in Alexandria, Barbaria, Madaga. Bractea amplexicaules. Flor. albi, basi fusi?

40. *thyrsoides*, fol. latis ciliatis, corym-bis multifloris racemiformibus, filam. alternis furcatis, fol. lanceolatis. Ait. Kew. 1. p. 412. Q. Flor. luteis, bracteis pedunculo brevioribus. Ait. Houtt. t. 82. f. 3. β. Flor. albis, bracteis longitudine pedunc. Jacq. hort. 3. p. 17. t. 28. Mill. ic. 228. t. 192. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

41. *aureum*, racemo coarctato, sub-corymboso, filamentis alternis emarginatis, fol. lanceolatis cartilagineo-denticulatis. Willd. p. 124. O. minimum. Jacq. ic. rar. 2. t. 438. Collect. 3. p. 233. β. O. flavescens. Jacq. l. c. t. 437. γ. O. flavissimum.

Jacq. t. 436. Hab. ad Cap. b. spei. Var. flor. rubris, aurantiis, flavis, quas cl. Willdenow. l. c. non puto species distinctas agnoscit.

42. *coarctatum*, racemo multifloro coarctato, filamentis alternis emarginatis, fol. linearibus canaliculatis. Willd. p. 125. Jacq. ic. rar. 2. t. 435. Collect. suppl. 77. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

43. *caudatum*, racemo longissimo, fol. lanceolato-linearibus, corollis patentibus, staminibus dilatatis, alternis cuneiformibus. Ait. Kew. 1. p. 412. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

44. *nutans*, floribus secundis pendulis, nectario stamineo campaniformi. Jacq. auct. t. 307. Hab. in Italia, Helvetia et Germania. ¶

804. SCHILA. Cor. 6-petala, patens, decidua. Filam. filiformia, petalorum basi adnata.

1. *maritima*, nudiflora, bracteis refractis. L. Willd. Sp. II. p. 125. Blackw. t. 591. Desf. Atl. 1. p. 297. Hab. ad Hispaniae, Lusitan., Siciliae, Syriae littora et in Barbariae arvis. Bulbus crassius fere cap. humani. Fol. lanceolata, stricta. Scapus ante folia, longissimus, multiflorus. Flor. albi.

2. *Lilio-Hyacinthus*, racemo paucifloro, pedunculis ebractatis, foliis lanceolatis humi adpressis, bulbo squamato. Willd. p. 126. S. radice squamata. L. Hort. cliff. 123. Moris. t. 12. f. 21. Hab. in Biscaya, Aquitania, Hispania, Pyrenaeis.

3. *italica*, racemo conico oblongo. L. Besl. cys. vern. 42. f. 1. Hab. ., Bractea longitudine pedicellorum.

4. *lingulata*, foliis lanceolatis planis racemo denso conico, bract. subulatis pedicellos sequentibus. Desf. Atl. 1. p. 298. Poir. it. p. 151. Hab. in Barbariae arvis. Flor. hyeme. Fol. vagina basi cincta.

5. *villosa*, fol. lanceolatis planis villosis, flor. corymbosis. Desf. l. c. p. 299. t. 85. f. 2. In arenis prope Kew. Fl. hyeme.

6. *obtusifolia*, scapo laterali, foliis linguiformibus undulatis, flor. racemosis ebractatis. Desf. l. c. t. 86. Hab. prope La Calle. Flor. S. autumnalis.

7. *parviflora*, fol. lineari-lanceolatis acutis glabris scapo brevioribus, flor. racemosis confertis, bract. brevissimis. Desf. Atl. t. p. 300. S. numidica. Poir. it. p. 151. Hab. in Algeria.

8. *undulata*, fol. lanceolatis undulatis, flor. laxo racemosis, bract. brevissimis. Desf. Atl. 1. p. 300. t. 88. Hab. in Barbariae collib. incultis. Cor. campanulata, pallide rosea. Flor. autumnus.

9. *tetraphylla*, aculis, floribus fasciculatis, fol. quaternis ovato-lanceolatis. Lin. suppl. 200. Hab. in Africa.

10. *peruviana*, corymbo conferto conico, fol. in orbem expansis margine ciliatis. Rudb. clys. 1. p. 37. f. 1. Moris. 2. 4. t. 12. f. 19. Desf. Atl. 1. p. 298. Hab. in Lusitania et in Barbariae arvis. Radix tunicata, lanuginosa. Fol. in pl. culta glabra.

11. *japonica*, florum umbella terminali fastigiata. Thunb. jap. p. 137. Hab. in Japonia. Bractea in scapo et sub flor. membranacea lanceolata erecto-adpressa. Cor. patens albo-purpurea. T.

12. *amoena*, scapo angulato, pedunc. alternis flore brevioribus, bracteis obtusis brevissimis. Willd. Rudb. clys. 2. p. 34. t. 7. Hab. in Austria, Russia, Germania, Petal. laxis linearis 2 albidis. T.

13. *praecox*, scapo angulato, racemo subcorymboso, pedunculis flore duplo longioribus, bracteis obscuris. Willd. p. 128. Hab. . . A. praecedente habitu, parvitate et proceritate floris jam primo intuitu distincta. W.

14. *campanulata*, bulbo solido, racemo multifloro oblongo-subconico, cor. campanulatis erectis, bract. bipartitis pedunc. longioribus, fol. lanceolatis. Ait. Kew. 1. p. 444. Scilla hyacinthoides. Jacq. ic. rar. 1. t. 65. Collect. 1. p. 61. Hab. in Hispania, Lusitania. T.

15. *bifolia*, radice solida, flor. racemosis ebracteatis, fol. lanceolatis sublinis in scapo elevatis. Ait. Kew. 1. p. 444. Engl. bot. t. 24. Hab. in Gallia, Germania. T.

16. *varna*, corymbo hemisphaerico paniciformi bracteato, fol. linearibus canaliculatis. Huds. angl. 142. Smith. brit. 1. p. 129. Engl. bot. t. 23. Flor. dan. t. 538. Hab. in Hispaniae et Cambriae pratis et Angliae maritimis.

17. *lusitanica*, racemo oblongo conico, petalis linearis. L. Rud. clys. 2. p. 34. f. 4. Hab. in Lusitania. T.

18. *orientalis*, flor. erectis racemosis, fol. elliptico-ensiformibus. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 334. S. bifolia. Thunb. jap. 138. Hab. in Japonia. T.

19. *hyacinthoides*, racemo cylindraceo multifloro petalis germine aequilongiorib.

pedunculis coloratis, fol. lanceolatis. Ait. Kew. t. p. 445. Hab. in Madera et Lusit. T.

Obs. Nisi saepe a bulbo principe avellantur bulbilli, per annos saepe viginti non florebit. Gouan.

20. *autumnalis*, fol. filiformibus linearibus, floribus corymbosis, pedunculis ebracteatis nudis ascenduntibus longitudine floris. L. Car. ic. 3. p. 38. t. 274. f. 2. Engl. bot. t. 78. Curt. Lond. ic. Hab. in Europa australiori solo glaroso et pascuis sterilioribus. Pet. rosea. T.

21. *mauritanica*, flor. racemosis, bract. binis pedunc. sequantibus, fol. linearibus planis apice involutis. Schomb. maroc. t. p. 154. Hab. in monte Shibil Kibir in Barbaria. Priori affinis, sed cor. minores, minus patulae. S.

22. *tingitana*, flor. racemosis, bract. solitariis pedunc. brevioribus, fol. lanceolatis planis, apice involutis. Schomb. p. 155. Cum priore. Bract. persistentes. Cor. majores quam in S. autumnali.

23. *biflora*, racemo laxo, flor. geminis. S. biflora. Flor. Peruv. 3. p. 69. In Peruvia collib. arenosis. Cor. alba.

24? *unifolia*, folio teretiusculo latere subspicato. L. Ornithogalum spicatum unifolium, flore niveo odorato. Griseb. lusit. Hab. in Lusitania.

805. CYANELIA. Cor. hexapetala: petalis 3 inferioribus propendentibus. Stylus et Stamen infimum declinata. Caps. subrotunda, 3-locularis. (Stam. etiam 3 deflexa.)

1. *capensis*, caule folioso paniculato, racemis divaricatis, fol. lanceolatis undulatis. Willd. Sp. II. 1. p. 231. Lin. suppl. p. 201. Andrew. t. 197. Jacq. hort. 3. p. 21. t. 35. Hab. ad radices montis Tabularis in Cap. b. spec. Flor. caerulea. T.

2. *orchidiformis*, caule ramoso, racemis erectis, fol. caulinis ensiformibus strictis, radicalibus ovatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 447. Collect. 4. p. 211. Cum priore. Fol. glauca, margine cartilagineo-denticulata. Stam. tria deflexa.

3. *lutea*, scapo nullo subramoso: racemis erectis, fol. linearibus lanceolatis planis. Willd. Lin. suppl. 201. Thunb. in Act. holm. 1794. p. 125. t. 7. f. 1. Hab. in campis inundatis arenosis Cap. b. spec. Stam. tria deflexa. T.

4. *alba*, scapo nudo unifloro, fol. filiformibus. Willd. Thunb. l. c. p. 195. t. 7. f. 2. Hab. in Bockland. $\overline{\text{T}}$

806. ASPHODELUS. Cor. 6-partita, patens. Nect. ex valvulis sex germina tegentibus.

1. *acaulis*, caul. nullo; fol. subulato-triquetris, pedicel. fructiferis reflexis. Desf. Atl. t. p. 302. t. 89. Hab. in montib. Slibae. Cor. pallide rosea.

2. *luteus*, caule folioso, fol. triquetris striatis. L. Blackw. t. 233 Jacq. hort. 1. 77. A. stipulis maximis. Hall. helv. n. 1206. A. luteus flore et radice. Bauh. pin. 28. Hab. in Sicilia et Helvetia. $\overline{\text{O}}$

3. *creticus*, caule folioso superne nudo ramoso, fol. filiformibus striatis denticulatis subciliatis. Lam. Enc. 1. p. 297. Hab. in Creta.

4. *ramosus*, caula ramoso nudo, fol. ensiformibus carinatis laevibus. L. Hab. in Europa australi. $\overline{\text{T}}$

5. *albus* (simplex), caule nudo simplici, pedunc. confertis longitudine bractearum, fol. linearibus carinatis laevibus. Willd. p. 133. A. ramosus. Murr. Comm. Goett. 1776. p. 39. tab. 7. Blackw. t. 238. Hab. in saxosis Lusitaniae, Hispaniae, Narbonae, Croatiae. $\overline{\text{T}}$

6. *stulosus*, caule nudo, fol. strictis subulatis strictis substulosis. Cav. ic. 3. p. 1. t. 202. Moris. s. 4. t. 1. f. 5. Hab. in Galloprovincia, Hispania, Creta. $\overline{\text{T}}$

7. *altaicus*, caule nudo simplici, staminibus cor. duplo longioribus, fol. linearibus canaliculatis. Willd. p. 134. Act. Petrop. 1779. p. 260. t. 10. Ad radices mont. Altaicorum. $\overline{\text{T}}$

8. *liburnicus*, caul. simplici basi foliis cor. cernuis monoptalis, fol. setaceis. W. Scop. carn. n. 411. t. 12. Hab. in Istria. \dagger

807. PHALANGIUM. Cor. 6-petala patens. Filamenta nuda s. glabra. Caps. ovata. Sem. angulata. (Rad. plerumque fibrosae aut fasciculatae. Fol. plana. Flor. in plumeris albi aut purpurascens. Huc omnia ANTHEERICA L. prioris sectionis.)

* Filamenta filiformia aequalia.

1. *serotinum*, fol. planiusculis, scapo unifloro. Lin. Willd. II. p. 134. sub Anth-

rico, (uti omnes sequentes species.) Ornithogalum striatum. Willd. Sp. II. 112. Fol. crassulis, scapo unifloro. Rag. angl 3. p. 374. t. 17. f. 1. Hab. in alpinis $\overline{\text{T}}$

2. *fragrans*, fol. tereti-filiformibus strictis scapo brevioribus, scapo simplici. Willd. p. 135. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 45. t. 86. Hab. ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

3. *filifolium*, filam. glabris, radice bulbosa, fol. filiformibus flexuosis glabris, scapo simplici flexuoso. Jacq. ic. rar. 2. t. 414. Collect. suppl. 93. Hab. ad Cap. b. spei in regione Namaqua.

4. *flexifolium*, fol. linearifiliformibus flexuosis reflexis, basi ciliatis scapo ramosi longitudine. Willd. p. 135. Jacq. ic. rar. 2. t. 412. Collect. suppl. 93. Lin. suppl. 201. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *filiforme*, fol. filiformi-teretiusculis scaberrimis, petalis lanceolatis. Alt. Kew. 1. p. 451. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *exuviatum*, fol. linearisubulatis canaliculatis, scapo simplici fol. brevioris, squamis radicalibus transversim rugosis. Willd. p. 136. Jacq. ic. rar. 2. t. 415. Collect. suppl. 89. Hab. ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

7. *elongatum*, fol. linearifiliformibus scapo ramoso brevioribus, racemis elongatis. Willd. p. 136. Anthericum filiforme. Thunb. prod. 62. Hab. ad Cap. b. spei. \dagger

8. *virgatum*, foliis strictis filiformibus acutis, caul. superne ramoso, ramis virgatis simplicibus, flor. minimis caul. folioso sulcato. Poir. in Enc. bot. 5. p. 246. Hab. in Carolina. Cor. alba, medio stria purpurea. Scap. 2-3-pedalis.

9. *fastigiatum*, caul. altissimis nudis, ramis pluribus virgatis, flor. subternatis. Enc. 1. c. Hab. . . Fol. ? Flor. albi. \dagger

10. *revolutum*, fol. oblongis undulatis, spic. longissimis pyramidalis. petal. revolutis. Ph. spicatum. Enc. bot. 1. c. Hyacinthus revolutus. Lin. suppl. p. 204. Hab. ad Cap. b. sp. Cor. pallescens, fascia brunnea.

11. *capillare*, fol. capillaribus substriatis longis, scapo nudo simplici, spica brevi viridescens. Enc. bot. 1. c. Hab. . . \dagger

12. *croceum*, bulbosum, fol. gramineis, spica pyramidalis, bract. convoluta-amplexantibus, seminib. subglobosis. Michaux. Flor. 1. p. 196. Hab. in humidis ayiv. Georgiac. Flor. crocei.

13. *planifolium*, foliis planis, scapo compresso glabro, filam. interne lanatis superne spiculatis. Schoub. Maroc. 1.

p. 157. Willd. II. p. 136. A. bicolor. Desf. Atl. t. p. 304. t. 90. Hab. in Lusitania et in Barbaria, in fructibus Shibil Kibir. Petal. intus nivea, extus purpurascens, etiam utrinque purpurea.

14. *gracum*, fol. planis, scapo simplici, floribus corymbosis, filam. lanatis? Syst. Veg. 272. Hab. in Oriente. Fol. linearia, longitudine fere scapi. L. Filam. non lanata. L. Mant. 365.

15. *squamum*, scapo squamis membranaceis tumidis imbricato. Lin. suppl. 282. Hab. ad Cap. b. spei. Radix tuberosa oblongis tomentosis pluribus, flo. pendulis. Cor. infundibuliformis extus subpubescens serpatia. Var. fol. hirsutis et glabris. L.

16. *comosum*, fol. ensiformibus glabris, scapo ramoso comoso. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei. $\frac{1}{2}$ +

17. *floribundum*, foliis planis glabris linearibus lanceolatis acutis, scapo simplici, racemo multifloro cylindrico compacto, petalis patentibus, staminibus glabris. Ait. Kew. 1. p. 447. Hab. ad Cap. b. spei. $\frac{1}{2}$

18. *revolutum*, fol. trigonis scabris, scapo ramoso, cor. revolutis. Mill. dict. n^o. 1. A. fol. linearibus scapo longioribus. Thunb. prod. 62. Comm. hort. 1. p. 67. t. 34. Hab. ad Cap. b. spei.

19. *ramosum*, fol. planis, scapo ramoso, cor. planis, pistil. recto. L. Jacq. austr. t. 16. Hab. in rupibus et sylvis calcareis.

20. *sulphureum*, fol. lanceolato-linearibus canaliculatis, apice obtuso-concavis, scapo racemose simplicissimis, cor. patentissimis. Pl. Hongar. p. 89. t. 95. Hab. ad Thermas. Fl. Moja.

21. *caeruleum*, fol. ensiformibus, panic. longissima, flor. caeruleis. Flor. Peruv. 3. p. 67. Bermudiana caerulea. Feuill. 2. p. 75. pl. 8. Hab. in R. Chilensis umbrosis, Rad. fasciculata, odore Ictos florentinae. Cor. marcida, spiralliter contorta.

22. *coarctatum*, fol. inferne carinatis, medio coarctatis, pedunc. bifido-dichotomis, pedicel. subumbellatis. Flor. Per. l. c. t. 299. Hab. in Andium montibus. Cor. violaceo-caerulea. Planta tincturam croceam immutabilem praebet.

23. *eccremorhizum*, fol. ensiformibus carinatis, scapo folioso, racem. longis, spathis 2-3-floris. Flor. Per. t. 303. Cresc. in Peruviae collib. Habitus Asphodeli. Rad. tuberosa pendula, lanuginosa.

24. *glaucum*, racemo longissimo simplici multifloro, pedunc. florifero patentibus:

fructiferis adpressis. Flor. Per. l. c. p. 68. Hab. in Andium montibus. Fol. ensiformis, supra glauca.

25. *elatum*, fol. planis scapo ramoso, pedunculis aggregatis, corollis planis. Ait. Kew. 1. p. 448. Hab. ad Cap. b. spei.

26. *falcatum*, fol. carnosis ensiformibus falcatis glabris, caule ramoso racemosa. Lin. suppl. 202. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. depressa terrae incumbens.

27. *contortum*, fol. planis ensiformibus, caule ramoso, floribus remotissimis. Lin. suppl. 202. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. contorta.

28. *vespertinum*, fol. linearibus ensiformibus carinato-triquetris, scapo ramoso brevioribus. Willd. p. 139. A. filamentis muricanis. Jacq. Schoenb. 1. p. 44. t. 85. Hab. ad Cap. b. spei. $\frac{1}{2}$

29. *graminifolium*, fol. linearibus planis depressis scapo ramoso brevioribus, petalis alternis undulatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 411. Collect. suppl. 87. Hab. ad Cap. b. spei. $\frac{1}{2}$

30. *japonicum*, fol. ensiformibus contortis glabris, scapo ramoso angulato, flor. racemosis cernuis. Thunb. jap. 138. Hab. in Japonia, China et Java.

31. *niveum*, fol. planis basi plicatis, caul. simplici, flor. densissimis longe apicatis bract. nigris pedunc. aequantibus. Enc. bot. 5. p. 248. Hab. in India. Cor. parva.

32. *longifolium*, fol. linearibus decumbentibus margine ciliatis scapo ramoso longioribus. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 413. Collect. suppl. 92. Hab. ad Cap. b. spei. $\frac{1}{2}$

33. *hirsutum*, fol. linearibus hirsutis scapo ramoso brevioribus, racemo longissimo. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei. $\frac{1}{2}$

34. *Adenantha*, fol. linearibus ensiformibus basi connatis, glandula inter filamentum et antheram. Forst. prod. n^o. 149. Hab. in N. Caledonia.

35. *pilosum*, scapo simplici folioso glabro, fol. lanceolatis vaginantibus utrinque pilosis. Willd. p. 140. Jacq. ic. rar. 2. t. 416. Collect. suppl. 87. Hab. ad Cap. b. spei. $\frac{1}{2}$

36. *undulatum*, fol. ensiformibus falcatis undulatis scapo longioribus. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei. $\frac{1}{2}$

37. *triflorum*, fol. canaliculato-ensiformibus, scapo simplici, bracteis remotis trifloris. Ait. Kew. 1. p. 448.

♂. *A. bipedunculatum*, filam. glabris, radice fasciculata, fol. lanceolato-linearibus, carinatis, scapo racemoso simplici, bract. subbifloris. Jacq. ic. 2. t. 410. Collect. suppl. 88. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

38. *canaliculatum*, fol. subcarnosis pilosis ensiformi-triquetris latere angustiori canaliculatis, scapo simplici. Ait. Kew. 1. p. 448. Hab. ad Cap. b. spei. S. apusteres pilosus. ♀

39. *Albucoides*, fol. linearibus canaliculatis glabris, margine cartilagineis, scapo simplici. Ait. Kew. 1. p. 449. Hab. ad Cap. b. spei. Petalis luteis, carina viridi, apice fornicatis, refert Albucam. Ait. l. c. ♀

40. *Liliago*, fol. planis, scapo simplicissimo, cor. planis, pistillo declinato. Jacq. hort. 1. t. 81. Moris. 5. 4. t. 2. f. 10. Liliago Cordi. Lob. ic. p. 48. Hab. in Helvetia, Germania, Gallia. ♀

41. *Liliastrium*, fol. planis, scapo simplicissimo, cor. campanulatis, staminibus declinatis. L. Scheuchz. alp. 1. p. 48. et 7. p. 514. Hab. in alpinis Helveticis, Allobrogibus. Corol. Lili candidi. ♀

42. *spirale*, scapo spirali. L. Hab. sub monte Leonis Cap. b. spei, locis glareosis. ♀

• • *Filamenta medio incrassata.*

43. *phryodes*, filam. glabris, rad. bulbosa, fol. oblongis planis lucidis, racemo subcorymboso. Jacq. ic. rar. 2. t. 418. Coll. suppl. p. 94. *A. marginatum*. Thunb. Stam. medio dilatata. Facies scillae. Willd. p. 147. Cum sequente ad Cap. b. spei.

44. *pusillum*, filam. lanceolatis glabris, rad. bulbosa. fol. lanceolato-linearibus in orbem prostratis. racem. corymboso. Jacq. p. c. t. 417. Collect. suppl. p. 94.

Obs. Stam. uti in priore specie, quam ob rem a cl. Willd. in subdivisione peculiari: *Scilloides* illae enumerantur.

45. *coarctatum*, fol. ensiformibus carinatis, medio coarctatis, petunc. bifidodichotomis, pedicell. subumbellatis, filam. ad medium incrassatis. Flor. Per. 3. p. 67. t. 299. Hab. in Andium montibus. Cor. violaceo-cerulea. Planta tincturam croceam praebet.

808. **ANTHERICUM**. *Filamenta* barbata, cetera *Phalangii*. (Fol. succulenta, fistulosa. Flor. Intei, *Bulbine*. L.)

1. *frutescens*, fol. carnosis teretibus,

caule fruticoso erecto ramoso. Willd. sp. 17. p. 142. Plantae grassae, ic. Hab. ad Cap. b. spei, uti omnes quae sequuntur. ♀

2. *rostratum*, antheris barbatis, caul. fruticosis radicanibus brevissimis, fol. subulatis teretibus pulposis. Jacq. ic. rar. 2. t. 403. Collect. suppl. 82. Habit. ad Cap. b. spei. ♀

3. *Alvodes*, fol. carnosis linguiformi-lanceolatis planiusculis. Willdenow. p. 143. Plant. grassae, ic. Dill. elth. 312. t. 232. f. 300. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. inferne convexa. ♀

4. *nutans*, fol. carnosis lanceolatis planis basi concavis, apice reflexis, racemo apice nutante. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 407. Collect. suppl. 86.

5. *incurvum*, fol. carnosis trigonis incurvis brevissimis, racemo elongato cernuo. Thunb. prod. 62.

6. *latifolium*, fol. carnosis lato-ensiformibus glabris, racemo longissimo, caule simplici. Lin. suppl. 202. Jacq. ic. rar. 2. t. 408. Collect. 219.

7. *pugoniforme*, filam. barbatis acaule, radice subrotunda perenni, fol. crasso-subulatis antice sulcatis apice teretibus pulposis erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 405. Collect. suppl. 81.

8. *praemorsum*, fol. carnosis linearibus canaliculatis distichis erectis scapo brevioribus. Willd. A. radice perenni difformi praemorsa, fol. subtriquetris. Jacq. ic. rar. 2. t. 406. Collect. suppl. 85.

9. *Asphodeloides*, fol. carnosis subulatis semiteretibus strictis. L. Jacq. hort. 1. 181. Hab. in Aethiopia. Fol. margine aspera. ♂

10. *longiscapum*, fol. carnosis subulatis semiteretibus flexuosis glaucis, scapo triplo brevioribus. Willd. p. 145. Jacq. ic. rar. 2. t. 404. Collect. suppl. 84. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

11. *annuum*, fol. carnosis subulatis teretiusculis, scapo subracemoso. L. Hort. ups. 84. Mill. dict. n. 7. Plantae grassae, ic. Hab. in Aethiopia. ☉

12. *hispidum*, fol. carnosis compressis hispidis. L. A. filam. muricatis, scapo hispido. Jacq. ic. 2. t. 409. Collect. suppl. p. 91. Habitat ad Cap. b. spei. Radix fibrosa. ♀

13. *muricatum*, fol. linearibus muri-

cois striatis, scapo ramoso inferne muricato. Thunb. prod. 63. Scapus bipedalis postea ramosus.

14. *ciliatum*, fol. ensiformibus carnososubtriquetris ciliatis, scapo simplici, racemo longissimo. Lin. suppl. p. 202. Fol. longissima.

15. *Cauda felis*, fol. canaliculato-ensiformibus, scapo simplici, racemo oblongo. Lin. suppl. p. 202. A. caudatum. Thunb. prod. 63.

16. *triquetrum*, fol. filiformibus triquetris scapo simplici brevioribus, racemo ovato. Lin. suppl. p. 202.

17. *scabrum*, fol. triquetris serrulatis, caule ramoso scabro, pedunc. fructiferis recurvis. Lin. suppl. p. 202.

18. *cirrhatum*, fol. lanceolatis planiusculis, scapo paniculato, filam. barbatis laceratis. Forst. prod. n. 148. Hab. in N. Zeelandia.

19. *crispum*, fol. ellipticis crispis ciliatis, scapo ramoso. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei. †

Obs. An omnes hae species revera hujus generis?

809. NARTHECIUM. Cor. hexapetala, patens, persistens. Filam. filiformia, hirsuta. Caps. supera prismatica. Sem. utrinque appendiculata.

1. *ossifragum*. Smith. brit. z. p. 368. Engl. bot. t. 535. Anthericum. Lin. Willd. p. 147. Flor. dau. t. 42. Hab. in uliginosis, paludib. turfosis. Fol. ensiformia. Cor. flava. †

810. XANTHORRHÆA. Cor. infera, hexapetala, persistens. Filam. plana, nuda. Caps. triquetra. Semina bina, compressa, marginata.

1. *resinosa*. Hab. in Australia, s. N. Hollandia. Caud. lignosus resina flava scattens. Scap. longissimus, amento terminatus multifloro. Smth. in Act. soc. Lin. V. †

811. CONANTHERA. Cor. supera. Petala 6, reflexa. Antherae in conum acutum coalitae. Caps.

oblonga, 3-locularis, 3-valvis. Sem. pauca, subrotunda.

1. *bifolia*, pedunc. bifloris, fol. 2-radiculibus, linearis-ensiformibus. Flor. Peruv. 3. p. 68. t. 301. Bermudiana poliposa. Trew. 3. p. 8. pl. 3. Hab. in R. Obiens. collibus. Petal. violaceo-cerulea basi variegata. Bulb. 1-articulatos.

2. *Echeandia*, scapo simplici, fol. lanceolato-ensiformibus, petal. 3-exterioribus angustissimis, filam. glandulosis. Anthericum reflexum. Cor. ic. 3. p. 21. t. 247. Willd. II. p. 140. Echeandia terniflora Ortega dec. pl. p. 50. Hab. . . . Cor. lutea.

Obs. Hoc genus ad Syngenesiam-monogamiam potius transcendendum.

812. ASPARAGUS. Cor. 6-partita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca 3-locularis, supera, polysperma. (Fol. fasciculata.)

1. *officinalis*, caule herbaceo erecto paniculato, fol. setaceis, flor. dioicis, pedunculis in medio articulatis. Lamarck. Encyclop. t. p. 295. (Asparagus maritimus, humilior, divaricatus, griseus. Hab. in arenosis, sylvaticis.)

2. *tenusifolius*, humilis, caule herbaceo ramosissimo folioso, flor. hermaphroditis, pedunc. longis sub flore nodosis. Lamarck. Enc. t. p. 295. Bauh. pin. 594. Hab. in Galliae meridional. montosis et uliginosis.

3. *declinatus*, caule inermi tereti, ramis declinatis, fol. setaceis. L. Hab. ad Cap. b. spei. †

4. *decumbens*, caule herbaceo inermi decumbente ramosissimo, ramis flexuosis, fol. setaceis, pedunc. solitariis terminalibus. Willd. p. 151. Jacq. Schoenb. t. p. 71. t. 97. Hab. ad Cap. b. spei. †

5. *crispus*, caule herbaceo debili tortuoso, ramis incurvis flexuosis subcrispis, flor. solitariis, pedunc. nudo. Lam. Enc. t. p. 295. Hab. in ins. Franciae. †

6. *flexuosus*, herbaceus inermis, caule flexuoso, fol. lanceolatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *scandens*, herbaceus inermis volubilis, foliis lanceolatis falcatis. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei.

8. *falcatus*, aculeis solitariis reveris,

ramis teretibus, fol. ensiformibus falcatis, pedunc. axillaribus 1-floris. Burm. zeyl. 36. t. 13. f. 2. Hab. in Zeylona. ♂

9. *racemosus*, aculeis solitariis, ramis striatis, fol. fascicularibus linearibus-subulatis falcatis, racemis multifloris axillaribus. Willd. Hab. in India orientali. Flor. parvi et pedunc. bracteis oblongis suffulti. W. h

10. *retrofractus*, aculeis solitariis, ramis teretibus reflexis retrofractisque, fol. setaceis fasciculatis. Pluk. amath. 40. t. 375. f. 3. Hab. in Africa. h

11. *aethiopicus*, aculeis solitariis reversis, ramis angulatis, fol. lanceolatis-linearibus. Mant. 63. Hab. ad Cap. b. spei. Rami flexuosi, angulati. T

12. *asiaticus*, aculeis solitariis, caule erecto, ramis filiformibus, fol. fasciculatis setaceis. L. Pluk alm. 45. t. 15. f. 4. Hab. in Asia? h

13. *albus*, aculeis solitariis, ramis angulatis flexuosis, fol. fasciculatis triquetris mucicis deciduis. L. A. aculeatus, spinis borridis. Baub. pin. 590. Moris. 1. 1. 1. f. 3. Hab. in Lusitania, Hispania et Barbaria. Turiones edules sunt. Caul. albus. h

14. *acutifolius*, caule inermi angulato fruticoso, fol. aciformibus regidulis pennantibus mucronatis aequalibus. L. Mill. dict. n. 3. Sanv. monsp. 45. Hab. in Lusitania, Hispania, Montpelii et Oriente. Turiones quoque comeditur. h

15. *subulatus*, frutescens inermi, ramis retroflexis, foliis teretibusulatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei. h

16. *dependens*, fruticosus aculeatus, ramis reflexis, fol. subulatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei. h

17. *horridus*, aphyllus fruticulosus pentagonus, acul. tetragonis compressis striatis. Lin. suppl. p. 203. Cavan. ic. 2. p. 30 t. 136. Desf. atl. 1. p. 307. Hab. in Hispania et Barbariae arvis. Sequentis var.? h

18. *aphyllus*, caule inermi angulato fruticoso, fol. subulatis striatis inaequalibus divergentibus. Mor's. 1. 1. t. 1. f. 2. A. phyllacanthus. Lam. enc. 1. p. 296. Hab. in Sicilia, Hispania, Lusitania et Barbaria, ad littora maris.

19. *lanceus*, aculeis solitariis, fol. lanceolatis subfalcatis, pedunc. axillaribus solitariis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei. h

20. *capensis*, spinis quaternis, ramis aggregatis teretibus, fol. setaceis. L. Pluk. alm. t. 78. f. 8. Hab. ad Cap. b. spei. Spinac teruae. Lam.

21. *sarmentosus*, fol. solitariis linearilanceolatis, caule flexuoso, aculeis recurvis. Flor. zeyl. 124. Mill. dict. n. 11. Hab. in Zeylona. h

22. *verticillaris*, fol. verticillatis. L. A. orientalis, fol. gallii. Tournef. Buxb. cent. 5. spf. 47. t. 37. Hab. in Oriente. †

813. DRACENA. Cor. 6-partita, erecta. Filam. medio subcras-siora. (L.) aut simplicia. Bacca 3-locularis, 1-sperma.

1. *Draco*, arborea, fol. subcarnosis apice spinosis. Linn. Willd. Sp. p. 155. Blackw. t. 358. Draco arbor. Habitat in India orientali. h

2. *marginata*, fol. angustis planis acutis confertis terminalibus, margine purpureis, Lam. enc. 2. p. 324. Hab. ad Madagascar. Psiori affinis.

Obs. Non est D. marginata. Ait. quae nunc dentata nominatur.

3. *indivisa*, arborea, fol. ensiformibus acutis, racemo laterali composito. Forst. escul. n. 33. Hab. ad portum obscurum N. Zealandiae. h

4. *umbraculifera*, arborea, fol. ensiformibus acuminatis, panicula terminali densissima subsessili. Jacq. Schoenb. 1. p. 50. t. 95. Hab. culta in insula Mauriti. h

5. *australis*, arborea, fol. ensiformibus acutis, racemo terminali erecto supradecomposito. Forst. prod. n. 151. Hab. in N. Zealandia. h

6. *cernua*, arborea, fol. lanceolatis suboblique-flexis, panicula dependente divaricata. Willd. p. 157. Schoenb. 1. p. 50. t. 96. Hab. in insula Mauriti. h

7. *ferrea*, arborea, fol. lanceolatis acutis. L. Hab. in China. Fuscopurpurea. h

8. *dentata*, fruticosa, fol. dentato-spinosis, racemis axillaribus, bacis polyspermis. Ait. Kew. 1. p. 454. D. *marginata*. Aloe purpurea. Lam. enc. 1. p. 55. Plant. grass. ic. Genus forte intermedium inter

alcom et draenensm. Fol. non succulenta. Hab. in insula Bourbon. h

9. *terminalis*, arborescens, fol. lanceolatis petiolatis, ramis paniculae patentissimis. Lam. l. c. Willd. II. p. 154. Jacq. ic. 2. t. 448. Collect. 2. p. 357. Rumph. 4. t. 34. Hab. in India, China. Fol. fere cannae. Rad. contra diarrhaeam. Demum purpurascens.

10. *reflexa*, fol. ensiformibus supra basin angustatis: inferioribus rebexis, flor. pedicellis longioribus. Lam. enc. 2. p. 327. Cordylina. Commers. Rumph. 7. t. 35. ? Hab. in ins. Mauritania. Filam. non incrassata? Baeca flava.

11. *mauritanica*, suffrutescens, fol. ensiformibus, scapo sarmentoso alterne paniculato, flor. pedicellis aequantibus. Lam. p. 325. Hab. in insula Bourbonia. Fol. iridea.

12. *striata*, frutescens erecta, fol. lanceolatis oblique falcatis striatis, caule flexuoso. Lin. suppl. 204. Asparagus striatus. Thunb. prod. 65. Hab. ad Cap. b. spei. h

13. *undulata*, herbacea caulescens erecta, fol. ovatis acutis multinerviis, flor. axillaribus pedunc. Lin. suppl. 204. Asparagus undulatus. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *erecta*, herbacea caulescens erecta, fol. lanceolatis subulatis subsessilibus. Lin. suppl. 204. Asparagus erectus. Thunb. prod. 65. Hab. ad Cap. b. spei.

15. *borealis*, herbacea subsulescens, fol. ellipticis subplicatis. Ait. Kew. 1. p. 454. t. 5. Andner. t. 206. Filam. simplicia. Hab. in sinu Hudsonis et Canada, ¶

16. *graminifolia*, herbacea acaulis, fol. linearibus. L. Hab. in Asia. Statura Anthrici Phalangii. Fol. valde striata. Flor. ad singulos dentes racemi 4 s. 5, quasi e gluma proleunt. L. Filam. incrassata.

814. DIANELLA. *Cor.* aperta. *Filam.* apice tumida s. incrassata. *Bacca* 3 locularis: loculis 4-2-sperminis.

1. *memorosa*. Lam. enc. 2. p. 276. Les Liliacées. t. 1. Jacq. Schoenb. t. p. 49. t. 94. Rumph. 5. t. 73. Draecena ensifolia. Lin. Willd. Sp. II. p. 158. Hab. in Indiae nemorib. Fol. iridea. Flor. paniculati, atrovirentes. Baeca amethystea.

815. CORDYLINA. *Cor.* externa pubesceus. *Filam.* simplicia, basi corol. inserta. *Stigm.* subincrassatum. *Bacca* (turbinata) 1-locularis.

1. *hemichrysa*. Commers. Dianella hemichrysa. Lam. Hab. in insula Bourboniae, supra arbores et saxa. Fol. radicalia subtus flava et pubescentia. (Ex. observat. eel. du Petit-Thouars.)

816. SANSEVIERA. *Cor.* infera, monopetala; tubo filiformi, limbo 6-partito, r-voluto. *Stam.* limbo inserta. *Bacca* 1-sperma.

1. *guineensis*, fol. lanceolatis planiusculis uniformibus, stylo staminibus duplo longiore, bracteis tubo corollae triplo brevioribus, flor. sessilibus. Willd. Sp. II. p. 159. Thyrsiflora. Thunb. prod. 65. Aleris hyacinthoides β guineensis L. Jacq. hort. 1. p. 61. t. 84. Aloe guineensis, radice geniculata, fol. ex viridi et atro undulatum variegatis Comm. hort. 2. p. 39. t. 20. Hab. in Guinea, Bacca lutea. ¶

2. *zeylanica*, fol. glomeris oblongis acutis lanceolatis canaliculatis, stylo longitudine staminum, bracteis pedunculatis longitudine. Willd. Salmia spicata, fol. rigidis canaliculatis maculatis, flor. spicata. Cav. ic. 3. p. 24. t. 246. Liriope spicata. Loureiro coch. p. 248. Comm. hort. 2. p. 41. t. 21. Hab. in Zeylonia. Fol. carnosius minor. ¶

3. *lanuginosa*, fol. nervosis; nervis lanuginosis, inferioribus oblongis, reliquis linearibus, stylo staminum longitudine, pedunc. ebracteatis. Willd. p. 160. Salmia ebractea. Cav. l. c. Rheed. 11. p. 38. t. 42. Hab. in Indiae arenosis. ¶ +

817. CONVALARIA. *Cor.* 6-fida (varia). *Bacca* maculosa, 3-locularis, superea.

* *Cor. campanulatis.*

1. *majalis*, scapo nudo semicylindrico, fol. ovatis. Willd. Sp. II. p. 160. Flor. den. t. 854. Hab. in montosis sylvaticis. ¶

2. *japonica*, scapo nudo ancipiti, flor. racemosis secundis, fol. linearibus gramineis, scapo triplo longioribus. Lin. suppl. 203. Kaempfer. amoea. 823. ic. Hab. in Japonia.

3? *spicata*, scapo nudo, racemo spicato, flor. aggregatis. Thunb. jap. 141. Hab. in Japonia. Cor. subglobosa violacea. Fruc. obscurus. Thunb. $\bar{\tau}$ \dagger

** *POLYGONATUM*, oor. *infundibuliformibus*.

4. *verticillata*, foliis verticillatis. L. Flor. dan. t. 86. Engl. bot. t. 128. Hab. in sylvaticis, montosis, præcipitiis. $\bar{\tau}$

5. *Polygonatum*, fol. alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunc. axillaribus subunisloris. Flor. dan. t. 377. Engl. bot. t. 280. Hab. in umorosis, rupibus. Flor. gemini, in apice caul.

6. *multiflora*, fol. alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunc. axillaribus multifloris. Flor. dan. t. 152. Engl. bot. t. 229. Hab. in Europæ et Americæ boreal. sylv. montosis. Flor. 3-4i aut subquini apice bini.

7. *latifolia*, fol. alternis amplexicaulibus acuminatis, caule angulato, pedunc. axillaribus multifloris. Jacq. austr. 3. t. 232. Hab. in Austriæ, Baviaræ, Pannoniac sylv. $\bar{\tau}$

* *dichotoma*, fol. cordatis amplexicaulibus, caule ramoso dichotomo. Cres. in montibus Gebennicis procel. Monspelium. Thibaud. Ulterius examinandum an constans sit species. Differentia ex unico specimine eruta est.

8. *umbellulata*, fol. radicalibus oblongo-ovalibus, scapo radicali nudo pubescente umbellula terminali multifo. a. Michaux. Flor. t. p. 202. Hab. in montibus alleghanis. Flor. odorati, albi aut intus purpurcomaculati. $\bar{\tau}$

*** *MAJANTHEMUM*, corol. *rotatis*.

9. *racemosa*, fol. sessilibus, racemo terminali composito. L. Moris. s. 13. t. 4. f. 9. Hab. in Virginia, Canada, et Carol. montibus.

10. *stellata*, fol. alternis amplexicaulibus, racemo terminali simplici. Moris. s. 15. c. 4. f. 7. Hab. in Canada. Flores sæpius tetrandri. W. $\bar{\tau}$

11. *trifolia*, pumila fol. amplexicaulibus ovali-lanceolatis ternis, racemo terminali simplici. Michaux. t. p. 202. Gmel. sibir. t. p. 36. t. 6. Hab. in Sibiriae sylv. et in rupibus à sinu Hudsonis ad Quebec. $\bar{\tau}$

12. *bifolia*, fol. cordatis, flor. tetrandris quadrifidis. Flor. dan. t. 251. Michaux. Flor. t. p. 201. Hab. in Europæ et Americæ borealis sylv. Fol. 2-3, interdum oblongo-ovalia. $\bar{\tau}$

818. *LAPAGERIA*. Cor. 6-petala, basi trigona. Petala 3-interiora latiora, subungiculata. Anthere erectæ. Stigm. clavatum. Bacca supra 1-locularis, polysperma. Sem. receptaculo triplici, per parietes, decurrenti affixa.

1. *rosea*, fol. ovali-lanceolatis quinque-nerviis. Flor. Peruv. 3. p. 65. t. 297. Hab. in regn. chilensis sylv. Fruticosa, scandens. Cor. magna, rosea aut roseo-purpurea intus punctis albis distincta. \bar{h}

Obs. Hoc genus (dicunt auctores Flor. Peruv.) dicatum est *Joseph. Lapageriæ*, lectissimæ feminae, Nep. Bonaparte uxori dignissimæ, botanica et hist. naturalis *Fautrici* egregiæ.

819. *LUSURIAGA*. Cor. infera, 6-petala. Petala 3-exteriora angustiora. Filam. receptaculo inserta. Anthere erectæ, sagittatæ. Stigma 3-angulare. Bacca trilocularis: dissepimentum membranaceum. Semina bina: 1-passim abortiente.

1. *radicans*, fol. lanceolatis obliquis. Flor. Peruv. 3. p. 66. t. 298. Hab. in regn. chilens. sylv. Petala et gemitibus albido-lutescentibus punctis et lineis rubris variegata.

820. *CALLIXENE*. Cor. 6-petala: petalis alternis basi biglandulosis. Filam. basi latiora. Anth. versatiles. Stigm. 3-gouum. Bacca supra, 3-locularis, polysperma.

1. *marginata*. Lam. ill. t. 278. Enargæ marginat. Gacrin. de sem. t. p. 203. t. 39. f. 3. Willd. Sp. 11. p. 230. Hab. in freto Magellanico. Suffrui. inferne nodosus aphyllus. Flor. solitarii terminales. Fol. marginæ tumida.

821. *PHILESIA*. Cor. 6-petala: petalis 3-interioribus longioribus. Filam. basi connata. Anth. lon-

gæ, versalites. *Stigm.* 3-lobum. *Bacca* subtrigona, polysperma.

1. *duxifolia*. Willd. p. 231. Lam. ill. t. 248. Habit. eum priore genere. Ramuli flexuosi. Flor. revoluta. Cor. magna. h

822. HERRERIA. Cor. infera, 6-partita. *Stigm.* 3-gonum. *Caps.* triquetralata, 3-locularis, 3-valvis: valvula septiferæ. Sem. margine membranaceo cincta.

1. *stellata*, caul. volubili aculeato, fol. radiatis linearis-ensiformibus. Flor. Per. 3. p. 69. t. 303. f. 2. Salva Few. 2. p. 216. pl. 7. Hab. in R. Chilens. sylvis. Cor. lutescens, odora. h

823. RIPOGONUM. Cor. 6-partita, minima. *Antheræ* longæ, tetragonæ, subsessiles. *Bacca* globosa, 2-sperma. Sem. hemisphærica.

1. *scandens*. Forst. N. Gen. pl. ic. Hab. in Australia.

824. FLOSCOPA. Cal. 3-fidus inferus pilosus (Cor. petal. 3-exteriores?). *Petala* 3, ovata. *Caps.* 2-locularis, 1-sperma.

1. *scandens*, caul. scandente, fol. lanceolatis, flor. fasciatis. Loureiro Coch. 1. p. 238. (Ed. Willd.) Hab. in montibus Cochinchinæ. Flor. parvus, dilute violaceus. h

825. ONCUS (Oncorhiza). Cal. 2-phyllus inferus. Cor. 6-fida, campanulata. *Bacca* 3-locularis.

1. *esculentus*, scandens, fol. cordatis subrotundis, spic. laxis. Lour. l. c. p. 240. In Cochinchinæ sylvis. Rad. tuber maximum (unde nomen) farinosum, edule. Dioscoreæ affine genus.

826. POLYANTHES. Cor. infundibuliformis incurva. *Filamenta* faucis inserta. *Germen* in fundo corollæ.

1. *tuberosa*, flor. alternis geminis, radialis tuberosis, scapo squamoso, fol. linearibus longioribus. Flor. Peruv. 3. p. 66. Willd. Sp. II. p. 164. Amica nocturna.

Rumph. 5. t. 98. Hab. sponte in Java et Peruv. Odor flor. gratus.

2. *pygmaea*, fol. oblongo-ovatis scapo longioribus. Willd. p. 165. Jacq. ic. rar. 2. t. 380. Collect. suppl. 56. Hab. ad Cap. b. spei. Planta simillima Agapantho ensifolio, quocum forte proprium format genus. W. & A.

827. DRIMIA. Cor. infera campanulata 6-fida, laciniis revolutis. *Stam.* corollæ inserta. *Stigma* capitatum.

1. *ciliaris*, fol. sublinearibus ciliatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 377. Collect. suppl. p. 41. Hab. in Cap. b. spei, eum sequentibus. Flor. albi.

2. *elata*, fol. lanceolato-linearibus glabris glaucescentibus scapo duplo brevioribus. Jacq. ic. rar. 2. t. 373. Collect. sup. 38. Cor. externe virescens.

3. *pusilla*, fol. lanceolatis glabris bas. canaliculatis, floribus erectis. Willd. Sp. p. 165. D. fol. lanceolato-linearibus glabris, scapum æquantibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 374. Collect. suppl. 42. Cor. virescentes uti in sequente.

4. *undulata*, fol. linearis-lanceolatis glabris undulatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 376. Collect. suppl. 41. Hyacinthus revolutus. Thunb. prod. 64? Hab. ad Cap. b. spei. W. & A.

5. *media*, fol. linearis-subulatis semiteretibus. D. fol. subulatis antice subcanaliculatis glabris. Jacq. ic. rar. 2. t. 375. Coll. suppl. 40.

Obs. Totum genus ab Hyacinthis non satis distinctum est; insertio staminum enim in diversis speciebus Hyacinthi variat. Willd. p. 166.

828. HYACINTHUS. Cor. erecta campanulata aut subrotunda 6-fida, passim 6-partita: laciniis æqualibus. (Pori 3-melliferi germinis. Lin.) *Stam.* cor. medio inserta. *Caps.* loculi subbispermi.

* *Corolla* 6-partita. (Scylloidei.)

1. *Non scriptus*, racemo cernuo: cor. campanulata sexpartita apice revoluta. L. Blackw. t. 61. Scilla nutans. Smith. brit. r. p. 366. Engl. bot. t. 377. Hab. in Angliæ, Galliæ, Hispaniæ, Italiæ nemoribus, vere.

β. *cernuus*, minor, cor. campanulata

separatis (incarnatis) racemo cernuo. L. H. hispanicus, Clus. hist. 1. p. 177. Hab. in Hispania. Cor. huic basi ventricosior, praecedenti vero minime. L. \bar{U}

2. *convallarioides*, cor. campanulatis separatis, fol. subulatis. Willd. p. 168. Lin. suppl. p. 204. Jacq. Schoenh. 7. p. 42. t. 82. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. lutei.

3. *brevifolius*, cor. separatis, racemo cernuo, fol. scapo brevioribus. Thunb. prod. 63. Cum priore.

* * *Corol. campanulata 6-fida.*

4. *amethystinus*, cor. campanulatis semisextidis basi cylindricis. H. oblongo caeruleo flore, minor. H. minor hispanicus angustifolius. Hab. in Hispania, Russia. \bar{U}

5. *orientalis*, cor. infundibuliformibus semisextidis basi ventricosis. Hab. in Asia, Africa.

6. *flexuosus*, cor. campanulatis, racemo erecto, fol. linearibus scapo longioribus. Thunb. prod. 64. Hab. ad Cap. b. spei. \dagger

7. *corymbosus*, cor. infundibuliformibus corymbosis erectis, scapo fol. brevior. L. Jacq. Collect. 3. p. 230. t. 19. f. 2. Hab. in Cap. b. spei pascuis. Folia linearia, angustissima, saepius tria. Scapus fol. brevior. Flor. purpurei.

8. *romanus*, cor. campanulatis semisextidis racemosis, stam. membranaceis. L. Willd. p. 169. Lam. enc. 3. p. 192. Hab. in Italiae cultis et hortis. Cor. campanulatae (cylindrico-ovatae. Capell.) ultra medium sessilidae, albae. L. Transitum ad sequentem divisionem facit.

* * * *Muscari. Corol. ovatis aut cylindricis brevi incis.*

9. *maritimus*, fol. subulatis, racemo tertii, cor. cylindricis: summis coloratis sessilibus abortivis. Muscari. Desf. atl. 1. p. 389. Hab. ad maris litora prope veterem Carthaginem. Cor. fere II. comosi.

10. *parviflorus*, fol. subulato-feliformibus, racemo terminali brevissimi, flor. distinctis. Muscari parviflorus. Desf. l. c. p. 390. Cresc. cum priore. Affinis. H. racemo, sed flor. longe rarioribus et cor. superne latiorib. differt. D.

11. *Muscari*, cor. ovatis omnibus aequalibus. Hort. cliff. 126. Hab. in Asia.

12. *comosus*, cor. angulato-cylindricis:

summis sterilibus longius pedicellatis erectis. L. In agris, passim in sylvis.

* *monstruosus*, flor. paniculatis monstruosis. L. Hort. cliff. 126. H. paniculatus, racemo paniculato sterile, pedunc. ramosa coloratis, cor. campanulatis basi acutis. Lam. enc. 3. p. 193. Moris. 2. 4. t. 11. f. 2. Hab. in Italia (Pavise.)

13. *botryoïdes*, cor. globosis uniformibus, fol. canaliculato-cylindricis strictis. Scop. carn. n°. 424. Lob. ic. p. 108.

14. *racemosus*, cor. ovatis uniformibus confertis, summis sessilibus (sterilibus), fol. laxis dependentibus linearibus. Willd. p. 170. Jacq. austr. t. 187. Knorr. del. 1. t. T. 8. H. junciformis. Lam. l. c. p. 194. Hab. in Europa australl.

* * * *Zuccanonia. Cor. cylindrica. Petala sria exteriora longiora, lanceolato-setacea, saepe reflexa.*

15. *viridis*, petal. exterioribus subulata longissimis, fol. linearibus canaliculatis scapo longioribus. Lin. Jacq. ic. rar. 1. t. 66. Zuccagnia viridis. Thunb. Dis. N. genera pl. Pars. IX. Lachenalia viridis. Willd. Sp. II. p. 174. Hab. ad Cap. b. spei.

16. *livida* (H. *serotina*. L.), flor. secundis, petal. exteriorib. subdistinctis, interioribus coadunatis. L. Cav. ic. p. 18. t. 50. Lachenalia serotina. Willd. p. 175. Hab. in Hispania. Cor. fuscens: pet. longitudine subaequalia. Flor. initio aestatis.

829. *PHORMIUM. Cor. 6-petala, infera: petalis 3-interioribus longioribus. Stam. adscendentia, exserta. Caps. oblonga, triquetra. Sem. compressa.*

1. *tenax*. Forst. gen. n°. 24. Cook. it. v. 2. t. 96. P. fol. plurimis, inflorescentia ramosa. Lin. suppl. 204. Hab. in N. Zeelandia. Fol. equitantis, ensiformis 2-3-petala. Incolae ex hac planta Lini speciem fabricant.

830. *LACHENALIA. Cor. 6-petala, infera: petalis obtusis 3-interioribus longioribus. Stam. erecta. Caps. subovata, trialata. Sem. globosa.*

1. *glaucina*, cor. campanulatis sessilib., petalis interioribus longioribus patulis obtusis, stylo staminib. longiore, fol. linearilanceolatis glabris. Willd. Sp. II. p. 172.

Jacq. ic. rar. 1. t. 391. Collect. suppl. 39. Hab. ad Cap. b. spei, cum. *sequentibus*. Petala exteriora glauco viridia, apicibus rubicundis, interiora albedo-incarnata. Sep. immaculatus.

2. *orchioïdes*, cor. campanulatis sessilibus, stylo longitudine staminum fol. oblongo-lanceolatis margine cartilagineo-crenatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 340. Collect. 3. p. 241. Phormium Hyacinthoides. Lin. suppl. 204. Scapus maculatus.

3. *pallida*, cor. campanulatis brevissime pedunculatis, scapo apice angulato fol. lineari-oblongis brevioribus. Willd. L. mediana. Jacq. ic. rar. 2. t. 392. Collect. 3. p. 242.

4. *hyacinthoides*, cor. campanulatis, fol. lineari-subulatis canaliculatis laxis scapo duplo longioribus. Willd. p. 173. Jacq. ic. rar. 2. t. 382. Collect. suppl. 58. Hyacinthus orchioïdes Jacq. hort. vind. 2. t. 178. Petala tria exteriora, alba exterius apice rubicunda et macula viridi notata, interiora alba emarginata.

5. *angustifolia*, cor. campanulatis, petal. interioribus longioribus, patulis obtusis, fol. lineari-subulatis canaliculatis laxis scapo longioribus. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 381. Collect. suppl. 47. Scapus rubro-maculatus. Petala alba patentia.

6. *contaminata*, cor. campanulato-cylindraceis, petalis interioribus lanceolatis obtusis erectis, fol. lineari-subulatis canaliculatis laxis scapo longioribus. Willd. p. 174. L. orthopetala. Jacq. ic. 2. t. 383. Collect. 3. p. 240. Fol. supra maculis obscure rubentibus adpersa.

7. *pusilla*, cor. cylindricis, stem. cor. longioribus, fol. elliptico-linearibus basi attenuatis scapo longioribus patulis. Willd. Jacq. ic. 2. t. 385. Collect. suppl. p. 71. Fol. rubro-maculata. Scapus vix ullus. Flor. albidis adpressis.

8. *patula*, fol. geminis lineari-lanceolatis canaliculatis pulposo-carnosis, ad medietatem erectis, dein reflexis, cor. campanulatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 381. Collect. 4. p. 149. Cor. alba, sub apice macula viridi et petal. interioribus ad apicem linea rubicunda notatis.

9. *fragrans*, fol. geminis lineari-lanceolatis planis maculatis glabris, scapo erecto, cor. pedicellatis subcampanulatis. Jacq. Schoenb. 1. p. 43. t. 82. Cor. candida.

10. *liliflora*, fol. geminis ex oblongo lanceolatis dense facie pustulatis, scapo erecto tereti, cor. patentibus reflexis, petalis sublinearibus. Jacq. ic. 2. t. 387. Collect. suppl. 66. Cor. alba.

11. *pustulata*, fol. geminis lanceolato-linearibus pustulatis, scapo triquetro reclinato, flor. subcampanulatis subsessilibus. Jacq. ic. rar. 2. 386. Coll. 3. p. 244. Cor. alba, apice viridis.

12. *purpureo-caerulea*, cor. campanulatis pedunculatis, petalis interioribus obtusis revolutis petam. cor. longioribus, scapo apice angulato, fol. lanceolatis pustulatis. Willd. p. 177. Andrew. t. 251. Jacq. ic. 2. t. 388. Coll. suppl. 63. Scillam refert, odorata. Fol. erecta.

13. *unicolor*, fol. geminis lineari-lanceolatis, facie rariter pustulatis, scapo erecto tereti, cor. subcylindricis, petalis interioribus apice patulis, genitalib. declinatis. Jacq. ic. 2. t. 389. Coll. suppl. 61. Cor. violacea depressa.

14. *violacea*, fol. geminibus oblongis maculatis, scapo tereti adscendente, racemo erecto pedunculis patentissimis longitudine florum, flor. basi planis propendulis. Jacq. ic. 2. t. 394. Coll. 4. p. 147. Petala exteriora viridia, interiora violacea.

15. *purpurea*, fol. geminis lineari-lanceolatis immaculatis ad oras subtilissime cartilagineo-crenulatis, flor. pedunculatis patentissimis, cor. subcylindricis. Jacq. ic. 2. t. 393. Coll. suppl. p. 65. Hab. ad Cap. b. spei. Pet. exteriora alba, interiora atrosanguinea.

16. *lancaefolia*, cor. subcampanulatis patentibus, pedunc. corolla triplo longioribus, petalis linearibus obtusis subaequalibus, fol. ovatis acuminatis. Willd. p. 178. Jacq. ic. 2. t. 402. Coll. suppl. 69. Fol. variegata, latissima. Scapi prostrati.

17. *unifolia*, cor. cylindraceis, pedunc. longitudine corollae, petalis interioribus longioribus obtusis inaequalibus, folio solitario lineari-lanceolato. Willd. L. folio unico canaliculato, racemo laxo. Jacq. Schoenb. 1. p. 43. t. 83. Scapus punctatus.

18. *hirta*, cor. campanulatis pedunculatis, fol. linearibus hirtis. Thunb. prol. 64. Hab. in Cap. b. spei aquosis. Fol. unicam. basi late vaginaus. Flor. racemosi, albo-caerulescentes.

19. *isopetala*, cor. cylindraceis pedunculatis, petalis linearibus obtusis subae-

qualibus, scapo apice angulato, fol. lanceolatis deflexis. Willd. p. 179. Jacq. ic. rar. 2. t. 401. Collect. suppl. 68. Cor. albae, apice atro-purpureae.

30. *tricolor* (*aloi* les), cor. cylindraceis pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus emarginatis, bracteis acutis, fol. lanceolatis. Willd. p. 179. Phormium Aloides, fol. binis radicalibus supra fuscomaculatis. Lin. suppl. p. 205. Jacq. ic. rar. 1. t. 61. Les Liliacées. t. 2.

β? *luteola*, fol. geminis elongato-lanceolatis subimmaculatis, scapo erecto, cor. propendulis cylindricis cum limbo petalorum interiorum patentissimis. Jacq. ic. 2. t. 395. Coll. 4. p. 148.

31. *rubida*, fol. patulis superne planis, cor. cylindraceis brevissime pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus, stylo stamin. longiore, fol. oblongis. Willd. p. 179. Jacq. ic. 2. t. 398. Coll. suppl. 60.

32. *tigrina*, fol. subgeminis, basi ad mediocatem usque mutuo amplexantibus et convolutis, dein lanceolatis et patulis acutis maculatis, scapo erecto maculato, flor. cylindricis punctatis pendulis. Jacq. ic. 2. t. 399. Coll. suppl. 67. Willd. p. 180.

33. *punctata*, fol. geminis linearilanceolatis canaliculatis brevissime maculatis erectis, scapo erecto maculato patulifloro, flor. cylindricis incurvulis punctatis pendulis. Jacq. ic. 2. t. 397. Collect. 2. p. 123. Scapus rubromaculatus. Petala exteriora incarnata sanguineo-punctata, interiora albidula rubropunctata apice flavescencia.

34. *pendula*, fol. ovato-oblongis, cor. cylindraceis, petalis tribus interioribus longioribus integris, flor. pedunc. pendulis. Ait. Kew. 1. p. 461. Andrew. t. 41. Phormium bulbiferum. Cyrill. Neap. fasc. 1. t. 12.

β. *tricolor*, fol. immaculatis. Jacq. ic. 2. t. 400. Coll. 3. p. 239. Petal. exteriora rubra, interiora flavescencia apice violacea. Willd. L. pendula. Jacq.

35. *quadricolor*, fol. geminis linearilanceolatis maculatis, scapo erecto, cor. propendulis cylindricis cum limbo petal. interiorum patulo. Jacq. ic. 2. t. 396. Collect. suppl. 62. Andrew. t. 148.

831. LANARIA. Cor. supera, lanata, filamentis longior: limbo 6-partito, patulo. *Petal.* 3-loculare.

1. *plumosa*. Ait. Kew. 1. p. 462. Thunb.

Argolasia. Juss. Hyacinthus lanatus, cor. lanatis, caule ramoso. L. Hab. ad Cap. b. spei. Scapus corymbosus.

832. VELTHEIMIA. Cor. tubulosa 6-dentata (pendula). Stam. tubo inserta. *Caps.* membranacea, triolata, loculis monospermis.

1. *viridifolia*, fol. lanceolatis plicato-undulatis obtusis, dentibus limbi rotundatis rectis. Willd. Sp. p. 181. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 41. t. 78. Aletris capensis. L. Hab. ad Cap. b. spei; uti sequentes.

2. *glauca*, acaulis, fol. lanceolatis glaucis, flor. nutantibus, limbo patente. Ait. Kew. 1. p. 461. Jacq. Schoenb. 1. p. 40. t. 77.

3. *sarmentosa*, acaulis, fol. ensiformibus laxis, flor. spicatis, radicibus sarmentosis. Aletris. Andrew. t. 54. Flor. nutantes rubentes, apice palliunt. Flor. hyeme.

4. *livaria*, acaulis, fol. ensiformibus canaliculatis carinatis. L. sub Aletris. Knorr. del. 1. t. A. 13. Seb. thes. 1. p. 29. t. 19. f. 3. Flor. coccinei.

5. *pumila*, scapo brevior fol. linearibus acute carinatis. Ait. Kew. 1. p. 464. sub Aletris.

833. ALETRIS. Cor. infundibuliformis, subsexfida rugosa. *Filam.* laciniarum basi inserta. *Caps.* semiinfera, superne cal. marcido vestita, 3-locularis, polysperma.

1. *farinosa*, acaulis, fol. lanceolatis membranaceis, flor. alternis. Willd. II. p. 163. A. alba, flor. pedicellatis oblongo-tubulosis, cal. fructus laeviusculis farinosis. Millaux. Flor. 1. p. 190. Hab. in in Amer. septentrionali.

2? *fragrans*, caulescens, fol. lanceolatis. L. Hab. in Africa. Caul. 10-12-petalis. Flor. sordide albi circa vespertam durante nocte explicati fragrantissimi. Fl. Maj. Jun. h.

3. *aurea*, flor. subsessilibus breviter tubulatis subcampanulatis, cal. fructus rugosis scaberrimis. Michaux. Hab. in Carol.

Obs. Synonyma Plucknetii et Morisoni a Linnaeo ad Heloniam *bullatam* relata, huc pertinent. Michaux. l. c. p. 190.

834. *YUCCA*. *Cor.* campanulato-patens. *Sylus* nullus. *Capr.* 3-6-locularis, apice pertusa.

1. *gloriosa*, fol. lanceolatis latiusculis integerrimis. L. Willd. Sp. II, p. 183. Michaux. Flor. 1. p. 196. Barr. rar. 70. t. 1194. Hab. in Canalis, Peru, et Carolinae littoralibus.

2. *aloifolia*, arborescens, fol. linearilanceolatis crenulatis strictis. L. Dill. elth. t. 324. f. 416. Hab. in Jamaica, Vera Cruce, Carolina, etc.

3. *draconis*, arborescens, fol. crenatis nutantibus. L. Dill. elth. 437. t. 324. f. 417. Hab. in America. *h*

4. *filamentosa*, acutis, fol. lanceolatis serrato-filiferis. L. Trew. Ehret. sel. t. 37. Hab. in Virginiae et Carolinae littoralibus. *h*

835. *ALOE*. *Cor.* tubulosa, ore subsexfilo patulo, fundo nectarifero. *Filam.* receptaculo inserta. *Capr.* supra, 3-locularis, 3-valvis, polysperma. *Sem.* biserialia margine membranaceo. (Flor. ore nunc recto, nunc latibato. Fol. carnosae. s. speculenta crassa.)

1. *dichotoma*, caule dichotomo, fol. ensiformibus serratis, flor. paniculatis, atom. cor. ovata longioribus. Willd. Sp. pl. II, p. 184. A. ramosa. Lin. suppl. 806. Patters. iter. t. 3. 4. 5. Thunb. Diss. de Aloë. n°. 1. Hab. in monte Bockland Cap. b. spci. *h*

2. *spicata*, caulescens, fol. planis ensiformibus dentatis, flor. spicatis campanulatis horizontalibus. Thunb. Diss. n°. 2. Lin. suppl. p. 805. Hab. in Cap. b. spei interioribus regionibus. Ex huius succo optima Gumma-resina Aloës paratur. Th. *h* +

3. *umbellata*, caulescens, scapo nudo, fol. crassis maculatis margina spinosis, flor. racemoso-umbellatis. Plant. grassen. cum. ic. et descr. A. *maculosa*. Lam. enc. t. p. 87. A. perfoliata. Lin. Var. ad Cap. b. spei cum omnibus fere speciebus. Flor. majusculi, rubri.

4. *fruticosa*, caulescens, fol. amplexicaulibus reflexis subrecurvis longis margine spinosis. A. arborescens. Plant. grass. ic. Mill. dict. n°. 3. Lam. l. c. Scap. bract.

obtectus. A. *cornes de belier*. Gall. fol. formam non male exprimit.

5. *ferox*, eaul. arborescente, fol. perfoliatis undique spinosis, ataminib. cor. duplo longioribus. Plant. grass. ic. Lam. l. c. n°. 7. Com. prael. t. 19. A. perfoliata S. Act. Flor. spicati densi, parvuli, bract. setaceis suffulti.

6. *rhodacantha*: caulescens, fol. patulis amplexicaulibus margine rubris spinosis, scapo bract. magnis confertis oblecto. Plant. grass. Specim. Phil. ic. 71. Flor. subspicati, primo erecti.

7. *mitraeformis*, caulescens, fol. crassis margine spinosis inferna adpressis spinulosis, racemis umbellatis. Plant. grass. Lam. n°. 8. Dill. At. t. 17. f. 19. Scap. subramosus, bracteatus. Var. fol. conniventibus et patulis.

Obs. Antecedentes et nonnullae sequentes plerumque ut varietates A. *perfoliatae* habitae sunt quare nomen ipsum suppressendum duxi.

8. *succotrina*, eaul. fruticoso, fol. oblongo-ensiformibus submaculatis, margine cartilagineo spinoso. Plant. grass. ic. Lam. enc. t. p. 85. Trew. t. 333. A. perfoliata, succotrina. Ait. Kew. t. p. 466. Scap. bracteatus. Flor. penduli, rubri apice viregunt.

9. *vera* (*rubescens*), eaul. brevi, fol. amplexicaulibus patulis lanceolatis, margine spinoso ex viridi purpurascens scapo compresso ramoso bracteis minutissimis. A. *rubescens*. Plant. grass. ic. A. vera. Lam. l. c. n°. 4. Hab. in Indiis. Flor. parvuli rubri.

10. *vulgaris* (*flava*), fol. patulis lanceolatis margine spinosis, scapo ramoso, ramis bract. duplici amplexis. Plant. grass. ic. Lam. l. c. n°. 3. p. 86. A. barba-lensis. Mill. Act. p. 466. Hab. in India. Flor. majusculi, flavescent.

* *abyssinica*, fol. lanceolatis patulis duriusculis submaculatis, margine spinisque rubris. Lam. l. c. n°. 5. A. vulgaris. *β*. Plant. grass. A. maculata vera. Forsk. Arab. p. 73. Hab. in Abyssinia.

11. *picta*, caulescens, fol. ensiformibus dentatis pictis patentibus, flor. racemosis reflexis cylindricis. Thunb. Diss. n°. 4. Thunb. prod. 61. Plant. grass. ic. Fol. margine spinosa, maculata. Flor. obscure rubri, spicati.

12. *sinuata*, caulescens, fol. ensiformibus sinuato-serratis reflexis, floribus

racemosis erectis cylindricis. Thunb. Diss. n°. 5. Thunb. prod. 61. A. barbadensis minor lacte virens et splendens. Dill. elth. p. 43. t. 10. f. 20. Caul. spinosus flexuosus erectus inaequalis. Thunb. +

13. *humilis*, acaulis, scapo bracteato, fol. trigonis subulatis aculeatis, flor. racemosis reflexis, cylindricis. Thunb. Diss. n°. 6. Les Plant. grass. ic. Flor. longi, rubri apice virides.

14. *arachnoides*, acaulis, fol. caespitosis glaucescentibus, trigonis cuspidatis ciliatis, flor. subsuperis erectis cylindricis. Thunb. Diss. n°. 7. Thunb. prod. 61. Plant. grasses. ic. Cor. labiata, albicans. Hab. ad Cap. b. spei in Carro juxta Swartkops Zoutpan. h

15. *atrovirens*, fol. caespitosis patulis brevibus apice trifariis: angulis spinosis, lateribus subtuberculatis. Plant. grass. ic. A. arachnoides. p. Thunb. Willd. p. 188. Cor. fuscescens sublabiata.

16. *brevifolia*, fol. caespitosis brevissimis glaucis apice trigonis, margine spinosis, scapo bract. numerosis. Plant. grass. ic. A. perfoliata. S. Lin. Comm. Nar. t. 45. Aloë arichaut. Gull. Flor. congesti penduli rubri.

17. *Serra*, caulesc., fol. caespitosis patulis margine spinosis: spinis inferioribus approximatis coarctatis; superioribus remotis, medio subspinosis, scapo dense bracteato. Plant. grass. ic. Flor. rubri.

p. *verrucosa*, acaulis, fol. ensiformibus, acutis papillois distichis, flor. racemosis reflexis clavatis. Ait. Kew. t. p. 468. Comm. hort. 2. p. 17. t. 9. A. carinata. p. *ensiformis*, fol. ensiformibus planiusculis. Plant. grasses.

18. *carinata*, acaulis, fol. subdistichis acinaeformibus papillois, flor. racemosis cernuis curvatis. Ait. Kew. t. p. 469. Plant. grass. ic. Dill. elth. 22. t. 18. f. 20. Flor. basi ventricosi rubri, apice virides.

19. *maculata*, acaulis, fol. linguiformibus glabris pictis, floribus racemosis cernuis curvatis. Thunb. Diss. n°. 10. Thunb. prod. 5. Hab. ad Cap. b. spei in Hautiquas montibus. h +

20. *Linguiformis*, caulinis, fol. linguiformibus subdenticulatis glabris distichis, flor. racemosis erectis cylindricis. Thunb. Diss. n°. 11. Thunb. prod. 61. Ait. Kew. t. p. 469. Liu. suppl. 206.

p. *disticha*, flor. racemosis pendulis ovato-cylindricis curvis. L. Linguiformis. Plant. grass. ic.

21. *plicatilis*, subacaulis, fol. linguiformibus inermibus laevibus distichis, flor. racemosis pediculis cylindricis. Ait. Kew. t. p. 470. Plant. grasses. ic. Curt. mag. t. 457. Flor. rubri, suberecti.

22. *variegata*, subacaulis, fol. trifariis pictis canaliculatis, angulis cartilagineis, flor. racemosis cylindricis. Thunb. Diss. n°. 12. Plant. grass. ic. Hab. in Aethiopiae argillosis. Flor. longi, subcurvi, penduli, rubelli. Fol. maculis albis variegata.

23. *viscosa*, subcaulescens, fol. imbricatis trifariis ovatis, flor. racemosis cernuis subbilabiatis. Plant. grass. ic. A. africana erecta triangularis et triangulari fol. viscoso. Com. prael. 82. t. 31. Dill. elth. 15. t. 13. f. 13. Hab. in Cap. b. spei campestris. Fol. in cultis saltem non viscosa. Cor. acuminata. h

24. *rigida*, subcaulescens, fol. inermibus, superioribus subspiralibus, patulis rigidis acuminatis. Plant. grass. ic. Cor. bilabiata albedo-virescent. Fol. superiora quoad iconem, rubescunt.

25. *spiralis*, subcaulescens, fol. ovatis, octofariis imbricatis, flor. racemosis recurvis. Thunb. A. *spiralis*, subcaulescens, fol. inermibus ovato-acutis imbricatis octofariis, flor. cylindricis obtusis transverse rugosis. Plant. grass. ic.

26. *margaritifera*, acaulis, fol. subtrigonis acuminatis, tuberculis cartilagineis undique adspersis. Mill. dict. n°. 14. Plant. grass. ic. Aloë *pumila*. Lin. cum varietatibus. Flor. erecti? (cernui Ait.) albi subbilabiati. Quoad magnitudinem variat. vid. Willd. p. 188.

27. *retusa*, acaulis, fol. quinquefariis deltoideis. Thunb. prod. 61. Plant. grass. ic. Cor. albicans bilabiata: labio inferiore revoluto. Fol. apice depresso-triquetra. Hab. in Africae argillosis. h

836. AGAVE. Cor. erecta supera tubulosa aut infundibuliformis. *Filam.* cor. longiora, erecta, *Caps.* (infera) triangularis, polysperma. (Caps. situ a precedente genere differt.)

1. *americana*, acaulis, fol. dentato-spinosis, scapo procerbo, staminibus longioribus, stylo staminibus longiore. Lin.

Willd. Sp. II. p. 192. β . Aloë *variegata*, folior. margine luteo. Hab. in America calidior. Hodie ab ea sepes in Lusitania, et Helvetia. In vario usu apud Peruvianos est; vid. Flor. Peruv. 3. p. 66. Ex foliis fila et papyrus præparari possunt.

2. *vivipara*, acaulis, fol. dentatis, scapo ramoso, tubo corollae medio angustato, staminibus corollam aequantibus Willd. Comm. præf. 65. t. 15. Rumph. 5. t. 94. Hab. in America. Panic. bulbifera. Fol. dilatata. η

3. *virginica*, acaulis herbacea, fol. cartilagineo-serratis, scapo simplicissimo. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 378. Collect. 2. p. 261. Hab. in Virginia. ζ

4. *lurida*, subcaulescens, fol. dentato-spinosis, scapo ramoso, stylo staminibus brevior. Hab. in America meridionali. Simillima A. americanae, cor. virescens nec lutea.

5. *tuberosa*, caulescens, fol. dentato-spinosis, rad. tuberosa. Ait. Kew. 1. p. 472. Mill. dict. n.º 4. β . spinis duplicibus. Hab. in America. η \dagger

\dagger *Фурака*. Cor. campanulata, 6-partita, supera. Stam. glandulae insertae, decursum incrassata, compressa, apice subulata. Caps. infecta trilocularis, trivalvis, polysperma.

6. *faetida*, caulescens, fol. integerrimis. L. Furcraea gigantea. Vent. in Bull. Philom. n.º 28. Plantae grassae. ic. Jacq. ic. rar. 2. t. 330. Collect. 2. p. 312. Panic. ampla, multiflora. Cor. albedo-virescens. η

7. *odorata*, acaulis, fol. ciliato-spinosis. Agave cubensis. Jacq. amer. Ed. pict. t. 260. f. 25. Willd. p. 193. A. *mexicana*. Lam. enc. 1. p. 52. Hab. in Ins. Cuba et Mexico.

Obs. Ob Corol. *hexapetalam* (quae odorem spirat gratum) et filam. (ex Jacquino) basi obovata, compressa, omniumque crassissima, declinata in superiorem partem subulatum, hanc speciem huic divisioni, a generi diverso? adnumeravi.

837. ALSTROEMERIA, Cor. 6-petala campanulata, aut subbilabiata: petalis 2-inferioribus basi semi tubulosis. Stam. declinata, aut erecta. Stigm. 3, linearia. Caps. subrotundo-ovalis; 3, 6-angularis, 3-valvis, aut intus pulposa non

dehi cens. Sem. plura, globosa. (Flor. umbellati. Fol. saepius ob petiolos contortos resupinata.)

* Caul. erecto aut assurgente.

1. *peregrina*, caul. erecto-assurgente, fol. linearilanceolatis contortis, flor. 2-6. petal. exteriorib. obcordatis acuminatis. Flor. Peruv. 3. p. 58. t. 288. Jacq. hort. t. 50. Curt. mag. t. 139. Willd. Sp. II. v. 194. Hab. in Peruviae et chilensis collibus, praeruptis, maritimis arenosis et glaucosis. Rad. tuberoso-pendula longissima.

Obs. Vox *Pelegrina* ab Hispanis in regno Peruviano usitata, significat flos superbus. Willd. l. c. vulgo *Peregrina* non *Pelegrina* appellatur. Flor. Per. l. c.

2. *ligita*, caule erecto, fol. spatulato-oblongis, pedunc. umbellae involuero longioribus, cor. bilabiata. Lin. suppl. 207. A. *ligita*, caul. erecto, fol. lanceolato-linearibus flor. umbellatis, petal. subconformibus. Flor. Per. p. 59. Tew. obs. 2. pl. 4. Hab. in Lima et passim in arenosis conceptionis urbis R. chilens. Vernacula *Liutu* (farina e radice præparata.) ζ

3. *revoluta*, caul. erecto, fol. lanceolatis, petal. reflexis: interioribus minorib. Flor. Per. 3. p. 59. Hab. in R. chilensis collibus Prov. Acce. Petal. purpurea, interiora a medio ad basin lutea et punct. purpureis variegata. Rad. hujus et 2 sequentium ut in priore.

4. *versicolor*, caul. erecto, fol. lanceolato-linearibus, umbel. 2-3-flora, petal. internis angustioribus: infimo brevior. latiore. Fl. Peruv. l. c. Cum priore, in collib. aridis altis. Pet. lutea macul. purpureis. ζ

5. *haemantha*, caul. erecto, fol. linearilanceolatis ciliatis, umb. subsexradiata, pedunc. bifloris, petal. exteriorib. serratis. Flor. Per. p. 60. Cresc. in collib. rudertatis. Petal. sanguinei coloris, 2-interiora longiora, lin. lucis variegata. Var. petal. albedo-purpureis et luteo variegatis. l. c.

6. *lineariflora*, caul. erecto, fol. lanceolatis, umb. 4-7-radiata, pedunc. bifloris basi folio minori suffultis, petal. serratis linearis. Flor. Per. p. 60. Hab. in Peruv. collibus. Rad. tuberoso-pendula. Petal. purpurea, 2-interiora col. luteo et purpureo variegato.

7. *distichifolia*, caul. adscendente, fol. distichis oblongo-lanceolatis, umb. 3-8-flora, petal. aequalibus: interiorib. planis.

Flor. Per. l. c. t. 287. In Andium nemoribus et in Munse montib. altis. Cor. punicea. Caps. non dehiscens. Sem. pauc. pulpa nidulantis. l. c. $\overline{\text{T}}$

8. *secundifolia*, caul. dependente, fol. secundis lanceolatis acutissimis subtus albis, umbel. subquingeflora, flor. hirsutus. Cum priore. Pet. 3-interiora lutea punct. nigris maculata, apice virida. Stigm. lanuginosa.

* * Caul. volubili.

9. *Salsilla*, caule volubili, fol. petiolatis lanceolatis acuminatis, umb. ramosa, pedunc. involucri longioribus bracteatis laxis. Lin. suppl. 206. Pedunc. dichotomis trifloris. Flor. Per. p. 61. Fecill. peruv. 2. p. 713. t. 6. Hab. in Lima, et R. chilensis sylvis. Petal. obovata - cuneiformia, tria interiora ad basin macula violacea. Flor. Peruv.

10. *ovata*, caule volubili, fol. lanceolatis, superiori pagina lanuginosis, inferiori lucidis, flor. umbellatis, cor. tubulosis. Cav. ic. v. p. 54. t. 76. Hab. in Peru. Petal. tria exteriora coccinea apice viridia; interiora viridia, punctis nigris variegata. Caps. magna 6-sulcata. Fol. obliqua. C.

11. *anceps*, caul. volubili aenipiti, fol. lanceolatis acutis, umb. 17 - flora, pet. aequalibus punct. atro - purpureis. Flor. Peruv. p. 61. In Andium nemorib. Fol. limata.

12. *rosea*, caul. volubili tereti, fol. ovato-lanceolatis, umb. 18-radiata, petal. interiorib. lineis nigris maculatis. Fl. Per. l. c. Cum priore. Pet. rosea. Fol. subtus pubescentia. $\overline{\text{T}}$

13. *crocea*, caul. volub. tereti, fol. lineari-lanceolatis subtus pubescentibus, umb. multiflora, petal. aequalib. croceis. Fl. Per. l. c. Fol. sparsa, acutissima, basi contorta. Hab. in Peru.

14. *bracteata*, caul. volubili, fol. lanceolata-linearibus, umb. 5-partita sub 12-flora, petal. interioribus spatulatis. Fl. Per. Petal. purpurea, interiora viridia, basi lutea, marg. punct. violacea.

15. *fbriata*, caul. volubili, fol. lanceolatis angustis, umb. multiflora, petal. interiorib. fimbriatis. Fl. Peruv. p. 61. Cor. luteo-croceo variegata. Petioli contorti. $\overline{\text{T}}$

16. *latifolia*, caul. volubili, fol. oblongo-ovatis acuminatis, umb. multiradiata, pedunc. 1-3-floris, cor. rubro-viridi. Fl. Per. p. 64. In Peru. collibus, Lomas dictis. Pet. interiora punct. et lineis violaceis variegata. $\overline{\text{T}}$

17. *tomentosa*, caul. subvolubili, fol. lanceolatis margine reflexis subtus tomentosis, umb. multiflora; radiis bifloris. Fl. Per. p. 62. t. 292. In Andium nemorib. locis frigidis et pluviosis. Pet. exteriora coccinea, interiora lutescentia. Sem. in pulpa dulci, eduli; nidulantur. Affinis A. *ovatae*. Cav. $\overline{\text{T}}$

* * * Caul. scandente.

18. *setacea*, caul. scandente, fol. lanceolatis, umb. simplicibus radiis numerosis, bracteol. setaceis, cor. parva. Flor. Per. p. 62. t. 292. Hab. in Peru. Andium nemorib. Pet. exteriora punicea, interiora spathuleta lutea. $\overline{\text{T}}$

19. *denticulata*, caul. scandente, fol. lanceolato-ovatis acutissimis, margine repando-denticulatis, flor. umbellato-corymbosis. Flor. Per. l. c. t. 291. Cum priore in montib. altissimis, pluviosis. Cor. rubrolutescens. $\overline{\text{T}}$

20. *purpurea*, caul. scandente, fol. lanceolatis angulatis subtus pubescentibus, flor. corymbosis subumbellatisque purpureis. Fl. Per. p. 63. t. 293. Hab. versus Pillae vicum. Caps. subtruncata, trigono-alata.

21. *macrocarpa*, caul. scandente, fol. oblongo-lanceolatis, umb. multiradiata, pedunc. bifloris longissimis. l. c. Cum priore. Cor. rubro-lutescens. Caps. nunc. Island. magnitudine intus pulposa. An diversa ab A. *ovata*. Cav. ?

22. *corlifolia*, caul. scandente, fol. cor-latis acuminatis, umb. sexradiata, pedunc. 2-3-floris. Flor. Per. p. 64. t. 290. Cor. rubicundo-lutescens.

23. *formosa*, caul. scandente, fol. lanceolatis longis, umb. semiglobosa, flor. numerosa puniceo-luteis punctatis. Flor. Per. p. 64. t. 266. Hab. in Andium nemorib. ad Munse.

Obs. *Alstroemeria pulchella et formosa*. Lin. suppl. pl. p. 206. et 207, heic sunt omisae, cum forte cum una alterave specie ex tam multis enumeratis, quarum ampla descriptio in Flor. Peruviana extat (ubi vero earum nulla mentio est facta) conveniant.

338. *HEMEROCALLIS*. Cor. campanulata: tubo cylindrico. Stam. declinata. Stigma parvulum, simplex, villosulum.

* Fol. oblongis sublanceolatis.

1. *flava*, fol. lato linearibus carinatis,

petalis planis acutis, nervisque petalorum indivisis. Willd. Sp. II. p. 197. Jacq. hort. t. 137. Les Liliacées. t. 15. Hab. in Helvetiae, Sibiriae, Hungariae campis. Cor. flava.

3. *graminea*, fol. angusto-linearibus carinatis graminibus, petal. tribus interioribus majoribus undulatis. Andrew. t. 246. Hab. in Europa septentrionali. Media inter priorem et sequentem speciem, cum qua flore fere conveniunt. Cor. extus brunnea, odorata. A. †

3. *fulva*, fol. linearibus (lanceolatis) carinatis, petalis tribus interioribus obtusis undulatis, nervisque petalorum exterioribus ramosis. Willd. Les Liliacées. t. 16. Hab. in China. Flor. e longinquo Liliū bulbi ferum s. croceum referunt. †

4. *lanceifolia*, fol. oblongis utrinque attenuatis. Willd. Hab. in Japonia. †

* * Fol. laetis subcordatis petiolatis.

5. *alba*, fol. ovato-cordatis, cor. tubo longo, bract. pedicellis lenioribus. Andrew. t. 194. H. *japonica*. Thunb. Willd. p. 198. Les Liliacées. t. 3. Hab. in Japonia. Cor. candida, odorata. Flor. Jul., Aug. in caldariis.

Obs. Secundum mentem clar. Andrew l. c. ut synonyma huc referenda sunt *Lilium longiflorum* et *L. japonicum*. Willd. L. candidum. Thunb. Fl. japon.?

6. *caerulea*, fol. cordatis, membranaceis brevibus, cor. limbo campanulato. H. caerulea. Vent. Malm. t. 18. Andrew. t. 6. Hab. in China. An huc *Lilium cordifolium*. Willd. Vid. Andrew. Obs. l. c.

839. ACORUS. *Spadix* cylindricus, tectus flosculis. Cor. 6-petala, nuda. *Stylus* o. *Caps.* 3-locularis.

1. *Calamus*, scapi mucrone longissimo foliaceo. Ait. Kew. 1. p. 474. Moris. 2. 8. t. 13. f. 4. β. A. asiaticus, radice tenuiore. Herm. lugd. g. Rumph. arab. 5. t. 72. f. 1. Rheed. 11. t. 60. Hab. in Europae, et Indiac fossis. †

2. *gramineus*, scapi mucrone spadiceo vix excedente. Ait. Kew. 1. p. 474. Hab. in China. Vere flor. proferit praecedentis similes. †

840. ORONTIUM. *Spadix* cylindricus, tectus flosculis. Cor. 6-

petala, nuda. *Stylus* nullus. *Folliculi* 1-spermi.

1. *aquaticum*, fol. lanceolato-oratis venosis. Ait. Kew. 1. p. 474. Willd. p. 199. Lam. ill. gen. t. 251. Hab. in Virginiae, Canadae paludibus, scaturiginibus. †

2. *japonicum*, fol. ensiformibus venosis. Thunb. jap. 144. Banks. Ic. Kaempf. t. 12. Hab. in Japonia. Fol. sunt nervosa nec venosa. Willd. †

841. TACCA. *Cal.* 6-partitus. Cor. 6-petala. calyci inserta, antherifera. *Stigma* stellatum. *Bacca* sicca, 6-angularis, polysperma, infera.

1. *pinnatifida*. Lin. suppl. p. 251. Lam. ill. t. 212. Leonice Leonopetaloides, fol. simplicibus tripartito-multifidis, cor. monopetalis esculatis. L. Sp. pl. p. 448. Tacca littorea. Rumph. arab. 5. t. 114. Hab. in India orientali et Tahiti. Fol. similis Dracontio polyphylo. †

842. CORYPHA. *Cal.* 3-phyllus. Cor. 3-petala. *Bacca* 1-sperma. Sem. globosum, magnum, osseum.

1. *umbraculifera*, frondibus pinnato-palmatis plicatis, petiolis ciliato-spinosis, spadice erecta. Lam. enc. 2. p. 130. Rheed. 3. t. 1-12. Hab. in India. Altitudine 60-70-pedum, et vix floret ante 30. s. 40 aetatis annum, ubi tunc perit. Fol. amplissimum.

2. *rotundifolia*, frondib. orbiculatis palmato-peltatis radiatim plicatilibus petiolis ciliato-spinosis, spadice pendulo. Lam. enc. 2. p. 131. C. Saribus. Gmel. Syst. II. p. 563. Saribus Rumph. 1. t. 8. Houttuyn. t. 2. f. 1. 2. Hab. in Moluccis. †

Obs. C. minor, frondib. palmatis flabelliformibus plicatis subtrifidis, filis interjecta paucis, stipitib. inermibus. Jacq. hort. ut peculiare genus nunc sub nomine *Sabal* a coryphis separatur.

843. LICUALA. *Cal.* 3-partitus. Cor. 3-partito. Nect. truncatum sertiforme. *Drupa* 1-sperma.

1. *spinosa*. Willd. Sp. II. p. 201. Thunb. N. pl. Gen. 3. p. 70. Rumph. 1. p. 43. t. 9. Hab. in Moluccis. Frons palmata, lacinias pinnaribus apice truncatis dentatis. W. †

844. THRINAX. *Cal.* 6-dentatus.

Cor. o. Stigma infundibuliforme, obliquum. *Bacca* monosperma.

1. *parviflora*. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 614. Willd. p. 202. *Corypha* palmacea, fol. flagelliformibus cum appendiculo ad imum, petiolis tenuioribus flexilibus compressis. Brown. Jam. 190. Hab. in maritimis et aridis Jamaicae, Hispaniolae, Palma 10-20 pedalis. *h*

845. *CALAMUS. Cal. 6-phyllus.*

Cor. o. Bacca exarida, 1-sperma, retrorsum imbricata.

1. *Rotang*, candice densissime aculeato, aculeis erectis, spadice erecto. Willd. Sp. II. p. 202. *C. petraeus*. Loureiro coch. p. 260. Rheed. t. 64. 65. Rumph. amb. 5. p. 82. t. 151. Hab. in Indiae sylvis juxta Suentia. *h*

2. *verus*, frondibus longissimis, spinis confertis longis, spadice brevi, corolla tripetala. Loureiro. Flor. coch. p. 261. Rumph. 5. t. 54. Hab. ad fluviolum ripas Indiae orientalis. Caudex solitarius. Rumph. l. c. *h*

3. *Draco*, aculeis caudicis adpressis, frondium patentibus, spadice erecto. Willd. p. 203. Rumph. 5. t. 58. f. 1. Hab. in India orientali. *h*

4. *niger*, aculeis candicis et frondium horizontalibus, spadice coarctato pendulo. Rumph. 5. p. 101. t. 52. In littoribus Indiae orientalis. Aculei fusco-nigricantes. *h*

5. *viminalis*, aculeis caudicis patentibus, frondium distantibus reflexis, spadice nutante. Rumph. 5. t. 55. Hab. in sylvis humentibus Javae et Celebis. *h*

6. *albus*, aculeis caudicis reflexis, spadice divaricato recto. C. rudentum, caule longissimo aequali, spinis inversis. Lour. coch. p. 260. Rumph. 5. p. 122. t. 52. Vulgatissima species.

7. *equestris*, aculeis candicis erecto-patentibus, frondium uncinatis, foliolis ellipticis utrinque attenuatis, spadice erecto. Willd. p. 204. Rumph. 5. t. 56. et t. 57. f. 1. Hab. in humidis saxosis Amboinae. *h*

8. *Zalacca*, aculeis patentibus, spadice radicali. W. Gaert. de fr. et sem. 2. p. 267. t. 139. f. 2. Hab. in sylvis humentibus Javae orientalis, Balesae et Baudae. Fruct. trispermus.

846. *JUNCUS. Cal. 6-phyllus*, persistens. *Cor. o. Stigmata* 3. *Caps.*

1-locularis, 3-valvis. *Sem.* plurima.

* *Culmis nudis*, (*panicula ut plurimum late alii*.)

1. *acutus*, culmo nudo tereti mucronata, panicula terminali, involucri diphylo spinoso, caps. subrotundis mucronatis. Smith. Brit. 1. p. 324. Borel. ic. t. 203. f. 2. Hab. in arenosis maritimis. Caps. triquetrum-subrotunda.

2. *maritimus*, culm. nudo tereti, panic. terminali prolifera, involucri diphylo spinoso erecto, caps. oblongis. Smith. l. c. p. 375. Moris. 1. 8. t. 10. f. 15. Cum priore. Caps. prismatica, oblonga.

3. *conglomeratus*, culmo nudo stricto, panicula laterali coarctato-capitata, flor. triandris. Leers. herb. t. 13. f. 1. Fl. dan. t. 1094. Hab. in Europae uliginosis, in pascuis, etc.

4. *effusus*, culmo nudo stricto, panicula laterali, flor. oblongis, caps. obtusa. Flor. dan. t. 1096. Leers. l. 13. f. 2. Hab. in Europae et Americae uliginosis. *h*

5. *glauco*, culmo nudo glauco apice inflexo, panicula laterali effusa, ramis elongatis, flor. et caps. acuminatis. Willd. p. 206. Flor. dan. t. 1159. Engl. bot. t. 665. Hab. in udis. *h*

6. *inflexus*, culmo nudo, apice membranaceo incurvo, panicula laterali. Moris. 1. 8. t. 10. f. 25. Borel. ic. 204. Hab. in Europa australi. Planta obscura. *h* +

7. *rigidus*, culm. nudo superne incurvo pungente, panic. laterali elongata, pedunc. compressis nodosis, cal. mucronato. Desf. Atl. 1. p. 312. In arenis ad maris littora. Caps. ? Fol. ?

8. *arcticus*, culmo nudo stricto, umbella laterali, pedunc. multifloris, flor. sessilibus. Willd. p. 206. Fl. dan. t. 1095. Hab. in alpinis Norvegiae, Lapponiae. J. Jacquinii similimus. *h*

9. *filiformis*, culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali, bracteis subimpliedis, caps. subrotundis. Smith. Brit. 1. p. 372. Pluck. Phyt. t. 40. f. 8. In Europae uliginoso-petulosis turfosis, alpinis. Habitat praecedentium sed minor. Rad. valde repens. Sm.

10. *setaceus*, culmo nudo filiformi nutante, umbel. laterali composita pauciflora, pedunc. multifloris, petal. subulatis. Rostock de Junco. Berol. 1801. p. 13. t. 1.

1. 2. Hab. in Pennsylvania. Affinis priori, sed pedunc. ramosis, etc. differt. $\overline{\text{E}}$

17. *capillaceus*, culmo nudo capillaceo, panicula laterali brevissima, caps. calyce majoribus. Lam. enc. 3. p. 266. Hab. in Brasilia prope Monte-Video.

18. *grandiflorus*, culmo nudo unifloro. fol. teretibus, foliolis calycinis linearisubulatis longissimis inaequalibus. Lam. enc. 3. p. 266. Lin. suppl. 209. Forst. in Comment. Goett. 9. p. 27. 1. 5. Hab. in freto Magellanico inque Terra del Fuego. Flos culmum terminans, unicus, magnus.

13. *magellanicus*, culmo nudo unifloro, fol. planiusculis angustissimis culmo longioribus, flore laterali. Lam. 1. c. 3. p. 266. Hab. in freto Magellanico. Culmi filiformes angulosi nudi. Germen subrotundum atrum.

14. *rubens*, culmo nudo basi vaginis vestito, involucri spathaceo multifloro terminali. Lam. p. 266. Hab. in Brasilia prope Monte-Video. Capitula sunt et flor. bini vel tribus composita, et squamis totidem longitudine fere florum munita. L.

15. *trifidus*, culmo nudo, fol. floribusque tribus terminalibus. L. Flor. dan. t. 107. Hab. in alpinis. Fol. longa, stricta.

*. *monanthos*, culm. folioso 1-floro, fol. subulatis. Hoffm. germ. 1. p. 165. Jacq. obs. n^o. 33. 4. 4. f. 1.

16. *squarrosus*, culmo nudo, fol. setaceis subdistichis, capitulis terminalibus glomeratis aphyllis. Flor. dan. t. 430. Hab. in arenosis, uliginosis. Fol. rigida, squarrosa. $\overline{\text{E}}$

17. *cymosus*, culm. nudo subanguloso, fol. planis, panic. terminali cymosa, involucri bivalvi. Lam. enc. 3. p. 267. Hab. ad Cap. b. spei. Culm. 8-9-uncialis. Panic. subumbelliformis.

18. *pygmaeus (pallens)*, caespitosus, fol. lineari-setaceis, capitul. pedunculatis: primario sessili, floris linearibus obtusis. Thuill. Flor. Paris. Hab. in uliginosis. Culm. nudus, basi rufus. Involucr. 1-2-phyllo, alterum longius.

19. *capensis*, culmo aphylo compresso, capitulis sessilibus pedunculatisque. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei. \dagger

20. *marginatus*, fol. planis glabris, corymbo terminali simplici proliifero, capit. sub-10-floris, petal. c. ps. obtusam aequantibus. Rostk. Junc. p. 30. t. 2. f. 3. Hab. in Pennsylvania.

21. *nodosus*, fol. nodoso-articulatis teretibus, corymbo simplici, capitul. globosis, caps. acuminatis corol. longioribus. Rostk. l. c. t. 2. f. 2. Hab. in Amer. boreali.

β ? *polycephalus*, fol. nodoso-articulatis, capit. globosis multifloris subpaniculatis, flor. linearib. 3-andris. Michx. 1. p. 192. Var. fol. crassioribus compressis et (*tenuifolius*) fol. subfiliformibus. Hab. in Georgia et Carolina.

22. *alpinus*, humilis, fol. articulatis, panic. simplicissimam subaequantibus, capit. laterali terminalique subpedunculata. Villars. Delph. 2. p. 213. Hall. helv. n^o. 1321. J. articulatus. β . Willd. p. 211. Hab. in Helv. et Delphin. alpinis, cum quoque legi in uliginosis in Monte aureo (Mont'or en Auvergne). Flor. nigricant. Culm. 5-6-pollicaris. Caps. obtusae. $\overline{\text{E}}$

* * Culmis foliosis.

23. *punctorius*, culmo nudo tereti, folie tereti articulo mucronato, panicula glomerata. Lin. suppl. 209. Conf. Lam. 1. c. p. 269. Affinitas J. articulati sed omnia robustiora. L.

24. *aquaticus*, culmo adscendente, fol. nodoso-articulatis compresso-teretiusculis, panicula composita, etal. (foliolis calycinis) aequalib. obtusiusculis. Willd. p. 212. (J. articulatus.) I. *aquaticus*. Roth. germ. p. 403. I. *obtusiflorus*, fol. nodoso-articulatis, flor. obtusis. Hoffm. germ. p. 166. Hab. in Europae aquis. $\overline{\text{E}}$

25. *sylvaticus*, culmo erecto, fol. nodoso-articulatis teretibus, panicula supra-decomposita, petalis aristatis interioribus longioribus. Willd. 1. *acutiflorus*, fol. nodoso-articulatis, flor. acutis. Hoffm. β . *utriculosa*, flor. in fol. excrecentibus. Gramen junceum folio articulo cum nrisculis. Bauh. prod. 12. Hab. in nemoribus humidis, in uliginosis. $\overline{\text{E}}$

26. *verticillatus*, culmo decumbente radicante, fol. setaceis, flor. glomeratis verticillatis, glomerulis foliosis. Willd. p. 212. I. *uliginosus*. Roth. Flor. dan. t. 817. β . *Asians*, caul. longius radicante. Lam. enc. 3. p. 26. Mich. p. 191. J. *stolonifer*. Wobleben. Flor. Hallens. suppl. p. 13. c. ie. Wulff. in Jacq. Collect. 3. p. 31. γ . *supinus*, culmo erecto humiliore, dichotomo, fol. canaliculatis filiformibus, capitulo triphylo. Joeneb. hays. Fl. dan. t. 1099. Hab. in Europa: America boreali, locis uliginosis et palludibus, γ in sicco-ribus. $\overline{\text{E}}$

27. *acuminatus*,

27. *acuminatus*, culm. folioso erecto, fol. subnodoso-articulatis, panic. terminali composita; glomerulis pedunculatis sessilibusque, flor. acuminatis triandris. Michaux. Flor. t. p. 192. Hab. in Carol. inferiore. Facie J. articulati.

28. *Tenageja (Vaillantii)*, culmo ramoso paniculato, flor. solitariis sessilibus, petalis ovato-oblongis, capsula subglobosa. Lin. suppl. p. 208. Flor. dan. t. 1760. Vail. par. t. 20. f. 1. J. Vaillantii. Thuill. per. Hab. in paludosis exsiccatis. ☉

29. *aristatus*, rad. bulbosa, culm. folioso erecto compresso, fol. angustis subcanaliculatis, panic. composita, flor. triandris, cal. bracteisque aristatis. Michaux. l. c. Hab. in Georg. et Carolina. Facie J. bulbosi. Petala exteriora aristata.

30. *bulbosus*, culmo subcompresso indiviso, fol. linearibus canaliculatis, corymbo terminali, petal. obtusis capsula subrotunda obtusa brevioribus. Willd. p. 213. l. fol. linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. L. Flor. dan. t. 431. l. compressus. Jacq. Moris. s. 8. t. p. f. 11. Hab. in pascuis, humidis ad vias. Rad. bulbosa? ☞

31. *multiflorus*, culm. inferne nodoso folioso, fol. teretibus, panic. terminali elongata erecta, pedunc. inaequalibus multifariam decompositis fasciculatis. Desf. Atl. t. p. 313. t. 92. Hab. in Barbariae paludibus. Flor. J. effusi s. glauci. D.

32. *foliosus*, culm. nodoso ramoso folioso, fol. canaliculatis, panic. terminali erecta, lacin. cal. aciformibus. Desf. p. 313. t. 92. Hab. in Algeriae paludibus. Flor. J. buiformi.

33. *tenuis*, culm. folioso simplice teretiusculo, fol. canaliculatis, corymb. terminali dichotomo bract. brevioribus, caps. oblonga obtusa petal. brevioribus. Rostk. Junc. p. 21. t. 1. f. 3. J. *bicornis*, fol. radicalib. subsetaceis, culm. nudo, involucr. setaceo aphylo, etc. Michaux. t. p. 191. Hab. in Georgia Carolina. Cal. acutissimis. M.

34. *bufonius*, culmo dichotomo, fol. angulatis, flor. oblongis solitariis sessilibus. L. Flor. dan. t. 1098. Hab. in inundatis, ad vias.

35. *cephalotes*, culmo aphylo tereti, fol. canaliculatis, capitulis subumbellatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. F. spec. †

36. *stygius*, fol. setaceis depressiusculis, pedunculis geminis terminalibus, glumis solitariis subbifloris. L. Smith. ic. ined. J.

p. 55. Hab. in Succ. paludibus. Culmi spithamei, simplices. Folia altitudine culmi, erecta. Petala exteriora purpurascens, interiora pallida. Stigm. reflexa. L.

37. *triceps*, fol. canaliculatis basi ventricosis, capitulis tribus multifloris involucriis terminalibus. Rostkow. p. 48. t. 1. f. 4. Hab. in Sibiria. Involucr. 2-valve, capitul. quodlibet basi cingens, illoque 3-plo longius. Petal. castanea. R.

38. *castaneus*, fol. planis amplexicaulis, capit. terminali subgemino multifloro basi foliato, bract. acutis. Smith. Brit. t. p. 383. Hab. in Scotiae alpib. paludosis. Rad. laxo repens, sarmentosa.

39. *Jacquini*, culm. 1-folio, fol. canaliculatis, capit. terminali solitario multifloro. Rostak. l. c. p. 49. Willd. p. 215. Jacq. Flor. austr. 3. t. 227. J. nigricans. Lam. Creec. in alpibus. Capitul. splendeus, nigricans.

40. *biglumis*, folio subulato, gluma biflora terminali. L. Flor. dan. t. 220. Hab. in alpibus helv. et scoticis. ☞

41. *triglumis*, fol. planis, gluma triflora terminali. L. Flor. dan. t. 232. Hab. in alpibus. ☞

42. *pilosus*, fol. planis pilosis, corymbo subsimplici, pedunc. unifloris nutantibus, petal. capsula brevioribus ovatis acutis. Willd. p. 289. Curt. Lond. ic. Leers. herb. t. 13. f. 19.

43. *vernalis*, fol. planis pilosis, pedunc. simplicibus, inferioribus reflexis. Hoffm. germ. p. 168. Hab. in sylvis. Vere. ☞

44. *maximus* (nemorosus), fol. planis pilosis, corymbo decomposito, pedunculis elongatis divaricatis subtrifloris, petal. aristatis longitudine capsulae. Willd. p. 117. l. *maximus*, fol. planis pilosis. Retz. Fl. dan. 441. l. *maximus*. Roth. germ. l. p. 157. l. laefolius. Wulff. in Jacq. Coll. 3. p. 59. l. sylvaticus. Curt. lond. ic. Smith. brit. p. 325. Hab. in montosis sylvaticis. ☞

45. *spadiceus*, fol. planis glabris, vaginis pilosis, corymbo decomposito divaricato, pedunc. subquadrifloris, petal. mucronatis capsula acuta brevioribus. Willd. p. 218. Villars. delph. 2. p. 216. t. 6. Habit. in alpibus et montosis. ☞

46. *parviflorus*, fol. planis vaginisque glabris, corymbo decomposito erecto, pedunc. unifloris, calyc. foliolis acutis nutantibus. Willd. p. 219. Rostkow. de Junc. p. 26. t. 1. f. 1. Ehrh. Beitr. 6. p. 159. Hab. in alpibus Lapponiae. ☞

46. *glabratus*, fol. planis culmoque glaberrimis, corymbo decomposito divaricato, pedunc. subunisporis, cal. ciliatis, petal. acuminatis. Rosk. l. c. p. 28. Habit. in alpb. salisburgensib. Simil. J. maximo, sed fol. glabris et pedunc. plerumque unifloris diversus. R.

47. *luteus*, fol. planis, vaginisque glabris, corymbo composito conferto, pedunculis multifloris, petal. acutiusculis splendentib. Willd. Allion. ped. n°. 2085. Villars. l. c. Hab. in alpbus.

48. *serratus*, fol. ensiformibus planis serratis subtus canis, paniculae vaginis subulatis perfoliatis. Lin. suppl. p. 208. Hab. ad Cap. b. spel. Panic. conglomerata.

49. *albidus*, fol. planis pilosis, corymbo decomposito, pedunc. subquadrisporis, calyc. foliolis mucronatis, interioribus paulo longioribus, radice fibrosa. Willd. Hoffm. germ. l. angustifolius. Wulf. in Jacq. Collect. 3. p. 36. I. niveus. Leers. herb. t. 13. f. 6. et plurium autorum. Hab. in nemorosis.

50. *niveus*, fol. planis pilosis, corymbo composito, pedunc. subquinq. floris, calyc. foliolis acutis, interioribus duplo longioribus, radice repente. Willd. l. Scheuch. gram. 320. t. 7. f. 7. Moris. s. 8. t. 9. f. 30. Hab. in alpbis et montosis sylvaticis. Flor. majores quam in priore, eleganter nivei.

* *brevifolius*, fol. linearibus canaliculatis pilosis, corymb. composito glomerato, fol. subaequali, capit. subdecemfloris, petal. obtusis; interioribus duplo longioribus. Rosk. p. 35. Hab. in montib. Lusitaniae. Petal. alba, splendentia. An var. prioris?

51. *campestris*, fol. planis pilosis, spicis pedunc. ovatis subcernuis; intermedia sessili, calycinis foliolis mucronatis capsula obtusa longioribus. Willd. p. 221. Leers. t. 13. f. 5. Hab. in Europae pascuis siccioribus. ¶

52. *pediformis*, fol. plano-carinatis pilosis, flor. oblongis, spica labata nutante. Villars. Dauph. 2. p. 238. Hab. in montibus Delphinatus et Redemonte. Balbis. Caul. in meo specimine, alius, nudus.

53. *congestus*, pilosis, culmo stricto erecto, capitul. congestis, scissilibus, cal. ovatis aristato-acuminatis. Thuill. Paris. p. 170. Junc. villosus, panic. compacta. Vaill. bot. p. 110? Hab. in sylvaticis, subhumidis.

54. *erectus*, vagin. pilosis, spicis ovatis, inaequaliter pedunculatis strictis, petal. caps. dimidio fere longioribus. J. multiflorus. Hoffm. germ. 1. p. 169. J. intermedius. Thuill. Hab. in sylvaticis. Spic. fuscescentes, intermediae breviter pedunculatae.

55. *sudeticus* (nigricans), fol. planis glabris vaginis pilosis, spicis pedunculatis umbellatis, intermedia sessili, petalis mucronatis longitudine capsulae. Willd. l. spicatus. Krock. siles. n°. 559. t. 52. Hab. in sudetis Silesiae summis humilis. Spic. subsecundae nigrae. ¶

56. *spicatus*, fol. planis, spica racemosa nutante, basi composito, caps. acutis. Smith. brit. 1. p. 386. Flor. lapp. t. 10. f. 4. Flor. dan. t. 270. l. alpinus latifolius, panic. racemosa nigricante pendula. Till. pit. 97. Hab. in Lapp. et Scythiae alpbus. ¶

847. APHYLLANTHES. Cal. persistens, glumaceus imbricatus. Cor. 6-partita limbo patente. Caps. supera, 3-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *montepeliensis*. Lin. Lam. ill. gen. t. 252. Moris. s. 5. t. 25. f. 12. Desf. Atl. t. p. 285. Hab. in Europ. australi et Barbar. collib. arenosis. Facie Junci. Caul. fere pedalis, nudus.

848. LEONTICE. Cal. 6-phyllus, deciduus. Cor. 6-petala. Nect. 6-phyllum, unguibus corollae insidens, limbo patens.

1. *Chrysogonum*, fol. pinnatis: foliol. verticillatis lanceolatis acutis trienspidatis. Willd. Sp. II. p. 148. L. fol. pinnatis: petiolo communi simpliciter. L. Hort. cliff. 122. Moris. s. 3. t. 15. f. 7. Habit. inter Graeciae segetes. ¶

2. *Leontopetalum*, fol. radicalibus bi-ternatis, caulinis ternatis, fructu ovato. Willd. l. fol. decompositis: petiolo communi trifido. L. Moris. s. 3. t. 15. f. 6. Hab. in Apulia, Hetruria, Creta. ¶

3. *vesicaria*, fol. bi-ternatis, fructibus obovatis inflatis. Willd. Pall. it. 3. app. n°. 84. t. V. f. 2. Hab. in Sibiria. Vcre.

4. *altaica*, fol. radicalibus decompositis: caulinis quinatis: foliolis lanceolatis. Willd. p. 159. Pall. in Act. Petrop. 1779. p. 257. t. 8. f. 1-3. Hab. in montib. Aluticis. Bract. ellipticae. ¶

849. *CAULOPHYLLUM*. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-petala, cal. opposita. *Antheræ* loculis margine dehiscens. *Drupa* 1-sperma.

1. *Thalictroides*. Michaux. Flor. 3. p. 205. t. 21. Leontice. Willd. Sp. II. p. 148. n°. 5. Hab. in montosis amer. septentr. Subpedale. Epimedio subinutile. Fol. terna, pinnato-lobata. Flor. paniculati.

850. *DIPHYLLEIA*. *Cal.* 3-phyllus, deciduus. *Cor.* 6-petala, cal. opposita. *Antheræ* membrana a basi ad apicem solubili dehiscens. *Bacca* 1-locularis. *Semina* 2-3, subrotunda.

1. *cymosa*, glabra, fol. subpalmatis, anguloso-serratis, cyma multiflora. Mich. l. c. p. 203. t. 19-20. Hab. in rivulis montium Carol. septentrion. Fl. Majo. Statura Podophylli petati.

851. *BERBERIS*. *Cal.* 6-phyllus. *Pet.* 6, ad ungues glandulis 2. *Stylus* o. *Stigm.* umbilicatum. *Bacca* 1-locularis, 2-4-sperma. (Filam. primo glandulis adherentia, dein elasticæ eriguntur.

1. *vulgaris*, racemis simplicibus pendulis, fol. obovatis ciliato-dentatis. Willd. Sp. II. p. 227. Blackw. t. 163. *β. asperma*, laccis aspermis. Canadensis aculeis triplicibus, serratoris foliorum remotis. Hab. in Europæ sylvis, Oriente, Libano, atque in America boreali. h

2. *ilicifolia*, racemis simplicibus corymbosis, fol. obovatis coriaceis spinoso-dentatis. Willd. p. 228. Lin. suppl. 210. Hab. in Tierra del Fuego in rupium fissuris. h

3. *microphylla*, pedunc. trifloris, fol. obovatis integerrimis submucronatis, spinis trifurcis. Forst. in Comm. goett. 9. p. 29. Cum priore.

4. *monosperma*, racem. multifloris nantibus, fol. ovalibus obovatis mucronatis, acul. trifidis. Flor. Peruv. 3. p. 52. Hab. in Tarmæ præruptis. Bacca nigra 1-sperma, sem. orbiculatum. h

5. *flexuosa*, racem. aggregatis inaequalibus paucifloris, fol. obovatis inermibus, aculeis ternis coarctis. Flor. Peruv. l. c. t. 281. f. a. Hab. in Andium præruptis calidis. Bac. nigra, 4-5-sperma. h

6. *lutea*, pedunc. pluribus aggregatis 1-floris, fol. obovatis mucronatis et subtricuspidatis. Flor. Per. 3. p. 51. t. 280. Cum priore. Caul. rimosus, cinereo-lutescens. Lign. luteum, amarum. Flor. plures 5-andri.

7. *virgata*, flor. subternis 5-andris, fol. parvis obovato-cuneiformibus mucronatis, acul. tricuspidatis parvis. Flor. Per. l. c. t. 281. f. b. In Andium nemorib. Bac. ovali-oblonga.

8. *latifolia*, pedunc. 3-6-nis, flor. hexandris, fol. oblongo-obovatis mucrone minimo, acul. parvis tricuspidatis. Flor. Per. p. 52. t. 282. Bac. atra, 3-4-sperma, stigm. pedicellato rostrata.

9. *tomentosa*, pedunc. ternis 1-floris inaequalibus, fol. ovalibus dentato-spinosis mucronatis. Flor. Per. l. c. t. 282. Ad Conceptionis urbis tractus. Bac. 2-3-sperma, rostrata.

10. *cretica*, pedunc. subbifloris, fol. lanceolato-obovatis integerrimis submucronatis. Willd. p. 229. Lycium creticum. Alp. exot. 21. t. 20. Hab. in Creta.

11. *sibirica*, pedunc. unifloris solitariis, fol. obovatis ciliato-dentatis. Willd. erb. 35. Pall. ross. 2. p. 41. t. 67. Hab. in alpin. Altaicis, Sibiriae. h

12. *ruscifolia*, fol. lanceolatis coriaceis? utrinque unidentatis integrisque, flor. racemosis. Ex Herb. Juss. Lam. ill. gen. t. 223. f. 2. Hab. in Montevideo.

13. *buxifolia*, fol. inermibus ovato-lanceolatis ovatisque integerrimis pedicel. 1-floris. Lam. ill. t. 253. f. 3. Ex Herb. Juss. Cum priore. Commers. Fol. parvula, venosa.

14. *empetrifolia*, fol. linearibus angustis, flor. solitariis. Juss. Lam. l. c. f. 4. Hab. ad fructum magellanicum. Fol. juniperiformibus facile distinguenda.

15. *inermis*, fol. ramisque inermibus, flor. solitariis. Juss. Hab. in Fretto Magell. Pedicelli sublongi.

852. *PRINOS*. *Cal.* 6-fidis. *Cor.* 1-petala, rotata. *Bacca* 6-sperma.

1. *vericillatus*, fol. obovato-lanceolatis acuminatis duplicato-serratis, venis subtus pilosisculis. Willd. Sp. II. p. 225. P. Gronovii. Michaux. Flor. l. p. 236, qui hoc genus ad Dioclean amandavit. Hab. in Virginiae paludibus. h

2. *montanus*, fol. ovatis serratis utrinque nitidis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 622. Hab. in fruticulis montium Jamaicae. h

3. *dioicus*, fol. oblongo-ovatis subserratis glabris coriaceis, pedunc. axillaribus subunifloris, flor. dioicis tetrandris Vahl. eclog. 2. p. 25. t. 14. Habitat in insula Montserrat. h

4. *nitidus*, fol. oblongo-ovatis serratis nitidis membranaceis, pedunc. axillaribus unifloris, flor. tetrandris Vahl. eclog. 2. p. 26. Cum. priore.

5? *glaber*, fol. cuneato-lanceolatis obtusiusculis glabris apice serratis. Ait. Kew. 1. p. 478. Conf. Michaux. 2. p. 236. Hab. in Canada. Arbor. Pedunc. uniflori, axillares. Cal. et Cor. ut in precedentibus. Willd. p. 226. h

6. *lucidus*, fol. ellipticis acuminatis laevibus apice subserratis. Ait. Kew. 1. p. 478. Hab. . . . h

7. *Sideroxyloides*, fol. subrotundis integerrimis. Swartz. prod. 58. Fl. ind. occ. 1. p. 624. Hab. in ins. Caribaeis. h

8. *ambiguus*, fol. ovalibus utrinque acuminatis, flor. quadrifidis : masculis ad imos ramulos congestis, foemininis solitariis. Michaux. 2. p. 236. An Cassine caroliniana. Walt. ? Hab. in Carolina.

853. *COSSINIA*. Cal. inferus, 5-partitus. Cor. 4 - s. 5 - petala. Caps. 3-locul. apice dehiscens, loculis subtrispermis. (Flor. paniculato-racemosi.)

1. *triphylla*, fol. ternatis subtus tomentosis : foliolis oblongis obtusis. Lam. enc. 2. p. 132. t. 256. et ill. gen. Cossinea. Willd. p. 226. Jussieu. Hab. in ins. Bourbonia. h

2. *pinnata*, fol. pinnatis : foliol. quinis lanceolatis, subtus tomentosis. Lam. l. c. t. 256. Hab. in ins. Mauritiis.

854. *NANDINA*. Cal. inferus, polyphyllus, imbricatus. Cor. 6-petala. Bacca exsucca, disperma.

1. *domestica*. Thunb. jap. 147. Lam. ill. t. 261. Banks. ic. Koenigsf. t. 13. 14. Hab. in Japonia. Fol. composita, foliolis lanceolatis ternis. Panic. terminalis. h

855. *LINDERA*. Cal. o. Cor. 6-petala, infera. Stigm. 2. Caps. 2-locularis.

1. *umbellata*. Thunb. jap. 145. t. 21. Lam. ill. t. 263. Hab. in Japonia. Flor. subumbellati. h

856. *CAPURA*. Germen superum. Cal. o. Cor. 6-fida. Stam. intra tubum. Stigma globosum. Bacca.

1. *purpurata*. L. Mant. 225. Habit. in Indi. Arbor ramis brachiatis. Fol. opposita, ovata. Flor. axillares. L. h

857. *LORANTHUS*. Cal. o. s. margo brevis, concavus. Cor. 6-fida, revoluta, inferne agglutinata : lacin. lineari-spathulatis. Stam. ad apices petalorum. Bacca infera, 1-sperma, umbilicata s. cal. coronata. (Frutices parasitici. Cor. etiam 5-5-7-fida. Stam. 4-5.)

1. *Scurrula*, pedunc. unifloris congestis, fol. obovatis. L. Willd. Sp. II. p. 232. Roxb. Corom. n°. 140. Pet. gaz. t. 63. f. 8. Hab. in China. Flor. 4-andri. h

2. *tetrapetalus*, flor. ad articulos quatuor verticillatis tetrapetalis, fol. oblongis oppositis subsessilibus. Lin. suppl. p. 211. Forst. prop. n°. 156. Hab. in N. Zeelandia. Fol. elliptica coriacea.

3. *glaucus*, pedunc. axillarib. unifloris, fol. ovatis glaucis. Thunb. prod. 58. Hab. ad Cap. h. spei. h

4. *biflorus*, fol. ovato-subrotundis, pedunc. axillaribus bifloris, cor. tubulosa arcuata. Lam. enc. 3. p. 600. Hab. in Ind. orientali.

5. *cuneifolius*, flor. axillarib. 1-3-nis, bract. cyathiformi 3-gona 3-dentata, fol. cuneiformib. acuminatis. Flor. Peruv. 3. p. 46. t. 276. In Peruvia vallibus. Cor. punicea. Succ. nigra. h

6. *dichotomus*, pedunc. geminis dichotomis, bract. semicyathiformi, fol. 3-4-nis verticillatis oblongis. Flor. Peruv. p. 45. t. 274. In Peruv. Andium nemorib. Cor. inferne punicea, superne lutea.

7. *Buddleioides*, fol. ovatis, flor. congestis axillaribus quadrifidis, calyce truncato, fruct. turbinatis. Lam. enc. 3. p. 600. Hab. in India. h

Obs. Inflorescentia similima Buddlejæ diversifoliae, sed distinguitur a Buddlejæ cerniue infero, cor. tubo incurvo, et laciniiis profunde divisis inaequalibus. Lam.

8. *nodosus*, fol. ovato-rotundatis, pedunc. axillaribus fasciculatis, cor. tubo longissimo, articulis notosis. Lam. enc. 3. p. 601. l. c. Hab. in Peru. Pedunc. in dichotomia caulis.

9. *clavatus*, fol. ovatis obtusis, flor. congestis lateralibus subsessilibus longe tubulosis. Lam. enc. 3. p. 57a. Hab. in ins. Madagascar. h

10. *parvifolius*, pedunc. axillaribus trifidis, pedicellis unifloris, fol. ovatis integris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 628. Hab. in montibus Jamaicae supra ramos arborum. h

11. *falcatus*, racem. paucifloris axillaribus, fol. linearibus obtusis lateraliter falcatis glaucis. Lin. suppl. p. 211. Hab. Madras in arboribus. Flor. falcati sulvi.

12. *uniflorus*, racemis simplicissimis longitudine foliorum, pedunc. unifloris elongatis, fol. obovato-obtusis mucronatis. Willd. p. 233. Jacq. amer. 98. t. 69. Ed. picta. t. 100. L. parviflorus. Lam. enc. 3. p. 595. Hab. in Domingo sylvaticis. h

13. *europaeus*, racem. simplicibus terminalibus, flor. dioicis. Jacq. Flor. aust. t. 30. Habit. in Austriae quercubus parviticis et in Siberia. Statua Visci albis, Flor. dioici. Baccæ flavescens.

14. *acutifolius*, flor. racemosis, pedicell. 1-3-floris, bract. minime orbiculata, fol. lanceolatis acutissimis. Flor. Peruv. p. 48. t. 274. In Peruviae praeruptis calidis. Caul. ramosissimus. Baccæ nigra.

15. *sarmentosus*, racem. brevibus, flor. ternis sessilibus, bract. ovatis, fol. oblongo-lanceolatis carinatis. Flor. Peruv. 43. t. 278. In Andium nemoribus. Petal. lutescentia. Baccæ viscosa, grisea.

16. *acuminatus*, racem. axillarib. bract. minimis concavis, fol. ovatis longe acuminatis. Flor. Per. l. c. Cresc. cum anteceden. cui affinis, sed differt: ram. non radicalibus, fol. subaveniis, et Stigm. capitato-peltato. l. c.

17. *retroflexus*, racem. compositis, flor. retroflexis subternis minimis, bract. foliisque ovatis. Flor. Peruv. p. 49. t. 279. Hab. cum prioribus. Caul. saepe punctatus. Rad. toruosa, ferruginea.

18. *lanceolatus*, flor. racemosis hexandris, pedicell. 3-floris, bract. ovata reflexa, fol. lanceolato-oblongis. Flor. Peruv. 3. p. 47. t. 278. Hab. in Andium nemoribus. Cor. lutea.

19. *punctatus*, racem. longissimis, pedicellis subverticellatis trifloris, flor. 6-andris, bract. obovata, fol. obovatis. Flor. Per. t. 277. Cum priore. Rami oppositi, saepe verticillato-terni.

20. *heterophyllus*, flor. racemosis 6-andris, pedicell. trifloris, bract. ovata scabra, fol. polymorphis. Flor. Per. p. 48. t. 273. Hab. in R. chilensis sylvis, praesertim supra Myrti species. Cor. albidopurpurascens.

21. *longiflorus*, corymb. axillaribus, flor. pentandris nutantibus, fol. oblongis lanceolatis obtusis venosis. Willd. p. 235. Lam. enc. 3. p. 57a. Hab. in Ind. orientali. h

22. *elasticus*, corymbis axillaribus, flor. pentandris nutantibus, fol. oblongis utrinque attenuatis nervosis. Willd. L. cor. junioribus medio fenestratis. Lam. l. c. Rheed. 10. t. 3. Cum priore, hab. in India orientali. h

23. *grandiflorus*, flor. corymboso-racemosis pentandris pendulis, bract. ovata-concava, fol. ovalibus subvenosis. Flor. Per. 3. p. 45. t. 273. Hab. in Peruv. Andium nemorib. Baccæ caeruleae.

24. *americanus*, racemis subramosis cymosis, flor. nutantibus, fol. ovatis difformibus. Swartz. obs. 132. Jacq. amer. 97. t. 67. Ed. picta. t. 98. Hab. in Amer. arbor. maritimis. h

25. *glaucus*, flor. racemoso-corymbosis 5-andris, bract. lanceolata, fol. ovato-lanceolatis. Flor. Per. t. 275. In Peruvia. Flor. secundi. Baccæ atropurpureae.

26. *ellipticus*, flor. corymboso-umbellatis 7-andris, pedicell. 3-floris, bract. ovata reflexa, fol. ellipticis. Flor. Per. 3. p. 47. t. 276. Cor. 7-petala, lutea.

27. *occidentalis*, racemis simplicibus, flor. irregularibus. L. Amoen. acad. 4. p. 366. Viscum latoribus et subrotundis foliis, flore purpureo. Sloan. jam. 168. hist. 2. p. 92. t. 200. f. 2. Hab. in Amer. arboribus. h

28. *tetrandrus*, flor. aggregato-umbellatis 4-andris, bract. 3-partita ciliata, fol. ovatis. Flor. Per. 3. p. 46. t. 275.

Periclymenum, etc. Few. Obs. 2. pl. 45. Hab. in R. chilensis sylvis. Adhibetur ad tingendum pulchro colore nigro. h

29. *verticillata*, flor. aggregato-capitata subverticillatis 6-andris, bract. ovatis, fol. ternis lanceolatis. Flor. Per. l. c. Cor. punicea semiquinquefida. Bac. purpureo-nigra.

30. *Lonicerojdes*, flor. aggregata capitata, fol. ovato-lanceolatis r. violatis. Lin. Willd. p. 276. Rheede 7. t. 29. *Periclymenum*, etc. Pluck. alm. t. 212. Hab. in Asia. Fol. saepius 5-andri.

31. *pedunculatus*, fol. ovato-cordatis, racemis simplicibus solitariis, flor. ternis pedunculatis. Jacq. amer. 98. Hab. in Carthagenae arboribus maritimis inunlatis. Racemi axillares fol. breviores. Flor. parvi.

32. *sessilis*, fol. ovatis, racemis simplicibus solitariis, flor. ternis sessilibus. Jacq. amer. 93. Habitat in sylvis Caribag. Rami diffusi fragiles. Flor. insident pedunc. partiali incrassato. Jacq. h

33. *marginatus*, fol. ovatis subacuminatis margine scariosis, racemis solitariis axillaribus, pedicellis trifloris. Lam. enc. 3. p. 566. Hab. in Brasilia. Fol. integerrima. h

34. *Stelis*, racemis trichotomis, pedunc. trigonis, flor. aequalibus. L. Hab. in Cumanac arborib. h

35. *pauciflorus*, racemis tripartitis fol. brevioribus, fol. obovatis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 627. Hab. in arboribus Jamaicae interioris. h

36. *brasiliensis*, hexapetalus, fol. lanceolato-ovatis, cor. ante florescentiam longe tubulosis rectis clavatis. Lam. enc. 3. p. 570. Hab. in Brasilia. h

37. *pentandrus*, racemis simplicibus, flor. quinquefoliis racemosis, fol. alternis petiolatis. L. Hab. in India. Ramis ad folia dilatatis. Fol. alterna, subnervia, figura Lauri. L. h

38. *spicatus*, spicis quadrangularibus, fol. oppositis. Jacq. amer. 97. t. 68. Ed. picta. t. 99. Hab. Carthagenac. h

39. *ovalifolius*, spic. solitariis geminisque brevibus, flor. confertis hexandris minimis, fol. ovalibus subaveniis carnosis. Flor. Per. 3. p. 50. Affinis L. *spicato*. Pet. purpurea.

40. *longibracteatus*, spic. terminalibus, bract. floriferis, flor. pentandris, fol. lan-

ceolatis enerviis. Lam. enc. 3. p. 599. Hab. in Peru. Flor. c. forea bractearum.

41. *cucullaris*, fol. lato-lanceolatis oleatis nervosis, bract. cordatis cucullatis subtrifloris. Lam. in Journ. d'Hist. natur. n°. 12. p. 444. t. 23. Hab. in Guiana. h

42. *polystachyus*, spic. ternis laxis, flor. sessilibus minimis, fol. ovato-lanceolatis amplis. Flor. Per. l. c. Pet. purpurea. Bac. luteo-fusca.

43. *emarginatus*, spic. axillaribus, fol. cuneato-ovatis emarginatis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 625. Hab. in montib. Hispaniolac. h

858. CLEOME. *Glandulae* nectariferæ 3, ad singulum sinum calycis singula, excepto infimo. Cal. 4-phyllus. Petala omnia adscendentia. Caps. siliquosa pedicellata, unilocularis, bivalvis. (Stam. 4-6-12-20 et plura, subtetradymama.)

* Fol. non manifestis.

1. *Juncea*, fruticosa, aphylla, corymbis lateralibus, genitalibus elongatis gynandris octandris, siliqua lineari tomentosa. Lin. suppl. p. 300: Willd. Sp. III. p. 564. Hab. ad Cap. b. sprei. Fol. vix ulla, nisi parvas squemulac. L. h

** Fol. compositis : 3-5-7-tenis.

2. *heptaphylla*, flor. gynandris, fol. subsepienatis, caule aculeato. L. Habit. in Indiis. ☉

3. *pentaphylla*, flor. cynandris, foliis quinatis, caule inermi. Jacq. hort. t. 24. Rheed. 9. t. 24. Hab. in India. ☉

4. *triphylla*, flor. gynandris, fol. ternatis, caule inermi. L. Herm. lugdb. t. 565. Hab. in Indiis. ☉

Obs. Tres praecedentes (2, 3, 4.) ex eadem planta olim prognatas evincunt folia imprimis floralis sessilia, vix itaque specie sunt sufficienter diversae. L.

5. *polygama*, flor. superioribus masculis tetrandris, fol. ternatis, foliolis sessilibus margine subaculeatis. L. Willd. Sp. III. p. 563. Sloan. bist. 1. p. 124. t. 124. f. 1. Hab. in Jamaica. ☉

6. *icosandra*, flor. icosi-tetrandris, fol. quinatis. L. Rumph. t. 96. f. 3. Burm. zeyl. t. 99. Hab. in Zeylona. ☉

7. *viscosa*, flor. dodecandris, fol. quinatis ternatisque. L. Mort. Rheed. g. 2. 23. Hab. in Zeylona, Malab. Stam. 10 ad 15. ☉

8. *dodecandra*, flor. dodecandris, fol. ternatis. L. Burm. zeyl. 216. t. 100. f. 1. Sloan. hist. 1. p. 149. t. 134. f. 1. Hab. in India. Caul. viscoso-pubescent. Stam. 10-14. Siliqua sessiles, subinflatae. ☉

9. *uniglandulosa*, fol. sparsis ternatis lanceolatis integerrimis, flor. glandulosis dodecandris. Cav. ic. 4. p. 3. Hab. in N. Hispan. praesertim in Acapulco. Caul. villosus. Cor. alba. Stam. 14-16.

10. *felina*, polyandra hispida, fol. ternatis cuneiformibus strigosis, flor. axillaribus solitariis pedunculatis, siliquis linearibus compressis. Lin. suppl. p. 300. Hab. in Zeylona. Folia linguam referunt felinam. L.

11. *Chelidonii*, polyandra hirsuta, foliolis quinatis septenis cuneiformibus scabris, racemis terminalibus, siliquis filiformibus. Lin. suppl. p. 300. Hab. prope Transcaucas. Cor. rubra Chelidonii hybridi. Siliqua filiformis.

12. *gigantea*, flor. hexandris, fol. septenatis, caule inerme. Jacq. obs. 4. p. 1. t. 76. Hab. in Guinra. Scapulis et ultra acmper virant. Racemus terminalis. Qualitas saporis urentissima, odoris viciatissima. L.

13. *aculeata*, flor. hexandris, fol. ternatis integerrimis, stipulis spinoscentibus. L. Hab. in Amr. Flor. solitarii, parvi.

14. *spinosa*, flor. hexandris, fol. septenatis quintisque, caule spinoso. Jacq. amer. Naregr. bras. 33. t. 34. Habit. in Amer. meridionali. Rami divaricati. ☉

15. *serrata*, flor. hexandris, fol. ternatis foliolis linearibus lanceolatis serratis. L. Jacq. amer. 190. t. 190. f. 43. Hab. in America meridionali. ☉

16. *ornithopodioides*, flor. hexandris, fol. ternatis foliolis ovali-lanceolatis. L. Dill. elib. 359. t. 206. f. 345. Buxb. cent. 1. p. 6. t. 9. f. 24. Hab. circa Peram in agris. Flor. flavi. ☉

17. *violacea*, flor. hexandris, fol. ternatis solitariisque foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. L. Barr. ic. 865. Hab. in Louisiana. Petala atropurpurea atomis flavis. Lateralis 2 cordata. ☉

18. *arabica*, flor. hexandris, fol. glandulosis inferioribus ternatis lanceolatis ob-

tusis, siliquis fusiformibus viscoso-scabris. Lin. dec. 3. t. 8. Drsf. Atl. 2. p. 39. Shaw afr. f. 558. Hab. in Arabia et Barbaria. Petala lutea, apice purpurea. ☉

19. *tenella*, flor. hexandris, fol. ternatis linearibus filiformibus. Willd. p. 570. Retz. obs. 4. p. 28. Pluck. phyt. 1. 224. f. 3. Hab. in aridis arenosis orientalis. Cor. lutea. ☉

20. *filifolia*, flor. hexandris, fol. septenatis ternatisque filiformibus. Vahl. symb. 2. p. 48. C. *angustifolia*. Forsk. descr. 120. Hab. in Arabia felici ad agrorum margines. Caul. debilis. ☉

*** Fol. simplicibus.

21. *guyanensis*, flor. hexandris, foliis linearibus filiformibus sessilibus. Willd. Aubl. Guian. 2. t. 173. Flor. axillares flavi.

22. *monophylla*, flor. hexandris, fol. simplicibus ovato-lanceolatis petiolatis. L. Burm. zeyl. 217. t. 100. f. 2. Rheed. g. t. 34. Hab. in India. ☉

23. *capensis*, flor. hexandris, fol. simplicibus sessilibus linearibus lanceolatis, caule angulato. L. Hab. ad Cap. h. spri et in India. Caul. facie Epilobii. Fol. Genistae.

24. *procumbens*, flor. hexandris, fol. simplicibus lanceolatis petiolatis, caulibus procumbentibus. L. Jacq. amer. 189. t. 120. Sloan. hist. 1. t. 123. Hab. in Jamaicae et Hispaniolae aridis sabulosis. ☉

Obs. Genus hoc ex Capparidis familia a Linnaeo ad classem Tetradynamiam est amandandum.

859. STEPHANIA. Cal. campanulatus, bilobus. Cor. 4-petala. Stam. bina, inferiora longiora. Germen pedicellatum. Stylus o. Stigma capitatum. Caps. ?

1. *Cleomoides*. Willd. Sp. II. p. p. 239. Capparis paradoxa. Jacq. Schoenb. 1. p. 58. t. 111. Hab. ad Caraecas Amer. Frutex 6-petalis. Flor. axillares solitarii. Cal. aurantius bilobus ventricosus. Cor. flava calyce paulo longior, petalis rectis. Cum Capparidibus nil commune habet, prater germen pedicellatum. W.

* RUTACEAE 6-andrae. Genera 860-865.

860. HILIA. Cal. duplex, inferus, 6-phyllus, superus 2-4-phyllus. Cor. 6-fida, tubo cylindrico lon-

gissimo. *Antherae* intra tubum faucem corol. sessiles. *Sem.* comosa.

1. *longiflora*, cor. sexfolis, laciniis lanceolatis revolutis, fol. ovatis acutis. Swartz. obs. 135. t. 3. f. 1. Willd. p. 239. Andrew. t. 145. H. parasitica. L. Jacq. amer. Ed. picta. t. 97. Hab. in fruticetis humilis montium Jamaica et in Brasilia, Flor. flavi. Non est parasitica. Sw. h

2. *tetrandra*, cor. quadrifidis, laciniis ovatis, fol. obovatis. Sw. Fl. ind. occid. 1. p. 630. In montib. altis Jamaicae.

861. COUTAREA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* magna, infundibuliformis, 6-fida, tubo incurvo ventricos. *Filam.* tubi basi inserta. *Stigm.* sulcatum. *Caps.* infera 2-locularis, 2-valvis, polysperma. *Sem.* imbricata, margine membranaceo. (Flor. basi bibracteati, interdum 7-andri. A.)

1. *speciosa*. Aubl. Guj. p. 314. t. 122. Juss. gen. pl. Portlandia hexandra. L. Willd. Sp. 1. p. 336. Jacq. amer. ed. pict. p. 35. t. 65. Hab. in Cartagena fruticosus et in Guiana. Flor. pulchri, suavolentes fere tripollicares, carneo-albi. J.

862. ISERTIA. *Cal.* superus, 6-dentatus. *Cor.* infundibuliformis, 6-fida. *Stigma* 6-fidum. *Pomum* 6-loculare, polyspermum.

1. *coccinea*, fol. lanceolato-ellipticis subtus villosis-lanceis acuminatis utrinque acutis, pedunc. racemosis bifidis. Vahl. eclog. 2. p. 27. Willd. p. 240. Lam. ill. t. 279. Guetter. la coccinea. Aubl. guj. 1. p. 317. t. 123. Hab. in sylvis Cajen. Gujan. Arbor 10-12-pedalis, ramis tetragonis. Panicula terminalis. h

2. *parviflora*, fol. oblongis inferiorib. basi subcordatis, thyrso ovato. Vahl. p. 28. t. 15. Hab. in ins. Trinitatis. Fol. glabra, interdum subtus subvillosa. V.

863. RICHARDIA. *Cal.* 6-partitus, persistens, superus. *Cor.* infundibuliformis, 6-fida. *Stigm.* 3, capitata. *Fructus* 3-partibilis. *Sem.* 5, truncata. (Capit. radiata foliolis. Una pars floris passim demitur. Flor. Pernv.)

1. *scabra*, caul. hispido brachiato, fol.

ovato-lanceolatis scabris. Lin. Sp. pl. p. 470. Lam. ill. t. 254. Hab. in Vera-Cruz. Caul. erecti? pilis reflexis.

2. *pilosa*, fol. oblongo-lanceolatis floralibus geminis quaternisque, flor. capitulato-umbellatis. Flor. Pernv. 3. p. 50. In ruderalis et segetib. Cercado et Lima Fl. toto anno. Caul. procumbens, ramis inferiores brachiati. Anther. et Stigm. pilosa.

864. STEVENSIA. *Cal.* bifidus, deciduus. *Cor.* tubulosa: limbo plano 5-7-fido. *Antherae* (6-7) in cor. fauce sessiles. *Caps.* 2-locularis, polysperma, apice quadrifariam dehiscens.

1. *burifolia*. Poiteau in Annal. d. Muscum. Cah. 27. p. 233. t. 60. Cresc. in ins. St. Dominica septentrionali. Flor. solitarii albi, odorati, externe subtoementosi. Fol. subtus alba, reticulata. h

865. PSATHURA. *Cal.* superus, 6-dentatus. *Cor.* campanulata, intus barbata, 6-fida. *Stigm.* lamellatum. *Drupa* sicca, striata, coronata, 6-locularis: loculis 1-spermis.

1. *borbonica*. Willd. Sp. II. p. 229. Lam. ill. gen. t. 260. Hab. in ins. Borbonia. Rami nodosi fragiles. Flor. corymbosi. h

866. CANARINA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-fida, campanulata. *Stigmata* 6. *Caps.* infera, 6-locularis, polysperma.

1. *Campanula*. Lin. Lam. ill. t. 259. Campanula canariensis. L. fol. oppositis hastatis dentatis petiolatis. L. Syst. veg. Pluck. alm. 76. t. 276. f. 1. Hab. in ins. Canariis. Fol. petiolata, hastata. Flor. dichotomia. h

867. FRANKENIA. *Cal.* 5-fidus, infundibulif. *Petala* 5. *Stigma* 2-3-partitum. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis.

* *Herbacene.*

1. *laevis*, flor. solitarii, petalis subrepandis obtusis, fol. linearibus basi ciliatis. Willd. Sp. II. p. 247. Hab. in Eur. australis maritimis et circa Astracan.

Obs. Ab Illicitanis, in Hispania, ut praestans remedium habetur in mitigandis symptomatibus calculosis. — Cav. ic. pl. 2. p. 15.

2. *Nothria*, flor. fasciculatis, petalis acutis, fol. linearibus basi ciliatis. Willd. *Nothria repens*. Berg. cap. 17 t. 1. f. 2. Hab. ad Cap. b. spci. h

3. *hirsuta*, flor. fasciculatis, petalis subrepandis obtusis, fol. linearibus oblongis, caule hirsuto. Willd. Hab. in Apulia, Creta, in Sibiria. T.

4. *pulverulenta*, flor. solitariis, petalis subrepandis, fol. subrecto-ovoideis subtus pulverulentis. Hab. in litoribus, ©

* * *Fruticosae.*

5. *corymbosa*, fruticosa, fol. linearibus pulverulentis margine reflexis, flor. corymbosis. Desf. Atl. 1. p. 315. t. 93. Hab. ad maris littora prope Arzan in Barb. Fol. F. laevis, perennans.

6. *thymifolia* (ericoides), fruticosa erecta ramesissima, fol. (cinereis) lineari-bus confertis brevissimis, flor. axillaribus. Desf. p. 316. Barcl. t. 714. Hab. in Barbar. arenosis, et in Hispan. prope Arangues quoque inventa a D. Thibaud. Ericam refert. Fol. quasi crustosa, vix ciliata. Flor. subsecundi.

7. *microphylla*, fruticosa levis, fol. oppositis quadrifariam imbricatis subteretibus, flor. solitariis subterminalibus. Cav. ic. 6. p. 77. t. 537. f. 1. Hab. in America meridion. Née. Cor. alba. Caul. ramostissimi decumbentes. h

868. *FLOERKEA*. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Stylus bifidus. Utriculus dicoccus.

1. *lacustris*. Fl. proserpinacoides. Willd. in Act. Soc. Nat. cur. Perolin. v. 3. 1801. Hab. in Pennsylvaniae lacubus, et paludosis.

819. *PEPLIS*. Cal. campanulatus: ore 12-fido. Petala 6 (ant o.), calyci inserta. Caps. 2-locularis, polysperma.

1. *Portula*, flor. hexandris axillaribus solitariis subpetalis, fol. petiolatis subrotundo-ovatis. Willd. Sp. 11. p. 243. P. flor. apetalis. L. Flor. dan. t. 84. Lam. ill. t. 262. Hab. in inundatis. ©

2. *indica*, flor. tetrandris spicatis brac-

teatis, fol. oblongo-obovatis sessilibus. Willd. Hab. in India. Caul. ascendens.

870. *GAHNIA*. Cal. gluma 1-valvis, 2-5-flora. Cor. gluma 2-valvis. Stylus dichotomus. Sem. 1.

1. *procera*, paniculis spicatis pluribus elongatis, flos. hexandris. Forst. prod. n°. 358. Lin. suppl. 212. Hab. in N. Zeelandiae collibus.

2. *schoenoides*, culmis flexuosis, paniculis compositis spicatis rigilibus subsolitariis. Forst. prod. n°. 159. Hab. in ins. Tabiti.

871. *BAMBOS*. Squamae tres spiculas subquinq. flores tegentes. Cal. o. Cor. gluma 2-valvis. Stylus 2-fidus. Sem. 1.

1. *arundinacea*, panicula ramosa divaricata. Willd. p. 245. (Bambusa) Reiz. obs. 5. p. 24. Roxburgh. corom. 1. p. 55. t. 79. Nastus. Juss. Rheed. 1. t. 16. Hab. in India utraque. h

2. *verticillata*, spica terminali simplici verticillata. Willd. Kumph. amb. (B. stricta. Roxb. l. c. t. 80. ? Verticill. sessilis globularis, congestus. R.) Hab. in India. h

72. *EHRHARTA*. Cal. gluma 2-valvis, abbreviata, uniflora. Cor. gluma duplex, utraque bivalvis, exterior compressa acinaciformis, transversim sulcata. (Styl. 1-2.)

1. *cartilaginea*, culmo indiviso, panicula simplici, cor. exteriori retula submunica, foliorum margine cartilagineo crispo. Smith. ic. ined. p. 33. Thunb. prod. 66. Eh. Mnemateja. Lin. suppl. p. 209. Eh. nutans. Lam. enc. 2. p. 346. Habitant omnes species ad Cap. b. spci. Gramen pulchrum.

2. *bulbosa*, culmo indiviso, panicula ramosa multiflora, cor. exteriori emarginata aristata. Smith. loc. cit. E. aristata. Thunb. Trochera striata. Richard. Panic. simplex laxa. Th. prodr. append. p. 188.

3. *longiflora*, culmo simplici, panicula ramosa multiflora, cor. exteriori mucronata tuberculato-hispida, flor. triandris. Smith. p. 32. t. 32.

4. *panicca*, culmo diviso, panicula subramosa, flor. erectis digynis. Smith. t. 9. Eh. erecta. Lam. enc. 2. p. 347. Hab. ad Cap. b. spci. h

5. *calycina*, culmo ramoso, panicula subsimplici, calyce colorato cor. aequante. Smith. ic. t. p. 33. t. 33. E. glum corollinis exterioribus subpilosis. Thunb. prodr. app. p. 1188. Aira capensis. Län. suppl. 108.

6. *ramosa*, cor. glabris muticis, panic. coarctata, culm. ramoso. Thunb. prodr. corrig. Melica ramosa. Ejusd. p. 21.

7. *melicoides*, cor. glabris muticis, panic. patentissima, fol. subfiliformibus. Th. l. c. Mel. capensis. Ejusd. l. c.

8. *gigantea*, cor. hirsutis aristatis, panic. verticillata, culm. erecto. Thunb. prodr. sub Melica.

9. *geniculata*, corol. hirtis, panicula coarctata, culm. decumbente. Thunb. sub Melica.

DIGYNIA.

873. *ORYZA*. Cal. gluma 2-valvis, 1-flora. Cor. 2-valvis, subaequalis, semini adnascens.

1. *sativa*. L. Willd. p. 247. Catech. ear. 1. p. 14. t. 14. *β. mutica*, glum. absque aristis. *γ. glutinosa*, sem. glutinoso. Loureiro. Colitur in India paludosis, hinc inde etiam in Europa. Var. quoad seminis formam; vid. Willd. l. c.

874. *NECTRIS*. Cal. 6-partitis, lacinii 3-interioribus minoribus obtusi. Cor. o. Caps. subcarosae, stylis coronatae, uniloculares, 1-2-spermae.

1. *aquatica*. Willd. Cabumba aquatica. Aubl. guj. 1. p. 321. t. 124. Mich. Flor. 1. p. 206. Lam. ill. t. 265. Hab. in stagnis et rivulis Cajen. Gujanac. et Carolinae. Fol. inferiora capillares - multifida, superiora natantia peltata. Flor. flavi. Sem. globosa.

875. *ATRAPAXIS*. Cal. 2-phylla. Petala 2, sinuata. Stigmata capitata. Sem. 1.

1. *spinosa*, pamis spinosis. L. l'Herit. stirp. nov. 1. p. 27. t. 24. Dill. elh. 47. t. 40. t. 47. Hab. in Media et Siberia. Sem. compressum.

2. *undulata*, inermis, fol. undulatis. Polygonum undulatum. Berg. cap. 135. Polygonum. Thunb. prodr. 77. Dill. elh. 36. t. 32. f. 36. Hab. ad Cap. b. spec. Pet. o. Sem. subrotundum. L. h.

TRIGYNIA.

876. *RUMEX*. Cal. 3-phyllus. Petala 3, conniventia. Sem. 1. triquetrum.

* *Flor. hermaphroditis. Valvulis granulato notatis.*

1. *Patientia*, valvulis integerrimis; unica granifera, fol. ovato-lanceolatis. L. Willd. Sp. II. p. 249. Hab. in Italia, in Germania. Col. in hortis.

2. *sanguineus*, valvulis integerrimis; unica granifera, fol. cordato-lanceolatis. L. Blackw. t. 49a. Hab. in Virginia. Fol. venis rubris succo sanguineo.

3. *purpureus*, valv. dentatis graniferis, fol. cordatis; petiolis venisque purpureis. Enc. bot. 5. p. 63. R. sanguineus. *β. latifolius*. Hort. Paris. Hab. . . R. sanguineam refert, sed fol. multo latioribus, praesertim valvul. dentatis differt.

4. *spathulatus*, fol. obovatis obtusis, valvul. graniferis. Thunb. prodr. 67. Hab. ad Cap. b. spec.

5. *verticillatus*, valvul. integerrimis; omnibus graniferis, fol. lanceolatis; vaginis cylindricis. L. Hab. in Virginia.

6. *Britannica (xanthorrhiza)*, valvulis integerrimis; omnibus graniferis, fol. longo lanceolatis; vaginis obsolete, laceris. L. Michaux. 2. p. 217. R. bienne. Moench. meth. p. 354. Hab. in Virginia et Carolinae aquosis nec in Europa.

7. *Hydrolapathum*, valvul. integerrimis graniferis, fol. lanceolatis strictis glabris acutis integerrimis basi attenuatis. Ait. Kew. 2. p. 481. R. aquaticus. Smith? et plurium autorum. Hab. in fossis, ad fluviorum ripas.

8. *crispus*, valv. integris omnibus graniferis, fol. lanceolatis undulatis acutis. Hab. in Europae humosis.

9. *Nemolapathum (conglomeratus)*, valvulis linearibus obtusis integerrimis omnibus graniferis, verticillis gloomeratis, fol. inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis undulatis. Län. suppl. p. 212. R. conglomeratus. Roth. germ. l. II. 422. R. limosus. Thuill. ? R. crispus. *β. Pollich.* Hab. in nemoribus humidis, ad rivulos, in paludibus. A priore satis diversus. Rami divaricati. Flor. ad dimidium minores.

10. *persicarioides*, valvulis dentatis : omnibus graniferis, fol. lanceolatis undulatis. L. Hab. in Virginia. Valv. dentibus utrinque tribus longis. ☉

11. *aegyptiacus*, valvul. trifido-setaceis : unica granifera. L. Till. pis. 43. t. 37. f. 1. Hab. in Aegypto. ☉

12. *dentatus (multiflorus)*, valvulis dentatis, omnibus graniferis, fol. lanceolatis L. caps. seminis alba et crenata. Dill. elth. 191. t. 156. f. 191. Hab. in Aegypto. Humilis. Rami verticilli multiflori. Fol. oblique. ☉

13. *maritimus*, valvul. deltoideis setaceo-dentatis graniferis, fol. linearibus, verticillis confertis. Smith brit. 1. p. 253. Petiv. brit. t. 2. f. 8. R. aureus. Withering. Hab. in paludosis, praesertim maritimis.

14. *palustris (aureus)*, valv. lanceolatis graniferis basi dentatis, fol. linearilanceolatis, verticill. distantibus. Smith. l. c. p. 594. Boec. mus. t. 104. Curt. Lon. 3. t. 23. Petiv. l. c. f. 7. Hab. in paludosis et ruderalis humidis. Rad. intus rubra. Curt. in paludosis, radicalia maxima. Sm.

15. *crispatus*, valvul. obtuse cordatis graniferis, crisato-dentatis, fol. inferiorib. lanceolatis, margine crispatis, apic. apyillis. Michaux. Flor. 1. p. 217. Hab. in Kentucky. Affin. C. persicarioid. Facie R. acuti. M.

16. *divaricatus*, valv. dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis obtusiusculis pubescentibus. L. Till. pis. 43. t. 37. f. 2. Hab. in Italia. ☉

17. *acutus*, valv. dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis acuminatis. Hab. in Europae succulentis. ☉

18. *obtusifolius*, valvul. dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. Hab. in pratis.

19. *pulcher*, caul. ramosissimo, valv. dentatis : subunica granifera, fol. radicalibus panduriformibus. L. Hall. helv. n^o. 1593. Till. pis. 43. t. 37. f. 2. Moris. s. 5. t. 37. f. 13. Hab. in ruderalis, ad vias. Rami floriferi recurvati.

*** Valvul. granulo destitut. s. nudis.

20. *bucephalophorus*, valvul. dentatis nudis, pedicellis planis reflexis, incrassatis. L. Col. cephr. 1. p. 141. t. 150. Hab. in Italia. ☉

21. *aquaticus*, valvulis integerrimis

nudis, fol. late cordatis glabris acutis. L. Hab. ad ripas fluviorum et paludum, passim. ☉

22. *Lunaria*, valvul. laevibus, caule arboreo, fol. subcordatis. L. Pluck. alm. 8. t. 252. f. 3. Hab. in Canariis. Panic. oppositifolia. h

23. *ambriatus*, cal. laciniato-ambriatis subplumosis, fol. cordatis, rad. tuberosa. Enc. bot. 5. p. 65. D. repandus Bosc. Hab. ad Cap. b. sp. Panic. terminalis, flor. albidis pendulis.

24. *vesicarius*, valv. omnibus maximis membranaceis reflexis, fol. indivisis. L. Moris. s. 5. t. 28. f. 7. Hab. in Africa. Valv. rubellae, venosae. ☉

25. *roseus*, valvulae fructus alterius ala maxima membranae reticulata, fol. erosis. Lin. Desf. Atl. 1. p. 320. R. fol. subcarnosis laciniato-hastatis panduriformibusque petiolatis. R. *lucernus*. Balbis Misc. bot. p. 19. Hab. in Aegypto et Barbar. arvis. ☉

26. *tingitanus*, valvul. cordatis obtusis integerrimis, fol. hastato-ovatis erosis. Moris. s. 5. t. 28. f. 8. Shaw. specim. n^o. 5. ic. Hab. in Barb. Hisp. Fol. petiolata, subseabra, basi subhastata et erosa.

27. *scutatus*, fol. cordato-hastatis, caule tereti. β. *Rumex glaucus*, flor. hermaphroditis, valvulis nudis, fol. cordato-hastatis obtusis glaucis, caule suffruticeo. Jacq. ic. rar. 1. t. 6. Collect. 1. p. 64. Hab. in Helvetia, Gallia, inter acervos lapidum.

28. *nervosus*, valv. integerrimis nudis, fol. oblongis trinerviis. Vahl. symb. 1. p. 27. Hab. in montibus Hadensib. Rami striati, articulis apice fuscis. Cal. reflexus. h

29. *digynus*, flor. digynis, fol. orbiculatis emarginatis. L. Fl. lapp. p. 132. Flor. Jacq. Collect. 2. p. 30. Moris. s. 5. t. 36. f. 1. cult. Hab. in alpinis.

30. *lanceolatus*, fol. lanceolatis reflexo-marginatis, caule angulato. Thunb. prod. p. 67. Hab. ad Cap. b. spec. †

*** LAPATHUM. Floribus declinis.

31. *alpinus*, flor. hermaphroditis sterilib. femineisque : valvul. integerrimis nudis, fol. cordatis obtusis maximis. Blackw. t. 26a. Hab. in Helv. et Galliae montosis. Fol. magnitudine Rhei. ☉

32. *spinosus*, flor. androgynis : cal.

femineas mono-thyllis reflexo - uncinatis. Nibo spinosa, Moench. meth. p. 318. Beta cretica, semine spinoso. Benth. hist. 2. p. 962. Hab. in Creta, et in subhamidis juxta Tingidem. Schousb.

33. *tuberosus*, flor. dioicis, fol. lanceolato-sagittatis; harnis patentibus, radice tuberosa. Hab. in Italia. Affinis R. Acetosae. Folia harnis postice magis hiantia et Stipulae longiores. T.

34. *multifidus*, flor. dioicis, fol. hastatis; auriculis palmatis. Boerh. mus. 2. t. 126. In alpidibus Calabriae, Hetturiae, Orientis

35. *Acetosella*, flor. dioicis, fol. omnibus petiolatis lanceolato-hastatis; auricul. integris. Flor. dan. t. 1161. (R. multifidus. Thuill. Hab. in arenosis, sylv.

36. *thyrsoides*, caul. simplicis, fol. hastatis, panic. coarctata. Desf. Atl. 1. p. 321. Hab. in Barbaria. Priori affinis. Cal. foliola colore roses.

37. *Acetosa*, flor. dioicis, caul. elongato, fol. oblongis sagittatis. L. Engl. bot. t. 127. Hab. in pascuis, sylvestricis.

38. *aculeatus*, flor. dioicis, fol. lanceolatis petiolatis, fructibus reflexis; valv. ciliatis. L. Bauh. prodr. t. 55. Hab. Creta, Hispania. Similis R. Acetosellae. Flor. femineorum interioribus valvulae ciliatae aculeis minimis. L.

39. *luzuians*, flor. dioicis, fol. cordato-hastatis, caulibus angulatis diffusis, valvulis exterioribus subulatis, interioribus orbiculatis. Lin. suppl. p. 212. Boerh. mus. 165. t. 126. Hab. in alp. Bonosiensibus. Radix tuberosa. T.

40. *arifolius*, flor. dioicis, fol. omnibus petiolatis hastatis, auriculis simplicibus divaricatis, caule erecto. Ait. Kew. 1. p. 487. Lin. suppl. p. 212. R. abyssinicus. Jaeg. hort. 3. p. 48. t. 98. Hab. in Abyssinia. T.

41. *bipinnatus*, flor. dioicis, fol. bipinnatis. Lin. suppl. p. 211. Hab. in Marocco. Flor. androgyni. Valv. cordatae nudae, margine venis sanguineis pictae. Schousb. Maroc. ed. germ. p. 170.

37. FLAGELLARIA. Cal. 5-partitus. Cor. o. Bacca 3-1-sperma.

1. *indica*. Lin. Lam. ill. t. 266. Rumph. 5. t. 59. f. 2. Rhced. 5. t. 53. Hab. in India et Guines. Humanum altitudinem superans. Fol. terminata cirrho.

878. SCHEUCHZERIA. Cor. 6-partita. Cal. o. Antherae lineares. Stigm. sessilia, lat-ralia. Caps. inflata, distinctae, subdisperm.

1. *palustris*. L. Fl. lepp. t. 10. f. 1. Lam. ill. gen. t. 268. Flor. dan. t. 76. Hab. in paludosis, etiam in Canada.

879. TRIGLOCHIN. Cal. 3-phyllus. Petala 3, calyciformia. (Cal. 6-phyllus, foliolis 3-superioribus cum inferioribus alternantibus. Cor. o. Roth.) Stylus o. Caps. basi dehiscens.

1. *palustre*, capsulis trilocularibus lacubus linearibus basi attenuatis. Willd. p. 264. Flor. dan. t. 490. Hab. in uliginosis. ♂

2. *bulbosum*, radice bulbosa fibris oblecta. L. Jaeg. ic. rar. 2. t. 454. Hab. ad Cap. b. spel. Tr. palustris simile. Styli protracti et patentes, qui in T. palustri recti et obsoleti. L.

3. *striatum*, caps. subrotundis trigonis trilocularibus, scapo nudo striato, spic. simplici coarctata. Flor. Peruv. l. c. Hab. in Peruv. laenibus et inundatis. Rad. fusiformis, scapes plures protrudens.

4. *ciliatum*, caps. ovatis trigonis trilocularibus, culm. apice contorto, spica composita. Flor. Peruv. 3. p. 72. Hab. in Peruv. collib. frigidis. Flor. bract. 2, ovatis, ciliatis stipati.

5. *triandrum*, fol. subsetosis scapum subaequantibus, flor. trifidis triandris, caps. trigono-subrotundis. Mich. Flor. t. p. 203. Hab. in inundatis in Amer. boreali.

6. *maritimum*, capsulis sexloenaribus ovatis. L. Flor. dan. t. 306. Roth. germ. II. p. 418. Hab. in maritimis, et pascuis, etiam in America.

88c. WURMBEA. Cal. o. Cor. infera, 6-partita: tubo hexagulo. Filam. fandi inserta. Styli subconniventes. Caps. oblonga, 3-quetra. S m. rotunda.

1. *capensis*. Thunb. Diss. bot. 1. p. Andrew. t. 221. Lam. ill. t. 270. Melant. Wurmbea Thunb. prodr. Hab. in collib. arenosis Cap. b. spel. Fol. lanceolata, cucullata.

Obs. Dantur nonnullae hujus plantae vacietates ab Thunbergio ut tales fixae, quas Willdenowius Sp. pl. II. p. 263. tanquam distinctas species exhibuit.

881. **MELANTHIUM**. Polygamum.

Cal. o. *Cor.* rotata, 6-partita: laciniis basi biglandulosis. *Filam.* ex elongatis unguibus cor. *Caps.* subovata (tricocca), apice subtrifida, 3-locularis. *Sem.* plura, alato-membranacea. (Fol. elongata, debilia.)

1. *virginicum*, flor. paniculatis, petalis ovalibus. Michaux. Floc. 2. p. 251. Willd. Sp. II. p. 266. Hab. in Amer. boreal. humidis. Pauc. pyramidalis. Floc. albidolivid.

2. *racemosum*, panic. racemoso-oblonga, petal. obiculatis. Michaux. Hab. in altis montib. Carol. septentrion. Floc. obsolete pallidi. Priore minus altum. An M. *laetum*. Ait. Kew. 1. p. 419. Willd. p. 267.

3. *sibiricum*, flor. paniculatis, petalis sessilibus acutis, fol. lineacibus. Willd. p. 267. Hab. in Sibiria. \mathcal{T}

4. *capense*, floc. racemosis, petalis punctatis, fol. lanceolatis cucullatis. Willd. Hab. ad Cap. b. spei. \mathcal{T}

5. *triquetrum*, fol. triquetris glabris caule longiocularibus, floc. spicatis. Lin. suppl. 213. Thunb. prod. 67. Cum picioce.

6. *ciliatum*, petalis unguiculatis, fol. basi cucullatis: ensiformibus cartilagineo-ciliatis, flor. spicatis. Lin. suppl. 213.

7. *juncum*, fol. lineari-subulatis, superioribus basi dilatatis, spica flexuosa, petalis unguiculatis. Willd. p. 268. Jacq. ic. cac. 2. t. 451. Collect. suppl. p. 105. Ad Cap. b. spei. \mathcal{T}

8. *secundum*, fol. lineacibus, spica secunda, petalis unguiculatis. Willd. Enc. bot. 4. p. 29. t. 289. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

9. *phalangioides*, fol. linearibus canaliculatis, caccmo multidoro, pedunculis flore longioribus, petalis sessilibus. Willd. Enc. 4. p. 26. Anthiericum sulcatigynum. Jacq. ic. rac. 2. t. 419. Collect. 3. p. 273. Hab. in Carolina. \mathcal{T}

10. *indicum*, petalis lineari-lanceolatis, fol. lineacibus. L. Hab. in Tanquib. Radix

bullosa. Statura Ornith. lutei. Flor. atcompurpicei. Petala augusta. Fol. angustolineacea.

11. *viride*, fol. ovato-lanceolatis vaginantibus, coc. reflexis. Thunb. prod. 67. Andrew. t. 213. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. viridipurpurea.

12. *uniflorum*, fol. lineari-lanceolatis caule subuniifoco longiocularibus, petalis lanceolatis subunguiculatis. Willd. Jacq. ic. cac. 2. t. 450. Collect. 4. p. 100. Ad Cap. b. spei. \mathcal{T}

13. *eucomoides*, fol. oblongo-lanceolatis cucullatis, caule trifido, petalis subhastatis unguiculatis. Willd. Jacq. ic. rac. 2. t. 452. Collect. suppl. 104. Ad Cap. b. spei. \mathcal{T}

14. *pumilum*, ol. lanceolatis basi barbatis, caule subtrifido, petalis sessilibus. Willd. p. 270. Focst. in Comm. goeti. 9. p. 30. t. 6. Hab. in Tierra del Fuego. Caul. cespitosus. Cor. alba, inflexo-cucullata.

15. *gramineum*, acaule, fol. imbricatis gramineis, floc. sessilibus. Cav. ic. 6. p. 64. t. 587. f. 1. Hab. cum sequente prope Moyadoc. Broussoneti Pet. nervosa.

16. *punctatum*, acaule, fol. imbricatis carinatis lanceolato-acuminatis, floc. sessilibus punctatis. Cav. l. c. t. 588.

882. **VERATRUM**. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala, eglandulosa. *Caps.* 3, polyspermae. In flor. masc. Pistilli rudimentum.

1. *nigrum*, fol. ovalibus plicatis, caccmo composito, cor. patentibus, bract. linearibus. Jacq. Flor. t. 336. Moris. 2. 12. t. 4. f. 1. Hab. in Sibir. et Hungar. apricis siccis.

2. *album*, fol. ovalibus plicatis, racemo superacocomposito, corol. erectis, bract. lanceolatis. Lin. Jacq. Floc. austr. 4. f. 335. Flor. dan. t. 1220. Habit. in Europae et Amer. borealis montosis ad rivulos. \mathcal{T}

3. *parviflorum*, fol. subovatis lanceolatisque planis glabris, panic. caulis filiformibus, coc. stellatis: laciniis ovali-lanceolatis acutis. Michaux. Floc. 2. p. 250. Hab. in Carol. montibus altis. Coc. viridis Intermedium inter hoc et autecedens genus. M.

4. *lateum*, racem. simplicissimo, fol. sessilibus. Lin. Reich. syst. 4. p. 297. Hab. in Virginia, Canada. Fol. angusta, lanceolata. Rad. bulbosa, +

583. **ZIGADENUS**. *Cor.* hexaphyllus, pateus: laciniis supra basin angustatam biglandulos. *Stam.* ad contactum ovarii inserta. *Styl.* 3, contigni. *Caps.* membranacea, 3-locularis. *Sem.* plurima, aptera.

1. *glaberrimus*, fol. linear-lanceolatis angustis recurvis longis. Michaux. 1. p. 214. t. 22. Hab. in Carol. infer. herbosis, humidis. Caul. subpeltatis. Flor. Veratri albi.

Obs. Stamina situ et cor. figura Vetrato affine, et glandulis Melanthio, sed fructu brachymis discrepat ab utroque hocce genus. M.

584. **MEDEOLA**. *Cal.* o. *Cor.* 6-partita, revoluta. *Bacca* 3-sperma.

1. *virginica*, caul. lanuginoso, fol. verticillatis, ramis inermibus. L. Michaux. 1. p. 214. Pluck alm. 401. t. 328. f. 4. Hab. in Virginia. Fol. in apice caul. 3.

2. *asparagoides*, fol. alternis ovatis, basi subcordatis obliquis. Ait. Kew. 1. p. 489. Dracaena medeoloides. Lin. suppl. p. 203. Hab. in Aethiopia. An bujus generis? Fol. alterna pinuata. Flor. penduli e pedicello unifloro.

3. *angustifolia*, fol. alternis ovato-lanceolatis. Ait. Kew. p. 490. Till. pis. 17. t. 12. f. 2. Hab. ad Cap. b. spec. E.

585. **TRILLIUM**. *Cal.* patens, 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 3-locularis.

1. *cernuum*, fol. ovalibus, basi angustatis, flor. pedunculato cernuo. L. Michaux. Flor. 1. p. 216. Willd. Sp. II. p. 216. Hab. in Carol. Styl. distinctus.

2. *erythrocarpum*, foliis subcordatis abrupte subpetiolatis, flor. erectiusculo, lacinis oblongis. Michaux. p. 216. In Carol. septentrion. montib. et in Canada. Bacc. coccinea.

3. *rhomboides*, fol. lato rhomboides, pedunc. inclinato. Michaux. Flor. 1. p. 213. *F. erectum*, flor. pedunculato erecto. Lin. Flore atropurpureo. *β. album*, flor. minore albo. *γ. grandiflorum*, flor. amplissimo exalbido. Hab. in Carol. montib. excelis.

4. *pusillum*, fol. ovali oblongis obtusis

sessilibus, pedunci erecto, petal. interioribus sublongioribus. Hab. in Carol. infer. Petala carnea.

5. *sessile*, fol. lato-ovalibus, flore sessili erecto. L. Catesb. cat. 1. p. 50. t. 50. Hab. in Virgin. Carol. Baec. globoso-depressa.

586. **COLCHICUM**. *Spatha*. *Cor.* 6-partita: tubo radicato. *Anth.* incumbentes. *Caps.* 3, connexae, inflatae.

1. *autumnale*, fol. planis lanceolatis erectis, petal. ovatis. Engl. bot. t. 153. Willd. p. 873. *β. C. vernum*, petalis foliisque angustioribus, simul crescentibus. Hab. in pratis humidioribus. Flor. autumnale et fol. una cum fructu vere proferri, excepta var. *β*, quae rara.

2. *montanum*, fol. linearibus patentissimis, petal. linear-lanceolatis. Allion pedem. 1. t. 74. f. 2. Fol. una cum florib. autumnale erumpunt. L.

3. *variegatum*, fol. undulatis patentibus, petal. ovato-lanceolatis variegatis. Hab. in Oriente. Petal. maculata sere ut in Fr. Meleagride.

587. **MERENDERA**. *Spatha*. *Cor.* campanulata, 6-partita. *Anth.* rectae, sagittatae. *Caps.* 3, basi connexae, latere interiore debiscentes.

1. *Bulboodium*. Ramond in Bull. Soc. philom. n. 47. t. 12. f. 4. Les Liliacées. t. 26. Bulboodium vernum. Desf. Alt. Hab. in Pyrenaeis et in Barbaria.

Obs. Medium tenet inter antecedenti et Bulboodium genus et quoad antheras Croco affinis est.

588. **HELONIAS**. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Styli* 3, distincti. *Caps.* 3-locularis, 3-cornis, oligosperma.

1. *latifolia*, fol. lanceolatis acuminatis, scapo subaphyllo, spica flor. brevissime pedicellatis confertis. Michaux. Flor. 1. p. 219. H. bullata. Lin. Willd. p. 213. Les Liliacées. t. 13. Mill. ic. t. 272. (male). Hab. in Pennsylvania et Marylandiae paludosis. Spica purpurascens Distortae, fol. Orchidis.

Obs. Nomen *bullata* ex aliena Plucknetii phrasi deduxerat Linnaeus. M. l. c.

2. *angustifolia*, fol. angustissimis, scapo inferne folioso, spica laxiuscula, sem. linearibus. Michaux. l. c. Hab. in herbos. et fruticetis Carol. inferioris. Flor. exalbid. Caps. oblongiuscula. Fol. longissima. M.

3. *erythrosperma*, fol. lineari-longissimis, scapo folioso, caps. abbreviata, seminibus ovatis. Michaux. Hab. in umbrosis rivul. Carol. inferioris. Flor. virescentes. Sem. arillata?

4? *dubia*, fol. angustissimis gramineis, scapo nudo, spica gracili, flor. parvis sessilibus. Michaux. p. 213. Hab. in Georg. et Florid. sabulosis.

5? *pumila*, fol. lanceolatis enerviis. Jacq. ic. rar. 3. 1. 451. Coll. 2. p. 260. Hab. in Carol. Caul. foliosus. Spic. capitata. Germ. inferum. Willd.

890. XEROPHYLLUM. Cor. rotata. *Filam.* basi contigua. *Stigm.* 3, revoluta, basi subconnata. *Caps.* subglobosa, apice triplici rimâ dehiscens, 3-locularis 2-sperma.

1. *setifolium*, fol. subulsto-setaceis. Michaux. l. c. p. 210. Helon. Asphodeloides. L. Pluck. mant. t. 342. f. 3. Hab. in Pennsylvania. Fol. arida, subgraminea. Spic. racemiformis. M.

890. TOFIELDIA. Cal. trifidus. *Petala* 6. *Caps.* superæ, tres, basi conjunctæ, polyspermæ.

1. *palustris*, scapo foliolo oblecto petal. lineari-obovatis. T. palustris. Huds. Smith. brit. t. p. 307. Engl. bot. t. 536. Heloneas borealis. Willd. II. p. 274. Heritiera anthericoides, var. *ramosa*. Com. de Sternberg, in Bot. Zeitung. 1. p. 83. c. ic. Erlang. 1802. 2? *borealis*, scapo toto? nudo. Anthericum calyculatum. Lin. Hab. in tur- fosis alpinis.

Obs. An genuinum Anth. calyculatum. Lin. diversum est? A nonnullis hæc species male cum Narthecio conjungitur.

2. *pubescens*, spica oblonga interrupta, petal. lanceolatis acutis. Narthecium. Michaux. Flor. 1. p. 209. Anth. calycul. Gronov. Hab. in Carol. inferiore. Caps. subglobosa.

3. *pusilla*, tota glabra, spica conglobata bracteata. Narthec. Michaux. l. c. Cresc.

ad lacus Mistassius. Fol. brevissima. Scap. filiformis.

4. *falcata*, fol. falcatis striatis distichis, flor. racemoso-spicatis. Iridogalvia falcata. Flor. Peruv. 3. p. 68. t. 302. Hab. in Andium montib. altis. Scap. squam. ovatis oblectus. Cor. albidopurpurea.

5? *glutinosa*, scapo glutinosa-stabro, spica fasciculis paucis alternantibus. Michaux. p. 210. Cresc. a Quebec usque ad lacum Mistassius. Habitu Anth. ossifragi. Caps. ovoidea. M.

891. NOLINEA. Cor. 6-partita, patens. *Stylus* brevissimus. *Caps.* 3-gona, membranacea, 3-locularis, dissepimentis bipartilibus debiscens. *Sem.* solitaria, hinc convexo-incurva.

1. *georgiana*. Michaux. Flor. 1. p. 208. Hab. in Georgia. Fol. unilique versa, coriaceo-graminea. Scap. racemiflorus, ramosus, flor. parvulis albis.

Obs. Genus hinc Phalangio, inde Heloniæ affine est. M.

892. SABAL. Flor. hermaphroditi. *Spathæ* partiales. *Filam.* libera, basi incrassata. *Bacca* (Drupa?) 1-3-sperma (per abortum). *Semen* osseum. *Embryo* lateralis.

1. *minor* s. *Adansoni*. Guernsent observat. sur le sabal d'Adanson in Bull. de la soc. Philom. n° 67. t. 25. Corypha minor. Jacq. hort. vind. 3. p. 8. t. 8. Chamerops aculis. Michaux. Flor. 1. p. 207. Hab. in Amer. boreali. Frond. palmatæ flabelliformes. Stipes inermis.

893. CHAMÆROPS. Polygama. *Spatha* compressa. *Spadix* ramosus. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala. *Filam.* submonodelpha. *Drupæ* 3, monospermæ. Flor. masculi divici? (Ovarium 3-loculare, locul. 1-perinis, 2-abortantibus. Michaux.)

1. *Palmetto*, caul. arboresc., stipitib. inermib. Michaux. Flor. 1. p. 206. Corypha Palmetto. Walt. Hab. in Amer. borealis maritimis.

2. *serrulata*, caul. repente, stipitibus (minutim) aculeato-serrulatis, drupis ovoideis. Michaux. l. c. Cum priore.

3. *humilis*, acaulis, frond. palmatis plicatis, stipitib. spinosis. Lin. Desf. Atl. 2. p. 436. Phoenix humilis. Cav. ic. 2. p. t. 115. Hab. in Hispania et in Barbaria. Filam. basi in urceolum coalita. Radices et pars inferior caud. juniorum sub terra recondita comeditur. Dioica?

β. *arborescens*, candice 14-16-pedali, quae in Hort. patiens colitur, com haec species in loco natali nullum caslem protrudit.

4? *excelsa*, frond. palmatis nervosis serratis, stipit. incrimibus. Thunb. jap. p. 130. Rhaps. flabelliformis. Ait. Kew. 1. p. 473. L'Her. stirp. 2. t. 100. Hab. in Japonia. Stylus 1. An Corypha?

894. HYDROGETON. *Scapus* radicalis. *Cor.* 3-petala. *Filam.* basi dilatata. *Pis illa* 3, simplicia. *Caps.* 3, membranaceae, 2-spermae. *Semina* parieti caps. adnata.

1. *fenestralis*. Fol. lineari-elliptica, obtusa, perforata. Rad. magna, edulis. Nomen vernaculum *Ouvirandra* (Mirbel. Hist. natur. d. plaut. v. 4. p. 117.) i. e. radix edulis, haec tuberosa est et aquatica. Sequenti generi affine. Hab. io Madagascariae aquosis. (Ex. observ. D. Dupeit-Thouars.)

895. APONOGETON. *Amentum* e squamis compositum. *Cal.* o. *Cor.* o. *Capsulae* 4, trispermæ. (Stam. passim 7 et 12.)

1. *monostachyon*, spica simplici, fol. cordato-ovalibus. Lin. suppl. 214. Thunb. diss. Nov. Pl. gen. 4. p. 74. c. ic. Willd. Spec. II. p. 927. Spathium. Lour. Conch. 1. p. 173.

β. *lineare*, spica simplici, fol. linearibus. Vahl symb. 3. p. 51. Hab. in Indiae orient. inundatis, inter Oryzam. Radix bulbosa. Fol. radicalia ostantia.

2. *crispum*, spica simplici, fol. ensiformibus crispis. Thunb. Diss. Nov. Pl. gen. p. 73. Radix fibrillosa.

3. *distachyon*, spica bifida, fol. lineari-oblongis natis, bracteis integris, flor. polyandris. Ait. Kew. 1. p. 415. Thunb. Hab. in rivulis Cap. h. spec. Radix bulbosa. Stam. 6-12. Bulbi assati eduntur.

4. *angustifolium*, spica bifida, foliis lineari-lanceolatis crectis, bracteis bipar-

titis, flor. hexandris. Hab. ad Cap. h. spec. Bract. albæ basi rubrae.

HEXAGYNIA.

896. WENDLANDIA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-petala, succulenta. *Styl.* reclinatus. *Caps.* 6, uniloculares, monospermae.

1. *populifolia*. Willd. Sp. II. p. 275. Wendl. Hort. Herrenh. Fasc. 3. t. 16. Hab. in Carolina. Caesalpinia smilacea. Angl. Fol. alterna cordato-ovata, pendula integerrima. Racemi simplices supra axillares. Flor. parvi albi. Willd. h

897. OTTELIA. *Spatha* 1-phylla, 5-alata. *Cal.* superus, 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 10-locularis, polysperma.

1. *alismoides*. Damasocolum indicum. Willd. p. 276. Stratiotes alismoides, fol. cor. latis. L. Rheed. 11. t. 46. Hab. in aquis Ind. orientalis. Scap. uniflorus.

898. DAMASONIUM. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Styli* 6. *Caps.* (Nuces?) acuminatae, 1-3-spermae, stellatim patentes.

1. *stellatum*. Dalech. hist. Juss. gen. pl. Alisma. L. Willd. p. 277. n. 4. Curt. Lond. t. 28. Habit in foveis et stagnis passim.

POLYGYNIA.

899. ALISMA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Caps.* plures, monospermae.

1. *Plantago*, fol. ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. L. Flor. dan. t. 361. β. *angustifolia*, fol. lanceolatis. Hab. in aquosis. T

2. *flava*, fol. ovatis acutis, pedunculis umbellatis, fructib. globois. L. Hab. in America meridionali. T

3. *sagittifolia*, fol. sagittatis, fructib. obovatis obtusis. Willd. Sp. II. p. 277. Hab. in Guinea. T

4. *cordifolia*, fol. cordatis obtusis, flor. dioecandris, seminibus uncinato-mariatis. L. Sp. pl. 487. Swartz obs. 139. Moris. s. 15. t. 4. f. 6. Plum. spec. 7. ic. 234. f. 2. Hab. in Amer. australi et septentrionali. T

5. *parva*, *angustifolia*,

5. *parnassifolia*, fol. cordatis subrotundis acutis, capsulis aristatis. Hab. in paludibus. $\bar{\eta}$

6. *repens*, caul. subrepentibus adscendentibus, ad nodos inferiores ralicosis et foliosis, fol. lanceolatis petiolatis, verticillis simplicibus. Lam. enc. 2. p. 515. Cav. ic. 1. p. 41. t. 55. Hab. in humidis Hispaniae et Barbariae.

7. *nataans*, fol. ellipticis obtusis, pedunc. solitariis. L. Vaill. act. act. 1719. p. 29. t. 4. f. 8.

8. *ranunculoides*, fol. lineari-lanceolatis, fructib. globoso-squarrosis, 5-gonis. Flor. dan. t. 222. Engl. bot. t. 316. Hab. in paludosis, fossis. $\bar{\eta}$

9. *subulata*, fol. subulatis. L. Hab. in Virginia.

M O N O G Y N I A.

Guettarda quaedam species. Genipa. Schradera. Tectonia grandis. Amyrus zeylanica. Limonia trifoliata. Lythrum linifera, Parsonsia, Hyscopifolia. Cessia glandulosa. Trientatis europaea. Polygona quaedam. Lauri nonnullae species. Dodonaea viscosa. Bocconia frutescens. Mimosa hexandra. Chlora imperfoliata, J. Gaura tripetala.

D I G Y N I A.

Swertia difformis. Velezia rigida. Leersia hexandra.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

900. **TRIENTALIS.** *Cal.* 7-phyl-
lus. *Cor.* 7-partita, æqualis,
plana. *Bacca* exsucca. (Stam. 5,
6 et 7.)

1. *europæa*, fol. ovato-lanceolatis in-
tegrissimis. Flor. dan. t. 86. Engl. bot. t. 15.
2. *americana*, fol. angusto-lanceolatis.
Michaux. 1. p. 220. Hab. in sylvis et juni-
peretis. \mathfrak{f}

901. **DISANDRA.** *Cal.* subseptem-
partitus. *Cor.* rotata, septem-
partita. *Cal.* 2-locularis, po-
lyperma.

1. *prostrata*, prostrata. Lin. suppl. 214.
Sibthorpia peregrina, fol. reniformibus
crenatis, pedunc. geminis. L. Sp. pl. 2.
p. 880. Lam. ill. t. 275. 2. *africana*,
fol. orbiculatis integris crenatis, pedunc.
solitariis. \mathfrak{f} . Hab. in Oriente et insula
Madera. \mathfrak{f}

902. **PISONIA.** *Cal.* campanulatus
quinquefidus. *Cor.* 6. *Bacca* 1-
locularis monosperma.

* *Aculeatae.*

1. *aculeata*, spinis axillaribus horizon-
talibus, fol. ovalis utrinque attenuatis,
corymbis axillaribus. Willd. Sp. p. 283.
Lam. ill. t. 861. Pluck. alm. 318. t. 108.
f. 2. Sloan. hist. 2. p. 25. t. 167. Hab.
in Amer. meridionali. \mathfrak{f}

2. *villosa*, spinosa, fol. ovato-obtusis,
pedunc. sublivaricatis villosis. Poir. in Enc.
bot. 5. p. 347. Hab. in Ind. occid. Sonner.
Flor. racemosa.

* * *Inermes.*

3. *subcordata*, fol. cordato-subrotun-
dis, fruct. siccis subclavatis pentagonis,
angulis apice muricatis. Swartz. prod. 60.
Fl. ind. occid. 2. p. 641. Hab. in Antigua. \mathfrak{f}

4. *nigricans*, fol. ovatis acuminatis,
flor. cymosis erectis, fructibus bacatis.
P. inermis. H. Hab. in Jamaicae, Hispani-
olac sylvestribus. \mathfrak{f}

5. *coccinea*, fol. lanceolato-ovatis;
pedunc. terminalibus laxis, flor. nutan-
tibus, fruct. bacatis. Swartz. prod. 60.
l. c. 2. p. 945. Hab. in fruticibus Hispani-
olac. \mathfrak{f}

6. *mitis*, fol. ovatis, flor. axillaribus.
Willd. p. 284. Hab. in India orientali. \mathfrak{f}

903. **TOVARIA.** *Cal.* 7-phyllus,
Cor. 7-petala. *Discus* planus,
7-gonus, stellæformis, cui *Stam.*
inserta. *Stigm.* peltatum. *Bacca*
1-locularis, pulposa. *Sem.* com-
pressa. (Numerus partium passim
octonarius.)

1. *pendula*, fol. ternatis, racem. lon-
gissimis, flor. secundis. Flor. Per. 3. p. 73.
t. 306. Hab. in Peruviae runcationib. et
fluviumque ripis. \mathfrak{f}

904. **PETIVERIA.** *Cal.* tetra-
phyllus. *Cor.* 6. *Stylus* lateralis.
Stigma penicilliforme. *Sem.* 1;
aristis quatuor reflexis apice in-
structum. (Stam. 6-8.)

1. *alliacea*, flor. hexandris. L. Trem.
Ehr. 33. t. 67. P. fol. oblongo-ovatis, spicis
longis terminalibus. Brown. jam. 274.

♂. *octandra*. Jacq. amer. 201. Plum. gen. 50. ic. 219. Hab. in Jamaic. nemorosis aridis. h

905. *PANCOVIA*. *Cal.* campanulatus, 4-partitus. *Pet.* 5, unguiculata, plicato-crispa, dentata, cucullata. *Stam.* adscendentia; calyce longiora.

1. *bijuga*. Willd. Sp. II. p. 285. Hab. in Guinea. Arb. ramulis ferrugineo-pubescentibus. Fol. alterna, pari-pinnata. Racemi interfoliacei multiflori. W. h

906. *ÆSCULUS*. *Cal.* 1-phyllus, ventricosus. *Cor.* 4. s. 5-petala, inaequalis, pubescens, calyci inserta. *Caps.* 3-locularis. *Sem.* magna castaneiformia.

* *Capsulis echinatis, cor. 5-petala planiuscula.*

1. *Hippocastanum*, fol. digitatis septenis, cor. pentapetalis patulis. Willd. Sp. p. 285. ♀. *inermis*, fruct. nudiusculo, fol. variegatis. Enc. bot. 3. p. 212. Hab. sponte in Asia septentrionaliore. Flor. polygami. h

** *PAVIA*, cor. 4-petala, connivente, caps. laevibus.

2. *Pavia* (rubra), fol. quinis glabris petalis obovatis, unguibus longitudine calycis. Ait. Kew. 1. t. 494. *Pavia*. Boerh. Lugdb. 2. p. 260. t. 260. Trew. chret. *Pavia* rubra. Enc. bot. 5. p. 94. Hab. in Carol., Florida, Brasilia. h

3. *lutea*, fol. quinatis subtus ad costam pubescentibus aequaliter serrulatis, corollis tetrapetalis, petalor. unguibus calyce longioribus. Willd. p. 285. (Ac. flava.) Ac. *lutea*. Wangerh. Act. voc. Berol. 8. p. 133. t. 6. Hab. in Carolinae montib. excelsis. In solo pingui ad altitudinem Ac. Hippocastani assurgit. Michaux.

4. *macrostachys*, humilis, foliol. quinis subtus subtomentosis, spica tenui longissima. Michaux. Flor. 1. p. 220. Ac. parviflora. Walt. Ac. nana. H. P. Hab. ad ripas Amm. Savannah. 3-4-petalis. Flor. albi, plerumque heptandri. Arbuse. stolonifera. M.

907. *PETROCARYA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 14, quorum 7-terilia. *Drupa* carnosa, cribrata. *Nux* bilocularis, loculis monospermis.

1. *montana*, foliis ovatis acumiuatis.

Willd. p. 287. *Parinari montana* magno fructu. Aubl. guj. 1. p. 514. t. 203, 205. Hab. in sylvis interioris Gujanac. h

2. *campestris*, fol. corollis acuminatis. Willd. *Parinari fructu parvo*. Aubl. p. 517. t. 206. Hab. in sylvis Gujanac. h

908. *IONESIA*. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* infundibuliformis, tubo clauso carnoso, limbo 4-fido. *Nectar.* annulus faucis tubi corollae insertus, staminiferus. *Legumen.*

1. *pinnata*. Roxb. Asiat. Researches. 4. p. 355. Rheed. 5. t. 59. Habit. in India orientali. Arb. medioeris. Flor. aurantii cyrui. Legum. acinaciforme. h

DIGYNIA.

909. *LIMEUM*. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, aequalia. *Caps.* globosa, 2-locularis.

1. *africanum*, fol. oblongis petiolatis. Lin. suppl. 214. Hab. ad Cap. b. spci, cum 2 sequentibus. *Statura* Corrigiolae s. Telephii. E

2. *capense*, fol. ovatis sessilib. Thunb. prod. p. 68. L. aphyllum. Lin. suppl. 214.

3. *aethiopicum*, fol. linearilanceolatis. Thunb. prod. 68.

TETRAGYNIA.

910. *ASTRANTHUS*. *Cal.* o. *Cor.* hypocrateriformis, limbo 14-fido. *Sem.* 1, parvum, superum.

1. *cochinchinensis*. Lourc. cochin. 1. p. 274. Willd. Sp. II. p. 291. Hab. in Cochinchina. Arbor. ramis paucis adscendentibus. Fol. ovata serrata lanuginosa alternata. Spicae longae simplices axillares. L.

911. *SAURURUS*. *Cal.* amentum squamis 1-floris. *Cor.* o. *Germ.* 4. *Bacca* 4, 2-spermae.

1. *cernuus*, caule folioso polystachio. L. Jam. ill. 1. 1. Mathuslea. Gm. syst. p. 589. Pluck. alm. 343. t. 117. f. 3. 4. Hab. in Virginia. Stamina vix numerantur, nisi deflorato omento persistentia. L.

HEPTAGYNIA.

912. *SEPTIAS*. *Cal.* 7-partitus, C c 2

Petala 7. *Germina* 7. *Caps.* 7, polyspermæ.

1. *capensis*. L. Andrew. t. 90. Lam. ill. t. 276. *Crassula Sepias*, fol. connatis crenatis subrotundis, caule subaphyllo umbellifero. Thunb. prod. 57. Hab. ad Cap. b. spei. Rad. tuberosa.

913. **ACTINOPHYLLUM.** *Cal.* margo integer. *Cor.* calyptræformis, desiliens. *Bacca* 7-angularis, 7-locularis. *Sem.* solitaria subovata. (Flor. conglomerati. Styl. 5-7. Stam. etiam 5, 6, 8, 9.)

1. *angulatum*, arborescens, foliosis 7-11-nis, cor. obovatis angulatis truncatis. Flor. Per. 3. p. 73. t. 307. Hab. in Peruviae collib. nemoros. Arb. spectabilis.

2. *pedicellatum*, scandens, foliol. 9-13-nis, racemis septenis, flor. pedicellatis umbellatis, cor. hemisphaericis. Flor. Per. l. c. t. 308. In Peruviae nemorib. ad Munna tractus. Gummi crystallinum uti ex priore exsudat, h

3. *conicum*, scandens, foliol. 7-13-nis, racem. ternis binisque, corol. conicis. Flor. Peruv. p. 75. t. 309. In Peruv. nemoribus. *Bacca* globose, hyacinthina.

4. *acuminatum*, scandens, foliol. 7-11-nis, racem. 2-5-nis, corol. acuminatis acumine obliquo. Flor. Peruv. t. 310. Cum priore. Frut. scandens. Recept. flor. favosum.

5. *pentandrum*, erectum, foliol. 7-11-nis, racemis solitariis ternisque, corol. conicis obtusis. Flor. Per. p. 73. t. 311. *Bacca* 5-gona, albicans.

914. **GILBERTIA.** *Cal.* 7-dentatus. *Cor.* 7-petalus. *Stigm.* patentia, ovata. *Caps.* loculamenta, 1-sperma, in stellæ formam disposita. *Sem.* oblonga. (Numerus partium interdum 8-9-narius.)

1. *umbellata*, fol. oblongis obsolete denticulatis. Flor. Peruv. 3. p. 75. t. 312. Hab. in Peruviae nemorib. Munna. Arb. 3-ulmaris. *Caps.* et cortex parum aromatica. *Fo-lyscius* Forst. valde affine genus. l. c.

MONOGYNIA.

Cassia. *Pelargonium.* *Dracontium.* *Calla.* *Houttuynia*, secundum Willdenow.

DIGYNIA.

Polygonum orientale et alia. *Aponogeton.* Lin.

HEPTAGYNIA.

Phytolacca sticta,

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

915. *TROPEOLUM*. *Cal.* 1-phyl-
lus, 5-fidus, calcaratus. *Petal.* 5,
inæqualia. *Nuc.* coriacea, sulcata.
Sem. 1, subrotunda.

1. *minus*, fol. peltatis subrepandis mu-
cronatis, petalis acuminato-secaceis. L.
Willd. Sp. II. p. 298. Curt. mag. t. 68.
Hab. in Peru. Var. flor. pleno, quæ
perennat. ☉

2. *majus*, fol. peltatis, repandis, petalis
obtusis. E. Peru in Europam venit 1684.

3. *hybridum*, fol. subpeltatis, quinclo-
bis integerrimis, petalis variantibus. L.
Mant. p. 64. Berg. act. holm. 1764. p. 32.
t. 1.

Obs. A præcelsente orta Holmiæ se-
mine varius, sed ramis propaganda planta.
Fol. latius cuneata, nutantia, margine
omni ascendente, hinc fere cucullata. L.

4. *peruvianum*, fol. peltatis palmato-
quinclobis basi excavatis, petal. inferiori-
bus ciliatis, superioribus incisus maximis.
Flor. Peruv. 3. p. 75. Jacq. Schœnbr. 1.
p. 51. t. 68. Hab. in Peru ubi ornamenti
gratia colitur. Fol. in Peruvia non den-
tata. L. c. ☉

5. *bicolorum*, fol. peltatis septemlobis
basi transversim truncatis, petal. inciso-
ciliatis. Flor. Per. l. c. t. 313. Hab. in An-
dium nemorib. humidis. Petal. 2-superiora
lutea minora, 3-inferiora coccinea pun-
nices.

6. *dipetalum*, fol. subpeltatis sexlobis,
cor. dipetala, petal. spatulatis crenulatis.

Flor. Per. 3. p. 77. t. 313. In Andium mon-
tibus. Succosum, subglaucom. ☉

7. *tuberosum*, fol. peltatis quinclobis
basi transversim truncatis, petal. dentatis
cal. fere longitudine. Flor. Per. t. 314. Co-
piose in Peruviae præruptis. Incolæ ra-
dices, tuberoso-pendulas, coctas quotidie
comedunt.

8. *ciliatum*, fol. peltatis palmatis sex-
lobis, supul. bracteolisque ciliatis, petal.
integerrimis cal. subæquantibus. Flor. Per.
p. 77. Hab. in R. chilensis sylvis. Caul. fili-
formis, nitidus, ramosissimus.

9. *pentaphyllum*, fol. digitato-quinatis,
foliol. ovalibus integris subpetiolatis, petal.
omnibus sessilibus brevibus acutis integerrimis.
Lam. enc. t. p. 605. Ejusd. ill. t. 277.
f. 2. Hab. ad Monte-Video. Pet. cal. bre-
viora.

10. *polyphyllum*, caul. prostrato, petiol.
elongatis alternis polyphyllis (fol. digitato
5-phyllis). Cav. ic. 4. p. 65. t. 365. Hab.
in chilensi Monte-Cordillera. Foliola in
orbem expansa: majora dentata. Pet. cal.
longiora. ☉

916. *MAGALLANA*. *Cal.* 3-par-
titus, calcaratus. *Petala* 5, inæ-
qualia. *Fruct.* trialatus, mono-
spermus (per abortum). *Sem.*
oblongum. (*Filam.* basi breviter
coalita.)

1. *porifolia*, caul. herbaceo scandente,
fol. alternis trifidis, flor. axillaribus. Cav.
ic. 4. p. 51. t. 374. Hab. in Amer. meri-
dionali. Flor. lutei. Hoc genus navigatori
celeberrimo Ferd. Magallano consecra-
tum est.

917. *OSBECKIA*. *Cal.* 4-fidus: lobis squama ciliari interstinctis. *Cor.* 4-5-petala. *Antherae* rostratae. *Caps.* 4-5-locularis, calycis tubo truncato cincta. *Receptac.* compressum, semi-ovatum. *G.* (Stam. 8-10.)

1. *chinensis*, fol. sessilibus, calycib. glabris. Willd. Sp. II. p. 300. O. pedunc. trifloris bracteatis. Lin. suppl. p. 215. Lam. ill. gen. t. 283. Osbeck. it. 213. t. 2. Hab. in China. Caul. brachiatus, fol. angusto-lanceolata, trinervi.

2. *zeylanica*, fol. petiolatis, cal. hispido. Willd. O. pedunc. unifloris nudis. Lin. suppl. O. chinensis. Gaertn. de fr. 2. p. 202? Pluck. alm. 142. t. 173. f. 4. Hab. in Zeylona. Fol. linearis-lanceolata, ut tota planta, strigosa. W.

Obs. Osbeckiae a Rhexiae differre videntur germine infero, quum capsula Rhexiae calyce inclusa. Willd., a *Melastomis* non satis distinctae, et potius cum iis conjungendae. Lam. enc. bot. 4. p. 647.

918. *RHEXIA*. *Cal.* urceolatus, 4-5-fidus. *Pet.* 4, calyci inserta, obliqua. *Antherae* declinatae. *Caps.* setosa, 4-locularis, intra ventrem calycis. *Receptac.* sub-lunatum. *Sem.* numerosa, cochleata. (Stam. etiam 10.)

* *Folii sessilibus plerisque.*

1. *virginica*, caul. alato subpiloso, fol. sessilib. sub-lanceolatis trinerviis serrato-ciliatis, calycib. glanduloso-ciliatis. Willd. Sp. II. p. 301. Michaux. Flor. p. 222. Pluck. alm. 235. t. 202. f. 8. *β. septemnervia.* Walter, statura majore, fol. 5-7-nerviis (in inundatis). Hab. in Amer. boreali. Caul. angulis membranaceis. L.

2. *mariana*, caul. hirsutissimo, fol. sessilibus lanceolatis trinerviis villosis-ciliatis, cal. stellato-pilosis. Willd. Michaux. t. p. 221. Lam. ill. t. 283. f. 1. Pluck. mant. 123. t. 428. f. 1. Hab. in Marilandiae pratis. Var. fol. purpureis et rubellis, fol. plus minusve latioribus.

3. *trichotoma*, flor. solitariis axillaribus terminalibusque, fol. sessilibus oppositis lanceolatis hirsutis. Vahl. symb. 2. p. 48. Rostk. pl. surinamens. p. 9. tab. 5. Hab. Surinami. h

β. exalbida, fol. linearibus, flor. pallidis. Michaux. R. lanceolata. Walter.

4. *petiolata*, fol. subovatis trinerviis ciliatis petiolatis, caps. globosis, anther. nudis. Walt. carol. p. 130. Hab. in Carolina.

5. *ciliata*, caul. subquadrangulo glabro, fol. parvulis subpetiolatis ovalibus subus glabris, supra parce hispulis, margine ciliatis, flor. involucreis. Michaux. l. c. Hab. in Carol. infer. Flor. violaceo-purpurei. Affin. priori.

6. *lutea*, caul. 4-angulo hirato, fol. inferioribus cuneato-oblongis obtusis; superiorib. lanceolatis. Michaux. p. 222. Walt. l. c. Hab. in Florida et Georgia. Flor. lutei. Anth. breviusculae uti in priore. M.

7. *Alifanus*, foliis subovatis cauleque erecto sublaevibus, cal. corollaeque glanduloso-pilosis. Walt. carol. p. 130. Hab. in Carolina.

8. *glabella*, caul. cylindraceo glabro, fol. sessilibus erectis lanceolatis laevibus glabris integris, flor. brachiato-subpaniculatis, cal. hirsuto-glutinosis. Michaux. t. p. 223. In Carol. et Georgiae sylvis. Flor. majusculi, dilute purpurascens. Priori affinis.

9. *Jussiaeoides*, pubescens, fol. lanceolatis alternis contatis margine scabris. Lin. suppl. 215. Hab. in Surinamo. Fol. margine scabra ex minutissimis serraturis. h

10. *bivalvis*, decandra, fol. sessilibus glabris ovatis obtusis trinerviis, capsula bivalvi. Willd. p. 302. Vahl. eclog. 1. p. 38. Melastoma bivalvis. Aubl. guj. 1. p. 404. t. 155. f. 4. Hab. in pratis paludosis Gujanac. ©

11. *trivalvis*, decandra, fol. sessilibus glabris linearis-lanceolatis acutis, oboleto trinerviis, capsula trivalvi. Willd. Vahl. eclog. 1. p. 39. M. trivalvis. Aubl. guj. t. p. 406. t. 155. f. 6. Hab. in pratis paludosis Gujanac. ©

** *Fol. petiolatis.*

12. *hypericoides*, decandra, villosissima, fol. ovatis acutis integerrimis brevissimis petiolatis septemnerviis, panicula terminali. Willd. p. 303. M. villosa. Aubl. guj. 1. p. 423. t. 168. Hab. in pratis humidis Cajennae. Facies Hyperici montani. ©

13. *glutinosa*, fol. oppositis trinerviis laevibus, flor. thyrsoides. Lin. suppl. p. 216. Mutis. amer. v. 1. t. 6. Hab. in N. Granada. Melastomis similis, ramulis artieu-

latis. Summitates ramulorum et calyces glutinosi. L.

14. *quinquenervis*, fol. ovatis acutis quinquenerviis, pedunc. dependentibus suborymhosus, petal. convolutis. Flor. Peruv. 3. p. 83. t. 318. f. 6. Hab. in Peruviae montibus et collibus. Petal. violacea. h

15. *rosmarinifolia*, fol. subpetiolatis oblongo-linearibus trinerviis, margine revolutis, pedunc. 3-5-floris pendulis, petal. convolutis. Flor. Peruv. t. 318. Hab. in collib. ventosis, aridiusculis. Petal. violacea, nocte et mane patentia.

16. *lutescens*, fol. ovatis trinerviis rugosis, pedunc. trifloris pendulis, petal. convolutis. Flor. Peruv. p. 84. t. 319. Cresc. in montibus, locis pluviosis. Flor. latescentes pasim 10-andri. h

17. *dicrananthera*, fol. ovatis 5-nerviis, pedunc. subcorymbosis, petal. patentibus. Flor. Peruv. t. 320. Hab. in Peruviae sylvia. R. villosae affinis. Petal. rosea.

18. *echinata*, fol. ovatis 5-nerviis imbutus lanuginosis supra cebinatis, pedunc. 1-3-floris: petal. magnis patentissimis. Flor. Peruv. 3 p. 85. t. 319. Hab. in collib. aliis, ventosis. Flor. violacei, 10-andri. h

19. *recurva*, fol. petiolatis ovatis minimis, caul. 4-angulari articulato apice recurvo, flor. terminalibus subsolitariis. Poirr. in Enc. bot. 6. p. 6. Hab. in Cajenna. Stam. exserta. Anth. versatiles.

20. *flexuosa*, hirsutissima, fol. lanceolatis serrulatis 5-nerviis, pedunc. corymboso-dichotomis, petal. reflexis. Flor. Peruv. p. 85. t. 320. In Peruv. runcationibus. Pet. parva, alba.

21. *ochypetala*, hirsuto-hispida, foliis lanceolatis 5-nerviis, pedunc. trifloris, petal. patentissimis acumiuatis. Flor. Peruv. p. 86. t. 321. Hab. in montibus apertis, praeeruptis. Petal. purpurea acumine parvo. Flor. bract. 2, caducis tecti, 10-andri. h

22. *glomerata*, foliis petiolatis ovatis integerrimis trinerviis villosis, flor. terminalibus glomeratis. Willd. p. 304. Roth. pl. surinamens. p. 8 t. 4. Hab. in Surinami pratis depressis.

23. *longifolia*, decandra, pilosa, foliis lanceolatis integerrimis quinquenerviis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis fol. brevioribus. Hab. in America meridionali.

24. *aspera*, decandra, foliis petiolatis ovatis quinquenerviis, calyce squamoso-bracteato. Willd. Tibouchina aspera. Aubl. guj. 1. p. 448. t. 127. Hab. in aridis Gujanac. Calyx squamis imbricatis treius. h

25. *uniflora*, fol. petiolatis ovatis serratis, flor. axillaribus solitariis decandris, caule alato dichotomo. Hab. in Cajenna. Caul. herbaceus, viscosus. Fol. margine e pilis glandulosis ciliato serrata. Capsulae Coriandri.

26. *inconspans*, fol. ovatis hispida, setis adpressis, subtus incanis trinerviis, pedunc. terminalibus subunifloris. Ochromis ornata. Swartz Fl. ind. occid. 2. p. 647. Hab. in summo monte Montansery St. Christophori. h

27. *latifolia*, fol. petiolatis subrotundis acutis quinquenerviis hirsutis, pedunculis terminalibus unifloris. Ochromis ornata. Aubl. gujan. 1. p. 336. t. 129. f. 2. Hab. in pratis Gujanac.

28. *villosa*, fol. petiolatis subrotundis ovatis acutis quinquenerviis villosis, flor. geminis terminalibus subsessilibus. Willd. Aubl. l. c. p. 334. t. 129. f. 1. Cum priore in pratis.

29. *aquatica*, foliis oppositis cordatis crenulatis hirsutiusculis, panic. terminalibus triehotomis, ramulis filiformibus patentissimis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 650. Melastoma aquatica. Aubl. p. 430. tab. 169. Hab. in inundatis Cajennae, Surinami, Jamaicae, Dominicae. h

ОПЛОДЖ. (Gen. 918-922.) Cal. superus, tubo longo distinctus: limbo 4-5 persistente, aut deciduo. Petala summo calyci inserta, saecida. Stam. numero varia 12, 4, 6, 8, 10 et plura. Fructus plerumque inferus, est vel capsula, aut bacca, aut drupa, ut plurimum polysperma, 1-multilocularis. Fol. alterna, aut opposita. Caul. herbaceus vel frutescens.

919. OENOTHERA. Cal. tubulosus: 4-fidus, laciniis deflexis deciduis. Petala 4, cal. inserta. Stigm. 4-fidum. Caps. 4-locularis, 4-valvis, iufera. Sem. nuda, receptaculo centrali, 4-gono affixa.

* Caps. elongatis teretibus sessilibus.

1. *biennis*, fol. ovato-lanceolatis planis caule muricato-villoso, caps. conicis deor-

sum subtergillis. Mill. ic. t. 86. f. 2. Flor. dan. 446. Lam. ill. t. 219. f. 1. Hab. in Virginia, nunc 1614. nunc vulgaris in Europa. Stam. coroll. breviora. W. ♂

2. *suaveolens*, foliis ovato-lanceolatis obsolete denatis, caps. elongatis crassitudine subaequalibus, cor. magna. Hab. in America. Col. in hort. ob odorem aurantium et magnitudinem florum. Oen. grandiflora. Ait? Antecedente omnib. partibus major. Caps. sulcatae, deorsum suberasiores.

3. *parviflora*, foliis ovato-lanceolatis planis, caule laevi subvillosa, staminibus cor. longiorib. Willd. Sp. II. p. 306. Mill. ic. 189. f. 1. Hab. in America septentrionali. Fructus apex marginis obtuso, nec quadrifido. Caul. ruber, scaber. L. ♂

4. *muricata*, fol. lanceolatis planis, caule purpurascente muricato, stamin. longitudine corollae. Willd. Murr. in N. Comment. Goett. VI. p. 24. t. 1. Habitat in Canada. Similis antecediens, sed fructus os non 8-fidum. L. ☉ ♂

5. *longiflora*, fol. denticulatis, caul. simplicibus pilosis, petalis distantibus bilobis, flor. tubo longissimo. Jacq. hort. t. 172. Curt. magn. 365. Habitat in agro Bonariensi. Petala flava, biloba, post anthesin rubescunt. Caps. hirsutae. ☉ ♂

6. *mollissima*, fol. lanceolatis undulatis. tomentosis. Mill. clth. 297. t. 219. f. 286. Hab. in agro Bonariensi, et R. Chilensis campis. Petal. primo flava dein purpurea. ☉

7. *nocturna*, fol. lanceolatis repandodentatis pubescentibus, caule tereti pubescente. Willd. Jacq. ic. var. 3. t. 455. Collect. 3. p. 205. Lam. ill. t. 279. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Fruct. ovato-oblongus. Cor. praecedentis, petalis flavis, dein rubicundis. ☉

8. *villosa*, fol. lanceolatis villosis, caule angulato hirsuto. Thunb. prod. 75. Cum priore. †

9. *prostrata*, fol. sublanceolatis acutis dentato-sinuatis, caps. linearib. obtuse 4-gonis coronatis-curvatis. Flor. Per. p. 79. t. 315. Hab. inter Peruv. segetes. Petal. latea purpureaque, obcordata. Affinis videtur Oe. sinuata.

10. *sinuata*, decumbens molliter pubescens, fol. lanceolatis dentato-sinuatis (incisis), flor. axillaribus villosis. Michaux. Flor. 1. p. 224. Murray in comm. Goett. 5. t. 9. In Amer. hor. aridis.

11. *tenella*, fol. linearis-obovatis, caps. cylindricis curvatis. Flor. Per. t. 316. Cav. ic. 4. p. 66. t. 368. f. 2. Hab. in R. Chil. campis. Pet. purpurea, cal. duplo longiora.

12. *odorata*, fol. linearilanceolatis subdentatis undulatis, caula villosa suffruticosa. Jacq. ic. var. 3. t. 456. Collect. suppl. 107. Hab. in Patagonia. Fol. rigida. Flor. magnitudine Oe. longiflorae. W.

13. *tenuifolia*, fol. inferiorib. oblongis, superiorib. linearibus, caps. cylindricis rectis, petal. crenulatis. Flor. Per. p. 81. t. 317. Cav. ic. 4. p. 67. t. 367. Onagra linearifolia. Few. 3. t. 34. Hab. in collib. siccis, campis. Pet. albedo-purpurea. Flor. Per. 1. luteo-rubra. Cav.

14. *dentata*, fol. sublinearibus denticulatis, caps. cylindricis angustissime curvatis. Flor. Per. p. 82. t. 317. Oe. caps. tenuissimis tetragonis. Cav. ic. 4. p. 67. t. 392. Hab. in arvis, segetib. locis arenosis. Pet. obovata, obsolete crenulata lutea.

** *Caps. ventricosae angulatis quibusdam pedicellatis.*

15. *acaulis*, fol. pinnatifidis 1 lacinia terminalli majore denticulata. Cav. ic. 4. p. 60. t. 399. Oe. grandiflora, fol. interrupte pinnatis pinnatifido-lyratisque, caps. sessilibus obovatis 4-gonis alatis. Flor. Peruv. 3. p. 78. t. 318. Hab. in N. Chilensis arvis et ruderalis. Pl. initio florescentiae acaulis, postea caulescens. Pet. alba. Fl. Per. 1. c. ♂

16. *virgata*, fol. lyratis lanceolatisque dentatis, caps. pedunculatis clavatis. Flor. Per. p. 29. t. 315. Hab. in Peruviae segetib. et ruderalis. Flor. subpaniculati, purpurei. Var. fol. vix incisis.

17. *tetraptera*, (mutabili) fol. lanceolatis basi pinnatifido-dentatis, capsulis pedicellatis obovatis quadrialatis. Willd. p. 309. O. foliis alternis subpinnatis crispis, flore mutabili, fructu tetraptero. Cavan. ic. 3. p. 40. t. 279. Hab. in Sotoluca N. Hispaniae. Flores maximi, candidi, post florescentiam purpurei. †

18. *glauca*, fol. lato-ovalibus repando-subdentatis laevigatis glaucis, caps. ovato tetragona. Michaux. 1. p. 224. Hab. in Americae boreal. sylvis.

19. *hybrida*, caul. erecto villosa, fol. utrinque pubescentibus lanceolatis remota dentatis undulatis, caps. subspectis ovato-tetragonis substipitatis. Michaux. p. 225. Hab. in Carol. superiore.

20. *fruticosa*, fol. lanceolatis subdentatis acutis, capsulis pedicellatis oblongo-clavatis angulatis. Willd. p. 310. Curt. mag. t. 33a. Hab. in Virginia. Flor. magni, aurei. Cal. purpurascens. Flor. lutei.

21. *pumila*, fol. lanceolatis integerrimis obtusis, capsulis pedicellatis elliptico-obovatis angulatis. Willd. Curt. mag. t. 355. Hab. in America septentrionali. Petala lutea, obcordata, lineata. Caps. octangulares. $\bar{\tau}$

22. *rosea*, fol. ovatis utrinque attenuatis dentatis, capsulis pedicellatis oblongo-obovatis angulatis. Willd. Ait. Kew. 2. p. 3. Oc. purpurea. Enc. bot. 4. p. 554. Oc. rubra. Cav. ic. 4. p. 68. t. 400. Hab. in Peru. Pet. rubra. $\bar{\tau}$

23. *purpurea*, fol. glaucescentibus glabris lanceolatis integerrimis utrinque attenuatis obtusis, caps. sessilibus ovatis angulatis. Willd. O. foliis ovato-lanceolatis glaucescentibus integerrimis, caps. sessilibus, stigm. atropurpureo. Curt. mag. t. 35a. Hab. in America boreali. Pet. purpureo. Caul. semipedalis. Folia glaucoviridia. W.

24. *pusilla*, minutum pubescens, caul. simplici, fol. lanceolato-oblongis obtusiusculis integris, caps. sessilibus obovato-turbinatis subaequaliter 8-gonis. Michaux. 205. Hab. in rupibus ad lacus Mistassins. Pl. 4-6-uncialis. Flor. ad summitatem axillares. M.

25. *chrysantha*, caul. debili subpubescente, fol. lanceolatis obtusiusculis planis integris, caps. sessilibus clavata acutangula. Michaux. p. 225. Cresc. a Quebec ad sinum Hudsonis. Subpedal. Flor. parvi aurei. M.

26. *linearis*, pubescens gracilis, fol. linearibus, caps. stipitatis subrotundo-4-gonis villosis. Michaux. Hab. in Carol. superiore.

27. *subulata*, fol. subulatis, caps. clavatis 4-gonis superne alatis. Flor. Per. 3. p. 82. t. 316. Hab. in Chili apricis, arvis. Petal. bifida, purpurco-rubra.

280. GAURA. *Cul.* 4-fidus, tubulosus. *Cor.* 4-petala, adscendens versus latus superius. Nux. infera. 1-sperma.

1. *biennis*, fol. lanceolatis dentatis, pet. obovatis adscendentibus patulis, stylis uaminibusque dextis, caule herbaceo.

Willd. Sp. II. p. 311. Michaux. Flor. 1. p. 226. Curt. mag. t. 319. Flor. spicato-corymbosi, rubelli. Hab. in Virginia, Pennsylvania. $\bar{\tau}$

2. *angustifolia*, fol. linearibus confertis, repando-undulatis, spicae fructibus dissitis oblongo-4-gonis utrinque acutis subcandicantibus. Michaux. 1. c. Hab. in Carol. inferiore. Flor. duplo minores.

3. *fruticosa*, fol. lineari-lanceolatis denticulatis, petalis obovato-lanceolatis adscendentibus adpressis, stylis staminibusque rectis, caule fruticoso. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 457. Collect. 1. p. 142. Hab. in Amer. meridionali. $\bar{\tau}$

4. *mutabilis*, fol. ovatis dentatis, pet. ovatis acutis cruciatim patentibus, stylis staminibusque rectis, caul. fruticoso. Willd. Cav. ic. rar. 3. p. 30. t. 258. Curt. mag. t. 388. Hab. in N. Hispania. Cor. flava post anthesin rubescit, An a priori specie diversa?

5. *tripetala*, fol. lanceolatis subdentatis, flor. hexandris. Cav. ic. 4. p. 66. t. 396. f. 1. G. hexandra. Ortega. Hab. in Mexico. Pet. 3, coccinea. Nux 3-gona.

921. EPILOBIUM M. *Cal.* 4-fidus, tubulosus. *Petala* 4. *Caps.* oblonga, infera. *Sem.* comosa. (Flor. rubelli.)

* *Staminibus declinatis.*

1. *spicatum*, caul. elongato simplici, fol. alternis lanceolatis glabris venosis, pedunc. ebracteis, spica pyramidata. Lam. enc. 2. p. 373. E. *angustifolium*. Willd. Sp. II. p. 313. et plur. antor. Flor. dan. t. 289. Curt. Lond. ic. E. *antonianum* quorumd.

2. *latifolium*, fol. alternis lanceolato-ovatis subdentatis breviusculis aveniis, flor. inaequalibus axillaribus et terminalibus. Flor. dan. t. 565. E. frigidum. Retz. Scand. ed. 2. n. 459. Act. Haf. 10. t. 8. f. 23. Hab. in Europ. septentrionalis uliginosis?

Obs. Rad. densa, compacta. Caul. pedalis fere. Fol. vix unc. 1. longa, avenia, infima squamiformia. Flor. prioris sed non spicati.

3. *angustifolium*, caul. ramosissimo, fol. sparsis anguste linearibus aveniis, pedunc. unibracteatis. Lam. 1. c. 374. E. *angustissimum*. Ait. Willd. rosmarinifolium. Haenke. Moris. 2. 3. t. 51. f. 2. Hab. in Groenlandia, inque alpinis. $\bar{\tau}$

* * *Staminibus erectis regularibus.*

4. *hirsutum*, caul. ramoso, fol. oppositis lanceolatis serratis decurrenti-amplexicaulibus. L. Flor. dan. t. 326. Curt. Lond. ic. E. amplexicaule. Lam. enc. l. c. Hab. ad latera rivulorum. Cor. calyce duplo major. Stigm. crassum 4-6dum.

* *incanum*, totum incanum, caul. ramosissimo, fol. subamplexicaulibus lanceolatis dentatis, stigm. crasso 4-6do. E. *tomentosum*. Vent. Hort. Cels. p. 50. t. 90. Habit. ad margin. rivulorum in oriente. Propter canitiem albicantem et pariam alienam a priore non diversum. An tantum varietas?

5. *pubescens*, fol. (mediis) oppositis lanceolatis subpetiolatis pubescentibus, caul. villosissimo simplicissimo. Roth. germ. II. 435. Flor. dan. t. 317. E. villosum. Curt. Lond. ic. E. parviflorum. Hoffm. E. molle. Lam. enc. 2. Moris. t. 3. t. 11. f. 4. Hab. ad fossas et in pratis. ¶

6. *villosum*, fol. alternis lanceolatis serratis hirsutis. Thunb. prod. 75. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *montanum*, fol. subpetiolatis oppositis ovatis dentatis, stigm. 4-partito. Smith. brit. t. p. 410. Flor. dan. t. 922. Curt. l. c. t. 14.

β. *alpestre*, foliis oppositis alternisque ovatis denticulatis subsessilib. glabris, caul. simplicissimo obtusungulo, flor. axillaribus subsessilib. caps. utrinque attenuatis tetragonis. Schmidt. bohém. n°. 377. Hab. in montosis, nemorosis, ad muros etc.

γ. *trigonum*, caul. simplice obsolete trigono, fol. ternis ovatis dentatis sessilibus. Hab. in Silesia et in Helvetia. Ludw. E. *alpestre*? Schleicher. An E. *alpestre* Schmidt bohém. diversum?

8. *roseum*, fol. oppositis alternisque ovato-lanceolatis petiolatis serratis glabris. Roth. germ. 2. p. 458. Schreb. Sp. p. 147. E. *roseum*, fol. petiolatis ovatis dentatis, caul. subtetragono, stigm. indiviso. Smith. brit. t. p. 411. Hab. in uliginosis ad margines rivulor. Caul. (ramosus), superne villosa candido obtectus. R., incanus. S. Flor. parvi carnei. Stigm. clavatum. S.

δ. *glabellum*, fol. oblongis dentatis obtusis, imis oppositis, caule teretiusculo erecto. Forst. prod. n°. 160. Hab. in N. Zeelandia.

10. *denticulatum*, fol. sublanceolatis

denticulatis: inferiorib. oppositis, petal. aequalib. bifidis. Flor. Per. 3. p. 78. t. 314. Hab. in Peruv. et chilens. ripis. Pet. rosea. Suffrutescens.

11. *rotundifolium*, fol. oppositis sobrotundis denticulatis. Forst. prod. n°. 161. Hab. in N. Zeelandia.

12. *tetragonum*, fol. lanceolatis denticulatis, imis oppositis, caule ramoso tetragono, stigm. indiviso. Smith. p. 412. Flor. dan. t. 1029. Curt. Lond. 23.

β. *obscurum*, fol. oppositis alternisque, lanceolatis glabris serratis basi decurrentib. Schreb. Hab. in palustribus. Stigm. clavatum. S.

13. *palustre*, fol. sessilibus lanceolatis subdenticulatis, caul. tereti ramoso. stigm. indiviso. Smith. brit. t. p. 413. Engl. bot. t. 146. Hab. in palustribus. Stigm. lineare, indivisum.

14. *origanifolium*, fol. oppositis ovatis acutis subdentatis, caul. basi erecto glabro. Lam. enc. 3. p. 576. Hab. in alpestribus Sequente, quacum confunditur, major. Fol. ferme aequalia, infima minora.

15. *alpinum*, fol. oppositis ovato-lanceolatis integerrimis, siliquis sessilib. caule basi repente. L. Flor. dan. t. 322. Lightf. scot. t. 10. f. 1. E. *anagallidifolium*. Lam. Hab. in alpinis ad rivulus. Racem. subtriflorus.

β? *pumilum*, caul. simplici basi incurvo subpubescente, fol. oppositis sessilib. ovato-lanceolatis acute serratis. Hab. in subalpinis. Caul. spithameus. Fol. sensim angustiora, magis rugosa. Flor. terminales, pauci.

927. FUCHSIA. Cal. infundibuliformis, coloratus, superus, deciduus. Petala (Nectar. L.) 4, fauci calycis insidentia, ejusque laciniis alternantia. Nect. glandula octosulcata. Stigm. capitato-tetragonum. Bacca oblonga, obtuse 4-gona, 4-locularis. Sem. numerosa, obovata, dissepimentis adhaerentia. (Flor. penduli.)

1. *coccinea*, pedunc. 1-floris axillaribus, cor. convoluta, fol. ternis lanceolatis. Willd. Sp. II. p. 340. Dubam. Traité d'arbres. Ed. nov. t. 13. Hab. sponte in R. chilensi et ad fret. Magellanicum. Cor. violacea. β? F. *triphylla*. L.

3. *serratifolia*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. 3-4-oppositis oblongis serratis. Flor. Peruv. 3. p. 86. t. 323. Hab. in Peruv. locis subhumidis et subumbrosis. Cal. villosus, roseo-ruber. Pet. punicea. h

3. *denticulata*, pedunc. axillaribus 1-floris, fol. ternis oblongo-lanceolatis denticulatis. Fl. Peruv. p. 87. t. 325. f. a. Cresc. in ripis et praeceptis calidis. Cal. purpureus. Pet. punicea obovatis. ☉

4. *ovalis*, pedunc. axillarib. racemosis foliosis, fol. 4-nis oppositisque ovalibus utrinque pubescentibus. Flor. Per. l. c. t. 524. Hab. in Munnae nemorib. Flor. punicea. h

5. *corymbiflora*, pedunc. terminalib. ternis corymbosis foliosis, fol. oblongo-lanceolatis. Flor. Per. l. c. t. 325. f. b. Hab. in nemoribus, loc. umbrosis.

6. *macrostema*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. ternis ovatis subsinuato-dentatis, petal. patentibus obovatis. Flor. Per. p. 88. t. 324. f. b. Thilco. Feuill. Hist. 3. t. 47. Hab. in Chili uliginosis. Pet. caerulea. Stam. passim. 10. h

7. *decussata*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. ternis oppositisque lanceolatis obsolete denticulatis. Flor. Per. p. 88. t. 323. f. b. Cresc. in umbris et subhumidis. Cal. roseo-puniceus.

8. *lycioides*, fol. pedunc. axillarib. cal. laciniis reflexis, fol. ovato-lanceolatis subternis. Andrew. t. 120. Hab. in Amer. septentrionali. Bacc. subglobosa nigrescens. h

9. *simplicicaulis*, pedunc. terminalib. quaternis 1-floris involucreatis, fol. quaternis lanceolato-linearib. Flor. Peruv. p. 89. t. 322. Hab. in Peruviae sylv. Bacc. pubescens. Cal. roseus pubescens.

10. *rosea*, fol. fasciculatis inaequalib. alternisque lanceolatis integerrimis. Flor. Per. p. 88. In R. chilensis praeruptis. Fol. ex eodem centro 8. Flor. rosei.

11. *excorticata*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. ovatis alternis (longe petiolatis.) Lin. suppl. p. 217. Lam. enc. 2. p. 566. Skinnera. Forst. prodr. n. 161. Hab. in N. Zeelandia. Fol. subtus canescentia, enuissime serrata.

12. *apetala*, pedunc. terminalibus corymbosis umbellatis, fol. sparsis ovatis acuminatis integerrimis. Flor. Per. 3. p. 89. t. 322. Flor. magni. Cresc. in nemoribus.

923. MEMECYLON. Cal. superus, fundo striato, margine integerrimo. Cor. 1-petala. Antherae insertae lateri apicis filamentis. Bacc. coronata calyce cylindrico.

1. *capitellatum*, fol. ovatis petiolatis, umbellulis capitatis axillaribus subsessilibus. Willd. II. p. 347. Lam. (Desrousseaux) enc. 4. p. 88. et ill. t. 284. f. 1. Hab. in Zeylona. h

2. *tinctorium*, fol. oblongo-ovatis petiolatis, corymbis axillaribus. Willd. M. ramiflorum. Lam. enc. 4. p. 86. Hab. in India orientali. Fol. flavo-viridia. h

3. *grande*, fol. acuminatis. Retz obs. 4. p. 26. Hab. in India orientali. Arb. Fol. opposita. Pedunc. axillares.

4. *cordatum*, fol. coriatis subsessilibus, umb. compositis axillaribus pedunc. Lam. enc. 4. p. 89. et ill. t. 284. f. 2. p. 2 fol. minoribus amplexicaulis, fructu globoso. Lam. l. c. Habit. in insula Mauriti, in India orientali. ☉

924. COMBRETUM. Cal. 4-dentatus, campanulatus, superus. Cor. 4-petala, calyci inserta. Stam. longissima. Caps. quadrangularis: angulis membranaceis, 1-locularis. Sem. 1, oblongum. (Flor. quidam 10 andri.)

1. *laxum*, fol. oppositis, racemis laxis ebracteatis, cal. interne villosis. Willd. Sp. p. 319. Lam. ill. gen. t. 282. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. ☉

2. *secundum*, fol. oppositis, racemis secundis ebracteatis, cal. glabris. Lam. ill. t. 282. f. 1. Jacq. amer. t. 176. f. 30. Ed. pict. t. 260. Hab. in fruticetis Carthag. Rami fructi et fol. fricata male olent.

3. *purpureum*, fol. ovato-oblongis calycibus nudis, spicis simplicibus secundis. Vahl. symb. 3. p. 51. C. coccineum, flor. decandris, spicis laxis paniculatis. Lam. enc. 1. p. 734. ill. t. 282. f. 2. Cristaria. Sonnerat it. 2. t. 140. Hab. in Madagascar. h

4. *decandrum (album)*, fol. oppositis oblongis acuminatis, racemis laxis bracteatis, flore longioribus, flor. decandris distichis. Willd. Roxb. coron. 1. p. 43. t. 59. Hab. in montosis sylvaticis Ind. orient. h

5. *alternifolium*, fol. alternis, flor. decandris, Jacq. amer. Ed. pict. t. 200. (*C. decandrum*). Hab. in Carthageria. Fruct. ad 20 pedes scandit. h

Obs. Forte melius novum et distinctum efficit genus. Cal. et Cor. 5-fida. Caps. 5-alares, non rigidae, Jacq.

925. *VITMANNIA*. Cal. 4-fidus, Cor. 4-petala. Nect. squama ad basin filamentorum. Nux semilunata, compressa, monosperma.

1. *elliptica*. Vahl. symb. 3. p. 31. t. 60. Samadera. Gaertn. de fr. et sem. 2. p. 352. t. 256. f. 3. Hab. in India orientali. Arb. Fol. alterna elliptica. Flor. umbellati. h

926. *GRISIEA*. Cal. 4-fidus. Pet. 4, ex incisuris calveis. Filam. longissima, adscendentia. Caps. globosa, supra, 1-locularis, polysperma.

1. *secunda*, fol. petiolatis glabris, corymbis axillaribus secundis. Willd. p. 320. Hab. in America calidiore. h

2. *tomentosa*, foliis sessilibus subtus tomentosis, corymbis axillaribus patulis. Willd. p. 321. Roxb. corom. 1. p. 29. t. 31. Lythrum fruticosum, Lin. Hab. in collibus Indiac et Chinae. Cortex lacerna. h

927. *ROXBURGHIA*. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala. Nectar. foliola 4 lanceolata, medio petalorum inserta. Antherae geminae, e basi folii nectarii dependentes. Caps. unilocularis, bivalvis, polysperma. Sem. receptaculo spongioso inserta.

1. *Gloriosa*. R. gloriosoides. Roxb. corom. 1. p. 29. s. 32. Willd. Sp. p. 321. Habit. ad radices montium Indiac orientalis. Planta scandens media inter Liliaceas et Asclepiadeas. Radix tuberosa. Fol. petiolata cordata. Cal. flavus cor. purpurea major. W.

5. *SAITONIA*. Cor. his 3-4-5-petala, quibusdam in medio villosa, s. glandulosa, aliis petal. interiore ad unguem aucta, stam. 6-10, plerumque 8, cum petalis disco inserta. Styl. numero variis, aut 3. Fruct. est vel drupa, vel capsula 1-3-locosa: coceul. monospermis. Plautae

sunt vel frutices aut arbores, rarius herbae, fol. alternis, plerumque 1-2-3-ternatis aut pinnatis distinctae.

928. *ORNITROPHE*. Cal. 4-partitus. Cor. 4-petala, medio barbata. Germen didymum. Baccas 2, monospermas.

1. *integrifolia*, fol. ternatis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, racemis subsimplicibus. Willd. Sp. II. p. 322. Lam. ill. t. 309. f. 1. Jus. gen. pl. Hab. in insula Borbonia. h

2. *serrata*, polygama, foliis ternatis scabris, foliolis petiolatis ovatis acuminatis serratis, racemis simplicibus. Willd. Roxb. corom. 1. p. 44. t. 61. Hab. in montosis Indiae orientalis. h

Obs. In locis altis arbor evadit, in depressis frutex. Baccas comeditur, et radix adstringens contra diarrhoeam adhibetur. R.

3. *Cobbe*, fol. ternatis, foliolis petiolatis ovatis acutis serratis, subtus pubescentibus, racemis simplicibus, pedunculo tomentoso. Willd. Rhus Cobbe, fol. ternatis, foliolis ovatis acuminatis serratis, pedunc. tomentosis. L. Sp. pl. 382. Hab. in Zeylona. h

4. *Cominia*, fol. ternatis, foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis subius pubescentibus, racemis compositis. Willd. p. 323. Schmidelia Cominia. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 667. Rhus Cominia. Sloan. hist. 2. p. 100. t. 208. f. 1. Hab. in montosis Jamaicae occident. h

5. *occidentalis*, fol. ternatis, foliolis subsessilibus, racemis simplicibus. Willd. Schmidelia. Swartz. l. c. Allophylus racemosus. Swartz. prodr. 62. Hab. in frutetis montosis Hispaniolae. Foliola lateralia basi obliqua, subtus leviter tomentosa. h

6. *Schmiedelia*, fol. ternatis, foliolis petiolatis subserratis nudis, racem. simplicibus. Schmiedelia racemosa. Lin. Willd. Sp. II. p. 435. Burm. ind. t. 32. f. 1. Hab. in Ind. orient. Ram. flexuosi. Flor. digyni.

7. *rigida*, fol. simplicibus denticulato-spinosis, flor. racemosis. Sw. Fl. ind. occid. sub Schmiedelia. Hab. in montosis aridis Hispaniolae. h

8. *Allophylus*, fol. ovalibus acuminatis integerrimis. Allophylus Zeylanicus. Lin. Hab. in Zeylona. Arb. Perseae facie. Racem. brevissimi ex alis. L.

929. *EUPHORIA*. *Cal.* 5-phyllus.
Pet. 5, reflexa, medio intus subvillosa. *Bacca* 2 (altera plerumque abortiva) corticosa, tuberculata, 1-locularis, 1-sperma. (*Stam.* 6, saepius 8. *Juss.* *Stam.* 7. *Lam.*)

1. *punica* (Litschi). *fol.* pinnatis, *foliol.* ovato-lanceolatis utrinque glabris, *baccis* scabris puniceis. *Lam. enc.* 3. p. 573. et *ill.* t. 306. Litschi chinensis Sonner. *it.* t. 129. Dimocarpus Willd. *Sp.* II. p. 346. *Sevitalia*. Gaertn. de fr. t. 147. *Sapindus* edulis. *Ait.* *Hab.* in Ind. orient. *Fruct.* edulis, sapore graius. *Arb.*

2. *longana*, *foliolis* ovato-oblongis; *nervis* lateralibus subius eminentib., *bacc.* laeviusculis luteis. *Lam.* I. c. p. 575. *Buchoz.* *ic. color.* t. 99. *Hab.* in China. *Arb.* Antecedente multo procerior. *Fruct.* vero minores, minus boni.

930. *CUPANIA*. *Cal.* 5-phyllus.
Cor. 5-petala, apice cucullata.
Stylus 3-fidus. *Caps.* 3-locularis 3-valvis, loculis submonospermis.
Sem. axillata.

1. *tomentosa*, *foliis* pinnatis, *foliolis* obovatis retusis, inferne ferrugineo-tomentosis. *Swartz.* *Fl. ind. occid.* 2. p. 657. *Willd.* *Sp.* II. p. 327. *Trigonis* tomentosa. *Jacq. amer.* 102. *Hab.* in montosis sylvaticis Hispaniolae. *Petal.* 3-angularia, iugis hirsuta. *Jacq.* *h.*

2. *glabra*, *fol.* pinnatis, *foliolis* ovatis obtusis crenatis glabris. *Swartz.* *Fl. ind. occid.* 2. p. 659. *Hab.* in montosis Jamaicae, Hispaniolae. *h.*

3. *Saponaria*, *fol.* pinnatis; *foliolis* oblongis attenuatis integerrimis, subtus scabris pubescentibus. *Swartz* l. c. a. p. 661. *Hab.* in India occidentali. *h.*

4. *laevis*, *fol.* pinnatis bijugis, *corymbis* paniculatis; *fructibus* obovato-truncatis triquetris. *Willd.* p. 329. sub *Molinaea*. *Lam. illust.* t. 305. f. 1. *Hab.* in insula Borbonia. *Caps.* obovatae triquetro-alatae.

5. *canescent*, *fol.* pinnatis bijugis, *racemis* paniculatis, *fructibus* ovatis. *Roxb.* *Corom.* 1. p. 43. t. 60. *Willd.* I. c. *Hab.* in montosis Indiae orientalis *Pauc.* axillaris. *Caps.* trilobata, non alata.

6. *alternifolia*, *fol.* pinnatis, *foliolis* alterius retusis, *panícula* coarctata. *Willd.*

Lam. illust. t. 305. f. 2. *Hab.* in ins. Borbonia. *h.*

7. *lentiscifolia*, *canl.* fruticoso, *fol.* alternis abrupte pinnatis; *pinnulis* lanceolatis integerrimis, *flor.* paniculatis. *Guttoa* lentiscifolia. *Cav. ic. pl.* p. 50. t. 373. *Hab.* in Amer. insul. *Babae.* *Caps.* 3-alatae.

Obs. Secundum observationes ultiores *ill.* *Jussieu*, genus *Molinaea* ab eo constitutum, *Cupaniis* inseri debet, quibus etiam adijcienda *Toulicia Aubletii*?

931. *THOUINIA*. *Cal.* 4-partitus.
Petala 4, medio villosa. *Stigm.* 3-fidum. *Caps.* 8, monospermae, alatae.

1. *simplicifolia*, *fol.* simplicibus sinuato-dentatis. *Poitau* in *Annal. d. Mus.* *scum d'hist. natur.* *Fasc.* 13. p. 71. *Hab.* in ins. Dominica. *Frut.* ramosissimus. *Fol.* castaueaeformia.

2. *trifoliata*, *fol.* ternatis. *Poitau*, l. c. *Hab.* cum priore. *Herb. Juss.* *Flor.* *spicati*, axillares uti in priore.

932. *EPHIELIS*. *Cal.* 5-partitus.
Cor. 5-petala, basi squamis 2 appendiculata. *Caps.* oblonga, 1-locularis, disperma.

1. *guyanensis*. *E. fraxinea*. *Willd.* *Sp.* II. p. 328. *Mateiba* guyanensis. *Aubl.* *guj.* 1. p. 331. t. 128. *Lam. ill. gen.* t. 298. *Hab.* in Guayanae sylv. *Arb.* 50-60-petalis. *Fol.* abrupte pinnata. *Panic.* divaricatae.

933. *MELICOCCA*. *Cal.* 3-partitus.
Petala 4, reflexa infra calycem.
Stigma subpeltatum, *Drupa* corticosa.

1. *bijuga*. *Lam. ill.* t. 306. *Jacq. amer.* 108. t. 72. *Ed. pict.* 1. 109. *Comm. hort.* 1. t. 94. *Hab.* in Amer. meridionali. *Arb.* procer, elegans. *Nuca* comeduntur *h.*

934. *KOELREUTERIA*. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 4-petala irregularis. *Nect.* squamæ 4, bifidae. *Caps.* inflata, 3-locularis, loculis dispermis.

1. *paniculata*. *Dulam.* *arb. ed. nov.* t. 36. K. *paullinoidea*. *Herit. sort. angl.* 18. t. 19. *Sepiudus* chinensis, *fol.* pinnatis,

foliolis laciniatis, Lin. Hab. in China. Arbustula 8-12-pedalis. Flor. flavi.

Obs. Vidi in Herbario Jussieui alteram speciem, fol. ternis simpliciter serratis, distinctam, prope diem cum nonnullis aliis hae ex familia, ab illo describendam.

335. *HEDWIGIA*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* tubulosa, 4-fida. *Caps.* tri-coeca, 3-locularis. *Nuces* solitariae.

1. *balsamifera*. Swartz. Flor. ind. occident. 2. p. 672. An *Tetragastris* ossea Gaertn. de fr. 2. p. 130. t. 2. hujus loci. Hab. in montosis sylvaticis Hispaniolae Arb. caelsa, fol. pinnatis. Racemi terminales.

Obs. Species tantummodo generis *Bursacrae* videtur, a quo solummodo numero part. fructificat. differt. E. nomen *Hedwigia* inter museos conservandum ob viri immortalis merita in illustrandam hanc plantarum familiam.

936. *AMYRIS*. *Cal.* 4-dentatus. *Petala* 4, oblonga, patentia. *Stigma* subcapitatum. *Bacca* drupacea, 1-sperma, per abortum.

1. *polygama*, caule arboreo, fol. simplicibus sparsis lanceolato-ovatis integerrimis. Cavan. ic. 3. p. 20. t. 239. Willd. Sp. II. p. 333. Hab. in E. Chilensi h

2. *Elemifera*, foliis ternatis quinato-pinnatisque subius tomentosis. Lam. enc. 1. p. 359. Plum. ic. 100. Hab. in Carolina, et ins. Antill. h

3. *sylvestica*, fol. ternatis erenatis acutis. Jacq. amer. Ed. picta. t. 188. Hab. Caribaeanae, in sylvis maritimis. h

4. *maritima*, fol. ternatis erenulatis obtusis. Jacq. amer. 107. Hab. in America, in rupestrib. maritimis. Frut. nanus.

5. *Kataf*, fol. ternatis, apice serratis, pedunc. confertis bifidis. Vahl. symb. 1. p. 28. Forsk. descr. 80. Hab. in Arabia. h

6. *gileadensis*, fol. ternatis integerrimis, pedunc. unifloris lateralibus. L. Vahl. symb. 1. p. 28. t. 11. A. *Opobalsamum*. Forsk. aegypt. p. 79. Hab. in Arabia felice. Var. sequentis? h

7. *Opobalsamum*, fol. pinnatis: foliolis sessilibus. L. Alp. aegypt. 48. t. 60. Balesan. Bruce itin. cum ic. p. Balsamca mecca-

nensis. Glehlitseh. Act. Soc. Nat. Berol. 3. p. 127. t. 3. f. 2. Hab. in Arabia. h

8. *tozifera*, fol. pinnatis: foliol. petiolatis 7-tenis ovatis acuminatis planis, panic. axillaribus elongata. Willd. Toxicodendrum. Catesb. t. t. 40. In Carol.

9. *Protium*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis quinis oblongis acutis undulatis, racemis axillaribus. Willd. p. 337. Protium javanicum. Burm. ind. 88. Rumph. amb. 7. p. 54. t. 23. f. 1. Hab. in India orientali. Nectar. e receptaculo marginato. h

10. *dentata*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis novenis ovatis acuminatis dentatis, racemis axillaribus. Willd. Cum priore. Ab omnibus fol. margine dentato distinctis. Pedunc. uniflori, elongati. W. h

11. *anisata*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis tredecimis ovato-lanceolatis obsolete dentatis inaequalibus, paniculis axillaribus. Willd. Hab. in Guinea. Similis praecedenti. Panic. corymb. pedunc. multifloris. h

12. *zeylanica*, fol. pinnatis petiolatis glabris, racemis interruptis axillaribus, flor. involucreis hexandris. Retz. obs. 4. p. 25. Hab. in Zeylona. h

13. *oleosa*, foliis pinnatis subtrijugis, flor. racemosis, bacc. ovatis ex caeruleo nigris. Lam. enc. 1. p. 362. Rumph. 2. t. 54. Cresc. in Moluccis. †

14. *balsamifera*, fol. bijugis. L. arboreus, fol. bijugatis ovatis glabris, racemis laxis terminalibus. Brown. jam. 208. Lucinium. Pluck. alm. 227. t. 207. f. 3. Sloan. jam. t. 168. f. 4. Hab. in Jamaica. h †

ICICA. *Cal.* 4-5-dentatus. *Petala* 4-5, oblonga, basi conniventia. *Stigm.* capitatum, 4-sulcatum. *Drupa* coriacea, 2-4-valvis, 2-4-sperma.

15. *enneandra*, fol. ternatis pinnatisque, foliolis petiolatis ovatis acuminatis basi attenuatis reicentato-venosis, panic. axillaribus terminalibus racemosis. Willd. p. 335. *Iceia enneandra*. Aubl. guj. 1. p. 345. t. 134. Hab. in sylvis Gujanae. h

16. *heterophylla*, fol. ternatis pinnatisque, foliolis petiolatis ovatis acuminatis simpliciter venosis, racemis simplicibus. Willd. *Iceia Aracouchini*. Aubl. p. 343. t. 133. Cum priore.

17. *gujanensis*, fol. pinnatis, foliolis quinis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis congestis axillaribus. Aubl. guj. 1.

t. 131. *J. viridiflora*. Lam. enc. 3. p. 225. Hab. ad maris littora, in sylvis Gujanac. h

18. *ambrosiaca*, fol. pinnatis, foliolis septenis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis multifloris subcorymbosis axillaribus. Willd. Lin. suppl. 216. *Iceia heptaphylla*. Aubl. t. 130. Cum priore. h

19. *decandra*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis quinis oblongis utrinque acuminatis, panic. axillaribus divaricatis. Willd. *Iceia*. Aubl. guj. s. p. 346. t. 135. Hab. in sylvis maritimis. h

20. *altissima*, fol. pinnatis, foliolis septenis petiolatis oblongo-obovatis acuminatis, racemo simplici axillari. *Iceia*. Aubl. guj. s. p. 342. t. 132. Le Cèdre blanc. β. ligno magis rubro. Le Cèdre rouge incol. Hab. in sylvis Gujanac. h

937. *CEDROTA*. Cal. 6-partitus, laciniis concavis. Cor. o. Germen glandula cinctum. Fruct...

γ. *longifolia*. Willd. p. 338. Aniba gujanensis. Aubl. guj. s. p. 327. t. 126. Lam. ill. t. 298. Hab. in sylvis desertis Gujanac. Arbor. ex-elsa. Fol. lanceolata, reticulato-venosa. Panic. axillaris.

938. *XINENIA*. Cal. 4-fidus. Petala 4, pilosa, revoluta. Drupa monosperma.

1. *americana*, spinosa, fol. oblongis, pedunc. multifloris. L. multiflora. Jacq. Amer. 106. t. 277. f. 31. Ed. picta. t. 107. Plum. gen. 6. ic. 261. f. 1. Lam. ill. gen. t. 297. Aubl. guj. s. p. 324. t. 125. Hab. in Amer. Flor. albi, odore suavissimi. Fruct. lutei.

2. *elliptica*, caule inermi, fol. elliptico-lanceolatis, pedunc. multifloris. Forst. prod. n. 162. Hab. in N. Calcedonia. h

3. *inermis*, fol. ovatis, pedunc. unifloris. L. Amyris arborescens, fol. ovatis ulabris vetustioribus confertis, petiolis submarginatis, flor. solitariis. Brown. jam. 209. Hab. in Jamaica. h

939. *DODONÆA*. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Filam. brevissima. Anther. oblongæ. Caps. 3-locularis, tripartita. Sem. bina.

1. *viscosa*, foliis oblongis obtusis basi angustatis viscosis. Willd. Sp. p. 343. Trew. chret 12. t. g. Cav. ic. pl. 4. p. 24. t. 327.

Ptelea viscosa. L. Sp. pl. 2. p. 173. Hab. in Jamaica et Amer. calidior. Cal. 3-4-5-phyllus.

2. *triquetra*, fol. lanceolatis, utrinque attenuatis, ramul. triquetris, flor. dioicis. Andrew. t. 230. Willd. l. c. ? D. *triquetra*, caule fruticoso triquetro glabro, fol. alternis lanceolatis glabris, flor. cymosis axillaribus. Wendl. obs. bot. 1. 43. Hab. in N. Hollandia. Anth. (in flor. masc.) flavæ. Styl. longus, rubellus. h

3. *angustifolia*, fol. linearibus marginè revolutis. Lin. suppl. p. 218. Hab. ad Cap. b. spei, in India australi et in montib. Jamaicae. h

940. *VALENTINIA*. Cal. 5-partitus, coloratus, patens. Cor. nulla. Caps. baccata, tetrasperma, pulposa.

1. *illicifolia*. Swartz. Fl. ind. necid. 2. p. 699. Plum. ic. 167. f. 2. Pluck. alm. t. 196. f. 3. Hab. in petrosis Hispaniolæ et in Cuba. Fol. alterna ovato-lanceolata, margine undulato-spinosa. Flor. subumbellati coccineæ. Sw. h

941. *LAUSONIA*. Cal. 4-fidus. Petala 4, Stamina 4-paria. Caps. 4-locularis, polysperma. Sem. angulata.

1. *inermis*, ramis inermibus. L. Desf. atl. 1. p. 325. Q. *alba*, fol. acutis, ovatis utrinque acutis, petalis albis patentibus. Lam. enc. 2. p. 106. Cyprus, Henna, Alcantha. Rauw. itin. 60. t. 60. (bona.) Hab. in India, Aegypto, et Barbaria. h

Obs. Est Cyprus antiquorum, et tincturae croceae inervit, qua cutis et pedum et manuum phalanges a mulieribus cantur.

β. *spinosa*, ramis sub-spinosis. L. Lam. ill. t. 206. Cyprus. Rumph. amb. 4. p. 42. t. 17. Rheed. t. 40. Hab. in India. Flor. racemosi, axillares.

Obs. L. *inermis* et *spinosa* eadem species certo, quæ junior *inermis*, vetusta vero spinescit ramis induratis. Desf. Atl.

2. *Acronychia*, inermis, fol. longe petiolatis cuneiformibus. Lin. suppl. p. 219. *Acronychia laevis*. Forst. gen. n. 27. Hab. in N. Calcedonia. Differt fol. ad insertionem subarticulatis, calyce minimo. h

3 ? *purpurea*, fol. subsessilib. lanceolatis, petalis erectis purpureo-coeruleis. Lam.

enc. 3. p. 107. Rheed. 4. t. 57. Hab. in India orientali. Flor. corymbosi terminales. *h*

Obs. Genus aliud, huic Stam. 4, et Cor. 1-petala. Desf. l. c. p. 326.

942. MELICOPE. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Nect.* glandulæ 4, didymæ, germina cingentes. *Caps.* 4, monospermæ.

1. *ternata*. Forst. prod. Forst. gen. n^o. 28. Lam. ill. t. 294. Entegnum laevigatum. Gaertn. sem. 1. p. 351. t. 59. f. 6. Hab. in N. Zealandia. *h*

943. HAGENIA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala plana. *Nect.* foliola 5, petalis quadruplo breviora. *Caps.* ?

1. *abyssinica*. Willd. Sp. II. p. 331. Lam. ill. t. 311. Cusso Bruce iter, cum ie. Hab. in Abyssinia. Arb. Fol. interrupte pinnata eum impari. Panie. nutans.

944. CARAPA. *Cal.* 4-partitus. *Pet.* 4. *Nectar.* cylindricum, octodentatum, antheras gerens. *Caps.* unilocularis, quadrivalvis. *Nuces* difformes, angulatæ, numerosæ.

1. *guyanensis*, fol. multijugis, foliol. oblongis acumineatis. Lam. enc. 1. p. 621. Auhl. guj. 2. p. 32. t. 387. Lam. illust. t. 301. Willd. Sp. II. p. 331. Hab. in Guayanae sylvis. Arbor simillima Guayacae, ex maximis. Ex nucibus oleum: *huile de carapa* præparatur.

2. *molluccensis*, fol. subtrijugis, foliol. ovato-acutis. Lam. l. c. Rumph. 3. p. 92. t. 61. *ß.* fol. acutioribus. t. 62. Hab. in ins. Moluce. ad oras maris. Fruct. granata refert. *†*

945. GUAREA. *Cal.* 4-dentatus. *Petala* 4. *Nectar.* cylindricum, ore-Antheras gerens. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* solitaria.

1. *trichilioides*. Lin. Cavan. diss. 7. p. 366. t. 210. Jacq. amer. 1. 16. t. 176. f. 37. Hab. in Brasilia et in Ind. occidentali. Flor. racemosi. Fol. pinnata, nitida. Arb.

946. XYLOCARPUS. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Nectar.* 8-fidum, cui *Filam.* inserta.

Drupa exsucca, magna, 4-5-sulcata. *Nuces* 8-10, difformes.

1. *granatum*. Koenig, im Naturforscher (Promtuar. hist. nat. Halac Saxon. editum.) Fasc. 20. p. 2. Willd. Sp. II. p. 328. Rumph. 3. t. 61. Hab. in Ind. orient. littoribus. Arb. Fol. opposita, integerrima. Flor. racemosi.

947. HONCKENIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nectar.* staminiiformis. *Caps.* echinata, 5-locularis, 5-valvis, polysperma. *Sem.* arillata.

1. *foefolia*. Willd. Sp. II. p. 325. Uner. delect. 2. p. 201. t. 4. Hab. in Guinea. Fol. alterna subius tomento fulvo tecta. Flor. terni coeruleo-violacei. Valde affinis Aubletiae. W. *h*

948. MIMUSOPS. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 16-phyllum. *Drupa* acuminata.

1. *Elengi*, foliis alternis ovatis acumineatis. Willd. II. p. 325. Roxb. corom. 1. p. 15. t. 14. M. stylis cor. longioribus. Lam. enc. 4. p. 186. Fj. ill. gen. t. 300. Elengi. Rheede. 1. t. 20. Rumph. 2. t. 63. Hab. in India. *h*

2. *hexandra*, foliis alternis obovatis emarginatis, flor. hexandris. Willd. p. 326. Roxb. corom. 1. p. 16. t. 15. Hab. in montib. Circarsensibus Indiae. *h*

3. *obtusifolia*, fol. alternis remotis obtusis, stylis cor. longioribus. Lam. enc. l. c. M. Kaufl. Willd. p. 326. Binectaria. Forsk. Rumph. 3. t. 8. Hab. in India. *h*

949. NIOTA. *Cal.* quadrifidus. *Petala* 4-5. *Anth.* sagittatæ. *Stigm.* acutum. *Caps.* liguosa, 1-sperma.

1. *tetrapetala* (Commerstoni), petalis 4. Poir. in Enc. bot. 4. p. 450. Lam. ill. gen. p. 299. Hab. in Ind. orient. Comm. Arb. fol. alternis, ovalibus integerrimis. Flor. subumbellati in pedunc. longissimo pendulo.

2. *pentapetala*, petal. 5, flor. pentandris. Poir. l. c. Rheed. 6. t. 18. Hab. in Malaharia. Januar. flor. Arb. 30-petalis. Fol. prioris cum fruct. valde amara.

950. JAMBOLIFERA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala, infundibulif. *Filam.*

Filam. planiuscula. Stigma simplex. Fruct...

1. *pedunculata*. L. Vahl. symb. 3. p. 52. t. 61. Deyand. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 232. Cle. Lam. enc. 3. p. 195. et Juss. gen. pl. Hab. in India.

Obs. Arboe ad Myrtum accedens a Joss. ad Onageas elata, inter plantas dubias aut obscuras pertinet.

951. ACER. Cal. 5-fidus. Petala 5. Samar. 2, basi unite, superæ, 1-spermæ, alatæ. (Flor. nonnulli masculi, et interdum dioici.)

1. *tataricum*, fol. cordatis indivisis serratis: lobis obsolete, flor. cæcemosi. L. Pallas Floe. ross. p. g. t. 3. Hab. in Tartaria. Racem. compositus, erectus. Flor. albi.

2. *Pseudo-Platanus*, fol. quinquelobis inaequaliter serratis obtusis, racem. pendulis subtomentosis. Duham. arb. 1. t. 36. f. 1. Engl. bot. t. 303. Hab. in sylvis, ad sepes. Var. fol. variegatis.

3. *platanoides (lactescens)*, fol. quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, flor. corymbosis erectiusculis glabris. L. Duham. t. 10. f. 1. Habit. in sylvaticis montosis. Petioli abrupti lactescunt. Caps. glaberræ.

ß. *laciniatum*, fol. laciniatis crispis.

4. *rubrum*, fol. quinquelobis subdentatis subtus glaucis, floe. dioicis, umbellatis sessilib. L. Mill. ic. t. 8. f. 2. Duham. t. 10. f. 5. Hab. in Amer. boreali, in uliginosis. Floret primo vere, antequam frondescit. Flor. cubri. Germ. globeum.

5. *dasy carpum*, fol. quinquelobis acuminatis subtus pubescentibus, flor. dioicis glomeratis, germinib. tomentosis. Ehrh. Beytr. 4. p. 24. A. eriocarpum. Michaux. Flor. 1. p. 253. A. tomentosum. H. Par. Hah. cum priore. Flor. April. Arb. procera.

6. *saccharinum*, fol. quinquepartito-palmatis acuminato-dentatis, subtus pubescentibus. L. Duham. t. 11. f. 3. Hab. in Amer. boreali. Floe. apetalis, racemosi. Reichard Syst. 4. p. 332. Caps. turgidae. Fol. autumnu rubescunt.

7. *dissectum*, fol. multipartito-palmatis: laciniis subpinnatifido-serratis. Thunb. Floe. jap. p. 160. Hab. in Japonia cum 4 sequentibus. Rami 2-3-chotomi. Var. fol. rubris. Th.

8. *japonicum*, fol. multipartito-incisis villosis, flor. subumbellatis. Thunb. jap. p. 161. Fol. subrotunda, 13-partita, serrata.

9. *palmatum*, fol. palmatis serratis glabris, flor. umbellatis. Thunb. l. c.

10. *septemlobum*, fol. 7-lobis glabris: lobis acuminatis aequaliter acute serratis. Thunb. jap. p. 162.

11. *pictum*, fol. septemlobis glabris: lobis acuminatis integris. Thunb. jap. p. 162. Rami cinerei.

12. *striatum*, caul. lineis albicantibus striato, fol. trilobis acuminatis serratis, racem. pendulis, petal. ovalibus. Lam. enc. 2. p. 381. A. *pensylvanicum*. Lin. ? A. canadense H. Par. Duham. 1. t. 12. f. 11. Erable jaspé Gal. Hab. in Canada, passim in montibus alleghanis, Pensylv. et Carol. Arb. mediocri altitudine, sed pulchra.

13. *spicatum*, fol. trilobis quinquelobisque acuminatis inaequaliter serratis subtus pubescentibus, racem. spiciformibus erectis, petal. linearibus. Lam. l. c. A. *montanum*. Willd. arbor. berol. p. 7. A. *parviflorum*. Ehrh. l. c. p. 25. Hab. in Amer. septentrione. Flor. omnium parvuli.

14. *campestre*, fol. quinquelobis obtusis glabris, racem. erectis, cortice suberoso rimoso. Engl. bot. t. 304. Hab. ad sepes, in sylvaticis. Caps. rubicundæ, alis patentibus.

15. *Opalus*, fol. rotundatis lobatis obtuse dentatis subtus glaucis, caps. subglabris: alis semipatentibus. Lam. enc. 2. p. 382. (A. *rotundifolium*.) A. *Opalus*. H. Par. Hab. in Italia. Fent. arborescens, ramossissimus, rsm. junior. rubicundi. Flor. subcorymbosi, erectiusculi, albi. Caps. subglobosæ.

Obs. *Apolifolium*, foliis quinquelobis subrotundis obtusodentatis, fruct. cymosis: alis apoclimatis. Vttf. Dauph. 3. p. 802. A. *montanum*. C. B. pin. p. 431. Hab. in Delphin., Helvetiæ montosis, a priore forte non diversum.

16. *monspessulanum*, fol. trilobis integerrimis glabris annuis. L. Duham. 1. t. 10. f. 8. A. *teitolum*. Bauh. Hab. Monspeliæ, Italia et Germania. Fol. juniora pubescentia.

17. *creticum*, fol. coriaceis trilobis integerrimis pubescentibus perennantibus. L. Duham. t. 10. f. 9. Hab. in ins. Creta. Fol. Anemon. hepaticæ: juniora integra.

D d

Obs. Lamark hanc prioremque speciem sub nomine *A. trilobatum*, conjunxit. An sequens tantum var. junior?

* *sempervirens*, fol. ovatis integerrimis sempervirentibus. Lin. Mant. p. 128. Species dubia, a nemine, præter Millerum, descripta. †

18. *trifidum*, fol. indivisis trifidisque integra. Thunb. Jap. p. 163. Hab. in Japonia.

19. *Negundo*, fol. impari-pinnatis, flor. dioicis. Duhem. 1. t. 11. f. 10. Hab. in Pensylvan. et Carolinam. Arb. magna, fol. fraxiniformibus, ab omnibus distincta.

952. *CHLORA*. *Cal.* 8-10-phyllus. *Cor.* 1-petala, 8 fida. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *perfoliata*, fol. perfoliatis. L. Willd. Sp. II. p. 340. Gentiana fol. radicalibus ovatis, caulinis triangularibus. Hal. Moris. Hab. in collibus sicis. Fol. glauca. ☉

β. *mascaresiensis*, cor. duplo majoribus 9-10-partitis, stam. 8-10. Desf. Atl. 1. p. 327. Ad rivulos prope Mascar.

2. *quadrifolia*, fol. quaternis. Habit. in Europa australi. Pedunc. terminalis, quinque 1 singulis in medio bracteae 2, oppositae. L.

3. *sessilis*, acaulis, flor. quadrifidis Willd. p. 341. Gentiana sessilis. L. Fenzl. peruv. 3. p. 20. t. 14. Hab. in R. chilensis.

4? *imperfoliata*, cor. sexfidis. Hab. in Italia. Fol. sessilia ovata. Filam. sex. Styli duo conglutinati. Fruct. ignotus. L.

953. *MICHAUXIA*. *Cal.* multifida. *Cor.* rotata, 8-10-partita, revoluta. *Nect.* 8-valve, staminiferum. *Caps.* 8-10-locularis, polysperma.

1. *strigosa*, fol. radicalibus pinnatifidis, caul. strigato. Alt. Kew. 2. p. 8. Herit. monograph. Miadum. Adans. Juss. Compositula fol. radicalibus dentato-pinnatis, caulinis cordatis sessilibus. Gron. freg. 19. Moris. 2. 5. t. 3. f. 31. Hab. in Oriente, Syria, Libano. ☿

2. *laevigata*, fol. radicalibus ovatis serratis, caulinis oblongatis semisimplexicaulis, caul. laevi glaberrimo. Vent. Hort. Cels. p. 81. t. 81. Hab. in Persia, in monte Albours. Fol. pilosa.

954. *JEFFERSONIA*. *Cal.* 5-phyllus, coloratus, deciduus. *Cor.* 8-petala, incurvo-patentia. *Stam.* ovarium ambientia. *Caps.* obovata, substipitata, 1-locularis, infra apicem dehiscens. *Sem.* plura, oblonga, ad basin arilata.

1. *diphylla*. Barton in Act. Philad. J. Bartonis. Michaux. Flor. 1. p. 237. Podophyllum diphyllum. Lin. syst. veg. ed. 15. p. 523. Hab. in montib. occidentilib. Tennessee. Acaulis; pedunc. nudus, 1-florus. Fol. conjugata.

955. *ANTICHORUS*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Caps.* supera, subulata, 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* plurima.

1. *depressus*. L. fasc. pl. p. 3. t. 2. Lam. ill. t. 265. Jussiea edulis. Forst. Hab. in Arabia. Flor. axillares, bini. Fruct. reflexi. Planta pusilla.

956. *BUGINVILLÆA*. *Cal.* 6. *Cor.* tubulosa, medio coarctata. *Stam.* receptaculo insidentia, inclusa. *Fruct.* . . . (Flos tubulosus bractea majusculæ s. involucri insidens.)

1. *bracteata*. B. spectabilis. Willd. Sp. II. p. 348. Lam. ill. t. 294. Hab. in Brasilia. Frut. facie Pisoniae, sempervirens, aculeatus. Fol. ovato subrotunda, integerrima.

957. *NEÆA*. *Involuer.* 2-3-phyllum, squamæforme. *Cor.* tubulosum. *Stam.* cor. breviora, alternantia longiora. *Drupa* monosperma, coronata. *Nucleus* tunigatus.

1. *verticillata*, fol. quaternis lanecolatis. Ruiz. et Pavon Syst. veg. Fl. Peruv. p. 90. Hab. in Peruviae nemoribus. Frut. 3-orgyalis.

2. *oppositifolia*, fol. oblongo-ovalibus acuminatis. Ruiz et Pav. l. c. p. 91. In Peruv. sylvia. Flor. sero autumnos; uti prior. quadriorgyalis. ♀

Obs. Ad Familiam Nyctagineam secundum cl. Jussieu in Annal. d. Museum, cal. x. p. 275. c. priore genere pertinet.

958. *BORONIA*. *Cal.* 4-fidus, persistens. *Petala* $\frac{1}{2}$, ovata. *Nectar.* coronatum. *Filam.* ciliata, incurva. *Stigm.* capitatum. *Caps.* 4, 2-valves. *Semina* subsolitaria, arillata.

1. *pinnata*, fol. imparipinnatis linearibus, pedunc. axillarib. dichotomis, filam. apice obtusis glandulosis. Andrew. t. 59. Vent. Hort. Malmis. p. 38. Cresc. in N. Hollandia. Cor. Febr. Maj. E. Fam. Rutacea. Cor. rubella.

959. *CORREA*. *Cal.* campanulatus. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis dissiliens: locul. 1-2-spermis.

1. *alba*, fol. ovatis obtusis subtus albidis, flor. terminalib. subumbellatis, petal. basi conniventibus. Vent. Malmis. p. 13. t. 13. Andrew. t. 18. Willd. Sp. II. p. 324. Hab. usque sequente, in N. Hollandia.

2. *rufa*, fol. subrotundis subtus ferrugineis, flor. solitariis axillaribus et terminalib. Vent. l. c. Mazentoxeron rufum. Labillard. Voyag. à la recherche de la Peyrouse. 2. p. 11. t. 17.

3. *reflexa*, fol. ovatis reflexis, cor. cylindricis. Vrat. Maz. reflexum. Labillardiere. l. c. t. 19.

4. *revoluta*, fol. lanceolatis serrulatis, margine revolutis Vent. l. c. — Hoc genus Rutaceis affine est.

960. *TETRATHECA*. *Cal.* 4-dus, inferus. *Cor.* 4-petala. *Anth.* 4-loculares. *Caps.* 2-loculares, 5-valvis: valv. medio septiferis. *Sem.* subbina.

1. *juncea*, glabra, fol. alternis lanceolatis, raul. acutangulo, ramis elongatis nudiusculis. Smith. N. Holl. 1. p. 5. t. 2. Willd. Sp. II. p. 321. Hab. in N. Hollandia, cum seq.

2. *oppositifolia*, fol. subsparis lanceolato-linearibus oppositis: flor. erectis.

3. *ericæfolia*, fol. verticillatis linearibus, flor. cernuis.

Obs. Duas has species vidi in Herbario D. Thibaud, a cl. Née in Australasia collectas.

961. *OXYCOCCUS*. *Cal.* superus, 4-fidus. *Cor.* 4-partita: laciniis sublinearibus revolutis. *Filam.* conniventia. *Anth.* tubulosa, bipartita. *R. Bacca* polysperma.

1. *palustris* (europæus), foliis ovatis integerrimis revolutis, caule filiformibus repentibus nudis. *Oxyccoccus*, s. *Vaccinia* palustris. J. Baub. 1. p. 525. ic. *Vaccinium*, l. Flor. dan. t. 80. Lam. ill. t. 286. f. 3. Scollera Roth. germ. 2. p. 442. e. bon. descr. Hab. in uliginosis, sphagnosis, sempervirens. Bacca purpurea.

2. *macrocarpus*, foliis integerrimis ovali-oblongis planis obtusis, caule repentibus filiformibus. Vae. *macrocarpum*. Ait. Kew. 2. p. 13. t. 7. Lam. ill. t. 286. f. 4. V. *oxycoce*. 3. *oblongifolius*. Michaux. Flor. 1. p. 226. Hab. in Canadae turfosiss. paludosis.

3. *hispidulus*, fol. subrotundo-ovalibus acuminatis, caule repentibus. *hispidus*. Lin. Willd. Sp. II. p. 355. Michaux. l. c. t. 23. sub *Vaccinio*. *Arbutus* thymifolia. Ait. A. filiformis. Lam. enc. Hab. in Amer. bor. cupressetis humidis. Caule ferrugineo-hirsutus. Bacca nivea, edulis.

4. *erythrocarpus*, fol. ovalibus acuminatis serrulatis ciliatisque, caul. erecto. Michaux. p. 227. sub *Vacc.* Hab. in Carol. septent. montib. altis. Cor. ante anthesin longa, conoidea. *Anth.* exsertae. Bac. coccinea. h

Obs. Habitu, loco natali, praesertim cor. forma a *Vacciniis* (quae ob stamina ut plurimum 10, ad decandriam sunt relata), differt hoc genus.

962. *MENZIESIA*. *Cal.* monophyllus. *Cor.* monopetala, ovata. *Filam.* receptaculo inserta. *Caps.* supera, quadrilocularis, dissepimentis e marginibus inflexis vulvularum. *Sem.* numerosa, oblonga.

1. *ferruginea*, flor. foliisque terminalibus fasciculatis lanceolatis planis, subtus laevibus. Jussieu in Annal. du Mus. d'hist. nat. 1. p. 55. Smith. ic. ined. 1. p. 56. t. 56. Willd. p. 355. Lam. ill. t. 285. Hab. in Amer. boreali. h

2. *polifolia*, flor. terminalibus racemosis, fol. alternis ovatis revolutis subtus incano-tomentosis. Juss. l. c. *Andromeda* *Dabocchia*. Lin. Syst. veg. *Erica* *Dabocchia*.

Ej. Sp. pl. Willd. p. 385. Smith. brit. 1. p. 420. Engl. bot. t. 35. Hab. in montib. Hiberniae occidentalis h

3? *pilosa*, fol. pilosis apice nivicis. Lin. ill. gen. p. 494. Journ. d'hist. nat. 1. p. 410. conf. Juss. Annal. 1. c. p. 56. Hab. in Amer. bor.

963. *ERICA. Cal. 4-phyllus, persistens. Cor. 4-fida. persistens. Filam. receptaculo inserta. Anthera bifida. Caps. membranacea, 4-8-locularis. Dissepimenta e valvularum margine. Sem. singulis loculis plura.*

† ASSISTATAE. * *fol. oppositis.*

1. *glutinosa*, antheris aristatis pistilloque inclusis, corol. globoso-ovatis, fol. oppositis sparsisque ciliato-glandulosis linearib. Willd. Sp. pl. II. p. 536. Thunb. Diss. de Erica n. 48 Icon. horti Kewens. t. 17. E. droseroideae. Lam. enc. 1. p. 489. Andromeda droseroideae, racemis secundis, foliis linearibus pilosis viscidis. L. Mant. 239. Petiv. mu. t. 161. Hab. ad Cap. b. spei in planitie montis Tabularis. Cor. ovata violacea, collo atropurpureo, limbo minuto albo.

Obs. Omnes fere species, quae parvi fructores sunt, ad Cap. bon. spei afric. crescunt, hinc ad plurimas indicatio loci natalis in spatii compendium omitta est.

2. *lutea*, anth. aristatis styloque inclusis, corol. oblongo-ovatis, flor. terminalibus; fol. linearibus trigonis glabris oppositis, ramis deflexis. Willd. p. 557. Lam. ill. t. 287. f. 2. Wendland de Erica. p. 13. t. 4. Andrews Erica. n. 11. c. Icon. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. subrostrata lutea. h

** *foliis ternis.*

3. *paniculata*, aristata, fol. ternis trigonis glabris, flor. lateralibus aggregatis, caule erecto. Pluk. alm 136. t. 279. f. 2. Seb. mus. 2. p. 46. t. 44. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *depressa*, anth. aristatis inclusis, cor. campanulatis, stylo inclusio, flor. raris, fol. ternis, caule depresso. L. Mant. 230. Thunb. Diss. n. 50. t. 6. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei in lateribus rupium et planitie montis Tabularis. Cor. campanulata rubra. h

5. *halicacaba*, anther. aristatis, stylo inclusio, cor. campanulato-ovatis inflatis, flor. terminalibus solitariis, foliis ternis linearib. trigonis. Willd. p. 358. Thunb.

Diss. n. 51. Icon. horti Kewens. t. 2. Lam. ill. t. 288. f. 2. (mala). Hab. in rupibus praeruptis cum priore. Cor. magna, flavo-virescens. h

6. *Monsoniana*, anth. aristatis inclusis, stylo inclusio, cor. oblongo-ovatis, calyce duplici colorato, flor. terminalibus subsolitariis, fol. ternis oblongis obtusis. Willd. Thunb. Diss. n. 52. t. 1. fol. 2. Icon. horti Kewens. t. 7. Hab. in montibus Hottentots Holland. Flor. magno. albi. h

7. *discolor*, anth. aristatis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis, calyce duplici, flor. terminalibus teruis, fol. ternis glabris. Willd. p. 359. E. discolor. Andrews Erica. n. 3. c. Icon. mala. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. pallide purpurea, apice virescens. h

8. *densifolia*, anth. aristatis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis pubescentibus, flor. axillaribus, fol. ternis oblongis imbricatis. Willd. Cor. pubescens. h

9. *cruenta*, anth. aristatis inclusis, stylo exserto, cor. tubulosis incurvis, calyce simplici glanduloso-dentato, flor. axillaribus verticillatis, fol. ternis margine scabris. Willd. p. 360. Icon. horti Kewens. t. 21. Andrews Erica. ic. Cor. panicula cylindrica uncialis, parum incurva, glabra. h

10. *nigrita*, anth. aristatis, cor. campanulatis, stylo inclusio, calycibus imbricatis trifloris sessilibus, cap. tomentosa. E. larinina. Berg. cap. 94. Seb. mus. 2. p. 11. t. 9. f. 7. Hab. in summite montis Diaboli. Flores albi. Antherae obtusae, nigrae. h

11. *phylicoides*, anth. aristatis inclusis, stylo inclusio, cor. campanulatis calyce paullo longioribus, flor. axillaribus natis, fol. ternis sexfariam imbricatis. Willd. p. 361. Habitus Phylliae ericoidis. h

12. *regerminans*, anth. aristatis, cor. ovatis, stylo inclusio, cal. acutis, flor. racemosis. L. Thunb. Diss. n. 54. Caulis, ramis junceis. Cor. ovato-globosa rubra, ore obtuso. Ramus spicam continuat. L. h

13. *urceolaris*, anther. aristatis, cor. ovato-conicis villosis, stylo inclusio, cal. lanceolatis, flor. umbellatis, fol. ternis. Ait. Kew. 2. p. 15. Icon. horti Kewens. t. 16. E. pentaphylla. Lin. Syst. veg. 302. E. caffra. Lin. Sp. pl. Edit. 1. et 2. Seb. mus. 1. p. 32. t. 21. f. 2. h

14. *marifolia*, anth. aristatis, cor. ovato-conicis, stylo mediocri, fol. ternis ovatis, pubescentibus, subius albidis. Ait. Kew. 2.

p. 15. Icon. horti Kewens. t. 14. Rami pilosi. Folia subtus alba. Flores umbellati. h

15. *planifolia*, anth. aristatis exsertis, cor. campanulatis, fol. ternis quaternisque ovatis acutis glanduloso-ciliatis. Willd. p. 362. E. thymifolia. Wendl. obs. p. 48. Pluk. mont. 60. t. 347. f. 1. Rami pilis apice glanduliferis. h

16. *hirta*, aristata, fol. ternis linearibus hispida, flor. umbellatis, cal. scabro rudi. Thunb. Diss. n.º. 56. t. 2. f. 3. Corollae globosae subvillosae, longe pedunculatae. Willd. h

17. *bicolor*, aristata, fol. ternis ovatis scabris, flor. ternis cernuis glabris, cal. villosa colorato. Thunb. Diss. n.º. 51. h

18. *articularis*, anth. aristatis inclusis, cor. globosis cal. colorato multo minoribus, fol. ternis linearibus margine membranaceis. Willd. p. 363. Thunb. Diss. n.º. 58. E. pulchella Andr. E. n.º. 51. c. 10. Cal. ovatus incarnatus. Cor. alba. Stylus atropurpureus Stigma coerulescens. h

19. *viridipurpurea*, anth. aristatis, cor. campanulatis, stylo incluso, fol. ternis, flor. sparsis. L. Syst. veg. p. 301. Lin. Diss. n.º. 9. cum fig. flor. E. pelviiformis. Salisb. l. c. p. 376. Thunb. Diss. n.º. 5. Hab. in Lusitania. Variat fol. quaternis. h

*** foliis quaternis.

20. *cateruaeifolia*, caul. angulato pubescente, tubo anguste obovato. Anth. foraminosis. Salisb. in Act. Soc. Lin. 6. p. 372. E. pubescens. β. villosa. Thunb. In monte Tafelsberg.

21. *pubescens*, fol. laminis parum replicatis fimbriatis, cor. linearibus pubescente, limbo erecto, caps. glabra. Salisb. Andrew. Eric. n.º. 60. ic. E. hirtiflora. Curt. mag. t. . n.º. 481. E. pubescens, var. hirtida. Th. Fol. quaterna.

22. *tardiflora*, cal. adpresso ovato-cuneato, cor. linearibus pubescente, limbo brevissimo recurvo, cap. hirta. Salisb. p. 373. E. pubescens. Curt. mag. n.º. 480.

23. *parviflora*, cal. adpresso rhombo-cuneato, cor. linearibus pubescente, calcaribus auricularibus, caps. glabra. Salisb. E. pubescens. Lin. Diss. de Erica. n.º. 19. E. parviflora. Lin. Sp. pl. p. 606.

24. *exigua*, cal. adpresso ovato commutato, cor. linearibus pubescente, tubo ovali, limbo brevissimo, calcar. linearibus attenuatis, peric. glabro. Salisb. E. pubescens, var. parviflora. Thunb. Fol. 3 - us, saepius 4 - us.

25. *persoluta*, aristata, fol. ternis quaternisque trigonis glabris. flor. umbellatis calyce ciliato. Thunb. Diss. n.º. 62. E. strigosa. Willd. p. 365. Wendl. de Er. sax. 2. p. 25. ic. E. subdivaricata. Berg. cap. p. 114. Hab. in campis arenosis Cap. b. spei. Cor. alba. h

26. *gracilis*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. campanulatis, calyce colorato, lacin. linearibus glabris, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearibus glabris adpressis, caule glaberrimo. Willd. p. 365. Wendl. obs. bot. p. 47.

27. *strigosa*, anth. aristatis, cor. campanulatis glabris, stylo exserto, fol. quaternis pubescentibus ciliatis. Ait. Kew. 2. p. 17. E. axillaris. Salisb. l. c. p. 325. Cor. pallide rubens. Anth. inclinae oblongae nigricantes. Stigm. nigro-purpureum. Ait. h

28. *arborescens*, anth. aristatis, cor. campanulatis, stylo exserto, fol. ternis, ramulis incanis. L. Syst. veg. 302. E. scoparia. Thunb. E. procera. Salisb. l. c. p. 328. Hab. in Europa australi. Flor. Convallariae, albi. Caul. incani. l. h

β. *stylota*. Rudolphi. in bot. Journ. 1800. p. 233. E. arborescens quorund. F. caffra. Lin. Cr. sc. cum antecedente. Styl. cor. multo longior. Stigm. depresso-capitatum.

29. *stricta*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. ovatis, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearibus glabris horizontalibus. Willd. Donn. Catal. horti. Cantab. p. 45. Hab. ad Cap. b. spei et in insula Corsica legit G. Joxy. Cal. viridis. Cor. rubra ovata, lacinis reflexis. h

30. *florida*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. globosis, cal. villosa reflexo, flor. terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus pilosis. Willd. p. 367. Thunb. Diss. n.º. 64. t. 6. f. 2. h

31. *mucosa*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. globosis mucosis, pedunc. ternis terminalibus flore longioribus, fol. quaternis linearibus margine cartilagineo serratis. Willd. Andrews. Erica. ic. Icon. horti Kewens. t. 15. Berg. cap. 112. Hab. ad Cap. b. spei inter urbem et Bay falso. Calyx scarieus mucosus. Cor. mucosa. h

32. *pilulifera*, aristata, fol. quaternis linearibus ciliatis, umbellatis, calyce naviculari apice ciliato glabro. Thunb. Diss. n.º. 65. Habit. in montibus versus Bay falso. h

33. *amoena*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. campanulatis, calyce colorato villosa, flor. axillaribus verticillatis, fol.

quaternis linearibus imbricatis villosis. Willd. p. 368. Wendl. obs. p. 48. h

34. *Tetralix*, anth. aristatis, cor. ovatis, stylo incluso, fol. quaternis ciliatis, flor. apiculatis. Lin. Flor. dau. t. 81. Hab. in Europa boreali. h

35. *inflata*, aristata, fol. quaternis linearibus glabris, flor. umbellatis ventricosis, cal. subulato glabro. Thunb. Diss. n°. 67. t. 2. f. 2. Cor. ventricosa pallide sanguinea, subpollicaris. h

36. *gileæ*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. cylindricis, calycinis foliolis membranaceis, flor. axillaribus verticillatis, fol. quaternis linearibus glabris cartilagineo-mucronatis. Willd. p. 369. Wendl. obs. 48. Cor. magna, sordide flavescens, apice virescens. h

37. *verticillata*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. cylindricis supra basin constrictis, flor. pendulis verticillatis, foliis quaternis patentibus. Willd. p. 370. Andrews-Erica. n°. 27. c. Icon. Cor. coccinea supra basin constricta. h

Obs. Cl. Salisbury (l. c. p. 366.) hanc ut varietatem sequentis respicit.

38. *Pattersonia*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavata, flor. horizontalibus terminalibus, foliis quaternis quinque glabris: junioribus confertissimis. Willd. p. 355. Thunb. profr. suppl. p. 189. E. Pattersonia, Andrews Erica. n°. 7. c. Icon. Wendl. Ericarp. 15. t. 5. Cor. flava. Anth. inclusae.

**** foliis senis.

39. *mammosa*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. clavato-cylindraceis, flor. umbellatis, fol. subsenis linearibus reflexis. Willd. E. abietina. Thunb. Diss. 68. auctoritate ejus specim. Salisb. Buxb. Cent. 4. p. 25. t. 41. 42. E. abietina. Willd. p. 369. excl. syn. Lin. Hab. ad Cap. b. spei. Caulis rigidulus, lineis albis ambuletis a cicutriculis foliorum decurrentibus. Cor. sanguinea, longissima. Antherae cor. longiores. h

40. *empetrifolia*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. campanulatis, flor. verticillatis, fol. senis linearibus pilosis. Willd. p. 371. Thunb. Diss. n°. 70. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. ut Lycopodii, quasi spiralisiter, unde numerus eorum difficilis. Th. h

41. *mollensis*, cal. 4-fido, cor. linearilaevis: subo urceolari, limbo recurvo-patentissimo, caps. hirsuta. Salisb. p. 370.

E. empetrifolia. Schneevogt. n°. 17. c. 16. Habitu praecedentis, sed flor. diversi. S.

42. *spicata*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis, flor. in ramorum apice verticillatis, fol. quaternis senive linearibus glabris. Willd. Thunb. Diss. n°. 71. t. 4. f. 3. Wendl. Eric. 2. p. 27. E. sessiflora. Lin. suppl. 222. Hab. ad Cap. b. spei in montibus inter Nordhoek et Bay falso. Frutex fuscus. Cor. saepius cernuus.

***** foliis octonis.

43. *octophylla*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. cylindraceis ventricosis, flor. umbellato-capitatis, fol. linearibus octonis truncatis. Willd. p. 372. Thunb. Diss. n°. 72. t. 3. f. 1. E. fascicularis. Lin. suppl. 217. Hab. in montibus Houtentous - Holland. Cor. grossa purpurea. Anth. longitudine cor.

Obs. Has duas sub nomine E. radi-florae conjunxit Salisb. l. c. p. 860.

44. *fascicularis*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. cylindricis clavatis, flor. numerosis verticillatis horizontalibus, foliis octonis linearibus glanduloso-denticulatis. Willd. p. 373. Icon. horti Kewens. t. 6. E. coronata. Andrews Erica. Cor. uncialis, sanguinea, apice viridis. Anth. inclusae.

++ Сизтатя. * foliis sparsis.

45. *obliqua*, anth. cristatis, stylo incluso, cor. ovatis viscosis, flor. terminalibus umbellatis, fol. suboppositis sparsis linearibus arcuatis truncatis. Willd. p. 373. Thunb. Diss. n°. 73. t. 1. f. 3. Icon horti Kewens. t. 3. Pedunc. flore longiores coloratis viscidis, bracteis 3 instructi. W.

** foliis oppositis.

46. *vulgaris*, anth. aristatis, cor. campanulatis subaequalibus, calycibus duplicatis, fol. oppositis sagittatis. L. Fl. dan. t. 627. Hab. in campestribus sterilibus, sylvaticis arenosis. Var. fol. hirsutis et squarrosis. vi-l. Willd.

Obs. Hanc stirpem, si quae alia in toto ordine proprium debet constituere genus, jure antiquiore profecto suum nomen retinuerit, sed cum tot aliae stirpes, apud omnes Botanicos jam eodem cognomine gaudeant, satius duxi hanc unam novo insignire titulo: itaque *Callunam* appellavi, ob usum. ejus frequentissimum in scopis conficiendis. *Essentia generis* qua differt ab Erica, est in pericarpio (capsulae) valvis, ad latera loculorum dehiscenibus, septis axi relictis, habitus, absque ullo rudimento petioli pelunculire, omnia sessilis. Salisb. l. c. p. 377.

*** *foliis ternis.*

47. *gnaphalodes*, anth. cristatis, cor. ovatis testis, stylo inclusio, fol. ternis, stigma. quadripartito. Berg. cap. p. 119. Thunb. Diss. n.º 75. Pluck. mant. 63. t. 346. f. 11. Houttuya. t. 23. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei in collibus arenosis. h

48. *corifolia*, anth. cristatis, cor. ovatis, stylo inclusio, col. turbinatis, fol. ternis, flor. umbellatis. Berg. cap. 108. Thunb. Diss. n.º 77. Sch. mus. 1. p. 32. t. 21. f. 3. Pet. gaz. 7. t. 3. f. 7. Hab. in campo sabuloso infra Tasselsberg et Sternberg. Cor. purpurea. Stigma. capitatum.

49. *calycina*, anth. cristatis, stylo inclusio, cur. ovatis magnitudine cal. colorati patentis, fol. ternis adpressis. Willd. p. 3-5. Thunb. Diss. n.º 78. Andrews Erica. ic. Seb. mus. 2. p. 13. t. 11. f. 7. Hab. in summitate montis Tabularia.

50. *bracteolaris*, anth. cristatis inclusis, cor. prismaticis, bract. numerosis induratis purpureis flor. obvolvendis, fol. ternis, flor. fasciculatis. Lam. enc. 1. p. 482. Facie Diosmae. †

51. *triflora*, anth. cristatis, cor. globoso-campanulatis, styl. inclusio, fol. 3-nis, flor. terminalibus. Lin. Mant. p. 374. Thunb. Diss. n.º 79. t. 5. f. 2.

52. *pyrolaeflora*, foliorum laminis euneatis, calyce ovato-curcato, cor. bilt-neari, tubo 4-angulo, spærico, calcaribus late auricularibus. Salisb. l. c. p. 351. E. triflora. Willd. Sp. pl. exclusis synonym. Persimilis præcedenti, sed differt, tubo cor. apice intus sub sinibus limbi, in tot carinas canaliculatas, extremitate pilis aliquot minutis barbatis, prominente. Salisb.

53. *scoparia*, anth. cristatis, cor. campanulatis, stigmata exserto peltato, fol. ternis. L. Syst. veg. 302. E. *fucata*. Thunb. Willd. p. 387. E. *scoparia*, ramis virgatis, fol. ternis patentibus. flor. triplo longioribus, cal. viridibus. Rudolphi in Bot. Journ. 1801. p. 232. E. major scoparia, fol. decelibus. Bauh. pin. 465. E. coris folio IV. Clus. hist. 1. p. 42. Hab. Monsp. in Hisp., Eur. australi. h

54. *Bergiana*, cristata, fol. ternis lanceolatis scabris, flor. subternis, cal. reflexo ciliato. Thunb. Diss. n.º 81. E. *quadriflora*. Willd. Sp. II. p. 379. Wendl. Er. fasc. 2. p. 29. c. Icon. Hab. in Roo de Sands Kloof. Cor. campanulata purpurea obtusa.

55. *formosa*, cristata, fol. ternis ovatis integris glabris, flor. umbellatis sulcatis,

cal. patenti integro. Thunb. Diss. n.º 82. t. 3. f. 3. Fol. obtusa patentia. Cor. albidia, glabrosa. Anth. stylusque inclusus.

56. *rubens*, cristata, fol. ternis linearibus integris glabris, flor. umbellatis globosis, cal. lanceolato brevi, ramis glabris. Thunb. Diss. n.º 81. Cor. sanguinea, magnitudine piperis. Anth. stylusque inclusus.

57. *incarnata*, cristata, fol. ternis ovatis integris glabris, flor. umbellatis ovatis, cal. integro, ramis villosis. Thunb. Diss. n.º 84. Obs. E. *incarnata* hortulanor. diversa est. Cal. foliula glabra, adpressa purpurea. Cor. oblonga alba. Anth. inclusae.

58. *cinerea*, anth. cristatis, cor. ovatis, stylosubexserto, fol. ternis, stigma. capitato. Flor. dan. t. 38. Curt. Lönch. fasc. 1. t. 25. bon. Hab. in Eur. media, inque Oriente, (copiose circa Parisios.) Flor. exsiccati carrulci.

59. *australis* anth. cristatis, cor. cylindricis, stylo exserto, fol. ternis patentibus. L. Syst. veg. 303. Thunb. Diss. n.º 86. Wendl. de Er. fasc. 9. p. 13. ic. Hab. in Hispania. Cor. obtusa, calycis triplo longior, lacin. cur. canescentes. L.

**** *foliis quaternis.*

60. *ramentacea*, anth. cristatis, stylo inclusio, cor. globosis, flor. umbellatis, fol. quaternis linearibus trigonis patentibus glabris. Willd. p. 379. Lam. ill. t. 287. f. 3. Andrews Erica. Wendl. de Er. p. 17. t. 6. Cor. purpurea.

61. *lateralis*, anth. cristatis, cor. globoso-campanulatis, cal. adpressis ciliatis, flor. terminalibus et axillaribus secundis, fol. quaternis glabris horizontalibus. Willd. p. 380. Vur. E. *rubens humilis* Wendl. Er. fasc. 3. p. 13. c. Icon. Fol. accroa, linearitrigona. Flor. numerosi, purpurei.

62. *margaritacea*, anth. cristatis, stylo exserto, cor. globoso-campanulatis, flor. terminalibus subumbellatis, fol. quaternis linearitrigonis glabris erectis. Willd. Ait. Kew. 2. p. 20. Flor. terminales. Cor. alba, tubus urceolatus. Filam. apice inflexa. Stigma subquadrilobum. A.

63. *baccans*, anth. cristatis, stylo inclusio, cor. globosis cal. colorati magnitudine, flor. umbellatis terminalibus, fol. quaternis linearitrigonis margine cartilagineis glabris imbricatis. Willd. p. 381. Andrews Erica. Thunb. Diss. n.º 88. Seba. mus. 1. p. 32. t. 21. f. 3. Hab. in collibus arenosis Cap. b. spei. Pedunc. purpurei. Cor. campanulato-subglobosa, rubra.

64. *pendula*, anth. cristatis, stylo in-

cluso, cor. ovatis, umb. multifloris terminalib., fol. quaternis quiniave glabris oblongis margine revolutis, ramis pendulis. Willd. Wendl. obs. 48. Cor. ovata. Anth. stylusque inclusus.

65. *physodes*, cristata, fol. quaternis linearibus, flor. umbellatis viscosis, cal. ovato brevi. Thunb. Diss. 89. Andrews Eric. 44. c. icon. Hab. in planitie montis Tabularis. Cal. ovatus. Cor. viscida.

66. *laza*, cristata, fol. quaternis linearibus, flor. umbellatis glabris, cal. ovato ciliato. Thunb. prodr. suppl. p. 189.

67. *cernua*, cristata, fol. quaternis ovatis ciliatis, flor. capitatis, cal. ciliato. Thunb. Diss. n.º. 90. E. cernua. Montin Act. ups. 2. p. 291. t. 9. f. 3. mala. Hab. in Koude Bokkeveld. h

68. *lanceolata*, cristata, flor. capitatis cernuis, fol. quaternis lanceolatis erectis glabris. E. cernua lanceolata. Wendl. de Er. fasc. 8. p. 13. ic.

69. *retorta*, anth. subcristatis, fol. quaternis recurvis, cor. ovato-oblongis, stylo medioeri. Lin. suppl. p. 220. Andrews Eric. n.º. 15. Lam. ill. t. 288. f. 1. Hab. in montibus Hottentota - Holland. Cor. inflata, viscida. Filam. linearia, membranacea.

††† ΜΥΤΙΣΜ. * *foliis oppositis*.

70. *tenuifolia*, anth. muticis inclusis, cor. calyceque sanguineis, fol. oppositis. L. Seb. mus. 1. p. 157. t. 73. f. 6.

** *foliis ternis*.

71. *albens*, anth. muticis inclusis, cor. ovatis oblongis acutis, racemis secundis, fol. ternis. L. Mant. 231. Curt. bot. mag. n.º. 440. c. icon. Flor. subspicati, albi. L. ochroleuci?

72. *bracteata*, mutica, fol. ternis lanceolatis glabris, flor. umbellatis bracteis petiolatis coloratis obvallatis. Thunb. Diss. n. 3. Hab. in montibus Platte Kloof. Flor. umbellati bract. obvallati. Bract. interiores otae sanguinesc. Th.

73. *Thunbergii*, anth. muticis medioeribus, cor. planis, tubo globoso, stylo exserto, fol. ternis. Lin. suppl. p. 220. Thunb. Diss. n. 4. Mont. Act. ups. 2. p. 290. t. 9. f. 2. mala. Hab. in Koude Bokkeveld. Caul. rufescens. Flor. terminales pedunculati. Cor. tubus subglobosus. Anth. purpurea, bifidae.

74. *tetragona*, mutica, fol. ternis lanceolatis, flor. racemosis secundis tetragonis.

Thunb. Diss. n. 5. t. 4. f. 2. Lin. suppl. 225. Flor. latei.

75. *umbellata*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, stylo exserto, fol. ternis acerosi. L. Syst. veg. 306. Icon. horti Kewens. t. 5. Loefl. it. 138. Hab. in Lusitania. Anth. basi gibboso-caudatæ. Cor. coerulescentes.

76. *nudiflora*, anth. muticis exsertis, cor. cylindricis, stylo exserto, fol. ternis, ramis tomentosis. L. Mant. 229. Smith, ic. incl. 1. p. 57. Thunb. prodr. suppl. Caul. hispido tomentosus. Th.

Obs. Ab. E. ramosa differt, fol. ternis glabris. calyce glabro. Willd. Fol. ciliata dicit Thunb. l. c.

77. *petiolata*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. campanulatis calyce colorato bracteato parum longioribus, flor. terminalibus, fol. ternis lanceolatis glabris. Willd. p. 186. E. mutica, fol. ternis lanceolatis glabris, flor. umbellatis campanulatis, caule decumbente. Thunb. Diss. n. 7. t. 6. f. 2. bona. Facies Rosmar. offic. Lin. Hab. in mont. Tabulari.

78. *Bryantha*, anth. muticis, stylo exserto, cor. campanulata, flor. racemosis corymbosis, fol. ternis oblongis obtusis. Willd. Thunb. Diss. n. 8. Andromeda, L. Mant. 238. Pall. ross. 2. p. 57. t. 14. f. 1. Bryanthus repens serpillifoli, flor. rosso. Gmel. sib. 4. p. 133. t. 57. fig. 3. Hab. in Sibiria ad portum Ochotsensem, in Camtschatca et in insula Bergii. Planta densis caespitibus uti Serpillum provenit.

79. *Stelleriana*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. campanulatis, flor. terminalibus geminis, fol. subternis oblongo-linearibus obtusis. Willd. p. 387. Pallas, ross. 2. Hab. in Camtschatca. Simillima praecedenti.

80. *axillaris*, mutica, fol. ternis trigonis glabris, flor. racemosis globosis, ramis tomentosis. Thunb. Diss. n. 10. Hab. ad Cap. b. spec. Flor. axillis foliorum solitarii, pedunculati, globosi, minni.

81. *imbricata*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, cal. imbricatis, stylo exserto, fol. ternis. Syst. veg. 306. Lin. Diss. n. 53. cum fig. floris. Hab. in collibus arenosis.

82. *sexfaris*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. campanulatis cal. colorato imbricato brevioribus, flor. ternis terminalibus, fol. ternis linearibus trigonis glabris sextariam imbricatis. Willd. p. 383. Icon. horti Kewensis t. 12. Tota glabra. Flor. tres

brevissime pedunculati, albi. Cal. foliola subrotunda.

83. *melanthera*, anth. muticis mediocribus, cor. campanulatis calyce 4-fida duplo longioribus, stylo longe exserto, pericarpio sericeo, fol. ternis. Lin. Mant. 232. *E. lysimachiaeflora*. Salisb. l. c. p. 332.

84. *cristaeiflora*, anth. muticis, fol. ternis trigonis glabris, flor. umbellatis, calyceib. 4-phyllis, limbo tubo triplo longiore, basi integro, caps. laevi. Salisb. p. 332. *E. melanthera*. Thunb. Diss. n. 12.

85. *leucanthera*, mutica, foliis ternis trigonis glabris, flor. umbellatis, anth. exsertis albis. Willd. Sp. II. p. 389. Lin. suppl. 223. Cor. alba.

86. *taxifolia*, anth. muticis inclusis, cor. ovata calyce colorato tecta, flor. umbellato-corymbosis, fol. linearis-trigonis margine cartilagineis. Willd. p. 380. Icon. hort. Kewent. t. 19. Wendl. Eric. fasc. 11. p. 19. c. Icon. Caul. paniculatis. Cor. tubo carneo, laciniis paucis. Filam. alba. Anth. flavae, ovatae.

87. *spumosa*, anth. muticis inclusis, cor. ternis calyce communi obiectis, stylo exserto, fol. ternis. Willd. Sp. pl. II. p. 390. Hab. ad Cap. b. ap. in planitie montis Tabularis. Cal. imbricatus, sanguineus. Cor. campanulatae flavicantes. Stylus longissimus nutans. L.

88. *capitata*, anth. muticis inclusis, cor. globoso-campanulata cal. lanato tecta, flor. sessilibus, fol. ternis linearibus obtusis villosis. Willd. p. 390. Wendl. Er. ic. Petiv. gaz. 5. t. 2. f. 10. Seba mus. t. p. 30. t. 20. f. 1. Andrews. Er. 34. c. Icon. Cal. lanugine flavescens dense obtusis.

89. *Bruniades*, anth. muticis exsertis, cor. campanulata cal. lanato tecta, flor. umbellatis, fol. ternis linearibus obtusis pubescentibus. Willd. p. 391. Andrews. Eric. ic. L. Syst. veg. p. 306. *E. capitata*. Thunb. Diss. n. 15. Pluck. mant. 69. t. 347. f. 9. optima. Cal. alba lana obiectus tegit totam cor. sul truncatam. L.

90. *carbasina*, anth. muticis exsertis, cor. campanulata, cal. dense lanato 4-phyllis multo longiore, flor. sparsis, nect. sericeo. Salisb. l. c. p. 333. *E. Bruniades*. Lin. mant. p. 378. Fol. praecedentis latiora et magis tomentosa. S.

91. *calyculata*, anth. muticis exsertis, cor. suberectis brevi glabra, flor. ramulorum terminalibus umbellatis, foliis ternis acuminatis ciliatis subulatis imbricatis.

Wendl. de Er. fasc. 4. p. 5. c. ic. Cor. albo-ferruginea. Styl. exsertus.

92. *tenuissima*, anth. aristatis inclusis, cor. minima obovata obtusa glabra, stylo incluso, flor. ramul. terminalibus umbellatis erectis et cernuis, fol. 3-4-nis linearifiliformibus glabris subimbricatis Wendl. de Er. fasc. 6. p. 9. c. ic.

93. *Passerina*, mutica fol. ternis ovatis glabris, flor. subsolitariis, cal. tomentosis. Thunb. Diss. n. 26. Lin. suppl. 221. Petiv. Gaz. t. 3. f. 7. Cor. campanulata. Germen albo-tomentosum.

94. *totta*, mutica, fol. ternis oblongis hispidis, flor. ternis, cal. ciliatis. Thunb. Diss. n. 17. Rami hispidi. Flor. ultimis ramulis terminales, solitarii, cernui, albidii.

95. *absynthoides*, anth. muticis inclusis, cor. ovato-campanulatis viscidis, stylo exserto, stigmae peltato, fol. ternis. L. Syst. veg. 304. Thunb. prodr. suppl. Mant. 66. *E. virgata*. *E. hispidula*. Willd. suppl. 11. p. 394. ex Salisbury. 8. Thunb. Diss. n. 18. Pluck. mant. 68. t. 347. f. 14. In monte Tabulari et in dunis versus Bay falsu. Frutex statura Absynthii paniculatus caule rufo. Cor. pallidae. L.

96. *ciliaris*, anth. muticis inclusis, cor. ovatis grovis, stylo exserto, fol. ternis ciliatis racemis secundis. Syst. veg. 304. Curt. bot. mag. n. 184. c. Ic. bon. Locfl. it. 138. Hab. in Lusitania et in Gallia (Depart. d. Landes.) Bipedalis. Cor. magna, ore contracto.

97. *pilifera*, anth. muticis, fol. ternis glabris mucronato-piliferis, flor. terminalibus aggregatis. Thunb. prodr. suppl. p. 188.

98. *scariosa*, anth. muticis, fol. ternis linearib. glabris, flor. racemosis campanulatis, bract. remotis. Thunb. l. c.

99. *caerulea*, anth. muticis inclusis, stylo inclusis, cor. ovatis, pedunc. terminalibus quaternis quinisque flore nutante multo longioribus, fol. ternis linearibus obtusis cartilagineo-denticulatis. Willd. p. 163. Anomeda caerulea. L. Sp. pl. 563. *A. taxifolia*. Pail. rois. 2. p. 54. t. 72. f. 2. Fl. lapp. t. 1. f. 5. Gmel. sib. 4. p. 131. t. 57. f. 2. In alpihus Norvegiae, Lapponiae, inque Sibiria.

100. *Petiverii*, anth. muticis exsertis, cor. cylindraceis, calycibus foliolis subrotundis bracteatis, flor. pedunculatis solitariis terminalibus, fol. ternis squarrosopatentibus. Willd. p. 394. Lam. ill. t. 288. f. 4. Thunb. Diss. n. 21. Flor. solitarii, terminales. Cor. lutea. Similis *E. Pluckentii*,

*ed Cal. duplex. Cor. luteae, acute quadrifidae. Fol. squaroso-imbricata. Lin.

101. *Banksii*, anth. muticis exsertis, cor. cylindrica limbo revoluta, cal. foliolis coloratis oblongis obtusis bracteatis, flor. sessilibus geminatis terminalib., fol. ternis linearibus clavis erectis. Willd. p. 395. Andrews Erica. n. 26. c. Icon. Caul. decumbens. Fol. lineari-trigona. Cor. viridilutea. Stigma viride. W.

102. *Sebana*, anth. muticis exsertis, cor. clavata incurvata, cal. inis foliolis scarios oblongis obtusis bracteatis, flor. ternis terminalib., fol. ternis linearibus squarropatentibus. Willd. Donn. index horti cantab. 45. Icon. horti Kewens. t. 30. E. Plukenetii. Berg. cap. 91. descriptio. Seba mus. 1. p. 32. t. 21. f. 4.

103. *monadelpha*, anth. muticis exsertis, cor. cylindrico-ovata, cal. foliol. coloratis obtusis bracteatis, flor. ternis terminalib., fol. ternis linearibus obtusis adpresso-erectis. Willd. p. 396. Andrews Erica. n. 22. c. Icon. Filam. dilatata margine leviter cohaerentia. W.

104. *Plukenetii*, anth. muticis longissimis exsertis, cor. cylindricis, stylo exserto, cal. simplicibus, fol. ternis. L. Syst. veg. 325. Thunb. Diss. n. 27. Icon. horti Kewens. t. 9. optima. Chamaepithys aethiopica, fol. laete virentibus, flore oblongo phoeniceo plusquam eleganti. Pluck. mant. 45. t. 344. f. 3. Seba mus. 2. t. 25. f. 5.

Obs. Plures varietates vid. apud Wendl obs. bot. p. 45-46. et Willd. Sp. p. 396.

105. *versicolor*, anth. muticis subexsertis, cor. clavato-tubulosis glabris, flor. pedunculatis terminalibus, fol. ternis linearibus ciliatis. Willd. p. 397. Andrews Erica. Cor. tubus aurantiaco-sanguineus superne flavus, laciniis limbi viridibus. W.

106. *perspicua*, anth. muticis inclusis, cor. tubulosis villosis, flor. sessilibus terminalibus subulatis, fol. ternis linearibus ciliatis. Willd. p. 397. Wendl. Erica. p. 7. t. 1. Er. Linnaei Hortulan. Cor. albidodisphana. W.

107. *Aitoni*, anth. muticis inclusis, cor. hypocrateriformi, flor. umbellatis, foliis ternis linearibus patentibus erectis. Willd. p. 398. E. Aitonia. Andrews Erica. n. 21. c. Icon. Cor. figura et magnitudine Jasmini officinalis. Tubus sanguineus, viscosus. Limbus albus planus.

*** *foliis quaternis, quinis et senis, pluribusve.*

108. *cephalotes*, anth. muticis inclusis,

stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis, cal. pubescentibus, flor. capitato-vericillatis, fol. senis linearibus. Willd. p. 398. Thunb. Diss. n. 23. Cor. purpurea.

109. *pulchella*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-campanulatis, cal. glabris, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearibus. Willd. p. 398. Thunb. Diss. n. 24. t. 4. f. t. E. retroflexa, Wendl. de Er. fasc. p. 3. c. ic. Er. argutifolia. Salisb. l. c. p. 364.

110. *vestita*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. pubescentibus tubulosis curvatis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis adpressis linearibus margine ciliatigineis scabris. Willd. p. 399. Andrews Erica. Var. flor. albis et purpureis.

β. *longifolia*, anth. muticis inclusis, stylo inclusio, cor. pubescentibus tubuloso-clavatis, flor. axillaribus verticillatis, fol. sublenis linearibus margine cartilagineis scabris. Willd. p. 399. Donn. ind. hort cantab. p. 42. Icon. horti Kewens. t. 4. E. pinea. Wendl. Erica p. 11. t. 3.

Obs. Hanc cum priore conjunxit sub nomine *E. longiflorae* cl. Salisbury.

111. *pinex*, anth. muticis inclusis, stylo inclusio, cor. glabris clavato-curveis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearibus necolatis. Willd. Thunb. Diss. n. 26. Cor. alba, pollicaris.

112. *leuca*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. glabris tubuloso-clavatis subtetragonis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis rigidis. Willd. p. 400. Andrews Erica. n. 20. c. Icon.

113. *coccinea*, anth. inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis pubescentibus, cal. villosis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearibus, basi margine glandulosis, subpubescentibus. Willd. p. 400. Wendl. Er. 3. p. 9. c. Icon. Er. abietina. Lin. Sp. pl. et Hort. Cliff. p. 148. n. 9. auctoritate ipsius specimen. Salisb. l. c. p. 364. Seba mus. 2. p. 32. t. 21. f. 4. Cor. pubescentes. Flor. copiosi.

114. *purpurea*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. tubulosa glabra, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearibus. Willd. Andrews Erica. n. 4. c. Icon.

115. *concinna*, anth. muticis inclusis, cor. cylindricis basi attenuatis, flor. terminalibus umbellatis, fol. sublenis glabris. Ait. Kew. 2. p. 27. Er. abietina. Andrews Erica. n. 61. c. Icon. Cor. carnea, extus villosiuscula. Germen turbinatum concavum, margine crenulato. L.

116. *grandiflora*, anth. muticis exsertis, cor. cylindraceis subincurvis glabris, stylo elongato, flor. axillaribus pedunculatis, fol. subsenis acerosis glabris. Willd. p. 104. Icon. horti Kewens. t. 8. Curt. mag. 189. c. Icon. *β. exurgens*. Andrews Erica. ic. Flos maximus aurantio-flavus.

117. *cylindrica*, mutica, fol. quaternis trigonis glabris, flor. terminalibus cylindricis glabris. Thunb. Diss. n. 29. Cor. alba, glabra semipollicaris.

118. *curviflora*, anth. muticis, cor. curvato-clavatis glabris, flor. solitariis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis glabris. p. 402. Wendl. t. Em. 3. p. 7. c. Icon. Andrews Erica. n. 40. c. Icon. Seb. mus. 2. t. 19. f. 5. Hab. ad rivulorum latera prope Drakenstein. Cor. sanguinea glabra.

119. *simpliciflora*, anth. muticis exsertis, cor. tubuloso-clavatis rectis, flor. terminalibus solitariis sessilibus, fol. quaternis lineari-trigonis glabris. Willd. Donn. catal. horti. cantab. 45. Er. curviflora. L. Syst. veg. 305. auctoritate ipsius speciminis. Salisb. l. c.

120. *tudiflora*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubulosis pubescentibus, flor. terminalibus solitariis sessilibus, fol. quaternis lineari-trigonis pubescentibus. Willd. L. Syst. veg. 305. Seb. mus. 2. t. 19. f. 5.

121. *lanata*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis pubescentibus, flor. terminalibus subsolitariis, fol. quaternis linearibus villosis imbricatis erectis. Willd. Wendl. obs. 45. Ej. Er. fasc. 5. p. 5. c. ic. Simillima precedenti, cor. magis curvata, brevior.

122. *spuria*, cal. ovato cuneato, cor. 7-8-linearibus pubescente, tubo cylindrico urceolari, limbo revoluta, pericarpio olivaceo-pyriformi. Andrews Er. n. 46. ic. E. culcitelliflora. Salisb. p. 357. Facie antecedentis.

123. *ignescens*, anth. muticis subexsertis, cor. cylindrica glabra, apice birta, styl. exserto, flor. racemoso-pyramidalibus, fol. quaternis linearibus villosis patentibus. Wendl. de Er. fasc. 8. p. 3. c. ic. Cor. luteo-ignescens.

124. *splendens*, anth. muticis exsertis, cor. tubulosa clavata pubescente, styl. exserto, flor. terminalibus racemosis, fol. quinis plurimisque linearibus glabris obtusis. Wendl. l. c. p. 5. c. ic.

125. *procerus*, anth. muticis inclusis, styl. exserto, cor. tubulosis basi ventricosis, flor.

subsolitariis terminalibus, foliis quaternis linearibus trigonis pubescentibus erectis. Willd. Wendl. obs. 45.

126. *conspicua*, anth. muticis subinclusis, cor. cylindricis curvis longissimis pilosis, limbo revoluta, stylo exserto, fol. quaternis glabris. Willd. Sp. pl. II. p. 404. Ait. Kew. 2. p. 22. Icon. horti Kewens. t. 12. Andrews Erica. n. 29. c. Icon. Cor. flava longe tubulosa, incurva, pubescens.

127. *glandulosa*, mutica, fol. quaternis linearibus glanduloso-pilosis, flor. clavatis glabris, cal. hispidis. Thunb. Diss. n. 32. Cor. cylindrico-clavata, sanguinea, pollicaris.

128. *transparens*, mutica, fol. quaternis trigonis ciliatis, flor. terminalibus subsolitariis. Willd. Sp. pl. II. p. 404. Filamenta in hoc calcitrata. Thunb. prod. 76. E. cerinthoides.

129. *cerinthoides*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. tubuloso-clavatis pilosoviscosis, flor. verticillatis unanibus, fol. quaternis linearibus reflexis villosis glandulosis. Willd. Sp. pl. II. p. 407. Andrews Erica. n. 25. c. Icon. E. coris folio. Breyn. cent. 25. t. 13. Srb. mus. 2. p. 22. f. 4 et t. 34. f. 6.

130. *pectinifolia*, fol. laminis angusto ovato cuneatis, pectinatis, cal. rhombro spatulato, cor. 5-7-linearibus, intus lanatis. Salisb. l. c. p. 367. E. Cerinthoides. Thunb. Diss. 53.

131. *Sprengmanni*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubulosis strigoso-villosis, calyce lanato, flor. sessilibus quaternis, fol. quaternis oblongis ciliatis imbricatis. Willd. p. 405. Lin. suppl. 219. Act. holm. 1798. p. 24. t. 2. Singularis capitulis floribus semper divisis in flores quatuor. Th.

132. *Massoni*, anth. muticis inclusis, cor. cylindricis grossis, flor. capitatis, fol. octofariis imbricatis pubescentibus. Willd. II. p. 406. Icon. horti Kewens. t. 18. Curt. mag. 306. c. Icon. Thunb. Diss. n. 35. t. 3. f. 2. Andrews Erica. n. 9. c. Icon. Hab. in montib. Hottentots Holland. Flor. in capitulo terminali sessiles. Cor. cylindrica grossa.

133. *ventricosa*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. oblongo-ovatis, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearibus ciliatis. Willd. Sp. pl. II. p. 426. Thunb. Diss. n. 36. t. 1. f. 1. Andrews Erica. n. 2. c. Icon.

134. *ampullacea*, anth. muticis inclusis,

stylo exserto, cor. striatis basi globoso-ovatis, superne cylindraceis, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearib. ciliatis reflexis. Willd. p. 406. E. ampullacea. Curt. mag. 303. c. Icon. Cor. pallide purpurea, lineis saturatioribus longitudinalibus, basi globoso-ovata, superne elongata cylindracea, W.

135. *fastigiata*, anth. muticis inclusis, cor. hypocrateriformibus fasciculatis, stylo incluso, fol. quaternis. Syst. veg. 305. Lin. Diss. 44. c. fig. flor. Thunb. Diss. n. 17. Limbus subtus ruber, supra albus, laciniis subcordatis.

136. *incurva*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. campanulatis, flor. terminalibus capitatis, fol. quaternis incurvis ciliatis. Willd. p. 407. Wendl. obs. 47. Accedit ad E. empetrifoliam.

137. *inflexa*, anth. muticis, fol. quinis trigonis incurvis glabris, flor. racemosis ovatis, cal. viridi. E. *incurva*. Thunb. prodr. suppl. p. 188.

138. *globosa*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. campanulatis, cal. imbricatis, flor. terminalibus globoso-capitatis, fol. quaternis linearibus cartilagineo-dentatis, apice callosis. Willd. p. 408. †

139. *comosa*, anth. muticis inclusis, cor. ovato-oblongis, stylo incluso, fol. quaternis, flor. congestis. L. Mant. 234. Thunb. Diss. n. 38. Icon. horti Kew. t. 18. Cor. ovato-cylindrica: limbo plano.

140. *denticulata*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. ovatis, cal. fol. membranaceis ciliato-dentatis, flor. terminalibus sessilibus, fol. quaternis lineari-trigonis glabris. Willd. p. 408. L. Mant. 229. E. *dentata*. Thunb. Diss. n. 39. Caul. distort. E. vulgaris. Cor. subinfundibuliformis.

141. *Muscari*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. ovatis subtrigonis, cal. foliolis lanceolatis integerrimis, flor. terminalibus sessilib. fol. quaternis lineari-trigonis glabris. Willd. p. 409. Andr. Er. Icon. Cor. pallide flavae, subtrigonae.

142. *viscaria*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. campanulatis glutinosis, cal. fol. areis ciliatis, flor. subracemosis, foliis quaternis linearibus glabris. Willd. p. 409. Icon horti Kewens. t. 1. Thunb. Diss. n. 40. Cor. campanulata valde mucosa purpurascens.

143. *pyramidalis*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. hispidis campanulato-infundibuliformibus, flor. umbellatis, fol.

quaternis lineari-triquetris pubescentibus. Willd. p. 410. Ait. Kew. 3. p. 491. Curt. mag. 366. c. 4 con. Cor. campanulato-infundibuliformis pilis brevissimis tecta.

144. *mediterranea*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. cylindraceo-campanulatis, flor. axillaribus, pedunc. flore breviorib., fol. quaternis linearibus glabris. Willd. Curt. bot. mag. n. 471. c. Icon. Thunb. Diss. n. 41. Baub. hist. 1. p. 356. Hab. in Eur. australi. Caul. ramis albicantibus angulatis.

145. *multiflora*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. campanulatis, flor. axillaribus, pedunc. longitudine floris, fol. quinis linearibus glabris. Willd. p. 411. Thunb. Diss. n. 42. E. juniperifolia. Garid. six. 160. t. 32. Hab. in Anglia, G. Narbonensi, Oriente et Redemont. Caul. 2-3 pedali. Cor. potius ovata. Balbis.

146. *herbacea*, anth. muticis exsertis, cor. oblongis, stylo exserto, fol. quaternis, flor. secundis. L. Syst. veg. 306. β . *carnea*. L. Jacq. austr. t. 32. Hab. in Europa australiori.

Obs. Flores autumno col. herbacei, oblongi sunt, vere amoenae rubri: anth. fuscis prominulis.

147. *purpurascens*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, stylo exserto, fol. quaternis, flor. sparsis. L. Syst. veg. p. 306. E. procumbens dilute purpurea. Baub. pin. 486. Hab. in Europa australi.

Obs. Haec cum praecedente a Salisbury. l. c. conjuncta est sub nomine E. *saxatilis*.

148. *vagans*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, stylo exserto, fol. quaternis, flor. axillarib. confertis. Smith. Engl. bot. t. 3. E. multiflora. Huds. Hab. in Africa, Tolosae et in ericetis Cornubiae.

149. *cubica*, anth. muticis inclusis, cor. campanulatis acutis, stylo incluso, fol. quaternis patentibus. Lio. Andrews Eric. 39. (ic. mala.) Thunb. Diss. n. 46. Flor. terminales corymbosi. Cal. scariousus. Cor. purpurea, basi pallida.

150. *racemosa*, mutica, fol. quaternis lanceolatis villinis, flor. racemosis globosis, calycib. tomentosis. Thunb. l. c. n. 47. t. 5. f. 1. Rami verticillati et elongati, pubescentes. Flor. incarnati subnantes in ramulis racemosi. Thunb. Inflorescentia in axillis simplex non racemosa. Salisb. l. c. p. 345.

++++ *Obs.* Numerosae sequentes species seorsim hic enumerantur, cum auctor haud animadvertit, quibus divisionibus sit inserendae.

151. *spiculifolia*, pedunc. bracteatis, cal. breviter 4-fido, cor. 1-lineari, laevi, tubo cyathiformi 4-angulo, filamentis muticis. Salisb. Trans. of the Linnean society. Vol. VI. p. 316. Hab. in monte Olympo. Singularis ob defectum bractearum. S.

152. *asperifolia*, folior. laminis linearibus, cor. lineari viscido, tubo sphaerico, filamentis sarpius calcaratis, pericarpio (caps.) lanato. Salisb. l. c. *E. setacea*. Andrews. Hab. in Hottentots Holland.

153. *oxycoccifolia*, caule decumbente, filiformi, folior. laminis ovatis, cor. lineari campanulata hirsuta, filamentis muticis. Salisb. l. c. p. 325. Cum priore in humidis. Simillima *Vaccinio oxycocco*. L.

154. *sicaefolia*, folior. laminis mucronatis, cor. lineari extus hirsuto, tubo cyathiformi, calcarib. lineari-attenuatis, pericarpio glabro. Salisb. Hab. in Hottentots Holland.

155. *fausta*, folior. laminis setosis, cor. 2-3-lineari, extus pubescente, tubo urceolari, calcaribus aurito-attenuatis, valde serratis. Salisb. p. 326.

Obs. Similis *Er. hirtae* Thunb. sed differt fol. basi latioribus, antheris linearibus, quae in *E. hirta* versus apicem sensim angustatae. S.

156. *tomentosa*, folior. laminis angusto linearibus, cal. planiusculo, cor. linearis, utrinque tomentosa, calcaribus longis recurvis. Salisb. p. 327.

157. *auricularis*, folior. laminis linearis lanceolatis, cor. 2-linearis, extus pubescente, tubo ovato, calcaribus minutis, auricularibus. Salisb.

158. *helianthemifolia*, fol. binis, laminis obovatis planiusculis, cor. lineari, utrinque pubescente, calcaribus longis. Salisb. p. 328.

159. *polytrichifolia*, caule tomentoso, bracteis remotis, cal. basi sensim angustato, cor. lineari, calcaribus curvatis. Salisb. l. c. p. 329. Hab. prope Lisboa. Banks.

Obs. Similis *Er. scopariae*. Sed flores foetidi, cor. oblonga: tubo poculiformi, stigma fibulaeformis, nec peltatum, pericarpium pyriforme. S.

160. *tenuis*, caule divaricato, foliorum laminis linearibus, cor. lineari, campanulata, laevi filamentis brevissimis, calcaribus linearis-attenuatis. Salisb. p. 329. Hab. . . .

161. *glomiflora*, folior. laminis anguste cuneatis, cal. bracteis imbricato, cor. 2-lineari viscido, tubo sphaerico, calcaribus villosissimis. Salisb. l. c. p. 330.

162. *cardunifolia*, folior. laminis setosis, pedunc. longis, cor. 2-lineari laevi, tubo globoso, filam. brevissimis. Salisb. l. c.

163. *tubercularis*, cor. lineari, tuberculis aspera, tubo globoso, filamentis muticis, pericarpio longe stipitato. Salisb. l. c. Hab. . . .

164. *campanularis*, caule glabro, folior. laminis angustis, cor. 2-lineari campanulata laevi, filamentis brevissimis muticis. Salisb. l. c. *E. tenuifolia*. Hortul. Flos Convall. majalis, luteus.

165. *blanla*, flor. glomeratis, cor. lineari, limbo tubo dimidio longiore, lacinia semiorbicularibus, stigmate lato. Salisb. p. 331.

166. *scriphtifolia*, foliolis minute ciliatis, cor. lineari, limbo basi integro obtuso, filam. muticis. Salisb. p. 331. *E. cubica*. Thunb. Diss. o. 46.

167. *lavandulaefolia*, caule incano, bracteis juxta calycem. cor. bilineari, tubo 4-angulo, limbo incurvo, filam. inferoe latissimis. Salisb. Hab. in Hottentots Holland. h

168. *humifusa*, fol. binis, laminis ovalibus, cor. lineari, limbo amplo, stylo longe exserto. Salisb. p. 332.

169. *corydalis*, folior. laminis lanceolato-cuneatis, cor. bilineari, limbo basi integro, antheris dorso alatis. Salisb. p. 334. Hab. ad Cap b. spec. h

170. *asuleaefolia*, folior. laminis lanceolatis, cor. lineari, hirta, antheris exsertis, pene totis foraminosis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

171. *vesicularis*, fol. vesiculis nigris adspersis, cor. lineari, viscido-pubescente, calcaribus parallelis cuneatis, pericarpio sericeo. Salisb. l. c. p. 335. *E. conacea*. Hortulan.

172. *verniciiflua*, fol. viscidis, cor. bilineari, limbo recurvo, calcaribus coriis cuneatis hirtis, pericarpio laevi. Salisb.

173. *Lachneaeifolia*, foliorum laminis ovalibus pubescentibus, cor. bilineari, limbo recurvo, calcaribus longis, anguste cuneatis. Salisb. l. c. p. 335. E. *Lachneca*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

174. *lyrigeria*, fol. lucidis, cor. lineari, limbo recurvo, calcaribus serratis, antheris lyraciformib., pericarpio tomentoso. Salisb. l. c. p. 336.

175. *salar*, fol. lividis, cal. adpressa, cor. lineari, filam. brevissimis, pericarpio laevi, stigmate lato. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

176. *cumuliflora*, fasciculis 7-12-floris, cal. incano, cor. bilineari, limbo inferne ciliato, pericarpio hirsuto, stigmate angusto. Salisb. l. c. p. 336. Hab. in Hottentots Holland.

177. *genistaeifolia*, fasciculis 3-floris, cal. viscido, cor. bilineari, limbo inferne ciliato, pericarpio laevi, stigmate lato. Salisb. l. c. p. 337. Hab. . . .

178. *periplocaeifolia*, foliorum laminis lanceolato cuneatis, pedunc. longis, cal. brevi orbiculari, cor. 1-2-lineari, stigmate angusto. Salisb. l. c. p. 337.

179. *lucida*, cal. minute ciliato lucido, cor. lineari, calcaribus auricularibus, incisoratis, stigmate angusto incluso. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

180. *munda*, bracteis cal. -que integerrimis, cor. lineari, calcaribus auricularib. ciliatis, pericarpio hirsuto. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

181. *fabrilis*, fol. dense imbricatis, cor. lineari, cal. vix longiore, calcaribus integerrimis, antheris minutis, pene didymis. Salisb. l. c. p. 338. Hab. in Hottentots Holland. h

182. *dianthifolia*, fol. latis longis, cal. ovato-cuneato, cor. trilineari, calcaribus serratis, pericarpio glabro. Salisb. l. c. Hab. ad Cap. b. spec. h

183. *brevifolia*, foliorum laminis ovatis, cor. lineari, cal. longiore, calcaribus lineari-attenuatis, seminibus striatis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

184. *chlamydiflora*, foliorum laminis linearibus hirsutis, cor. bilineari, cal. vix longiore, calcaribus auricularibus, seminibus ovatis. Salisb. Hab. in Hottentots Holland. h

185. *selaginifolia*, caule tomentoso,

cor. lineari laevi, tubo globoso, calcaribus latissimis orbicularibus. Salisb. l. c.

186. *pannosa*, foliorum laminis parum reduplicatis, cor. bilineari lanata, filam. latis breviter calcaratis, stylo exserto. Salisb. p. 339. Hab. in Hottentots Holland.

187. *ciliciflora*, fol. ternis minutis, cal. pilosissimo, bracteis distincto, cor. lineari hirsuta tetrandra, filam. muticis. Salisb. Anther. pene didymae, valde herbae. An *Blaeria*, uti 5 sequentes? P.

188. *xeranthemifolia*, fol. ternis, laminis valde incurvis, cal. lanato, imbricato, cor. lineari lanata tetrandra. Salisb. Hab. in Hottentots Holland.

189. *nodiflora*, fol. ternis, cal. infundibuliformi villosissimo, cor. lineari hirsuta tetrandra, anth. breviter foraminosis. Salisb. l. c. p. 340.

190. *asculosa*, cal. limbrato, cor. lineari, tubo angustissimo, superne repente dilatato tetrandra, filamentis angustissimis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

191. *exilis*, fol. quaternis, cal. infundibuliformi glabro, cor. lineari glabra, tetrandra, filamentis muticis. Salisb. l. c. E. *scabra*. Thunb. prodr. p. 72.

192. *labialis*, fol. ternis, laminis glabris, cal. bilabiato limbrato, cor. lineari, 2-bilabiato, 4-5-andra. Salisb. Hab. in Hottentots Holland.

193. *barbigera*, cal. bracteis imbricato, profunde 4-fido barbato, cor. bilineari, glabra, 4-5-andra, filam. muticis, stylo angustissimo. Salisb. l. c. p. 341. Hab. in Hottentots Holland. h

194. *brunaeifolia*, fol. longis, bracteis juxta calycem: extriorae longissima, cor. lineari hexandra, filam. calcaratis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

195. *turmalis*, pedunc. brevissimis, cal. minuto adpresso, cor. bilineari, 4-5-andra, filam. muticis, anth. latis. Salisb. l. c. p. 342. Facies antecedentis, sed penitus distincta, cal. triplo minore. S.

196. *equisetifolia*, fol. ternis, fasciculis 3-5-floris, pedunc. longis glabris, cor. lineari, 4-5-andra, filam. muticis. Salisb. E. *articularis*. Hortulan. Hab. . .

197. *diotaeflora*, cal. late cuneato, cor. lineari, tubo amphora-formi, anth. parum exsertis, pericarpio pubescente. Salisb. p. 352.

198. *manipuniiflora*, caule incano, flor. in axillis intereuptis, cor. lineari, tubo eyathiformi, anth. in sertum erectis. Salisb. p. 344. E. verticillata. Forst. fl. p. 210. Hab. juxta Bujuchtar.

199. *padibunda*, fol. 3-4-nis, cor. bilineari, viscido, tubo ovato, anth. lalis, exsertis hirsutis, pericarpio tuchinato hirsuto. Er. nutans. Wendl. Er. fascic. 3. p. 5. a. icon.

200. *filiformis*, bracteis juxta calycem, cor. lineari glabra, limbo recurvo, anth. longe foraminosis, stigmatibus angustis, fol. ternis. Salisb. l. c. p. 345. Hab. in Hottentots Holland. h

201. *turgida*, pedunc. brevissimis, cor. lineari, hirsuta, tubo modico, calcaribus euneatis, anth. brevissimis. Salisb. p. 345. Hab. . . .

202. *vestiflora*, folior. lamineis incurvo patentibus, junioribus pilosis, flor. solitariis, cor. 9-10-lineari, tubo cylindrato. Salisb. p. 346. Hab. . . .

203. *socciflora*, folior. lamineis renevo-patentibus, cor. 4-6-lineari, tubo ovato-pyramidalis, pericarpio ovato. Salisb. Er. pyramidalis. (p. viridis. Andr. Er. n°. 59. c. Icon. E. *Petiverii* Hortulan.

204. *follicularis*, folior. lamineis patentibus, floribus solitariis, cor. 5-7-lineari, basi inflata, nectario plinthiformi. Salisb. l. c. Er. *Petiveriana*. Andr. Er. n°. 25. c. Icon. Var. (p. Er. inclinata. Andr. Er. n°. 43.

205. *penicilliflora*, cor. bilineari, cal. obdueta, tubo sphacrico, anth. in penicillum auctum convergentibus. Salisb. E. *Petiverii* vera. Hortulan.

206. *placentiflora*, fol. obtusissimis, cor. calyce obliquo, tubo rapaeformi, filam. sensim dilatatis, stigmatibus angustis. Salisb. l. c.

207. *squamiflora*, bracteis supra medium pedunculi sparsulis, cor. lineari, cal. breviori, anth. acuminatis, pericarpio late ovato. Salisb. p. 349. Hab. prope Bay Falso. h

208. *caesia*, cal. bracteis imbricato, cor. lineari, cal. breviori, anth. obtusis, apice lato, pericarpio ovato. Salisb.

209. *flexuosa*, bracteis supra medium pedunculi sparsulis, cor. lineari, cal. longiore, anth. obtusis septo angusto, nectario grandis. Salisb. l. c. p. 349. E. *flexuosa*. Andr. Er. n°. 33. c. Icon.

210. *lasciva*, cal. bracteis imbricato, cor. lineari, cal. parum breviori, anth. a basi foraminosis, stigmatibus peltatis. Salisb. l. c. p. 349. E. *imbricata*. Thunb. Diss. n°. 11. auctoritate ejus specimenis. Facile dignoscas antheris longe foraminosis. S.

211. *styliflora*, pedunc. longis, bracteis juxta calycem sparsulis, cor. lineari calyce parum longiore, anth. acuminatis, pericarpio ovali. Salisb. l. c. Stylus longissimus. Hab. . . .

212. *diosmaefolia*, fol. lividis, cor. bilineari, laciniis imbricatis, filam. angustissimis, calcaribus exquisitis attenuatis serculatis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

213. *palliflora*, caule angulato, folior. lamineis lanceolato cuneatis, cor. lineari calyce parum longiore, calcaribus auricularibus glabris. Salisb. l. c. p. 351. Hab. in Hottentots Holland.

214. *tegulaefolia*, folior. lamineis ovalibus pubescentibus, cor. lineari, tubo paucum 4-angulo unilinato, calcaribus grandibus orbicularibus. Salisb. l. c. p. 351. Hab. in Hottentots Holland.

215. *modesta*, fol. parvis dense imbricatis, cor. 3-lineari tomentosa, tubo late ovato, limbo recurvo, calcaribus linearibus attenuatis. Salisb. l. c. p. 352.

216. *holosericea*, folior. lamineis argute reduplicatis, cor. 3-lineari, holosericea, tubo ovato, anth. hirsutis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

Obs. Species pulcherrima, ab omnibus hucusque cognitis cor. sua holosericea facile dignoscenda. S.

217. *glauca*, fol. tenuis glaucis succulentis, cor. 3-lineari extus torida, calcaribus suborbicularibus. Salisb. p. 353. Andrews Er. 47. cum Icon.

218. *versicolor*, cal. incurvo erecto, cor. 8-lineari, tubo plus minus 6-costato, filam. muticis, basi dilatatis. Salisb. l. c. Andrews Er. n°. 12. c. Icon. Var. fol. viridibus et glaucis, cor. parum vel saturate coccinea: E. *costata*. Andrews Er. n°. 46. c. Icon.

219. *decora*, cal. plano, marginibus erasis, cor. 8-10-lineari, viscido-pubescenti, tubo clavato, calcaribus longis pubescentibus. Salisb. Erica Eweri. Hortulan. Hab. . . .

220. *nana*, caule humifuso, fol. obtusis, cor. 9-11-lineari, extus repulenta, tubo

clavato compresso, calcarib. longis. Salisb. *Er. depressa*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

221. *sacciflora*, cal. late ovato acuminulato, cor. 6-8-lineari glabra: tubo cylindraceo, calcaribus longis, anth. linearibus valde papulosis. Salisb. Habit. in Hottentots Holland. h

222. *cylindriflora*, fol. ciliatis, scis decompositis, cal. recurvulo, cor. 9-lineari glabra, tubo cylindraceo. calcarib. brevibus. *E. serratifolia*. Andrews Er. n. 36. c. Icon. Salisb. l. c. p. 356.

223. *cyrtelliflora*, caul. tenui, cor. 2-3-lineari pubescente, tubo anguste campanulato, limbo brevi, filamentis muticis. Salisb. l. c. p. 357. Habit. in Hottentots Holland. h

224. *velitaris*, cor. 2-3-lineari pubescente, tubo obovato, limbo recurvo patente, calcarib. longis argute cucatis parum serratis. Salisb. Hab. . .

225. *cuspidigera*, pedunc. glabris, cal. ovato-cuspidato, cor. 11-12-lineari, pubescente, limbi interstitiis basi lanceolatis, anth. hirsutis. Salisb. p. 358.

226. *bibax*, (*flammea*), cal. foliolis imbricatis inaequalibus, cor. 8-lineari pubescente, tubo valde clavato, laciniis basi imbricatis. Salisb. *E. curviflora*. Thunb. Diss. 10. *E. flammea*. Hortulan. Hab. ad Cap. b. spec. h

227. *buccinaeformis*, pedunc. pubescentibus, cor. 9-10-lineari pubescente, limbo recurvo patente, filamentis pubescentibus. Salisb. p. 359. *E. tubiflora*. Thunb. Diss. n. 31. Hab. . . †

228. *stagnalis*, folior. laminis hirsutis, pedunc. glabris, cor. 10-11-lineari hirsuta, anth. rectis papulosis. Salisb. Hab. . .

229. *longiflora*, pedunc. glabris, cal. recurvo patente basi extus convexa, cor. 18-20-lineari pubescente, limbo obtuso. Salisb. l. c. p. 359. *E. elata*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

230. *sordida*, ramis sparsis lanatis, flor. saepius solitariis, cal. adpresso basi extus convexo, cor. 12-lineari, rare laeata. Andrews Erica. n. 58. c. Icon. *Er. Luniflora*. Wendl. Er. 2. p. 23. c. Icon. Salisb. l. c. p. 360.

231. *exurgens*, folior. laminis recurvis acutis, cor. 13-15-lineari viscida, tubo infundibuliformi, laciniis ovato-cuneatis.

Andrews Er. n. 13. c. Icon. *Er. pharitraeformis*. Salisb. l. c. p. 361. Dignoscenda ab omnibus aliis, cor. laciniis versus apicem attenuatis bifidulisque. S.

232. *cerviciflora*, cor. 5-6-lineari pubescentula, tubo angusto urceolari, limbo patente, filam. minute calcaratis. Salisb. l. c. p. 362. *E. inaperta*. Hortulan.

233. *calamiformis*, cal. adpresso, cor. 9-10-lineari glabra, tubo cylindraceo-urceolari, limbo recurvo, pericarpio liseri. Salisb. l. c. p. 362. *E. radiata*. Andrews Er. n. 53. c. Icon.

234. *pulviniformis*, folior. laminis attenuatis serrulato ciliatis, flor. in rudimentis ramulorum longiusculis, cor. 7-9-lineari viscida, tubo cylindraceo urceolari. Salisb. l. c. p. 364. Hab. in Hottentots Holland.

235. *scepteriformis*, caul. stricto, pedunc. brevissimis, cal. calloso, foliolis late spatulatis inciso serratis, cor. 7-10-lineari rorulenta. Salisb. p. 365.

236. *claviflora*, pedunc. brevissimis, cal. foliolis orbiculato-apathulatis, integerrimis, cor. 10-12-lineari rorulenta. Salisb. p. 365.

237. *alveiflora*, pedunc. glabris, cor. 7-9-lineari rorulenta, tubo cylindraceo urceolari, inferne 5-angulo. Salisb. l. c. p. 366. *E. gelida*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

238. *brachialis*, cor. 6-8-lineari utrinque hirsuta, tubo curvo pyramidalis, anth. inclusis longissimis. Salisb. l. c. p. 367. Hab. in Hottentots Holland. h

239. *doliiformis*, fol. hirsutis, bracteis juxta calycem, cor. 4-5-lineari viscida, tubo urceolari, calcarib. brevibus cuneatis. Salisb. l. c. p. 368. *Er. mammosa*. Thunb. Diss. n. 60. c. fig.

240. *pyxidiflora*, cal. quadrifido, cor. bilineari laevi, tubo obovato limbo incurvopatente, pericarpio hemisphaerico glabro. Salisb. l. c. p. 371. *E. empetroides* Hortulanis. Flores odorem cerae spirant.

241. *notaeiflora*, cal. tetraphyllo; cor. 2-lineari laevi, tubo calathiformi, limbo recurvo patente, stigmato inclusivo. Salisb. p. 371. Hab. in Hottentots Holland. h

242. *festu*, caule valde angulato, fol. 4-nis, cor. bilineari viscida, tubo angusto urceolari, filamentis muticis. Salisb. l. c. p. 371. Hab. in Hottentots Holland. h

243. *fallax*,

243. *fallax*, cor. bilineari viscida, tubo urceolari parum costato, filamentis longioribus tubi calcaratis, pericarpio viscido. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

244. *parilis*, 3-lineari viscida, tubo urceolari parum costato, flama. vix longitudine tubi minute calcaratis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

245. *pubigera*, cal. patente ovato acuminato, cor. lineari pubescente, limbo longiusculo recurvo, pericarpio hirsuto. Salisb. p. 372.

246. *pusilla*, cal. adpresso late ovato-cuneato, cor. lineari pubescente, tubo calathiformi, limbo longitudine tubi, pericarpio glabro. Salisb. l. c. p. 374. Hab. ad Cap. b. spei. h

247. *transulifera*, cal. imbricato, cor. bilineari tubo urceolari, limbo recurvo, calcaribus hirsutis, anth. latissimis foraminosis hirsutis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

248. *curvirostris*, folior. laminis linearibus, cal. adpresso, cor. lineari, tubo sphaerico, calcaribus pubescentibus, stylo sursum curvo. Salisb. p. 375. E. *declinata*. Hortulan. Flores gravem, saepe nauseosum odorem spirant.

249. *gracilis*, cal. minuto, cor. lineari, tubo ovali, limbo recurvo, calcarib. lineari attenuatis hirsutis. Salisb. l. c. p. 375. E. *imbecilla*. Hortul. Hab. . .

250. *intervallaris*, caule tenui, fol. vorticillis remotis, 1-2-lineari tubo ovato cylindraceo oreolato, pericarpio hirsuto. Salisb. l. c. p. 375. Hab. . .

251. *quadriflora*, caule glabro, cor. lineari, tubo poculiformi, limbo erecto, calcarib. lanceolato-cuneatis integerrimis. Salisb. l. c. p. 375. Hab. in Hottentots Holland. h

252. *turrigera*, fol. angustis, cal recurvo horizontali, cor. bilineari, tubo haemisphaerico, laciniis basi imbricatis. Salisb. l. c. p. 377. E. *capressina*. Hortulan.

253. *turbiflora*, caule glabro, cor. lineari laevi, tubo turbinato 8-angulo, limbo-incurvo, calcaribus auricularibus, glabris. Salisb. l. c. p. 377.

254. *blenna*, folior. laminis ovato-cuneatis, cor. 4-5-lineari viscida, tubo urceolari, laciniis basi imbricatis, flama. latissimis. Salisb. l. c. p. 379. Hab. in Hottentots Holland. h

255. *verecunda*, fol. 4-nis, spicis coar-

ctis, cor. bilineari laevi, tubo amphoraeformi, limbo crenulato. Salisb. l. c. E. *cernua*. Andrews Eric. n°. 48. c. Icon.

256. *pulchella*, cor. bilineari glabra, tubo urceolari, parum 4-gono, calcarib. cuneatis hirsutis, anth. hirsutis. Salisb. Hab. in Hottentots Holland. h

257. *embothriifolia*, folior. laminis linearibus lanceolatis, spicis coarctatis, cor. 4-lineari, tubo superne admodum ventricoso, anth. exsertis. Salisb. l. c. p. 379.

258. *curvifolia*, fol. ternis, laminis recurvis, spicis coarctatis, cor. 4-lineari viscida, tubo ovato pyramidalis, calcaribus lineari attenuatis. Salisb. l. c. p. 380. Hab. in Hottentots Holland. h

259. *squarrosa*, cor. 5-6-lineari viscida, tubo ovato pyramidalis limbo obusio, calcaribus marginalibus, anth. lacibus. Salisb. l. c. p. 380.

260. *capax*, folior. laminis ovato-cuneatis, cor. 9-11-lineari viscida, tubo late ampullaceo, limbo reflexo. Salisb. l. c. p. 381. Hab. in Hottentots Holland.

261. *lagenaeformis*, fol. ternis, cor. 12-14-lineari viscida, tubo ovato apice ventricoso, limbo tubo 4-plo brevior ovato. Salisb. p. 382. E. fol. 3-nis erecto-patulis, cor. lagenaeformi viscida limbi laciniis ovatis, tubo 4-plo breviorib. Vent. Malmaise. t. 33. E. *jasminiflora*. Andrews Erica. n°. 49. Icon.

262. *favettaeflora*, peluoc. brevissimis, cor. 9-10-lineari, limbo intus frasinoso, filamentis juxta apicem antherae calcaratis. Salisb. Hab. ad Cap. b. spei. h

263. *fistulaeflora*, cal. minute ciliato, cor. 5-6-lineari, tubo angusto-cylindraceo urceolari, limbo brevissimo, flama. muticis. Salisb. p. 383. E. *cylindrica*. Thunb. Diss. n°. 39.

264. *nidiflora*, caule pubescente, cal. obcuneato serrato, cor. 3-lineari, limbo tubo timidio brevior, calcaribus minutissimis auricularibus. Salisb.

265. *Walkeria*, caule glabro, cal. anguste lanceolato serrato, cor. 4-5-lineari, limbo duplo brevior, anth. breviter foraminosis. Andrews Erica. n°. 45. c. Icon. E. *pulchra*. Salisb. l. c. p. 384.

266. *daphneiflora*, caule ovato cuneato vix serrato, cor. 3-lineari, limbo tubo duplo brevior recurvo reflexo, filamentis muticis. Salisb. p. 384. Hab. in Hottentots Holland. h

267. *pellucida*, caule gracili, cal. spatulato serrato, cor. 5-6-linearis, limbo tubo triplo brevior, filam. muticis. Salisb. Hab. in Notientosis Holland. h

268. *borbonicaeflora*, fol. binis, cal. 3-linearis, late ovali acuminulata, cor. 3-linearis, tubo ovato, pericarpio obovato. Salisb. p. 386.

269. *hyssopifolia*, folior. laminis pubescentia ciliatis, cor. bilineari, versus apicem litta, laciniis crispis retusis. Salisb. p. 387. Hab. ad Cap. b. spei. prope Bay Falso. h

964. *OPHIRA*. *Involucr.* 2-valve, 2-florum. *Cor.* 4-petala, supera. *Bacca* 1-locularis.

1. *stricta*. Lam. ill. gen. t. 293. Hab. in Africa. Fol. opposita, ovato-linearia. Flor. laterales. h

965. *GRUBBIA*. *Involucr.* 2-valve, triflorum. *Cor.* 4-petala, infera. *Stigma* simplex.

1. *rosmarinifolia*. Berg. cap. 90. t. 2. f. 3. Hab. ad Cap. bon. Spei. Flor. axillares, conglomerati, hirsuti. B. h

966. *LAGETTA*. *Cor.* supera, caduca, tubulosa, quadridentata, glandulis 4, petaliformibus. *Cor.* insertis. *Drupa* pilosa, pisiformis, 1-sperma, infera. Lam., tecta.

1. *linteria*. Lam. enc. 3. p. 376. Ej. ill. t. 289. Daphne Lagetta. Swartz. Flor. ind. occid. 2. p. 680. Willd. p. 419. Hab. in montib. Jamaic. et ad St. Domingo. Cort. interior est compositus e reticulo linteraeformi, unde nomen *bois-dentelle* apud incolat. Flor. spicati. h

Obs. Non solum genere a Daphne differt sed et familia, quae *Elaeagni* est. L.

~~~~~  
*THYMELAEAE* (Gen. 967-972.) instructae sunt cor. (sed potius cal. colorato) 2-petala, infera, tubo in plurimis longo tenui, piloso, ora nunc nuda, nunc squamulis petaloideis aut glandulis obsita. Stam. 2-4-8-10, ut plurimum duplici serie inserta. Pistillum simplex. Fructus est drupa, vel semen 1, nudum, atillatum aut cor. pari. interiore tectum. Caul. plerumque lignosus, frutescens. Fol.

simplicia, integerrima plerique, et communiter alterna.

967. *DAPHNE*. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida, corollacea, marcescens, *Stamina* includens. *Drupa* 1-sperma.

\* *Floribus lateralibus.*

1. *Mazereum*, flor. sessilib. ternis caulibus fol. lanceolatis decidui. L. Flor. dan. t. 268. Hab. in sylv. Var. flor. albis. h

2. *Thymelaea*, flor. sessilibus axillari-bus, fol. lanceolatis, ramis simplicissimis. Vahl. symb. 1. p. 28. D. fol. lanceolatis glaucis utrinque glabris. Lam. encycl. 3. p. 434. *Thymelaea alpina* glabra, flosculis subulatis ad folior. ortum sessilibus. Pluk. alm. 366. t. 299. f. 2. Hab. in Hispania et Mompelii. h

3. *pubescens*, flor. sessilibus lateralibus aggregatis, fol. lanceolato-linearibus, caule pubescente. L. Mant. 66. Hab. in Austria. Flor. angusti, tubo filiformi. Diversa videtur a D. *Thymelaea*. L. h

4. *vermiculata*, flor. sessilibus lateralibus solitariis glabris, fol. linearis-lanceolatis villosis. Vahl. symb. 1. p. 28. Barr. ic. 235. Hab. in Arragonia.

5. *villosa*, florib. sessilibus lateralibus solitariis, fol. lanceolatis planis ciliatis pilosis confertis. L. Sp. pl. 510. Tournef. inst. 504. Hab. in Lusitania et Hisp. Fol. polygoni, utrinque pilis albis remotis oblecta. Flor. angusti, parvi. h

6. *Tartoneira*, flor. sessilibus lateralibus aggregatis, basi squamis imbricatis, foliis obovatis nervosis sericeis. Vahl. symb. 3. p. 53. Lam. ill. gen. t. 290. f. 2. *Tartoneira galloprovinciae mompeliensis*. Lob. ic. 371. Barr. ic. 222. Habitat in Galloprovincia. Flor. passim solitarii dioici? h

7. *tomentosa*, flor. sessilibus axillari-bus, col. oblongis obtusis utrinque sericeo-tomentosis. Lam. enc. 3. p. 436. An Till. Pis. 165. t. 49. f. 2. 7. Hab. in Oriente. Antecedenti affinis, sed major.

8. *nitida*, flor. lateralibus aggregatis sessilibus basi nudis, fol. linearis-oblongis sericeis enerviis. Vahl. symb. 3. p. 53. *S. argentata*. Lam. enc. 3. p. 436? Hab. in mont. calcareis Tuneti. h

9. *alpina*, florib. sessilibus aggregatis

29. *lateralibus*, fol. lanceolatis obtusiusculis, sulcatis tomentosis. L. Pluck. alm. 366. t. 299. f. 3. Hab. in alpinis. h

30. *coridifolia*, flor. axillaribus sessilibus solitariis conferto-spicatis, fol. linearibus subulatis nudis. Lam. l. c. Ej. ill. gen. t. 290. f. 3. Hab. in Hispan., Gallicia. Herb. Juss. Parva, facie Ericae.

31. *thesioides*, flor. axillarib. sessilibus subgeminis, fol. linearibus glabris, ramulis simplicibus. Lam. l. c. p. 437. et Ej. ill. f. 4. Cresc. cum priore?

32. *Laureola*, racemis axillaribus quinquefloris, fol. lanceolatis glabris. Lam. Jacq. Flor. austr. t. 183. *Laureola*. Dod. Blackw. t. 62. Hab. in sylv. Europ. australioris. Sempervivens. Flor. virescentes.

33. *pontica*, pedunc. lateralibus bifloris, fol. lanceolato-ovatis. L. Andrew. Repert. t. 73. Tournef. itin. 3. p. 180. t. 180. Hab. in Ponto in oriente. Flor. penduli, acuti, rari. h

34. *pendula*, capitul. lateralibus pedunculatis involucrentibus nutantibus, fol. lanceolato-ellipticis alternis glabris. Smith. ic. ined. t. p. 34. t. 34. Willd. Sp. p. 410. *Scopolia* composita. Lin. suppl. 409. Hab. in Java. Arb. Stipulae nullae. Pedunc. in axillis foliorum post eorum casum solitarii nutantes filiformes. S.

\* \* *Floribus terminalibus.*

35. *tinifolia*, racem. compositis erectis, flor. terminalibus confertis, fol. oblongis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 683. Habit. in montib. Jamaicae.

36. *Gnidium*, racem. terminalibus paniculatis, fol. linearibus lanceolatis acuminato-cuspidatis. Willd. p. 420. Hab. in Hisp., Italia, G. Narbonensis, et in Barbaria, in locis aridis. Flor. parvi, odorantia, albicantes.

37. *rotundifolia*, hirsuta, flor. terminalibus congestis sessilibus, fol. oppositis ellipticis subpetiolatis obtusis glabris. Lin. suppl. 223. Hab. in ins. Namuka. Rami tomentosi. h

38. *foetida*, glabra, flor. terminalibus congestis sessilibus, fol. oppositis petiolatis ovato-oblongis acutis. Lin. suppl. 223. Hab. in insula Tahiti. An distincta a priore?

39. *indica*, capitulo terminali pedunculato, fol. oppositis oblongo-ovatis glabris L. Hab. in China. Odor gratissimus. †

40. *odora*, capitulo terminali subsessili multifloro, fol. sparsis oblongo-lanceolatis glabris. Ait. Kew. 2. p. 26. Banks ic. Kaempf. t. 16. Hab. in China, Japonia. Flor. albi, odorati. An eadem ac *indica*?

41. *occidentalis*, pedunc. axillaribus, flor. terminalibus umbellatis dioicis, fol. alternis lanceolatis glabris. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 685. Hab. in mont. Jamaicae australis. h

42. *Cneorum*, flor. fasciculatis terminalibus sessilibus, fol. lanceolatis nudis mucronatis. L. Pollich. Flor. pal. t. 1. f. 4. Jacq. Fl. austr. t. 426. Duham. arb. 2. t. 94. Hab. in montosis et subalpinis. Caul. humifusi. Flor. suaveolentes, rubri. Vere et aestate denuo floret. h

43. *altaica*, flor. terminalibus subsessilibus, fol. oppositis oblongo-lanceolatis obtusis basi angustatis glabris. Willd. Pall. ross. 1. p. 53. t. 35. Hab. in Sibiria, in alpinis Altaicis. Flor. albi, in capitulum congesti. h

44. *squarrosa*, flor. terminalibus pedunculatis, fol. sparsis linearibus patentibus mucronatis. L. Burm. afr. 134. t. 49. f. 1. Hab. in Aethiopia, et in Cap. b. spei. h

45. *glomerata*, flor. subsessilibus glomeratis terminalibus, fol. ovato-lanceolatis glabris involucrentibus; caule simplicibus. Lam. enc. 3. p. 435. Hab. in Oriente. Flor. albi. h

46. *oleoides*, flor. geminis terminalibus sessilibus, fol. elliptico-lanceolatis glabris. L. Schreb. dec. 13. t. 7. D. salicifolia. Lam. enc. 3. l. c. Alp. exot. 44. t. 43. Hab. in Creta. Flor. parvi, albi, 2-3.

47. *collina*, flor. fasciculatis terminalibus, fol. obovatis obtusis supra glaberrimis subtus villosis. Smith spicil. t. 18. Duham. ed. nov. 1. t. 11. D. *sericea*, flor. aggregatis terminalibus sessilibus, fol. lanceolatis subtus villosis, lacinis corollae obtusis. Vahl. symb. 1. p. 28. D. *oleae* folia. Lam. l. c. p. 440. Habit. in collibus Italiae australis, et in Creta. h

48. *DIRCA. Cal. o. Cor. tubulosa limbo obsolete. Stam. tubo longiora. Bacca 1-sperma.*

1. *palustris*. L. Lam. ill. t. 293. Duham. arb. 1. t. 212. Hab. in Virginiae paludosis. h

969. *GNIDIA*. *Cor.* infundibuliformis, 4-fida et squamis 4-8-petaloidis ad faucem. *Nux* subdrupacea. (Semen subbaccatum.)

1. *pinifolia*, fol. sparsis trigonis, flor. umbellato-capitatis. Thunb. prod. p. 76. Willd. p. 434. Ramis verticillatis. Andrew. t. 52. Wendl. obs. bot. p. 15. t. 2. f. 17. Lam. ill. t. 291. f. 1. Hab. ad Cap. b. spri, cum speciebus sequentibus, quae sunt Fl. involucri, albi Anth. quatuor supra faucem pilis cinctae. h

2. *juniperifolia*, fol. lineari-subulatis planis laevibus, ramulis glaberrimis, flor. solitariis binive glabris terminalibus. Lam. enc. 2. p. 765. *G. pinifolia*. Lin. f. suppl. p. 225.

3. *radiata*, fol. subulatis triquetris acutis, capitulis terminalibus sessilibus radiatis, bracteis lanceolatis. L. Wendl. l. c. t. 2. f. 12. Scaber, prolifer. Petala pilosa. h

4. *carinata*, fol. lanceolatis obtusis carinatis glabris, floribus capitatis. Thunb. prod. 76.

5. *scabra*, fol. lanceolatis acutis scabris, flor. capitatis. Thunb. prod. 76.

6. *simplex*, foliis omnibus linearibus acutis, flor. terminalibus sessilibus. Lin. Andrew. l. 20. Brey. cent. 10. t. 6. Flor. ex apice rami villosa, lutea.

7. *capitata*, fol. sparsis lanceolatis glabris, flor. capitatis, bracteis obvallatis, pedunc. nudo. Lin. suppl. p. 224. Thunb. prod. 76. Flos *Passerinae* similis. †

8. *laevigata*, fol. oppositis ovatis glabris, quadrifariam imbricatis, flor. terminalibus subcapitatis. Thunb. prod. 67. Wendl. obs. p. 17. t. 2. f. 14. Andrew. t. 89. Lam. ill. t. 291. f. 2. Flor. flavi.

9. *biflora*, fol. sparsis lanceolatis glabris, flor. lateralibus binis, ramis divaricatis. Thunb. prod. p. 76.

10. *racemosa*, fol. obovato-lanceolatis laevibus glabris, flor. racemosis axillaribus. Thunb. prod. p. 76.

11. *tomentosa*, foliis sparsis ovato-oblongis glabris, margine scabris. Lam. G. pubescens. Berg. cap. 124.

12. *argentea*, fol. sparsis obovatis tomentoso-argenteis, flor. capitatis Thunb. prod. p. 76.

13. *imbricata*, fol. oblongis quadrifariam imbricatis sericis, flor. terminalibus in axillis foliorum. Lin. suppl. 225.

14. *sericea*, fol. oppositis ovatis tomentosis, flor. terminalibus. Thunb. prod. p. 76. Wendl. obs. p. 16. t. 2. f. 13. Lam. ill. t. 291. f. 3. *Passerina sericea*. L. Faux floris coronata filis 8 coloratis. L.

15. *oppositifolia*, fol. oppositis lanceolatis ovatisque tomentosis, flor. terminalibus. Thunb. prod. p. 76. Andrew. t. 225. β. *Passerina laevigata*, fol. ovatis glabris acutis, flor. obtusis. L. Spec. pl. 2. p. 513. *Nectandra laevigata*. Berg. cap. 134. Squamulae 8. Burm. afr. p. 137. t. 49. f. 3.

16. *daphnaefolia*, decandra, fol. oblongis planis integerrimis, capitulo terminali pedunculato involucreto, floribus quinquefoliis. Lin. suppl. 225. Hab. in Madagascar. Var. fol. hirsutis et nudiusculis, et flor. magnitudine. Involucr. ut in Daide, sed pentaphyllum. h

970. *STELLERA*. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida, medio ventricosa. *Stam.* fauci inserta, brevissima. *Nux* 1, rostrata.

1. *Passerina*, fol. linearibus, flor. axillaribus quadrifidis. Willd. Sp. II. p. 429. Hab. in agris, inter segetes. Facie Thesii.

2. *altaica*, fol. lanceolatis acutis, flor. capitato-racemosis quadrifidis. Habit. in montib. altaicis. Thiebaut.

3. *Chamaejasme*, fol. lanceolatis, flor. terminalibus racemosis nudis quinquefoliis. Willd. Amm. ruth. 16. t. 2. Hab. in Siberia.

971. *PASSERINA*. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida, nuda. *Stylus* filiformis, lateralis, longus. *Stam.* tubo imposita. *Nux* 1, corticata.

1. *filiformis*, fol. linearibus convexis quadrifariam imbricatis, ramis tomentosis. L. Wendl. obs. p. 18. t. 2. f. 15. Willd. Sp. II. p. 430. Brey. cent. 10. t. 6. Hab. in Aethiopia, ad Cap. b. spei. h

2. *hirsuta*, fol. carnosis extus glabris, caulib. tomentosis. L. Wendl. l. c. t. 2. f. 16. P. *Metnau*. Forsk. Hab. in Gollo-provincia, Italia, Oriente et Barbaria. h

3. *salsolaeifolia*, fol. subulatis hirsutis, tubo elongato superoe incrassato tomentoso. Poirret Enc. 5. p. 41. Hab. . . Herb. Lam.

4. *ericoides*, fol. linearib. laevibus subimbricatis, cor. globosis. L. Hab. ad Cap. b. spei. Facies tota Ericae. 1. h

5. *nervosa*, fol. lanceolatis glabris tricoctatis, flor. capitatis. Thunb. prod. 75. Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *cephalophora*, fol. trigenis quadrifariis, capit. lanatis. Thunb. prod. 75. Hab. ad Cap. b. spei. h

7. *capitata*, fol. linearibus glabris, capit. pedunc. tomentosis. L. Wendl. p. 18. t. 2. f. 17. Lam. ill. gen. t. 291. f. 3. Burm. afr. 1. 48. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Siam. supra faucem 16, quorum 8 interiora castrata. h

8. *globosa*, fol. suborbiculatis eymbiformibus interiorib. glabris, superiorib. hirsutissimis, flor. glomeratis. Poir. l. c. p. 42. Lam. ill. gen. t. 291. f. 4. Burm. afr. 1. 46. f. 3? Hab. ad Cap. b. spei. h

9. *orientalis*, fol. lanceolatis subcarnosis obtusis glabriusculis, flor. axillarib. Willd. p. 431. Hab. in Oriente et in Hispania. h

10. *ciliata*, fol. oblongo-lanceolatis ciliatis, flor. axillaribus, caule villosa. Willd. Burm. afric. 129. t. 47. f. 2. Selinus. 2. 1. 12. f. 9. Hab. ad Cap. b. spei. Flores purpurei. h

11. *doica*, flor. axillaribus geminis, fol. linearilanceolatis glabris. Lin. suppl. p. 223. Gouan. illustr. p. 17. t. 17. f. 1. Lam. enc. 3. p. 419. sub Daphne. Ilab. in Pyrenaeis. Flor. axillares, bini, albiflavescetes. h

12. *calycina*, flor. axillarib. solitariis calyculatis, fol. linearilanceolatis glabris, caulib. prostratis. Lapprouse. Mem. p. 2. t. 15. Lam. l. c. f. 3. Willd. p. 416. Sub Daphne. Cum priore.

13. *nivalis*, ramis prostratis, fol. linearibus obtusiusculis carnosius subciliatis, flor. axillarib. dioicis. Ramond in Bullet. d. scienc. n. 41. p. 131. f. 4. Hab. in summis Pyrenaeis, circa Mont-Perdu. Rad. crassa, ramosa. Flor. flavescentes. An a priore satis diversa?

14. *tinctoria*, fol. linearib. obtusius tomentosis, flor. axillarib. sessilibus. Pourret Chlro. narbon. p. 27. Hab. in G. Narbonni. a Baecelone ad Mont-Ferrat. Flor. flavi. Tincturac inservit.

15. *nitida*, fol. confertis enerviis linearibus obtusiusculis sericeis, flor. axillarib.

glomeratis sessilibus. Desf. Atl. 1. p. 331. t. 94. Daphne nitida. Vahl. symb. 3. p. 53. Halit. in montosis incolitis in Barbaria. Magnitudine variat. Flor. pallidi.

16. *virgata*, ramis virgatis villosa tomentosis, fol. lanceolatis villosis obtusis, flor. axillarib. aggregatis sessilibus. Desf. l. c. t. 95. Hab. in oris Barbariae prope Flemsen. Flor. albi.

17? *striata*, fol. ovatis acutis argute striatis, flor. subaggregatis, limbo patulo. Poir. enc. bot. 5. p. 44. Lam. ill. f. 291. f. 2. Hab. . . Fruct. ignotus.

18. *uniflora*, fol. linearibus oppositis, flor. terminalibus solitariis, ramis glabris. L. Wendl. obs. p. 19. t. 2. f. 19. Lam. ill. t. 291. f. 1. Hab. in Aethiopia. h

Obs. Antherarum rudimenta 8 latent in fundo floris. Lin., quae secundum Wendl. squamae glandulaeformis sunt, ut in quibusdam *Gnidiis*, quare haec species, uti putat, potius ad hoc genus transferri posset.

19. *grandiflora*, glaberrima, fol. oblongis acutis concavis extra racosis, flor. terminalibus sessilib. solitariis. Lin. suppl. p. 226. Hab. in Africa. Rami uniflori.

20. *canescens*, fol. oblongis quadrifariam imbricatis lanato-tomentosis, flor. terminalib. lanatis. Willd. p. 432. Hab. in Marocco. h

21. *spicata*, fol. ovatis villosis, flor. lateralibus solitariis. Lin. suppl. p. 226. Wendl. t. 2. f. 19. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequentibus; refert spicam foliosam.

22. *laxa*, fol. ovatis sparsis, flor. capitatis, ramis laxis cernuis. Lin. suppl. p. 226. Wendl. t. 2. f. 20. Similis P. ericoidi.

23. *stricta*, fol. ovatis hirsutis, flor. capitatis, ramis rigidis. Thunb. prod. 75.

24. *anthylloides*, fol. ovatis villosis, flor. capitatis hirsutis. Lin. suppl. p. 226. Flor. extus albi, intus lutei.

25. *pentandra*, fol. ovatis hirsutis, spicis ovatis terminalib. Thunb. prod. p. 76.

Obs. Hoc genus Daphnis valde est affine, fructu tamen differi. Ab eo vero Pamelae nisi staminum numero diversae videntur.

972. LACHNÆA. Flor. capitato-couglomerati. Cal. o. Cor. 4-fida: limbo inequali. Filam. E c 3



longa, situ subæqualia. *Nux* subdrupacea.

1. *Erioccephala*, capitulis solitariis lanatis, foliis quadrifariam imbricatis. L. Willd. p. 434. Andrew. t. 104. Lam. ill. gen. t. 202. f. 3. Thunb. prod. 75. sub Passerina. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spei, cum sequentibus. Capitula cinerea lana candida, bracteisque membranaceis.

2. *conglomerata*, capitulis confertis, fol. laxis. l. *phylloides*, foliis linearisubulatis glabris laxè imbricatis, capitulis confertis tomentoso-albis. Lam. enc. 3. p. 374. ill. gen. t. 202. f. 2.

3. *buxifolia*, fol. ovalibus sessilib. glaberrimis, flor. capitatis tomentoso-lanatis. Lam. l. c. p. 373. ill. t. 202. f. 1. Onidia filamentosa. Lin. suppl. p. 224.

### D I G Y N I A.

973. *GALENIA*. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Caps.* subrotunda, 2-sperma.

1. *africana*, erecta fruticosa, fol. linearibus sub-arnosis. Lin. suppl. p. 227. Willd. Sp. II. p. 436. Lam. ill. t. 314. Hab. in Africa. Flor. sessiles, pallidi, minuti, in panicula dichotoma.

2. *procumbens*, procumbens, fol. ovatis canaliculatis apice paulo recurvato. Lin. suppl. l. c. Thunb. prod. p. 77. Hab. ad Cap. b. spei.

974. *WEINMANNIA*. *Cal.* 4-phyl-lus. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 2-locularis, birostris.

#### \* *Foliis compositis.*

1. *glabra*, fol. pinnatis, foliol. obovatis crenatis laevibus. Lin. fil. suppl. Lam. ill. gen. t. 313. f. 1. W. pinnata. L. Sp. pl. 515. Hab. in Jamaica. Fol. pinnata, petiolo communi alato, articulis subovatis. Racemi terminalis. h

2. *trichosperma*, fol. impari pinnatis, petiol. communi alato: articulis quadrangularib., racem. axillarib. Cav. ic. 6. p. 45. t. 567. Hab. in San Carlos de Chila.

3. *hirta*, fol. pinnatis, foliolis ovatis serrato-crenatis, subtus racemisque hirsutis. Swartz. Fl. ind. occ. 2. p. 691. Hab. in altis montibus Jamaicae australis. Articuli petioli communis subcordati. h

4. *tomentosa*, foliis pinnatis, foliolis ovatis integerrimis subtus tomentosis, stipulis caducis. Lin. suppl. p. 227. Hab. in

N. Granada. Arb. valde ramosa. Petiol. communis articulis obovatis. Racemi versus apicem densissimi, quasi spicae.

5. *trifoliolata*, fol. ternatis, foliol. elliptice lanceolatis serratis glaberrimis, panic. compositis. Lin. suppl. p. 227. Lam. ill. t. 313. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

#### \* *Foliis simplicibus.*

6. *racemosa*, fol. simplicibus obovato-ellipticis obtusis dentatis, racemis glabris. Willd. p. 438. Stipulae nullae. Lin. suppl. p. 227. Hab. in N. Zeelandia.

7. *parviflora*, fol. simplicib. ovatis serratis subsessilibus, racemis terminalibus ternis quinisque. Forst. Hab. in ins. Tabaeis.

8. *ovata*, fol. simplicib. ovatis crenato dentatis, flor. racemosis. Cav. l. c. p. 45. t. 566. Hab. in fossis in Peruv. Arb. 18-petalis. Germ. auctum disco 8-glanduloso, uti in praecedente. C.

9. *paniculata*, fol. simplicib. lanceolatis serratis, flor. paniculatis. Cav. ic. 6. p. 44. t. 565. Hab. in R. Chilensi ad littora. Arboresc. Flor. nonnulli 5-petali, trisyni. C.

975. *CODIA*. *Cal.* 4-phyl-lus. *Cor.* 4-petala. *Receptaculum* commune involucreatum. *Involucreum* 4-phyl-lum.

1. *montana*, montana. Lin. suppl. 288. Forst. gen. n°. 30. Lam. ill. t. 314. Hab. in N. Caledonia. Fol. opposita elliptica. Capitula globosa, h

976. *MOEHRINGIA*. *Cal.* 4-phyl-lus. *Petala* 4. *Caps.* 1-locularis, 4-valvis.

1. *muscosa*. L. Lam. ill. t. 314. Alsine, fol. linearibus connatis. Hall. Scheuch. alp. 503. t. 6. Pluck. alm. 13. t. 75. f. 1. Hab. in alpinis et montosis in sylvis muscosis et ad fontes et scaturigines. T.

2. *sedoides*, seu *dasiphylla*, fol. brevioribus, crassioribus, caul. elongato nudo? - Balbis Miscell. bot. p. 20. t. 5. Hab. prope Turin ad rupes, locis siccis. An distincta species? Sedum dasiphylum referre dicitur.

Полноцвѣт. Stamina calyci s. corol. calycinæ insident, definita. Fructus a

semen unicum, nudum aut calyce tectum, cujus embryo perispermio farinaceo est immersus. Fol. alterna, vagina stipulari distincta. Caul. plerisque herbaceus, etiam arborescens. Præter sequentia 3 genera huc etiam pertinent Rumex, Rheum, Astraphaxis et Eriogonum?

## T R I G Y N I A.

977. POLYGONUM. Cal. o. Cor. 5-partita, calycina. Sem. 1, angulatum, tectum. (Stam. et styli numero incerti.)

\* *Atraphaxoides caule frutescente*, flor. racemosis.

1. *frutescens*, caule fruticoso, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, ochrea lanceolata internodiis brevior, petalis binis exterioribus minoribus reflexis. Willd. Sp. II. p. 440. P. caule fruticoso, calycinis foliolis duobus reflexis. L. Gmel. sib. 3. p. 68. t. 12. f. 2. Lam. ill. t. 315. f. 2. Hab. in Sibiria, Dauria. ♀

2. *grandiflorum*, caule fruticoso, fol. ovato-oblongis acutis, ochrea lanceolata internodiorum longitudine, pet. aequalib. erectis. Willd. Hab. in Oriente. Facie Polygalæ Chamaejas. Flor. axillares pedunculati maximi hujus generis, Myrti communis fere magnitudine. W.

3. *polygamum*, caul. ramosissimo, fol. spathulatis, cor. obovatis patentib., ochreis integris. Vent. Hort. Cels. p. 61. t. 63 Polygonella parvifolia. Michaux. Flor. 2. p. 240. Hab. in Carol. aridis. Flor. racemosi polygami. V., spicati dioici. M. ♀

\*\* *Flor. axillaribus.*

4. *maritimum*, flor. octandris trigynis axillaribus, fol. ovali-lanceolatis semper-virentibus, caule suffrutescente. Hab. in littoribus. ♀

\* *littorale*, fol. crassis succulentis, caul. minus ramoso. Link in Schrad. bot. Jour. 1800. p. 54. P. marinum. Roj. Syn. p. 147. exc. synonym. Smith. brit. 1. p. 429.

5. *aviculare*, caul. decumbente, herbaceo, flor. octandris trigynis axillaribus, fol. lanceolatis, margine scabris, stipul. nervis remotis. Smith. brit. p. 429. Lam. ill. t. 325. f. 1. P. caul. procumbente herbaceo. L. Hab. in cultis ruderalis ad vias. Var. fol. latis, et caul. erecto 1. P. *erectum*. Roth. germ. II. p. 458.

\* *monspeliense*, erectum, fol. ellipticis crenulatis, caul. erecto, stipulis scariosis incis. Hab. Monspelii. Thiebaut. Distincta species videtur.

6. *arenarium*, flor. 8-andris trigynis, spicis terminalib. aphyllis, fol. lanceolato-linearibus, caulibus angulatis declinatis herbaceis. Plant. rar. Hungar. p. 69. t. 67. Cre. c. in arena mobili in Hungaria. Cal. corollinus magnus, primo purpureus, dein albo-rubellus, tandem atrosanguineus. P. avicul. afflu. l. c.

7. *ramosissimum*, flor. triandris, trigynis, caulib. strictis ramosissimis striatis, stipul. abbreviatis margine laceris, fol. lanceolatis. Michaux. Flor. 1. p. 238. Hab. in regione Illinoensi. Facie P. avicularis.

8. *tenue*, pumilum, caul. gracili ramoso acutangolo, fol. longis linearibus strictis acuminatis, stipul. tubulosis apice villosis, flor. alternis subsolitariis. Mich. p. 238. Hab. in Canada. Stip. castaneæ.

9. *Bellardi*, erectum, flor. axillaribus octandris trigynis, fol. elliptico-lanceolatis, vaginis ciliatis. Allion. pedem. n°. 2052. t. 90. f. 2. Hab. in agro Pedemontano, in Gallia et prope Lisbon.

10. *setosum*, flor. octandris trigynis, axillaribus, fol. subulato-linearib., stipulis setaceo-laceris, caul. subfruticoso. Jacq. obs. 3. p. 8. t. 57. Hab. in Armenia. ♀

11. *erectum*, flor. octandris trigynis axillaribus, fol. ovalibus, caul. erecto herbaceo. L. Hab. in Philadelphia. ☉

\*\*\* *Flor. spicatis, spicis teretibus.*

12. *Bistorta*, caule simplicissimo monostachyo, fol. ovatis in petiolum decurrentibus. L. Flor. Dan. Engl. bot. t. 509. Hab. in montibus et pratis humidis. ♀

13. *viviparum*, caule simplicissimo monostachyo, fol. lanceolatis, margine revolutis. Smith. brit. 1. p. 428. Flor. dan. t. 13. P. fol. nervosis, radicalibus ovato-lanceolatis, caulibus linearibus. Hall. helv. n°. 1558. Pluck. t. 151. f. 2. Hab. in subalpinis, pascuis duris.

14. *lapathifolium (pallens)*, floribus hexandris digynis, stipulis mucis, pedunc. scabris, seminibus utrinque concavis. Ait. Kew. 2. p. 30. P. pennsylvanicum. Curt. lond. ic. P. scabrum. Moench. meth. Hab. promiscue cum sequente, pro cuius varietate ut plurimum habetur, spica pallida et pedunc. scabris distinctum. ♀

E c 4

\* *nodosum*, caul. elongato maculato ad geniculos nodoso, vaginis nudis, fol. ovato lanceolatis, spica ramosa. Hab. in humidis, in ruderalis rarius. Caul. 3-pedalis, unc. 1. crassus. Fol. margine et ad petiolo scabra. An a *Persicaria* specie diversum?

15. *Persicaria*, flor. hexandris digynis, spicis ovato-oblongis. fol. lanceolatis, pedunc. laevibus, stipul. ciliatis. L. Flor. dan. t. 702. Curt. lond. ic. Hab. in humidis et ad vias. Flor. robri. Var. fol. viridibus et nigro-maculatis.

β. *incanum*, flor. hexandris digynis, spicis ovato-oblongis. fol. oblongo-lanceolatis subtus pubescentibus. Willd. Schmidt. bohém. n°. 351. P. tomentosum. Schrank. t. 1. p. 669. t. 3. 669. Pet. H. Brit. t. 3. f. 8. Hab. in agris.

16. *minxa*, flor. hexandris submonogynis, fol. lineari-lanceolatis planis, spic. erectiusculis, caul. basi repente. Ait. Kew. 2. p. 31. Curt. lond. ic. P. *angustifolium*. Roth. germ. II. p. 453. P. strictum. Al-lion. ped. n°. 2051. t. 67. f. 1. Moris. 6. 3. t. 29. f. 5. Hab. in agris et pascuis. Spica rubra.

17. *amphibium*, flor. pentandris semi-digynis, spica ovata. Flor. dan. t. 282. Engl. bot. t. 456. α. *natans*, fol. ellipticis natantibus. β. *terrestre*, fol. hirsutis lanceolato-acuminatis. Hab. in stagnis. β. in humidis rarius florens. T.

18. *Hydropiper*, flor. hexandris semi-digynis, fol. lanceolatis undulatis, spic. filiformib. nutantibus, caul. erecto, stipulis submoticis. Blackw. t. 119. Curt. Lond. ic. Hab. in subhumidis ad fossas, gregarie.

19. *mite*, flor. 8-andris semitrigynis, fol. anguste lanceolatis hirsutis, stipul. hirsuto-ciliatis, spic. linearib., bract. ciliatis subimbricatis. P. *Hydropiperoides*. Mich. Flor. t. p. 219. Hab. in Amer. boreali. Facie antecedantis, non acre. Flor. purpureascentes. M.

20. *hirsutum*, flor. 8-andris semitrigynis, fol. lanceolatis, pedunc. elongato distachyo, spic. linearibus, caul. adscendente hirsuto. Michaux. l. c. Hab. in Carol. inferior. herbosis udis.

21. *ocreatum*, flor. pentandris trigynis, fol. lanceolatis. L. *Persicaria* spicis longis copiosissimis, fol. ex lineari lanceolatis, vaginis delatibus. Gmel. sib. 3 p. 51. n°. 39. t. 8. Hab. in Sibiria. Vaginae integrae, ventricosae, ampliores caule. Folia revoluta. L.

22. *filiforme*, flor. pentandris digynis, spicis filiformibus, fol. ovatis, stipulis ciliatis. Thunb. jap. 163. Hab. in Japonia. Caul. lineis elevatis obsolete, villosis, pilis adpressis, ferrugineis. Stipulae intra-foliaceae inflatae.

23. *glabrum*, flor. hexandris digynis, spicis virgatis, ochreis truncatis nudis, fol. lanceolatis acuminatis glabris. Willd. p. 447. Hab. in Ind. orientali. A sequente distinctum; fol. lanceolatis valde acuminatis glabris. Var., stam. A. P. filiformi fol. longioribus truncatilibus. W.

24. *barbatum*, flor. hexandris trigynis, spicis virgatis, ochreis truncatis setaceo-ciliatis, fol. oblongis acutis glabriusculis. Willd. Smoo. jam. 48. hist. 1. p. 17. t. 3. f. 1. Rheed. 12. t. 77. Hab. in China. Caul. rufus.

25. *tinctorum*, flor. hexandris trigynis, spic. virgatis, stipul. glabris truncatis ciliatis, fol. ovatis acutiusculis glabris. Ait. 2. p. 51. Willd. p. 445. Hab. in China. Flos ruberrimus. Spic. longae, ramosae.

26. *virginianum*, fol. ovalibus, spic. longissimis, flor. remotis inaequalibus 5-andris digynis. Michaux. Flor. t. p. 258. Willd. Sp. II. p. 442. Hab. in Amer. bor. sylv. umbrosis. Flor. pallidi. Styl. prolongatus, recurvus, persistens. T.

27. *australe*, fol. lanceolato-linearib., stipulis longo-herbatis, spica filiformi, flor. approximatis. Hab. in N. Hollandia. Née. (Ex herb. Thiebaud.) Bract. deltoideae, ciliato-aculeatae.

28. *tomentosum*, flor. hexandris trigynis, spicis virgatis, ochreis truncatis hispulis setaceo-ciliatis, fol. ovatis acuminatis utrinque incano-tomentosis. W. Houttuyn Syst. t. 49. f. 1. Pluck. alm. 288. t. 210. f. 7. Hab. in Zeylona. Var. β. Fol. inferiora utrinque scabra, nec albicantia tomentosa.

29. *orientale*, flor. heptandris digynis, fol. ovatis, caule erecto, stipulis hirsutis hypocrateriformibus. L. Curt. mag. t. 213. Hab. sponie in Oriente et India. In hortis ornamenti causa colitur. Omnium specierum facile altissimum, flor. rubris, passim albis, polebris distinctum.

30. *pennsylvanicum*, flor. octandris digynis, pedunc. hispulis, fol. lanceolatis, stipulis muticis. L. Sp. pl. p. 519. Pedunc. scabri, setis rigidiusculis apice gluten secarneo-tubis. Spicae subracemosae florculis pedicellatis. L.

\*\*\* *Flor. paniculato-racemosis*, fol. linearibus aut ovatis nec basi excisis.

31. *articulatum*, fol. octandris trigynis, apic. articulatis paniculatis, stipul. vaginalibus truncatis integris, fol. linearibus. L. Willd. p. 450. Hab. in Canada. Spicae filiformes, imbricatæ bract. turbinatis, panicul. terminant. L.

32. *divaricatum*, flor. octandris trigynis racemoso-paniculatis, fol. lanceolatis laevibus, caule divaricato patulo glabro. Willd. p. 451. Buxb. cent. 2. p. 31. t. 31. Hab. in Sibiria.

33. *alpinum*, flor. octandris trigynis racemoso-paniculatis, fol. ovato-lanceolatis glabris margine ciliatis, caule ramoso, geniculis barbatis. Willd. p. 451. Allion. pedem. t. 68. f. 1. Ec. mus. 2. t. 27. Hab. in alpinis, et in insula Corsica. T.

34. *undulatum*, flor. octandris trigynis racemoso-paniculatis, fol. lanceolatis undulatis superne scabris, subtus pubescentibus, caule ramoso inferne pubescente, geniculis ciliatis. Willd. Murr. in Comm. goett. 1774. p. 34. t. 5. P. sibiricum. Lin. suppl. p. 298. Gmel. sib. 3. p. 56. t. 10. Hab. saxosis humiliusculis in Sibiria. T.

35. *sericeum*, flor. octandris trigynis racemosis, fol. ovatis incano-pubescentibus, caule decumbente. Willd. Pall. it. ed. min. 3. p. 233. P. flor. petunculatis in apicis laxissimis. Gmel. sib. 3. p. 58. t. 9. f. 2. Hab. in Sibiria ad lacum Baical. T.

36. *serratum*, fol. crenatis. L. Hab. in Mauritania. †

\*\*\*\* *Helxine fol. subcordatis, s. basi excisis.*

37. *corymbosum*, flor. octandris trigynis, pedunc. glanduloso-pilosis, fol. oblongo-lanceolatis subsessilibus, bracteis ment. ranceis ciliatis. Willd. p. 452. Hab. in Java. Sequenti affine.

38. *chinense*, flor. octandris trigynis, pedunc. scabris, foliis petiolatis ovatis, bracteis s. fol. summis cordatis. L. Burm. ind. go. t. 30. f. 3. Hab. in India, China. Fol. ovato-cordatis.

39. *sagittatum*, fol. sagittatis, caule aculeato. Gmel. sib. 3. p. 65. t. 13. f. 2. Flor. oecipatis 8-andris. Michaux. t. p. 241. Hort. cliff. 151. t. 12. Hab. in Virginiae, Marilandiae et Carol. madidis.

40. *arifolium*, fol. hastatis, caule retrorsum aculeato. L. Fluck. amalib. 67.

t. 308. f. 3. Hab. in Virginiae, Floridae et Carolinae montib. Flor. 6-andri, semidigyni.

41. *acetosae-folium*, flor. 8-andris trigynis, fol. hastato-lanceolatis crassiusculis, caul. laevi volubili, fructu subbaccato. Vent. Hort. cels. p. 88. t. 88. Coccoloba sagittifolia. Ortega Dec. p. 60. Hab. in Brasiliis. †

42. *crassifolium*, fol. hastatis, inferioribus ovatis, reliquis linearis-lanceolatis, caule decumbente glabro. Willd. Murr. Comment. goett. 1774. p. 37. t. 6. Hab. in Sibiria locis apricis.

43. *perfoliatum*, fol. triangularibus, caule retrorsum aculeato, stipulis perfoliato-foliosis patentibus subrotundis. Burm. ind. go. t. 31. f. 2. Lam. ill. t. 313. f. 3. Hab. in India. Pedunc. pauciflori, aculeati.

44. *tataricum*, fol. cordato-sagittatis, caule inermi erecto, aeminib. sublentatis. L. Gmel. sib. 3. p. 64. t. 13. f. 1. Hab. in Tataria. ©

45. *emarginatum*, fol. cordato-sagittatis, caule erecto inermi, seminibus apice truncatis emarginatis, alis cartilagineis. Anth. Catal. bot. t. p. 48. Hab. in China. ©

46. *Fagopyrum*, fol. cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus. L. Mart. Flor. rust. t. 46. Hab. in Asia, nunc ut frumentum quibusdam in arenosis regionibus colitur. ©

47. *Convulvulus*, fol. cordato-hastatis, caule volubili angulato, flor. obtusis. L. Flor. dan. t. 744. Curt. Lond. ic. Hab. in Europae et Amer. agris. Anth. violaceae.

48. *cilinode*, subpubescens, caul. angulato debili, stipulis subaeutis basi ciliatis, fol. cordatis, fructub. apteris. Mich. Flor. 1. p. 241. Hab. in Canada. Priori affine.

49. *dumetorum*, fol. cordatis, caule volubili laevi, flor. carinatis. L. Flor. dan. t. 759. Hab. in Europae sylvis, frutices scandens. Anth. albae.

50. *scandens*, fol. cordatis, caule volubili, flor. carinatis. L. Pluck. alm. 143. t. 177. f. 7. Sloan. jem. 46. list. 1. p. 138. t. 50. f. 1. Hab. in Americae sylvis. Flor. 8-andri, trigyni, cal. fruct. majusculi, tripteri. Mich. T.

51. *multiflorum*, fol. cordatis, caule volubili, angulato, florum panicula ramosa, Thunb. jap. 169. P. chinense. Houttuya. Syst. 6. t. 49. f. 3. Hab. in Japonia. T.

978. *BRUNICHIA*. *Cal.* 1-phyllus, demum coriaceus, angulatus, 5-fidus : lacin. revolutis. *Cor.* o. *Caps.* supera, 1-locularis, 1-sperma. *Sem.* inversum lobatum. (*Stam.* 8-10.)

1. *cirrrosa*, caul. scandente, fol. cordato-sagittatis. Gaertn. de fr. et sem. r. p. 254. t. 45. f. 2. Hab. in Bahama. Col. in H. P. *Cal.* inferne ventricosus et elongatus in pedunc. planum, arcuatum; basi attenuatum. G.

979. *COCCOLOBA*. *Cal.* 5-partitus, coloratus, demum baccatus. *Cor.* o. *Bacca* calycina, monosperma.

1. *uvifera*, foliis cordato-subrotundis nitidis. L. Willd. Sp. II. p. 459. Jacq. amer. 112. t. 73. Lam. ill. t. 316. f. 2. Catesb. car. 2. p. 96. t. 96.

2. *leoganensis*, fol. subrotundis integerrimis utridia planis, racemis fructuum erectis. Jacq. amer. 113. t. 178. f. 53. Hab. in America. Arb. magna, pub. bra.

3. *latifolia*, fol. integris latissimis basi coarctatis. Enc. bot. 6. p. 61. Lam. ill. t. 316. f. 4. Ex Amer. meridion. Priori affinis. Fol. tenuiora, membranacea fere, cordato-orbiculata.

4. *australis*, fol. cordato-ovatis acutis, flor. polygamis. Forst. prod. n°. 176. Hab. in N. Zelandia. h

5. *pubescens*, fol. orbiculatis pubescentibus. L. Sp. pl. 523. Mill. dict. n°. 2. *C. grandifolia*, fol. subrotundis integerrimis rugosis. Jacq. amer. 113. Pluck. phyt. 222. f. 8. Hab. in America. Arbor praecalta, a 60-80 ped. Lignum durissimum. Fol. maxima, rugosa, subtus pubescentia.

6. *diversifolia*, fol. ramusculorum ovatis, ramorum ovato-cordatis. Jacq. amer. 114. t. 76. Hab. in Domingo. Arb. 10-12-pedalis.

7. *flavescens*, fol. ellipticis obtusis mucronatis, basi cordatis. Willd. p. 458. Jacq. amer. 114. t. 75. Hab. in Domingo. Magnitudine prioris.

8. *excoriata*, fol. oblongo-ovatis acutiusculis basi cordatis, racemis pendulis. Plum. ic. 146. f. 1. Hab. in America. h

9. fol. breviorib. ovato-subacutis, racemis praelongis pendulis. Poir. enc. 6. p. 62. Hab. in Porto-Ricco. Ledr.

10. *nivea*, fol. oblongis acuminatis venosis, supra nitidis, racemis erectiusculis. Swartz. Flor. ind. occid. 2. p. 693. Hab. in montosis aridis Jamaicae. Arb. 20-petalis.

11. *punctata*, fol. lanceolato-ovatis. L. Jacq. Am. Ed. pict. t. 554. Hab. in Amer. Racem. breves, recti.

12. *obtusifolia*, fol. oblongis obtusissimis. Jacq. amer. 117. t. 74. Hab. in Carthagina. h

13. *microstachya*, fol. ovatis obtusis glaberrimis, racemis nutantibus. Hab. in India occidentali. Rami cinerici. Fol. petiolata, fere sesquiuincialia. Racemi brevissimi. W. h

14. *emarginata*, fol. coriacea subrotundis exciso-emarginatis. L. Jacq. obs. 4. p. 481. t. h. Hab. in America calidiore. Fructificatio ? h

15. *barbadensis*, fol. cordato-ovatis undulatis. L. Jacq. obs. 4. t. 8. Hab. in Barladis. h

16. *tenuifolia*, fol. ovatis membranaceis. Lam. ill. t. 14. f. 3. Brown. jam. 210. f. 3. In Jamaica. h

980. *PAULLINIA*. *Cal.* 5-phyllus. *Petal.* 4. *Nectar.* 4-phyllum, inaequale. *Caps.* turbinata, trigona, 3-locularis : loculis monospermis. *Receptac.* centrale. *Sem.* ad dimidium arillata. (Fol. ternata aut pinnata.)

\* *Caps. pyriformibus : valv. nudis aut carinato-alatis.*

1. *Cururu*, capsulis pyriformib. obtusis, foliis ternatis, foliolis oblongis dentato-serratis subacuminatis, petiolis alatis. Schumacher in Act. Hist. Nat. Haef. 3. p. 2. t. 121. Willd. p. 460. Jacq. obs. 3. p. 51. t. 61. f. 4. *Cururu*. Plum. gen. 34. ic. 111. f. 2. Hab. in America calidiore. Caul. glaber subangulatus. h

2. *pinnata*, caps. pyriformibus tricornibus, fol. pinnatis, foliolis oblongis obtusis serratis acuminatis, petiolis marginatis. Schumacher. l. c. p. 121. Lam. ill. t. 318. f. 2. Jacq. l. c. t. 62. f. 52. Hab. in Brasilia, in Antilles.

\*\* *Capsulis ovatis.*

3. *Meliacifolia*, fol. pinnatis : foliol. trijugis subsessilibus laucrolatis remotis

dentatis, subtus pubescentib., fruct. alis apice prominulis. Juss. in Annal. d. Mus. Ceb. 23. p. 357. t. 66. f. 2. Hab. in Brasilia. Caul. scandens. h

4. *Thalictrifolia*, fol. subripinnatis summis simplicibus, foliol. ovatis parvis integris aut subdentatis, caps. triolata. Juss. l. c. t. 66. f. 1. Cum priore. Petiol. communis et caul. subtomentosus. Pedunc. spiralis. h

5. *acutangula*, fol. pinnato-quinatis : foliol. oblongo-ovatis acuminatis dentato-serratis, caps. obovatis triangulo-alatis. Ruiz et Pavon. l. c. p. 93. Sub *Semariaria* uti sequens, cum qua iisdem in locis crescit.

6. *obovata*, fol. pinnato-quinatis, foliolis lanceolatis serratis, caps. obovatis. Ruiz et Pavon syst. Pl. Flor. Peruv. et Chil. p. 93. Hab. in Peruv. nemoribus. Scandens. h

7. *tetragona*, caps. tricarinata tricornibus, fol. pinnatis, foliolis ovatis subserratis acutis glabris, petiolis nudis. Schumacher. Act. Hist. Nat. Haf. 3. p. 2. t. 122. Aubl. guj. 1. p. 355. Hab. in Cajenna. Caul. 4-gonus. Antecedenti affinis.

8. *Vespertilio*, caps. alatis, alis horizontalibus, fol. pinnatis, foliolis ovatis apice inciso-serratis, petiolis nudis. Schumacher. Act. Hist. Nat. Haf. 3. p. 122. t. 11. f. 1. Hab. in insula St. Christophori Americæ. Caul. vix angulosus, laevis.

9. *curassavica*, caps. valvulis semiobcordatis, fol. biterminatis, foliolis crenatis ovalibus imparibus ovato-cuneatis, petiolo intermedio marginato. l. c. p. 123. t. 12. f. 2. Jacq. t. 61. f. 8. Plum. gen. 34. ic. 112. f. 1. Hab. in Curassao. Caulis sulcatus, angulis villosis ferrugineis. Sch. h

10. *barbadensis*, caps. valvulis semiobovatis villosiusculis, fol. biterminatis, foliolis ovalibus integerrimis serratisque coriaceis, petiolis submarginatis. Schum. p. 123. Jacq. t. 62. f. 9. Hab. in Barbados. h

11. *polyphylla*, caps. valvulis capsularum semiobovatis, fol. supradecompositis, foliolis ovato-cuneatis, apice crenatis supra glabris subtus petiolisque villosis. Schum. l. c. p. 124. Willd. p. 461. Jacq. l. c. 1. 61. f. 10. Hab. in Amer. australiore. Cirrb. axillaris. h

12. *tomentosa*, fol. pinnatis : foliolis ovato-rhombis repandis obtusis capsulisque tomentosis, petiol. marginatis. Schum. l. c. p. 125. Jacq. obs. t. 61. f. 13. Hab. in

Amer. Fol. ovato-oblonga, remote-crenata.

13. *senegalensis*, caps. ovatis, fol. pinnatis : foliol. sessilibus ovatis remote crenatis, impari majore : petiol. marginatis, caul. angulato subtomentoso. Juss.

14. *sphaerocarpa*, fol. pinnatis : foliol. subsessilibus ovatis glabris remote crenatis acumine obtuso, petiolo nudo, caul. tereti. Juss. l. c. Hab. in Guinea. Rich.

15. *subrotunda*, fol. pinnato-quinatis : foliol. oblongis superne serratis, caps. subrotundis. Ruiz et Pavon syst. l. c. p. 92. (Semariaria.) Hab. in Peruv. nemoribus. Frut. scandens. Arillus edulis.

\*\*\* *Fructibus ignotis.* †

16. *nodosa*, fol. ternatis, petiol. nudis, foliol. medio obovato. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 62. f. 3. Willd. p. 460. Hab. in America.

17. *carthagenensis*, foliis biterminatis, petiol. omnibus marginatis, caul. inermi. Jacq. l. c. t. 62. f. 6. Hab. Carthagenae in Amer. h

18. *caribaea*, fol. biterminatis, petiol. omnibus marginatis, ramis aculeatis. Jacq. l. c. t. 62. f. 7. Hab. in Caribæis.

Obs. Ob ramos aculeatos et petiolos secundum ill. Jussieu *Supindis* minus affinis species est, sed uti et sequens alia ad genera forte amandanda.

19. *cauliflora*, fol. pinnatis, pinnula infima ternata, petiolo ad apicem marginato, basi nudo, flor. corymbose-capitatis axillaribus et terminalibus. Willd. p. 463. Jacq. ic. rar. 3. t. 450. Collect. 3. p. 176. Hab. in America ad Caracas.

20. *japonica*, foliis quinatis, petiolulatis marginatis, caule herbaceo inermi. Thunb. jap. 170. Hab. in Japonia. Foliola infima ovata subsessilia inciso-bifida vel trifida, pollicaria. Th. 72

21. *diversifolia*, fol. supradecompositis, petiolis marginatis : infimis pinnatis reliquis ternatis. Jacq. l. c. t. 62. f. 14. Hab. in America. h

22. *Cupanaefolia*, fol. pinnatis : foliol. bijugis sessilibus ovato-oblongis remote crenatis claberrimis, pedunc. cirrhoris. Juss. l. c. Hab. in sylv. Gujanæ. Rich.

23. *connarifolia*, fol. pinnatis : foliol. bijugis sessilibus coriaceis ramisque ferrugineis, petiol. nudis, pedunc. acirrhosis. Juss. Cum priore.

24. *fibulata*, fol. pinoatis: foliol. breve petiolatis ovatis subconiacis subdenticulatis ferrugineis inferne subtomentosis, pedunc. circis incrassatis fibuliformibus floriferis. Juss. Hab. in sylvat. ad ripas in Guiana. Rami ferruginei.

25. *rufescens*, foliol. hijugis subpetiolatis ovato-lanceolatis remote crenatis subius tomentoso-ferrugineis, supra nigro-virentibus, petiol. nudis, ramis subangulatis ferrugineis. Juss. l. c. Cresc. ubi antecedens. Pedunc. cirrhosi aut acirrhosi. J.

26. *Ingaefolia*, fol. magnis pinnato-5-jugis: foliolis atro-virentibus obuse acuminate, petiol. basi nudo, ultra marginatis, ram. striatis punctato-scribris. Juss. l. c. p. 350. Hab. in Guianae sylvis, flumin. Amazonio conterminis. Pedunc. nunc ramoso-peniculati, omne simplices ultra medium cirrhosi et floriferi. J.

981. *SERIANA*. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 4. Nectar. 4-phyllum. *Samaræ* 3, longitudinaliter connatæ, globose, inferne in alant membranaceam dilatatae.

1. *sinuata*, alis capsular. postice dilatatis, fol. ternatis. foliolis ovato-lanceolatis dentato-sinuinatis. Schum. in Act. Haf. 3. p. 2. p. 126. t. 22. f. 1. Willd. p. 467. Paullinia Seriana. L. Jacq. abs. 3. p. 17. t. 61. f. 2. Lam. ill. t. 318. f. 1. Hab. in America calidiore. h

2. *divaricata*, fol. biternatis, foliolis ovatis integerrimis subacutis lucidis petiolatis, petiolis nudis. Schum. l. c. t. 11. f. 2. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 616. sub Paulinia. Hab. in sylvis Jamaicae. h

3. *caracasana*, alis caps. postice rotundatis, foliis biternatis, foliolis oblongis utrinque acutis remotissime dentatis, petiolis nudis. Willd. p. 465. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 52. t. 99. sub Paulinia. Hab. ad Caracas. h

4. *racemosa*, alis caps. postice dilatatis antice subsinuinatis, fol. biternatis, foliolis ovatis profunde serratis. Schum. p. 127. t. 12. f. 3. Hab. in Vera Cruce. h

5. *spectabilis*, alis caps. postice dilatatis, fol. biternatis, foliol. obovatis terminalibus rectis, petiolis alatis. Schum. t. 12. f. 4. Hab. in America. Foliola integerrima; terminale emarginatum. W.

6. *mexicana*, foliis biternatis, foliolis obovatis integerrimis omnibus emarginatis,

petiolis alatis, racemis compositis. Willd. Schum. t. 17. f. 3. Paulinia fol. ternatodecompositis, caule aculato. L. Hort. cliß. 152. Hab. in Mexico. Fruct. ignotus. †

7. *angustifolia*, fol. biternatis, foliol. lineari-lanceolatis integerrimis acutis, petiolis alatis. Willd. Paull. mexicana. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 61. f. 5. Plum. gen. 34. ic. 123. f. 2. Hab. in Amer. calidiore. h

8. *lupulina*, alis caps. semiovalibus, fol. biternatis crenatis subius ferrugineis, foliol. terminalibus subrhombis lateralibus ovatis, petiolis subulatis. Schum. p. 127. t. 12. f. 5. Hab. in America. h

9. *lucida*, alis caps. semiovalibus, fol. biternatis, foliol. ovatis acutis serratis petiolis subnudis. Schum. l. c. p. 2. t. 128. Hab. in insula St. Crucis. Fol. apice lucida.

10. *triternata*, fol. triternatis, foliol. ovatis obtusis repandis, petiolis alatis, racemis paniculatis. Willd. p. 466. Paull. l. Mant. 216. Jacq. obs. 3. p. 22. t. 62. f. 11? Plum. gen. 34. ic. 112. Hab. in Amer. in ins. St. Dominica, ubi ab incolis demominatur. *Liane à porril*. Ad pisces, eos venenando, capiendos adhibetur.

982. *CARDIOSPERMUM*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. Nectar. 4-phyllum, inaequale. *Caps.* 3, connatæ, fistulae.

1. *Halicacabum*, caule, petiolis, foliolisque inciso-dentatis glabris. Willd. Sp. II. p. 764. Lam. ill. t. 317. Rumph. 6. t. 24. f. 2. Hab. in Indiis. ☉

2. *hirsutum*, caule petiolisque hirsutis, foliolis dentatis glabris. Willd. Habit. in Guinea. Caul. quadrupedalis et ultra scandens. Fol. simpliciter et grosse dentata. W. Simile priori, sed triplo majus. W.

3. *Corindum*. fol. subius tomentosis. L. C. villosum, fol. incisus obtusis, petiolis brevibus. Mill. dict. n.º. 3. Hab. in Brasilia. ☉

7. *grandiflorum*, foliis pubescentibus, capsulis acuminatis maximis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 698. Hab. in fruticetis sepibusque Jamaicae. ☉

983. *SAPINDUS*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Caps.* carnosæ, connatæ, ventricosæ.

1. *Saponaria*, inermis, fol. pionatis,

foliis ovato-lanceolatis, rachi alata. Ait. Kew. 2. p. 35. Willd. p. 468. Comm. hort. 1. p. 183. t. 94. Hab. in America juxta littora in Georgia. Michaux. Fruct. glabrosi, terebinthinacei. M.

2. *longifolius*, fol. pinnatis, foliolis lanceolatis glabris, unico terminali, rachi simplicibus. Vahl. symb. 3. p. 53. Hab. in India orientali? h

3. *spinosus*, fol. abrupte pinnatis, caule spinosissimo. L. Brown. jam. 207. t. 20 f. 2. Hab. in Jamaica. h

4. *laurifolius*, fol. pinnatis, foliolis ovato-oblongis attenuatis glabris, rachi simplicibus, petalis margine tomentosis. Vahl. symb. 3. p. 54. Rheed. 4. t. 19. Hab. in Malabar. h

5. *emarginatus*, fol. pinnatis, foliolis oblongis emarginatis subtus villosis, rachi simplicibus, petalis margine tomentosis. Vahl. 1. c. Hab. in India orientali. h

6. *rubiginosus*, fol. pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acutis subtus villosis, rachi simplicibus, petalis glabris. Willd. p. 469. Roxb. cotoon. 1. p. 44. t. 62. Hab. in montosis circassiensibus. Arb. utilis.

7. *tetraphyllus*, fol. pinnatis, foliolis lanceolato-oblongis glabris, rachi simplicibus, racemis subsimplicibus, petalis glabris. Vahl. 1. c. Hab. in India orientali. h

8. *rigidus*, fol. pinnatis, foliolis ovato-oblongis, rachi simplicibus, cor. fructibusque glabris. Vahl. 1. c. Gaertn. de sem. 1. p. 34. t. 70. f. 3. Pluck. alm. 255. t. 217. f. 7. Hab. in America. Racemus supradecompositus pedalis. V. h

9. *arborescens*, fol. pinnatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, panicula axillari simplicibus. Willd. Aubl. guj. 1. p. 359. t. 139. Hab. in sylvis Gujanæ. h +

10. *frutescens*, foliis pinnatis, foliolis alternis lanceolatis acuminatis glabris, panicula axillari simplicibus. Willd. Aubl. p. 355. t. 138. Hab. in sylvis Gujanæ. h +

984. PONAËA. Cal. 5-partitus. Cor. 4-petala. Caps. trilocularis, triolata: loculis monospermis.

1. *saponarioides*. Willd. Sp. II p. 470. Tonlicia gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 359. t. 140. Lam. ill. t. 317. In sylvis Gujanæ. Fol. abrupte pinnata. h

985. CORNIDIA. Cal. obtuse trigonus, integerrimus, semisuperus, germine accretus. Cor. 4-petala. Stylis divergentes. Caps. 3-corniculata, 3-locularis, 3-valvis. Semina numerosa.

1. *umbellata*. Ruiz et Pav. syst. veg. Fl. Per. p. 91. Arb. excelsa, fol. oblongis. Cresc. in Peruv. nemoribus.

## TETRAGYNIA.

986. PORLIERA. Cal. 4-phyllus, æqualis. Petala obovata, conniventia. Squamæ nectariferæ 8. Stamina æqualia, dorso nectarii inserta. Drupæ 4, connatæ. (Guajaco affine genus.)

1. *hygrometra*, fol. abrupte pinnatis: foliol. linearibus. Ruiz et Pavon. Flor. Per. et Chil. prodr. p. 55. t. 9. et syst. vegetab. p. 94. Hab. in Peruv. ruderatis et apricis. Lignum sudorificum et antirheumaticum. Fol. hygrometrio inserviunt.

987. FRANCOA. Cal. 4-partitus, persistens. Cor. 4-petala. Stylus o. Stigm. plana. Caps. 4, basi connatæ, carinatæ. Semina numerosa, suturis catinarum affixa.

1. *appendiculata*, acutius, fol. cordatis ovatis obtuse angulatis, petal. foliol. appendiculatis. Cav. ic. 6. p. 77. t. 568. Hab. in ins. San Carlos, etc. Flor. racemosi.

Obs. Auctor putat, quod *Slaupanke* amplissimo sonchi folio. Feuill. Peruv. 2. p. 44. t. 31. alteram hujus generis efficit speciem, qualis planta vero a cl. Willd. Sp. pl. II. p. 487. ad *Panke* Molinæ relata est. *Panke tinctoria*. Mol. et Willd. secundum Flor. Peruv. 1. p. 29. *Gunneræ* species est.

988. GALVESIA. Cal. 4-phyllus. Petala sessilia. Stam. 4. alternantia breviora. Corpus glandulosum sub germine. Drupæ 4.

1. *punctata*, fol. lanceolatis oblongisque serratis punctato-pellucidis. Ruiz et Pavon. syst. veg. 1. c. p. 97. Hab. in R. Chilensis nemoribus, et stagnatis, etc. Fol. fragrantia, aromatica.

989. CALANCHOE. Cal. 4-phyllus.



*Cor. hypocrateriformis*, 4-fida: lacin. acutis, tubo ventricoso, *Squamæ nectarif.* 4 ad basin germinum lineares. *Capsulæ* 4, superæ, 1-loculares, polyspermæ. (Plantæ succulentæ. Fol. plus minusve incisa. Flor. flavi.)

1. *lanceolata*, foliis lanceolatis apice serratis, panic. villosa. Cotyledon lanceolatus. Vahl. symb. 2. p. 51. Hab. in Arabia.

2. *laciniata*, fol. laciniato-pinnatifidis: summis integris. Decand. Pl. grass. ic. Cotyledon laciniata. Lin. Rumph. 5. t. 95. Hab. in ins. Java, Bourbon et Moluccis.

3. *aegyptiaca*, fol. spathulato-subrotundis cunravis. Pl. grass. ic. Cotyl. nudicaulis. L. syst. veg. 14. p. 351. Willd. Sp. pl. II. p. 258. Pluckn. Alm. t. 208. f. 3. (mala.) Hab. in Aegypto in monte Melbau. Forsk. Flor. auresc.

\* *spathulata*, fol. spathulato-subrotundis crenatis planiusculis. Plant. grass. ic. Cotyl. hybrida. H. Par. Hab. in China? Affinis valde antecedenti.

4. *Verca*, fol. ovatis repando-crenatis, flor. corymboso-paniculatis. *Verca* crenata. Andrew. i. 21. *Verca*. Willd. Sp. II. p. 471. Cotyledon crenatum Vent. Malm. t. 49. Hab. in Sierra Leone. Subfruticosa. Cor. flava ore aurantiaco.

5. *pinnata*, fol. quinato-pinnatis, foliol. obovatis crenatis: crenis filamentis barbatis, flor. longis pendulis. Lam. enc. 2. p. 141. Hab. in ins. Francisc. 3-4-petalis. Panic. ramosa. Flor. penduli. Fol. crenarum fila radicales referunt. Lam.

β. *floripendula*, fol. subconcrevis crenis nudis. Lam. l. c. *Cassuvia floripendia*. Commers. Lam. l. c.

6? *alternans*, fol. orbiculato-spathulatis integerrimis. Vahl. symb. 2. p. 51. sub Cotyledon. Hab. in Arabia.

*Obs.* Nomen *Kalanchoë* jam prius ab Adansonia (Fam. d. Pl. 2. p. 248.) his plantis, erat impositum. Cotyledoni generis, quidem affines, sed præter stam. numerum etiam cor. forma ab eo discrepant.

990. PARIS. *Cal.* 4-phyllus. *Petal.* 4, angustiora. *Antheræ*

filam. medio adnexæ. *Bacca* 4-locularis.

1. *quadrifolia*, fol. quaternis. L. Flor. dan. t. 139. Herba Paris. Math. Hab. in nemoribus. Var. fol. 3-5.

991. ADOXA. *Cal.* 2-3-fidus, inferus. *Cor.* 4-5. 5-fida, supera. *Bacca* 1-locularis, 4-5. 5-sperma, calyce coalita. (Flor. laterales 9-10-andri.)

1. *Moschatellina*. L. Engl. bot. t. 151. Curt. Lond. ic. Lam. ill. t. 320. Hab. in nemoribus. Vere. Flor. virecentes, odorati.

992. ELATINE. *Cal.* 4-phyllus. *Petal.* 4. *Capr.* 4-locularis, 4-valvis, depressa, polysperma: dissepimenta suturis opposita.

1. *Hydropiper*, fol. oppositis, flor. alternis. Hoffm. germ. p. 186. Schuhr Handb. t. 109. Vaill. parisi. 5. t. 2. f. 2.

β. *triandra*, fol. floribusque oppositis. Hoffm. l. c. Schuhr t. 109. Vaill. l. c. Hab. in inundatis. ☉

2. *Alsinastrum*, foliis verticillatis. L. Lam. ill. t. 320. f. 2. Hab. in fossis. Facie fere Hippuridis. Fol. cernua quaterna, ovata.

993. HALORAGIS. *Cal.* 4-phyllus, supernus. *Petal.* 4, caduca. *Drupa* sicca. *Nux* 4-locularis.

1. *Cercodia*, fol. serratis, florib. verticillatis. Ait. Kew. 2. p. 37. Willd. Sp. II. p. 473. H. *Tetragonia*. L'Herit. stirp. nov. 1. p. 82. H. *alata*, fructu quadrilato. Jacq. ic. rar. 1. t. 69. *Cercodia* erecta. Murray in Comm. goett. 1780. p. 3. t. 1. Lam. enc. 1. p. 68a. Ej. ill. gen. t. 319. *Tetragonia* ivaeifolia. Lin. suppl. 257. Fol. ovato-lanceolata, venosa. Pedunc. scabri, demum reflectuntur infra folia.

2. *prostrata*, fol. integerrimis, flor. solitariis axillaribus. H. fructib. globosis Forst. prod. n°. 779. L'Herit. stirp. nov. 1. p. 82. Hab. in Botanicis insula et in N. Caledonia. Facie Ammanniac. Rami glabri. ☿

---

M O N O G Y N I A.

*Dais octandra*. *Richardia scabra*. *Vaccinia nonnulla*. *Andromeda octandra*, *ericoides lycopo-lioides*. *Elaeocarpus serratus*. *Diospyri quaedam*. *Rivina octandra*. *Jussieuae plures species*. *Rutae flor. laterales*. *Fagars octandra*, *Elaphrium*. *Rhizophora Mangle*. *L. Ammannia sanguinolenta*, *octandra*. *Melastomae plures species*. *Trichilia pallida*. *Portulaca quadrifida*, *meritiana*. *Zygophyllum Morganae*. *Cleoma juncea*. *Capparis ferruginea*. *Monotropa Hypopithys* (quoad *flor. laterales*). *Caseariae nonnullae species*. *Petiveria alliacea*. *Lamonia monophylla*. *Aesculus Pavia*. *Quivisia ovata*, *heterophylla*. *Samidae quaedam*.

D I G Y N I A.

*Ulmus effusa*. *Chrysopenia* (*flor. lateral.*) *Polygon. pensylvanicum*.

T R I G Y N I A.

*Hortensia speciosa*.

T E T R A G Y N I A.

*Myriophyllum verticillatum*. *Forstoleae secundum Murray*, *Willdenow*.

P E N T A G Y N I A.

*Sedum pusillum*, *pulchellum*, *ternatum*. *Michaux*.

O C T O G Y N I A.

*Phytolacca octandra*.

---

# C L A S S I S I X.

## E N N E A N D R I A.

### M O N O G Y N I A.

994. *LAURUS*. *Cal.* 4-6-partitus. *Nectar.* glandulis 3. bisetis, gemmen cingentibus. *Filam.* interiora quorum 3-alterna sterilia glandulifera. *Drupa* 1-sperma. (Stam. 3, 5, 6, 7, 8 et 14. Flor. passim dioici.)

1. *Cinnamomum*, fol. suboppositis trinerviis ovato-oblongis, nervis versus apicem evanescentibus, panic. terminali. Lam. enc. 3. p. 441. Willd. Sp. II. p. 475. Blackw. t. 354. Burm. zeyl. 62. t. 27. Hab. in Zeylona et in America. Dioica. Arb. 18-24-pedalis.

2. *Cassia*, fol. triplinerviis lanceolatis. L. panic. laxis sublaeralibus. Lam. l. c. p. 444. Ej. ill. t. 321. f. 2. Burm. zeyl. 63. t. 28. Blackw. t. 359. Carua. Rheed. t. 4. 57. Hab. in Malabar, Sumatra, Java. h

3. *Culiban*, fol. triplinerviis suboppositis. Lin. Rumph. 2. t. 14. Lam. l. c.

3. *Malabratum*, fol. suboppositis praelongis utrinque scatis triplinerviis transverse venosis. Lam. p. 445. Katon-Karus. Rheed. 5. t. 53. Malabratum. Lohel. ic. 308. Hab. in montosis Malabaricae. Prima specie altior, cui affinis. Flor. paniculati, termin.

4. *Camphora*, foliis sub-triplinerviis lanceolato-ovatis, panic. latentibus. Lam. p. 446. Jacq. Coll. 4. p. 221. t. 3. f. 2. Blackw. t. 347. Hab. in Japonia. h

5. *montana*, fol. triplinerviis ovato-acuminatis perennantibus, flor. racemoso-paniculatis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 700. Hab. in altis montibus Jamaicae australis. Habitu L. Camphorae simillima. S. h

6. *Chloroxylon*, foliis trinerviis ovatis coriaceis: nervis apicem attingentibus. L. Brown. jam. 187. t. 7. f. 1. Hab. in Jamaica. h

7. *cupularis*, fol. ovatis glabris, panic. sessilibus subterminalib., fract. glandiformibus cal. copulari exceptis. Lam. l. c. p. 447. t. 321. Aubl. Guian. 1. p. 363. Hab. in ins. Mauriti. et Bourbonia. Var. fol. laetissimis.

8. *glauca*, fol. nervosis lanceolatis perennantibus, ramulis tuberculatis, flor. solitariis. Thunb. jap. 173. Hab. in Japonia. Folia acumine obtusa, margine reflexo, subtus glauca vel lutea in ramulis sparsi, solitarii. Oleum fructuum pro candelis inservit. Th.

9. *pedunculata*, fol. oppositis nervosis oblongis integerrimis, flor. solitariis pedunculatis. Thunb. jap. 177. Cum priore. Caul. fruticosus. Flor. versus apicem ramulorum sparsi.

10. *caustica*, fol. ovalibus rugosis perennantibus, flor. quadrifidis. Willd. p. 479. Hab. in Chili. Arbor. venenata.

11. *nobilis*, foliis lanceolatis coriaceis subundulatis venosis perennantibus, flor. subquadrifidis dioicis. Hab. in Italia, Hispan. et Oriente. h

12. *indica*, fol. venosis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis cicutricibus, flor. racemosis pubescentibus. L. Wendl. obs. bot. p. 21. t. 3. f. 22. Pluck. alm. 210. t. 304. f. 1. Seb. thes. 2. p. 90. t. 84. f. 6. Hab. in Madera, et in Canar. Cal. 6-partitus.

13. *foetens*, fol. venosis ellipticis acutis perennantibus, axillis renarum sulcus villosis,

louis, racemis elongatis compositis paniculiformibus. Ait. Kew. 2. p. 39. L. maderiensi. San. Hab. in ins. Canariis et in Madera. h

14. *Persea*, fol. ovatis coriaceis transverse venosis perennantibus, flor. corymbosis. Jacq. obs. 1. p. 38. Swartz. obs. 152. Hab. in America calida. Stam. 6. Fructus magnus pyriformis gratusissimus.

15. *Borbonia*, fol. lanceolatis perennantibus, calycib. fructus baccatis. L. exel. synonym. Catesb. Borbonis. Plum. gen. 4. Hab. in Carolina, Virginia. h

16. *carolinensis*, fol. perennantibus ovali-lanceolatis inferne subglauca, pedunc. simplicib., flor. fasciculo subcapitato terminatis, cal. laevis. exterioribus duplo brevioribus. Michaux. Flor. 1. p. 244. Catesb. car. s. p. 63. 1. 63. In Carol. et Ludovisia. Bacc. subglobosa, strobilulra. Var. ramul. et fol. glabris et pubescentibus.

17. *Catesbaei*, fol. perennantibus lato-lanceolatis ramulisque glabris, panic. brevipedunculatis, cal. subrotati laevis. subaequalibus. Michaux. p. 244. Catesb. 11. 1. 28. Frut. 6-9-juncialis. Stam. perfecta 6. Bacc. ovata nigra. h

18. *martinicensis*, fol. oblongis acuminatis coriaceis perennantibus planis, racemis paniculatis, pedunc. calycibusque momentosis. Willd. p. 481. Jacq. Collect. 2. p. 109. t. 3. f. 2. Hab. in sylvis Martinicae. Ad L. coriaceam accedere videtur. W.

19. *exaltata*, fol. lanceolato-ovatis subcoriaceis perennantibus planis, flor. racemoso-corymbosis, fructu calyce urceolato glabro semitecto. Swartz. Fl. ind. oecid. 2. p. 702. Hab. in sylvis montium Jamaicae occidentalis. h

20. *alpigena*, fol. ovatis obtusis convexiusculis coriaceis, subtus venosis glaucescentibus, racemis erectis folio longioribus. Swartz. l. c. Hab. in summis montibus Jamaicae australis. h

21. *triandra*, foliis lanceolatis - ovatis acuminatis membranaceis planis, floribus triandris, fructu calyce fere tertio. Swartz. Fl. ind. oecid. 2. p. 706. Hab. in montibus Jamaicae occident. Flor. numerosi decidui steriles. Sw.

22. *sanguinea*, fol. lanceolato - ovatis acuminatis, subtus venosis-reticulatis, racemis terminalibus. lateralibusve erectis folio brevioribus, calyce turbinato fructum basi cingente. Swartz. l. c. Nectandra. Rothb. pl. surin. 10. Hab. Surinami. h

23. *surinamensis*, fol. lanceolato-ovatis acuminatis, ramis patentissimis, racemis filiformibus. lateralibus axillaribusve. Swartz. p. 708. Willd. p. 482. Nectandra Bijuna. Hab. in sylvis Gujanae, Surin. etc. h

24. *hexandra*, fol. lanceolatis, racemis axillaribus, flor. hexandris. Swartz. l. c. Ajova gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 311. t. 120. Hab. in sylvis interioribus Gujanae. h

25. *salicifolia*, fol. lanceolatis acuminatis planis perennantibus coriaceis, racemis. Swartz. p. 709. Hab. in India occidentali. h

26. *globosa*, fol. ovatis glabris, cym. pedunculatis axillaribus, drupa globosa. Lam. enc. 3. p. 751. Aubl. Gujan. p. 364. Sloan. hist. 2. p. 21. t. 106. f. 3. Hab. in Jamaica, St. Domingo.

27. *coriacea*, fol. ovatis acuminatis planis reticulato-venosis subcoriaceis, racemis erectis fol. brevioribus. Swartz. 5. p. 710. L. parvifolia. Lam. enc. 3. p. 452. Hab. in montibus Jamaicae. h

28. *Leucoxylo*, fol. oblongo-lanceolatis planis perennantibus, racemis axillaribus folio brevioribus, cal. fructiferis pedunculisque inerassatis verrucosis. Swartz. 2. p. 712. Hab. in sylvis montium Jamaicae. Cal. tumidus ex albedo-verrucosus. Sw. h

29. *membranacea*, fol. oblongis acuminatis venosis margine convexis coriaceo-membranaceis, racemis erectis folio brevioribus. Swartz. 2. p. 713. Hab. in montibus excelsis Jamaicae, Hispaniolae. L. Borboniae proxima. h

30. *patens*, foliis-oblongis utrinque acuminatis planis membranaceis, racemis erectis folio longioribus, ramisque patentibus diffusis. Swartz. l. c. p. 715. Hab. in Jamaicae montosis. ☉

31. *parviflora*, foliis oblongo ellipticis acuminatis planis membranaceis, racemis terminalibus axillaribusve folio brevioribus erectis confertis subpaniculatis. Swartz. p. 717. Cum priore cresc. Quoad figuram folior. et racemorum L. Leucoxylo similis. Sw.

32. *pendula*, fol. oblongis apice brevi attenuato venosis membranaceis subtus glaucescentibus, racemis laxis, fructibus pendulis nudis. Swartz. p. 719. Hab. in sylvis montium Jam. occident.

33. *floribunda*, fol. ovato-lanceolatis planis membranaceis venosis, racemis axillari-terminalibus folio longioribus paniculatis, pedunc. longissimis. Swartz. p. 721. Hab. in sylvis montium Jam. australis. h

34. *lucida*, fol. oblongis serratis, ramulis ternis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus. Thunb. jap. 174. Hab. in Japonia. h.

35. *umbellata*, fol. ovatis serratis, ramulis umbellatis, flor. racemosis. Hab. in Japonia. h.

36. *aestivalis*, fol. venosis oblongis acuminatis, utrinque glabris, annuis, ambus rugosis, ramis supra axillaribus. L. Mill. dict. n.º 8. Hab. in Virginia ad ripas rivulorum. Frut. 8-10-pedalis. h.

37. *Diospyrus*, fol. oblongo-ovalibus inferne subtomentosis, flor. glomerato-umbellatis dioicis, pedicell. villosis. L. Diospyroides. Michaux. Flor. 1. p. 243. L. melissaeifolia. Walt. ? Hab. in Amer. boreali. Virgata humilis, nulliflora ut plerumque species Amer. frigidioris. M. T.

38. *geniculata*, ramis divaricatis flexuosis, fol. deciduis lanceolatis, basi subius barbatis, flor. umbellatis polygamis. Michaux. p. 243. Conf. L. axillaris. Lam. enc. 3. p. 453. Hab. in aquis stagnantibus Carolinae.

39. *Benzoin*, foliis cernuis ovatis utrinque acutis integris annuis, flor. glomeratis lateralibus. Comm. hort. 1. p. 189. t. 97. Arbor benzoinum redolens. Pluk. alm. 42. t. 139. f. 3. 4. L. *Pseudo-Benzoin*. Michaux. Fl. p. 243. Hab. in Virginia. h.

*Obs.* Succus, odore quidem Benzoin, ac hanc resinam non profert, quae forte a Terminali Benzoin provenit.

40. *Sassafras*, fol. deciduis integris trilobisque flor. dioicis. L. Michaux. p. 244. Trew. Ehret. t. 5. p. 60. Catesb. car. t. p. 55. 1. 55. Amer. boreali. Stam. flor. max. 9, foent. 6. brevissima. M. Remedium optimum sistit sudorificum, aperient.

995. *ANACARDIUM*. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5, reflexa. *Anther.* 9, filam. decimo castrato. *Nux.* reniformis, supra receptaculum carnosum, s. pedunc. ampliatus pyriforme.

1. *occidentale*. L. Jacq. amer. 124. t. 181. f. 35. Blackw. t. 369. Cassinivum. Lam. ill. t. 322. Rumph. t. t. 69. Rchb. t. 54. Hab. in India. Fol. simplicia magna. Flor. panicul. Pedunc. spongiosus esculentus. (Pomme d'aejon.)

*Obs.* Est planta polygama dioica. Fila-

mentum longius in apertis floribus sterile est, in clausis vero Antheram gerit magnam, torosam. Rott.

996. *PLEGORHIZA*. *Cal.* o. *Cor.* monopetala. *Caps.* 1-locularis, 1-sperma.

1. *adstringens*, Willd. Sp. II. p. 48. Enc. bot. 5. P. Guajacum. Molin. chil. Hab. in Chili provinc. borealiorib. Fol. radical. cespitosa. Flor. terminales pedunculati plurimi. Semen unic. oblongum subcompressum. M. h.

997. *CASSYTA*. *Cor.* calycina, 6-partita. *Nect.* glandulis 3. truncatis, germen cingentibus. *Filam.* interiora glandulifera. *Drupa* 1-sperma.

1. *filiformis*, filiformis laxa. L. Lam. ill. t. 14. Voluella aphylla. Forsk. desc. 81. Calosium cochinchinense Loureiro. Fl. ed. Willd. t. p. 303. Rumph. 5. t. 184. f. 4. Herba cuscutoe; fructificatio lauri. L.

2. *corniculata*, ramis lignosis spinosis. L. Turm. ind. 93. t. 33. f. 1. Hab. in Celebis montib. inter truncos putridos. Fol. lanceolato-linearica. h.

998. *PALOVEA*. *Cal.* duplex: exterior urceolatus, 2-lobus, interior infundibuliformis coriaceus, 4-5-lobus. *Petala* 3? *Legumen*.

1. *guyanensis*. Aubl. t. p. 363. t. 141. Lam. ill. t. 323. Ginannia Schreb. Gen. p. 231. Hab. in Guyana. Fol. simplicia. Flor. spicati bracteati, legum. longum.

*Obs.* Genus ulterius examinandum, cuius filament. decimum forte sterile; ac potius in Decandriam pone Bauhiniam collocandum; cfr. Juss. gen. pl.

999. *ERIOGONUM*. *Cal.* subcampanulatus, 6-fidus. *Cor.* o. *Sem.* 1, triquetrum, cal. tectum. (Flor. pedicellati e communib. involucro campanulato proveniunt.)

1. *tomentosum*, caul. herbaceo dichotomo, fol. ternis verticillatis obovatis. Michaux. Flor. 1. p. 246. t. 24. Hab. in aridib. pinetis Carol. et Georgiae. Flor. allii. Genus Polygoneum, sed vagina stipulari destitutum. M.

## TRIGYNIA.

1000. RHEUM. *Cal.* o. *Cor.* 6-fida, persistens. *Sem.* 1, triquetrum.

1. *rhaponticum*, fol. obtusis glabris, venis subtus pilosisculis, sinu bascos dilatato, petiolis supra sulcatis margine rotundatis. Ait. Kew. 2. p. 41. Willd. Sp. Pl. p. 488. Sabb. hort. 1. t. 34. Hab. in Thracia, etc.

2. *undulatum*, fol. subvillosis, petiolis aequalibus, Lin. Syst. veg. 385. Amoen. acad. 3. p. 312. t. 4. Hab. in China, Sibiria. h

3. *palmatum*, fol. palmaris scuminatis. Lin. fasc. 7. t. 4. Hab. in China.

4. *compactum*, fol. sublobatis obtusissimis lucidis argute denticulatis glaberrimis. L. Hab. in Tartaria, China. Fol. coriacea s. compacta, petiol. solcati.  $\frac{1}{2}$

5. *tataricum*, fol. cordato-ovatis integris planis glaberrimis, petiolis semiteretibus angulatis, panic. sulcata. Lin. suppl. p. 229. Hab. in Tartaria minore. Fol. magna radicalia humo incumbenda. L.

6. *Ribes*, fol. obtusissimis subverruculosis, venis subtus spinulosis, petiolis supra planis margine rotundatis. Ait. Kew. 2. p. 42. Desf. in Annal. d. Mus. p. 1. t. 46. Dill. elth. 191. t. 158. f. 192. (folium.) Hab. in Persia, Libano, Carmelo.

7. *hybridum*, fol. supra glabris, subtus pilosisculis sublobatis acutis, sinu laseos angustato, petiolis supra obsolete sulcatis

margine rotundatis. Ait. Kew. 2. p. 42. Murr. Comm. goett. 1779. p. 7. t. 1. Hab. in Asia boreali. Petiol. plani. h

8. *leucorhizum*, fol. transverse ovalibus depressis, panic. seminifera divaricata, cal. foliolis binis multoties majoribus. Pall. in N. Act. petrop. 1792. p. 381. Hab. in montosis deserti Songarici in Sibiria. Fol. radicalia ad terram appressa, per oram asperata denticulis minutissimis cartilagineo-rightlis. Petioli compressi laeves succul. P.

1001. PLÆA. *Cor.* 6-partita, patens. *Caps.* subrotundo-trigona, (tres conjunctæ?) trilocularis: septo non manifesto. *Sem.* numerosa, oblonga, margini valvularum adnexa. (Spica spathis 1-floris.)

1. *tenuifolia*, fol. ensiformi-attenuatis longissimis. Michaux. 1. p. 248. t. 25. Hab. in ndis sylv. Car. inferioris. Spath. convolutae amplexantes.

*Obs.* An cum *Toffieldia*, potius conjungendum genus? à quo staminum numero solummodo differre videtur.

## HEXAGYNIA.

1002. BUTOMUS. *Cal.* o. *Petalata* 6. *Caps.* 6, polysperma.

1. *umbellatus*, L. Engl. bot. t. 651. Flor. dan. t. 604. Curt. lond. ic. fucus floridus. Baoh. Habit. in squosis.

## MONOGYNIA.

*Amyris* (*Icica*) *enneandra*. *Gardenia* Thunbergia. *Guettarda* speciosa. *Brownnaca enneandra*.

# C L A S S I S X.

## D E C A N D R I A.

### M O N O G Y N I A.

*Leguminosae, filamentis distinctis, cor. nunc regulari, nunc irregulari, s. papilionacea. (Gen. 1003-1033.)*

1003. *SOPHORA, Cal. 5-dentatus, campanulatus, superne gibbus. Cor. papilionacea: alis longitudine vexilli. Legum. moniliforme. (Fol. pinnata: foliol. plerumque numerosa.)*

1. *tetraptera*, foliis pinnatis, foliolis lanceolato-oblongis villosiusculis, leguminibus membranaceo-quadrangulis, caule arboreo. Ait. Kew. 2. p. 43. Lam. ill. gen. t. 325. f. 3. Willd. Sp. II. p. 499. Hab. in N. Zeelandia. Arb. 10-12-pedalis, fiores primo vere, antequam frondescit. h

2. *microphylla*, fol. pinnatis, foliol. minatis obovatis villosiusculis, leguminibus membranaceo-quadrangulis, caule arboreo. Ait. K. l. c. p. 43. Lam. ill. t. 325. f. 1. S. *tetraptera*. Lin. suppl. 230. Habitat cum priore.

3. *flavescens*, glabra, fol. pinnatis, foliolis oblongis glabris, caule herbaceo. Ait. p. 43. Hab. in Sibiria. Fruct. torulosus, glaber.

4. *alopecuroides*, fol. pinnatis, foliol. oblongis villosis, caule herbaceo. L. Mill. diet. n.º 1. Kniph. cent. 10. n.º 94. Dill. elth. 136. t. 112. f. 136. Buxb. cent. 3. p. 25. t. 46. Hab. in Oriente. h

5. *tomentosa*, fol. pinnatis, foliol. subrotundis tomentosis. L. Herm. lugth. 165. t. 171. Lam. ill. t. 325. f. 2. Hab. in Zeylona. h

6. *occidentalis*, fol. pinnatis, foliolis subrotundis incanis subtomentosis. Swartz. obs. 154. Trew. Ehret. 27. t. 59. Hab. in America. An var. precedentis? Fol. minus tomentosa, et fere subtus tantum subtomentosa. Sw.

7. *obliqua*, fol. abrupte pinnatis, subtus ferrugineis, foliol. parvulis basi obliquis, petiunc. verrucosis. Hab. in Amer. australi? (Herb. D. Thibaud.) Pedicelli villosi et fol. subtus subvillosa, haec quasi quadrangula, superiora ovata. Legum. longum torulosum in pedicellis squamosis.

8. *retusa*, fol. pinnatis, foliol. retusis, junioribus leguminibusque tomentosis. Hab. in insula Franciae. Commer. Foliol. ovato-lanceolata apice emarginata. Flor.?

9. *japonica*, fol. pinnatis, foliol. pluribus ovatis glabris, caule arboreo. L. Hab. in Japonia. Arbor alta, fol. nitidis. Petal. chroleuca (alba. L.) unguicul. rotundis. Flor. aestate.

10. *heptaphylla*, fol. pinnatis, foliol. septenis glabris. L. Rumph. amb. 4. p. 60. t. 22. Hab. in India. h

11. *monosperma*, fol. impari-pinnatis, pinnis 5-jugis, leguminibus monospermis, caule arboreo. Swartz. Fl. ind. oecid. 2. p. 272. Podalyria. Enc. bot. 5. p. 440. Hab. in insulis Indiae occidentalis. Arbuscula decem-pedalis cort. albi. Rami ferrugineo-tomentosi. Panic. terminales, ramosae. Cor. magna, coerulesca, odorata. Sw.

12? *argentea*, petiol. diphyllis spiniscentibus, petiunc. racemoso-multifloris terminalibus. Pall. in Act. petrop. 2. 1792. p. 373. t. 8. Podalyria. Willd. Sp. II. p. 502. Hab. in Sibiria. Flores? Legum. planum 1-spermum. h

1004. VIRGILIA. *Cal.* 5-dentatus, gibbus. *Cor.* papilionacea. *Ala* nervillo brevior. *Legum* compressum, ant subteres, polyspermum. (Fol. pinnata.)

1. *capensis*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis subus incanis, legum. tomentosis, caul. fruticoso. Lam. ill. gen. t. 326. f. 2. Sophora. Lin. Podalyria. Willd. p. 501. Hab. ad Cap. b. Sp. Flor. albi. Fur. Amorrhæ. C.

2. *aurea*, fol. pinnatis, foliol. ellipticis acutiusculis, inferne subnudis, legum. glabris. Willd. sub. Podalyria. Lam. ill. t. 326. f. 1. L'Her. Stürp. nov. 1. p. 157. t. 75. Cresc. in Abyssinia. h

3. *secundiflora*, caul. fruticoso, fol. sparsis impari-pinnatis, flor. racemosis secundis. Cav. ic. 5. p. 1. t. 401. Broussonetia. Ortega decal. 5. p. 61. t. 7. Hab. in N. Hispania. *Cor.* caerulea. *Legum.* tomentosum.

1005. PODALYRIA. *Cal.* subbilabiat, 5-fidus. *Cor.* papilionacea, ala vexilli longitudine. *Legumen* læve, ventricosum, polyspermum.

1. *australis* (caerulea), fol. ternatis petiolatis, fol. obovato-lanceolatis obtusis, stipulis lanceolatis petiolo duplo longioribus. Willd. Vent. Hort. Cels. p. 56. t. 56. S. caerulea. Tr. Pl. rar. t. 14. S. australis. L. Hab. in Amer. *Legum.* acuminata. *Flor.* caerulei.

2. *tinctoria*, fol. ternatis petiolatis, foliolis subrotundo-obovatis obtusis mucronatis, stipulis obsoletis oblongis acutis petiolo multoties brevioribus. Willd. *Legum.* parvulis longius stipitatis. Mich. Lam. ill. gen. t. 327. f. 1. Hab. in Amer. septentr. *Flor.* lutei. Rad. tinctoriam nigram præbet.

3. *alba*, ramis divaricatis flexuosis; fol. ternatis petiolatis, foliolis oblongis obtusis, stipulis subulatis petiolo brevioribus, legum. obovatis. Michaux. p. 264. Sophora alba. L.

4. *villosa*, pubescens, fol. subsessilibus, foliol. ovali-oblongis obtusis; stipul. linearib., spica terminali. Michaux. Flor. 1. p. 267. In Car. septentrion. *Flor.* pallidi. *Calyc.* subsemi-quadrifidi. M.

5. *mollis*, pubescens, foliol. subrhomboidico-lanceolatis, stipul. foliaceis lanceolatis, spic. terminali. Michaux. Hab. in Carol. superiore. *Flor.* lutei.

6. *lupinoides*, fol. ternatis petiolatis,

foliol. elliptico-lanceolatis obtusis pubescentibus, stipulis lanceolatis petiolo longioribus. Willd. p. 504. Lam. ill. t. 327. f. 2. Sophora lupinoides. L. Pall. it. 2. p. 616. Hab. in Camtschatca. *Flor.* lutei. *Stipulae* ensiformes magnæ.

7. *myrtyllifolia*, fol. simplicib. obovatis utrinque sericeis obtusis cum acumine, pedunculis unifloris, calycibus basi intratis tomentosis. S. *rotundifolia*, fol. simplicib. obovatis sericeis, flor. axillaribus, pedunculis longitudine foliis. Thunb. prod. 79. Sub Sophora. Retz. obs. 1. p. 86. In Cap. b. spei.

8. *biflora*, fol. simplicibus obovatis subtoementosis, pedunc. bifloris. L. Hab. ad Cap. b. spei. *Flores* purpurascens.

9. *pedunculata*, fol. simplicibus ovatis tomentosis, flor. axillaribus, pedunc. folio longioribus. Sub Sophora. P. buxifolia. Willd. p. 565. Lam. ill. t. 317. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. *Tomentum* rufum. *Flor.* solitarii pedunc. longo insidentes. h

10. *hirsuta*, fol. simplicibus hirsutis, superioribus ovatis, inferioribus sub rotundis, ramis teretibus, lacinis calycinis lanceolatis longitudine alarum. Ait. Kew. 2. p. 46. Sub Sophora. Hab. ad Cap. b. spei. h

11. *obcordata*, fol. simplicib. obcordatis sericeis candicantibus, floribus solitariis subsessilibus, legum. minimis 1-spermis. Lam. enc. 5. p. 445. Ill. gen. t. 327. f. 5. Hab. in Senegal. *Flor.* ignoti. An Ononis?

12. *cuneifolia*, fol. cuneiformib. emarginatis sericeis, pedunc. fol. brevioribus, cal. basi intrusis. Vent. Hort. Cels. p. 69. t. 69. Hab. ad Cap. b. spei. *Arbusc.* elegant, fol. sericeis et flor. lacteis distincta.

13. *perfoliata*, foliis suborbiculato-perfoliatis, flor. solitariis axillarib., leguminib. subglobois. Michaux. Flor. 1. p. 263. *Crotalaria* perfoliata. L. Habit. in Carolinae aridis. *Flor.* lutescentes.

14. *uniflora*, pubescens, flor. solitariis axillaribus pedunculatis, foliol. lanceolatis, stipulis setaceis. Mich. l. c. Sophora lanceolata. Walt. 7. Hab. in Carol. et Georg. *Fol.* sessilia. *Flor.* lutescentes.

*Obs.* Gompholobium. Smith. in Act. soc. Linn. IV. idem genus, saltem ob fructum, videtur.

1006. PULTENÆA. *Cal.* 5-dentatus, utrinque appendiculatus. *Cor.* papilionacea, alis vexillo  
F f 3



brevioribus. *Legumen* uniloculare, dispermum. (Fol. simplicia.)

1. *stipularis*, fol. linearibus mucronatis subciliatis, stipulis solitariis binerviis laceris. Smith. Nov. Holl. 1. p. 35. t. 12. Willd. p. 506. Totum genus provenit in Nova Hollandia seu Australasia.

2. *paleacea*, fol. linearibus mucronatis glabris, capitulo terminali, bracteis oblongo-acuminatis dentatis flore longioribus. Willd. h

3. *linophylla*, fol. linearib. obtusis mucronatis trigonis, capitulis terminalibus paucifloris, bracteis scariosis bifidis calyce multo brevioribus. Willd. l. c. Sert. hannov. p. 28. t. 18. h

4. *daphnoites*, fol. obovatis glabris mucronatis, floribus terminalibus capitatis. Willd. Wendl. obs. 43. Ej. Hort. Herrenb. p. 7. t. 18.

5. *villosa*, fol. oblongis pilosis, florib. axillaribus, caule villosa. Willd. h

6. *tuberculata*, fol. imbricatis ovato-linearibus glabris, tuberculis minutis exsertatis, flor. axillaribus fol. aequantibus. Ex Herb. D. Thibaud.

Obs. A praecedente, quantum ex brevi diagnosi divinare licet, diversa est. Stipulae scariosae, margine villosae. Fol. conferta, convexa, summa parum ciliata, flor. obtegentia.

1007. DAVIESIA. *Cal.* angulatus, simplex (s. nudus), quinquefidus. *Cor.* papilionacea. *Legum.* compressum, monospermum.

1. *ericoides*, hirsuta, fol. sparsis linearibus, margine revolutis, flor. axillaribus. *Pultenaea* ericoides. Vent. Malmaia. p. 35. t. 35. Hab. ut sequens in Australasia.

2. *juncea*, petiol. teretibus: primordiis foliosis, fol. ternatis lanceolatisque deciduis superiorib. nudis longissimis. Vent. Choix de pl. 1. p. 6. t. 6. (D. *densata*.) *Sophora juncea*. Sert. Hannoveran. p. 9 t. 3. *Pultenaea juncea*. Willd. Fol. distincta rarius observantur.

1008. ANAGYRIS. *Vexillum* aequicarinata breviores in corolla papilionacea. *Legumen*.

1. *foetida*. L. Lam. ill. t. 328. Hab. in

Europ. austral. montibus. Folia alternata ternata. Flores subracemosi. Willd. h

1009. CERCIS. *Cal.* 5-dentatus, inferne gibbus. *Cor.* papilionacea: vexillo sub alis brevi. *Legumen*. (Fol. integra.)

1. *Silicastrum*, fol. orbiculatis cordatis. L. Lam. ill. t. 328. F. Dubam. Ed. nov. t. 7. Hab. in Europ. australi.

2. *canadensis*, fol. cordatis acuminatis pubescentibus. L. Mill. ic. 2. Hab. in Virginia. Fol. ad axillas nervor. villosa. Flor. parvuli. M. h.

1010. BAUHINIA. *Cal.* 5-fidus, irregularis, deciduus. *Petala* patula, oblonga, unguiculata: superiore magis distante, omnia calyci inserta. *Legumen* longum, pedicellatum, sublanceolatum. (Filam. in nonnullis basi unita. Fol. biloba.)

1. *scandens*, caule cirrhifero. L. Willd. Sp. 11. p. 508. Rheed. 8. t. 29. Hab. in Malabar, Amboina, Cumana. h

2. *parviflora*, racemis axillaribus terminalibus nutantibus, petalis linearibus, lobis foliorum rotundatis glabris. Vahl. symb. 3. p. 55. Hab. in India orient. Cirrhi nulli. h

3. *racemosa*, flor. triandris extus staminibusque basi hirsutis, fol. subtus sericeis, lobis rotundatis. Vahl. symb. 3. p. 56. t. 62. Lam. enc. 390. In India.

4. *aculeata*, caule aculeato. L. Jacq. amer. 119. t. 177. f. 2. Plum. gen. 23. ic. 14. f. 1. Hab. in Amer. calidior. h

5. *divaricata*, fol. ovatis, lobis divaricatis. L. Hort. cliff. t. 15. Lam. ill. t. 824. f. 3. Hab. in Amer. Stam. diadelph. L. h

6. *aurita*, fol. basi subtransversis, lobis lanceolatis porrectis trinerviis, petalis lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 48. Fol. ovato-cordatis lobis longissimis parallelis. Mill. ic. 41. t. 61.

7. *porrecta*, fol. cordatis, lobis porrectis acutis trinerviis, petalis lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 48. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 52. t. 100. Hab. in Jamaica, Hispaniola. Flor. diadelph. subdecandri.

8. *ungulata*, fol. ovatis, lobis parallelis. L. Hab. in America.

9. *variegata*, calyc. monophyllis rumpentibus, et talis sessilibus ovatis, folior. lobis ovatis obtusis. Ait. l. c. p. 48. Rheed. t. 32. Hab. in Malabarica, Maderae arenosis. Petal. rosei, luteo-purpureoque variegati. h

10. *candida*, fol. cordatis subtus pubescentibus, lobis ovatis obtusis, calycibus superne attenuatis elongatis. Ait. Hab. in India orientali. h

11. *purpurea*, flor. triandris, foliorum lobis ovalibus obtusis. Ait. Kew. 2. p. 49. Rheed. t. 33. Hab. in Indiae arenosis. Flor. purpureascentis.

12. *tomentosa*, fol. cordatis, lobis semi-orbiculatis tomentosis. L. Burm. zeyl. 44. t. 18. Rheed. t. 35. Hab. in India. Cor. campanulata, albo-flavescens. h

13. *acuminata*, fol. ovatis, lobis acuminatis semi-ovatis. L. Rheed. t. 33. Habit. in India orientali. Cor. campanulata, albae. Stamina diadelph. 1.

14. *guyanensis*, fol. binatis, foliol. acuminatis, caule cirrhoso. Willd. B. foliis petiolum divisit, foliol. acutis. Lam. enc. p. 391. *β. Outimonta*, caule cirrhifero, fol. cordiformibus bipartitis, subsus auriculis. Aubl. gej. 1. p. 375. t. 144. Hab. in sylvis Gujanac. h

15. *diphylla*, fol. binatis, foliol. inaequalibus obtusis 5-nerviis, cirrho simplici laterali. Synon. it. ad Regn. avam. 3. Lond. 1800. t. 7. Hab. in India.

16. *rubescens*, fol. ad petiolum usque divisit, foliol. semiorbiculatis obtusis. Lam. l. c. illust. gen. t. 329. f. 2. Hab. in Africa. Caul. nudus. h

17. *Pes caprae*, caul. arboreo, fol. cordatis glabris, lobis apice divergentibus, flor. racemosis. Cav. ic. 5. p. 3 t. 404. Collecta c. sequentibus in Amer. australi a cl. Née Stam. diadelph. h

18. *latifolia*, caul. fruticoso, fol. cordatis rotundato-bilobis, flor. racemosis glabris. Cav. l. c. p. 4. t. 405. Petal. alba. Caul. inermis. h

19. *rotundifolia*, fol. alternis subrotundis, lobis semiorbiculatis subtus tomentosis, flor. racemosis. Cav. t. 405. B. *tomentosae* affinis, sed stam. diadelpa et cor. campanulata. †

20. *lunaria*, fol. glabris cordatis, lobis subrotund., flor. racemosis tomentosis. Cav.

t. 407. Aff. B. *racemosae*. Stam. diadelph. ha. Cor. rubra.

21. *Pauletia*, caul. fruticoso aculeato, fol. ovatis bilobis, lobis obtusis, flor. geminis, in racemum foliosum dispositis. *Pauletia aculeata*. Cav. l. c. p. 6. t. 410. Cresc. in Panamae vicinit. Petal. undulata et luteo-rubra uti in sequente.

22. *inermis*, inermis, caule arborescente, fol. ovatis, lobis acutis, flor. racemosis terminalibus. *Pauletia inermis*. Cav. p. 6. t. 409. Hab. in Acapulco vicinitis.

Obs. Beat. auctor ex hac et antecedente specie genus peculiare constituit: ob cal. *persistentem*, petal. *linearia*, fil. m. *basi connexa*, in corpus crassum etc. et nomine viri probi nec non meriti condemnavit: sed characteres, quibus à Bauhinia, L. differunt, vix sufficere videntur, ut ab eis removeri possint.

23? *latifolia*, caule fruticoso, fol. lobis acutis, legum. latissimis. Cav. l. c. p. 5. t. 406. Hab. in Ins. Philippicia. Legum. semipedal. An *Hymenaea*?

1011. HYMENAEA. Cal. turbinatus coriaceus, 5-partitus. *Petala* 5, subaequalia. *Stylus* intortus. *Legumen* magna, dilatatum, repletum pulpa farinacea. (Fol. conjugata.)

1. *curbaril*, foliol. coriaceis subaequalibus basi inaequalibus, paniculae flor. pedunculatis. Vahl. erlog. 2. p. 30. Willd. Sp. II. p. 512. Lam. ill. gen. t. 330. f. 1. Pluk. alm. 166. t. 82. f. 3. Hab. in Amer. meridionali. Arb. resinosa, utilisima.

2. *venosa*, fol. membranaceis venosis, basi subaequalibus, paniculae flor. subsessilibus. Vahl. l. c. p. 31. Hab. in Cajenna. h

3. *verrucosa*, foliol. venosis basi inaequalibus, panic. flexuosa divaricata. pedunc. multifloris, legum verrucoso. Willd. Gaert. sem. 2. p. 406. t. 139. f. 7. Lam. ill. t. 330. f. 2. Hab. in Madagascar. h

1012. AFZELIA. Cal. tubulosus, limbo quadrifido, deciduo. *Petala* 4, unguiculata: summo maximo. *Filamenta* 2 suprema, sterilia. *Legum.* multiloculare. *Semina* basi arillata.

1. *africana*. Smith. in Act. soc. Linnaen. v. 4. Hab. in Africa equinoctiali. Arb. fol.

alterna abrupte pinnata. Floe. racemosi, sanguinei. Legum. lignosum. Scm. nigra: arillo coccineo. S.

1013. CYNOMETRA. *Cal.* 4-phyllus. *Anthera* bifida. Legum. carnosum lunatum, 1-spermum. (Fol. conjugata.)

1. *cauliflora*, tenuco floifero. L. Willd. Sp. II. p. 539. Rumph. 1. t. 52. Lam. ill. t. 331. Hab. in Indiis. Aeb.

2. *ramiflora*, ramis floriferis. Rumph. 1. t. 63. Rhed. 4. t. 31. Cresc. in India. Aeb. praecedente alior. Legum. minora.

1014. CASSIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petalata* 5, aequalia. *Anthera* suprema 3, steriles; infimae 3, rostratae, in filam. longioribus incurvis. Legum. membranaceum, 2-valve.

1. *aphylla*, caule fruticoso dichotomo aphylo. Cav. ic. 6. p. 41. t. 56r. Hab. in Amer. boreal. 3-petalis. Legum. lineaeae.

2. *diphylla*, fol. conjugatis, stipulis cordato-lanceolatis. Cav. ic. 5. p. 80. t. 600. f. 1. Hab. in India. ☉

3. *lanceolata*, fol. 11-jugis obovatis venosis, stipul. lanceolatis apiceatis, foliol. subaequantibus. Hab. in Cajenne. (Heeb. Lamark.) Legum. longe pedicellatum, glabrum, stipul. longae.

4. *rotundifolia*, fol. 2-jugis subeotundis, stipul. parvis ovato-acuminatis, petiol. subaequantibus, caule subvillosa. Hab. in Amer. austr. (Herb. Juss.) Flor. axillares solitarii, pedicel. longi inaequali.

5. *Abzus*, pilosa, fol. 2-jugis obovatis, gland. duabus subulatis inter infima. L. Senna quadrifolia, siliqua plana hirsuta, floe aureo sanguineo. Burm. zeyl. 212. t. 97. Hab. in Indis, Aegypto. ☉

6. *viminea*, fol. 2-jugis ovato-oblongis acuminatis, glandula oblonga inter infima, apinis subpetiolaribus obsolete tridentatis. Sloan. jam. 2. p. 49. t. 189. f. 6. 7. Hab. in Jamaicae montibus altissimis interiocisylvaticis. h

7. *Apocovita*, arborescens, fol. 2-3-jugis amplis ovali-oblongis, eacem. axillaribus. Aubl. Gujan. p. 379. t. 146. Hab. in Gujans. Arb. satis alta.

8. *Tagera*, procumbens, fol. 3-jugis glandula petiolaris, stipulis ciliatis cordatis acuminatis. L. Rhed. msl. 2. p. 103. t. 52? Hab. in India.

9. *Tora*, erecta, fol. 3-jugis obovatis, exteioribus majoribus, glandula subulata inter infima. L. C. *limensis*, Lam. Dill. elth. 72. t. 83. f. 73. ☉ C. *humilis*, siliquis forni graeci. Plum. Spec. 18. t. 72. f. 2. Hab. in India. ☉

10. *bicapsularis*, fol. 3-jugis obovatis glabris: interioribus rotundioribus, glandula interjecta globosa. L. Meisn. sue. 1. 32. Plum. spec. 18. t. 76. f. 1. Hab. in India. h

11. *emarginata*, fol. sub-4-jugis ovatis subintegris, florib. eacemos irregularibus, caule aetereo. Swartz. obs. 157. Sloan. hist. 2. p. 44. t. 180. f. 1. 2. 3. 4. Hab. in Caebacis. h

12. *obtusifolia*, fol. 3-jugis ovatis obtusiusculis. L. Dill. elth. 71. t. 62. f. 72. Hab. in Cubae et Jamaicae rudicatis.

13. *sennoites*, fol. 3-jugis, foliol. sverse ovatis, glandula obtusa inter infima, stipulis subulatis, caule arboreo. Jacq. ic. rae. 1. t. 70. Collect. 1. p. 74. W. Hab. in India orientali h

14. *acuminata*, fol. 3-jugis, foliol. ovatis acuminatis, glandula sessili inter foliola. Willd. p. 517. C. *apocovira*. Aubl. guj. 1. p. 379. t. 146. Hab. in Gujanae sylvis. h

15. *corymbosa*, fruticosa, fol. 3-jugis lanceolatis subfalcatis glabris, glandula inter infima, corymbis pedunculatis axillaribus, leguminibus cylindricis. Lam. enc. 614. Hab. in Bonaria. C. *falcata* hortulanorum. h

Obs. Sub nomine C. *falcata* frequens hic colitur, a qua tamen diversa. C. *crassifolia* et *corymbosa*? Orteg. decad. 10. p. 122-124, ab hac non dissee videtur.

16. *longisiliqua*, fol. 4-jugis, foliol. extremis lanceolatis, glandula subulata infra infima interque extrema. Lin. suppl. p. 230. Hab. in America. Legum. tetragonum, hirtum brevius. h

17. *falcata* (herbacea?) fol. 4-jugis ovato-lanceolatis retrofalcatis, glandula basos petiolorum. L. Hort. cliff. 159. Hab. in America. ☉ †

18. *sericea*, fol. sub-4-jugis ovatis hirsutis, glandula subulata inter foliola, peduncul. 4-floris, leguminibus tetragonis. Swartz.

Flor. 2. p. 724. *C. sensitiva*. Jacq. ic. rar. 3. t. 459. Collect. 2. p. 362. Hab. in gramin. subalpinis Jamaicæ. ☉

19. *occidentalis* (*foetida*), fol. sub-5-jugis ovato-lanceolatis margine scabris, exterioribus majoribus, glandula baseos petiolorum. L. C. americana foetida. Tourn. institut. Comm. hort. 1. p. 51. t. 26. Sloan. jam. hist. 2. t. 176. 3. 4. Pedunc. multiflori. Hab. in America. Legum. angusta linearia falcata. Michaux. ☉

20. *linearis*, herbacea glabra, fol. sub-6-jugis lanceolatis ovalibus acutissimis, gland. basilar. pedunc. subbifloris, legum. linearib. rectis. Michaux. Flor. 1. p. 261. Hab. in Carol. Præcedenti nimis affinis, florazione præcocior. ☉

21. *grandiflora*, fol. 5-jugis ovatis margine pubescentibus, pedunc. axillarib. brevibus subtrifloris, gland. globosa sessili. *C. chinensis*. Lam. enc. 1. p. 644. Rumph. t. 2. 23. Hab. in China. Flore magno, flavo memorabilis. L. ☉

22. *ornithopoides*, fol. 4-jugis, foliol. ovato-cuneiformibus mucronatis, pilosoferrugineis, legum. linearibus articulatis erectis tomentosis, macrone recurvo terminatis. Lam. 1. c. Hab. in Amer. meridion. Gland. conico-filiformis ad singulum fol. par. L.

23. *torosa*, fol. 5-jugis, foliol. ovato-oblongis, gland. subpedicellata baseos petiolorum, legum. cylindricis, utrinque juxta suturas torulosis, torulis transversalibus. Cav. Desc. de Las. plant. p. 131.

24. *Camca*, fol. sub-6-jugis, foliol. ovato-lanceolatis subciliatis, gland. sessili in petiolor. basi, flor. subumbellatis, legum. subquadrangularibus. Cav. 1. c. Hab. in Cumana.

25. *planisiliqua*, fol. 5-jugis ovato-lanceolatis glabris, glandula baseos petiolorum. Plum. Sp. t. 77. Hab. in Amer. calidiora. h

26. *patula*, fol. 5-6-jugis oblongis acutiuscul. glabris, glandula baseos petiolorum, ramis lacribus. Ait. Kew. 2. p. 51. Hab. in India occidentali. h

27. *atomaria*, fol. 5-jugis ovatis submentosis, petiolis teretibus eglandulatis. L. Hab. in America. Petioli atomis subferrugineis adpersi. Fol. utrinque viridia, tactu tomentosa. L.

28. *lineata*, fol. 5-jugis oblongiusculis sulcis pubescentibus subæqualibus, gland. obsoleta sub infimis, peduncul. unifloris.

Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 726. Hab. in ruderalis et cultis Jamaicæ. ☉

29. *pilosa*, fol. 5-jugis eglandulatis, stipul. semicordatis acuminatis, caule stricto piloso. L. Hab. in Jamaicæ austr. aridis. Flor. pentandri.

30. *arborescens*, fol. sub-5-jugis ellipticis glabris, glandula oblonga inter inferiora, stipulis subulato-falcatis, racemis axillaribus. Vahl. symb. 3. p. 56. Hab. in India orientali. h

31. *Senna*, fol. sejunctis subovatis, petiolis eglandulatis, legum. reniformibus. Hab. in Aegypto. ☉

32. *orientalis*, fol. 5-jugis lanceolatis æqualib., gland. supra basi petiolorum. Cassia lanceolata. Forsk. Aegypt. 85. n. 58. Lam. enc. 1. 646. Cassia orientalis. Tabern. ic. 507. *Senna alexandrina*, fol. 4-jugis lanceolatis acutis. Mill. Hab. in Oriente. Legum. arcata. Cum priore confusa; videtur *Senna vera* officinarum. Saltem antecedente multo efficacior est.

33. *ruscifolia*, fol. subsejugis ovato-lanceolatis glabris, glandula ad petioli basin, tomento compresso marginato. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 71. Collect. 1. p. 43. Hab. in Madrae rupibus. h

34. *biflora*, fol. 6-jugis oblongiusculis glabris, inferioribus minoribus, glandula subulata inter infima, pedicellis subbifloris. L. Hort. cliff. 159. Plum. spec. 18. ic. 78. f. 1. Hab. in America. h

35. *chinensis*, fol. pinnatis ex quatuor ad septem parib., foliol. lanceolatis, gland. supra basin costae, legum. transversim costato. Jacq. ic. rar. 1. t. 73. Collect. 1. p. 64. Hab. prope Peking in China. h

36. *multiglandulosa*, fol. 6-jugis ovali-oblongis obtusis pilosis, exterioribus majoribus, gland. subulatis omnium parium, siliquis linearibus. Ait. Kew. 2. p. 52. Jacq. ic. rar. 1. t. 72. Collect. 1. p. 62. Hab. in ins. Teneriffa. h

37. *hirsuta*, fol. 6-jugis late ovatis acuminatis lanatis. Lin. suppl. 23r. Hab. in America.

38. *glauca*, fol. 6-jugis, foliol. ovatis infra glaucis et venosis, gland. oblongis pluribus, legum. linearibus rostris compressis et mucronatis. Lam. enc. 1. p. 647. Rheed. 6. p. 17. t. 9. et 10. Hab. in Pondichery.

39. *tomentosa*, fol. 6-8-jugis, foliol. oblongo ovatis, basi obliquis mucronatis subius tomentosis, gland. pluribus subulatis, racemis axillaribus, legum. tomentos. Lam. l. c. et Lin. suppl. p. 231? Rami quoque flavo-tomentosi. Hab. in Brasilia.

40. *albida*, fol. 7-jugis, oblique ovalibus sericeis, gland. subulatis, pedunc. subquadrifloris, legum. obsolete 4-gonis hirsutis. Orteg. dec. p. 92. Hab. in N. Hispania.

41. *serpens*, fol. 7-jugis, flor. pentandris, caul. filiformibus prostratis herbaceis. L. Hab. in Jamaicae pascuis aridis. ☉

42. *mexicana*, fol. 7-jugis, foliol. obtusiusculis pubescentibus ciliatis, glandula cylindrica inter infima. Willd. Jacq. hort. Schoenh. 2. p. 41. t. 203. Habitat in Mexico.

43. *angustifolia*, fol. 7-jugis lanceolatis, extimis majoribus, petiolis eglandulatis, caule fruticoso. Vahl. symb. 1. p. 29. Hab. in Arabia. A. C. Senna differt legum. non curvatis. V. h

44. *ligustrina*, fol. 7-jugis lanceolatis, extimis minoribus, glandula bascos petiolorum. L. Dill. elrh. 350. t. 259. f. 338. Hab. in Virginia, Bahama. h

45. *florida*, fol. 7-jugis ovali-oblongis glabris emarginatis eglandulosis, flor. racemosis, bract. spatulatis mucronatis. Vahl. symb. 3. p. 57. Hab. in India orient.

46. *stipulacea*, fol. sub-8-jugis ovato-lanceolatis, glandula inter inferiora, stipul. ovatis maximis. Ait. Kew. 2. p. 52. Feuill. peruv. 3. p. 56. t. 42. Hab. in Chili. h

47. *alata*, fol. 8-jugis obovati-oblongis, exterioribus minoribus, petiolis eglandulatis, stipulis patulis. L. Veget. 328. Swartz. obs. C. *herpetica*, Jacq. obs. 2. p. 24. t. 45. f. 2. Rumph. 7. t. 18. Legum. margine crenato-membranaceo. Fol. magis emarginata. Hab. in Amer. calidiore. h

48. *siamea*, fol. 8-9-jugis ovato-oblongis obtusis glabris, petiol. eglandulatis, corymb. pedunculatis axillaribus terminalibusque. Lam. enc. 1. p. 518. Hab. prope Siam. Comm. Legum. planum marginatum. +

49. *marilandica*, fol. 8-jugis ovato-oblongis aequalibus, glandula bascos petiolorum, flor. spicato-paniculatis. L. Dill. elrh. 351. t. 250. f. 319. Hab. in Amer. boreali. Legum. lineare arcuatum.

50. *fastigiata*, fol. 9-jugis oblongis gla-

bris. gland. pedicellata inter omnia foliola, flor. racemosis. Vahl. symb. 3. p. 57. Hab. in India. h

51. *frondosa*, fol. 9-jugis ovali-oblongis glabris obtusiusculis, glandula cylindrica inter inferiora, petiola basi eglandul. Ait. Kew. 2. p. 35. C. *cristata*. Jacq. ic. rar. t. 74. Collect. 1. p. 82. Hab. in India occidentali. h

52. *tenuissima*, fol. 9-jugis oblongis, glandula subulata inter infima. L. Hab. in Havana. h

53. *virgata*, fol. 10-jugis ovato lanceolatis villous, glandula petiolorum pedicellata, pedunc. unifloris foliolis longioribus. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 728.

54. *angustisiliqua*, fol. 10-jugis ovato-oblongis acutis aristatis, gland. pedicellata inter infima, legum. angustis et compressis. L. l. c. p. 619. Burm. amer. t. 78. f. 2. Hab. in America australiore. Flor. magni, racemosi. h

55. *sophera*, fol. 10-jugis lanceolatis, glandula bascos oblonga. L. Burm. zeyl. 213. t. 98. Rumph. 5. t. 97. f. 1. Rheed. 2. t. 52. Hab. in India umbrosis. Cor. albidoflavescens venis fuscis. Legum. subfalcatum, lineare.

56. *bracteata*, fol. 10-jugis oblongis obtusis eglandulatis, racemosis elongatis, bract. magnis ovatis tumidis imbricatis legumine quadrangulati compresso. Lin. suppl. 232. Hab. in Surinamo. Fol. pelalia. Racem. maximus. Bract. magnae imbricatae nervosae, caducae. L.

57. *auriculata*, fol. 12-jugis obtusis mucronatis, glandulis subulatis pluribus, stipulis reniformibus barbatis. L. Pluk. alm. 341. t. 314. f. 4. Hab. in India.

58. *brevifolia*, ramosissima subglabra, fol. 12-jugis obovatis, pedunc. lateralibus unifloris, fol. longioribus. Lam. encycl. 1. p. 652. Hab. in Madagascar. Commers. Fol. minutissima, approximata. h

59. *angustissima*, fol. multijugis, foliol. perexiguis aristatis tomentosis, stipul. lanceolato-setaceis, pedunc. bipartitis, caul. hirsuto. Lam. l. c. p. 651. Hab. in ins. Java. Commers.

60. *nirricans*, fol. 14-jugis lineari-oblongis obtusissimis mucronatis, glandula bascos sessili. Vahl. symb. 1. p. 30. Hab. in Arabia felici. h

61. *polyphylla*, fol. multijugis, foliol.

ellipticis obtusis ciliatis, glandula oblonga, sessili inter infima, pedunc. subbifloris. Willd. p. 527. Jacq. ic. rar. 3. t. 460. Collect. 4. p. 104. Hab. in insula Porto-Rico. h

61. *Chamaecrista*, fol. multijugis, glandula petiolari subpedicellata, stipulis ensiformibus. Hab. in Jamaica, Barbados, Virginia. Flor. subgemini. Fol. pennaeformia. Petala 2-superiora macula purpurea. Legum. pubesc.

62. *glandulosa*, fol. multijugis multiglandulatis, stipulis subulatis. L. Breyn. cent. 63. t. 24. Hab. in Jamaica, Guadeloupe. Flor. alexandri, anth. 2-longissimis. L.

63. *mimosoides*, fol. multijugis linearibus: glandula basos petiolorum obsoleta, stipulis setaceis. L. Hab. in Zeylona. Stip. lanceolatae, seta terminatae. Stam. 2, quorum 7 cum antheris oblongis. Legumina linearia. L.

64. *fasciculata*, glabrescens, fol. subjugis, gland. sessili, fascic. multifloris, legum. glabellis acutis adscendentibus. Michaux. Flor. 1. p. 262.

65. *microphylla*, fol. multijugis linearibus mucronatis, gland. inter infima, stipulis lanceolatis mucronatis, pedunc. solitarii unifloris, caule ramoso virgato. Willd. p. 529. Hab. in ins. St.-Cruceis. Loment. compressum, lineare, affinis praecedenti. W. +

66. *pumila*, fol. multijugis, basi ciliatis mucronatis, gland. petiolari pedicellata, caul. ramosissimo hirsuto. Lam. l. c. p. 651. Pluk. alm. 251. t. 120. f. 1. Hab. in Ind. orient. Flor. minimi. Legum. compressum, subvillosum.

67. *flexuosa*, fol. multijugis, stipul. dimidiato-cordatis. L. Breyn. cent. 65. t. 23. Hab. in Brasilia. ☉

68. *capensis*, fol. multijugis, foliol. linearibus, caule flexuoso-erecto villosulo. Thunb. prod. 79. Hab. ad Cap. b. spel.

69. *niticans*, tota pubescens, fol. multijugis, flor. pentandris, caule erecto villosulo. Pluk. alm. 141. t. 314. f. 5. Rumph. 6. t. 61. f. 1. Hab. in Amer. bor. Flor. minuti, immaculati. ☉

70. *procumbens*, fol. multijugis eglandulatis, caule filiformi procumbente. L. Roth. Catal. 2. p. 43. Comm. petrop. t. 11. Pet. sicc. 243. Hab. in Indiis, aprieis siccis. Stam. 10, glandula in fol. actate evanescent. Roth. ☉

1015. *CATHARTOCARPUS*. Cal. 5-partitus, deciduus. Cor. regularis, 5-petala. Filam. inferiora arcuata. Legum. longum, teres, ligulosum, pluriloculare: loculis pulpa faretis.

1. *Fistula*, fol. 5-jugis ovatis acuminatis, petiolis eglandulosis, petalis planis ovatis. Cassia *fistula*. Lin. Gaertn. de Fr. 2. p. 313. Lam. ill. t. 332. Rumph. 2. t. 21. Hab. in India, Aegypto et America. Arb. magna, Juglandem referens, flor. pulchros profert.

Obs. Usus fructus ejusque pulpa notissimus, unde nomen huius generi a reliquis Cassiis diverso inditum.

2. *Bacillus*, fol. 2-jugis ovatis obliquis, glandula inter infima. Gaertn. l. c. Hout. Reliq. t. 17. Cassia bacillaris. Lin. Suppl. p. 231. Willd. Sp. II. p. 514. Hab. in Surinamo. Frut. 12-pedal. Racem. axillares. Legum. subcurvum, acum., filiformi terminatum. L.

3. *grandis*, fol. 20-jugis oblongis obtusis, subholosericeis eglandulatis. Lin. Suppl. p. 230, sub Cassia. Cassia *brasiliensis*. Lam. enc. 1. p. 649-650. C. *mollis* Vahl. Willd. p. 526. Breyn. cent. t. 21. Hab. in Surinamo, Brasilia et St.-Domingo. Arbor robusta, legum. 1-semi-pedale, ultra unc. latum, superne canaliculatum, venis prominulis, pulpa ingrata, amara. L.

4. *javanicus*, fol. 12-15-jugis, foliolis ovatis obtusis glabris, legum. subcylindricis longissimis. Lam. l. c. sub Cassia. Vahl. symb. 3. p. 58. Willd. Sp. II. p. 527. Commel. hort. 1. p. 217. t. III. C. *Fistula sylvestris*. Rumph. Amh. 2. p. 82. t. 22. Hab. in Java et in ins. Moluccens. Fruct. pulpa molli destitutus dicitur. Fol. eglandulosa, basi obliqua. V.

1016. *PARKINSONIA*. Cal. 5-fidus. Petala 5, plana, ovata: superiore ovato-subrotundo, ungue erecto longissimo. Legum. torosum.

1. *aculeata*. Lin. Lam. ill. t. 336. Jacq. amer. Ed. piet. t. 129. Hab. in Amer. calidiore. Arb. 12-petalis, elegantissima. Fol. rachis compressa, lata, cui adherent foliol. minutissima.

1017. *TACHIA*. Cal. turbinatus, 5-partitus. Cor. 5-petala, subaequalis. Stam. calyci inserta,

longa, omnia foecunda, tria superiora breviora. *Legumen*.

1. *paniculata*, fol. pinnatis, foliol. oppositis. Cul. aca. Schreb. Willd. p. 530. Tachigali paniculata. Aubl. guj. 1. p. 322. t. 143. f. 4. Lam. ill. t. 339. Hab. in sylvis Gujanæ cum sequente. *h*

2. *trigona*, fol. pinnatis, foliol. alternis. Aubl. 1. p. 374. t. 143. f. 2. Præcedentis varietas?

*Obs.* Nomen *Cubææ* cum *Cobacæ* nimis est consonum, ut assumi possit.

1018. *CÆSALPINIA*. *Cal.* 5-partitus, locinia infima majori subforficata. *Petala* 5. *Stam.* basi lanata, omnia foecunda. *Legum.* compressum.

\* *Inermes*.

1. *elata*, inermis, foliol. linearib. obtusis cum acumine, corymbis compositis, calycibus coriaceis tomentosis, petalis ambriatis, sism. longissimis. Swartz l.c. Hab. in Indis. Filam. atropurpurea, basi villosa.

2. *coriaria*, inermis, foliol. linearibus obtusis, racemis paniculatis, calycibus glabris, staminib. corolla duplo longioribus. Willd. p. 532. Poinciana coriaria. Jacq. amer. 123. t. 175. f. 36. Ed. pict. 250. f. 35. Hab. in merid. Curacæ et Carthagenæ. *h*

*Obs.* *Legum.* matura ab incolis, quibus *Libidibi* audinet, ad condensenda coria adhibetur. *J*

3. *brasiliensis*, inermis, foliol. ovato-oblongis, rachidibus pubescentibus, calycibus tomentosis, staminibus corolla brevioribus. Swartz. Hab. in Carolina, Jamaica, et Brasiliæ. *h*

\* \* *Aculeatae*.

4. *bahamensis*, ramis aculeatis, foliol. obovatis emarginatis, flor. albidis. Lam. enc. 1. p. 461. Catesb. Carol. 2. p. 51. t. 51. Hab. in ins. Bahama et Jamaica. Fol. duplicato-pinnata.

5. *vesicaria*, caule aculeato, fol. obcordatis subrotundis, racem. spicatis. Lam. enc. 1. p. 461. Lin. Sp. pl. p. 545. *C. bijuga*. Swartz. Willd. Sp. II. p. 530. Poinciana bijuga. Lin. Sloan. hist. 2. p. 50. t. 181. f. 2, 3. Pluk. t. 165. f. 3. Hab. in Jamaica. *Legum.* nigra, sulcata. *h*

6. *pulcherrima*, aculeata, foliol. ob-

longo-ovalibus emarginatis, calycibusque glabris, corymbis simplicibus, petalis ambriatis, staminib. longissimis. Swartz. obs. p. 166. Poinciana pulcherrima. L. Jacq. amer. 122. et ed. pict. t. 120. Lam. ill. t. 333. Hab. in Indiis. Flor. speciosi, e croceo et coccineo variegati, aut solum croci. Stam. longissima incurva. Frutes 12-pedalis.

7. *echinata*, caule ramisque aculeatis, foliol. ovatis obtusis, leguminib. echinatis. Lam. enc. 1. p. 461. Pseudo-Santalum rubrum. s. arbor Brasiliæ. Bauh. pin. p. 393. Hab. in Brasiliæ. Arb. grandis (*Bois de Brasil*), cujus lignum tincturae communi rubrae inservit. *h*

8. *Sappan*, caule aculeato, foliol. oblongis, inaequilateralibus (obliquis) emarginatis. Roxb. corom. 1. p. 17. t. 16. Lam. ill. t. 335. f. 1. Lignum Sappan. Rumph. 4. t. 21. Rheed. 6. t. 2. Hab. in Indiis. Arb. 10-15-pedalis, cujus lignum coctum tincturam præbet, primo nigram, sed, alumine admixto, amoene rubram.

9. *Crista*, aculeata, foliol. ovalibus, racem. simplicibus, petalis ovatis, calyce glabro brevioribus, staminibus calyce longioribus. Swartz. l. c. Plum. gen. t. 68. Hab. in Jamaica. *h*

10. *mimosoides*, caule petiolis pedunculisque aculeatis, foliol. oblongis obtusis parvis, leguminibus lanuginosis. Lamarck. enc. 1. p. 462. Ej. ill. t. 335. f. 2. Rheed. 6. t. 8. Hab. in India. Est sensitiva ut nonnullae Mimosæ. Racem. hispidulus. Flor. magni, flavi. *L*

1019. *HOFFMANSEGGERIA*. *Cal.* 5-partitus, persistens. *Petala* 5, unguiculata patentia, superiori latiore, basi glandulosa. *Filam.* pilosoglandulosa. *Stigm.* clavatum. *Legumen* lineare, compressum, polyspermum. (Petioli axillis glandulis pedicellatis.)

1. *falcaria*, caul. suffrutesco decumbente, fol. bipinnatis, pinnul. ovatis glaucis. Cav. ic. 4. p. 64. t. 392. Larrea glauca. Orteg. Hab. in montibus altis Amer. meridionali. *Legum.* arcuatum.

2. *trifoliata*, subcaulis, petiolis radicalibus trifoliatis, fol. pinnatis. Cav. l. c. p. 67. t. 393. f. 1. Hab. in Amer. meridion. aridis. *Legum.* rectum, villosum.

1020. *POMARIA*. *Cal.* turbinatus, 5-partitus, caducus. *Petala* 5, sub-

unguiculata : superiore concavo brevior. *Filam.* inferne hirsuta. *Stigm.* capitatum. *Legum.* 1-loeulare, dispersum.

1. *claudulosa*, caule fruticoso, fol. tota glandulis nigri obsita. Cav. ic. 5. p. 2. t. 402. Hab. in N. Hispania. Fol. bipinnata, alterna. Flor. racemosi, lutei. h

1021. ZUCCAGNIA. *Cal.* persistens, 5-partitus. *Petala* 5, ovata : superiore concavo. *Filam.* inferne pilosa. *Stigm.* infundibuliforme. *Legum.* subovatum compressum, 1-loeulare, 1-spermum.

1. *punctata*, fol. pinnatis, pinnul. ellipticis alternis punctatis glutinosi, flor. racemosis terminalibus. Cav. ic. 5. p. 2. t. 403. Hab. in montib. chilensibus. *Legum.* crinitum. h

*Obs.* An tria haecce Cavanillesii genera, inter se et priori nimis affinia, potius in unum conjungi debent?

1022. GUILANDINA. *Cal.* 1-phyllus, hypocrateriformis. *Petala* calycis collo inserta, subaequalia. *Legumen* subrhomboideum, 1-loeulare. *Sem.* dura.

1. *Bonduc*, aculeata, pinnis ovatis, foliol. aculeis solitariis. L. Lam. enc. 1. p. 434. et ill. t. 336. Rumph. 5. t. 48. Hab. in Indiis. h

2. *Bonduccella*, aculeata, pinnis oblongo-ovatis, foliol. aculeis geminis. L. Lam. l. c. Rumph. 5. t. 49. f. 2. Rheed. 2. t. 22. Hab. in Indiis. h

3. *Nuga*, caule inermi, fol. petiolo primario subtus aculeis geminis. L. Rumph. 5. t. 50. Hab. in Amboina. †

4. *paniculata*, ramis petiolisque aculeatis, florib. paniculatis ebraetatis, leguminibus monospermis laevib. Lam. enc. 435. Rheed. 6. t. 19. Hab. in Malaharia et N. Hibernia. h

5. *axillaris*, aculeata, fol. pinnatis, flor. axillaribus subsolitariis, leguminib. monospermis villosis. Lam. l. c. Rheed. 6. t. 20. Hab. in India.

1023. MORINGA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* calyci inserta, inequalia. *Caps.* longissima, 3-valvis. *Semina* alata.

1. *seylanica*, flor. semidecandris, fol.

subbipinnatis, foliol. inferioribus ternatis, leguminib. trigonis. Willd. Sp. II. p. 536, et Vahl. symb. 1. p. 30. Sub nomine generico *Hyperanthera* utriusq. species. M. *oleifera*. Lamarck. enc. 1. p. 398, et ej. ill. gen. 1. 337. Jacq. ic. rar. 3. t. 461. Collet. 2. p. 371. Rumph. 1. t. 74, 75. Hab. in Zeylona, America et Aegypto, locis arenosis. Arb. cujus radix et legum. commeduntur. Oleum ex seminib. expressum non rancidum fit. *Legum.* longissimum, triquetrum. h

2. *arabica*, florib. semidecandris, fol. bipinnatis, apice simpliciter pinnatis. Vahl. symb. 1. p. 30. (Hyper. semidecandria.) *Gymnocladus arabica*. Lam. enc. 1. p. 733. Hab. in Arabia. Stam. s. fertilia, caps. cylindrica.

1024. ADENANTHERA. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Anthera* apice exteriore glandula globosa affixa. *Legum.* membranaceum.

1. *pavonina*, fol. decompositis utrinque glabris, foliol. alternis. L. Willd. Sp. II. p. 550. Jacq. coll. 4. p. 212. t. 23. Lam. ill. t. 334. Hab. in Ind. h

2. *falcata*, fol. decompositis subius tomentosis. L. Rumph. 3. t. 111. Cum priore. h

3. *scandens*, fol. pinnatis bijugis, foliol. ovatis obliquis glabris, circlis terminalibus bifidis. Forst. prodr. n° 1117. Hab. in Ins. Mallicollo. h

1025. CADIA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, aequalia, obovata. *Legumen* polyspermum.

1. *purpurea*. Forsk. descr. p. 90. L'Herit. in Magaz. encycl. 5. p. 29. Spandonea tamarindifolia. Desfont. in Decad. philos. 7. p. 259. Hab. in Arabia felici. Fol. imparipinnata, foliol. numerosissimis. Cor. recens alba dein rosea.

1026. PROSOPIS. *Cal.* hemisphaericus, 4-dentatus. *Petala* 5, lineari-lanceolata, apice recurva. *Filamenta* petalor. basi adnata, capillacea. *Stigma* simplex. *Legumen* polyspermum, longum.

1. *spicigera*, L. Burm. ind. 102. t. 25. f. 3. Roxb. corom. 1. p. 45. t. 63. Lam. ill. t. 340. Hab. in India. Arb., ramis spinosis. Fol. alterna conjugata, foliol. pinnatis, sine impari. Flor. parvi. *Legum.* lineare terrestriusculum, edule. R.



1027. EPFRUA. *Cal.* monophyllus, limbo 4-partito. *Petalum* 1, subrotundum, laterale basi convolutum. *Filam.* basi incrassata, barbata, 5-sterilia. *Legumen*.

1. *falcata*. Aubl. guj. 1. p. 369. t. 142. Lam. ill. 338. Panzera. Willd. Sp. pl. p. 540. Hab. in sylvis Gujanac ad ripas. Arb. 60-pedalis. Fol. pari-pinnata. Panic. e racemis simplicibus elongata.

1028. HEMATOTOXYLON. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Caps.* lanceolata, 1-locularis, 2-valvis: valvis navicularibus.

1. *campechianum*. L. Lam. ill. t. 340. Willd. Sp. II. p. 547. Gatesb. car. 3. p. 60. t. 66. Hab. in Campeche Americæ. Fol. abrupte pinnata, foliol. obcordatis, flor. spicati parvi. h

1029. CRUDIA. *Cal.* monophyllus, limbo 4-fido. *Cor.* o. *Filamenta* basi dilatata. *Samara* subdispersa, orbiculata.

1. *spicata*, fol. pinnatis, foliol. oblongo-lanceolatis acuminatis. Willd. p. 539. *Apalosa spicata*, Aubl. guj. 1. p. 383. t. 147. Hab. in sylvis Gujanac. h

2. *aromatica*, fol. simplicibus ellipticis acuminatis. Willd. Touchiroa aromatica. Aubl. guj. 1. p. 185. t. 148. Lam. ill. t. 339. Hab. in sylvis Gujanac. Racemi axillares ut in præcedente, cui simillima. W

1030. DETARIUM. *Cal.* 4-fidus. *Petala* o. *Filam.* alterna breviora. *Drupa* orbiculata, nullis. *Nux* compressa, 1-sperma, fibris reticulata.

1. *senegalense*. Gmel. Syst. II. p. 700. Juss. gen. pl. p. 402. Arb. fol. alterna, impari-pinnata. Flor. racemosi. Hab. ad Senegal.

1031. COPAIFERA. *Cal.* o. *Petala* 4. *Legumen* ovatum. *Semen* 1, arillo ovato.

1. *officinalis*. L. Jacq. amer. Ed. pict. Lam. ill. t. 342. Hab. in Brasilia, Antillis. Fol. alterna, impari-pinnata. Arb.

1032. MYROXYLON. *Cal.* campanulatus, 5-dentatus. *Petala* 5, supremo reliquis majore. *Ger-*

*men* corolla longius. *Legumen* apice monospermum.

1. *peruiferum*, fol. abrupte pinnatis binjugis, foliol. suboppositis. Willd. p. 546. Lin. suppl. p. 233. Hern. mex. p. 51. cum ic. Hab. in America meridionali. Arbor pulcherrima, balsamum peruvianum præstat. Racemi axillares. Calyx viridi-canescens, cinctus extra orificium petalis antherisque albis, intra continens legumen viride, quod singularem faciem repræsentat. L.

2. *pedicellatum*, fol. impari-pinnatis subquinquejugis, foliol. alternis, legumine pedicellato. Willd. Myrospermum pedicellatum, legumioibus pedicellatis. Lam. enc. 4. p. 191. illust. t. 341. f. 1. Hab. in Peru. h

3. *frutescens*, fol. impari-pinnatis septemjugis, foliol. alternis, legumine sessili. Willd. Myrosp. frutescens. Lam. L. c. f. 2. Jacq. amer. pict. t. 118. Hab. Carthagenæ. Frut. 8-10-pedalis. Cor. exalbido-rosea. Fruct. scatet balsamo ingrato et forti. J.

1033. SCHOTIA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, calyci inserta, lateribus invicem incumbentibus, clausa. *Legumen* pedicellatum.

1. *speciosa*. Jacq. ic. rar. 1. t. 75. Collect. 1. p. 93. Guajacum afrum, fol. multijugis acutis. L. Hab. in Senegal et ad Cap. b. sp. Fol. octojuga. Foliol. ovato-oblongo, perennia. Stipulse ramis adpressæ. Semina ab incolis comeduntur. h

1034. TOLUIFERA. *Cal.* 5-dentatus, campanulatus. *Petala* 5, infimo maximo, obcordato. *Styl.* nullus.

1. *balsamum*. Hab. in America.

RUTACEÆ (gen. 1035-1042.) præcipue distinguuntur petal. 4-5, foliol. calycibus alternis, fructu supero lobato, a pluricapsulari, et embryone plano in perispermio carnoso. Fol. sunt sæpius opposita, plerumque composita, nunc nuda, nunc stipulis donata. Nonnullæ odore forti resinoso distinctæ.

1035. GUAIACUM. *Cal.* 5-fidus, inæqualis. *Petala* 5, calyci inserta. *Caps.* angulata, 3 s. 5-locularis.

1. *dubium*, fol. conjugatis oblongo-lan-

ovatis obtusis. Forst. prod. n°. 186. Willd. p. 558. Hab. in insula Toogata. h

2. *officinale*, foliol. hijugis obtusis. L. Lam. ill. t. 342. Slo. n. hist. 2. p. 113. t. 222. f. 3. Hab. in Hispania, Jamaica, Anill. Arb. ligno duro; caps. triangulares.

3. *sacrum*, foliol. multijugis obtusis. L. Bluckw. t. 350. f. 3, 4. Comm. hort. p. 171. t. 88. Pluk. alm. 130. t. 95. f. 4. Hab. in Am. Caps. 4-angulares. Fol. sub-8-juga, ovato-oblonga mucronata. Lam. enc. 2. p. 615.

4. *verticillata*, fol. subquinquejugis ovali-oblongis brevisacuminatis, petiol. verticalib. Orteg. Dec. p. 93. Hab. in N. Hispania. Ramosissimum: Pet. caerulea, unguib. contortis. Pericarp. turbinatum, pedicellatum. Sem. funiculo appensa. O.

1036. ZYGOPHYLLUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Filum. basi squamulosa: squamis germinem conniventibus. (Nectarium 10-phyllum. L.) Caps. ovato-pentagona, 5-locularis.

1. *simplex*, fol. simplicibus sessilibus cylindricis. L. Portulacoides. Forst. flor. aegypt. p. 88. et q. c. t. 12. B. Hab. in Arabia.

2. *cordifolium*, fol. simplicibus oppositis sessilibus subrotundis. Ait. Kew. 2. p. 60. Lin. suppl. 232. Hab. ad Cap. b. spec. h

3. *Fabago*, fol. conjugatis petiolatis, foliol. obovatis, pedunc. erectis, calyce glabro, petalis indivisis, caule herbaceo. Willd. Sp. II. p. 560. Lam. ill. t. 345. t. 1. Hab. in Syria, Mauritania, Sibiria. Caps. peltatae. h

4. *foetidum*, fol. petiolatis, foliol. obovatis, flor. nutantibus, petalis reflexis incis. Schrad. et Wendl. sert. hannov. p. 17. t. 9. Ad Cap. b. sp. Pet. subaurantia basi purpurea. h

5. *retrofractum*, fol. conjugatis petiolatis, foliolis ovatis, caule fruticoso ramisque retrofractis. Thunb. prod. 80. Hab. ad Cap. b. spec. h An a priore diversum?

6. *maculatum*, fol. conjugatis petiolatis, fol. lineari-lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 60. Cum priore. Petala lutea, macula cordata rubra ad basim, omnium distincta.

7. *coccineum*, fol. conjugatis petiolatis, foliol. cylindricis carnosissimis laevibus. L. Z. desertorum. Forsk. chl. ic. t. 11. Shaw. afr. f. 231. Hab. in Africa, Sibiria.

8. *album*, fol. conjugatis petiolatis, foliol. clavatis carnosissimis arachnoidico-lanceatis. L. Linn. dec. 1. t. 8. Desf. atl. 1. p. 338. Forsk. ic. t. XII. f. A. Hab. in Aegyptio, Barbar. et Canariis. Procumbens caeco-album. Petala lato-lanceolata.

9. *Morgana*, fol. conjugatis subpetiolatis, foliol. obovatis, caule fruticoso. caps. subtriaptera. Lam. enc. 2. p. 462. Burm. afr. 7. t. 3. f. 2. Dill. elth. t. 116. f. 141. Hab. ad Cap. b. spec. cum 5 sequentibus. Caulis articulatus. h

10. *capense*, fol. conjugatis sessilibus; foliol. obovatis, caule fruticoso. Lam. enc. 2. p. 463. Flor. rubris et fol. sessilibus a seq. differre dicitur. †

11. *microphyllum*, fol. conjugatis, subsessilibus, foliol. ovatis laevibus, caule fruticoso. Thunb. prod. 80. Foliol. ovalibus minutis, capsulis emarginatis. Lin. suppl. p. 232. Fol. subpetiolata. Per lunc. capillares solitarii. Petala flava. Caps. retusa. L.

12. *prostratum*, fol. conjugatis scabris, caul. decumbente, genicul. hirtis. Thunb. prod. app. p. 189.

13. *sessifolium*, fol. conjugatis sessilibus, foliol. lanceolato-ovalibus margine scabris, caule fruticoso. L. Dill. elth. t. 116. f. 142. Burm. afr. 4. t. f. 1. Petala crenata. h

14. *spinosum*, fol. conjugatis sessilibus, foliolis linearibus, carnosissimis supra planis, caule fruticoso. L. Burm. afr. 5. t. 2. Folia quaterna, linearia, carnosissima, supra plana, subustercuscula. Corollae nutantes, lateae. An a priore satis distinctum?

15. *aetnans*, fol. conjugatis sessilibus, foliol. obovatis retusis. L. Hab. in Surinam. Caulis diffusi. Stipulae quinac, reflexae. L.

16. *arborescens*, fol. pinnatis, caule arboresco. Jacq. amer. 130. t. 83. Ed. pict. t. 24. Hab. in Amer. calidior. Arb. 40-pedalis, speciosissima, cujus lignum durum et sub terra sepulchrum non corrumpitur, et veluti in lapidem mutare fertur. J.

17. *lanatum*, fol. ternatis, foliol. subtus papillois, flor. pentazyntis, caule flexuoso articulis lanato. Willd. Hab. in Sierra Leone. Foliola subrotunda mucronata. Peduoc. axillares. W. †

1037. FAGONIA. Cal. 5-phyllus. Petala 5, cordata. Caps. 5-locularis, 10-valvis: loculis 1-spermis. Sem. compressa.

1. *cretica*, spinosa, fol. ternatis, foliol.

*lanc.* L. Lam. ill. t. 346. Hab. in Creta, et in montib. prope Marcar. Desf. Caul. patens, dichotomus, nodoso-geniculatus.

2. *hispanica*, inermis. L. Mill. dict. Hab. in Hispania. Planta dubia, an var. prioris? ♂

3. *arabica*, spinosa, foliol. linearib. convexis subvillosis apic. brevioribus. L. Lam. enc. 2. p. 447. Hab. in Arabia et Barbaria. Facie Ulicis.

4. *indica*, fol. simplicibus ovalibus, spinis geminis. L. Burm. ind. 102. 34. f. t. Hab. in Persia. †

1038. **TRIEULUS.** *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5, patentia. *Stylus* o. *Caps.* 5, gibbæ, plerumque spinosæ, polyspermæ.

1. *maximus*, fol. subquadrangis: exterioribus majoribus, pericarpis decaspermis muticis. L. Jacq. ic. rar. 3. t. 462. Collect. 4. p. 110. Willd. p. 566. ill. t. 346. f. 2. Hab. in Jamaicae aridis.

2. *lanuginosus*, fol. tubquinquejugis subaequalibus, seminibus bicornibus. L. Burm. zeyl. 265. t. 106. f. 1. Hab. in Zeylona.

3. *terrestris*, foliol. sexjugatis subaequalibus, seminib. 4-cornibus. L. Lam. ill. t. 346. f. 1. Moris. 2. t. 1. 8. f. 9. Hab. ad semitas erva in Europ. australi et Barbaria. ☉

4. *cistoides*, foliol. octjugat. subaequalibus. L. Jacq. Schoenbr. 1. p. 54. t. 103. Coll. suppl. p. 109. Pluck. alm. t. 67. f. 4. Hab. in Amer. australiore. ☿

1039. **LARREA.** *Cal.* 5-phyllus, deciduus. *Petala* 5, unguiculata. *Germen* 5-sulcatum. *Nuces* 5, 1-spermæ.

1. *nitida*, caule fruticoso, fol. oppositis nitidis, fructib. glabris. Cav. ic. 6. p. 40. t. 559. Hab. cum sequentib. in Amer. meridion. Flor. axillares, solitarii, buteo-vireutes.

2. *divaricata*, fol. oppositis sessilib. bilobis: lobis divaricatis. Cav. l. c. t. 560. f. 1. Fol. villosa. Stip. in tuberculum incrassatae.

3. *cuneifolia*, fol. oppositis subsessilib. cuneatis apice bilobis: setula inter lobulos prominente. Cav. l. c. p. 41. t. 560. f. 2. Fol. villosa.

1040. **DICTAMNUS.** *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, patula. *Filamenta* punctis glandulosis adspersa. *Caps.* 5, coalitæ.

1. *Fraxinella*.  $\alpha$  *albus*.  $\beta$ . *purpureus*. Lam. ill. t. 344. Fraxin. Rencal. spec. 122. t. 121. Hab. in Germania, Gallia, Italia. Flores ut plurimum purpurei. ☿

1041. **RUŦA.** *Cal.* 4-5-partitus. *Petala* concava. *Receptac.* punctis melliferis decem cinctum. *Caps.* lobata. (*Petala* quibusdam 4 et Stam. 8.)

1. *graveolens*, fol. supradecompositis, foliol. oblongis, terminali obovato, petal. integerrimis. Willd. Sp. 2. p. 542. Lam. ill. 345. t. 1. Blackw. t. 7. Hab. in Europa australi, Alexandria, Mauritania. Flos primarius 5-fidus, reliqui quadrifidii.

2. *montana*, fol. supradecompositis, foliol. omnibus linearibus, petal. integerrimis. Willd. Ait. Kew. 2. p. 57. R. tenuifolia. Desf. atl. 1. p. 336. R. legitima. Jacq. ic. rar. 1. t. 76. collect. 1. p. 74. Sylvestris. Mill. Thuill. parisi. Hab. in collibus Helvetiae, Eur. austral. et Barbariae.

3. *chalepensis*, fol. supradecompositis, foliol. lanceolatis, petal. ciliato-dentatis. Hab. in Arabia. Simillima R. graveolenti. ♀

4. *angustifolia*, fol. inciso-pinnatifidis, lacinis linearibus cuneatis, flor. corymboisopatulis, petal. ciliatis. Mor. hist. 2. S. p. t. 35. f. 8? Hab. in rudertis Montspeltii. (Thiebaud.) R. montanae quoad fol. sub-similis.

5. *pinnata*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis, basi attenuatis serrato-crenatis, petal. integerrimis. Ait. Hab. in Canariis.

6. *patavina*, fol. ternatis, sessilibus linearibus integerrimis, basi attenuatis. Willd. Mich. N. gen. pl. 22. t. 19. Hab. prope Patavium. Petala plana, integra. ♀

7. *linifolia*, fol. simplicibus lanceolatis glabris, filamentis ciliatis, caule simpliciter herbaceo. Willd. Lam. ill. t. 345. f. 2. Barrel. t. 1186. Hab. in Hispania, in rudertis, et in agro Tuncetano. ♀

8. *villosa*, fol. lanceolatis petiolatis cauleque villosis, petal. oblongis, Stam. basi lanatis Tableau de la côte occid. de la mer Caspienne, n.º 15. R. fruticulosa. Delabillard. Willd. In Oriente. ☿

9. *uberculata*,

6. *tuberculata*, fol. linear-lanceolatis, subtus caulibus, capsulisque tuberculatis. For. k. arab. p. 86. Hab. in Aegypto. (Herb. Juss.) Caul. ramosissimus. h

10. *rosmarinifolia*, fol. linearib. subtus punctatis, caul. ramosissimo. Hab. in Hispania. Herb. Juss. R. l. fusiformis. T.

1042. **ERIOSTEMON** *Cal.* 5-partitus. *Petal.* 5, sessilia. *Filam.* plana, ciliata. *Anth.* pedicellatæ terminales. *Stylus* e basi germinis. *Caps.* 5, nectario to- rulofo insidentibus. *S. m.* arillata.

1. *australasium*, fol. lanceolatis sub- rugosis. *S. m.* in Act. soc. Linn. v. 4. Hab. in Australasia. h

2. *capense*, fol. ovato-linearibus, subtus glandulosis. *Diosma* uniflora. L. Vid. hujus operis, p. 247. Hab. ad Cap. b. sp. h

1043. **CROWEA** *Cal.* 5-partitus. *Petal.* 5, sessilia. *Filam.* plana subulata, pilis connexa. *Anth.* filum. adnatæ. *Styl.* e basi germinis. *Caps.* 5, coalitæ. *Semina* arillata.

1. *saligna*, fol. lanceolatis glabris, flor. axillarib. rubris. Andrew Repert. t. 99. C. *saligna*, caul. ramisque triquetris glabris, fol. alternis lanceolatis integerrimis flor. solitariis axillaribus. Vent. Hort. Malmais. t. 7. Hab. in Australasia. h

1044. **QUASSIA** *Cal.* 5-phyllus. *Petal.* 5. *Nect.* 5-phyllosum. *Drupæ* 5; distantes, bivalves, monospermæ, receptaculo carnosio insertæ. (Flor. etiam monoici aut 5-andri.)

1. *amara*, flor. racemosis hermaphroditis, fol. imparipinnatis; foliol. oppositis sessilibus, petiol. articul. alato. Lin. suppl. 235. Lam. ill. t. 343. f. 1. Hab. in Surinamo. Frutex nec arbor. W. Petiolus more citri alatus.

*Obs.* Lignum Quassiae venale non ex hoc frutice venit, sed ab excelsa, quæ minus amara. Vid. Willd. l. c.

2. *Simaruba*, flor. paniculatis monoicis, fol. abrupte pinnatis, foliol. alternis subpetiolatis, petiol. nudo. Lin. suppl. 234. Lam. ill. t. 343. f. 2. *Simarouba* amara. Aubl. guj. 2. p. 859. t. 331, 332. Hab. in locis

arenosis Amer. australioris. Corticex lætescens amarus. Panic. axillares amplæ. *Drupæ* ovatæ, subnigrae, receptaculo car- noso lateraliter affixæ.

3. *excelsa*, flor. polygamis pentandris paniculatis fol. imparipinnatis, foliol. op- positis petiolatis, petiolo nudo. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 742. Hab. in submontosis Jamaicae et Caribæarum. h

1045. **SIMABA** *Cal.* 5-partitus. *Petal.* 5. *Filam.* basi dilatata, pilosa. *Caps.* 5, coriaceæ 1- spermæ, receptaculo carnosio in- sertæ.

1. *guyanensis*. Aubl. guj. 1. p. 400. t. 153. *Zwingera amara*. Willd. Sp. 11. p. 569. Hab. in sylvis Gujanæ. Frut. octopetalis. Folia alterna imparipinnata. Pedunculi triflori, axillares. Flor. albid. W.

1046. **GOMPHIA** *Cal.* 5-phyllus. *Petal.* 5. *Anth.* subsessiles. *Drupæ* 2 s. 5, monospermæ, re- ceptaculo subrotundo, carnosio insertæ.

1. *angustifolia*, fol. lanceolat. extrorsum serratis, panicula terminali, petalis calyce longioribus. Vahl. symb. 2. p. 49. Willd. p. 570. Hab. in India orientali. h

2. *nitida*, fol. ovato-lanceolatis acumi- natis serratis, panicol. terminalib., calycib. corollæ aequalibus. Vahl. symb. 2. p. 49. Hab. in sylvis Jamaicae. h

3. *jahotapita*, racemis terminalib., pe- talis calyce triplo longioribus, drupis re- ceptaculo immixtis, foliis ovato-lanceolatis serratis. Willd. Oebna jahotapita. L. Plum. amer. 42. ic. 158.

4. *laevigata*, fol. lanceolatis obtusissim. integerrimis emarginatis, panicula termi- nali. Vahl. l. c.

5. *laurifolia*, racem. terminalibus, drupis receptaculo superimpositis, fol. ob- longis utrinque acuminatis integerrimis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 741. Hab. in montib. Jamaicae. h

1047. **THRYALLIS** *Cal.* 5-partitus. *Petal.* 5. *Caps.* 3-coeca. *Sem.* mucronato-incurva.

1. *brasiliensis*. L. Mercgr. hras. 97. f. 3. Hab. in Brasilia. Ramis seticulatis. Fol. op- posita, ovata. Stipulae setaceae. Flor. parvi lutei.

1048. CODON. *Cal.* 10-partitus.  
*Cor.* campanulata, 10-fida. *Caps.*  
bilocularis, polysperma.

1. *Royenii*. L. Hab. ad Cap. b. sp. Fol.  
alterna, ovato-cordata.

1049. POTALIA. *Cal.* turbinatus,  
5-partitus. *Cor.* 1-petala, 10-  
fida. *Filam.* annulo nectarifero  
inserta. *Bacca* sexsulcata, 3-  
locularis, polysperma.

1. *amara*. Anbl. gujan. 1. p. 394. t. 151.  
Lam. ill. t. 338. Nicandra. Willd. II. p. 541.  
Hab. in Guian. sylv. Corymb. pauciflorus.  
*Cor.* alba.  $\bar{E}$

HESTERIDEX *Decandrac* (gen. 1050-  
1055).

1050. LIMONIA. *Cal.* 5-partitus.  
*Petala* 5. *Bacca* 3-locularis.  
*Sem.* solitaria.

\* *Spinosa*.

1. *monophylla*, fol. simplicib., spinis  
solitariis. L. Willd. p. 541. Roxb. Corom. 2.  
p. 59. t. 83. Hab. in India orientali. Folia  
oblonga-ovata. Pedunc. axillares,  $\bar{h}$

2. *trifoliata*, fol. ternatis spinis gemi-  
nis. L. Jacq. lic. rar. t. 461. Collect. 3. p. 176.  
Andrew. t. 143.  $\beta$  inermis, foliis sessilibus.  
Willd. Sonnerat. it. p. 101. t. 63. Hab. in  
India orientali. Flor. trifidi.

3. *acidissima*, fol. pinnatis, petiolis ala-  
tis, spinis solitariis. L. Lam. enc. 3. p. 517.  
Rump. 2. t. 43. Hab. in India.  $\bar{h}$

4. *crenulata*, foliol. bijugis oppositis,  
petiol. alatis foliaceis. Roxb. & c. Rheed. 4.  
p. 11. t. 14. Hab. in oris Coromandelicis.  $\bar{h}$

\* \* *Inermes*.

5. *lucida*, inermis, fol. simplicibus,  
pedunc. axillaribus. Forst. prod. n°. 191.  
Hab. in insula Malicollo.

6. *mauritiana*, fol. subternatis, foliolis  
ovatis integris subacuminatis, panic. axilla-  
ribus. Lam. enc. 3. p. 517. Hab. in insula  
Mauritii. Habitus Rheoi.  $\bar{h}$

7. *arborea*, fol. alterois quinatis, foliol.  
liocaribus serratis laevibus. Roxb. l. c. Hab.  
in Coromandelia.

8. *pentaphylla*, inermis, fol. subqui-  
natis, ovatis integris. Retz. obs. 5. p. 24.

Roxb. l. c. p. 60. t. 84. Hab. in India. Racemi  
breves compositi.  $\bar{h}$

9. *madagascarensis*, fol. pinnatis, fo-  
liolis alternis subquaternis lanceolatis den-  
tatis, panic. brevib. axillaribus. Lam. Hab.  
in Madagascar. Khus refert.

10. *minuta*, inermis, fol. pinnatis, ra-  
cemis corymbosis terminalibus. Forst. prod.  
n°. 190. Cresc. in ins. Amicorum.  $\bar{h}$

1051. FERONIA. *Cal.* 5-partitus,  
planus. *Pet.* 5, oblonga. *Filam.*  
basi dilatata, villosa, disco hy-  
pogynio elevato inserta. *Bacca*  
corticosa, multilocularis: *locul.*  
carne spongiosa obvolutis.

1. *elephantum*. Roxb. corom. p. 21. t. 191.  
Correa in Act. Soc. Lin. 5. p. 224. Hab. in  
Indiæ sylvia et montosis.

1052. HEISTERIA. *Cal.* 5-fidus.  
*Petala* 5. *Drupa* cal. colorato  
maximo.

1. *coccinea*. Jacq. amer. 126. t. 81. El.  
pict. p. 64. t. 122. Hab. in Martinicæ sylv.  
ad torrentes.

1053. MURRAYA. *Cal.* 5-parti-  
tus. *Cor.* 5-petala, campanulata.  
*Nect.* germen cingens. *Bacca*  
1-sperma.

1. *exotica*. Murr. comment. goett. 9.  
p. 186. t. 1. Chalcat. Mant. p. 68. Burm. ind.  
p. 104. Lam. ill. t. 352. Rumph. 5. t. 18. f. 2.  
Hab. in India orientali. Fol. impari-pin-  
nata.  $\bar{h}$

1054. KOOKIA. *Cal.* 5-dus, infe-  
rus. *Cor.* 5-petala, æqualis,  
infera. *Pomum* 5-loculare: lo-  
culis 1-sperminis.

1. *punctata*. Willd. Sp. II. 538. Jacq.  
Schoenbr. t. p. 53. t. 101. Lam. ill. t. 354.  
Hab. in China. Arb. ramul. petiolisque ver-  
rucoso-punctatis. Panic. divaricata. Fol. pin-  
nata.  $\bar{h}$

1055. BERGERA. *Cal.* 5-partitus.  
*Cor.* 5-petala. *Stigma* turbina-  
tum. *Bacca* 2-sperma.

1. *Koenigii*. L. Roxb. Corom. 2. p. 9.  
t. 112. Rumph. 1. p. 149. t. 53. f. 1. Hab.

in India orientali. Arb. Fol. alterna, pin-  
natae. impari. Corymbi terminales.

1056. GÆRTNERA. *Cal.* 5-parti-  
tus. *Cor.* 5-petala, lacero-ciliata.  
*Filam.* basi subcoherentia: uni-  
cum reliquis longius. *Samara*  
monosperma, quadrialata: alis  
inaequalibus.

1. *racemosa*. Roeb. *Corom.* 1. p. 19. t. 18.  
Molina *racemosa*. Cavan. *Diss. g.* p. 435.  
t. 263. Lam. *ill.* t. 349. Hiptage *Madagloia*.  
Guert. *sem.* 2. p. 169. t. 116. *Banisteria* ben-  
ghalensis, L. B. unicapsularis. Lam. *enc.* 1.  
p. 36. Hab. in Ind. orient. h

1057. TRIGONIA. *Cal.* 6-partita.  
*Petala* 5, inaequalia: supremum  
basi intus foveolatum. *Nectarium*  
squamae 2, ad basin germinis.  
*Filam.* quaedam sterilia. *Caps.*  
leguminosa, trigona, 3-locularis,  
3-valvis.

1. *villosa*, fol. obovatis subtus tomen-  
tosis. Vahl. *Fcl. amer.* 2. Auhl. *gujan.* p. 188.  
t. 149. Lam. *ill.* t. 347. Hab. in Cojenna.

2. *laevis*, fol. oblongis utrinque glabris  
nitidis. Vahl. l. c. Auhl. p. 390. t. 150. Hab.  
in Gujana.

*Obs.* Cum Vahlis rectius ad Monodel-  
phiam referendum est hoc genus.

1058. ADENOSTEMUM. *Cor.* 6-  
petala. *Stamina* triplici serie,  
gradatim minora. *Glandulae* 2 ad  
basim singuli filamenti. *Stigm.*  
2-3. *Drupa* 1-locularis. *Nux* du-  
rissima, 2-3-locularis. *Nuclei*  
compressi.

1. *nitidum*, fol. oblongo-lanceolatis ni-  
tidis. Syst. *veg.* Flor. *peruv.* et *chil.* p. 108.  
Lucuma Keszle. Molin. *hist. chil.* p. 302.  
Hab. in A. Chil. nemorib. Arb. procerum,  
aempefflorens. Fol. resinosa et fruct. sa-  
pidissimi. Lignum ponderosum, venis pul-  
cherrimis variegatum.

*Obs.* Auctores libri allegati hoc genus  
*Gomortezae* nuncuparunt in honorem  
G. Ortegae, ad quem vero planta quaedam  
jam a Linnæo denominata erat.

1059. GODOVIA. *Cal.* 5-phyllos  
coloratus. *Nectar.* cilia in 5-  
series. *Anth.* poris geminis de-

hiscetes. *Caps.* 5-angularis.  
*Semina* imbricata, alata.

1. *obovata*, fol. obovatis crenatis. Go-  
doy. Syst. *veg.* Flor. *per.* etc. p. 101. Creic.  
in *Peruv. nemorib.* Arb. pulchra, 2-ulnaris,  
ligno durissimo.

2. *spathulata*, fol. spathulatis crenatis,  
floribus polyandria. L. c. p. 102. Arb. sta-  
mina 40 fere. Lignum variis utensilibus in-  
servit. h

MELTACEAE. (Gen. 1060-1066.) Dignos-  
cantur petalis 4-5, ungue latiusculo et  
stam. filamentis in urceolum, apice den-  
tato-antheriferum (Nectarium. L.) coe-  
lis. Genera illa hinc positis Monodelpha.  
Stylo simplici. Fruct. est vel bacca aut  
capsularis, quae saepe valde grandescit,  
multilocularis. Fol. simplicia, aut com-  
posita, exsimplacea.

1060. TREMANTHUS. *Cal.* cam-  
panulatus, inferus. *Petala* revo-  
luta, punctata. *Nect.* tubulosum.  
*Anth.* post dehisceniam punctis  
setaceo-stellatis asperæ. *Drupa*  
obovata. (*Foveolaria*. Ruiz et  
Pavon. *Strigilia*. Cavan.)

1. *cordata*, fol. cordato-ovatis acutis  
(subtus helvolis), foveolis glanduliferis.  
Syst. *veg.* Flor. *peruv.* et *chilens.* p. 99.  
Sub *Foveolaria* utique. Hab. in *Peruv.*  
*nemorib.* Arb. procerum.

2. *ovata*, fol. ovato-oblongis acuminatis  
glabris, foveol. minimis glanduliferis. Syst.  
*veg.* l. c. p. 100. Cum priore. Arb. excaisa.

3. *oblonga*, fol. oblongis acuminatis gla-  
bris, racem. 1-2-nis erectis. Syst. *veg.* l. c.  
Arbor 30-ulnaris.

*Obs.* Fol. in tribus hisce speciebus foveol.  
glanduliferis sunt instructi.

4. *ferruginea*, fol. oblongis bravi-acu-  
minatis subtus lanuginosis, glandulatis,  
racem. solitariis erectis. L. c. Hab. in  
*nemoribus* aliis frigidis. Lanugo duplex,  
stellato-penilliformis, exterior ferruginea  
decidua, interior alba.

*Obs.* *Strigilia racemosa*. Cav. *diss.* 7. p. 353.  
t. 201. Willd. *Sp.* 11. p. 351, eadem ac ul-  
tima species videtur.

1061. QUIVISIA. *Cal.* 4-5-dentatus.  
G g 2

*Cor.* 4-5-petala. *Nectar.* cylindricum, truncatum. *Antheræ* margini nectarii insertæ. *Caps* 4-locularis: loculis submonospermis.

7. *racemosa*, *decandra*, fol. alternis oblongis integris utrinque attenuatis racemis axillaribus. s. Gilibertia decandra Willd. Sp. II. p. 551. Decandra. Cavan. diss. 7. p. 367. t. 211. Hab. in insula Mauritiis. h

8. *ovata*, fol. alternis obovatis obtusis integris, pedunculis unifloris axillaribus, fructibus tomentosis. Willd. Cavan. diss. 7. p. 368. t. 212. Hab. in ins. Borbonia. h

9. *heterophylla*, fol. ovatis integris aut sinuato-pinnatifidis, floribus axillaribus binis. Cav. l. c. t. 213. f. 1. 2.  $\beta$  *Quercifolia*. Cum priore.

10. *oppositifolia*, fol. oppositis ovatis integris imis glabris, flor. axillaribus, pedunculis trifloris. Cavan. diss. 7. p. 368. t. 214. Hab. in insula Mauritiis. h

1062. *TRICHILIA*. *Cal.* sub-5-dentatus. *Petalu* 5. *Nectarium* dentatum, cylindricum, in apicentium *Antheras* gerens. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis. *Semina* baccata.

1. *hirta*, fol. pinnatis, foliol. paucioribus, ellipticis acuminatis glabris, racemis confertis. Swartz. obs. p. 171. Willd. Sp. II. p. 552. Sloan. hist. 2. t. 220 f. 1. Hab. in Jamaica. h

2. *spondioides*, fol. impari-pinnatis subhirsutis; foliol. numerosis, inferioribus majoribus, racemis axillaribus. Swartz Fl. ind. occident. 2. p. 710. Jacq. Schoenb. 1. p. 54. t. 122. Sloan. hist. 2. p. 103. t. 210. Cum priore. Hab. in sylvaticis montosis Amer. calidior. h

3. *emetica*, fol. pinnatis subtus villosis, foliol. ellipticis. Vahl. symb. 1. p. 31. Hab. in montib. Arabinæ felicis. h

4. *glabra*, fol. pinnatis glabris, foliolis eximie majoribus. L. T. havanensis. Jacq. amer. 129. n. 2. t. 175. f. 38. Hab. in Havanæ sylvis montosis. h

5. *pallida*, fol. impari-pinnatis membranaceis, racemis axillaribus terminalibusque, flor. octandris, caps. bivalvibus. Sw. Fl. ind. occ. 2. p. 713. Portesia ovata. Cav. diss. 7. p. 369. t. 215. Lam. ill. t. 302. f. 1. Hab. in fruticetis montosis Hispaniolæ. h

6. *capensis*, fol. impari-pinnatis marginibus undulatis, panic. axillaribus. Ekebergia capensis. Thunb. Willd. Sp. II. p. 549. Lam. ill. t. 358. Hab. in Cap. bon. sp. h

7. *moschata*, fol. alternatim innatis, racemis axillaribus, floribus subdecandris monopetalis, caps. monospermis. Swartz 2. l. c. p. 735. Hab. in Jam. borealis sylvis. h

8. *spectabilis*, fol. pinnatis, foliol. obovatis, racemis axillaribus compositis. Forst. prod. n. 188. Hab. in Nova Zeelandia. h

9. *alliacea*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis, acutis, racemis axillaribus supradecompositis. Forst. prod. n. 189. Hab. in insula Namoka. h

10. *heterophylla*, fol. pinnatis ternatisque, foliol. ovatis acuminatis, racemis axillaribus octandris. W. Portesia mucronata. Cavan. diss. 7. p. 370. t. 216. Lam. l. c. f. 2. Hab. in Madagascar. h

11. *trifoliata*, fol. ternatis, foliol. obovatis nullis. Vahl. symb. 1. p. 31. Jacq. amer. 129. t. 82. Ed. pict. t. 123. Hab. in Amer. merid. h

12. *nervosa*, fol. ternatis, foliol. ovatis. Vahl. l. c. Hab. in Java. h

13 ? *spinosa*, fol. simplicibus ovatis emarginatis, ramis spinosis. Willd. p. 554. T. virens. Hellenius in Act. holm. 1798. p. 294. t. 10. f. 1. Hab. in India. Baccæ trifloris. Medium tenet inter Trichiliam et Limonium. W.

1063. *TURRÆA*. *Cal.* 5-dentatus. *Petalu* 5. *Nectar.* longum, cylindricum, ore inter dentes *antheras* gerens. *Caps.* 5-cocca. *Semina* bina.

1. *virens*, fol. elliptico-lanceolatis emarginatis glaberrimis, calycibus fructibus sericeo-villosis. Willd. Sp. II. p. 555. Hab. in Ind. orientali. Arb. Fior. laterales, cernuntur in apicem minimam. An diversa a Quivisia decandra? †

2. *pubescens*, fol. ovatis emarginatis subtus pubescentibus, calycibus villosis. Willd. Hellen. in Act. holm. 1788. p. 269. t. 10. f. 3. Hab. in ins. Hainam. Fructus ignotus. h

3. *maculata*, fol. ovatis acutis-glabris, calycibus ciliatis. Willd. Smith. ic. ined. 1. p. 11. t. 11. T. glabra. Cav. diss. 7. p. 360. t. 204. Hab. in Madagascar, cum 2 sequentibus. h

4. *sericea*, fol. ovatis obtusiuscul. utrinque tomentosis, calycib. peduncul. petalisque villosis. Willd. Smith. ic. inaed. p. 12. t. 12. T. tomentosa. Cavan. l. c. p. 361. t. 205. f. 2.

5. *lanceolata*, fol. lanceolatis utrinque rotundatis glabris, laciniis calycinis longissimis lanceolatis. Willd. Cav. l. c. t. 205. f. 1.

1064. SANDORICUM. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectar.* cylindricum, truncatum, ore *antheras* gerens. *Drupa* magna, nucibus 5-freta.

1. *indicum*. Cav. diss. 7. p. 357. t. 202 et 203. Lam. enc. 3. p. 69. ill. t. 350. Hab. in Philippinis et Molucess. Arb. centro rubro. Fol. ternata. Panic. axillaris. Affine Trichiliae nervosae. W. h.

1065. SWIETENIA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Nectar.* cylindricum, ore *antheras* gerens. *Caps.* 3-5-locularis, lignosa, magna, 3-5-valvis. *Sem.* imbricata, alata.

1. *Mahagoni*, fol. pinnatis subquadrijugis, foliol. ovato lanceolatis basi aequalibus, paniculis axillaribus. Willd. Sp. II. p. 557. Cavan. diss. 7. p. 365. t. 209. Jacq. amer. 127. El. picta, etc. Catesb. car. 2. p. 81. t. 81. Hab. in Amer. meridionali, in petrosis. Caps. basi dehiscens. Arb. magna. cujus lignum est illud Mahagone, a. Acajou.

2. *sebrisuga*, fol. pinnatis subquadrijugis, foliol. elliptico-subrotundis emarginatis, basi inaequalibus, panicula terminali divaricata. Willd. Roxb. Corom. 1. p. 18. t. 17. In montibus Indiae orientalis. h.

3. *Chloroxylon*, fol. pinnatis multijugis, foliol. dimidiato-cordatis obtusis, panicula terminali patente. Willd. Roxb. l. c. 1. p. 46. t. 64. Hab. cum priore. Caps. apice dehiscens. R. h.

4? *senegalensis*, octandra, fol. abrupte pinnatis subtrijugis, fructu quadrijugis. Desrous. in Enc. bot. 4. p. 679. Hab. in Senegal. Fruct. pomiformis, recept. centrali 4-gono. h.

1066. MELIA. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectar.* cylindricum, dentatum, fauce *antheras* gerens. *Drupa* nucis quinqueloculari.

1. *Azedarach*, fol. bipinnatis, foliolis laevibus ovatis dentatis. Willd. p. 558. Cav.

dist. t. p. 363. t. 207. Lam. ill. t. 352. Ha 1. in Syria, Zeylona, et Enr. austr. Pulpa fructus venenata est.

2. *sempervirens*, fol. bipinnatis, foliol. rugosiusculis subseptenis. Swartz. Flor. 2. p. 717. Comm. hort. t. 176. Hab. ad sepes in Jamaica. Priore minor.

3. *composita*, fol. pinnatis, foliol. infimis ternatis, flor. tomentosis. Willd. Sp. II. p. 559. Hab. in Ind. Ramul. nigricantes, junioriores tomentosi. Fruct. ignotus. +

4. *Azadriachta*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis acumineis subfalcatis. Cav. Desf. 7. p. 164. t. 208. Burm. zeyl. t. 15. Rheed. 4. t. 52. Hab. in India. Arb. sempervirens. Flor. pallidi.

1067. MONOTROPA. *Cal.* 6. *Petala* 10, horum 5 exteriora basi excavato - mellifera. *Caps.* 5-valvis.

1. *Hypopithys*, florib. glabris lateralibus octandria. L. Flor. dan. t. 212. H. b. in sylvis, umbrosis, etiam in Amer., quae minor.

2. *lanuginosa*, caul. spicifloro, bract. floribusque lanuginosis. Mich. Flor. 1. p. 276. Hab. in sylv. Carol.

3. *Morisoni*, caul. elongato striato, trifloro, squamis distantibus. Mi. h. l. c. Moris. 2. 12. t. 16. f. 1. In Carol. sylv. umbrosis.

4. *uniflora*, maximo cernuo, squamis approximatis. Michaux. l. c. Catesb. car. 1. p. 36. t. 36. Hab. in Amer. boreali. Caul. crassus. T.

1068. DIONEIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 6. *Caps.* 1-locularis, gibba, polysperma.

1. *Muscipula*. L. Vent. Malmais. t. 29. Hab. in Carolinae uliginosis. Folia sunt sensibilia, ut dum insectum irrepit aut insidet folio, se elendant.

ONAGRÆ Decandrae. (Gen. 1062-1072.)

1069. JUSSIEUA. *Cal.* 4-5-partitus, superus, persistens, patens. *Pet.* 4-5, ovata, patentia. *Caps.* 4-5-locularis, oblonga, angulis dehiscens, enl. coronata. *Sem.* numerosa minuta, receptaculo angulato centrali adnexa. (Stam. 8-10.)

1. *grandiflora*, rad. repente, caul. erectis



pendulic. calyceibusque villosis, fol. integerrimis inferiorib. spatulatis superiorib. lanceolatis, flor. decandris. Michaux. Flor. r. p. 267. Hab. in Georgiæ paludosis. h

2. *repens*, caul. repente, fol. spatulatis, floribus pentapetalis decandris. L. Willd. Sp. II. p. 574. Lam. enc. 3. p. 330. Rheed. a. t. 51. *β. ascendens*. L. Mant. p. 69. Hab. in Indiæ humidis. h

3. *inclinata*, erecta glabra, flor. 4-petalis octandris pedunculatis. Lin. suppl. p. 235. Hab. in America præsertim meridionali. Priori valde affinis.

4. *tenella*, glabra, flor. pentapetalis subsessilibus, fol. oppositis linearilanceolatis. Burm. ind. 103. t. 34. f. 2. Hab. in Java. †

5. *linearis*, fol. linearibus sessilibus bipetidis, flor. tetrapetalis octandris. Willd. p. 575. Hab. in Guinea. Caul. erectus, ramos. Rami divaricati, pilis sparsis. Fol. longissima. Germen hispidum. W.

6. *linifolia*, fol. laevissimisque calycinis linearilanceolatis glabris, flor. sessilibus octandris. Vahl. p. 3a. Hab. in Amer. merid. Caul. inferne tetragonus. Rami alterni, subuliformes, patentissimi. V.

7. *peruviana*, erecta, flor. pentapetalis, pedunc. bracteatis, fol. oblongis utrinque attenuatis subtus pubescentibus. Willd. Few. peruv. 716. t. 9. Hab. in Lima. Fol. emollientia.

8. *hirta*, erecta hirsuta, fol. lanceolatis attenuatis subtus hirtis, flor. pedunculatis octandris. Oenothera hirta. Plum. spec. 7. ic. 174. f. 2. Hab. in America calidiore. h

9. *octovalvis*, erecta, flor. tetrapetalis octandris pedunculatis, caps. multivalvibus, fol. lanceolatis. Swartz. obs. 142. J. *octonervia*. Lam. enc. 3. p. 33a. Oenothera octovalvis. Lin. Hab. in Antill. Fructus 4-valvis non 8-valvis, sed stili 8 distinctus. Lam.

10. *angustifolia*, glabra, fol. alternis linearilanceolatis, flor. 4-petalis, caps. longiusculis pedunculatis. Lam. enc. 3. p. 331. Herba Vitilgium. Rumph. 6. t. 21. f. 12. Hab. in ins. Java et Molucc.

11. *caryophyllaea*, glabra, fol. lanceolatis, flor. 4-petalis, caps. brevibus subsessilibus. Lam. l. c. Herm. lugl. 366. Rheed. a. t. 4. *β. Madraspatana*. Pluck. alm. 236. p. 203. f. 5. Hab. in India.

12. *villosa*, tomentosa, fol. lanceolatis, flor. 4-petalis, caps. longiusculis curvis ses-

silibus. Lam. l. c. J. *suffruticosa*. Lin.? Rheed. 2. t. 50 (non 49).

13. *erecta*, glabra, fol. lanceolatis, flor. tetrapetalis, caps. sursum subattentatis sessilibus. Lam. l. c. p. 33a. Gaertn. de Fr. p. 159. t. 31. Burm. amer. t. 125. f. 2. Hab. in Amer. meridion. Rad. napiformis.

14. *pubescens*, erecta villosa, florib. 5-petalis decandris sessilibus. L. Sloan. jam. 85. Cum priore. †

1070. *CACUCIA*. Cal. campanulatus, limbo dilatato, 5-fido, deciduo. *Petala* 5. *Caps.* subbaccata, ovata, 5-angularis, 1-locularis, 1-sperma.

1. *coccinea*. Aubl. cujan. t. p. 450. t. 179. Gmel. Syst. p. 603. Lam. ill. t. 389. Sebous-loca. Willd. Hab. in Gujana. Frut. sarmamentosus. Flor. spicati, bracteati.

1071. *GUIERA*. Cal. oblongus, gracilis, 4-dentatus. *Petala* 5. *Stam.* exserta. *Caps.* longa angusta, villosissima, 1-locularis, subquinqueperma.

1. *senegalensis*. Juss. gen. pl. Lam. ill. gea. t. 360. Hab. in Senegal. Fol. opposita. Flor. capitati, involuero 4-phyllis cincti. h

1072. *PETALOMA*. Cal. urceolatus, 5-dentatus. *Petala* 5. calyci inserta. *Stamina* margin. calycis incidentia. *Bacca* 1-locularis, coronata.

1. *myrtilloides*, pedunc. solitariis 8-floris, fol. subsessilibus ovatis attenuatis basi obliquis. Swartz. Flor. a. p. 833. Willd. p. 542. Sloan. hist. 2. p. 78. t. 187. f. 3. In sylvis Hispaniol. et Jamaic. h

2. *Murici*, pedunc. confertis axillaribus, fol. petiolatis ovatis acuminatis. Swartz. l. c. p. 836. Mouriri gujanensis. Aubl. t. p. 453. t. 180. Lam. ill. t. 366. Hab. in Gujanas sylvis. Bacc. 4-sperm.

1073. *QUISQUALIS*. Cal. 5-fidus, fil formis. *Cor.* tubus longissimus. *Petala* 5. *Drupa* 5-angulari.

1. *indica*. fol. ovatis. *β. pubescens*, fol. subcordatis pubescentibus. Burm. ind. t. 35. f. 2. Rumph. 5. t. 38. Lam. ill. t. 357. Hab. in India. h

1074. DAIS. *Involucrum* 4-5-phyl-  
lum. *Cor.* 4. s. 5-fida. *Stigm.*  
capitatum. *Bacca* 1-sperma.  
(*Stam.* etiam 8.)

1. *cotinifolia*, fol. obovatisobtusis, florib.  
quinquefidis villosis. Willd. Sp. II. p. 370.  
Lam. ill. t. 368. f. 1. Hab. ad Cap. L. sp. h.

2. *disperma*, flor. octandris decandris-  
que, fol. ovato-lanceolatis enerviis. Forst.  
prod. n.º. 192. Hab. in ins. Tongatabu. h.

3. *octandra*, fol. ovato-lanceolatis ven-  
osis, florib. glabris quadrifidis octandris.  
Willd. Burm. ind. t. 33. f. 2. Hab. in India. h.

4. *laurifolia*, flor. decandris, fol. lan-  
ceolatis acutis. Jacq. ic. rar. 1. t. 77. Col-  
lect. 1. p. 146. Var. D. octandrae secundum.  
Willd. Hab. in India. h.

\* *linifolia*. Lam. enc. 2. p. 255. Ej. ill.  
gen. t. 368. f. 3. est *Gnidia capitata*. L. vid.  
Luj. lib. p. 436.

\* *madagascariensis*. Lam. l. c. p. 254.  
et ill. l. c. f. 2. *Gnidia daphnaefolia* var.  
glabra. L.

\* *pubescens*. Lam. l. c. p. 255. S. Gn.  
daphnaef.  $\beta$  hirsuta. L. Suppl. Tres hae  
*Gnidiae* L. ob involucri potius *Dalies* sunt.

1075. CIRATOPETALUM. *Cal.* 5-  
partitus, staminiiferus, persistens.  
*Petala* 5, pinnatifida. *Antherae*  
calcaratae. *Caps.* in fundo calycis  
tectae, bilocularis.

1. *gummiferum*. Smith. N. Holl. 1. p. 9.  
t. 3. Hab. in Australasia. Arbor procera.  
Fol. opposita ternata. Panic. terminalis. Pet.  
flava. W. h.

MELASTOMEN (Gen. 1076-79.) *cal.* ha-  
bent campanulato-tubulosum in quibusd.  
aquamis cinctum persistentem, cui *Petala*  
et stamina inserita. *Filam.* 8, 10, 12,  
apice saepius bisetosae aut bisauriculatae.  
*Anth.* longae, rostratae, incumbentes.  
*Fruct.* est vel bucca, vel capsula, aut  
*cal.* coarctato tectus, aut inferus, multi-  
locularis, polyspermus. Caul. ut plurimum  
frutescens. Fol. opposita, simplicia, ner-  
vosa. Juss.

1076. MELASTOMA. *Cal.* 5-fidus.  
campanulatus. *Petala* 5, calyci  
inserta. *Antherae* longae, arcuatae.  
*Bacca* 3-locularis, calyce obvo-  
luta. (*Stam.* etiam 8 et 12. Fol.

plerisque eleganter nervosa - ve-  
nosa.)

\* *Fol.* trinerviis.

1. *calyptrata*, fol. elliptico-lanceolatis  
attenuatis trinerviis glabris obsolete den-  
ticulatis, flor. paniculatis dodecandris. Willd.  
Sp. II. p. 581. Hab. in ins. Monferrat. Flor.  
calypttrati, petala flava. V. h.

2. *crenata*, hispida, fol. subcordatis ob-  
longis crenatis acumatis, racemis axilla-  
ribus paucifloris longitudine petioli. Vahl.  
eclog. 1. p. 41. Ej. ic. ecl. ill. t. 24. Hab. in  
Amer. meridionali. h.

3. *rigida*, fol. trinerviis subdenticulatis  
subcordato-ovatis rigidis, subtus scabris,  
racemis terminalibus paniculatis ferrugineo-  
hirtis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 268. Hab.  
in montibus caeruleis Jamaicae. h.

4. *montana*, fol. trinerviis subdenticulat.  
glabriusculis, racemo terminali, pedunc.  
tripartito-trifidis patulis, petal. retusis, cal.  
truncato. Swartz. l. c. p. 266. Hab. in mont.  
Jamaic. australis. h.

5. *procera*, arborea, fol. trinerviis sub-  
denticulatis glabris, racemo terminali, pe-  
dunc. trifidis erectis, calycibus truncatis.  
Swartz. l. c. p. 264. Hab. in altis montibus  
Jamaicae. h.

6. *adscendens*, fol. trinerviis denticulat.  
ovatis acutis glabris, racemo ovato termi-  
nali, racemulis floribus subsecundis, caule  
scandente. Swartz. l. c. p. 272. Hab. in sylvis  
mont. Jam. h.

7. *aspera*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis trinerviis scabris, flor. terminalibus  
subcorymbosis. Willd. p. 583. L. Sp. pl. 560.  
Burm. zeyl. t. 72. Rumph. 4. t. 43. Hab. in  
India. h.

8. *ledifolia*, villosa, fol. ovato-lanceo-  
latis integerrimis trinerviis, flor. axillaribus  
terminalibusque bracteatis. Lam. enc. 4.  
p. 48. Hab. in Peru. Bractae binae sub  
calyce. L. h.

9. *strigosa*, fol. integerrimis trinerviis  
strigosis ovatis, flor. solitariis. Lin. suppl. 236.  
Hab. in N. Granada. Caul. strigis alperis  
scaber. *Cal.* strigosus. Cor. purpurea. L. h.

10. *aromatica*, fol. ovatis nitidis, subtus  
subpilosis, nervis cauleque strigosis, calycib.  
basi bract. imbricatis. Vahl. eclog. M. Ti-  
bouchina. Lam. enc. 4. p. 48. Tibouchina  
aspera. Aubl. 1. p. 445. t. 177. Hab. in  
Guiana. Fol. 5-nervia. Lam. l. c.

11. *holosericea*, fol. oblongo-ovatis iu-

tegerimis subtus canis, apicis racemosis bipartitis, floribus confertis biserialis. Vahl. eclog. 1. p. 42. L. Sp. pl. 559. Pluk. mont. 2. t. 252. f. 2. Hab. in Brasilia, Surinamo. *h*

22. *velutina*, fol. trinerviis integerrimis sessilibus ovatis acutis villosis-sericeis, racemis brachiatis, ramis bipartitis, caule acute quadrangulo. Willd. p. 534. Hab. in Jam. Brasilia. *h*

23. *sessilifolia*, fol. integerrimis trinerviis spatulatis sessilib. subtus subtomentosis. L. Brown. Jam. 2. 9. t. 20. Pluk. alm. 50. t. 249. f. 2. Hab. in Jamaica. *h*

24. *ramiflora*, fol. trinerviis integerrimis ovato-lanceolatis scabrisculis, ramis floriferis, flor. pedunc. subconfertis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 775. Hab. in St. Thomae locis paludosis. *h*

25. *glabra*, fol. integerrimis trinerviis oblongis acuminatis glabris, panic. terminali, calycib. circumscissis. Willd. Forst. prod. n°. 124. Hab. in Societat. insulis. *h*

26. *involuta*, glabra, fol. ellipticis obtusiusculis serrulatis trinerviis, flor. biserialibus axillaribus involutis. Lam. enc. 4. p. 35. Hab. ad St. Domingo.

27. *diffusa*, pilosa, fol. ovata trinerviis serrulatis, flor. ad axillas ramulorum solitariis, caul. paniculato. Lam. l. c. p. 38. Hab. in Cayenne. Ramuli apice glandulosi.

28. *punctata*, fol. lanceolatis integerrimis subtus oehroleucis excavato-punctatis, panic. composita terminali. Lam. l. c. p. 50. Hab. ad St. Domingo.

29. *cornifolia*, glabra, fol. ovato-acuminatis trinerviis integris, cal. striato infundibuliformi, panic. terminali. Lam. p. 81. Hab. in ins. Martinica. Fol. eleganter ex viridi subflavescent.

30. *myricoides*, laeviuscula, fol. ovatis subacuminatis denticulatis trinerviis, panic. terminalibus, fructu granuloso. Enc. l. c. Hab. in Antillis. Rami nodoso-articulati.

31. *chrysophylla*, glabra, fol. ovatis acutis trinerviis integerrimis subtus aureo-virentibus, panic. terminali. Lam. enc. 4. p. 50. Hab. in Madagascar. Fol. subtus flavo-viridia. *h*

32. *quadrangularis*, fol. trinerviis integerrimis ovato-lanceolatis glabris, nervis subtus coloratis, ramis tetragonis, racemo stricto terminali. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 770. Hab. in Jamaicae montib. aliis. *h*

33. *trinervia (bipartita)*, fol. trinerviis

absque marginali, integerrimis utrinque glabris tenuioribus, racemis terminalibus, racemulis bipartitis, flor. sessilibus. Swartz. l. c. p. 774. Cum priore.

34. *repens*, fol. obovatis glabris trinerviis, subintegerrimis, florib. solitariis terminalibus, caule repente. Lam. l. c. p. 54. illust. gen. t. 362. f. 2. M. octandra. Retz. obs. 4. p. 25. Hab. in China. *h*

35. *glabrata*, fol. trinerviis subdenticulatis ovatis acutis glabris coriaceis, pedunc. terminalibus solitariis unilobis, florib. octandris. Swartz. p. 806. Hab. in alpinis Jamaicae australioris. *h*

36. *glandulosa*, fol. trinerviis integerrimis ovatis, superne strigoso-serris, subtus hirsuto-hispidis glandulosis, racemis terminalibus, flor. confertis octandris. Swartz. 2. p. 799. Hab. in summ. montib. Jamaicae. *h*

37. *hirtella*, fol. trinerviis integerrimis, margine hispido-pilosis, pedunc. brevissimis axillaribus trifloris, florib. octandris. Sw. 2. p. 810. Hsb. cum priore. *h*

38. *triflora*, fol. trinerviis elliptico-lanceolatis integerrimis, ramis petiolis calycibusque strigosis, floribus axillaribus subpedunculatis ternis. Vahl. eclog. 1. p. 46. Hab. in Caribaeis. *h*

39. *octandra (zeylanica)*, fol. integerrimis trinerviis ovato-lanceolatis glabris, margine nervisque subtus hispidis, floribus terminalibus. Willd. Hab. in Zeylona. *h*

30. *divaricata*, fol. trinerviis integerrimis ovatis acutis subtus pubescentibus, panic. terminali divaricata, floribus octandris. Willd. Hab. id India orientali. Rami seniores nigricantes, juniores ferrugineo-tomentosi. Cal. urceolat. *h*

31. *tetrandra*, fol. trinerviis integerrimis oblongis basi emarginatis convexiusculis glabris, racemo erecto terminali, flor. tetrandris. Swartz. l. c. p. 795. Hab. in mont. Jamaicae australis. *h*

32. *fascicularis*, fol. integerrimis ovatis acutis scabris, ramis floriferis, flor. confertis pedunculatis octandris. Swartz. 2. p. 801. Hab. in mont. Jamaicae interioris. *h*

33. *angustifolia*, fol. trinerviis linearilanceolatis integerrimis subtus incanis, ramis virgatis, panic. terminalibus, flor. erectis octandris. Swartz. 2. p. 796. Hab. in Jamaica inque insula St. Johannis. *h*

34. *purpurascens*, fol. trinerviis integerrimis oblongis acutiusculatis glaberrimis,

racemis lateralibus tripartitis patulis, flor. octandris. Swartz. p. 804. Hab. in Jam. mont. excelsis.

35. *alpina*, fol. trinerviis integerrimis ovatis rotatis glabris, panic. simpliciter trichotomis, flor. distinctis 8-andris. Swartz. l. c. p. 800. Habit. in insulae Guadriloupr muscosis.

36. *hirsuta*, fol. trinerviis subdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis hirsutis, pedunc. axillaribus divaricatis trifloris, flor. 8-andris. Swartz. Flor. 2. p. 801. Hab. in Jamaica, ad thrmas prope Bath.

37. *microphylla*, fol. trinerviis subdenticulatis ovatis obtusis superne hispulis, subtus tomentosis ferrugineis, pedunc. trifloris axillaribus, flor. 8-andris. Swartz. l. c. p. 803. Hab. in Jam. australi. Priori affinis.

38. *micrantha*, fol. trinerviis denticulatis oblongis utrinque acutis glabris, racemis axillaribus relinanthis, florib. aruminatis 8-andris. Swartz. Hab. in montib. Jamaicae occidentalis.

39. *capillaris*, fol. trinerviis subdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis glabris, pedunc. capillaribus trifloris, flor. 8-andris. Swartz. p. 803. Hab. in mont. Jam. austral.

40. *rubens*, fol. trinerviis denticulatis ovato-lanceolatis glaberrimis, ramis petiolisque coloratis, racemo terminali, flor. dioicis 8-andris. Swartz. l. c. p. 797. Hab. in alpib. Jam. australis. Purpurea serena.

**\*\* Fol. triplinerviis.**

41. *Grossularioides*, fol. subrotundo-ovatis acuminatis denticulatis triplinerviis glabris. Willd. p. 584. Pluk. alm. t. 24. f. 4. Hab. in Surinamo. h

42. *parviflora*, fol. ovato-lanceolatis utrinque attenuatis denticulatis triplinerviis glabris, panicula terminali trichotoma. Willd. p. 586. Aubl. guj. 1. p. 433. t. 171. Enc. bot. 4. p. 62. Habit. in paludosis Cajennae, Gujanae. Tincturam nigram praebet. h

43. *succosa*, fol. ellipticis acutis integerrimis triplinerviis hirsutis subtus tomentosis, flor. lateralibus subsessilibus, petalis denticulatis. Aubl. guj. 1. p. 418. t. 162. Hab. in sylvis Gujanae, Cajennae. h

44. *arborescens*, fol. subrotundo-ovatis acutis integerrimis triplinerviis glabris, corymbis bracteis lateralibus, petalis biunguiculatis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 420. t. 163. Cum priore.

45. *longifolia*, fol. lanceolatis glabri<sup>n</sup> trinerviis. ad summitatem caulis quaternis, flor. parvis albis paniculatis, fructu parvo caeruleo. Aubl. guj. 1. p. 434. t. 170. Hab. in Gujan. ad ripam amnis Galibensis. h

46. *prasina*, fol. triplinerviis integerrimis lato-lanceolatis glabris, panic. terminali patentissima. Swartz. 2. p. 77. M. larvigata. Aubl. 1. p. 412. t. 159. Hab. in America boreali.

47. *trichotoma*, laeviuscula, fol. lato-ovalib. acuminatis triplinerviis integerrimis, panic. trichotomis amplius terminalibus. Lam. enc. 4. l. r. Hab. . .

48. *staminea*, laeviuscula, fol. ovatis subacuminatis integerrimis 5-nerviis: nervis fuscis, cal. turbinate striato. Lam. p. 53. Hab. in Brasilia. Priori affinis.

49. *acuminata*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis undato-subdenticulatis triplinerviis, panic. terminalibus. Lam. p. 54. Hab. Guadeloupa. Panic. bract. nullis.

50. *marginata*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis triplinerviis marginato-ciliatis, pedunc. brevibus paucifloris, cal. echinato. Lam. enr. v. 4. p. 32. Hab. in Brasilia. Cal. fructus Dauri refert.

51. *multiflora*, glabra, fol. lanceolatis serratis, triplinerviis, panic. lateralibus, cal. turbinate subtruncato. Lam. l. c. p. 35. Hab. ad St.-Domingo. Panic. divaricata.

52. *amygdalina*, glabra, fol. angustolanceolatis compleritis serratis, panic. breviusculis lateralibus, cal. cylindrico. Lam. l. c. Cresc. cum priore, cui affinis.

53. *lanceolata*, fol. angustolanceolatis triplinerviis margine denticulato-scabris subtus ferruginis, panic. terminali. Lam. l. c. p. 42. Hab. ad St.-Domingo.

**\*\*\* Fol. triplinerviis.**

54. *verticillata*, fol. triplinerviis oblongis attenuatis denticulatis villosis, supra scabris, racemis axillaribus, flor. verticillatis. Vahl. eclog. 1. p. 47. Hab. in Caribaeis. h

Obs. Flores in hac uti in sequentib. speciebus hujus divisionis 8-andri sunt.

55. *cinnamomifolia*, fol. subintegerrimis triplinerviis lanceolatis aruminatis. Jacq. collect. 2. p. 111. t. 6. M. *acuminata*. Vahl. Willd. p. 697? Hab. in Montserrat. h

56. *lateriflora*, fol. obovatis acuminatis setaceo-subscabris glabris, pedunc. infra-

*foliaceis aggregatis unifloris.* Vahl. 1. c. p. 48. Hab. in mont. ins. Montserrat. h

57. *elaeagnoides*, fol. triplinerviis integerrimis lato-lanceolatis subtus albido-tomentosis, pedunc. terminalibus trichotomis, flor. solitariis. Swartz. Fl. 2. p. 815. Hab. in ins. St.-Johann. Amer. h

58. *scabrosa*, fol. triplinerviis denticulatis ovatis scabris hirsutis, flor. axillaribus aggregatis sessilib. octandris. Swartz. obs. 174. Brown. jam. 219. t. 24. f. 3. Hab. in Jam. montibus. h

59. *virgata*, fol. triplinerviis integerrimis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, ramis virgatis floriferis, racemis decussatis diffusis sparsis, flor. octandris. Swartz. 2. p. 816. Hab. in Jamaica. sylvestribus montium. h

\*\*\*\* *Fol. quintuplinerviis.*

60. *agrestis*, villosa, fol. ovato-lanceolatis denticulatis quintuplinerviis, corymbo terminali. Willd. p. 587. Aubl. guj. 1. p. 425. t. 166. Hab. ad ripas et in muris antiquis Cajennae. Fol. ferrugineo-villosa. h

61. *scandens*, fol. ovatis subserratis hirsutis quintuplinerviis, corymbo terminali capitulo, caule scandente. Willd. Aubl. guj. 1. p. 435. t. 172. Hab. in sylvis Gujanac. h

62. *alata*, fol. ovatis utrinque acuminatis integerrimis quintuplinerviis subtus pubescentibus, caput. paniculatis terminalibus, caul. alato. Willd. Aubl. guj. 1. p. 410. t. 158. Hab. in campestribus Cajennae, Gujanac. h

63. *flavescens*, fol. obovato-acutis integerrimis quintuplinerviis subtus pubescentibus, corymb. bracteatis lateralibus. Willd. Aubl. guj. 1. p. 423. t. 164. Hab. in sylvis Gujanac. h

\*\*\*\* *Fol. quinquenerviis, aut 7-g-nerviis (ob spec. affinitatem).*

64. *hirta*, fol. denticulatis quinquenerviis ovato-lanceolatis, caul. hispido. Lam. Pluk. alm. 40. t. 264. 265. f. 1. Hab. in America meridionali. Var. flor. dodecandris, bacca sexloculari. Sw.

65. *spicata*, fol. subdenticulatis quinquenerviis ovato-lanceolatis villosis, spicis axillaribus. Willd. p. 588. Aubl. 1. p. 423. t. 165. Hab. in pratis Gujanac. h

66. *acimodendron*, fol. ovatis acuminatis denticulatis quinquenerviis, cymis axillarib.

Willd. Plam. ic. 142. f. 2. Hab. in Amer. calidiore. h

67. *cymosa*, fol. cordatis acuminatis quinquenerviis serrulatis pubescentibus, cyma terminali, calycinis laciniis subrotundis, staminib. quinque sterilibus. Willd. M. fol. septemnerviis. Schrad. et Wendl. ser. hunc. 18. t. 8. Hab. in Amer. meridionali. h

68. *grandiflora*, fol. cordatis acuminatis quinquenerviis serrulatis pilosis, pedunculo terminali bifido, calycinis laciniis linearibus subulatis, staminibus quinque sterilibus. Willd. Vahl. symb. 3. p. 59. Aubl. guj. 1. p. 414. t. 160. Hab. in pratis Cajennae et Gujanac. h

69. *elegans*, hispida, fol. cordatis inaequaliter crenato-dentatis, racemis dichotomiae terminali usque paucifloris. Vahl. eclog. 1. p. 44. Aubl. guj. 1. p. 427. t. 167. Hab. in Cajenna in muris antiquis. h

70. *rufescens*, fol. cordatis crannulatis scabris subtus tomentosis, floribus terminalibus glomerato-spicatis. Willd. M. foliis crassis rugosis cordatis subtus tomentosis subsessilibus. Aubl. guj. 1. p. 408. t. 157. Hab. in locis campestribus Gujanac. h

71. *rubra*, fol. cordatis subcrenatis subtus ferrugineo-tomentosis, flor. axillaribus et lateralibus solitariis sessilibus. Willd. Aubl. guj. 1. p. 416. t. 161. Hab. ad ripas Gujanac. h

72. *majeta*, fol. obovatis quinquenerviis subcrenulatis pilosis, basi ad petiolum vesiculosis, flor. solitariis axillaribus sessilibus, calyce squamoso. Willd. Majeta gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 443. t. 176. Hab. in sylvis Gujanac. Fol. alterum duplo minus. h

73. *heterophylla*, pilosa, foliis oppositis disparibus denticulatis, petiolis superne vesiculosis, panic. brevissimis lateralibus. Lam. l. c. 4. p. 34. Hab. in Peru. Fol. alterum minus, sessile cordatum vix vesica donatum. Lam. h

74. *physiphora*, fol. ovatis attenuatis denticulatis ciliatis, petiolis hispidis apice vesiculosis. Vahl. eclog. 1. p. 45. Tococa gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 438. t. 174. Hab. ad vicum margines in Cajenna et Gujana. Racemus terminalis. h

75. *purpurea*, foliis ovato-lanceolatis acuminatis quinquenerviis pilosis subdenticulatis, ramis bifidis paniculatis terminalibus. Willd. p. 590. Aubl. guj. 1. p. 404. t. 154. Hab. ad ripas rivulorum Gujanac. h

76. *argentea*, fol. quinquenerviis subdeu-

*76. ovatis* glabris, subtus tomentosis candidis, panic. terminalibus patentibus. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 771. Sloan. hist. 2. p. 81. t. 176. f. 1. Hab. ad litus Mosquito-shore Americe. h

*77. elata*, fol. quinquenerviis serrato-denticulatis oblongis coriaceis, subtus ferrugineo-tomentosis, panic. terminalibus patentibus, flor. sessilibus. Swartz. l. c. 2. p. 781. Hab. in montib. elevationibus Jamaicae, etc. M. argentene proxima. Sw.

*78. impetiolearis*, fol. quinquenerviis denticulatis subsessilibus oblongis acuminatis coriaceis, subtus tomentoso-ferrugineis, panic. terminalibus axillaribusque erectis, flor. sessilibus. Swartz. l. c. p. 788. Hab. in India occidentali. h

*79. fragilis*, fol. quinquenerviis ovatis reticulatis serratis, racemis brachiatis terminalibus, pedunc. inferioribus trifidis, pelliculis subbifloris. Vahl. eclog. 1. p. 44. Lin. suppl. 236. Hab. in America australi. Fructus pisiformes, umbilico excavato; minores umbilico clauso squamis quinque. L. h

*80. coriacea*, fol. quinquenerviis cartilagineo-denticulatis ovatis rugosis glabris coriaceis, ramulis petiolisque strigosis, panic. ramis tetragonis, florib. subsessilibus. Sw. l. c. 2. p. 790. Hab. in summitate montis la Soufrière ins. Guadeloupe. h

*81. patens*, fol. quinquenerviis cordatis hirsutis subdenticulatis, racemo terminali patulo, flor. 12-andris. Swartz. p. 297. Hab. in Jam. montib. Hirsutis fusco-rubra. S.

*82. grossa*, fol. integerrimis quinquenerviis subcordatis scabris. Lin. suppl. 236. Hab. in N. Granada. Arb. ramis hispidis. Cal. valis, pilis strigosis. L. h

*83. malabathrica*, foliis integerrimis, quinquenerviis lanceolato-ovatis scabris. L. Burm. zeyl. 155. t. 73. Lam. ill. t. 261. f. 1. Fragaria niger. Rumph. 4. t. 52. Hab. in India. Cal. squamoso-calloso. h

*Obs.* Hanc species generis nomen ansam dedit cum fructus comedentium os, uti bacc. vacc. myrilli, atro inquinat.

*84. strigillosa*, fol. quinquenerviis subdenticulatis acuminatis, superne strigoso-pilosis subtus tomentosis, racemis axillaribus, flor. pellicellatis confertis. Sw. Fl. 2. p. 793. Hab. in Jamaica.

*85. tamonea*, fol. quinquenerviis oblongo-lanceolatis acutis integerrimis subtus tomentoso-incanis, racemis terminalibus compositis, racemulis brachiatis, pedunc. um-

bellulatis, braci. geminis. Swartz. l. c. 2. p. 783. M. Fothergilla. Enc. bot. 4. p. 45.  $\beta$ ? M. *dodecandra*. Fj. operis. Fothergilla mirabilis. Aubl. guj. 1. p. 442. t. 175. Hab. in Amer. meridionali. h

*86. mucronata*, fol. lato-ovalibus mucronatis 5-nerviis subtus tomentoso-ferrugineis, cal. truncato ciliato. Lam. p. 46. Hab. in Cayenne.

*87. savosa*, fol. ovatis subdenticulatis basi emarginatis 5-nerviis, subtus cellulosis, panic. terminali corymbosa. Lam. p. 47. Hab. ad St. Domingo.

*88. lima*, scabra, fol. ovatis serrulatis triplicinerviis, bullato-tuberculosis, flor. axillaribus terminalibusque subpaniculatis. Lam. l. c. Cum priore, eum que affinitatem habet.

*89. papillosa*, fol. ovalibus subcordatis crenulatis septemnerviis rugoso-papillosis, panic. terminalibus vix bracteatis. Lam. l. c. p. 48. Hab. in Peruvia. Fol. tuberculis polygonicis aspera.

*90. latifolia*, pilosa, fol. lato-ovatis acuminatis ciliatis septemnerviis, panic. axillaribus subgeminatis fol. brevioribus. Lam. enc. 4. p. 37. Hab. in Anullis.

*91. dichotoma*, hispidula, fol. cordatis 7-9-nerviis acutis denticulatis, panic. foliolosis, ramis lateralibus dichotomis. Lam. l. c. p. 41. Hab. in Brasilia.

*92. laxa*, fol. cordato-ovatis 7-nerviis serrulatis rugosis, panic. laevis foliis terminalibus. Lam. l. c. Hab. in Peruvia.

*93. nivea*, fol. cordatis 7-nerviis acuminatis denticulatis subtus tomentoso-niveis, panic. terminali, caul. hispidulo. Lam. p. 42. Hab. ad St. Domingo. Fol. uti in urtica nivea.

*94. pyramidalis*, fol. ovato-acuminatis denticulatis quinquenerviis subtus villorosis, panic. pyramidalis terminalibus. Enc. l. c. Hab. in Anillis.

*95. nicotianaeifolia*, fol. lato-ovatis acutis subdentatis longe petiolatis quinquenerviis, panic. brachiata terminali. Enc. l. c. Hab. ad St. Domingo. Fol. magna 7-unc. longa, 4-lata.

*96. pauciflora*, pilosa, fol. ovatis subacuminatis crenulatis, 5-nerviis, racemulis axillaribus terminalibusque paucifloris. Lam. enc. 4. p. 39. Hab. in Brasilia.

*97. ferruginea*, fol. ovato-acutis obsolete crenatis subciliatis 5-nerviis supra glabris, panic. terminalibus. Lam. l. c. p. 42. Hab. ad St. Domingo. Cor. albo-rosea.

98. *granulosa*, fol. ovato-lanceolatis integris quinquenerviis, supra granulosis, panic. terminalibus, caul. elato. Lam. p. 44. Hab. in Brasilia. Frut. 10-pedalis, ramis 4-gonis. Cor. magna.

99. *clavata*, fol. cordato-ovalibus sessilibus integerrimis sericeo-argenteis, panic. terminali, cal. clavato. M. *argentea* Enc. bot. 4. p. 45. Hab. in Brasilia. Cal. forma aequat Caryophyll. arom. flores.

100. *albicans*, fol. quinquenerviis integris ovatis acutis, supra glabris, subtus tomentosis albidis ferrugineis, racemis terminalibus erectis, flor. confertis sessilibus. Swartz. l. c. p. 86. Hab. in montib. Jamaicae inque Brasilia. h

101. *capitata*, fol. quinquenerviis lato-lanceolatis integerrimis, capitulis terminalibus involucreatis, ramis tetragonis, filament. appendiculatis, Vahl. eclog. 1. p. 45. Hab. in India occidentali. h

102. *splendens*, fol. quinquenerviis integris oblongis acuminatis utrinque glabris, sup. ne nitidis, panic. terminalibus erectis, flor. subumbellatis. Swartz. l. c. 2. p. 789. Plum. spec. 18. t. 140. Hab. in sylvis montium Jamaicae. h

103. *laevigata*, fol. integerrimis quinquenerviis ovato-oblongis laeviusculis acuminatis, margin. laevibus. L. Habit. in America. Cfr. M. *laevigata* Enc. bot. 4. p. 52. Racemi terminales, flor. minutis

104. *crispata*, fol. integerrimis quinquenerviis quaternis, ramis crispatis. L. Rumph. 5. t. 35. Hab. in Amboina. † h

105. *nodosa*, fol. ellipticis serrulato-ciliatis quinquenerviis coriaceis, corymb. bracteatis, ramis nodosis. Enc. bot. 4. p. 55. Hab. in Antillis. Nigricans. Corymb. trichotomus.

106. *crocea*, fol. ovatis subserratis glabris, nervis ad petiolum barbatis, panic. terminali. Enc. l. c. Hab. in Peruvia. Siam. 14-15.

107. *racemosa*, fol. ovatis quinquenerviis glabrisculis serrulato-ciliatis, petiol. supra villosis, panic. terminali subracemosa. Enc. l. c. Aubl. 1. t. 156. M. decussata. Vahl. Willd. p. 552.

108. *articulata*, fol. ovato-lanceolatis demiculato-ciliatis, petiol. villosis, panic. ramis dichotomis articulatis. Lam. enc. l. c. p. 56. Hab. Ceyennae. Priori affinis. Ramis 4-gonis. Fol. nervi 2-laterales obsolete.

109. *umbrosa*, fol. quinquenerviis lato-ovatis acuminatis utrinque hirsutis, ramul. floriferis, racem. dichotomis: stentib. flor. 8-andris. Swartz. Flor. ind. occid. 2. p. 817. Hab. in Amer. meridion. Fol. maxima.

110. *hispida*, fol. 5-nerviis subdentatis ovatis acutis, superne strigoso-hirsutis, subtus reticulato-tomentosis, panic. terminalibus divaricatis, flor. 8-andris. Swartz. p. 822. Hab. in Jam. montibus.

111. *sessiliflora*, villosa-subtomentosa, fol. 5-nerviis lanceolato-ovatis denticulatis subpetiolatis, flor. axillarib. subverticillatis. Vahl. eclog. 1. p. 49. Ej. ic. ecl. ill. 1. 18. Hab. in Amer. meridion. h

112. *pilosa*, fol. quinquenerviis subdentatis oblongis acutis, nervis subtus, ramulis racemisque lateralibus piloso-hirsutis, flor. octandris. Swartz. Fl. 2. p. 819. Hab. in sylvis montium Jamaicae. M. *microstachya* proxima. h

113. *discolor*, fol. quinquenerviis subintegerrimis oblongis acuminatis glabris subtus flavo-incanis, racemis cymosis, flor. octandris. Swartz. obs. 178. Plum. ic. t. 42. f. 1. Hab. in Amer. calidiore. h

114. *coccinea*, fol. quinquenerviis elliptico-ovatis acuminatis glabris integerrimis, thyrsis terminali, pedunc. pedicellisque nodosis hispidis. Vahl. l. c. p. 48. Ej. ic. ecl. illustr. t. 16. Hab. in ins. Montserrat. Variet. flore albo. V. h

1077. **TRISTEMMA.** Cal. 5-fidus, prope limbum bifariam ciliatus. *Petal.* 5, unguiculata. *Racca* ovata, compressa, rubangulata, tecta, 5-locularis.

1. *mauritianum*. Jus. gen. pl. Melast. virgata. Commers. Fol. ovatis. Flor. capitati. An a *Melastomis*, quarum habitum refert satis distinctum?

1078. **MICONIA.** Cal. 5-dentatus. *Petal.* 5. *Nect.* squamæ 5. *Stamina* declinata. *Anthere* plicatae, calcatae. *Caps.* 5-locularis. *Semina* subscobiformia.

1. *pulverulenta*, fol. ovatis quinquenerviis crenatis, acum. obtuso. Flor. per. Syst. p. 104. Hab. cum sequentib. in Peruv. nemorib., Chinchao, et Cuchero, etc. Flor. plurimi 6-petali, nonnulli 7-8-petali. h

2. *triplinervis*, fol. oblongis triplinerviis acuminatis, integerrimis. Syst. Fl. per. p. 105. h

β. *lanuginosa*, fol. oblongis quinque-nerviis integerrimis obtuse acuminatis. Syst. etc. l. c.

3. *emarginata*, fol. cordatis emarginatis quinque-nerviis. L. c. p. 106.

1079. *MERIANIA*. *Cal.* 5-fidus, campanulatus. *Petala* 5, calyci inserta. *Stam.* declinata. *Caps.* 5-locularis, polysperma.

1. *leucantha*, fol. oblongis nitidis, flor. bracteis geminis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 826. Willd. Sp. II. p. 600. Sw. prod. 61. Hab. in montib. Jamaicae. h

2. *purpurea*, fol. ovato-lanceolatis, flor. bracteis quaternis. L. c. p. 829. Rhevis purpurea. Swartz. prod. 61. Cum prior.

1080. *ACISANTHERA*. *Cal.* ventricosus, 5-fidus. *Petala* 5. *Anth.* sagittatae, versatiles. *Caps.* coronata, 2-locularis, polysperma.

1. *quadrata*. Rhevis *Acisanthera*. Lin. Willd. Sp. II. p. 303. *Acisanthera* ramulis quadratis, foliol. 3-nerviis ovatis crenatis oppositis, flor. (axillaribus) singularibus. Brown. Jam. t. 22. f. 1. Habit. in Jamaica. Eiam famil. naturali a Rhevis differt. Vahl. Juss. gen. pl.

1081. *GETONIA*. *Cal.* supernus, 5-phyllus, persistens. *Filam.* alternatim latiora, 5 in calyci ore. *Sem.* crustatum, oblongum. 5-striatum, cal. coronatum.

1. *floribunda*. Roxb. Corom. p. 64. t. 87. Hab. in Coromand. sylvis. Scandens. Fol. opposita, ovata. Flor. paniculati. Bract. lanceolatae. h

Obs. Calycopteris. Lam. ill. t. 357. alteram hujus generis speciem efficere videtur.

RHODORACEM (gen. 1083-84), *Ericis* affines, ab iis vero discrepant antheris non bicornib. et valvis fructus introflexis. Juss.

1083. *KALMIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis: limbus subtus quinquecorni, in quorum foveis anth. incumbunt. *Caps.* 5-locularis.

1. *latifolia*, fol. ovato-ellipticis coriaceis petiolatis ternis sparsisque, corymbis termi-

nalib. subvittosis. Ait. Kew. 2. p. 64. Willd. Sp. II. p. 600. Lam. ill. t. 363. f. 1. Trew. Ehret. t. 38. f. 1. Hab. in America boreali. Flor. vere. Frut. 4-petalis.

2. *angustifolia*, fol. lanceolatis, corymbis lateralib. subverticillatis. L. (p. oleifolia. Catesb. car. 3. p. 17. t. 17. f. 1. Trew. Ehret. t. 38. f. 2. Habit. in Amer. boreali. Fol. subtus subferruginea.

3. *cuneata*, fol. sparsis sessilib. cuneato-oblongis, subtus pubentibus subaristatis, corymb. lateralib. paucifloris. Michx. Flor. 1. p. 257. Hab. in Carol. Cor. alba, fundo purpureo M.

4. *glauca*, fol. oppositis oblongis laevigatis subtus glaucis, margine revolutis, corymbis terminalibus, ramol. ancipitibus. Ait. Kew. 2. p. 63. t. 8. Hab. in Terra Nova. β? *rosmarinifolia*. Bot. cult. 2. p. 250. Cresc. in Carolina. h

5. *hirsuta*, suffruticosa, fol. sublanco-latis revolutis alternis, flor. solitariis axillaribus. Lam. enc. 3. p. 331. Curt. bot. mag. t. 138. Hab. in Carolinis meridionali. h

1083. *LEDUM*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* plana, 5-partita. *Caps.* 5-locularis, basi dehiscent. (Stam. etiam 5.)

1. *palustre*, fol. linearibus margine revolutis subtus tomentosis. Ait. Kew. 2. p. 65. β. *decumbens*, spithameum decumbens. Ait. l. c. Cfr. Michx. Hab. in Europae septentrional. uliginosis, β. in sinu Hudsonis. h

2. *latifolium*, fol. ellipticis margine revolutis subtus tomentosis, florib. subpendulis. Ait. Kew. 2. p. 65. Jacq. ic. rar. 3. t. 464. Collect. 2. p. 308. Lam. ill. t. 363. L. groenlandicum. Retz scand. ed. 2. n. 493. Hab. in uliginosis Groenlandiae et Americae.

† *LEIOPHYLLUM*. *Caps.* apice dehiscent. *Fol.* utrinque glabra.

3. *thymifolium*, fol. ovalibus obtusis utrinque glabris, umbel. terminalibus sessilibus capitato-congestis. Lam. enc. 4. p. 459. Ej. ill. t. 363. f. 2. L. boxifolium. Ait. Michaux. Flor. 1. p. 260? Hab. in Carol. et N. Caesarea. Facie a Ledis recedit.

1084. *RHODORA*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* declinata. *Caps.* 5-locul.

1. *canadensis* Herit. stirp. nov. t. p. 141. t. 68. Lam. ill. t. 364. Hab. in Canada et Terra



Nova. Flor. terminales umbellati. A sequente genere satis diversum?

1085. RHODODENDRON. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* subinfundibuliformis, subobliqua. *Stam.* declinata. *Caps.* 5-locularis.

1. *ferrugineum*, fol. glabris subtus leprosis, corollis infundibuliformibus. Jacq. Flor. austr. t. 255. Hab. in alpinis. Petala inferiora angustiora.

2. *minus* (*punctatum*), fol. ovali-lanceolatis, subtus ferrugineo-punctatis, flor. infundibuliformibus, caps. elongatis. Mich. In montibus Carol. superioris. Flor. t. p. 258. Rh. *punctatum*. Willd. p. 607? Vent. Cels. t. 15.

3. *dauricum*, fol. glabris punctatis nudis; corollis rotatis. L. Andrews repot. t. 4. Hab. in Dauria. Cor. violaceae, fol. ampliores. h

4. *camtschaticum*, fol. ciliatis nervosis, coroll. rotatis, calycib. foliaceis. Pall. ross. t. p. 48. 33. Hab. in Camtschatka locis montosis lutosis. h

5. *hirtum*, fol. ellipticis acutiusculis ciliatis subtus punctatis, corollis infundibuliformibus. Willd. p. 601. Jacq. Flor. austr. t. 98. Hab. in alpinis. h

6. *Chamaecistus*, fol. ellipticis acutiusculis glanduloso-ciliatis nudis; cor. rotatis, petalis obtusis. Willd. l. c. Jacq. t. 217. Hab. in Baldo et Austria.

7. *caucasicum*, fol. acutis subtus ferrugineo-tomentosis, umb. terminalibus, cor. rotatis, petalis subrotundis. Willd. Pall. ross. t. p. 46. t. 35. Hab. in summis alpinis Caucasi. h

8. *Chrysanthum*, fol. oblongis scabris, subtus discoloribus glabris, umbellis terminalibus, enr. rotatis, petalis obovatis irregularibus. Willd. Lin. suppl. 217. Pall. it. 3. p. 369. app. t. N. f. t. 2. Gmel. sib. 4. p. 147. t. 54. Hab. in Sibiriae alpinis, etc. Frutex parvus diffusus. Fol. venoso-reticulata. Rami squamis stipulaeformibus ferrugineis tecti. Flores lutei. L.

9. *ponticum*, fol. oblongis glabris utrinque concoloribus, corymbis terminalibus, cor. campanulato-rotatis, petalis lanceolatis. Willd. Jacq. ic. rar. t. 78. Pall. ross. t. p. 43. t. 29. Lam. ill. t. 364. Hab. in Oriente et Gibraltariae subhumidis umbrosis.

Obs. *Cal.* lacin. brevissimae, acutae. M. Plerumque in hortis haecce species, nec sequens, colitur.

10. *maximum*, arborescens, fol. subcuneato-oblongis coriaceis glabris, csl. lacinias ovatis obtusis, cor. subcampanulata. Mich. t. p. 259. Cfr. L. et Willd. p. 607. Hab. in Amer. boreali. Fol. subtus pallidiora, laevia, juniora subtomentos. Flor. magis congesti. Frut. tener.

11. *catabiense*, fol. brevioralib. utrinque rotundato-obovatis, cor. campanulata, cal. lacin. elongatis. Michaux. Flor. t. p. 258. Hab. in montib. excelsis Carol. septentrion. juxta originem amnis Catawba.

ERICOIDEA, 2. *bicornia* Decandra. (Gen. 1086-92.)

1086. VACCINIUM. *Cal.* superus. *Cor.* urceolata aut campanulata, 4-5-fida: lacinias reflexas. *Filam.* germi inserta. *Bacca* 4-5-locularis, polysperma. (*Stam.* quibusdam 8.)

\* *Flor. subsolitariis.*

1. *Myrtillus*, pedunc. 1-floris, fol. serratis ovatis deciduis, caul. angulato. L. Engl. bot. t. 456. Hab. in ericetis, sylvaticis arenosis. Var. *bacca alba*. *Stam.* 8-10.

2. *myrtilloides*, pedunc. 1-floris, fol. lanceolatis integris, margine pubescentibus, membranaceis. Michaux. t. p. 214. Hab. in Amer. boreali. Facio praecedentis.

3. *uliginosum*, pedunc. 1-floris, fol. obovatis lanceolatisque glabris, ramis teretibus. Engl. bot. t. 681. Flor. Dan. t. 231. Hab. in paludosis montosis. *Stam.* 8-10. *Caul.* erectus.

\* *sednense*, pedunc. 1-floris, fol. obovalibus integris, caul. decumbente ramosissimo. Hab. in montosis, siccis graminosis, (in monte Danzet et de Seyne, dep. Basses-Alpes). Clarion. A *V. uliginoso* specie differre videtur. Fol. nonnulla subemarginata.

4. *cespitosum*, pusillum multicaule, flor. solitariis subsessilibus, fol. obovalibus serratis. Michaux. l. c. Hab. circa sinum Hud. Frut. 2-4-uncialis. *Stam.* 8.

5. *cereum*, pedunc. 1-floris, cor. 5-angularib. ovatis, fol. ovato-subrotund. serratis. Forst. Lin. suppl. p. 219. sub *Androm.* Hab. in ins. Tahiti.

6. *hirtum*, pedunc. unifloris, fol. ovatis serratis, ramis teretibus divaricatis. Hab. in Japonia. Ramosissimum. Ramuli apice villosi. Cor. campanulata.

7. *stamineum*, pedunc. solitariis nudis unifloris, antheris cor. longioribus. foliis oblongo-ovatis acutis integerrimis, subtus glaucis. Ait. Andrew. 1. 263. Mich. Flor. 1. p. 227. Hab. in America septentr. Fol. albicantia ovalia. R. h.

8. *album*, pedunc. simplicibus, fol. integerrimis ovatis subtus tomentosis. L. Hab. in Pennsylvania. Flor. duo vel tres ad apices ramorum. L.

9. *macronatum*, pedunc. simplicissimis unifloris, fol. ovatis mucronatis glabris integerrimis. L. Hab. in Amer. septentr. Frut. ram. glaucis.

10. *dumosum*, fol. ovatis acutis glabris pedunc. unifloris bracteatis, cor. urceolata. Andrew. t. 112. Hab. in America bor. Cor. aubalbida.

11. *diffusum*, pedunc. solitariis nudis unifloris, fol. ovatis acutis obsolete serratis villosiusculis. Ait. Kew. 2. p. 51. Hab. in Carolin. australi. h.

12. *angustifolium*, peduncul. solitariis unifloris, fol. elliptico-lanceolatis glabris obsolete serrulatis. Ait. l. c. Hab. in Terra Nova et Labrador. h.

\* \* Flor. corymbosis aut racemosis.

13. *corymbosum*, flor. corymbosis ovatis fol. oblongis acuminatis integerrimis. L. V. diomorphum, Michaux. 1. p. 231. et V. *amoenum*. Ait. Kew. 2. p. 227. Andr. 1. 118. Hab. in America septentrionali. Fol. nervis subtus villosis. Cor. cylindraceo-ovatae, longiores quam in reliquis.

14. *bracteatum*, racem. foliatis, foliis serratis acutis. Thunb. jap. p. 136. Hab. in Japonia. Fol. margine revoluta, utrinque glabra. Cor. cylindrica alba. h.

15. *ciliatum*, racem. foliatis, fol. ovatis integerrimis hispidis. Thunb. jap. 156. Cum priore. Fol. ramea hispida. Cor. rubra.

16. *fuscatum*, racem. nudiusculis, cor. cylindrico-ovatis, calycibus acutis: fol. ellipticis acutis integerrimis, venis subtus villosiusculis. Hab. in Amer.

17. *frondosum*, racem. bracteatis, pedicellis bracteolatis, cor. subcampanulatis, fol. obovato-oblongis integerrimis deciduis. Andr. t. 100? Hab. in Amer. septentrion.

18. *venustum*, racem. bracteatis, pedicellis bracteolatis, cor. subcampanulatis, fol. ellipticis integerrimis deciduis glabris. Hab. in Amer. bor. h.

19. *figustrinum*, racem. nudis, caule fruticoso, fol. crenulatis oblongis. L. Hab. in Pennsylvania. Flor. in racemis, destituti bracteis. L.

20. *resinosum*, racem. bracteatis, cor. ovatis, fol. ellipticis acutiusculis integerrimis deciduis, atomis resinosis irroratis. Ait. Kew. 2. p. 12. *Andromeda baccata*. Wangerh. amer. 11. t. 30. f. 69. Habit. in America boreali. h.

21. *glaucum*, fol. sublanceolato-cuneatis integerrimis dilute glaucis, subtus resinosis, racem. laxis, cor. globosis. Mich. Flor. 1. p. 231. Lam. enc. 1. p. 73. Hab. in Pennsylvania, Carolina. Atque V. *resinoso*. Bacca glauco-nigra, cellularis. M. h.

22. *arborescens*, fol. petiolatis obovalibus mucronatis, racem. bracteatis, cor. campanulatis, anth. dorso-aristatis. Michaux. p. 230. Hab. in Amer. bor. sylv. subaridis. Arb. 15-20-pedalis. Fol. lucida, punct. glandulosis.

23. *pallidum*, racem. bracteatis, cor. cylindraceo-campanulatis, fol. ovatis acutis serrulatis glabris deciduis. Ait. Hort. 2. p. 18. Hab. in Amer. boreali. h.

24. *parviflorum*, fol. lanceolatis undulatis venosis, flor. racem. pedunc. longissimis bracteatis, cor. conica strista. Andrew. t. 125. h.

25. *formosum*, fol. integerrimis oblongis acutis glabris, flor. racemoso-fasciculatis subcylindraceis castatis, cal. adpressis. Andrew. t. 97. h.

26. *virgatum*, fol. oblongo-ovatis serrulatis, flor. racemoso-fasciculatis axillaribus subcylindraceis, cal. apice-reflexis. Andr. t. 181. Hab. cum 2 antecedentibus in Amer. boreali. h.

27. *carnosum*, fol. ovatis serratis crassiusculis, flor. subumbellatis campanulatis. Andr. t. 105. Hab. in Carol.

28. *pensylvanicum*, fol. sessilib. ovali-lanceolatis serrulatis lucidis, flor. fasciculatis subterminalibus ovatis. Mich. p. 233. Hab. in Pensylv. Georg. Frut. ramosiss.

29. *myrsinites*, fol. sessilib. ovalibus mucronatis subterratis, subtus punctatis, flor. corymbosis sessilib. Lam. enc. 1. p. 73. Mich. p. 233. Hab. in aridis Floridae. Frut. erectus, ramosiss. microphyllus. Cor. purpurea. M.

30. *tenellum*, racem. bracteatis sessilib., cor. ovato-cylindraceis, fol. oblongo-ellip-

ticis subbenneiformibus serrulatis deciduis subglabris. Cfr. *V. galeans*. Mich. p. 238. Hab. in America bor. h

31. *Arctostaphylos*, flor. racemosis, fol. crenulatis ovatis acutis, caule arborco. L. Andrew. t. 30. Tournef. it. 2. p. 221. t. 223.  $\beta$  *cappadocicum*, maxima, nespili folio, flore variegato. Tournef. cor. 42. Hab. in Cappadocia et Madera. h

32. *meridionale*, fol. ovato-oblongis acutis serratis perennantibus planis luculis, racem. terminalib. erectis, cor. prismaticeis. Ait. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 6-6. Hab. in montibus caeruleis Jamaicae. Fruct. V. *Vitis* idaeae sapidus.

33. *Vitis idaea*, racemis terminalibus nutantibus, fol. obovatis revolutis integerrimis subtna punctatis. L. Engl. bot. t. 598 Flor. dan. t. 40. Hab. in sylvis montosis, locis petrosis. h

*Obs.* *Vaccinia* ab *Andromeda* fructu tantum differunt.

1087. *CERATOSTEMA*. *Cal.* turbinatus, 5-fidus: laciniis majusculis. *Cor.* coriacea, tubo longo, limbo recto. *Antherae* longae, erectae bipartitae s. bifurcatae. *Bacca* globosa, truncata, coronata, 5-locularis.

$\gamma$ . *peruvianum*, fol. sessilibus ovalibus, flor. panic. laxa. Hab. in Pern. Flor. magni. Pedunc. bracteati. Juss. h

1088. *ANDROMEDA*. *Cal.* 5-partitus, inferus. *Cor.* ovata: ore 5-fido, reflexo. *Caps.* 5-locularis, valvulis dissepimento contrariis. (Flor. quidam 8-andri.)

\* *Folii oppositis.*

$\gamma$ . *tetragona*, pedunc. solitariis lateralib., cor. campanulatis, fol. oppositis imbricatis obtusis revolutis. L. Pall. ross. 2. p. 56. t. 73. f. 4. Fl. lapp. 168 t. 1. f. 4. Willd. Sp. II. p. 607. Hab. in alpinis Lapponicis, Sibiricis. h

$\alpha$ . *ericoides*, fol. imbricatis convexis margine setaceo-ciliatis, pedunc. solitariis axillaribus, corollis globosis. Willd. Pall. ross. 2. p. 56. t. 71. f. 3. Hab. in C. mischata, in Sibiria. et in summis alpinis Davuriac. Caps. 4-5-locularis, 4-5-valvis. h

\* *Folii sparsis.*

3. *hypnoides*, pedunc. solitariis termi-

nalibus, cor. campanulatis, fol. confertis subulatis. L. Flor. dan. t. 10. Fl. lapp. 165. t. 1. f. 3. Hab. in alpinis Lapponicis, Sibiricis. h

4. *lycopodioides*, pedunc. solitariis geminatisque lateralibus, flor. campanulatis oecandris, fol. quadrifariam imbricatis. Gmel. sib. 4. t. 57. f. 1. Hab. in Camtschatcae montibus circa mare Ochot et in insula Beringii. h

5. *prostrata*, caul. fruticoso humifuso, fol. ovato-acutis glabris aparsis subserratis, pedunc. axillaribus solitariis. Cav. ic. 6. p. 43. t. 502. L. Hab. in Amer. australi.

6. *Myrsinites*, fol. minutis ovato-lanceolatis serratis sparsis, pedunc. solitariis axillaribus brevissimis unifloris. Lam. enc. ill. gen. t. 365. t. 2. *Arbutus Microphylla*. Forst. in Comm. Gotting. 9. p. 34. Willd. Sp. II. p. 619. Hab. in fretu Magellanici sylvaticis, montosis. h

\*\*\* *Folii alternis.*

7. *mariana*, pedunc. aggregatis rameis, cor. ovato-cylindricis, fol. oblongo-ovatis integerrimis deciluis. Duham. ed. nov. p. 177. t. 37. Jacq. ic. rar. 2. t. 467. Collect. 2. p. 336.  $\beta$ . *latifolia*. Hab. in Amer. boreali. In Europa culta ab anno 1736.

8. *ferruginea*, pedunc. aggregatis axillaribus, corollis subglobosis, fol. ellipticis integerrimis subtus squamoso-farinosis. Ait. Kew. 2. p. 67. Hab. in Amer. boreali. h

$\alpha$  *arborescens*, fol. confertiorib. revolutis convexis, flor. numerosis. Michaux. Flor. t. p. 252.

$\beta$ . *fruticosa*, ramis saepius flexuosis, fol. distantibus planiusculis, subtus reticulatis, flor. paucioribus. Michaux.

9. *cassinefolia*, pedunc. aggregatis, cor. campanulatis, fol. ovatis dentatis utrinque glabris. Vent. Hort. Cels. t. 60. t. 60. A. speciosa. Michaux. Flor. t. p. 256. Hab. in Florida.

$\beta$ . *pulverulenta*, pluvre albo conspersa, qui candor certe morbus est. Michaux. Bertram. it. t. 3. f. 2. Willd. p. 610.

10. *fasciculata*, pedunc. aggregatis, fol. alternis ovato-lanceolatis obtusis subcrenatis coriaceis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 836. Hab. in montib. Jamaicae australioris. h

11. *jamaicensis*, pedunc. aggregatis, cor. ovatis disphanis, foliis alternis lato-lanceolatis

lanceolatis obtusis interriginis subtus cinereis. Swartz l. c. p. 838. Hab. in summis montibus Jamaicae.  $\eta$

22. *octandra*, pedunc. aggregatis, cor. cylindricis quadrifidis, fol. alternis ovato-lanceolatis integris. Swartz l. c. p. 840. Cum antecedente.  $\dagger$

23. *polifolia*, pedunc. aggregatis, cor. ovatis, fol. alternis lanceolatis revolutis. L. Fl. dan. t. 54. Duham. t. 38. Hab. in uliginosis.

$\alpha$ . *latifolia*, fol. oblongis, cor. ovatis incarnatis, lacinii calycinis patentibus ovatis vltis interdum apice rubicundis. Ait. Kew. 2. p. 68. Hab. in Canada.

$\beta$ . *media*, fol. lanceolatis, cor. oblongo-ovatis rubicundis, lacin. calyc. magis erectis. Ait. Hab. in Russia, Siberia.

$\gamma$ . *angustifolia*, fol. lanceolato-linearibus, lacinii calycinis oblongis rubris. Ait. Kew. 2. p. 68. Hab. in Terra nova et litt. L. Brasil.  $\eta$

$\delta$ . *subulata*, fol. linearibus-subulatis. Duham. p. 183. Cum priore.

24. *rhomboidalis*, ramis floriferis triquetris, fol. rhomboidatibus lanceolatisque integerrimis cartilagineis glabris, gland. terminatis, pedunc. axillarib. aggregatis. Duham. l. c. p. 192. Hab. in Carolina et Florida.

25. *salicifolia*, racemis secundis nudis, cor. subcylindricis, fol. lanceolatis acutis integerrimis trinerviis. Lam. enc. t. p. 158. Hab. in ins. Mauritiis. Fol. Lauri sassafr. fere, subtus alba, trinervia.  $\eta$

26. *burifolia*, racemis secundis nudis, cor. subcylindricis, fol. cordato-ovatis integerrimis mucronulatis (erectis). Smith. ic. t. ed. t. p. 59. t. 59. Lam. l. c. Hab. in insula Bourboniae. Fruct. 6-7-pedalis. Panic. pubescens.

27. *pyrifolia*, arborescens, cort. striato-sulcato, fol. ovato-acuminatis. Cresc. cum antecedente. Arb. 20-pedalia. Flor. unicolores obscure purpurei. Panic. glabra. Aubert.

28. *ilicifolia*, fol. cordatis latis coriaceis subdentatis, flor. racemoso-paniculatis. Hab. in Peruvia (mis. D. Lagasca). Fol. breviter petiolata, juniora ovata, imbricaria, majora versus basin dentibus distantibus. Fruct. non vidi.  $\eta$

29. *rubiginosa*, fol. ovatis coriaceis integerrimis obtusis subtus pubescentibus: ju-

niorib. rubiginosis, racem. lateralib. erectis, cor. cylindricis. Hab. in ins. St.-Thomae. Fol. superne venis prominulis, quadautenus referunt fol. Sal. Caprae.  $\eta$

30. *japonica*, racemis secundis paniculatis terminalibus, fol. lanceolato-obovatis acutis apice serrulatis. Willd. Habit. in Japonia.  $\eta$

31. *arbores*, panic. terminalibus, cor. subpubescentibus, fol. ellipticis acuminatis denticulatis. Ait. Kew. 2. p. 69. Arb. 50-60-pedalis. Habit. in Virginia, Carolina. Var. fol. glabris et villosis. Anth. muticae.

32. *paniculata*, flor. paniculato-racemosis terminalibus, pubescentibus nudiusculis, fol. ovatis-acutis imbricis. A. paniculata. Michaux. p. 254. et Aiton? A. parabolica. Duham. ed. nov. p. 191. Flor. conferti, parvi, subrotundi. Var. fol. subtus pubescentibus. Hab. in Virginia, Carolina. An bue A. racemosa L.? sed flor. non racemosi, ut in sequente.

33. *racemosa*, racemis secundis bracteatis simplicibus nudis, cor. gibboso-cylindricis, fol. alternis oblongis serratis. L. Michaux. p. 256. A. paniculata. Duham. l. c. Hab. in Pennsylvania et Marylandia. Cor. cereae, oblongae, ut in A. axillari fere.  $\eta$

34. *axillaris*, racemis axillaribus simplicibus, cor. oblongis, fol. ovatis acutis serrulatis. Duham. arb. ed. nov. p. 186. t. 33. A. Catesbaei. Wult. Willd. p. 613. Hab. in Virginia, Carolina.  $\eta$

35. *acuminata*, racemis axillaribus simplicibus, fol. ovato-lanceolatis acuminatis serratis integrisque, cor. cylindricis. Duham. l. c. t. 42. Ait. Kew. 2. p. 70. A. lucida. Jacq. ic. rar. t. 1. 79. Collect. t. p. 95. A. populifolia. Lam. enc. Hab. in America bor.  $\eta$

36. *marginata*, ramis triangularibus, fol. ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis marginatis nitidis, pedunc. axillaribus aggregatis simplicibus. Duham. p. 183. t. 70. A. coriacea. Ait. A. lucida. Lam. Hab. in Car. et Florida prope rivos.  $\eta$

37. *rupestris*, racemis simplicissimis bracteatis, cor. campanulatis, fol. alternis oblongis serrulatis. Forst. prod. n. 195. Hab. in N. Zeelandia.  $\eta$

38. *calyculata*, racemis secundis foliaceis, cor. subcylindricis, fol. alternis lanceolatis obtusis punctatis. L. Lam. ill. t. 365. f. 4. Hab. in Amer. septent.

$\beta$ . *latifolia*, cor. oblongo-cylindraceis, fol. oblongo-ovalibus obtusis. Duham. l. c. p. 189. t. 41. Cresc. in Terra nova.

ll h

*Y. angustifolia*, cor. oblongo-ovalibus, fol. oblongo-lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 70. Hab. in Amer. boreali inque Sibiria. *h*

29. *anastomosans*, fol. ovatis subseriatis, subtus anastomosibus punctatis. Lin. suppl. 237. Hab. in N. Granada. Caul. villosus. Fol. rigida, venosa.

30. *bracteata*, fol. ovato-acutis, racem. terminalibus bracteatis, caul. hirsuto. Cav. ic. 6. p. 42. t. 362. f. 1. Cum sequente in Amer. australi, in monte Chinborago. Flor. hirti.

\* *glomerata*, fol. ovato-acutis, racem. axillaribus glomeratis, cor. glabris, bract. pedunc. longioribus. Cav. l. c. Auct. in dubio est, an eadem sit ac 23. species.

31. *eriphylla*, racem. secundis terminalibus bracteatis, cor. ovatis, fol. subrotundo-ovatis utrinque tomentosis, glandul. terminatis. Vandelii Flor. lusit. et Bras. Specim. Hab. in Brasiliæ montosis.

1089. *EPIGÆA*. *Cal.* exterior 3-phyllus: interior 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis. *Caps.* 5-locularis: *Recept.* 5-partito.

1. *repens*, fol. cordato-ovatis integerrimis reticulatis, cor. cylindricis. Willd. p. 615. Andrew. Repos. t. 102. Lam. ill. t. 367. f. 1. Hab. in Virginie, Canadæ pinetis. Flor. fragrant. *h*

2. *cordifolia*, fol. cordatis subrotundis serratis convexis hispidis rigidis, cor. ovatis. Swartz prod. 73. Fl. ind. occid. 2. p. 842. Lam. ill. t. 367. f. 2. Hab. in mont. Guadeloupæ, inque Cajenna. *h*

1090. *GAULTHERIA*. *Cal.* exterior 2-phyllus: interior 5-fidus. *Cor.* ovata. *Nectar.* mucronibus 10. *Caps.* supera, 5-locularis, vestita calyce interiore baccata.

1. *procumbens*, fol. oblongo-ovatis mucronatis dentatis confertis, caule procumbente flexuoso glabro. Andrew. t. 116. Lam. ill. t. 367. Fol. Theae succedaneum. Hab. in Canadæ sterilibus arenosis. *h*

2. *erecta*, fol. ovatis mucronatis, caul. erecto, flor. racemosis. Vent. Hort. Cels. p. 5. t. 5. Hab. in Peru. Viscoso-glandulosa. Fol. margine revoluta, subnervulosa. *h*

3. *busifolia*, fol. subrotundo-ovatis dentatis subtus punctato-scabris, pedunc. solitariis axillaribus, ramis hirsutis erectis. Willd.

in N. act. soc. Berol. 4. Hab. in summo monte Coracae, cum 2 sequentibus.

4. *scabra*, fol. ovato-cordatis acutis dentatis scabris, racem. axillaribus bracteatis. Willd. l. c. Sempervirens. Cal. baccans ater. *h*

5. *odorata*, fol. obovatis obtusis serrulatis subtus punctato-scabris, racem. terminalibus bracteatis. Willd. l. c. Semperv. Fol. benevolentia. *h*

6. *antipoda*, fol. sparsis subrotundis serratis dentatis glabris, caule fruticoso diffuso, ramis pubescentibus. Forst. prod. n°. 196. Hab. in N. Zealandia. *h*

1091. *ARBUTUS*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ovata, basi pellucida. *Bacca* supera, 5-locularis.

1. *Unedo*, caule arboreo, fol. glabris obtuse serratis, panicula terminali, bacis polyspermis. Lin. Lam. ill. t. 366. f. 1. Mill. dict. t. 48. f. 1. 2. *β. turbinata*, fructu turbinato. Tournef. Hab. in Europæ australis et Orientis sylvis. *h*

2. *laurifolia*, arborea, fol. oblongis utrinque acuminate acute serratis glabris, racem. axillaribus secundis sessilib. solitariis. Hab. in America septentrionali. Similima A. *Unedæ*. *h*

3. *Andrachne*, caul. arboreo lævi, fol. glabris integerrimis serratis, bacis polyspermis, panicul. nuda. Lam. enc. 1. p. 236. Ehret. act. angl. vol. 67. t. 6. Hab. in Oriente. Caul. epidermide denudatus. *h*

4. *integrifolia*, caul. arboreo, fol. ovatis integerrimis mucronatis, racem. terminalibus foliosis. Lam. enc. 1. p. 227. A. folio non serrato. Bauh. Tournef. Cor. 41. *Andrachne* veterum. Hab. in Candia, ad montem *Ida*. Ram. cortice deciduo demum denudati, ut in antecedente. † *h*

5. *ferruginea*, arborecens, fol. oblongis obtusis glabris integerrimis, racemis terminalibus. Hab. in America. Cor. magis elongata fere ut in *Andromeda*.

6. *acadiensis*, caul. procumbentibus, fol. ovatis subserratis, flor. sparsis, bacis polyspermis. L. Cfr. A. *lancoolata*. Lam. l. c. Hab. in Acadia. *h*

7. *alpina*, caul. procumbentibus, fol. rugosis serratis. L. Fl. dan. t. 83. laghis. Scot. t. 11. f. 2. b. Hab. in alpinis petrosis. Bac. 9-spermae.

8. *Uva ursi*, caul. procumbentibus, fol. integerrimis. L. Fl. lapp. t. 6. f. 3. Fl. dan. t. 33. Hab. in Europa frigida, Canada. Baccæ 5-spermae. h

9. *macronata*, caule fruticoso, fol. alternis ovatis serratis mucronatis, pedunc. axillaribus unifloris. Lam. ill. t. 366. f. 2. Hab. in Tierra del Fuego. Frut. rigidissimus. Flor. cernui. h

10. *pumila* (empetrifolia), caulib. diffusis, fol. alternis distichis oblongis integerrimis, flor. lateralibus solitariis. Lin. suppl. 239. *Andromeda empetrifolia*. Lam. Willd. p. 609. Cum priore. Forst. in Comm. goett. 9. p. 32. Fol. fere Empetri. h

11. *phyllireaeifolia*, caul. ramosissimo, fol. lanceolatis acuminatis acute serratis, flor. axillaribus. Hab. in Peru. Herb. Juss. Fol. parvula. h

1092. CLETHRA. Cal. 5-partitus, persistens. Petala 5. Stylus apice 3-fidus, persistens. Caps. 3-locularis, 3-valvis, cal. cincta. (Flor. spicati.)

1. *scabra*, fol. latis obovatis scabris, subtus villosis. Hab. in Amer. (Herb. Juss.)

2. *alnifolia*, fruticosa, fol. obovato-lanceolatis, racemis spiciformibus, calycib. acutis, bract. flor. brevioribus persistentibus. Ait. Kew. 2. p. 73. Lam. ill. t. 369. Duham. arb. 1. p. 176. t. 71. Hab. in Amer. boreali.

3. *incana*, fol. ovatis acuminatis, subtus incano-tomentosis. Catomentosa. Lam. enc. 1. p. 46. C. alnifolia.  $\beta$ . pubescens. Ait. An tantum prioris var.?

4. *acuminata* (glauca), arborescens, fol. ovalib. aut basi cuneatis acuminatis serratis, subtus glaucis, spicis subsolitariis, bract. flor. longioribus deciduis. Michaux. Flor. 1. p. 280. Hab. in Carol. montib.

5. *paniculata*, fol. lanceolato-obovatis serratis glabris, panic. angustata bracteatis. Willd. Ait. Kew. 2. p. 73. Cum priore. h

6. *arborescens*, arborescens, fol. oblongo-lanceolatis utrinque glabris serratis racem. spiciformibus, calycib. obtusis. Kew. 2. p. 73. Ventr. Hort. Malmaison. t. 40. Hab. in Madera. Frut. 6-8-pedali.

7. *tinifolia*, arborescens, fol. oblongo-lanceolatis integerrimis subtus incanis, racem. paniculatis spiciformibus tomentosis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 845. Tinas occidentalis. Lin. Brown. jam. 224. t. 21. f. 1. Sloan. hist. 2. t. 198. f. 2. Hab. in montib. Jamaic. australis. h

1093. CUELLARA. Cal. 5-partitus. Petala 5, æqualia. Stylus 3-gonus. Caps. trigona, 3-locularis. Semina imbricata, membranacea.

1. *revoluta*, fol. oblongis denticulatis, basi revolutis excavatis. Syst. veg. Flor. Per. et Chil. p. 103. Hab. in Peruv. nemorib. Arb.

2. *ferruginea*, fol. oblongis integerrimis acuminatis basi læviter excavatis. l. c. Frut. crescens in montib. frigidis et nemorosis.

3. *obovata*, fol. obovatis rugosis denticulatis. Syst. l. c. p. 104. Arb. excelsa, ligno valde duro.

1094. PYROIA. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 5-locularis, angulis dehiscens.

1. *rotundifolia*, fol. obovatis, staminibus ascendentibus, pistillo declinato. L. Flor. dan. t. 110. Lam. ill. t. 367. f. 1. Hab. in sylvaticis.

2. *azarifolia*, fol. reniformibus, pistillo declinato. Michaux. Flor. 1. p. 251. Hab. in Amer. boreali. Scap. squamis convolutis.

3. *minor*, floribus racemosis dispersis, staminib. pistillisque rectis. L. Flor. dan. t. 55. Engl. bot. t. 158. Hab. in sylvaticis. Priore rarior.

4. *secunda*, racemo unilateralis, pistil. recto. Gmel. sib. 4. p. 129. t. 56. f. 2. Fl. dan. t. 402. Hab. in Europæ bor. sylvis. h

5. *uniflora*, fol. suborbiculatis, scapo unifloro. L. Fl. dan. t. 8. Engl. bot. t. 146. Hab. in sylvis abietinis. Flor. odorati. h

6. *umbellata*, fol. lanceolatis, pedunculis subumbellatis. L. Lam. ill. t. 367. f. 2. Hab. in Europæ, Asiæ et Amer. septentrionalis sylvis. h

7. *maculata*, fol. oppositis subpetiolatis, pedunc. bifloris. L. Pluk. man. 157. t. 349. f. 4. Hab. in Amer. septentrion. sylvis. Fol. maculis albidioribus pictis. h

1095. STYRAX. Cal. campanulatus, subinteger, inferus. Cor. 5-7-partita: tubo brevi, cal. inserta. Drupa 1-2-sperma, coriacea. (Stam. 6-16, cor. tubo inserta. Anth. oblongæ lineares.)

2. *officinale*, fol. ovatis subtus villosis, h h 2

racemis simplicibus folio brevioribus. Ait. Kew. 2. p. 75. Willd. Sp. II. p. 623. Cavan. Diss. 6. p. 338. t. 182. f. 2. Lam. ill. t. 369. Hab. in Syria, Judaea, Italia. *h*

2. *grandifolium*, fol. obovatis subtus villosis, pedunc. inferioribus axillaribus solitariis unifloris. Ait. Kew. 2. p. 75. S. officinale. Walt. carol. 140. Hab. in Carolina australi. *h*

3. *Benzoin*, fol. oblongis acuminatis subtus tomentosis, racemis compositis longitudo foliorum. Dryand. in Act. angl. 77. p. 303. t. 10. Hab. in Sumatra. Ex hac arbore resina Benzoin dicta. Willd. *h*

4. *laevigatum*, fol. oblongis utrinque glabris dentatis, pedunc. axillaribus solitariis binisve. Ait. Kew. 2. p. 75. S. glabrum. L. c. 188. f. 1. S. americana. Lam. enc. 1. p. 8. f. 5. Hab. in Carolina australi. Stam. 8. *h*

#### 1096. INOCARPUS. *Cal.* bifidus.

*Cor.* infundibuliformis, lacin. lineares. *Stam.* duplici serie. *Drupa* monosperma, maxima.

1. *edulis*. Lin. suppl. 239. Forst. N. gen. n°. 33. Lam. ill. t. 362. Rumph. 1. t. 65. Hab. in India. Arb. fol. alterna subcordata. Spicæ axillares, hirsutæ. Flor. parvi, bracteatis suffultæ. L.

#### 1097. SAMYDA. *Cal.* 5-partitus, coloratus. *Cor.* nulla. *Nectar.* campanulatum, staminiferum. *Caps.* intus baccata, 4-valvis, 1-locularis. *Semina* nidulantia. (*Stam.* 8, 12 et plura.)

1. *nitida*, flor. octandris, fol. cordatis glabris. L. Willd. p. 624. Brown. jam. 217. t. 23. f. 3. Hab. in America. *h*

2. *macrophylla*, flor. octandris, fol. ovatis acutis glabris, axillis venarum subtus villosis, corymbo terminali. Willd. p. 625. Hab. in India orientali. Stigma pilosum. Fruct. ignotus. *h*

3. *multiflora*, flor. octandris, fol. oblongis dentatis utrinque attenuatis, subtus tomentosis, pedunc. unifloris aggregatis axillaribus. Willd. Cavan. ic. 1. p. 48. t. 67. Hab. in ins. St. Dominici. *h*

4. *villosa*, flor. decandris, fol. oblongis subterratis basi obliquis, sericeis, subtus villosis, pedunc. solitariis axillaribus. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 758. Hab. in montibus Jamaicæ. *h*

5. *glabrata*, flor. decandris, fol. ovato-lanceolatis integerrimis nitidis, pedunc. axillaribus unifloris. Swartz. l. c. 2. p. 760. Hab. in montib. Jamaic. australis. Cum *S. nitida* non confundenda. Sw. *h*

6. *spinescens*, flor. decandris terminabilibus, fol. lanceolato-ovatis obtusis crenatis glabris, ramis patulis spinulentis. Swartz. l. c. 2. p. 762. Hab. in Hispaniola. *h*

7. *pubescens*, flor. dodecandris, foliis ovatis subtus tomentosis. L. Hab. in America. *h* +

8. *serrulata*, flor. dodecandris, foliis ovato-oblongis serrulatis. L. Jacq. Collect. 2. p. 328. t. 17. f. 1. Plum. gen. 4. ic. 146. f. 2. Hab. in America. *h*

9. *polyandra*, flor. polyandris. Willd. p. 626. Melastaurum distichum. Forst. gen. n°. 72. Hab. in N. Caledonia. *h* +

#### 1098. CASEARIA. *Cal.* 5-phyllum.

*Cor.* 6. *Nectar.* 4-5-phyllum, cum staminibus alternans. *Caps.* intus baccata, 3-valvis, 1-locularis. *Sem.* nidulantia. (*Stam.* quibusdam 8.)

##### \* *Flor.* octandris.

1. *spinosa*, flor. octandris, fol. ovatis serratis glabris, pedunc. axillaribus unifloris, ramis spinosis. Willd. Sp. II. p. 626. Hab. in montosis Domingo. *h*

2. *nitida*, flor. octandris, fol. ovatis crenatis glabris, cymis pedunculatis axillaribus. Willd. Jacq. amer. ed. picta. Act. helv. 8. p. 58. t. f. 4. Hab. in Carthagena fruticetis. *h*

3. *ramiflora*, flor. octandris, fol. ellipticis serratis utrinque glabris, ramis floriferis. Iroucana gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 329. t. 127. Lam. ill. Athenæa. Schreb. Fl. b. in ins. St. Crucis, et ad littora maris Gujanæ, Cajennæ. *h*

4. *hirta*, flor. octandris, fol. ovatis serratis subtus hirsutis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 756. Hab. in pascuis sylvaticis Jamaicæ. *h*

##### \*\* *Flor.* decandris.

5. *parviflora*, flor. decandris, fol. oblongis acuminatis crenulatis utrinque glabris nitidis, pedunc. coarctatis axillaribus unifloris. Willd. p. 627. Samyda parviflora. L. Sloan. hist. 2. p. 108. t. 211. f. 2. Hab. in fruticetis Amer. calidioris. *h*

6. *parvifolia*, flor. decandris, fol. ovatis acuminatis serratis glabris, pedunc. unifloris aggregatis lateralibus. Willd. C. decandra. Jacq. amer. 133. t. 85. Hab. in montib. sylvaticis Martinicae. Divers. a praecedente. h

7. *sylvestris*, flor. decandris, fol. ovatis acuminatis integerrimis, ramis virgatis, pedunc. axillaribus confertissimis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 754. Hab. in sylvis montosis Indiae occidentalis. h

8. *macrophylla*, flor. decandris subtomentosis, fol. elliptic. acuminatis subcrenatis. Pitumba gujanensis. Aubl. guj. 2. app. 29. t. 385. Hab. in Cajenna. Rami griseo punctati. h

9. *serrulata*, flor. decandris, fol. ovato-lanceolatis obtusis serrulatis, ramul. flexuosis, pedunc. axillaribus confertissimis. Sw. Fl. ind. occid. 2. p. 754. Hab. in Indiae occidentalis insula Nevis. h

10. *elliptica*, flor. decandris, fol. elliptico-lanceolatis obtusis subserratis, juniorib. subtus pubescentibus, pedunc. axillaribus confertis. Willd. Anavinga lanceolata. Lam. enc. 1. p. 146. Ejusd. ill. gen. t. 355. f. 1. Hab. in India orientali. h

11. *Anavinga*, fol. alternis ovatis acuminatis serrulatis, baccis globosis pedunculo aequalib. Lam. l. c. sub Anavinga. Rheed. 4. t. 49. Hab. in India orientali. Flores octandri? h

12. *hirsuta*, flor. decandris, fol. ovatis acuminatis dentato-serratis hirtis, subtus villosis, pedunc. lateralibus confertis. Sw. Fl. ind. occid. 2. p. 755. Hab. in montibus Jamaicae et Hispaniolae. h

1099. CRATERIA. Cal. 5-partitus. Cor. o. Nectarium crateriforme, setis 10, distinctum hirtis coronatum, et cui stamina, alterna breviora, inserta. Stigmata 3. Fruct. ...? (Pericarp. 1-loculare? exsuccum?)

1. *fasciculata*, fol. oblongis serratis acuminatis, flor. fasciculatis. Chaetocrater. Syst. veg. Flor. Peruv. et Chilens. p. 106-107. Hab. in Peru in Chincho. Arb. 4-origyalis. Fol. subamara, col. ochraceum suppeliat.

2. *capitata*, fol. oblongis serratis acuminatis, flor. capitatis. Chaetocrater capitatum. l. c. p. 109. Cum priore. Arb. triorigyalis.

Obs. A priore genere praesertim nectario, quod in hoc setis decem, nec lociniis 5-ovatis uti in *Casearia* distinguitur, forte et fructu differt, qui nondum observatus.

1100. AQUILARIA. Cal. campanulatus. 5-fidus. Cor. o. Nectar. campanulatum. 5-fidum, interne staminiferum. Caps. 2-locularis, 2-valvis, lignosa. Sem. solitaria.

1. *ovata*. Cavan. diss. 7. p. 377. t. 224. A. malacensis. Lam. enc. 1. p. 49. \* a. p. 603. Ej. ill. gen. t. 356. Hab. in montibus Malaccae. h

1101. AUGEA. Cal. 5-partitus. Cor. o. Nectar. 10-dentatum. Caps. 10-locularis.

1. *capensis*. Thunb. prod. 80. Hab. ad Cap. b. spei.

ELMAGNES, *decandri* (Gen. 1102-1105.) Flor. sunt incompleti. Cal. tubulosus, superus, cui stamina inserta. Styl. 1. Fruct. baccatus, aut drupaceus 1-spermus. Frutices vel arborescunt, fol. plerumque alternis.

1102. BUCIDA. Cal. 5-dentatus, superus. Cor. o. Bacca 1-sperma, coronata.

1. *Buceras*, spicis elongatis, fol. cuneiformib. glabris. Vahl. eclog. 1. p. 50. Lam. ill. t. 356. Hab. in Jamaica. Fruct. saepe in cornua longa spongiosa excrescunt. h

2. *capitata*, flor. capitato-spicatis, fol. cuneiformib. margine villosis-ciliatis. Vahl. eclog. 1. p. 50. t. 8. Hab. in Montserrat. h

1103. TERMINALIA. Cal. 5-fidus, intus villosus, patens. Cor. o. Drupa infera, compressa, carinata, 1-sperma. (Flor. racemosi.)

1. *Catappa*, fol. obovatis crenulatis subtus tomentosis. Lam. enc. 1. p. 348. Rheede. 4. t. 3. et 4. Hab. in Malabar. Arb. procera, pyramidalis.

2. *malaccana*, fol. obovatis integerrimis utrinque glabris. Lam. l. c. p. 349. Catappa. Rumph. 1. t. 68. Hab. in Moluccis, Java. Arb. praecedenti affinis.

3. *mauritanica*, fol. oblongo-lanceolatis obsolete crenatis glabris, stam. calyce longioribus. Lam. l. c. Hab. in ins. Mauritii et Bourboniae, ubi inter arbor. maxima, et resinosa. Commers. *Le faux Benjoin* incolis.

4. *Benzoe*, fol. angusto-lanceolatis subrepandis pilosis sanguineo-venosis. Lam.



1. c. *T. angustifolia*. Jacq. hort. vind. 3. t. 100. Croton Bentoe. Lin. Hab. in Ind. orientali. Arbuse. succum lacteum stillans, et resinam Benzoin siccans.

5? *Vernix*, fol. lanceolato-linearibus glabris. Lam. p. 350. Rumph. caul. 2. p. 259. t. 86. Hab. in montosis Chinae, Molluc. Ex hac vernix Chinesium.

6. *Chebula*, fol. ovatis integerrimis nudis, petiol. superne biglandulosis. Retz. obs. 5. p. 31. Hab. in Ind. montibus. Pedunc. racemosi, flor. verticillatis.

7. *arbuscula*, fol. ovato-lanceolatis integris pubescentibus, ramis dichotomis, racemis erectis. Swartz. prodr. p. 68. Hab. in Amer. meridion.

1104. **CHUNCHOA**. *Cal.* 5-fidus, campanulatus, superus, deciduus. *Cor.* o. *Drupa* 1-sperma, inaequaliter alata. (Cfr. Juss. gen. pl.)

1. *obovata*, fol. obovatis acuminatis, spicis pendulis, caps. 5-alatis. *Gimbernatis* obovata. Flor. Per. et Chil. Syst. p. 274. Hab. in Peruviae nemorib. Arb. 40-ulnaris, ligno durissimo.

2. *oblonga*, fol. oblongis, spicis congestis, caps. dipteris. *Gimb.* oblonga. Flor. Per. etc. p. 375. Cresc. in Pogozo nemorib.

1105. **TANIBUCA**. *Cal.* urceolatus, 5-fidus, basi 1-bractentus. Fruct. compressus orbicularis, alatus?

1. *guyanensis*. Aubl. gujan. t. 128. Juss. gen. pl. Arb. Flor. spicato-racemosi. (Vidi fructum, in Herb. ill. Juss., satis magnum, orbicularem.)

## D I G Y N I A.

1106. **ROYENA**. *Cal.* urceolatus. *Cor.* 1-petala, limbo revoluta. *Caps.* 2-locularis, 4-valvis.

1. *lucida*, fol. ovatis scabriusculis. L. Willd. Sp. II. p. 631. Lam. ill. t. 370. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequentibus. h

2. *villosa*, fol. cordatis oblongis subtus tomentosis. L. Rami villosi.

3. *pallens*, fol. oblongo-obovatis obtusis glabris. Willd.

4. *glabra*, foliis lanceolatis glabris. L. Comm. hort. 1. p. 125. t. 65.

5. *cuneata*, fol. subcuneato-oblongis pubescentibus euvriis, caul. subvillosa. Lam. enc. 6. p. 322. Hab. in India? Flor. solitaria. *Cal.* albidus. *Cor.* purpurea.

6. *hirsuta*, fol. oblongo-lanceolatis villosiusculis. Willd. Lam. ill. l. c. f. 2. Jacq. coll. suppl. 110. t. 13. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei. h

7. *polyandra*, fol. ellipticis, flor. polyandris polygamis. Lin. suppl. 240.

8. *ambigua*, fol. obovatis villosiusculis coriaceis, flor. pedunculatis polyandris polyginis, cor. 6-7-fidae laevi. obtusis. Voss. Malmes. t. 17. Flor. fulvi, lacin. reflexi.

8. *angustifolia*, fol. lanceolata acutis subtus pilosiusculis. Willd. Cum priorib.

1107. **HYDRANGAEA**. *Cal.* superus, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* 2-locularis, 2-rostris, foraminis inter cornua dehiscens.

1. *vulgaris*, (*arborescens*. L.) fol. ovatis glabris, staminib. alternis longioribus, flor. conformibus. Smitt. ic. pictae. 2. p. 12. Lam. ill. t. 370. f. 2. H. vulgaris. Michaux. Flor. 7. p. 268. Hab. in Virginia et Carolina. Nullatenus arborescit.

2. *nivea*, fol. cordatis, subus nireo-tomentosis, flor. radiatis. Michaux. l. c. H. radiata. Willd. p. 634. Lam. l. c. f. 2. Cum priore.

1108. **CUNONIA**. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* bilocularis, acuminata, polysperma. *Styli* flore longiores.

1. *capensis*. L. Lam. ill. t. 371. Borm. afr. 259. t. 95. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. opposita, pinnata. Racemi terminales, bini. h

1109. **TRANTHEMA**. *Cal.* sub apice mucronatus. *Cor.* o. *Stam.* 5. 10-12. *Styli* 1-2. *Germen* retusum. *Caps.* circumscissa, 2-locularis: loculis 2-spermis. (Flor. axillares.)

1. *monogyna*, flor. pentandris monogynis. L. Lam. ill. t. 375. f. 1. Herm. par. 213. t. 213. Hab. in Jamaica, Curassao. ☉

2. *crystallina*, flor. pentandris monogynis congestis, fol. ovalibus, caule fruticoso. Papularia. Forsk. descr. Gg. Hab. in Arabia et in India orientali. h

3. *pentandra*, flor. pentandris digynis. L. Lam. ill. t. c. f. 2. Hab. in Arabia. Fol. petiolata, elliptica. Flores plures. ☉

4. *humifusa*, monogyna, fol. lanceolatis, caule frutescente tereti. Thunb. prod. 80. Hab. ad Cap. b. sp. h

5. *anceps*, monogyna, fol. lanceolatis, caule frutescente ancipiti, Thunb. prod. 80. Cum prior.

6. *decandra* (*glinoides*), flor. anblecantris digynis. L. Zalcia. Burm. ind. 110. t. 31. f. 3. Hab. in India. Sutura Glini. Filam. 10, rarius 1. Fruct. in congeneribus.

1110. **CHRYSOSPLENIUM**. Cal. 4-5. 5-fidus, coloratus. Cor. 6. Caps. birostris, 1-locularis, polysperma. (Flor. laterales 8-andri.)

1. *alternifolium*, fol. alternis. L. Flor. dan. t. 366. Hab. in opacis bumentibus, sylvis. Vere.

2. *oppositifolium*, fol. oppositis. L. Flor. dan. t. 365. Hab. ad rivulos in montosis.

1111. **SAXIFRAGA**. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Caps. 2-rostris, 1-locularis, polysperma.

\* Fol. indivisis radicalibus, caule subnudo.

1. *pyramidalis*, fol. radicalibus rosulatis lingulatis latiorib. obovatis serratis patulis, panic. composita recta. Lapeyr. Flor. d. Pyrenées. (Saxifr.) 1. p. 32. t. 11. f. 2. S. *Cotyledon*? L. Willd. Sp. II. p. 618. Flor. dan. t. 241. Lam. ill. t. 373. f. 3. Hab. in alpinis.

2. *recta*, fol. radicalib. rosulatis strictis glaucis supinis; incisiuris cartilagineo-argenteis, panic. simplicis. Lapeyr. l. c. p. 33. Moris. s. 19. t. 9. f. 19. fig. mala. Pluck. Phytog. t. 227. f. 1. Hab. in rupium fissuris.

3. *Aizoon*, fol. radicalib. rosulatis cartilagineo-serratis brevibus rotundatis verticillis, flor. cymosis. Lapeyr. p. 31-34. Jacq. austr. 5. t. 418. Mel. ic. t. 1310. Hab. cum praecedentibus. Cal. glaber.

4. *longifolia*, fol. radicalibus rosulatis linearisublanccolatis integris longissimis, basi subteretibus, caul. paniculato nutante. Lapeyr. p. 26. t. 11. Hab. in Pyrenaeis, ad praecipitiis. Caul. 1-3-petalis, multiflorus. Petal. alba punct. purpureis.

Obs. Quatuor hae species sub S. *Cotyledone* L. olim confundi sunt.

5. *mutata*, fol. radicalibus aggregatis lingulatis margine cartilagineis repandis, caul. racemoso foliato, cal. cili. glanduloso-pilosis, petalis linearis-lanceolatis. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 466. Carr. mag. 351. Hab. in alpinis. Fol. basi ciliato-plumosa. Lapeyr. S. *Cotyledoni* affinis, sed flores quadruplo majores, crocei nec albi. W.

6. *caliciflora*, fol. radicalibus rosulatis lingulatis integerrimis, petal. staminibusque intra cal. clausis. Lapeyr. l. c. p. 28. t. 12. Hab. in Pyren. saxi calcareis. S. *media*. Gouan. obs. p. 27. altitud. 1-5-unciali. Petal. rosea rotundata, cal. breviora. L.

7. *Aretioidea*, fol. radicalibus rosulatis integris, flor. capitis, petal. linearib. obtusis crenulatis. Lapeyr. l. c. Cresc. in rupum fissuris. Caul. 1-2-unc. Petal. flava. Facia Aretiae. An huc S. *Aizoides*? L.

8. *lateopurpurea*, fol. radicalibus rosulatis integris, flor. paniculatis, cal. campanulato, petal. integris connatis. Lapeyr. p. 29. Hab. in saxi calcareis. Petala lutea. Cal. purpurea. Non est hybrida.

9. *penzylvanica*, fol. lanceolatis denticulatis, caule nudo paniculato, flor. subcapitis. L. Hab. in Amer. boreali. Fol., caulis pilis articulatis tecta.

10. *hieracifolia*, fol. oblongo-lanceolatis glabris repando-dentatis, caule nudo, pedunculis unifloris aggregatis. Willd. p. 641. Waldst. et Kitzeb. Plantae rar. Hungar. f. 17. t. 18. Hab. in alpi. Carpathicis, loc. uliginosis. Simillima praecedent. Fol. tenuissima ciliata, pilis brevibus articulatis. Cal. et cor. flava patentissima. W.

11. *androsacea*, fol. lanceolatis obtusis pilosis, caule nudo bifido. L. Jacq. austr. t. 389. S. alpina, habitu androsaces, villosa. Hall. Hab. in alpinis. U

12. *caesia*, fol. linearibus perforato-punctatis aggregatis recurvatis, caul. multifloro. Jacq. austr. t. 173. Scop. carn. t. 15. S. recurvifolia. Lapeyr. l. c. p. 30. Hab. in alpinis. Fol. basi ciliata.

13. *burseriana*, fol. aggregatis imbricatis triquetris subulatis laevibus (glabris), caule subnudo unifloro. L. W. in Jacq. misc. 1. p. 159. t. 17. Segu. ver. 3. p. 201. t. 5. f. 2. Hab. in Tauro Rastadiensi, montib. Lessanensibus. Facies Sedi minoris. Caul. rufescenti-hispidus. Fl. lactei, lincis pallidis. L.

H h 4

β. *spinosa*. R. *Burseriana*, fol. rosulatis imbricatis spinoso-ciliatis triquetris, flor. fastigiatis, petal. crispo-reflexis. Lapeyr. p. 35. t. 17. f. 1. Rarissime in Pyrenæis.

14. *tenella*, fol. lanceolatis mucronatis basi ciliatis imbricatis, caule nudiusculo paucifloro, calycibus mucronatis. Willd. p. 643. Wulfen in Jacq. Collect. 3. p. 44. t. 17. Hab. in Carinthiæ alpinis. T.

Obs. Accedit ad sequentem sed flor. quadruplo minores, cal. mucronatus et germ. inferum glanduloso-pilosum. Willd.

15. *bryoides*, fol. lanceolatis mucronatis margine cartilagineis ciliatis, caul. nudiusculo paucifloro, calycibus obtusis. Willd. Jacq. misc. 2. p. 49. t. 5. f. 8. Lapeyr. saxifr. p. 35. t. 8. Hab. in alpinis. Petala flava, maculis fulvis.

16. *sedoides*, fol. aggregatis alternis oppositisque subanccolatis, flore pedunculato. L. Jacq. misc. 2. p. 134. t. 21. f. 22. S. muscoides. Allion. ped. n. 1528. t. 61. f. 2. Hab. in alpin. Tridentinis, Carinth. acis. T.

17. *stellaris*, fol. subrhomboidis serratis, caule nudo ramoso, petal. aequalib. connatis. L. Jacq. Coll. 1. p. 202. t. 13. Comosa, panicula foliacea. Fl. lapp. 175. t. 2. f. 3. Hab. in montosis alpinis ad latera rivulorum.

18. *leucanthemifolia*, hirsutissima, fol. elongatospathulatis, acute dentatis, caulib. divaricato-dichotomis, panic. capillaribus, petal. inaequalib. Michaux. Flor. 1. p. 268. Lapeyr. Saxifr. p. 49. t. 13. S. *Clusii*. Gouan. Hab. in Carol. alpinis et in Pyrenæis. Cal. reflexus.

19. *virginica*, pubens, fol. ovalib. obtusis subpetiolatis crenatis, caul. subnudo paniculato, cal. erectis. Michaux. p. 269. Pluck. t. 229. f. 5. Hab. in Amer. bor. Facie Stellaris. Affin. S. punctatae.

20. *crassifolia*, fol. ovalibus retusis obsolete serratis petiolatis, caule nudo, panic. conglomerata. Linn. dec. 2. p. 27. t. 14. Gmel. s. b. p. 166. t. 66. Hab. in alpinis Sibiriae. Fol. bina, palmaria, coriacea. Petala rubra. Flor. vere.

21. *nivalis*, fol. obovatis crenatis subsessilibus, caule nudo, floribus congestis. L. Flor. dan. t. 28. t. 12. Hab. in summis alpinis Spitzbergensibus, Lapponicis, Arvonica, inque Virginia, Canada.

22. *Bellarlii*, acaulis, fol. subrotundis repandis, flore sessili. Willd. Allion. ped.

n. 1536. t. 88. Hab. in rupib. humidis Pedemontanis. T.

23. *davurica*, fol. cuneiformi-rhombeis apice dentatis glabris petiolatis, caule nudo. Willd. Hab. in summis alpinis Davuriae, sub nive. T.

24. *sarmentosa*, fol. subrotundis dentatis pilosis, stolonib. reptantibus, petalis duobus elongatis. Ait. Kew. 2. p. 79. S. *stolonifera*. Jacq. ic. rar. 1. t. 80. Hab. in China, Japonia. Sarmenta ramosa e singulis fol. radicalium, alia copiosa radicania propaginibus. T.

25. *punctata*, fol. subrotundis dentatis longius petiolatis, caule nudo. L. Moris. hist. 3. p. 478. s. 12. t. 9. f. 17. Hab. in Sibiria. T.

26. *umbrosa*, fol. obovatis subretusis cartilagineo-crenatis, petiol. dilatatis, caula nudo paniculato. L. Mill. ic. 141. f. 2. Lapeyr. l. c. p. 44. t. 16. Hab. in montib. apud Cantoneros et in Pyrenæis. Flor. inferi, albi aut rosei, punctati. Caps. ampullaceae. Lap.

27. *hirsuta*, fol. cordato-ovalibus retusis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. L. Hab. in Pyrenæis. Cal. reflexus.

28. *cuneifolia*, fol. cuneiformibus obtusissimis r. pandis, caule nudo paniculato fragili. L. Plant. rar. bong. p. 43. t. 44. Lapeyr. Saxifr. p. 45. Hab. in alpin. Petiol. cartilaginei. Cal. reflexus. Petal. candida, basi macula flava. Stam. per paria eriguntur, et anth. stigmatib. applicant, polline emisso divaricantur. Pl. l. c.

29. *Geum*, fol. reniformibus dentatis utrinque pilosis avenis, caule nudo paniculato. L. Lapeyr. p. 46. t. 14. Moris. f. 12. t. 9. f. 12. fig. mala. Hab. in alpinis. Cal. reflexus.

\*\* Fol. indivisis, caul. folioso.

30. *caerulea* (*oppositifolia*. L.) fol. confertis ovatis ciliatis oppositis (subalternisque) staminibus pistillisque cor. brevioribus. Lapeyr. Saxifr. p. 36. t. 16. Flor. dan. t. 34. (mollis.) Hab. in alpin. super saxa, prope nives et gelu. In surculis sterilibus fol. alterna etiam vidi.

31. *biflora* (*rosea*), fol. obovatis ovatis, oppositis distantibus, cor. pistillisque cal. duplo superantibus. Lapeyr. l. c. p. 37. t. 18. Allion. pedem. 2. t. 21. f. 1. Willd. p. 648. Cum priore. Flor. 1-3, rosei.

32. *retusa*, fol. imbricatis acutis trigonis basi ciliatis, pistil. staminibusque exsertis.

Lapeyr. p. 38. t. 18. Gouan. Obs. t. 18. f. 1. S. purpurea. Allioni. l. c. t. 21. f. 2. Hab. in Pyrenæis et alp. pedem. Petala dilate violacea.

33. *spatulata*, fol. spatulatis obtusis ciliatis, caul. prostrato, pedicell. axillarib. unifloris. Desf. alt. t. p. 342. t. 96. f. 2. Hab. in cacum. Atlantis. Cal. ciliatus. Cor. alba, obovata.

34. *aspera*, fol. caulinis lanceolatis alternis ciliatis, caulib. procumbentibus. L. Jacq. aust. 5. p. 44. app. t. 31. Hab. in alpib. Petala albiola ungue luteo. ¶

35. *Hirculus*, fol. caulinis lanceolatis alternis nudis incrimibus, caule erecto. L. Flor. dan. t. 200. Gmel. sib. 4. t. 65. f. 3. Hirculus qui Chamæ Cistigenus. Clus. cur. 5. Hab. in alpestribus.

36. *autumnalis*, fol. caulinis linearibus alternis ciliatis; radicalibus aggregatis. L. S. Aizoides. L. Smith. brit. 2. p. 432. Hab. in humentibus Borussiae, Angliæ, Helvetiæ. ¶

37. *rotundifolia*, fol. caulinis reniformibus densis petiolatis, caule paniculato. L. Lapeyr. p. 50. t. 26. Hab. in alpib. et montosis ad latera rivulorum. Flor. inferi.

\*\*\* *Fol. lobatis aut partitis.*

38. *granulata*, fol. caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. L. Flor. dan. t. 514. Hab. in Europæ aprica. Var. flor. plenis, culta. ¶

39. *bulbifera*, fol. palmato-lobatis; caulinis scissilibus, caule ramoso bulbifero. L. Fl. dan. t. 330. Moris. s. 12. t. 9. f. 24. Hab. in Italiæ pratis saxosis, inque Norvegia.

\* *veronicaefolia*, fol. inferioribus subrotulatis cordatis crenatis, petiol. breviusculis dilatatis, caul. scissilib. inciso-dentatis acutis, cauleque simplicissimo subvillosa, flor. 2-4-subcapitatis. Hab. in Hisp. et Helv. Rad. subtuberosa. Veron. arvens. refert.

40. *cernua*, fol. caulinis palmatis petiolatis, caule simplicissimo unifloro bulbifero. Flor. dan. t. 22? Fl. lapp. 172. t. 2. f. 4. Hab. in alpinis Lapponicis.

¶ ? *retusa*, petal. retusis. Smith. Brit. 2. p. 454. Engl. bot. t. 664. An ob petala diversa?

41. *rivularis*, fol. caulinis palmatis; aummo florali ovato, caule simplici subbifloro. L. Flor. dan. t. 118. Hab. ad alplum Lapponicarum latera et rivulos. Parvula. ©

42. *Cymbalaria*, fol. caulinis cordatis trilobis integrisque, caulib. procumbentibus. L. Buxb. cent. 2. p. 40. t. 45. f. 2. Tournef. Cor. 18. t. 32. Hab. in Oriente.

43. *hederacea*, fol. caulinis ovatis lobatis, caule filiformi flaccido. L. Hab. in Creta. ©

44. *orientalis*, fol. subrotundis quinquelobis, caule ramosissimo procumbente. Willd. Jacq. obs. 2. p. 9. t. 34. Habit. in Oriente. An satis distincta a S. hederacea? W.

45. *cuneata*, fol. inferioribus petiolatis cuneiformibus quinquelobis, caulinis sessilibus lanceolatis, caule ascendente paniculato. Willd. p. 658. Cav. ic. 3. p. 25. t. 248. Hab. in Hispania. Petioli longi.

46. *pentadactylis*, fol. quinquelobis: lobis elongatis linearib. obtusis, stylis subnatis. Lapeyr. Fl. p. 64. t. 40. Hab. in Pyrenæis ad saxa umbrosa. Pl. duriuscula.

47. *ladaniflora*, fol. multilobis integris, petiol. compressis amplexicaulis, flor. tubulosis, cal. conicis. Lapeyr. p. 65. S. quinquelobu. Lam. Hab. in Pyrenæis. Tota planta gummi rubescentis aromatico oblecta.

¶ *minor*, fol. omnibus trifidis, scapo nudo simplici, flor. capitatis.

48. *palmata*, fol. palmatis nervis glandulosis, petiol. basi marginatis, flor. tubulosis. Lapeyr. p. 64. t. 41. Cum priorib. ad præcipitia, locis humenibus. Priori affinis sed multo minor. Gland. argenteo-lucifac.

49. *geranioides*, fol. radicalib. reniformibus quinquelobis multifidis, petiol. simplicibus, flor. tubulosis, cal. urceolatis. Lapeyr. p. 66. t. 43. Gouan. obs. t. 18. f. 2. Hab. in alpinis ad saxa humilia, ubi capitem latum efficit.

Obs. Var. scapo simplici nudo, flor. capitatis, et fol. lacissimis, etiam viscosa et odorata ac rigidior occurrit. Lapp.

50. *ajugæfolia*, fol. radicalibus palmato-tri-quinquepartitis, caulinis linearib. indivisis, caulib. adscendentibus multifloris. L. S. scapis lateralibus adscendentib. subbifloris. Lapeyr. p. 56. t. 31. Hab. in Gallinæ provinciae montibus, et in Pyrenæis. Scap. 1-2-nunc. rubescens. Fol. parva, lacin. lanceolata.

51. *sibirica*, fol. reniformibus palmatis pilosis, caule pedunculisque filiformibus. L. Hab. in Sibiria. Flos majusculus, albus, inferus.

52. *petraea*, fol. petiolatis palmato-tripartitis, lacinia subtrifidis, caule flaccido ramosissimo decumbente, pedunc. longissimis unifloris, petalis marginatis. Wulfen in Jacq. Coll. 1. p. 300. Jacq. ic. rar. 1. t. 81. *S. rupestris*. Willd. p. 653. Hab. in Carinthiae alpinis. ☉

53. *Tridactylites (annua)*, fol. canlinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. L. Cur. Lond. 2. t. 28. *S. annua*. Lapeyr. p. 39. Hab. in arenosis ad muros. Primo vere. Quoad loca variat. ☉

54. *adscendens*, caul. erecto firmo foliisque subcoriaceis cuneiformibus, apice tri aut quinquedentatis villosis-viscidis. Wulf. in Jacq. Collect. 1. p. 197. t. 11. et 12. f. 1. 2. Lapeyr. Flor. p. 48. t. 11. *S. petrosa*. Vahl. Willd. p. 64. *S. Scopoli*. Villars pr. Hab. in alpinis. Affinis *S. tridactyliti*, etiam viscida, sed caulis camosissimus. Fol. lata, palmata. Cor. quadruplo majores. C.

55. *aquatica*, fol. palmato-quinque-partitis, lobis multifidis, caul. paniculato, flor. majoribus, pinnil. clavatis. Lapeyr. p. 53. t. 28. *S. adscendens*. Willd. p. 655. *S. petraea*. Gouan. obs. t. 18. f. 3.  $\beta$ . caul. virgato, fol. lobis acutis subpinnatis. L. t. 29. Hab. in alpestribus, in aquis. Caul. succulentus. Planta junior a pastoribus commeditur, etiam a pecoribus appetitur.

*Obs.* Numen a Cl. Lapeyrouse huic speciei inditum, utpote loc. ejus natale optime exprimens, peaececi dñzi, cum plures species sub nomine *S. adscendens* confundi sint.

56. *capitata*, caul. capitato sphaerico, pedunc. lateralibus inferis, fol. pubentibus rosulatis profunde trilobis: lobo intermedio tridentato. Lapeyr. p. 55. t. 30. Hab. in Pyrenaeis, inter carices et juncos, in aquis. Caul. 2-3-unc. longa, adscendens. Pedunc. radicalis sub fol. oriens. L.

57. *pedemontana*, caul. caeco subnudo, fol. trilobis et tridentatis, caulim. palmatis. Allioni. pedem. 1. t. 21. f. 4. Hab. in montibus pedemontanis. Distincta species. Fol. congesta. Petala ovata.

58. *tricuspidata*, fol. radicalibus congestis cuneiformibus ciliatis tricuspidatis, caul. ascendentibus multifloris. Retz. scand. Ed. 2. Floe. dan. t. 976. Hab. in Groenlandia.

59. *leptophylla*, procumbens, glabra, fol. longe petiolatis trifidis quinquedentatis: lacinia linearib. divaricatis. *S. procumbens* et *hypnoides*. Herb. Juss. cfr. Willd. Sp. II. p. 656. n°. 49. Hab. in alpinis. †

60. *Hypnoides (gemmifera)*, cespitosa, caul. erecto subnudo glabro, fol. confertis trifidis, fol. in anteculis, apice in gemmam convoluta villosis. *S. hypnoides*. Lapeyr. p. 57. t. 32. Villars Delph. 3. p. 674. t. 45. Hab. in Pyrenaeis, Delphinatū, et in Mont. aureo.

*Obs.* Linnaeus dicit de sua *S. hypnoides*, quod caul. procumbens et viscidus sit!

61. *globulifera*, caul. bulbifero, fol. nervosis, imis spathulatis integerrimis, superiorib. palmatis 3-5-fidis, caulinis linearib. Desf. atl. 1. p. 341. t. 96. f. 1. Hab. in cacumine A'lanis. Facie *S. Hypnoides*. Caul. basi prostratus. Cor. alba.

62. *decipiens*, fol. pilosis palmatis 5-fidis trifidisque, caul. folioso paniculato, pet. subrotundis. *S. palmata*. Smith. brit. v. p. 456. Engl. bot. t. 455. *S. decipiens*. Ehrh. Hab. in Germaniae et Angliae rupibus subalpinis.

63. *nervosa*, fol. lobatis utrinque nervosis, cal. globosis, cor. patentibus, pist. subulatis. Lapeyr. p. 63. t. 39. *S. exarata*. Vill. Delph. 3. p. 674. t. 45. *S. Hypnoides*. All. pedem. t. 21. f. 4. exclus. synonym. Hab. in alpestrib. inter muscos. Surs. lignosi. Caps. grandia. Nervi in fol. siccis inferiorib. distincti. Var.  $\beta$ . hirsuta.

*Obs.* An a priore satis diversa?

64. *intricata*, fol. rosulatis cuneato-incisis nervosis, surcul. elongatis superioribus intricatis, petal. ovatis, pistil. subulatis. Lapeyr. p. 58. t. 33. Hab. in saxis altis humidis. An prioris var.? sed herbacea. L.

65. *moschata*, fol. radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque una cum caule glutinosis hirsutis (odocetis), florib. longe pedunculatis. Wulf. in Jacq. misc. 2. p. 128. t. 21. f. 21. Hab. in alpinis. Petal. elliptica, cal. longiora. Lapeyr. p. 61.

66. *groenlandica* (latiostigma), fol. imbricatis cuneato-palmatis ciliatis, petal. rotundis, surculo complanatis lanatis Lapeyr. p. 39. t. 19. *S. caespitosa*. Gunn. Norr. t. 7. f. 1. Hab. in alpinis. Pet. majuscula, trinervia, pallida. Styli divaricati.

67. *mixta*, fol. digitatis (trifidis) minutis nervosis subhirsutis, anth. sagittatis, stigm. pileatis reflexis, caul. subviscoso, 2-3-floro. Lap. p. 41. t. 20. *S. caespitosa*. L. All. et Villars.

$\beta$ . *elongata*, major, scapo elongato ramoso, fol. petiolatis multifidis. Flor. dan.

2. *71*. Hab. cum priore. Caul. subrisicosus a-3-florus.

68. *muscoides*, fol. subintegris linearib' carnosis pubescentibus, scapo filiformi subnifloro, petal. cal. subaequantibus. *S. caespitosa*. Lapeyr. p. 59. t. 34. Hall. it. hclv. t. 1. *S. muscoides*. Jacq. misc. 2. p. 123. *S. pyrcnaeica*. Villars. Hab. in alpinis. Flor. citrini. Caul. inferne robiginosus. Var. *β*. *screul. erectis elongatis*, fol. omoibus integris. Lap. t. 34.

*β. integrifolia*, fol. omnibus integris linearibus, surculis erectis elongatis. Lapeyr. t. 34.

*γ. hemisphaerica*, ramis congestis hemisphaericis, fol. brevibus imbricatis. Lapeyr. t. 36.

69. *cymosa*, piloso-viscosa, caul. erecto, fol. ensiformib. 3-5-fidis: canlin. 3-partitis, flor. cymosis, stylo cal. longiore. Plant. rar. honger. *S. caespitosa*. Wull. in Jacq. coll. 1. p. 290. Hall. hist. n<sup>o</sup> 989. Hab. in Hungaria, et Austria, in alpinis. Cor. alba lineata.

*Obs.* *S. pedemontana*. All., quam cl. auctores huc allegant, secundum specimen a D. Balbis Turino benevole missum, quoad folia omnino differt, quae cuneata s. subelliformia.

70. *magellanica*, fol. congestis viscoso-pubescentibus, inferiorib. trifidis superiorib. simplicibus, flor. subbinatis subsessilibus. Hab. ad Fretum magellanicum in alpinis. (Herb. Juss.) Pl. caespitosa. Petal. obovata.

*Obs.* Amplius hoc genus, tamen naturale, si forte excipias *S. crassifoliam* et *sarmentosam*, familiam plantarum, SAXIFRAGAE. Juss., cum quatuor praeclentibus, et duobus sequentibus generibus, nec non cum *Heuchera*, *Adoxa*, *Weinmannia* et *Hortensia*? efficit, quae inter alios characteres, capsula bicornita mox digossel potest.

1112. *TIARELLA*. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala, calyci inserta: petalis integris. Caps. 1-locularis, 2-valvis: valvula altera majore.

1. *cordifolia*, fol. cordatis. L. Lam. ill. t. 351. Hab. in Amer. et Asia septentrionali. Petal. cal. longiora.  $\mathcal{T}$

2. *trifoliata*, fol. ternatis. L. Hab. in Asia boreali.

3. *bitermata*, fol. bitermatis, flor. racemoso-paniculatis. Vent. Malmis. t. 54. Hab. in Amer. septentrionali.

1113. *MITELLA*. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala, calyci inserta: petalis pinatifidis. Caps. 1-locularis, 2-valvis: valvulis aequalibus.

1. *diphylla*, fol. cordatis subtrilob. denticatis, scapo diphylllo. Willd. Sp. II. p. 659. Lam. ill. t. 373. f. 1. Hab. in America septentrionali.  $\mathcal{T}$

2. *cordifolia*, fol. cordatis ciliato-denticatis, scapo nudo. Lam. enc. 4. p. 185. ill. t. 373. f. 3. Michaux Flor. 1. p. 270. Hab. in Canada, circa Quebec.

3. *prostrata*, fol. rotundato-cordatis, caul. prostratis foliosis. Mich. l. c. Hab. in Canad. meridion. Sublobata.

4. *nuda*, fol. reniformibus repandis ciliatis, scapo nudo. Willd. Lam. l. c. ill. t. 373. f. 2. M. petalis fimbriatis. Gmel. sib. 4. p. 175. t. 63. f. 2. Hab. in Asia boreali.  $\mathcal{T}$

1114. *SCLERANTHUS*. Cal. 1-phyllus; cui Stamina inserta. Cor. nulla. Sem. 1-2, calyce inclusa.

1. *annuus*, calycibus fructus patulis. L. Flor. dan. t. 504. Hab. in arvis praesertim calcareis.

2. *perennis*, calycib. fructus clausis obtusis. *β. cocciferus*. Hab. in campis apricis arenosis. Cal. laciniae albido-marginatae.  $\mathcal{T}$

3. *polycarpus*, calycib. fructus patentissimis spinosis, caule sobrioso. L. Col. ecphr. 1. p. 295. t. 294. Hab. Mospellii et in Italia.  $\odot$

*CARTOPHYLLUM*. (Gen. 1115-1122.) Cal. in hac familia valde naturali ut plurimum persistit. Petala ejusdem laciniae alterna, unguiculata, integra aut saepius incisa. Fructus simplex vel capsularis, polyspermus, receptaculo centrali libero distinctus. Caul. plurimum herbaceus, nodosus, stipulaceus aut nudus. Fol. opposita, basi connata, integra. — Genera quaedam naturalia, in aliis speciebus aliquae ob stylosum numerum male dispersae occurrunt.

1115. *Gypsophila*. *Cal.* 1-phyllus, campanulatus, angulatus. *Petala* 5, ovata, sessilia. *Caps.* globosa, 1-locularis, polysperma.

1. *repens*, fol. linearibus, staminibus cor. emarginatis breviorib. L. Jacq. austr. 5. p. 4. t. 407. Lam. ill. t. 375. f. 2. Hab. in Sibiria, Austria, Helvetia, Gall. meridional. Pyrenaeis.  $\overline{\text{T}}$

2. *prostrata*, fol. lanceolatis laevibus, caulib. diffusis, pistillis cor. campanulata longioribus. L. Pluk. alm. 22. t. 75. f. 2. Hab. in alpinis.

3. *paniculata*, fol. linearilanceolatis, inferioribus scabris, staminibus minutis, stylis cor. longioribus. Ait. Kew. 2. p. 83. Jacq. austr. p. 26. t. app. 1. Hab. in Sibiriae, Tatariae desertis sabulosis.

4. *viscosa*, fol. ovato-lanceolatis laevib. basi corollatis amplexicaulibus, internodiis ramorum medio viscosis, petalis retusis. Ait. Kew. 2. p. 85. Murr. comm. goetting. 1783. p. 9. t. 3. Hab. in Oriente.  $\odot$

5. *adscendens*, fol. lanceolato-linearib., caulibus prostratis. cor. staminibus et pistillis ejusdem longitudinis. Jacq. hort. 2. t. 138. Hab. ...

6. *altissima*, fol. lanceolatis subtrinerviis, caul. rectis. L. Gmel. sib. 4. p. 443. t. 60. Boc. mus. 23. t. 5. f. 3. Hab. in Silicia.

7. *compressa*, caul. erecto hinc compresso, fol. subulato-lanceolatis striatis, petalicell. calycibusque pubescentibus. Desf. Atl. 1. p. 343. t. 97. Hab. in Barbar. arvis arenosis. Vere. Petala subtus venis violaceis variegata.

8. *arenaria*, fol. linearibus subcarnosis glabris planis, caule corymboso, petal. integris. Willd. Waldst. et Kituh. pl. rar. Hung. p. 40. t. 41. Hab. in arcuosis Hungariae. Cor. rarissime subemarginata. Cal. nullis squamis tectus. Caps. globosa.

9. *Struthium*, fol. linearibus carnosis axillarib. confertis teretibus. L. Barr. rar. 64. t. 119. Boc. mus. 2. p. t. 122. Hab. in Hispania.  $\overline{\text{T}}$

10. *fastigiata*, fol. lanceolato-linearib. obsolete triquetris laevibus obtusis secundis. L. Gmel. sib. 4. p. 144. t. 61. f. 1. Hab. in Gotlandiae, Borussiae, Helvetiae, Haryanae rupibus.

11. *perfoliata*, fol. ovato-lanceolatis semiamplexicaulibus. L. Dill. elth. 368. t. 276. f. 357.  $\beta$ . tomentosa. L. Barr. ic. t. 1002. Hab. in Hispania et Oriente. Fol. subcarnosa.

12. *muralis (agrestis)*, fol. linearibus planis, calycibus sphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. L. Lam. ill. t. 375. f. 1. Hab. ad vias, muros, et inter stipulas.

13. *rigida*, fol. linearibus planis, caule dichotomo, peduncul. bifloris, petal. emarginatis. L. Hab. Monspelii.

14? *Saxifraga*, fol. linearibus, calycibus angulatis: squamis quatuor, coroll. emarginatis. L. Dianthus Saxifragus. L. Lam. enc. Hab. in Austria, Helvetia, Gallia. Calyx cinctus foliolis 4, tubo dimidio brevioribus.

1116. *Saponaria*. *Cal.* tubulosus, 1-phyllus, nudus. *Petala* 5, unguiculata. *Caps.* oblonga, 1-locularis.

1. *officinalis*, calycib. cylindricis, fol. ovato-lanceolatis. L. Willd. p. 667. Lam. ill. t. 376. Flor. dan. t. 543. Hab. ad vias.

2. *Vaccaria*, calycib. pyramidalis: quinquangularibus, fol. ovatis acuminatis sessilibus. L. Hab. inter segetes. Petal. parva, rubra.  $\odot$

3. *cretica*, calycib. quinquangularibus striatis, caule erecto subdichotomo, foliis subulatis. L. Hab. in Cretae aridis. Petala parva, integra.

4. *porrigens*, calycib. cylindricis pubescentibus, ramis divaricatis, fructub. pendulis. L. Jacq. hort. 2. p. 49. t. 109. Hab. in Oriente.

5. *illyrica*, calycibus subcylindricis, caule erecto viscido purpurascens: ramis alternis, cor. punctatis. L. Ard. spec. 2. p. 24. t. 9. Hab. in Illyria. Viscoso-pubescent. Fol. linearilanceolata. Pet. alba: punctis 3 purpureis.

6. *Ocymoides*, calycib. cylindricis villosis, caulib. dichotomis procumbentibus, fol. ovato-lanceolatis. L. Jacq. austr. 5. p. 39. app. t. 27. Cav. ic. 2. p. 23. t. 134. Hab. in Europ. petrosis, umbrosis, et in Atlante.

7. *orientalis*, calycib. cylindricis villosis, caule dichotomo erecto patulo, fol.

lineari-lanceolatis. Dill. elsh. 205. t. 167. f. 204. Hab. in Oriente, Carniola.

8. *lutea*, calycib. teretib. cauleque hirtis, petal. obovatis integerrimis, flor. corymbosis, fol. lineari-lanceolatis canaliculatis. Smith. spicil. bot. t. 5. Allion. pelem. t. 23. f. 1. Hab. in alpinis. Cor. flava. Stam. violacea.

9. *bellidifolia*, calycib. teretib. hirtis, caule glabro, petal. linearibus crenatis, fol. spathulatis. Smith. l. c. Boer. mus. 2. p. 75. t. 62. f. 1. Hab. in Italiae mont. altissimis. Fol. radicalia Globulariae similima. Stam. flava.  $\overline{\text{U}}$

1116. **DIANTHUS.** *Cal. cylindricus*, longus coriaceus. 1-phyllus: basi squamis 4-8. *Petala* 5, unguiculata. *Caps.* cylindrica, 1-locularis, apice dehiscens.

\* *Florib. aggregatis, quibusdam involucreatis.*

1. *barbatus*, flor. (versicoloribus) aggregatis fasciculatis. squamis calycinis ovato-subulatis tubum aequantibus, fol. lanceolatis. L. Willd. Sp. II. p. 671.  $\beta$ . *angustifolius*, fol. linearibus, flor. majoribus unicoloribus rubris. Hab. in Carniola, Germania.  $\overline{\text{U}}$

2. *carthusianorum*, flor. subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucre oblongo aristato capitulo breviori, fol. linearibus trinerviis. Willd. Hab. in apricis sylvaticis. Sequentes 3 subspecies tantummodo sunt.

\* *collinus*, flor. bifasciculatis, squam. calyc. ovato-subulatis tubo brevioribus, fol. lanceolato-linearibus 5-nerviis scabris. Pl. hongar. p. 36. t. 38. Cresc. in Hongar. collibus et fruticetis.

\* *atro-rubens*, flor. aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucre ovato aristato longitudine capituli, fol. connatis linearibus lanceolatis enerviis. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 467. Segu. veron. 1. p. 434. t. 7. f. 2. Habitat in Italiae et Tauriae aridis apricis. Cor. parva.  $\overline{\text{U}}$

\* *alpestris*, flor. aggregatis subbinis, squam. calycin. 4, duabus interioribus latis, mucronatis, corol. emarginatis. Balbis in Mém. de Turin t. 1. Hab. in pascuis alpinis.

3. *ferrugineus*, flor. aggregatis, petalis bifidis: laciniiis tridentatis. L. Barr. rar. 648.

t. 497. Hab. in Aprutino Italiae. Fl. fasciculati cal. communi scarioso.  $\overline{\text{O}}$

4. *Armeria*, flor. aggregatis fasciculatis squamis calycinis lanceolatis villosis tubum aequantibus. L. Flor. dan. t. 230. Hab. in sterilibus.

5. *japonicus*, flor. aggregatis fasciculatis, squamis calycinis acutis ciliatis tubo brevioribus, fol. ovatis. Thunb. jap. 183. t. 23. Hab. in Japonia.

6. *spinosus*, fruticosus procumbens, fol. rigidis subulatis spinescentibus, flor. capitatis bracteatis. Desf. in annal. de Mus. 1. p. 198. t. 16. f. 1. Hab. in Persia. *Petal. linearia.*

7. *prolifer*, florib. aggregatis capitatis, squam. calycinis ovatis obtusis mucicis tubum superantibus. L. Flor. dan. t. 221. Hab. in collib. et pascuis sterilibus.  $\odot$

\* *Flor. dispersi in caul. ramoso.*

8. *diminutus*, flor. solitariis, squamis calycinis octonis flor. (cor.) superantibus. L. Hab. in Germania, Helvetia et Algeria. Cal. oblongus pallens. Var. praecedentis?

9. *Caryophyllus*, flor. solitariis, squam. calycinis subrhombis brevissimis, petalis crenatis imberbibus, fol. lineari-subulatis canaliculatis glaucis. Smith. in Act. Soc. Lin. 7. p. 299.

10. *sylvestris*, flor. solitariis, squamis calycinis brevissimis ovatis, exterioribus acutis, interioribus obtusissimis, pet. crenatis imberbibus. Willd. p. 675. Wulf. in Jacq. Coll. 1. p. 237. Jacq. ic. rar. 1. t. 82. Segu. veron. t. 7. f. 3. Hab. in Helvetia, Carniola, Carinthia.

11. *fruticosus*, caul. fruticoso, fol. sublinearibus subrhombis brevissimis, petalis pluribus imbricatis. L. Willd. Sp. p. 694. Tournef. II. 1. p. 183. t. 9. Hab. in Graecia. Col. in borsis. Cal. attenuatus.

12. *juniperinus*, caul. fruticoso multifloro, fol. subulatis pungentibus, squamis calycin. subquaternis obovatis mucronatis, tubo duplo brevioribus. Smith. in Act. Lin. 2. p. 303. An versus D. *arboreus*, fol. subulatis. Lin. Sp. pl. p. 550. Cresc. cum priore. Caul. inferne lignosus, tortuosus. Flor. parvuli. D. *arboreus*. Herb. Juss.

13. *pomeridianus*, flor. solitariis, squam. calycinis ovatis acutis brevissimis, tubo apice tantum aristato, petal. emarginatis subnigerrimis. Smith. Act. Soc. Lin. 2. p. 300. Hab. Constantinopoli et in Palaestina. Simil.



D. Caryophyllo. Petala lateribus revoluta. Flos aperitur meridie et clauditur noctis hora decima. L.

24. *procumbens*, squamis calycinis quaternis lanceolatis subpungentibus, patulis tubo brevioribus, caule procumbente dichotomo. Vent. Hort. Cels. p. 39. t. 39. (D. monadelphus.) Hab. in Oriente. Caul. glaucus, fragilis, nonnunquam valde elongatus. Cor. alba, subtus cinerea, margine purpureo-cena.

15. *pungens*, flor. solitariis, caulib. paucifloris, squam. calycinis brevissimis mucronatis patentibus, tubo gibbo, petal. integris. Smith. *β. hispanicus*, squamis calycinis ovatis, petal. linearibus integerrimis. Avo synop. n°. 371. t. 3. Hab. in Hispaniae maritimis.

16. *virginicus*, fol. cespitosus, flor. solitariis, caulib. paucifloris, squam. calycinis brevissimis obtusissimis, binis distantibus, petalis crenatis. Smith. Jacq. aust. 5. p. 34. app. t. 15. D. rupestris. Lin. suppl. 240. Hab. in Gallia, Austria et Siliaria. Cor. rubra.

17. *attenuatus*, flor. solitariis, squam. calycinis brevibus lanceolatis acuminatis subnatis, tubo attenuato, petal. crenatis. Smith. Hab. in maritimis Galliae meridionalis. Caul. diffusi basi tortuosi ramosissimi. Fol. subulata. Flor. carnei, inodori.

18. *furcatus*, caul. bifloro, pedunc. oppositis distantibus, squam. calycin. oppositis subbinis tubo multo brevioribus. Balbis in Mém. de l'acad. de Turin. Hab. ad margines agrorum in montib. prope Tendam. Molinieri. Situ flor. mox distinguitur.

19. *purpureus*, caule subbifloro, florib. solitariis, squam. calycinis latis tubo dimidio brevioribus acutis, petal. integerrimis. Enc. bot. 4. p. 521. Lam. ill. t. 376. f. 2. Habitu recedit. Loc. natal. ignotus. †

20. *ochroleucus*, caule elongato submultifloro gracili, squam. calycin. ovato-lanceolatis ultra ubi dimidium, petal. obovato-linearibus subintegris. Hab. in Oriente. Col. in hort. Cels. Caul. subgeniculatus, fol. brevia, linearis-subulata. Flor. minuti. Cor. albido-pallens.

21. *albens*, flor. solitariis, squam. calycinis lanceolatis quaternis brevibus, cor. emarginatis. Ait. Kew. 2. p. 90. D. florib. solitariis, squam. calycinis quaternis ovatis brevissimis, petal. integris. Thunb. prod. p. 81. 7. Hab. ad Cap. b. spei. Petala albensia, apice utriusque violacea absque circulo pur. urco. †

22. *crenatus*, flor. solitariis, squamis calycinis senis lanceolatis, cor. crenatis. Thunb. prod. 81. Hab. ad Cap. b. spei.

23. *chinensis*, flor. solitariis, squamis calycinis subulatis patulis foliaceis tubum aequantibus, petal. crenatis, fol. lanceolatis. Smith. l. c. Mill. ic. 81. f. 2. Hab. in China. ☉

24. *deltoides*, flor. solitariis, squamis calycinis ovato-lanceolatis acutis subbinis, fol. obtusiusculis subpubescentibus, petalis crenatis. Smith. l. c. Hab. in arenosis sylvaticis.

26. *glaucus*, flor. solitariis squam. calycinis lanceolatis quaternis brevibus, cor. crenatis (albis). L. Hort. cliff. 164. Tunica ramosior, flore candido cum corona purpurea. Dill. elth. 400. t. 298. f. 348. Passim cum priore, cujus var. secundum cl. Smith.

25. *libanotis*, flor. subsolitariis, squam. calycinis senis lanceolatis patulis tubo brevioribus, petalis multifidis barbatis, foliis lanceolatis, caule erecto. Willd. Billard. pl. syriac. 1. p. 14. t. 5. Hab. in altis montib. Libani. †

27. *crinitus*, flor. solitariis, squam. calycinis ovalibus mucronatis subdivergentibus, tubo triplo brevioribus, petalis multifidis imberbibus. Smith. l. c. Hab. in Oriente. Fol. angustissima. Flor. 2-4 in caul. erecto. 5.

28. *monspeliacus*, flor. solitariis, squam. calycinis subulatis rectis tubo paullo brevioribus, cor. multifidis, caul. erecto. Smith. l. c. D. squamis calycinis subulatis longitudine tubi. L. Hab. Monspelii, Veronae. Flor. rubri. †

29. *plumarius*, flor. solitariis, squam. calycinis subovatis brevissimis obtusissimis muticis, cor. multifidis fance pubescentibus. L. Tunica fol. glaucis patentibus, flor. serratis, faucib. lanuginosis. Hall. helv. n°. 897. Hab. in pascuis nemorosis. Fol. rore caesio glauca. L. †

\* *moschatus*, cespitosus, squamis minutis ovatis obtusis, corol. multifidis, foliis filiformibus subulatis. Gmel. S. N. L. II. p. 71 t. Poit. enc. bot. 4. p. 521. Col. praesertim in hortis ad areas ornandas. Flor. vere. Var. prioris?

\* *saxatilis*, cespitosus subdecumbens, caul. bi-trifloro, squamis ovatis mucron longiusculo distinctis tubo brevioribus, pet. multifidis, lauce glabris. Hab. ad rupes, prope Clermont non infrequens. D. *plumarius* quorundam, sed fol. quae linearia

non glauca, cor. fauc. non pubescens, nec squamæ obtusæ.

30. *superbus*, flor. paniculatis subsessatigatis, squam. calycinis brevibus ovatis mucronatis, petal. ultra medium multifloro-capillarib. faecæ pilosis, caul. erecto. Flor. dan. t. 578. Hab. in pratis, sylvaribus. Cal. uno latere purpureo.

\*\*\* *Caul. 1-floro.* (Spec. parvulae subcespitosæ.)

31. *arenarius*, caulib. subunifloris, squam. calycinis ovatis obtusis, cor. multifidis, fol. linearibus. L. Hab. in Europæ frigidioris arena mobili. Pl. dubia. Pet. ultra medium disci divisa, basi macula livida et pilis purpureis, dispersa. L. An sequentes a eadem species?

\* *Pongaricus*. D. *arenarius*, caulib. subunifloris, squam. calycinis brevissimis subrotundis acuminatis; cor. (albis) multifidis, fol. subulatis glaucis ciliatis. Townsend Travels in Hungary. t. 16. Caul. adscendentes, angulati, glauci. Cal. viridis lividusque. T.

\* *gallicus*, caul. unifloro brevissimo, fol. ciliatis imbricatis, squamis cal. ovatis mucronatis, cor. dentato-submultifidis. Hab. in Galliae meridionalis arena mobili, Thore. Petala 5 f. incisa. Cal. squamæ margine tenui cinctæ.

32. *tener*, caul. unifloro, cor. fimbriatis, squam. calycin. tubum subaequantibus, fol. linearib. subulatis. Balbis in Mém. de Turin. t. 3. Hab. ad agrorum margines prope Tundum. Cor. rosea.

33. *serrulatus*, fol. lanceolatis serratis, pedunc. unifloris, squam. imbricatis acutis tubo brevioribus, petal. fimbriatis. Desf. atl. t. p. 346. Hab. in Tuncet arenis. Cal. squamæ 7-8. Cor. duplo minor D. *plumarii*, pallide rosea. D.

34. *pulchellus*, caul. 1-floro, squam. calyc. ovatis mucronatis appressis, cor. crenatis, fol. brevibus plantis lineari-acuminatis. Hab. .... †

Obs. Mihi missus sub nomine D. Plumieri. Forte, uti nonnullæ aliae in hoc genere valde naturalis, cultura a D. coronario ortus. Caul. palmares plures ex cespite, cui subsolitarius. Cal. purpurascens, subiurgidus. Cor. rubella.

35. *repens*, caul. unifloro, squam. calycinis binis ovatis acuminatis patulis longitud. ne fere tubi, petal. dentatis, radice repente. Willd. p. 682. Hab. in Sibiria.

36. *caesius*, caul. subunifloris, squam. calycinis subrotundis brevibus, petal. crenatis pubescentibus, fol. margine scabris. Smith. p. 302. engl. bot. t. 62. Dill. elth. 401. t. 208. t. 385. Hab. in montosis Angliæ, Helvetiæ. Caul. simplices quadranguli. Cal. squamæ tubo triplo breviores.

37. *cespitosus*, caul. unifloris, cor. integris, calycin. squamis quatuor lanceolatis, fol. trigonis. Thunb. prod. 41. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequente. T.

38. *scaber*, caul. unifloris, squam. calycinis quaternis lanceolatis, petal. crenatis. Thunb. prod. 81.

39. *alpinus*, caul. unifloro, petal. crenatis, squam. calycinis exterioribus foliaceis (foliiformibus) tubum æquantibus. Smith. l. c. D. caespitosus. Poir. enc. bot. 4. p. 5252 Jacq. austr. t. 52. Caryophyllus sylvestris 2. Clos. hist. t. p. 283. f. 1. bon. Hab. in alpestribus. Cor. magna, dentib. numerosis crenata, fauce parum villosa.

β. *glacialis*, flor. solitariis subcaulibus, squamis calycinis elongatis acuminatis tubum superantibus, fol. linearibus flore longioribus. Haenke in Jacq. Collect. 2. p. 84. Var. prioris secundum Willd. sed cor. viz prominet. Hab. in Stiria, Austria.

40. *pumilus*, caespitosus acaulis, fol. linearibus. Vahl. symb. t. p. 32. D. uniflorus. Forsk. Hab. in Arabia felici. Flor. sessiles solitarii. Pet. dentata. T.

## TRIGYNIA.

1117. *CUCUBALUS*. Cal. inflatus, aut campanulatus. Petala 5, unguiculata, nudas coronata ad faucem. Caps. 3 locularis.

1. *Behen*, fol. ovatis, caul. dichotomo, calycin. sublobosis reticulato-venosis, caps. trilocularibus, cor. subnudis. L. Flor. dan. t. 914. Engl. bot. t. 204. Hab. in pascuis, ad vias. Fol. subovata glabra aut ciliata. T.

β. *rotundifolius*, fol. rotundiorib. subvillosis aut glabris, flor. purpureiscent. Altoni specim. t. 5. f. 3. γ. *angustifolius*, fol. parvulis ovato-linearibus, flor. albo. In alpinis.

2. *alpinus*, pedunc. erectis unifloris, petal. bipartitis subcoronatis, fol. lanceolatis glaucis laevibus. Lam. enc. 2. p. 220. Hab.

in alpinis. Flor. magni albi. Fol. non ciliata, basi connata.

3. *maritimus*, flor. panicularis erectiusculis, petal. furcatis sub limbo dilatatis, fol. ovali-acuminatis cauleque villosis. Lam. 1. c. Hab. in Galliae meridionalis maritimis. Cal. ovalis albicans, vix venosus. L.

4. *littoralis*, caul. decumbente, fol. lanceolato-linearibus, flor. subsolitariis, calyc. glabris reticulato-venosis, petal. coronatis. Smith. brit. 2. p. 468. *Silene maritima*. Willd. Sp. p. 700. Hab. in maritimis arenosis, etiam ad fluv. alpinos. Styl. in-er-dum 4-5. Sm.

5. *fabarius*, fol. obovatis carnosius. L. Bocc. Mus. t. 92. Hab. in Sicilia ad littora.

6. *spergulifolius*, petal. bifidis, calyc. inflatis striatis glanduloso-scabris, panic. secunda, fol. linearibus, verticillatis. Willd. p. 690. Sub *Silene*. Hab. in Aruncia.

7. *stellatus*, fol. quaternis ovato-lanceolatis, petal. multifidis. L. Mich. Flor. t. p. 271. Hab. N. Anglia et in montib. alleg-haus. Pl. pulcherrima. Cor. patens alba.

8. *bacciferus*, cal. campanulatis, petal. distantibus, ramis divaricatis, fol. ovatis. Mill. ic. t. 112. *Silene baccifera*. W. Hab. in nemorosis. Caps. mollis, nigrescens.

9. *pumilio*, caul. unifloro, cal. ventri-coso campanulato-hirsuto, fol. cespitosius linearilanceolatis. Jacq. austr. 5. app. t. 2. Lam. ill. t. 377. f. 1. Hab. in alpinis.

Obs. Ob calycem turgidum nonnullae *Silenes* huc quoque referri possent; aut duo haec genera naturalia potius coniungenda. Ceteras Cucubali species gal. haud inflato distinctas, affinis specibus in sequente genere appropinquavi.

1118. *SILENE*. Cal. oblongus teres cylindricus aut conicus. Petala 5, unguiculata, nuda, aut coronata ad faucem. Caps. 3-locularis.

\* Flor. spicatis aut racemosis.

1. *anglica*, hirsuta, petal. integerrimis, flor. erectis (glabris?), fructib. reflexis pedunculatis alternis. L. Dill. elth. 417. t. 309. f. 398. Vaill. paris. 12. t. 16. f. 12. Hab. in Anglia, Gallia. Cal. non pilosi, sed angulis muricatis, aculeis reflexis vix conspicuis. L. ☉

2. *lusitanica*, hirsuta, petalis dentatis indivisis, flor. erectis, fructib. divaricato-

reflexis alternis. L. Dill. elth. t. 311. f. 407. Hab. in Lusitania. Cor. crenata, incarnata. L. ☉

3. *quinquevulnera*, hirsuta, petal. integerrimis subrotundis, fructib. erectis alternis. L. Hab. in Europ. australi et Siberia. Petala obtusa, macula atro-purpurea. ☉

4. *ciliata*, petal. bipartitis obtusis, calycib. clavatis pubescentibus, apice ciliatis alternis erectis. Willd. p. 692. Habit. in Creta. Cal. decemstriatus. Pet. bipartita, laciniis obovatis. W. †

5. *nocturna*, florib. spicatis alternis, secundis sessilibus, petalis bifidis. L. ☉? Cucubalus reflexus. L. Dill. elth. t. 310. f. 409. Moris. s. 5. t. 36. f. 7. Hab. in Hispania, Gallia et Pennsylvania. ☉

6. *gallica*, hirsuta, flor. subspicatis alternis secundis, petalis integris fructibus erectis. L. Dill. elth. t. 310. f. 499. Vaill. paris. t. 16. f. 12. Hab. in Helvetia, Gallia. Sequenti similis.

7. *cerastoides*, hirsuta, petal. emarginatis, fructificationibus erectis, calycib. subsessilibus subpilosius. L. Dill. elth. t. 309. f. 307. Hab. in Eur. australi. ☉

8. *mutabilis*, pet. bifidis, calycib. angulatis pedunculatis, fol. lanceolato-linearibus. L. Habit. in Eur. australi. Affinis Cucubalo reflexo. Lin.

9. *chlorantha*, petal. linearibus bifidis, flor. lateralibus secundis cernuis, fol. radicalibus margine scabris. Willd. Ehr. Beitr. 7. p. 145. Dill. elth. t. 316. f. 408. Menz. pug. t. 2. f. 1. Hab. in Germania. †

10. *nutans*, petalis bifidis, florib. lateralibus secundis cernuis, panicula nutante, fol. cespitosius, lanceolatis. L. Flor. dan. t. 242. Engl. bot. t. 465. Hab. in pratis, sylvis. Var. flore rubro.

11. *amoena*, petalis bifidis, coronula subcordata, flor. secunda, pedunc. oppositis trifloris, ramis alternis. L. Hab. in Tataria. Caul. diffus. †

12. *paradoxa*, flor. racemosis, calycib. decem-sulcatis viscidis, flor. aliis staminib. exsertis, aliis inclusis. L. Jacq. hort. vind. 3. t. 84. Smith brit. 2. p. 467. Zanon. hist. t. 109. Hab. in Italia et Anglia. Cor. noctu explicatae et odorate. Petala bifida subcrenata. L. Pet. limbus obcordatus. Sm.

13. *multiflora*, petal. bifidis, caule simplicissimo, corymb. multifloris oppositis, calycib.

calycib. clavatis striatis, fol. scabris, canaliculatis linearibus, radicalibus spathulatis. Willd. p. 687. Plant. rar. hong. p. 55. t. 56. sub Cucub. Ehr. Beytr. 7. p. 149. Hab. in Hungariae pratis. Flor. verticillati racemosi. Cal. scaber. Cor. fauce plerumque nuda. l. c.

14. *altaica*, petalis bifidis revolutis nudis, pedunc. alternis unifloris, fol. linearilanceolatis, caule frutescente. Cucubalus fruticosus. Pall. itin. 2. app. n<sup>o</sup>. 110. t. T. Willd. p. 687. sub *Cucubalo*. Hab. in montib. Altaicis Sibiriae. h

15. *caspica*, caul. basi lignescentibus, fol. spathulato-lanceolatis, calyc. cylindricis 10-striatis, petal. bipartito basi utrinque unidentato. S. fruticosus. Bieberst. Tabl. cauc. n<sup>o</sup>. 17. Hab. passim in collib. aridis inter Kuban et Schamachiam. Aest. h

Obs. Habitu praecedentis s. Cucub. fruticosi Pall., sed laux coronata. Flor. ex dichotomia caulis. B. h

16. *viscosa*, flor. lateralibus undique decumbentibus, caule indiviso, fol. basi reflexis. L. sub Cucub. Tournef. it. p. 361. Hab. in Eur. australiori et Oriente. ♂

17. *tatarica*, petal. bipartitis, flor. secundis decumbentibus, pedunc. oppositis solitariis erectis, caule simplicissimum spicato. L. sub *Cucubalo*. Hab. in Tartaria, Russia. T

18. *Royeni*, racemo verticillato, pedunc. oppositis brevissimis multifloris, petal. bifidis, fol. ovato-lanceolatis subundulatis. Bucherstein. l. c. n<sup>o</sup>. 16. Royen. ygdb. p. 448. (a Linnæo cum? ad priorem allegatum.) Hab. in planit. Kumukorum. Major. ♂ †

19. *sibirica*, petal. emarginatis subverticillatis linearibus, flor. verticillis umbellatis aphyllis. L. sub *Cucubalo*. Viscago fol. imis petiolatis ovatis. Hall. goett. 1. p. 150. ic. Hab. in desertis Tacorow. Flor. parvi. Petal. obcordata.

20. *Orites*, petal. linearib. indivisis undulatis glabris, flor. verticillato-capitatis dioicis, pedunc. glabris, caule nudo. Willd. p. 688. Flor. dan. t. 518. sub *Cucubalo*. Hab. in arenosis. Flor. parvi.

21. *parviflora*, petal. linearib. indivisis ciliatis flor. dioicis, pedunc. pubescentibus, caule paniculato. Willd. Ehrh. Beytr. 7. p. 143. sub *Cucubalo*. Hab. in Hungaria. Priori affinis.

22. *imbricata*, caul. inferne piloso, fol. lanceolatis, flor. sessilib. secundis strictis

imbricatis longe racemosis. Desf. p. 349. t. 98. Hab. in arvis prope Mascar. Petal. alba, bifida. ♂

23. *hispida*, flor. racemosis confertis secundis, cal. hirsutissimis, petal. bifidis, caul. subsimplice. Desf. atl. 1. p. 348. Hab. in Atlante. ♂

24. *tridentata*, hirsuta, fol. angustolanceolatis, flor. racemosis distinctis sessilibus, cal. dentib. subulatis, caps. acuminatis erectis. Desf. l. c. Clus. hist. aco. ic. Hab. in Algeriae arvis, et in Hispania prope Aranguet. Thibaut. Petal. rosea, plerumque tridentata. ♂

\* \* Caul. paniculato-dichotomo, flor. in pluribus ex dichotomia.

25. *fruticosa*, petal. bifidis, caule fruticoso, fol. lato-lanceolatis, panic. trichotoma. L. Com. hort. t. 33. Hab. in Sicilia. Fol. mollia. h

26. *bupleuroides*, caul. virgato, petal. bifidis, flor. pedunculatis oppositis bractea brevioribus, fol. lanceolatis acutis glabris. L. Desf. atl. 1. p. 351. Hab. in Persia et Atlante. Pct. inferne pallide violacea. ♂

27. *longiflora*, petal. bifidis, florib. paniculatis erectis, pedunc. oppositis bractea longioribus, calycib. longissimis glabris. Willd. Ehr. Beytr. 7. p. 144. S. juncea. Roth. catal. 1. p. 51. Cum priore saepe confunditur. Hab. in Hungaria. T

28. *longipetala*, fol. lanceolatis scaberrimis, pedunc. elongatis dichotomis, petalis bifidis recurviflexis. Vent. Hort. Cels. p. 81. t. 83. Hab. circa Alepp. Cor. albidolivida. ♂

29. *gigantea*, petal. bifidis, fol. radicalibus cochleariformibus obtusissimis, flor. subverticillatis. L. Walth. hort. 32. t. 11. Hab. in Africa. Fol. carnea, pubescentia. Cal. pubescentes. Cor. virides coronula obsoleta. Flor. noctu explicati. L. ♂

30. *crassifolia*, petal. emarginatis, fol. suborbiculatis carnotis hirsutis, racemo secundis. L. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. firmus, hirsutus. ♂

31. *scabridiflora*, petal. semibifidis, fol. ovatis scaberrimis acutis, panic. elongata subaphylla. L. Hern. parad. 199. t. 155. Hab. in Lushania. Panicul. brachiata pedunculis dichotomis, paucifloris. ♂

32. *reticulata*, glabra viscosa, fol. angustolanceolatis, caul. dichotomo, pedunc.

43. *subtrifloris*, cal. clavato (venis purpurascens), reticulato, petal. linearib. emarginatis. Desf. atl. 1. p. 350. t. 99. Hab. in Algeria. Cor. parva, rosea.

33. *picta*, glabra, caule dichotomo; fol. linearibus, caulim. subtactis, cal. clavato petalisque venosis nervisque rubris reticulatis. S. bicolor. Thore. Hab. prope Dax (dépt. des Landes) Nunc in hort. colitur. Spec. elegans, priori similis.

34. *rugosa*, caul. dichotomo, fol. linearilanceolatis, cal. clavati nervis crenato-rugosis subasperis. Hab. .... Herb. Juss. Facie 2-antecedentium, sed cal. a cacteris mox distinguitur.

35. *glutinosa*, petal. bipartitis, paniculotoma patentissima viscosa, fol. ovatis. Cucub. glutinosus. Retz. C. catholicus. Lin. Jacq. hort. t. 59. Hab. in Italia, Sicilia.

36. *mollissima*, petal. semibifidis, paniculotoma, caul. foliisque holosericeis: radicalibus spatulatis. L. sub *Cucubalo*. Hab. in Italiae mariuinis. An cal. inflatus?

37. *italicus*, laevis pubescens, petal. semibifidis, cal. clavatus, panic. dichotoma: ramis longis patentibus, flor. erectis, fol. lanceolatis. Willd. Sp. II. p. 686. Jacq. obs. 4. t. 79. Sub *Cucubalo*. Hab. in Italia.

38. *nicaeensis*, villosa-viscosa, fol. linearib. obtusis, petal. semibifidis, fruct. ovatis. Allion. pelem. 2. p. 81. t. 44. f. 2. Hab. in agro Nicaeensi. Cal. 10-striatus.

39. *conidea*, calycib. fructus globosis acuminatis striatis, fol. glabris, petal. integris. L. Lychnis, flore amplo rubello. Moris. s. 5. t. 36. f. 6. Hab. inter segetes Eur. australior. ☉

40. *conica*, calycib. fructus conicis striatis, fol. moll. h. lanceol. petalis bifidis. L. Jacq. austr. t. 253. Moris. l. c. t. 91. f. 33. Hab. in agris sylvaticis. Flor. parvi rubri. Cal. striae 30. Caps. lagenaria. ☉

41. *bellidifolia*, calycib. fructus ovatis villosis, fol. lanceolatis pilosis subasperis, petal. bifidis. Murr. syn. veg. Jacq. hort. 3. t. 81. Hab. .... Racem. geminati. ☉

42. *dichotoma*, calycib. ovatis viscosopilosis erectis, petal. bifidis, racem. geminatis terminalibus secundis, flore intermedio pedunculato, fol. petiolatis ovato-lanceolatis, basi ciliatis. Willd. p. 699. Plant. rar. hong. p. 28. t. 29. Ehr. Beytr. 7. p. 144. Hab. in Hungaria, non procul a Buda, in agris. Fl. albi subcrenati. ☉

43. *vespertina*, petal. bifidis, nectario connato, flor. alternis, cal. clavato pubescente. Retz. obs. 3. p. 31. Willd. p. 699. Hab. .... ☉

44? *Behen*, calyc. glabris ovatis venosoreticulatis, caps. trilobularibus. L. Hab. in Creta. Differt a Cucub. Behen corona corollae, cor. purpurascens. L.

Obs. An cum tribus sequentibus ob calycem ad Cucubalos potius referenda?

45. *stricta*, petal. emarginatis, calycib. glabris reticulato-venosis acuminatis pedunculo longioribus, caule dichotomo stricto. L. Ameron. acad. r. p. 158. Hab. in Hispania et Tolosae.

46. *pendula*, calycib. fructiferis pediculis inflatis, angulis decem scabris. Hort. ups. 109. Hab. in Creta et Sicilia.

47. *procumbens*, calycib. ovatis inflatis erectis obsoleto de: emangularib. petal. auriculat. bifidis, caul. procumbente. Morr. comm. goett. 1784 et 1785. p. 83. t. 2. Roth. catal. 1-p. 55. Hab. in Sibiria. ☉

48. *noctiflora*, calycib. de: emangularib. venosis, dentib. tubum aequantibus, caule dichotomo, pet. bifidis. L. Lam. ill. t. 319. f. 2. Engl. bot. t. 291. Hab. in sylvaticis arvis. Lychn. dioicae similis. Flor. paullo majores.

49. *ornata*, calycib. fructus oblongis carinatis pilosis, petal. bifidis, fol. lanceolatis pubescentibus viscosis planis, caul. viscido. Ait. Kew. s. p. 96. Cort. mag. t. 382. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. sanguinea. ☉

50. *undulata*, calycib. fructus clavato-cylindricis pilosis, petal. bifidis, fol. lanceolatis pubescentibus undulatis, caule ascendente. Ait. l. c. Cum priore.

51. *laciniosa*, fol. lanceolatis sessilibus, petal. quadrifidis, caps. unilobularib. Cor. ic. 6. p. 44. t. 563. Hab. in Amer. meridion. Cal. tubulosus villosus, 10-striatus, Cor. cocineae.

52. *virginica*, procumbens viscosopilosus, fol. oblongis margine subasperis, panic. dichotoma, petal. bifidis, genitalib. exsertis. Michaux. Flor. 1. p. 278. Hab. in regione Illinoensi. Cor. rubra.

Obs. Var. fol. lato-ovalibus, etiam caul. erecto, flor. subfasciculatis. M.

53. *pensylvanica*, humilis, viscidopilosus, fol. cuneatis, caulim. lanceolatis, petalis leviter emarginatis subcrenatis. Mich.

in Pennsylvania. Caul. subsimplex. Petal. purpurascens.

54. *antirrhina*, fol. lanceolatis subciliatis, pedunc. trifloris, petalis emarginatis, calycib. ovatis. L. Dill. elth. t. 313. f. 403. Hab. in Virginia, Carolina. ☉

55. *rubella*, erecta laevis, calycib. subglobosis glabris venosis, cor. inapertis. L. Dill. elth. t. 314. f. 406. ♂ ? S. annulata. Thore. Hab. in Lusitania, Oriente. ☉

56. *sedoides*, glanduloso-pilosa, calycib. clavatis, petal. emarginatis, fol. oblongo-obovatis subcarnosis. Willd. Jacq. collect. suppl. sta. t. 24. f. 1. Hab. in Creta. ☉

57. *apetala*, calycib. ovatis pubescentibus, flor. apetalis, fol. lanceolatis pubescentibus. Willd. p. 703. Hab. . . . Cal. oblongo-ovatus decemstriatus.

58. *clandestina*, calycib. ovatis decemangulatis pubescentibus, petal. bifidis erectis cal. paulo longioribus, fol. oblongo-lanceolatis ciliatis. Willd. Jacq. coll. suppl. 1111. t. 3. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Similis S. apetalae.

59. *inaperta*, caule dichotomo paniculato, calycib. laevibus, petal. brevissimis emarginatis, fol. glabris lanceolatis. L. Dill. elth. t. 315. f. 407. Hab. in Eur. australi. Stam. saepe 5.

60. *portensis*, caule dichotomo paniculato, calycib. striatis, petal. bifidis, fol. linearib. L. Hab. in Lusitania. Habitus S. inapertae. Pl. spinhamaea, brachiata. Cal. clavati, purpurascens. L.

61. *cretica*, erecta laevis, calycib. erectis decemangulatis, petal. bifidis. L. Viscago fol. inferiorib. bellidis, superiorib. tunicae. Dill. elth. 422. t. 114. f. 403, 405. Hab. in Creta. Caulis patens, filiformis, articulis viscidis. Flor. amoene purpurei. L.

62. *bipartita*, fol. inferioribus spathulatis, flor. racemosis secundis nutantibus, petal. bipartitis. Desf. atl. t. p. 352. t. 100. Cresc. in arvis Shibar. Caul. pubescens. Pet. rosea. ☉

63. *ramosissima*, pubesc. viscosa, fol. angusto-lanceolatis, pedunc. 1-3-floris, cal. ovatis, petal. bifidis, caps. intra cal. subsessilibus. De f. p. 354. Hab. ad maris litora. Petal. alba. Flor. numerosi. D. ☐

64. *arenaria*, villosa-viscosa, fol. linearilanceolatis obtusiusculis, flor. laxo racemosis, petal. bifidis, caps. intra cal. pedi-

cellatis. Desf. l. c. Cum priore in arenis. cui affinis. Flor. pauciores. ☐

65. *arenarioides*, pubescens, fol. angusto-linearibus, pedunc. 2-3-floris, cal. 10-striatis villosis, petal. bifidis, caps. virentibus pellicellatis. Desf. l. c. p. 355. Hab. in Barbariae arvis. Cal. purpurascens.

66. *cinerea*, fol. inferioribus ovatis, flor. racemosis subsessilib. solitariis 2-ternis, cal. pubescente 10-striato, petalis bifidis. Desf. l. c. In Algeriae arvis. S. nocturnam refert. Pet. lacin. angustae. Flor. in bifurcatione solitarius.

67. *patula*, viscosa, ramis paniculato-patentibus, fol. inferiorib. longe petiolatis ovatis acuminatis, pedunc. subtrifloris, cal. elongato, petal. semibifidis. Desf. p. 356. Hab. in Barbar. arvis. Cor. alba magnit. L. dioicae. L. Fol. pubescentia. Flor. circa vespem odorati. ☐

68. *Muscipula*, petal. bifidis, caul. dichotomo, flor. axillaribus sessilib. fol. glabris. L. Hab. in Hispania, G. Narbonensi, et Algeria. Viscosa.

69. *polyphylla*, fol. fasciculatis setaceis, ramorum florentium oppositis. L. Willd. Delph. 3. p. 609. Hab. in Fannonia, Austria. Bohemia, et Delphinatu. Rami multiflori, subdecumb. ☐

\*\*\* Flor. terminalibus fastigiatis, passim subsolitariis.

70. *Armeria*, flor. fasciculatis fastigiatis, fol. superioribus cordatis glabris, petalis integris. L. Flor. dan. t. 559. Hab. in apricis.

71. *Atocion*, petal. bilobis, basi utrinque dentatis, fol. laevibus, inferiorib. subrotundo-spathulatis, petiolis ciliatis. Ait. Kew. 2. p. 98. S. *orchidea*. Lin. suppl. 231. S. *Atocion*, cal. fructigeris clavatis, petalis sensibilibus, fasciculo flor. terminali dichotomo, fol. obovatis. Syst. vrg. Jacq. hort. 3. p. 19. t. 32. Hab. in Oriente. Plant. pulchella. Cor. faux tantum prominet, nec corunula instructa.

72. *Pseudo-atocion*, flor. fasciculatis terminalibus, cal. clavatis, petal. linearib. integerrimis, fol. imis obovatis. Desf. atl. t. p. 353. Hab. in Atlantide. Facies prioris, an ejus varietas? D. ☉

73. *aegyptiaca*, petalis emarginatis utrinque dentatis, fol. subtomentosis crassiusculis obovatis. Lin. suppl. p. 241. Hab. in Aegypto. Caul. brachylatus. Cal. clavatus. Petala incarnata cal. breviora. ☉

β ? *retroflexa*, Cucul. *aegyptiacus*, flor. erectis, petal. emarginatis retroflexis, utrinque denticulo notatis. L. Willd. p. 686. Fol. linearia. Cal. cylindricus, cor. aequans. L. †

74. *Catesbaei*, flor. magnis purpureo-rubris, petal. lacinatis, calycib. cylindricis, panic. subtrichotoma, fol. laevib. lato-lanceolatis. Walt. carol. 141. Catesb. carol. 2. p. 54. t. 54. Hab. in Carolina. Pet. utrinque ad lacus dente instructa. †

75. *cordifolia*, caul. simplici, fol. ovatis acutis, flor. subsessilibus terminalibus, pet. semibifidis. Allion. pedem. n°. 1581. t. 23. f. 3. Hab. in axosis Pedemontani et Nicuensis comitatus. †

76. *chloraeifolia*, calycib. glabris clavatis, petal. semibifidis, fol. glaucis, inferioribus ovalibus superioribus cordatis amplexicaulibus. Smith. ic. ined. 1. p. 13. t. 13. Hab. in Armenia. Fol. Lysim. nummul. Caul. subdichotomus. Cal. clavatus. †

77. *alpestris*, petal. quadridentatis, caul. dichotomo, capsul. ovato-oblongis, fol. lineari-lanceolatis glabris erectis, peduncul. viscidis. Ait. Kew. 2. p. 98. Jacq. auste. 1. t. 96. Lychnis alpestris, pet. quadrifidis coronatis, fol. recurvis. Lin. suppl. 244. Hab. in Austriae alpinis. †

78. *quadridentata*, petal. quadridentatis (3-4-lobis), caul. dichotomo, fol. linearib. recurvis. L. Syst. veg. sub Lychn. Jacq. austr. t. 120. Seg. suppl. t. 5. f. 1. Hab. in alpin. Fol. margine sparsim pilosa. Styl. 4-5.

79. *rupestris*, caul. dichotomo multifloro, flor. erectis, petal. emarginatis, calycib. teretibus, fol. lanceolatis. L. Flor. dan. t. 4. Hab. in montibus, ad saxa. Gypsophylam ceteri. †

80. *polygonoides*, petal. emarginatis, cal. cylindrico 5-gono piloso, flor. capitatis, fol. ellipticis utrinque acutis. Willd. l. c. Lychnis flore albo cum cicculo purpureo. Tournef. cor. 24. Hab. in ins. Naxo. Caul. decumbens. Fol. secpilli. W.

81. *dianthoides*, petal. bifidis nudis, calycib. striatis terminalibus subsessilibus; lateralibus pedunculatis. Cucub. Saxifragus. Lin. Willd. p. 689. Schreb. Dec. p. t. 5. Hab. in Oriente. Cal. inter a lobiola sessilis, fere ut in Diantho. L.

82. *Saxifraga*, caulib. subnifloris, pedunc. longitudine caulis, fol. glabris, flor. hermaphroditis femineisque, petal. bifidis.

L. Jacq. coll. 2. p. 37. Segu. ver. t. 6. f. 1. Hab. in montib. cretaceis. Cal. clavatus.

83. *Campanula*, caul. erecto gracili 2-3-floro, flor. subcervuti, petal. nudis, cal. infundibuliformi. Cucub. *alpestris*. Allioni, sub quo nomine benevole missa a cl. Balbis. Priori affinis. Caul. spitham. longus, subuliformis. Fol. linearia.

84. *repens*, rad. longo serpente, caule simplice adscendente, cal. villosa, fol. linearibus. Hab. in Siberia prope lacum Baikal. Post meridiem flor. dormiunt, cor. involutis. Patrín.

85. *sericea*, flor. terminalib. subsolitariis peduncul. caul. basi ramoso, foliisque lineari-lanceolatis sericeis. S. *sericea*, fol. acuminatis succulentis hirsutis lucidis, flor. carneo. Allioni Pedem. n°. 1573. t. 79. f. 1. Hab. in maritimis sabulosis pedemontanis. Sequentem refert. Cal. clavatus, striatos.

86. *valleria*, caulib. subnifloris decumbentibus, fol. lanceolatis tomentosis longitudine calycis. L. Allion. pedem. n°. 1524. t. 23. f. 2. Lychnis pumila saxatilis alpina, flore carneo, fol. caesp. mol. i. tomentosa. Amoen. acad. 4. p. 158. Boeck. mus. 65. t. 54. Hab. in alpinis Vallensiacis, Valdensibus. Cal. clavatus striis 10 elevatis.

87. *aeonlis*, caespitosa aconitis depressa, peduncul. elongatis nudis, petal. emarginatis. L. Flor. dan. t. 21. Allion. pedem. n°. 1581. t. 79. f. 1. Habit. in alpinis. Fol. caespitosa, graminea. Alpinum ornamentum. Fruct. oblongus. A.

\* *norwegica*, fol. linearib. magis sparsis, caul. subfolioso. Hab. in Norwegia. Vahl. S. caulem nonnihil refert, acd. caul. 4. pedunc. 2-phyllus. Var. ?

88. *exscapa*, caespitosa, flore sessili, fructibus subrotundis. Allion. pedem. 1584. t. 79. f. 2. Hab. in alpinis lapponicis, austriacis, pedemontanis, helveticis. Priori valde affinis. Fol. graminea.

1119. **STELLARIA**, Cal. 5-phyllus, patens, Petala 5, bipartita. Caps. ovata, 1-locularis, polysperma, apice 6-dentata.

1. *memorum*, fol. cordatis petiolatis, panicula dichotoma. L. Flor. dan. t. 271. Engl. bot. t. 92. St. cordata. Syst. veg. XV. p. 454. Hab. in nemoribus montosis. †

2. *aquatica*, caul. diffuso, fol. cordatis flor. solitariis 4-5-gynis, fruct. pseudis

*Cerastium aquaticum*. L. Curt. t. 34. Engl. bot. t. 538. Hab. in aquosis, fossis. Priori speciei nimis affinis, ut genere illiungi possit.

3. *latifolia*, fol. inferiorib. petiolatis subcordatis, caulinis ovatis subsessilib. caul. simpliciter dichotomo, pedunc. fructiferis reflexis. St. *Cerastium*. Syn. veg. ed. XV. in nota p. 457. Hab. in Germaniae sylvaticis montosis. St. *dichotoma* quorumd.

4. *ciliata*, fol. (parvulis) cordatis acutis subpetiolatis, petiol. ciliatis. Vahl. in Herb. Juss. Hab. in Pers. Caul. ramosus diffusus?

5. *dichotoma*, fol. cordato-ovatis sessilib. (subamplexicaulibus), caule dichotomo, flor. solitariis, pedunc. fructiferis reflexis. L. Smith. ic. ined. t. p. 14. t. 14. Hab. in alpinis Sibiricis. Fol. subciliata, cordata.

6. *pubera*, pubens, fol. sessilib. ovatis ciliatis, pedicellis erectis breviuscul. petal. cal. longioribus. Michaux. Flor. t. p. 273. Hab. in montibus sylvat. Carol. septentr. Cal. lacin. ovatae.

7. *radians*, fol. lanceolatis serrulatis, petalis quinquepartitis. L. Anom. ruth. 83. t. 10. Fol. subovato-lanceolata, sessilia, pubescentia, non manifeste serrata. Ex herb. Juss. Hab. in Sibiriae uliginosis.

8. *bulbosa*, fol. ovato-lanceolatis subtus arenis, caule subramoso, pedunc. unifloro, radice filiformi repente bulbifera. Willd. Wulf. in Jacq. collect. 3. p. 21. Jacq. ic. rar. 3. t. 468. Hab. in alpb. Carinthiae, locis umbrosis humidis. Simill. Trientali europaeae. ☞

9. *Holosteia*, fol. lanceolatis serrulatis, petalis bifidis. L. Fl. dan. t. 698. Engl. bot. t. 54. Hab. in Europae nemoribus. Cal. nervius. Fl. Majo. ☞

10. *graminea*, caul. diffusis, fol. linearibus integerrimis, flor. paniculatis divaricatis, petal. calycis longitudine. Willd. Fl. dan. t. 414. et 415. S. arvensis. Hoffm. S. Dilleniana. Moench. Hab. in agris, ad sepes. Aestate.

11. *palustris*, fol. lineari-lanceolatis integerrimis glaucis, flor. paniculatis, petalis bipartitis calyce majoribus. Retz. Fl. scand. ed. 2. n. 548. S. glauca. Smith. brit. 2. p. 476. Hab. in paludibus. Cal. trinervi. ☞

12. *crassifolia*, fol. oblongo-lanceolatis crassiusculis glaucis, pedunc. unifloris solitariis axillaribus, petal. calyce majoribus, caul. erecto. Willd. p. 712. Ehrh. Beytz. 3.

p. 60. Hab. in pratis humidis. Fol. subundulatis.

\* 13. *brevifolia*, fol. lanceolatis, pedunc. axillaribus axillaribus fol. longioribus, petal. ultra medium bifidis cal. subaequantibus. Schum. Flor. Zealand. p. 142. Flor. dan. t. 415. Hab. in maritimis. Fol. non 3-linearia.

13. *Alsine*, fol. oblongo-lanceolatis, pedunculis subgeminatis uni-multiflorisve, petalis calyce brevioribus, caule decumbente. A. *uliginosa*, Roth. germ. II. p. 489. S. *Alsine*. Hoffm. Willd. p. 113.

14. *hypericifolia*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis. Allion. Hab. in paludibus, ad rivulos.

14. *undulata*, fol. oblongis undulatis, caule angulato, flor. axillaribus. Thunb. Jap. 185. Ej. ic. pl. Jap. fasc. 3. Hab. in Japonia juxta vias. Caul. decumbens herbaceus.

15. *cerastoides*, fol. oblongis pubescentibus, caule decumbente, pedunc. unifloris geminatis erectis, petalis calyce majoribus. Willd. p. 714. Flor. dan. t. 92. Smith. ic. ined. t. p. 15. t. 15. Jacq. coll. t. 1. 11. *trigynum*. Vill. delph. 3. p. 645. t. 46. Cer. Hab. in alpb. Petiol. tufrecti. Hall. Var. styl. 4-5.

16. *multicaulis*, fol. lanceolatis glabris, simplicissimis, pedunculo subsolitario terminali, petal. calyce majoribus. Willd. S. *cerastoides*. Wulf. in Jacq. Collect. t. p. 254. t. 19. Hab. in alpbis Carinthiae. ☞

17. *humifusa*, fol. ovatis subsecundis sessilib. caul. procumbentibus tetragonis, pedunculis solitariis abbreviatis. Swartz. in N. Act. holm. 1789. p. 111. t. 4 f. 1. Fl. dan. t. 978. Hab. in alpbis Succiae, Norvegiae. ☉

18. *biflora*, fol. subulatis, ramis bipartitis, petalis emarginatis, calycib. striatis. Swartz. l. c. 1788. p. 36. t. 1. f. 1. Willd. p. 715. Fl. dan. t. 12. Hab. in alpbis Lapponicis. Foliae Saginae. Caul. digitales, filiformes.

Obs. Fatale laeviter tantum emarginata, itaque Arenaria proxima, magnitudine calycis. Willd.

19. *groenlandica*, caul. decumbentibus subbifloris, fol. linearibus basi subciliatis, petal. emarginatis, fructib. globosis. Retz. scand. ed. 2. n. 552. Hab. in Groenlandia. Pollicaris. Fol. subcarnosa. Flor. magni, vix emarginata.



20. *Arenaria*, fol. spatulatis, caule erecto bifido viscoso, ramis alternis, petal. emarginatis. L. Hab. in Hispania. Cerastium refert. Cal. subtrigonus. Rami alterni, divaricati, longitudine fere caulis. Cor. campanulata. L.

21. *scapigera*, acaulis, fol. lineari-lanceolatis triaerviis, pedunculis radicalibus unifloris. Willd. p. 716. Hab. .... Flor. magnitudine st. gramineae. W. +

1120. **ARENARIA.** Cal. 5-phyllus, patens. Petala 5, integra. Caps. 1-locularis, polysperma.

\* *Fol. ovatis.*

v. *pepoides*, fol. ovatis acutis carnosae. L. Honkenya peploides, Ehrh. Beytr. 2. p. 181. Hab. ad littora maris. Glandulae in receptaculo. Anq. diversum genus? T

2. *tetraquetra*, fol. ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis, flor. subcapitatis. L. Allion. pedem. t. 89. f. 1.  $\beta$ . Gypsophila aggregata. L. Sp. pl. 2. p. 581. Hab. in Pyrenaea, Montpellii et Turini.

3. *biflora*, fol. obovatis obtusis, caulib. procumbentibus, pedunc. bifloris lateralib. L. Allion. pel. t. 44. f. 1. et t. 64. f. 3. Jacq. ic. rar. 1. t. 89. Hab. in Eur. australis alpinis. T

4. *lateriflora*, fol. ovatis obtusis, pedunculo laterali bifloro. L. Hab. in Sibiria. Caul. filiformis, simplicissimus.

5. *trinervis*, fol. ovatis acutis petiolatis nervosis. L. Flor. dan. t. 429. Hab. in sylvis, etiam super salices.

6. *ciliata*, fol. oblongo-obovatis subpetiolatis ciliatis, cor. calyce majoribus, cal. foliol. lanceolatis subnervosis. Wulf. Jacq. Coll. 1. p. 245. t. 16. f. 2. Flor. dan. t. 346. Hab. in alpinis. Fol. tuberculis aspera.

7. *balearica*, caespitosa repens, fol. ovatis lucidis subcarnosis, caule repente, pedunculis elongatis unifloris. L. L'Herit. stirp. t. 1. p. 29. t. 15. A. muscosa. Medic. Hab. in insul. Balearibus. Plantula elegans, caespitem latum efficiens.

8. *multicaulis*, fol. pulposo-subcoriaceis ovato-lanceolatis sessilibus ciliatis, cor. calyce majoribus, cal. foliol. ovato-lanceolatis subnervosis. Jacq. Collect. 1. p. 248. t. 17. f. 1. Hall. t. 17. Hab. in alpinis.

9. *serpillifolia*, fol. subovatis acutis sessilibus laevibus, cor. calyce brevioribus. L. Hab. in sylvis glaucosis, agris.

10. *ruscifolia*, fol. (minimis) coriaceis ovatis acuminatis, flor. subpaniculatis dichotomis, cal. subcampanulatis, acutis, petal. cal. longioribus. Poir. enc. p. 365. Hab. .... Quoad fol. A. serpillifoliae similis.

11. *spathulata*, caul. erecto filiformi pubescente, fol. inferioribus spatulatis, petal. obovatis cal. longioribus. Desf. atl. 1. p. 358. A. *cerastioides*. Poir. enc. 6. p. 363. Hab. in Barbariae arenosis et sylvaticis. Caul. et pedunc. viscosi. Flor. axillares subpaniculati.

\* \* *Fol. linearibus.*

12. *procumbens*, fol. lineari-lanceolatis, caulib. prostratis villosis, petal. calyce subbrevioribus. Vahl. symb. 2. p. 50. t. 33. A. geniculata, fol. linearibus, flor. paniculatis pubescentibus, petal. calyce brevioribus. Poir. A. *herniariaefolia*. Desf. atl. p. 359. Hab. in ruderalis Tunceti inque Aegyptio.

13. *polygonoides*, fol. linearibus, caulib. procumbentibus, pedunc. bifloris terminalibus erectis, calyce subviscidis nervosis. Wulf. in Jacq. Collect. 1. p. 241. t. 15. Segn. veron. 3. p. 177. t. 4. f. 1. Hab. in alpinis Helvetiae, Carinthiae. ©

14. *cerastoides*, caul. bifloro, fol. breviusculis subovatis glabris acuminatis, cal. ovato-lanceolatis, petal. ellipticis brevioribus. Hab. in Pyrenaea. Mirb. Caespitosa, parvula. Cal. facin. subalbo-marginatis glabris.

15. *Villarsii*, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus subrigidis, caul. erecto trifloro. Balbis Miscell. bot. p. 21. A. *triflora*. Vill. Delph. 3. p. 643. t. 47. Hab. in Delphinatu et in alpinis, valis Pini et Tendae. Molineri. An potius Stellariae species? cujus habitus est. Petal. emarginata?

16. *montana*, fol. lineari-lanceolatis, caulib. sterilibus longissimis procumbentibus. L. Vent. Hort. Cels. t. 34.  $\beta$ ? A. *linearifolia*. Poir. enc. 6. p. 366. Hab. in Europ. australiori montibus. Stellar. aut Cerast. refert. T

17. *calycina*, glaberrima, fol. gramineis brevibus, pedunc. longissimis subunifloris, petal. lanceolatis hyalinis, cal. multo brevioribus. Poir. enc. 6. p. 370. Hab. in Barbariae subhumidis. Facie Stellar. gramineae.

18. *bavarica*, fol. semicylindricis carnosae obtusis, petal. lanceolatis, pedunc. terminalibus subulatis. L. Saxifraga bavarica. Raj. bist. 1013. Hab. in Bavaria, Baldo, Sibiria. Caul. stipulaceus? T

19. *gypsophioides*, fol. linearibor : radicalibus subteraceis, panic. subpubescente fastigiata, pet. lanceolatis, cal. ovatis longioribus. Willd. p. 723. Hab. in Oriente. Statua A. saxatilis. Caul. semipedalis ascendens. Panic. brachiaea, subfastigiata, pedicellis ultimis subvillosis. S.

20. *cucubaloïdes*, fol. linearibus marginę scabris, panic. dichotoma pubescente, petal. obovatis. Smith, ic. ined. t. p. 17. t. 17. Tournef. cor. 17. Hab. in Armenia. Cal. viscosus. Pelic. glabri? T.

21. *dianthoides*, fol. linearibus margine scabris, bracteis ventricosis pedunculor superantibus. Smith, l. c. p. 10. t. 16. Hab. in Armenia. T.

\*\*\* *Fol. lineari-subulatis.*

22. *triflora*, fol. lineari-subulatis basi ciliatis : floralibus calycibusque ovato-acuminatis subjungentibus, caul. diffuso, ramis erectis sur. trifloris. Cav. ic. 3. p. 26. t. 249. f. 2. Willd. p. 721. In Eur. australiori. Petal. cal. striato duplo fere longiora.

23. *saxatilis*, fol. subulatis, caulibus paniculatis, calyc. foliolis ovatis obtusis. L. A. fol. subulatis, calycinis lacinis membrana ipsis latiore acutis obtusis. Guett. stamp. 2. p. 281. Hab. in Europa. T. +

24. *verna*, fol. subulatis obtusiusculis nervosis, caulib. subpaniculatis elongatis, calycib. acuminatis striatis. L. J. a. g. aust. 5. p. 2. t. 404. Hab. in Eur. australior. alpinis. Petal. cal. longiora?

25. *caespitosa*, caul. basi ramosissimo radicato, fol. lineari-subulatis striatis, pedunc. pubescentib. 1-2-floris subfastigiatis, cal. foliol. ovatis striatis petal. aequantibus. A. caespitosa. Ehrh. Hab. in Hercynia, Pyrenaeis. Cal. latere purpureo. Ab A. *verna* non distincta dicitur; tamen in speciminib. sub hoc nomine in Herbariis occurrentibus, pedunc. vili elongatos, 2-3-floros, et cor. cal. multo longiorem.

Obs. A. *faccida* et *uti inosa* Schleicheri hujus aut A. *vernae* varietates videntur. Cal. et folia minus striata sunt.

26. *obtusata*, fol. linearib. obtusis, cal. ovato-lanceolato viscido petal. subaequante. Allion. l. c. p. 114. Hall. helv. 861. Hab. in pascuis saxosis alpinis. Pet. ovata. T.

27. *recurva*, fol. radicalib. congestis recurvis subulatis, caul. simpliciter subtrifloro, cal. ovatis striatis. Allion. pedem. n°. 1713. t. 89. f. 3. Wulf. in Jacq. Coll. 1. p. 244. t. 6. f. 1. Hab. in alpinibus.

28. *glabra*, suberecta multicaulis, fol. subulato-linearibus planis patulis, petic. elongatis divaricatis, cal. foliol. ovalibus laevibus cor. brevioribus. Michaux. Flor. t. p. 274. Hab. in rupib. Car. septentrional. Affn. Sted. 1-florae. Walt. dicitur.

29. *stricta*, multicaulis glabra stricta, fol. subulato-linearib. erectis, cal. foliol. ovali-lanceolatis striatis cor. breviorib. Michaux. In rupib. Amer. bor.

30. *scabra*, minuta, fol. lanceolato-acutis patentibus scabris, pedunc. paniculatis dichotomis, cal. asperis corol. brevioribus, caul. simpliciter brevissimis. Poir. l. c. Hab. in alpinis rupibus aridis.

31. *echinata*, pumila, fol. filiformibus subulatis, flor. subpaniculatis, calycib. pedunculisque hispidis glandulosis, cor. callicem aequante. Poir. enc. 6. p. 377. Hab. in alpinibus. Fol. tantum subpubescentia.

32. *hispida*, fol. subulatis subtus hispidis. L. Hab. Mompellii. Habitus *Spergulae*. Fol. subtus pilis hispida. Panic. primum dichotoma. L. +

33. *verticillata*, fol. subulatis spinosis floribusque verticillatis. Willd. p. 725. Tournef. cor. 18. Hab. in Armenia. Ramis lignosis, nodosis. Pedunc. quadriflori subcapitati axillares. Cal. foliola pungentia. Petala lanceolata. W.

34. *austriaca*, fol. linearibus, ramis erectis, pedunc. terminalib. longissimis binis, petal. obtusis emarginatis. Willd. p. 728. Jacq. Flor. aust. 3. t. 270. Allion. t. 64. f. 2. Hab. in Austriae et Italiae alpinibus.

\* *Stellarioides*. *Stellaria biflora*, caulib. prostratis ramosissimis, ramis annuis erectis longissime bifloris, fol. linearib. acutis, calycibusque dorso trinerviis. petal. calyce longioribus crenato-bifidis. Jacq. Collect. 1. p. 251. t. 18. Var. antecedentis, Willd.

35. *grandiflora*, fol. subulatis planis striatis : radicalibus confertis, caulib. subunifloris. L. Allion. pet. t. 10. f. 1. Allion. spec. pedem. 49. t. 10. f. 1. Hab. in montib. et alpinibus. T.

36. *cherlerioides*, caespitosa, repens, fol. linearibus sulcatis imbricatis, calycinis aequalibus. Vill. Dauph. 3. p. 626. A. *lanceolata*. Allioni. Hab. in rupibus alpestris. Cor. cal. brevior. Fol. subovata.

37. *liniflora*, caulib. erectis inferna ramosis suffrutescentis, fol. subulatis, flor. geminis. Lin. suppl. p. 241. Jacq. Coll. 2. p. 107. t. 3. f. 3. A. *striata*. Vill. delph. 3.

p. 630, t. 47. Hab. in Eur. australi. Caul. distorti. Cal. foliol. lanceolatis: striis 2. Cor. magnitudine Lini. L.

*Obs.* Differt ab *A. grandiflora*, fol. non plano-gramineis, cal. foliolis non multistriatis, caule multo longiore, basique suffrutesco. L.

37. *Gerardi*, fol. lineari-subulatis trinerviis, flor. geminis terminalibus, calycin. foliolis acuminatis margine membranaceis trinerviis. Willd. p. 229. *A. limiflora*. Jacq. austr. 5. t. 445. Gerard. prov. 205. t. 15. f. 1. Hab. in Austr. et Gall. alpinis.

38. *juniperina*, fol. subulatis spinosis, caulibus erectis, calycib. 5 rariis, capsula oblonga. L. Smith. ic. ined. 1. p. 35. t. 35. Lam. ill. t. 378. f. 2. Hab. in Armenia. Flor. paniculati. Cal. oblongi, 5-nervi. Pet. lanceolata. L.

\*\*\* *Folius setaceis.*

39. *sibirica*, fol. caespitosis setaceis longissimis, caul. subnudo umbellato-trifloris, cal. ovato obluso cor. multo minoribus. *A. capillaris*. Poir. in Enc. bot. 6. p. 380. Hab. in Sibiria Parin. Pl. elegans. Pet. ovalia.

40. *capillacea*, fol. setacis rigidis glabris, flor. erectis, petal. cal. majorib. Allion. pedem. t. 86. L. 2. Hab. in agro pedemontano. †

41. *laricifolia*, fol. setacis, caule superne nudiusculo, calycib. subhirsutis. L. Jacq. austr. 3. p. 39. t. 272. Magnol. hort. 11. t. 11. Hab. in montosis. Cal. oblongus, lineatus, cylindricus, pubescentes. L.

42. *striata*, fol. linearibus erectis appressis, calycib. oblongis striatis. L. Allion. l. c. t. 26. f. 4. Cum priore saepe confunditur. Au var. ? Hab. in alpinis.

43. *patula*, pubens, caul. paniculatis multifloris, fol. setaceo-subulatis subfasciculatis patentibus, petal. subemarginatis, cal. striato acuto sublongioribus. Michaux. Flor. 1. p. 273. Hab. in rupibus circa Knoxville. Fœrie *A. tenuifoliae*. Cal. cor. brevior.

44. *tenuifolia*, fol. oppositis subulatis setaceis solitariis, cauleque ramosissimo dichotomo glabris, cal. subulatis striatis cor. longioribus. L. Lam. ill. t. 378. f. 1. Engl. bot. t. 219. Vaill. paris. t. 3. f. 1. Hab. in agris et ad muros. Pet. subovata. Fol. glabra. Caul. non stipulaceo ab *Als. segetalis* differt.

45. *viscosa*, minor erecta piloso-viscida, f. l. subulatis basi dilatatis striatis, cal. acu-

minatis. Thuill. Flor. paris. p. 279. Hab. in arenosis, praesertim in sylvula prope Romaiville. An diversa ab *Als. viscosa* ?

46. *heteromalla*, caul. ramosissimo, flor. paniculato-fastigiatis, fol. setaceis fasciculatis secundis, cal. ovato acutis margine lato albo. *A. saxatilis* anciorum. Vaill. paris. 7. t. 2. f. 3. *A. setacea*. Thuill. Hab. in rupibus et in arenosis. Caul. basi lignosus, pubescens, fusco-ruber. Fol. basi ciliata. Flor. gypsoph. prostratae, cal. subcampanulatus.

47. *fasciculata*, fol. subulatis et fasciculatis setaceis, caul. erecto stricto subsimplice, flor. fasciculatis, cal. acuminatis, petalis brevissimis. Jacq. austr. 2. t. 182. Hab. Montipelli et in Austria. Non confundenda cum *Bufonia tenuifolia*. ☉

β. *rostrata*, caul. ramosissimo, subpaniculato, fol. setaceis internodiis subbrevioribus alternis subfasciculatis, cal. fol. conniventibus subulatis. *A. saxatilis*. Vill. Delph. 3. p. 631. Hab. in Gallia meridionali.

*Obs.* Media quasi inter heteromallam et *A. fasciculatam*. Caul. basi decumb. subfrutescens, rum. erectis tenuibus. Cal. albidus, dorso viridis, subcylindricus, longus rostriformis. Fol. non unum latus specant.

48. *filifolia*, caulib. suffrutescens dichotomis, fol. setaceis, pedunc. terminalibus simplicibus unifloris. Vaill. symb. 1. p. 33. t. 12. Hab. in Arabia.

SPERGULARIA. Habitu *Spergulae*. Flor. *Arenariae*. Caul. ad genicula stipulaceus (humifusus).

49. *rubra*, caul. prostratis glabris, fol. filiformibus internodiis brevioribus, seminibus compresso-angulatis. *A. rubra* campestris. L. Roth. germ. 2. p. 481. Smith. brit. 2. p. 479. Hab. in agris, arenosis, subhumidis. Cal. caps. aequans.

50. *media*, caul. prostratis, fol. semicylindricis carnosis internodiis aequantibus, seminib. compressis margine alatis. *A. media*. L. Willd. p. 722. Flor. dan. t. 740. *A. marina*. Roth. l. c. ? Hab. in pascuis et arenosis aridissimis. Priore multo major. Cal. caps. brevior.

51. *canadensis*, fol. linearib. carnosis, internodiis multo longioribus, staminib. 5, caps. globosa. *A. rubra*. β. Michaux. Flor. 1. p. 274. Hab. in Canada ad flum. St-Laurentii. Pedunc. reflexi. Caps. cal. longior.

52. *purpurea*, caul. erecto ? piloso ramis divaricatis, fol. subsetaceis internodi

dimidiis brevioribus. Habit. in Hispania. Thiebaut. Pl. pulchella, gracilis. Cor. amoenae rubrae.

*Obs.* Hae species aut *Spergulis*, ab iis enim stylosum numero tantum differre videntur, associandae, aut sub peculiari genere, cui *Alsine* vegetalis L. addi posset, ab *Arenariis* separandae, cum quibus seriem haud naturalem efficiunt.

1121. *CHERLERIA*. *Cal.* 4-phyllus.

*Nectararia* 5, bifida, petaloides.

*Anther.* alternae, steriles. *Caps.*

1 locularis, 3-valvis, trisperma.

L. (polyperma. Sm.)

1. *sedoides*. L. Jacq. austr. t. 285. Lam. ill. t. 329. Smith. brit. 2. p. 481. Hab. in alpinis. Fol. triquetra, subulata. Flor. lutescentes. Petal. 0?

1122. *DEUTZIA*. *Cal.* campanulatus, 5-fidus. *Petala* 5, obtusa, indivisa. *Filam.* trifida. *Caps.* triaristata, 3-locularis, 3-valvis, basi dehiscens, polyperma.

1. *scabra*. Thunb. jap. p. 185, t. 24. Lam. ill. t. 380. Hab. in Japonia. Fol. opposita ovata scaberrima. Racemi terminales. W.

1123. *HORTENSIA*. Flor. difformes: flor. solitarii *Cal.* 5-dentatus, minutus. *Cor.* 5-petala. Flor. cymam constituentium *Cal.* 4-5-phyllus, maximus, coloratus, petaloides, persistens. *Cor.* minuta, subglobosa: petal. 4-5. concavis deciduis. *Fruct.* (Stam. 8, 10, 11.)

1. *speciosa*, fol. late ovatis serratis acuminatis, flor. cymosis. *Hydrangea hortensis*. Smith. ic. pict. 1. p. 12. t. 12. Willd. Sp. II. p. 613. Roeb. N. bot. beytr. p. 202. H. opuloides. Lam. enc. 3. p. 136. Ej. ill. t. 380. Hab. sponte in India, nunc ornamentum causa ubique colitur.

*Obs.* Flor. primo albidis-virentes, tandem amoenae rosei; ob sterilitatem, fructum enim nondum perfecerunt, longe durant, denum marcescunt. Var. flor. purpureo-violaceis. An potius *Hydrangeae* species? sed flor. trigyni. Nonnulli hoc genus, forte minus recte, ad familiam *Rhamnorum* retulerunt, forsae ob florum similitudinem cum *Viburno* opulo.

1124. *GARIDELLA*. *Cal.* 5-phyllus, petaloides. *Nect.* 5, bilabiata, bifida. *Caps.* 3, connexae, polyspermae.

1. *Nigellastrum*. L. Lam. ill. t. 379. G. fol. tenuissime divis. Garid. prov. 203. t. 39. Hab. in Galloprovincia. ☉

*MALFIGIACEAE* (Gen. 1124-1129.) praesertim dignoscuntur petal. 5-unguiculatis s. pedicellatis, cal. laciniis persistentibus alternis, et cum staminibus 10 disco hypogyno insertis. Styli 1-3. Pericarp. est vel capsula vel bacca, plerisque vero samara s. nux alata. Fol. sunt integra substipulacea. Fruticulosae sunt vel arbusculaeformes. J.

1125. *MALFIGIA*. *Cal.* 5-phyllus, basi extus poris binis melliferis. *Petala* 5, subrotunda, unguiculata. *Filam.* basi coherentia, (aut libera.) *Drupa* 1-locularis tripyrena, nucibus monospermis.

1. *glabra*, fol. ovatis integerrimis glabris, pedunc. umbellatis. L. Mill. ic. t. 181. f. 2. Cav. diss. 8. p. 406. t. 254. f. 1. Willd. Sp. II. p. 735. Hab. in Amer. australi. Umbellae 4-florae.

2. *biflora*, fol. ovato-lanceolatis acutiss. pedunc. bifloris. Lam. enc. 4. p. 126. M. punicifolia. Cavan. l. c. p. 406. t. 254. f. 2. Hab. in sylvis Amer. calidioris. h

3. *punicifolia*, fol. ovatis integerrimis glabris, pedunc. unifloris. L. Lam. enc. l. c. Plum. gen. t. 166. f. 2. Hab. in Amer. meridionali. h

4. *saginea*, fol. oblongo-ovatis integerrimis, subtus sericeo-nitentibus, pedunc. tripartito-umbellatis. Swartz. Fl. ind. occident. t. p. 850. Hab. in ins. Grenada Americae. h

5. *glandulosa*, fol. ovato-ellipticis acuminatis integerrimis glabris, basi biglandulosis, racem. axillaribus. Willd. p. 733. Flor. racemosis monogynis. Cav. l. c. p. 411. t. 259. f. 2.

6. *glandulifera*, fol. ovatis subintegerrimis, utrinque pilis decumbentibus. obseis, racemis axillaribus, pedicell. superne glandula truncata instructis. Jacq. ic. rar. 3. t. 469. Hab. in Antillis; 6. in sylvis ad Caracas. h

6. *tuberculata*, fol. ovato-lanceolatis in-

tosius superne pubescentibus, inferne glabris Willd. Sp. II. p. 743. Hab. Carthagenae in sylvia. *h*

2. *odorata*, fol. simplicibus ovatis acutis superne glabris, inferne tomento is. Willd. Hab. in Guinea. Fol. venosa superne atro-viridis, inferne tomento flavescenti villosa adpresso tecta.

3. *pinnata*, fol. impari-pinnatis, foliol. ovato-oblongis altern. utrinq. glabris. Willd. Flabellaria paniculata. Cav. diss. 9. p. 436. t. 264. Hab. in Sierra Leone. *h*

*Obs.* An cum sequente genere potius coniungi debet?

1128. **TRIOPTERIS.** *Cal.* 5. partitus, basi extus poris 2-mellisferis. *Petala* subrotunda, unguiculata. *Filam.* basi coherentia. *Stigm.* 3-6. *Samaræ* 3, 1-spermae 3-a atq.

1. *jamaicensis*, fol. oblongis acuminatis venosis nitidis, racemis compositis terminalibus laxis, fructib. trialatis. Sw. obs. 183. Hab. ad sepes Jamaicae, Hispaniolae.

2. *indica*, fol. subrotundo-ovatis subcordatis acuminatis nitidis glabris, racemis compositis terminalibus, fructib. trialatis. Willd. p. 744. Hab. in India orientali. Ped. et calyces pubescentes. Samar. alae aequales venosae. *W.*

3. *ovata*, fol. ovatis obtusiusculis subcordatis glabris, petiolis biglandulosis, racemis compositis terminalibus, fructib. trialatis. Willd. Cav. l. c. p. 431. t. 259. Hab. in insula St.-Dominici. *h*

4. *rigida*, fol. subrotundis neutis marginatis lineatis coriaceis, racem. compositis axillaribus, fructib. trialatis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 859. Hab. in fruticetis montosis Hispaniolae. *h*

1129. **TETRAPTERIS.** *Cal.* 5. partitus, utrinque biglandulosus. *Petala* limbriata, unguiculata. *Fructus* quadrilatus, ulis 2-inferioribus minoribus.

1. *acutifolia*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, floribus paniculatis terminalibus. Cav. diss. 9. p. 433. t. 761. Triopteris. Willd. Sp. II. p. 744. Hab. in Cajenna. *h*

2. *mucronata*, fol. ovatis mucronatis glabris, flor. umbellatis. Cav. l. c. p. 434. t. 262. *l. 2.* Hab. in Cajenna. *h*

3. *buxifolia*, fol. ovatis subsessilib. paucis, flor. umbellatis terminalibus. Cav. l. c. t. 262. *f. 1.* Hab. in Antillis. *h*

4. *citrifolia*, fol. ovato-oblongis acutis glabris, umbellis axillaribus pedunculatis, fructibus quadrilatis, alis binis inferioribus brevioribus. Willd. p. 745. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 857. sub Triopteride. T. inaequalis, fol. ovato-acutis subcordatis glabris, flor. umbellatis, alis inferioribus brevioribus. Cav. l. c. 260. Hab. in sylvis montium Jamaicae. *h*

1130. **ERYTHROXYLON.** *Cal.* turbinatus. *Cor.* petalis basi squamula nectarifera emarginata. *Siam.* basi connexa. *Drupa* 1-locularis.

1. *areolatum*, fol. obovatis mucronatis, pedunculis lateralibus aggregatis flore duplo longioribus. Willd. Sp. II. p. 716. Jacq. amer. 134. t. 87. *f. 1.* Ed. pict. t. 129. Brown. jam. 278. t. 8 *f. 2.* Hab. in maritimis circa Carthagenam Amer. *h*

2. *hypericifolium*, fol. obovatis emarginatis, pedunc. lateralibus subsolitariis, flore triplo longioribus. Willd. Lam. enc. 2. p. 394. Cavan. diss. 8. p. 403. t. 230. Hab. in insula Mauritii et Bourbon. *h*

3. *buxifolium*, fol. obovatis integerrimis, nervo medio supra elevato, pedunc. axillaribus brevibus solitariis basi utriculatis. Lam. l. c. 2. p. 394. Cav. l. c. p. 403. t. 231. *f. 1.* Hab. in Madagascar. *h*

4. *ferrugineum*, fol. ovatis apice emarginatis subtus ferrugineis, squamulis imbricatis, flor. solitariis. Cav. p. 404. t. 131. *f. 2.* Hab. cum priore.

5. *rufum*, fol. ovatis coriaceis inferne rubis, squamulis imbricatis, axillis multifloris. Cav. l. c. t. 232. Hab. in Amer. meridionali. *h*

6. *havanense*, fol. ovatis, squamulis imbricatis, flor. subsolitariis, drupa gibbosa. Cavan. t. 233. Hab. Havanae in rupibus maritimis. *h*

7. *Coen.*, fol. oblongis obtusiusculis venosis, subtus trilineatis, pedunc. lateralibus sparsis flore brevioribus. Willd. Lam. enc. 2. p. 383. Cav. 8. p. 402. t. 229. Hab. in Peru. Fol. venosa.

8. *Syderoxyloides*, fol. ovato-oblongis obtusiusculis, ramis scabris apice compressis, pedunculis subternis axillaribus. Lamarch.

ene. 2. p. 393. Cav. diss. 8. t. 228. Pluk. amalib. 187. t. 442. f. 3. Hab. in ins. Bourbon. h

9. *squamatum*, fol. elliptico-lanceolatis acuminatis obtusis, ramulis squamosis floriferis. Vahl. symb. 3. p. 60. t. 63. Swartz. Flor. 2. p. 851. Hab. in Cajenna inque Caribacis. h

10. *macrophyllum*, fol. elliptico-acuminatis, axillis multifloris, squamis lanceolato-subulatis semisimplexicaulibus striatis. Vahl. eclog. 2. p. 33. Cavan. p. 401. t. 227. Hab. in Cajenna. h

11. *laurifolium*, fol. lato-lanceolatis, squamis acutis concavis, flor. glomeratis terminalibus. Cavan. p. 400. t. 226. Hab. in insula Mauritiis. h

12. *longifolium*, fol. oblongis crassis nitidis, squamulis acutis deciduis, floribus axillaribus. Cavan. p. 399. t. 225. Lam. l. c. p. 394. Hab. in Madagascar. h

13. *monogynum*, fol. ovato-lanceolatis, flor. axillaribus monogynis. Roxb. Corom. t. 88. Hab. in India. Sigm. 3.

TETRAGYNIA.

1131. *MICROPETALON*. Cal. 5-phyllus. Petala (minutissima), integra, aut nulla. Caps. ovata, cal. longior, 4-valvis. (Habitu *Stellariae*. *Spergulastrum*, Mich.)

1. *lanuginosum*, pubescens, fol. lanceolatis in petiolum angustatis, flor. apetalis. *Spergulastrum*. Michaux. Flor. 1. p. 275. Hab. in meridionalibus Amer. septentrional. Pedunc. subsolitarii, longi, denum reflexi.

2. *lanceolatum*, glabrum, fol. lanceolatis utrinque angustatis. Michaux. l. c. Hab. in Amer. boreali. Petala brevissima, ovalia. Flor. paniculati.

3. *gramineum*, glaberrimum, fol. linearib. erectis. Michaux. p. 276. Hab. in Pennsylvania. Stell. gramineam exakte refert. Flor. corollati.

Obs. Hae plantae genus naturale cum Stellaris efficere videntur.

PENTAGYNIA.

TELEBINTHACEAE Decandria 5-gyna (gen. 1132-37.)

1132. *AVERRHOA*. Cal. 5-phyllus. Petala 5; superne patentia. Stam.

annulo nectarifero inserta, alterna breviora. Bacca 5-gona, 5-locularis.

1. *Bilimbi*, fol. pinnatis: foliol. ovato-lanceolatis, fructib. oblongis obtusangulis. Willd. Sp. II. p. 749. Lam. ill. t. 385. Cav. diss. 7. p. 373. t. 219. Rumph. 1. t. 36. Hab. in India. h

2. *Carambola*, fol. pinnatis, foliol. ovatis inaequalibus acuminatis, fructibus oblongis acutangulis. Willd. Cavan. diss. 7. p. 374. t. 220. Rumph. 1. t. 35. Hab. in India.

1133. *TAPIRIA*. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. pentacocca, unilocularis, 5-valvis, 5-sperma. Sem. arillata.

1. *gujanensis*. Anbl. guj. 1. p. 470. t. 188. Lam. ill. t. 386. Jaconquetia *paniculata*. Willd. p. 750. Hab. in Gujanae sylvia. Arb. 50-pedalis. Fol. impari-pinnata. Flor. parvi paniculati.

1134. *SPONDIAS*. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala. Drupa nucleo 5-loculari.

1. *Mombin*, fol. petiolo communi compresso. L. Willd. Sp. II. p. 750. S. *Myrobalanus*. Jacq. amer. 139. t. 88. Ed. pict. t. 88. Sloan. hist. 2. p. 126. t. 219. f. 3. 4. 5. Hab. in India occidentali. h

2. *Myrobalanus*, petiolis teretibus: foliolis nitidis acuminatis. L. S. *Mombin*, racemis terminalibus longitudine folia aequantibus. Jacq. amer. 138. Sloan. hist. 2. p. 125. t. 219. Mer. surin. 13. t. 13. Hab. in Amer. meridionali.

3. *Mangifera*, foliolis oblongis integerrimis panicula racemosa. Willd. *Mangifera* pinnata. Län. suppl. 156. Hab. in India.

4. *dulcis*, petiolis teretib. terjugis, foliol. serrat. costatis. Forst. profl. n°. 158. Cytherca. Lam. enc. 4. p. 260. ill. t. 384. Soun. it. 2. t. 173. Hab. in Societ. insulis et in ins. Mauritiis. h

1135. *POUPARTIA*. Cal. minimus: 5-fidus. Stamina disco crenato inserta. Styl. approximati. *Pericarp.* nuce 5-loculari.

1. *borbonica*. Fol. impari-pinnata: simplicibus nonnullis intermixtis. Flor. racemosi. Arb. *Eois* de Poupard dicta. Juss. gen. pl. Genus quoad nonnullos caracteres ulterius observandum.

## 1136. ROBERGIA. Cal. 5-partitus.

*Petala* 5. *Drupa* uucco monosperma, putamine bivalvi.

1. *frutescens*. Willd. Sp. II. p. 752. Rourea frut. Aubl. guj. 1. p. 467. t. 187. Hab. in sylvis Gujanæ. Fol. impari-pinnata. Panic. corymbosa. h

Obs. Discrepat caps. simplici; caeteris forsân abortivis, a sequente genere. Juss.

## 1137. CNESTIS. Cal. 5-partitus.

*Petala* 5. *Caps.* 5, bivalves, monospermae, leguminiformes, utrinque villosæ, latere dehiscentes.

1. *glabra*, fol. pinnatis, foliolis ovatis petiolatis utrinque glabris, racemulis fasciculatis brevib. et tenuib. Lam. enc. 3. p. 23. et ej. illustr. t. 387. f. 1. Willd. p. 752. Hab. in insula Mauritij et Borlonia. h

2. *polyphylla*, fol. pinnatis, foliolis ovato-oblongis subvillosis brevissime petiolatis, racemulis tomentosis, capsulis obtusissimis. Lam. l. c. Ej. ill. gen. t. 387. f. 2. Hab. in Malagascar. h

3. *corniculata*, fol. pinnatis, foliolis oblongo-acuminatis, nervo medio villosis, capsulis oblongis acutis corniculatis tomentosis prurientibus. Lam. l. c. Hab. in Sierra Leone. h

4. *trifolia*, fol. ternatis, foliolis ovatis acuminatis superne laevibus, panic. terminali. Lam. cuc. p. 24. Hab. in Africa. h

## 1138. COTYLEDON. (Umbilicaria) Cor. 5-fidus. Cor. 1-petala. Squamæ nectariferæ 5, ad basin germinis. Caps. 5.

\* *Foliis dilatatis, planis.*

1. *orbiculata*, fol. ovato-spathulatis obtusis cum acumine laevibus, flor. paniculatis. Ait. Kew. 2. p. 106. Willd. p. 751. Decand. Pl. grass. ic. Hab. ad Cap. b. spei cum trib. sequentibus. Cor. subempanulata pulchra, coccinea. Var. fol. orbiculatis. h

2. *paniculata*, fol. oblongo-ovatis sessilibus, flor. divaricato-paniculatis, caule fruticoso ramoso. Thunb. prod. 83.

3. *fascicularis*, fol. cuneiformibus fasciculatis terminalibus, caul. incrassato, ramis carnosis umbonatis. Ait. Kew. 2. p. 106. Burm. afr. 41. t. 18.

4. *cuneata*, fol. cuneatis carnosis liris, flor. paniculatis hirsutis. Thunb. prod. 83.

5. *serrata*, fol. ovalibus crenatis, caule spicato. L. Dill. elth. t. 95. f. 112. Hab. in Creta, Sibiria.

6. *Umbilicus*, fol. peltatis crenatis, caule subsimplici, flor. pendulis, bracteis integris. L. Lam. ill. t. 389. f. 1. Engl. bot. t. 325.

7. *peltatum*, caul. erecto maculato simplici, flor. racemosis pendulis, cor. cylindrica punctata. Wendl. obs. 49. Hab. in Lusitania, Hispania, Anglia. Rad. suberosa. h

8. *lutea*, fol. dentato-crenatis; infimis peltatis, caule subsimplici, flor. erectis, bract. subdentatis. Hud. Smith. brit. 2. p. 484. C. *lusitanica*. Lam. enc. 3. p. 140. Douart. men. 265. t. 73. Hab. in Europa australi, Oriente. h

9. *alternans*, fol. orbiculato-spathulatis integerrimis, flor. paniculatis glabris quadrifidis. Vahl. symb. 2. p. 51. C. *orbiculata*. Forsk. Hab. in Arabia. Cor. ovata, lacinias lanceolatis flavo-rubentibus. V.

10. *hemisphaerica*, fol. suborbiculatis sursum punctatis subtus convexis, flor. subsessilibus. Ait. Kew. 2. p. 107. Pl. grass. ic. Dill. elth. 112. t. 95. f. 111. Hab. in Aethiopia. h

11. *triflora*, fol. obovato-carnosis integris, flor. spicatis ternis sessilib. Thunb. prod. 85. Hab. ad Cap. b. spei.

12. *coccinea*, fol. obovatis acutis carnosis, spica foliosa terminali. Willd. Cav. ic. 2. p. 54. t. 170. Hab. . . . h

13. *Malacophyllum*, fol. lanceolat. acutis carnosis, spica cylindrica terminali aphylla. Willd. p. 756. Fall. it. 3. app. tab. O. f. 1. Hab. in Darniæ alpibus. Similis Crass. spinosae. W. ©

14. *mamillaris*, fol. alternis teretibus ovatis, flor. alternis subsessilibus. Lin. suppl. 243. Hab. ad Cap. b. spei. Cum praecedente ad sequentem divisionem potius pertinet?

\*\* *Fol. teretibus.*

15. *spuria*, fol. spathulato-lanceolatis carnosis, caul. fruticoso. L. Willd. p. 754. C. *teretifolia*, fol. subteretibus carnosis obtusis basi angustioribus, caul. crasso frutescente. Lam. enc. 2. p. 139? Burm. afr. t. 19. f. 2. Moris. In 12. t. 7. f. 40. Hab. in Africa, loc. petrosis. Flor. pulchri, penduli, rubri.

15. *tuberculosa*, caul. frutescente, fol. ambrylindricis linear-oblongis acotis, flor. subpaniculatis, pedunc. calyribusque pubescentibus. Decand. Pl. grass. Lam. enc. 2. p. 139. Burm. afr. t. 20. f. 1. Ad Cap. b. sp. Flor. speciosi, subaurantiaci, tubulosi. Caul. crass. tuberculatus.

16. *ungulata*, fol. semi-cylindricis canaliculatis: apice margine calloso-purpureo. Lam. enc. 2. p. 139. Burm. afr. t. 22. f. 1. Hab. in Africa.

17. *purpurea*, fol. linear-oblongis carnosiss glabris, florib. paniculatis. Thunb. prod. 83. Hab. ad Cap. b. spei, cum 4 sequentibus.

18. *teretifolia*, fol. carnosiss subteretibus, flor. paniculatis, caule hirsuto. Thunb. prod. 83.

19. *caecalioides*, fol. teretibus, florib. paniculatis, caule fruticoso. Thunb. Lin. suppl. 242. Flores lutei reterunt Caecaliam.

20. *reticulata*, fol. teretibus, floribus reticulato-paniculatis, caule fruticoso. Th. Lin. suppl. 242. Refert Staticeam reticulatam.

21. *papillaris*, fol. oppositis tereti-ovatis, flor. corymbosis. Lin. suppl. 242.

22. *hispanica*, fol. oblongis subteretibus, flor. tubulosiss fasciculatis. Loefl. it. t. 1. Plant. grass. ic. C. pistosina. Orteg. monogr. f. 2. Hab. in Africa, Oriente, et Hispania. Cor. infundibulif. longi, rubelli. ♂ ☉

23. *viscosa*, fol. teretibus, racem. terminalibus villosis-viscosis, caule ramoso, cor. campanulata. Vahl. symb. 2. p. 59. C. Mucronia. Orteg. Jacq. Coll. suppl. 122. t. 13. f. 2. C. hispida. Lam. enc. 2. p. 141. Plant. grass. ic. Hab. in montosis Hispaniae et in Barb. Caul. rubescens.

1139. **SEDUM.** Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. Squamæ nectariferæ 5, ad basin germinis. Caps. 5.

\* *Planifolia.*

1. *verticillatum*, fol. quaternis, lanceolatis serratis. L. Amoen. acad. 2. p. 252. t. 4. f. 14. Willd. Sp. II. p. 760. Hab. in Europa australi et in Sibiria. Caul. pedalis erectus. Racemæ axillares et flor. parvi.

2. *Telephium*, fol. planiusculis ovatis sparsis serratis, corymb. folioso, caul. erecto. L. Lam. ill. t. 3. o. f. 1. Decand. Pl. grass. ic. Flor. dan. t. 686. Hab. in agris petrosis sylvaticis.

\* *maximum*, fol. ovatis dentatis conjugatis, umbell. alaribus, flor. albicantibus. Hall. belv. n. 955. Hab. in alpinis.

3. *Telephioidea* (americana), fol. planis ovatis, utrinque subcatis dentatis, flor. corymbosis-fasciculatis. Mich. Flor. 1. p. 277. Hab. in Atner. septentr. rupib. altissimis. Flor. purpurascens.

4. *Anacampseros*, fol. cuneiformibus integerrimis subsessilibus, caulib. decumbentibus, florib. corymbosis. L. Plant. grass. ic. Hab. in Gallo-provincie rupibus, et in Suecia. Flor. purpurei.

Obs. Fol. hyeme deciduus. Lin., perais-tentia secundum alios.

5. *divaricatum*, fol. cuneiformi-rhombicis emarginatis petiolatis, caulib. ramosis, paniculis terminalibus divaricatis. Ait. Rev. 2. p. 103. S. Aizoides. Plant. grass. ic. 7. Hab. in Maikra. h

6. *Aizoon*, fol. lanceolatis serratis planis, caule erecto, cyma sessili terminali. L. Pl. grass. ic. Hab. in Sibiria.

7. *hybridum*, fol. cuneiformibus concavis subdentatis aggregatis, ramis repensibus, cyma terminali. L. Gmel. sib. 4. t. 67. f. 1. Murray in comm. nov. Goett. 6. p. 35. t. 5. Hab. in Tataria.

8. *populifolium*, fol. planis cordatis dentatis petiolatis, corymbis terminalibus. Ait. Kew. 2. p. 109. Plant. grass. ic. Curt. mag. t. 118. Hab. in Sibiriae alpinis.

9. *stellatum*, fol. planiusculis angulatis subrotundis, flor. lateralibus sessilibus solitariis. L. Camer. hort. p. 7. ic. 2. Hab. in Italia, Gallia, Helvetia. ☉

10. *alsinesfolium*, fol. planis ovatis, caule paniculato, petalis obtusis. Hab. in umbrosis lapideis Pedemontii. Fol. tenuia venosa.

11. *Cepaea*, fol. planis sublinearibus, caul. ramoso, floribus paniculatis, petal. acutis. Willd. p. 763. Hab. in umbrosis.

\* *gallioidea*, caule ascendente, fol. oppositis inferioribus 3-4-nis. Allion. ped. n. 1742. t. 65. f. 3. Hab. in agris Pedemontii. Flor. rubicundi.

12. *libanoticum*, fol. radicalibus fasciculatis spatulato-lanceolatis, caule subnudo simplicissimo. L. Hab. in Palaestina. Facies semper montani. Racem. terminalis, longitudine caulis. L.



13. *heptapetalum*, fol. ovato-oblongis planiusculis, pedunc. subhirsutis, florib. paniculatis. Poir. enc. bot. 4. p. 630. *S. caeruleum*. L. ? Hab. ad Barlariae rupes, ad litora maris. Flor. caerulei. Habitu Sedi, sed stamina 12-15 Sempervivi.

14. *ternatum*, pumilum, repens, fol. planis rotundato-spathulatis ternis, cyma subtristachya. Michaux. Flor. 1. p. 277. Hab. in rupibus Amer. boreal. Flor. albi 8-dri: terminalis solitarius 10-ander. M.

\* \* *Teretifolia.*

15. *dasyphyllum*, fol. oppositis ovatis obtusis caruosis, caule infimo, flor. sparsis. L. Jacq. hort. t. 151. Pl. grass. ic. Engl. bot. 1. 656. S. fol. semiglobosis subovat. sessilibus quadrifariam imbricatis. Wachend. ult. 391. Hab. in Europ. australior. rupib. Flor. albidis.

Obs. Stamina 10-12; styli 5-6. In planta culta rami elongati, flor. sparsis:  $\beta$  *gracile*. Decand.

16. *pulchellum*, caul. assurgentibus, fol. sparsis linearib. obtusis planiusculis, cym. polystachya, flor. sessilibus. Mich. l. c. Hab. in rupibus circa K. noxville. Spic. longae recurvatae: flor. unilaterales.

17. *reflexum*, fol. subulatis sparsis basi solutis: inferioribus recurvis, flor. subcymosis primo recurvis. Hab. in sylvis. Cal. acutus.

18. *virens*, fol. subulatis sparsis basi solutis, flor. cymosis, petal. calyce lanceolato sesquilongioribus. Ait. Kew. 2. p. 110. Hab. in Lusitania.  $\mathcal{T}$

19. *rupestre*, fol. subulatis quinquefariam confertis basi solutis, flor. cymosis. L. Eugl. bot. 1. 170. Pl. grass. ic. Dill. ehb. 1. 256. f. 333. Hab. ad rupes. Fol. glauca. Cal. obtusiusculus, rubicundus basi 1-phyllus. Sm.

$\mathcal{E}$  20. *altissimum*, flor. suboctopetalis, fol. sparsis: inferioribus teretibus; superioribus depressis. Enc. bot. 4. p. 614. Plant. grass. ic. Semperviv. sediforme. Jacq. Hort. 1. t. 81. et Misc. austr. 1. p. 133. t. 5. Hab. in Europ. australi.

21. *saxatilis*, fol. sparsis semiteretibus obtusis basi solutis, caule ramoso decumbente. Willd. p. 765. Allion. ped. n<sup>o</sup>. 1746. t. 65. f. 6. *S. rupestre*. Flor. dan. 59. Plant. grass. ic. *S. alpestre*. Villars. Hab. in alpinis et montosis ad rupes.

22. *rubens*, fol. ovatis alternis sessilibus remotis, caule prostrato basi ramoso, flor. terminalibus subumbellatis, pedunc. simplicissimis. Haenke it. sudet. p. 114. Hoffm. Flor. germ. p. 208. Hab. in Andetis. Var. prioris secundum Willdenow Caps. purpureae.

23. *quadrifidum*, fol. sparsis teretibus obtusis, caule simplici, florib. umbellatis tetrapetalis. Willd. Pall. ii. 3. app. n<sup>o</sup>. 90. t. P. f. 1. Hab. in rupibus Asiae borealis.  $\mathcal{T}$

24. *hispanicum*, fol. linearibus teretibus depressis sparsis, cyma patula, flor. hexapetalis. Ait. Kew. 2. p. 111. Dill. elch. 1. 256. f. 332. Hab. in Hispan. Gall. et Carinthia.

25. *lineare*, fol. tereti-linearib. oppositis, cyma trifida. Thunb. jap. 187. Hab. in Japonia.

26. *caeruleum*, fol. oblongis alternis obtusis basi solutis, cyma bifida glabra. Vahl. symb. 2. p. 51. Shaw. it. f. 550. *S. azureum*. Desf. atl. Hab. in fissuris rupium ad Manub. Tuneti.

27. *album*, fol. oblongis obtusis teretiusculis sessilib. patentibus, cyma ramosa. L. Flor. dan. 1. 66. Blackw. t. 428. Lam. ill. 1. 350. f. 2. Hab. in muris antiquis.

28. *aere*, fol. alternis subovatis alnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. L. Pl. grass. ic. Curt. lond. ic. t. 32. Hab. in campis sterilitatibus, ad muros antiquos. Flor. majusculi, aurci.

\* *aestivum*, fol. ovato-teretiusculis obtusis, caul. bifido, flor. luteis sessilib. Allion. Fl. Pedem. Lob. ic. 378. Hab. in saxosis. Flos inter dichotom. scissilis. Pl. acida annua.  $\odot$

29. *sexangulare*, fol. subternis teretiusculis, alnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis, cyma trifida. L. Curt. lond. ic. Hab. in campis siccis, ad muros. Fol. subtus rubentis, insipida.

30. *annuum*, caule erecto solitario annuo, fol. ovatis sessilibus gibbis alternis, cyma recurva. L. Exch. syn. Raj. Hab. in Europa boreali. Simile *S. antecolentis*, sed fol. rubicunda. Flor. intei. L.  $\odot$  +

\* *Guetardi*, fol. teretibus obtusis, basi solutis acutis, calycib. teretibus, petal. lanceolatis, caul. corymboso dichotomo. Vill. Delph. 3. p. 67. t. 45. Hab. prope Estampes. Flor. albi. Forte eadem est ac *S. anglicum* aut *rubens*.

31. *anglicum*,

31. *anglicum*, fol. subovatis adnato-sessilibus gibbis subalternis, cyma ramosa bifida. Huds. Engl. bot. t. 171. Flor. dan. t. 82. Ruj. synop. t. 12. f. 2. S. robustus. Lightf. Hab. in rupibus et maritimis Angliæ et Norvegiæ. Caul. basi procumbens. Petala acuminiata alba: carina rufra. Sm.

32. *aristatum*, fol. teretibus utrinque acutis basi solutis radicalibus fasciculatis, petal. aristatis lanceolatis. V-ll l. c. p. 680. t. 45. Cresc. in Delph. prope Sigoyes. Flor. corymbosi, albid. Totum glabrum? +

33. *hirsutum*, fol. ovalibus obtusis planiusculis, margine pubescentibus, caul. ramoso erecto, petal. aristatis ovatis, stam. longioribus. Allion. pedem. n.º. 1754. t. 65. f. 5. Poir. enc. 4. p. 634. Hab. in Ital. alpinis et in monte aureo. Fol. radicalia rosacea fasciculata. Caul. rubens. Pst. alba: linea purpurea, phœntia. Cal. hirsutus. A.

34. *nicaense*, fol. anbulatis sparsis basi solutis, cyma bifida, flor. longe pedunculatis. All. l. c. 1752. t. 90. f. 1. Cresc. super saxa in comitatu Nicaensium. Flor. magni, albid, unilaterales. A. ☉

35. *atlanticum*, ramis filiformibus paniculatis villosis, fol. semiteretibus. S. hispidum. Desf. atl. 1. p. 461. Hab. in Atlante. Cor. aurea. Stam. 10-12. D.

36. *pubescens*, fol. oblongis obtusis supra planiusculis, cyma bifida, petal. lanceolatis. Vahl. symb. 2. p. 52. Hab. in fissuris rupium Tuneti.

37. *villosum*, fol. oblongis supra planiusculis pedunculisque axillaribus subunisporis pubescentibus, petal. ovatis obtusiusculis. Vahl. symb. 2. p. 52. Fl. dan. t. 24. Engl. bot. t. 394. Pl. grass. ic. Hab. in pratis paludosis. Flor. purpurei. Stam. 7-8.

38. *palustre*, fol. brevi-linearibus, flor. cymosis. Sedum palustre subhirsutum purpureum. Bauh. pin. p. 283. Cresc. in palustrib. montosis. Sed. villosa major. Flor. purpureo-cærulei, majusculi. Fol. litoria.

39. *monregalense*, fol. verticillatis linearibus, caul. procumbente paniculato, pedunc. villosis-viscosis. Balbis Miscell. bot. p. 23. t. 6. Hab. in alpestribus ad rupes Pedemontii. Caul. plures ex radice. Flor. primo nutantes, albi.

40. *atratum*, caule erecto, flor. corymbosis fastigiatis. Jacq. austr. t. 8. Plant. grass. ic. Scheuchz. it. 1. p. 48. t. 6. f. 34. Hab. in Helvetiæ, Galliæ et Italiæ alpinis.

Cal. atro-purpurascens. Petal. alba aut flava, ovata. Germina atro-purpurea: scintia.

41. *pusillum*, erectum, fol. alternis tenuiusculis oblongis, flor. 8-andris alternis subpedicellatis. Michaux. Flor. 1. p. 276. Hab. in Carol. septentr. Flor. albi.

42. *nudum*, fol. sparsis oblongo-cylindraceis obtusis, caul. fruticosis ramosissimis, ramis toruosis, cymis terminalibus. Ait. Kew. 2. p. 112. Hab. in Madera. h

Obs. In promontorio Cap. b. sp. plantarum succulentarum ceterum feraci nullæ Sedi species, quantum scio, huc usque sunt detectæ.

1140. PENTHORUM. Cal. 5-fidus. Petala nulla, aut quinque. Caps. 5-cuspidata, 5-locularis.

1. *sedoides*. L. Lam. ill. t. 390. Hab. in Amer. boreal. aquatica. Pedunc. terminal. spicis revolutis.

1141. BERGIA. Cal. 1-phyllus, caducus, 5-dentatus. Petala 5. Caps. 1, globosa, 5-torulosa, 5-locularis, 5-valvis: valvulis petaloideis. Sema plurima. (Bacca ovalis: cortice crasso, 1-locularis, polysperma. Roxb.)

1. *verticillata*, fol. lanceolatis apice denticulatis, flor. verticillatis. Willd. p. 770. B. aquatica. Roxb. Corom. 2. p. 22. t. 142. B. capensis. Lin. Rheed. g. t. 78. Hab. in India orientali, nec ad Cap. b. sp.

2. *glomerata*, fol. obovatis crenulatis, flor. glomeratis. Jan. suppl. 243. Thunb. prod. 82. Hab. ad Cap. b. sp.

1142. SURIANA. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Styli inserti lateri interiori germinum. Sem. 5, nuda.

1. *maritima*. L. Jacq. amer. 140. Ed. pict. p. 70. Lam. ill. t. 389. Hab. in Amer. calidioris maritimis. h

1143. GRIELUM. Cal. 5-fidus. Petala 5. Filam. persistentia. Pericarpia 5, monosperma.

1. *tenuifolium*. L. Lam. ill. t. 388. Geranium. Burm. afr. 83. t. 34. f. 1. Hab. in Aethiopia. Fol. incana multifida. Cor. lutea.

1144. **OXALIS**. Cal. 5-phyllus. Petala unguibus connexa. Stam. inæqualia, 5-breviora, exteriora basi connata. Caps. angulis elasticè dehiscens, 5-gona. Sem. subarillata.

\* *Fol. simplicibus.*

1. *monophylla*, acaulis, scapo unifloro, fol. ellipticis obtusis, filamentis glabris. Willd. Sp. II. p. 772. Jacq. Oxal. Vien. 1794. n.º. 35. p. 36. t. 79. f. 3. Thunb. Diss. de Oxal. n.º. 2. p. 8. t. 1. f. 1. Fol. Bellidis. Flos O. Acetosellæ.

Oss. Hab., paucis speciebus exceptis, quorum locos natalis indicatur, omnes fere ad *Cap. b. spei*. Fol. fere omnia, uti in Filicibus primo convoluta, et plus minusve irrinabilia.

2. *lepida*, acaulis, scapo unifloro, fol. obovatis subretusis, filamentis glandulosis pilosis simplicibus. Willd. Jacq. L. c. p. 53. t. 21. Cor. alba.

3. *rostrata*, acaulis, scapo unifloro, fol. obovatis retusis, filament. interiorib. apice rostratis piloso-glandulosis, antheris lateralibus. Cor. violaceo-albida. W.

\*\* *Foliis binatis.*

4. *asinina*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis lanceolatis margine cartilagineis denticulatis, petiol. alatis. W. p. 773. Jacq. p. 59. t. 24. Cor. magna flava.

5. *lanceafolia*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis ternatisque margine cartilagineis scabris, petiolis alatis. Jacq. p. 26. t. 26. Cor. flava.

6. *leporina*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis ellipticis emarginatis, margine cartilagineis denticulatis, petiolis alatis. W. Jacq. p. 60. t. 25. Cor. alba, margine rubicunda.

7. *crispa*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis subrotundo-obovatis emarginatis, margine undulatis petiol. subrotundo-alatis. Jacq. p. 58. t. 23. Cor. maxima, alba.

\*\*\* *Foliis ternatis.*

† *Acaulis, scapo unifloro.*

8. *fabacifolia*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis obovatis emarginatis mucronatis, petiolis alatis. W. p. 774. Jacq. p. 61. t. 27. Cor. ampla flava.

9. *laburnifolia*, foliolo medio sublan- ceolato, lateralibus oblique oblongis, stylis

longissimis, filamentis dearticulatis. Jacq. p. 61. t. 28. Pubescens. Petioli compressi. Cor. flava.

10. *sanguinea*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis, foliolo intermedio basi attenuato, petiolo semiteret compresso, calycibus simpliciter pilosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. p. 775. Jacq. p. 64. t. 29. Filam. interiora hispida.

11. *ambigua*, stylis longissimis, foliolo immaculatis planis, calycinis foliol. æqualibus. Jacq. Oxal. n.º. 59. p. 80. t. 43. Cor. alba fundo flavescente.

12. *undulata*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis 1 foliolo oblongis obtusis undulatis; intermedio cuneiformi, calycinis foliolo pilosis punctatis, unico spatulato majore, stylis staminibus longioribus. W. Jacq. p. 81. t. 44. Fol. pilosiuscula. Cor. alba fundo flava.

13. *fuscata*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis unculatis oblongis obtusis: foliolo intermedio cuneiformi-subrotundo, calycib. æqualibus interrupte bistriatis, stylis staminib. longiorib. W. p. 776. Jacq. p. 82. t. 45. Fol. subretusa maculata.

14. *glandulosa*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis: foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque glandulosis, stylis staminib. interiorib. breviorib. W. Jacq. p. 83. t. 46. Glandulæ pedicellatæ. Cor. alba fundo flava.

15. *tricolor*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis, foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque simpliciter pilosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Var. cor. interiore flava. p. 84. t. 47. et alba. Jacq. p. 85. t. 48.

16. *rubro-flava*, acaulis, scapo unifloro foliis paullo longiore erecto, fol. ternatis lanceolato-oblongis retusis, foliolo intermedio cuneiformi, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 87. t. 50. Cor. flava, externe rubro-marginata.

17. *flaccida*, acaulis, scapo unifloro fol. duplo longiore nutante, fol. ternatis oblongis retusis, foliolo intermedio cuneiformi, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. p. 777. Jacq. p. 88. t. 51. Cor. alba fundo flava, externe rubro-marginata.

18. *exaltata*, acaulis, scapo unifloro fol. duplo longiore stricto, fol. ternatis ellipticis emarginatis subtus villosis: foliolo intermedio cuneiformi, styl. staminib. exte-

rioribus brevioribus. W. Jacq. p. 86. t. 49. Parvius cor. et foliorum etiam ab antecendentibus distincta. W.

19. *sulphurea*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis subrotundis, calycinis foliolis margine clavato-pilosis apice reflexis, stylis staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 100. t. 63. Fol. subtus sanguinea, aureo-punctata. Cor. pallide-sulphurea.

20. *variabilis*, acaulis, scapo unifloro fol. longiore flaccido, fol. ternatis subrotundis: foliolo intermedio cuneiformi, styl. staminibus exterioribus brevioribus. Jacq. p. 89. t. 52. Rubra, flore rubro. Jacq. p. 90. t. 53. In  $\mathcal{Q}$ . cal. foliola margine glandulosa, apice pilosa et cor. carnosa-alba. In  $\beta$ . cal. simpliciter pilosi et cor. rosei coloris. W. p. 778.

21. *grandiflora*, acaulis, scapo unifloro fol. breviorere erecto, fol. ternatis subrotundis: foliolo intermedio cuneiformi, petal. truncatis, styl. staminibus exteriorib. brevioribus. W. p. 778. Jacq. p. 91. t. 54. Thunb. prodr. app. p. 189. Cor. candida, fundo flavescens.

22. *purpurea*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis subrotundis, petiol. teretibus, stylis staminib. interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 93. t. 56.

\* *laxula*, stylis intermediis, filamentis denticulatis, petiolis teretibus, foliol. exsist. saepe subus purpureiscentib. Jacq. p. 94. t. 57. Thunb. prodr. app. p. 190.

23. *humilis*, scap. unifloris, fol. ternatis: foliolo subrotundatis ciliatis. Thunb. prodr. app. p. 190. †

24. *breviscapa*, acaulis, scapo unifloro petiolis duplo breviorere, fol. ternatis subrotundis, petiolis compresso-planis, stylis staminibus interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 95. t. 58. Fol. subtus sanguinea punctata.

25. *speciosa*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis subrotundis ciliatis, stylis staminib. interioribus longioribus. W. p. 779. Jacq. p. 97. t. 60. Thunb. prodr. app. p. 189. Ehret. pict. t. 10. f. 2.

$\beta$ . *sagittata*, stylis longissimis, foliol. acutius subtus totis et supra ad oras lividis. Jacq. p. 98. t. 61. Burm. afr. p. 67. t. 27. f. 3.

$\gamma$ . *rigidula*, stylis longissimis, foliolis imbricatis. Jacq. p. 98. t. 59. Cor. majuscula, campanulata, purpureascent. Sugm. plumosa.

26. *Acetosella*, scapo unifloro, fol. ternatis obcordatis, radice dentata. L. Flor. dan. t. 980. Hab. in sylvis umbris, vere.  $\beta$ . *caerulea*, minor subvillosa.

27. *magellanica*, seapis unifloris, foliol. subrotund. emarginatis earnosis. Forst. comment. goett. p. 33. Hab. in Terra del Fuego, locis irriguis.  $\mathcal{Q}$

28. *marginata*, acaulis, scapo unifloro petiolis dimidio breviorere, fol. ternatis obcordatis, calycin. foliol. clavato-ciliatis apice reflexis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. p. 781. Jacq. p. 108. t. 68. Foliola inferne sanguinea, viridi marginata. Cor. alba fundo flavescens. W.

29. *pulchella*, acaulis, scapo unifloro petiolis triplo breviorere, fol. ternatis obcordatis, calycinis foliolis clavato-ciliatis apice reflexis, stylis staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 109. t. 69. Foliol. subtus sanguinea, aureo-punctata.

30. *obtusata*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis densae pilosis, calycinis foliol. apice rotundato-obtusis, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. p. 382. Jacq. p. 106. t. 79. f. 1. Cor. rubra. Filam. glabra. W.

31. *lanata*, acaulis, scapo unifloro foliis longiora, fol. ternatis obcordatis villosis, calycin. foliol. acutis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 104. t. 77. f. 2. Cor. alba. Filam. hirta.

32. *truncatula*, acaulis, scapo unifloro foliis duplo longiore, fol. ternatis foliolis triangularib. margine villosis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. Jacq. p. 99. t. 62. Foliola cuneiformia truncata. Cor. lilacina.

33. *strumosa*, acaulis, scapo foliis breviorere, fol. ternatis obcordatis, stylis staminibus exteriorib. brevioribus sub apice strumosis. W. Jacq. p. 102. t. 64. Foliol. fuscomaculata. Cor. alba.

34. *punctata*, acaulis, scapo foliis longiore, fol. ternatis obcordatis punctatis, stylis staminibus exteriorib. breviorib. W. p. 783. Jacq. p. 105. t. 66. Thunb. Diss. t. 1. f. 3. Hab. in collib. areosis.

35. *luteola*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis obcordatis pilosis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 103. t. 65.

36. *macrogonia*, acaulis, scapo unifloro foliis breviorere, fol. ternatis obcordatis ciliatis, styl. staminib. interiorib. longiorib. W.

20. *Arenaria*, fol. spatulatis, caule erecto bifido viscoso, ramis alternis, petal. emarginatis. L. Hab. in Hispania. Cerastium refert. Cal. subtrigonus. Rami alterni, divaricati, longitudine fere caulis. Cor. campanulata. L.

21. *scapigera*, acaulis, fol. lineari-lanceolatis trinerviis, pedunculis radicalibus unifloris. Willd. p. 216. Hab. .... Flor. magnitudine st. gramineae. W. †

120. **ARENARIA.** Cal. 5-phyllus, patens. Petala 5, integra. Caps. 1-locularis, polysperma.

\* *Fol. ovatis.*

1. *peploides*, fol. ovatis acutis carnosiss. L. Honkenya peploides. Ehrh. Beytr. 2. p. 18. Hab. ad littora maris. Glandulae in receptaculo. An diversum genus? ‡

2. *tetraquetra*, fol. ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis, flor. subcapitatis. L. Allion. pedem. t. 89. f. 1. β. Gypsophyla aggregata. L. Sp. pl. 2. p. 581. Hab. in Pyreocis, Monapeli et Turin.

3. *biflora*, fol. obovatis obtusis, caulib. procumbentibus, pedunc. bifloris lateralibus. L. Allion. ped. t. 44. f. 1. et t. 64. f. 3. Jacq. ic. rar. 1. t. 89. Hab. in Eur. australis alpinis. ‡

4. *lateriflora*, fol. ovatis obtusis, pedunculo laterali bifloro. L. Hab. in Sibiria. Caul. filiformis, simplicissimus.

5. *trinervia*, fol. ovatis acutis petiolatis nervosis. L. Flor. dan. t. 439. Hab. in sylvis, etiam super salices.

6. *ciliata*, fol. oblongo-obovatis subpetiolatis ciliatis, cor. calyce majoribus, cal. foliol. lanceolatis subnervosis. Wulf. Jacq. Coll. 1. p. 245. t. 16. f. 2. Flor. dan. t. 346. Hab. in alpinis. Fol. tuberculis aspera.

7. *balearica*, caespitosa repens, fol. ovatis lucidis subcarnosis, caule repente, pedunculis elongatis unifloris. L. Hierit. stirp. t. p. 29. t. 15. A. muscosa. Medic. Hab. in insul. Balearibus. Plantula elegans, caespitem latum efficiens.

8. *multicaulis*, fol. pulposo-subcoriaceis ovato-lanceolatis sessilibus ciliatis, cor. calyce majoribus, cal. foliol. ovato-lanceolatis subnervosis. Jacq. Collect. 1. p. 248. t. 17. f. 1. Hall. t. 17. Hab. in alpinis.

9. *serpillifolia*, fol. subovatis acutis sessilibus laevibus, corol. calyce brevioribus. L. Hab. in sylvis glareosis, agris.

10. *ruscifolia*, fol. (minimis) coriaceis ovatis acuminatis, flor. subpaniculatis dichotomis, cal. subcampanulatis acutis, petal. cal. longioribus. Poir. enc. p. 365. Hab. .... Quoad fol. A. serpillifoliae similis.

11. *spathulata*, caul. erecto filiformi pubescente, fol. inferioribus spatulatis, petal. obovatis cal. longioribus. Def. atl. 1. p. 358. A. *cerastioides*. Poir. enc. 6. p. 361. Hab. in Barbariae arenosis et sylvaticis. Caul. et pedunc. viscosi. Flor. axillares subpaniculati.

\* \* *Fol. linearibus.*

12. *procumbens*, fol. lineari-lanceolatis, caulib. prostratis villosis, petal. calyce brevioribus. Vahl. symb. 2. p. 50. t. 33. A. geniculata, fol. linearibus, flor. paniculatis pubescentibus, petal. calyce brevioribus. Poir. A. *herniariaefolia*. Desf. atl. p. 359. Hab. in ruderatis Tuneti inque Aegypti.

13. *polygonoides*, fol. linearibus, caulib. procumbentibus, pedunc. bifloris terminalibus erectis, calyce subviscidis enerviis. Wulf. in Jacq. Collect. 1. p. 241. t. 15. Segu. veron. 3. p. 177. t. 4. f. 1. Hab. in alpinis Helvetiae, Carinthiae. ☉

14. *cerastoides*, caul. bifloro, fol. breviusculis subovatis glabris acuminatis, cal. ovato-lanceolatis, petal. ellipticis brevioribus. Hab. in Pyrenaeis. Mirb. Caespitosa, parvula. Cal. lacin. subalbo-marginatis glabris.

15. *Villarsii*, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus subrigidis, caul. erecto trifloro. Balbis Miscell. bot. p. 21. A. *triflora*. Vill. Delph. 3. p. 623. t. 47. Hab. in Delphinatu et in alpin. Vallis Pissii et Tendae. Molineri. Au potius Stellariae species? cujus habitu est. Petal. emarginata?

16. *montana*, fol. lineari-lanceolatis, caulib. sterilibus longissimis procumbentibus. L. Vent. Hort. Cels. t. 34. β? A. *linearifolia*. Poir. enc. 6. p. 366. Hab. in Europ. australiori montibus. Stellar. aut Cerast. refert. ‡

17. *calycina*, glaberrima, fol. graminis brevibus, pedunc. longissimis subunifloris, petal. lanceolatis hyalinis, cal. multo brevioribus. Poir. enc. 6. p. 370. Hab. in Barbariae subhumidis. Facie Stellar. gramineae.

18. *bavarica*, fol. semicylindricis carnosiss obtusis, petal. lanceolatis, pedunc. terminalibus sublinatis. L. Saxifraga bavarica. Rnj. hist. 1013. Hab. in Bavaria, Baldo, Sibiria. Caul. stipulaceus? ‡

19. *gypsophioides*, fol. linearibus: radicalibus subcæcis, panic. subpubescente fastigiata, pet. lanceolatis, cal. natis longioribus. Willd. p. 723. Hab. in Oriente. Staturs A. saxatilis. Caul. semipedalis ascendens. Panic. brachiata, subfastigiata, pedicellis ultimis subulosis. S.

20. *cucubaloides*, fol. linearibus margine scabris, panic. dichotoma pubescente, petal. obovatis. Smith. ic. ined. t. p. 17. t. 17. Tournef. cor. 17. Hab. in Armenia. Cal. viscosus. Pedic. glabri? L.

21. *dianthoides*, fol. linearibus margine scabris, bracteis ventricosis pedunculatis superantibus. Smith. l. c. p. 10. t. 16. Hab. in Armenia. L.

\*\*\* *Fol. lineari-subulatis.*

22. *triflora*, fol. lineari-subulatis basi ciliatis: floralibus calycibus ovato-acuminatis subjunctis, caul. diffuso, ramis erectis saurifloris. Cav. ic. 3. p. 26. t. 249. f. 2. Willd. p. 721. In Eur. australiori. Petal. cal. striato duplo fere longiora.

23. *saxatilis*, fol. subulatis, esulibus paniculatis, calyc. foliolis ovatis obtusis. L. A. fol. subulatis, calycis laciniis membrana ipsa latiore acutis obtusis. Guett. stamp. 2. p. 281. Hab. in Europa. L. +

24. *verna*, fol. subulatis obtusiusculis nervosis, caulib. subpaniculatis elongatis, calycib. acuminatis striatis. L. J. q. aust. 5. p. 2. t. 404. Hab. in Eur. australior. alpinis. Petal. cal. longiora?

β. *cæspitosa*, caul. basi ramosissimo radicato, fol. lineari-subulatis striatis, pedunc. pubescentib. 1-2-floris subfastigiatis, cal. foliol. ovatis striatis petal. æquantibus. A. cæspitosa. Ehrh. Hab. in Hercynia, Pyrenæis. Cal. latere purpureo. Ab A. *verna* non distincta dicitur; tamen in speciminibus hoc nomine in Herbariis occurrentibus, pedunc. vili elongatis, 2-3-floris, et cor. cal. multo longiore.

Obs. A. *faccida* et *utilinosa* Schleicheri hujus aut A. *vernæ* varietates videntur. Cal. et folia minus striata sunt.

25. *obtusata*, fol. linearib. obtusis, cal. ovato-lanceolato viscido petal. subæquantibus. Allion. l. c. p. 114. Hall. helv. 861. Hab. in pascuis saxosis alpinis. Pet. ovata. +

26. *recurva*, fol. radicalib. congestis recurvis subulatis, caul. simpliciter subtrifloro, cal. ovatis striatis. Allion. pedem. n.º. 1713. t. 89. f. 3. Wulf. in Jacq. Coll. 2. p. 244. t. 6. f. 1. Hab. in alpinis.

27. *glabra*, suberecta multicaulis, fol. subulato-linearibus planis patulis, petic. elongatis divaricatis, cal. foliol. ovalibus laevibus cor. brevioribus. Michaux. Flor. t. p. 274. Hab. in rupib. Car. septentrional. Affin. Sted. 1-floræ. Walt. dicitur.

28. *stricta*, multicaulis. Labra stricta, fol. subulato-linearib. erectis, cal. foliol. ovali-lanceolatis striatis cor. breviorib. Michaux. In rupib. Amer. bor.

29. *scabra*, minuta, fol. lanceolato-acutis patentibus saabris, pedunc. paniculatis dichotomis, cal. asperis corol. brevioribus, caul. simpliciter brevissimis. Poir. l. c. Hab. in alpium rupibus aridis.

30. *echinata*, pumila, fol. filiformibus subulatis, flor. subpaniculatis, calycib. pedunculatis hispidis glandulosis, cor. calicem æquante. Poir. enc. 6. p. 377. Hab. in alpinis. Fol. tantum subpubescentia.

31. *hispida*, fol. subulatis subtus hispidis. L. Hab. Mompell. Habitus Spergulae. Fol. subtus pilis hispida. Panic. primum dichotoma. L. +

32. *verticillata*, fol. subulatis spinosis floribusque verticillatis. Willd. p. 725. Tournef. cor. 18. Hab. in Armenia. Rami lignosi, nodosi. Pedunc. quadriflori subcapitati axillares. Cal. foliola pungentia. Petala lanceolata. W.

33. *austriaca*, fol. linearibus, ramis erectis, pedunc. terminalib. longissimis binis, petal. obtusis emarginatis. Willd. p. 728. Jacq. Flor. aust. 3. t. 200. Allion. t. 64. f. 2. Hab. in Austria et Italiae alpinis.

\* *Stellarioides*. *Stellaria biflora*, caulib. prostratis ramosissimis, ramis annuis erectis longissime bifloris, fol. linearib. acutis, calycibusque dorso trinerviis, petal. calyce longioribus crenato-bifidis. Jacq. Collect. t. p. 251. t. 18. Var. antecedentis, Willd.

34. *grandiflora*, fol. subulatis planis striatis: radicalibus confertis, caulib. subunifloris. L. Allion. pet. t. 10. f. 1. Allion. spec. pedem. 49. t. 20. f. 1. Hab. in montib. et alpinis. L.

35. *echerterioides*, caespitosa, repens, fol. linearibus sulcatis imbricatis, calycinis æqualibus. Vill. Dauph. 3. p. 626. A. *lanceolata*. Allioni. Hab. in rupibus alpestris. Cor. cal. brevior. Fol. subovata.

36. *liniflora*, caulib. erectis inferne ramosis suffruticosis, fol. subulatis, flor. geminis. Lau. suppl. p. 241. Jacq. Coll. 2. p. 107. t. 3. f. 3. A. striata. Vill. delph. 3.

p. 630. t. 47. Hab. in Eur. australi. Caul. divaric. Cal. foliol. lanceolatis: striis 2. Cor. magnitudine lini. L.

*Obs.* Differt ab *A. grandiflora*, fol. non plano-gramineis, cal. foliolis non multistriatis, caule multo longiore, basi fruticoso. L.

37. *Gerardi*, fol. linearibus subulatis trinerviis, flor. geminis terminalibus, calycin. foliolis acuminatis margine membranaceis trinerviis. Willd. p. 729. A. liniflora. Jacq. aust. 5. t. 445. Gerard. prov. 405. t. 15. f. 1. Hab. in Austr. et Gall. alpinis.

38. *junci-perina*, fol. subulatis spinosis, caulib. erectis, calycib. striatis, capsulis oblongis. L. Smith. ic. inel. 1. p. 35. t. 35. Lam. ill. t. 378. f. 2. Hab. in Armenia. Flor. paniculati. Cal. oblongi, 5-nervi. Pet. lanceolata. L.

\*\*\*\* *Folii setaceis.*

39. *sibirica*, fol. caespitosis setaceis longissimis, caul. subnudo umbellato-trifloris, cal. ovato obtuso cor. multo minoribus. A. capillaris. Poir. in Enc. bot. 6. p. 380. Hab. in Sibiria Patr. Pl. elegans. Pet. ovalia.

40. *capillacea*, fol. setaceis rigidis glabris, flor. erectis, petal. cal. majoribus. Allion. pedem. t. 86. f. 2. Hab. in agro pedemontano. †

41. *laricifolia*, fol. setaceis, caule superne nudo, calycib. subhirsutis. L. Jacq. aust. 3. p. 19. t. 272. Magnol. hort. 11. t. 11. Hab. in montosis. Cal. oblongus, lineatus, cylindricus, pubescens. L.

42. *striata*, fol. linearibus erectis appressis, calycib. oblongis striatis. L. Allion. l. c. t. 26. f. 4. Cum priore saepe confunditur. Au var. ? Hab. in alpinis.

43. *patula*, pubens, caul. paniculatis multifloris, fol. setaceo-subulatis subfasciculatis patentibus, petal. submarginatis, cal. striato acuto sublongioribus. Michaux. Flor. 1. p. 273. Hab. in rupibus circa Knoxville. Faeie *A. tenuifoliae*. Cal. cor. brevior.

44. *tenuifolia*, fol. oppositis subulatis setaceis solitariis, cauleque ramosissimo dichotomo glabris, cal. subulatis striatis cor. longioribus. L. Lam. ill. t. 378. f. 2. Engl. bot. t. 219. Vaill. paris. t. 3. f. 1. Hab. in agris et ad muros. Pet. subovata. Fol. glabra. Caul. non stipulaceo ab *Als. vegetali* differt.

45. *viscosa*, minor erecta piloso-viscida, fol. subulatis basi dilatatis striatis, cal. acu-

minatis. Thuill. Flor. paris. p. 279. Hab. in arenosis, praesertim in sylva prope Romainville. An diversa ab *Als. viscosa*?

46. *heteromalla*, caul. ramosissimo, flor. paniculato-fasciculatis, fol. setaceis fasciculatis secundis, cal. ovato acutis margine lato albo. *A. saxatilis* auctorum. Vaill. paris. 7. t. 2. f. 3. *A. setacea*. Thuill. Hab. in rupibus et in arenosis. Caul. basi lignosus, pubescens, fusco-ruber. Fol. basi ciliata. Flor. gypsoph. prostratae, cal. subcampulatus.

47. *fasciculata*, fol. subulatis et fasciculatis setaceis, caul. erecto stricto subsimplice, flor. fasciculatis, cal. acuminatis, petalis brevissimis. Jacq. austr. 2. t. 182. Hab. Monspelii et in Austria. Non confundenda cum *Bufonia tenuifolia*. ☉

β. *rostrata*, caul. ramosissimo, subpaniculato, fol. setaceis internodiis subbrevioribus alternis subfasciculatis, cal. fol. conniventibus subulatis. *A. saxatilis*. Vill. Delph. 3. p. 631. Hab. in Gallia meridionali.

*Obs.* Media quasi inter heteromallam et *A. fasciculatam*. Caul. basi decumb. subfrutescent, ram. erectis tenuibus. Cal. albidus, dorso viridis, subcylindricus, longus rostriformis. Fol. non unum latus spectant.

48. *filifolia*, caulib. suffruticosis dichotomis, fol. setaceis, petunc. terminalibus simplicibus unifloris. Vaill. symb. 2. p. 33. t. 12. Hab. in Arabia.

SPERGULARIA. Habitu *Spergulae*. Flor. *Arenariae*. Caul. ad genicula *stipulaceus* (humifusus).

49. *rubra*, caul. prostratis glabris, fol. filiformibus internodiis brevioribus, seminibus compresso-angulatis. *A. rubra* campestris. L. Roth. germ. 2. p. 481. Smith. brit. 2. p. 479. Hab. in agris, arenosis, subhumidis. Cal. caps. aequans.

50. *media*, caul. prostratis, fol. semicylindricis carnosius internodiis aequantibus, seminibus compressis margine alatis. *A. media*. L. Willd. p. 722. Flor. dan. t. 740. *A. marina*. Roth. l. c. 7. Hab. in pascuis et arenosis maritimis. Priore multo major. Cal. caps. brevior.

51. *canadensis*, fol. linearibus, carnosius internodiis multo longioribus, staminibus 5, caps. globosa. *A. rubra*. β. Michaux. Flor. 1. p. 274. Hab. in Canada ad hum. St. Laurentii. Pedunc. reflexi. Caps. cal. longior.

52. *purpurea*, caul. erecto piloso ramis divaricatis, fol. subsetaceis internodiis

dimidio brevioribus. Habit. in Hispania. Thiebaut. Pl. pulchella, gracilis. Cor. anemone rubra.

*Obs.* Hae species aut Spergulis, ab his enim stylosum numero tantum differre videntur, associandae, aut sub peculiari genere, cui *Alsine* aequalis L. addi possit, ab Arenariis separandae, cum quibus seriem haud naturalem efficiunt.

1121. *CHERLERIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Nectar* 5, bifida, petaloidea. *Anther.* alternæ, steriles. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis, trisperma. L. (polyperma. Sm.)

1. *sedoides*. L. Jacq. austr. t. 284. Lam. ill. t. 329. Smith. brit. 2. p. 481. Hab. in alibus. Fol. triquetra, subulata. Flor. lutescentes. Petal. 6?

1122. *DEUTZIA*. *Cal.* campanulatus, 5-fidus. *Petal* 5, obtusa, indivisa. *Filam.* trifida. *Caps.* triaristata, 3-locularis, 3-valvis, basi debiscens, polyperma.

1. *scabra*. Thunb. jap. p. 185. t. 24. Lam. ill. t. 380. Hab. in Japonia. Fol. opposita ovata scaberrima. Racemi terminales. W.

1123. *HORTENSIA*. Flor. difformes: flor. solitarii *Cal.* 5-dentatus, minutus. *Cor.* 5-petala. Flor. cymam constituentium *Cal.* 4-5-phylus, maximus, coloratus, petaloideus, persistens. *Cor.* minuta, subglobosa: petal. 4-5, concavis deciduis. *Fruct.* (Stam. 8, 10, 11.)

1. *speciosa*, fol. late ovatis serratis acuminatis, flor. cymosis. *Hydrangea hortensis*. Smith. ic. piet. 1. p. 12. t. 12. Willd. Sp. II. p. 633. Roib. N. bot. beyr. p. 202. H. opuloides. Lam. enc. 3. p. 136. Ej. ill. t. 380. Hab. sponte in India, nunc oruamenti causa ubique colitur.

*Obs.* Flor. primo albidio-virentes, tandem anemone rosæ; ob sterilitatem, fructum enim nondum perfecerunt, longe durant, denum marcescunt. Var. flor. purpureo-violaceis. An potius *Hydrangea* species? sed flor. trigyni. Nonnulli hoc genus, forte minus recte, ad familiam Rhamnorum retulerunt, forsam ob florum similitudinem cum *Viburno* opulo.

1124. *GARIDELLA*. *Cal.* 5-phylus, petaloideus. *Nect.* 5, bilabiata, bifida. *Caps.* 3, connexæ, polysperma.

1. *Nigellastrum*. L. Ism. ill. t. 379. G. fol. tenuissime divis. Garid. prov. 203. t. 39. Hab. in Galloprovincia. ☉

*MALFIGIACEÆ* (Gen. 1124-1129.) praesertim digioscuntur petal. 5-unguiculatis s. pedicellatis, cal. laciniis persistentibus alternis, et cum staminibus 10 disco hypogyno insertis. Styli 1-3. Pericarp. est vel capsula vel bacca, plerisque vero samara s. nux alata. Fol. sunt integra substipulacea. Fruticulosae sunt vel arbusculaeformes. J.

1125. *MALFIGIA*. *Cal.* 5-phylus, basi extus poris binis melliferis. *Petal* 5, subrotunda, unguiculata. *Filam.* basi coherentia, (aut libera.) *Drupa* 1-locularis tripyrena, nucibus monospermis.

1. *glabra*, fol. ovatis integerrimis glabris, pedunc. umbellatis. L. Mill. ic. t. 181. f. 2. Cav. diss. 8. p. 406. t. 214. f. 1. Willd. Sp. II. p. 731. Hab. in Amer. australi. Umbellae 4-florae.

2. *biflora*, fol. ovato-lanceolatis acutiss. pedunc. bifloris. Lam. enc. 4. p. 326. M. puniceifolia. Cavan. l. c. p. 406. t. 214. f. 2. Hab. in sylvis Amer. calidioris. h

3. *punicifolia*, fol. ovatis integerrimis glabris, pedunc. unifloris. L. Lam. enc. l. c. Plum. gen. 1. 166. f. 2. Hab. in Amer. meridionali. h

4. *faginea*, fol. oblongo-ovatis integerrimis, subtus sericeo-nitentibus, pedunc. tripartito-umbellatis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 850. Hab. in ins. Grenada Americæ. h

5. *glandulosa*, fol. ovato-ellipticis acuminatis integerrimis glabris, basi liglandulosis, racem. axillaribus. Willd. p. 733. Flor. racemosis monogynis. Cav. l. c. p. 411. t. 219. f. 2.

6. *glandulifera*, fol. ovatis subintegerrimis, utrinque pilis decumbentibus, obtusis, racem. axillaribus, pedicell. superne glandula truncata instructis. Jacq. ic. rar. 3. t. 469. Hab. in Antillis; 6. in sylvis ad Caracas. h

6. *tuberculata*, fol. ovato-lanceolatis in-



tegerimis subpubescentibus, racem. lateralibus, ramis tuberculatis. Willd. Jacq. Schoenb. 1. p. 54. t. 104. Hab. ad Caracas Americæ. h

7. *nitida*, fol. oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis axillaribus, floribus monogynis. Willd. Cav. p. 411. t. 239. f. 1. Hab. in Jamaicae apricis cretaceis. Montegynia. h

8. *Armeniaca*, fol. ovato-oblongis acutis integerrimis coriaceis glabris, racem. axillaribus. Willd. Cavan. p. 410. t. 239. Hab. in Peruvia. Fructus refert Prunum Armeniacum h

9? *dubia*, fol. ovato-acutis cartilagineis glabris, floribus racemosis minimis, ramis punctatis. Cavan. l. c. p. 413. t. 242. Hab. in ins. St. Dominici. Fructus ignotus. †

10. *urens*, fol. oblongo-ovatis: setis decumbentibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis. L. Mill. dict. ic. t. 181. f. 1. Cav. p. 407. t. 235. f. 1. Lam. ill. t. 381. f. 1. Hab. in Amer. calidiore.

11. *angustifolia*, fol. lineari-lanceolatis: setis utrinque decumbentibus rigidis, pedunc. umbellatis. L. Cav. p. 408. t. 236. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. h

12. *canescens*, fol. oblongis obtusis pubescentibus, racem. axillaribus compositis. Aubl. Kew. 2. p. 105. Hab. in India occidentali. h

13. *crassifolia*, fol. ovatis integerrimis obtusis subustomentosis, racem. terminalibus. L. Aubl. gnj. 1. t. 182. (β? *Mourcila*, fol. ovatis subustomentosis acutis? flor. luteis spicatis. Aubl. gnj. 1. p. 450. t. 183. Hab. in Amer. calidiore. An (β. distincta? Arb. h

\* *macrophylla*, fol. ovatis latissimis subtus ferrugineo-tomentosis. Hab. in Brasilia? (Herb. Juss.)

14. *spicata*, fol. lanceolatis subtus ferrugineis, spicis terminalibus, petalis hastatis Cav. diss. 8. p. 409. t. 237. Hab. in insula St. Dominici. Arb. 30-pedalis. Cor. flava. Var. quoad folia. h

15. *altissima*, fol. ovato-oblongis subtus tomentosis, flor. albis spicatis. Aubl. gnj. 1. p. 455. t. 181. Cav. diss. 8. p. 413. Hab. in sylvis Guianæ. Arb. 60-80-pedalis. Priori æquis. h

16. *verbascifolia*, fol. lanceolato-ovatis tomentosis integerrimis, racemis terminalibus. L. Aubl. 1. t. 184. Cav. 8. p. 411. t. 240. Hab. in Amer. calidiore. h

17. *lucida*, fol. obovatis cuneiformibus integerrimis aveniis nitidis, racemo terminali. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 852. Hab. in Ind. occid. h

18. *coriacea*, fol. ovatis acutis integerrimis utrinque glabris, racemis terminalibus spicatis. Swartz. l. & 2. p. 854. Sloan. bist. 2. p. 20. t. 161. f. 1. Hab. in fruticetis mont. Jamaic. australis. h

19. *aquifolia*, fol. lanceolatis dentato-spinosis subtus hispidis. L. pl. 611. Cavan. diss. 3. p. 409. t. 216. f. 2. Plum. gen. 46. ic. 168. f. 1. Hab. in Amer. calidiore. h

20. *coccifera*, fol. subovatis dentato-spinosis. L. Cavan. 8. p. 408. t. 235. f. 2. Jacq. ic. rar. 3. t. 470. Flor. rubelli. Hab. in America. h

Obs. Planta junior proferit fol. elliptica absque dentibus: vid. Lam. ill. gen. 1. 381. f. 2. Willd. quæc M. *microphylla* quorund.

† GALFIMIA. Cavan. Cal. glandulis nullis. Filam. libera. Stigm. simplicia. Fruct. trilobulari. Cavan.

21. *glauca*, caul. fruticoso, fol. ovatis, flor. racemosis terminalibus. Cavan. ic. 5. p. 61. t. 489. Hab. in R. mexicano, cum sequentibus. Cor. flava. Styli rubri.

22. *hirsuta*, caul. fruticoso, fol. ovato-acutis hirsutis, racem. terminalibus. Cav. l. c. p. 62.

23. *glandulosa*, caul. fruticoso glabro, fol. lanceolatis, petiolis biglandulosis. Cav. ic. 6. p. 43. t. 503.

1126. BANISTERIA. Cal. 5-partitus, basi extus parvis binis melliferis. Petala subrotunda, unguiculata. Filam. basi coherentia. Samaræ 3, 1-spermæ apice simpliciter alatae. (Arb. aut Frut. ut plurimum scandentes.)

1. *angulosa*, fol. coriatis palmuliformibus angulosis, petiolis biglandulosis, umbella terminali. Willd. p. 737. Cav. diss. 9. p. 426. t. 252. Hab. in America calidiore. h

2. *palmata*, caule volubili, fol. palmatis subtus tomentosis, petiolis biglandulosis. Cavan. l. c. 9. p. 430. t. 257. f. 2. Hab. in ins. St. Domingo. h

3. *sagittata*, fol. hastato-sagittatis, lobis truncatis, subtus tomentosis, petiolis biglandulosis. Willd. Cavan. diss. 9. p. 430. t. 257. f. 3. Hab. ad St. Domingo. h

4. *auriculata*, caule volubili, fol. subsegiatis, glabris, lobis rotundatis, floribus umbellatis. Cav. l. r. p. 418. t. 255. Hab. in Brasilia prope Rio Janeiro. h

5. *ciliata*, fol. orbiculato-rotundatis ciliatis, dentatis glabris, petiolis biglandulosis, umb. terminali. Willd. Lam. enc. 1. p. 364. Cav. diss. g. p. 427. t. 254. Hab. in Brasilia. Commers. h

6. *emarginata*, fol. ovatis subcordatis apice emarginato-cuspidatis, desuper tomentosis, floe. racemoso-corymbosis. Cav. Hab. in America. Caul. dichotomus. W.

7. *Quapara*, fol. ovatis acutis, subtus tomentosis, umbella pedunculata axillari. Willd. Aubl. guj. 1. p. 464. t. 186. Cav. g. p. 425. t. 250. Hab. ad pratorum margines Gujanæ. h

8. *sinemariensis*, fol. ovatis acuminatis glabris setis adpressis teretibus, umb. racemosis axillariibus. Willd. Fol. ovatis acuminatis, florib. luteis corymbosis. Aubl. 1. p. 402. t. 185. Cav. p. 425. t. 251. Cam. prior.

9. *purpurea*, fol. subrotundo-ovatis obtusis glabris, racemis axillaribus terminalibusque, seminibus erectis. L. Cav. diss. g. p. 423. t. 246. f. 1. Hab. in America meridionali. h

10. *microphylla*, fol. ellipticis utrinque rotundatis glabris, racemis terminalibus subpaniculatis. Willd. Jarq. obs. 3. p. 7. t. 56. Hab. in Carolina? h +

11. *chrysophylla*, fol. ovato-oblongis acutiusculis, versus apicem obsolete sinuatis, subtus tomentosis nitidis aureis. Lam. enc. 1. p. 368. Cav. diss. g. t. 245. Jarq. Schoenh. 1. p. 55. t. 105. Hab. in Brasilia, et ad Caracas. h

12. *laurifolia*, fol. ovato-oblongis rigidis, racemis terminalibus. L. Hab. in Jamaica et Hispaniolæ fruticetis montium. h

13. *caerulea*, fol. ovatis acutis, racem. axillaribus brachiatis, capsulis trinis monopteris divaricatis. Lam. enc. 1. p. 367. Cav. diss. g. p. 421. t. 243. Hab. in America calidiore. h

14. *nitida*, fol. ovato-oblongis integerrimis subtus nitidis, panicula terminali foliosa. Lam. enc. 1. p. 369. Cav. t. 244. Hab. in Brasilia. h

15. *muricata*, fol. ovatis subtus tomentosis, racemis paniculatis terminalibus, sa-

maris aculeatis. Willd. Cavan. l. c. p. 443. t. 246. f. 2. Hab. in Peru. h

16. *leona*, fol. ovato-oblongis acuminatis coriaceis reticulato-venosis glabris, ramis paniculatis terminalibus. Willd. Cavan. g. p. 424. t. 247. Lam. ill. t. 381. Hab. in Sierra Leone. h

17. *sericea*, ramis angustibus, fol. ovatis subtus tomentosis, petiolis biglandulosis, flor. racemosis. Cavan. diss. g. p. 429. t. 258. Hab. in Brasilia. h

18. *ferruginea*, fol. ovatis acuminatis subtus ferrugineis, racemis paniculatis, ramulis squamosis. Willd. Cavan. t. 248. Hab. in Brasilia ad Rio Janeiro. An diversa a *B. fulgencia*. L.? h +

19. *longifolia*, fol. oblongis acuminatis rigidis nitidis, panicula terminali, ramis potentissimis. Sw. Fl. ind. orchid. 2. p. 856. Hab. in Caribæis.

20. *macrocarpa*, fol. oblongis acuminatis, florum spica composita, fruct. alis latissimis obliquis cotundatis. Hab. in Martinica. (Herb. Juss.)

21. *dichotoma*, fol. ovatis, racemis dichotomis. L. *Convolvutifolia*, fol. ovatis acumine productis glabris, flor. umbellatis. Cav. diss. g. p. 423. t. 256? Hab. in America calidiore. h

22. *ovata*, fol. ovato-lanceolatis subtus subvillosis, petiolis biglandulosis, ramis divaricatis, umb. terminalibus. Willd. Cav. t. 257. f. 1. Hab. in ins. St. Dominici. h

23. *fulgens*, fol. subovatis subtus tomentosis, racemis brachiatis, pedunc. umbellatis. L. Triopteris, fructu fulgente majore aureo. Pluk. mant. 185. Hab. in America. h

24. *heterophylla*, fol. subtus tomentosis orbiculato-rotundatis, ramis divaricatis subrotundis, petiolis biglandulosis, umb. terminali sessili. Willd. Cav. l. c. p. 426. t. 253. Sloan. hist. 2. p. 27. t. 162. f. 2. Hab. in America meridionali.

25. *brachiata*, fol. subovatis, ramis brachiatis, seminibus inversum angustioribus. L. Hab. in America.

1127. *HIRÆA*. Cal. 5-phyllus, absque poris melliferis. Petala subrotunda, unguiculata. Filam. basi coherentia. Samaræ 3; 1-spermae bialatæ.

1. *reclinata*, fol. simplicibus, obovatis ob-

tosis superne pubescentibus, inferne glabris Willd. Sp. II. p. 743. Hab. Carthagenae in sylvis. h

2. *odorata*, fol. simplicibus ovatis acutis superne glabris, inferne tomentosis. Willd. Hab. in Guinea. Fol. venosa superne atroviridia, inferne tomento flavescenti villosa adpresso tecta.

3. *pinnata*, fol. impari-pinnatis, foliol. ovato-oblongis altern. utrinq. glabris. Willd. Flabellaria paniculata. Cav. diss. 9. p. 436. t. 264. Hab. in Sierra Leone. h

Obs. An cum sequente genere potius conjungi debet?

1128. **TRIOPTERIS.** *Cal.* 5-partitus, basi extus poris 2-mellisferis, *Petala* subrotunda, unguiculata, *Filam.* basi coherentia. *Stigm.* 3-6. *Samar.* 3, 1-spermae 3-a atq.

1. *jamaicensis*, fol. oblongis acuminatis venosis nitidis, racemis compositis terminalibus laxis, fructib. trialatis. Sw. obs. 183. Hab. ad sepes Jamaicae, Hispaniolae.

2. *indica*, fol. subrotundo-ovatis subcordatis acuminatis nitidis glabris, racemis compositis terminalibus, fructib. trialatis. Willd. p. 744. Hab. in India orientali. Ped. et calyces pubescentes, Samar. alae aequales venosae. W.

3. *ovata*, fol. ovatis obtusiusculis subcordatis glabris, petiolis biglandulosi, racemis compositis terminalibus, fructib. trialatis. Willd. Cav. l. c. p. 435. t. 259. Hab. in insula St.-Dominici. h

4. *rigida*, fol. subrotundis acutis marginatis lineatis coriaceis, racem. compositis axillaribus, fructib. trialatis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 859. Hab. in fruticetis montosis Hispaniolae. h

1129. **TETRAPTERIS.** *Cal.* 5-partitus, utrinque biglandulosus. *Petala* ambriata, unguiculata. *Fructus* quadrialatus, alis 2-inferioribus minoribus.

1. *acutifolia*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, floribus paniculatis terminalibus. Cav. diss. 9. p. 433. t. 561. Triopteris. Willd. Sp. II. p. 744. Hab. in Cajenna. h

2. *mucronata*, fol. ovatis mucronatis glabris, flor. umbellatis. Cav. l. c. p. 434. t. 262. f. 2. Hab. in Cajenna. h

3. *buxifolia*, fol. ovatis subsessilib. paucis, flor. umbellatis terminalibus. Cav. l. c. t. 262. f. 1. Hab. in Antillis. h

4. *citrifolia*, fol. ovato-oblongis acutis glabris, umbellis axillaribus pedunculatis, fructibus quadrialatis, alis binis inferioribus brevioribus. Willd. p. 745. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 857. sub Triopteride. T. inaequalis, fol. ovato-acutis sub cordatis glabris, flor. umbellatis, alis inferioribus brevioribus. Cav. l. 260. Hab. in sylvis montium Jamaicae. h

1130. **ERYTHROXYLON.** *Cal.* turbinatus. *Cor.* petalis basi squamula nectarifera emarginata. *Siam.* basi connexa. *Drupa* 1-locularis.

1. *areolatum*, fol. obovatis mucronatis, pedunculis lateralibus aggregatis flore duplo longioribus. Willd. Sp. II. p. 716. Jacq. amer. 134. t. 87. f. 5. Ed. pict. 1. 129. Brown. jam. 278. t. 8 f. 2. Hab. in maritimis circa Carthagenam Amer. h

2. *hypericifolium*, fol. obovatis emarginatis, pedunc. lateralibus subsolitariis, flore triplo longioribus. Willd. Lam. enc. 2. p. 394. Cavan. diss. 8. p. 403. t. 230. Hab. in insula Mauritii et Bourbon. h

3. *buxifolium*, fol. obovatis integerrimis, nervo medio supra elevato, pedunc. axillaribus brevibus solitariis basi utriculatis. Lam. l. c. 2. p. 394. Cav. l. c. p. 403. t. 231. f. 1. Hab. in Madagascar. h

4. *ferrugineum*, fol. ovatis saepius emarginatis subtus ferrugineis, squamulis imbricatis, flor. solitariis. Cav. p. 404. t. 131. f. 2. Hab. cum priore.

5. *rufum*, fol. ovatis coriaceis inferne rufis, squamulis imbricatis, axillis multifloris. Cav. l. c. t. 232. Hab. in Amer. meridionali. h

6. *havanense*, fol. ovatis, squamulis imbricatis, flor. subsolitariis, drupa gibbosa. Cavan. t. 233. Hab. Havanae in rupesribus maritimis. h

7. *Coca*, fol. oblongis obtusiusculis venosis, subtus trilineatis, pedunc. lateralibus sparsis flore brevioribus. Willd. Lam. enc. 2. p. 383. Cav. 8. p. 402. t. 229. Hab. in Peru. Fol. venosa.

8. *Syderoxyloides*, fol. ovato-oblongis obtusiusculis, ramis scabris apice compressis, pedunculis subternis axillaribus. Lamarck.

enc. 2. p. 393. Cav. diss. 8. t. 228. Pluk. anath. 187. t. 442. f. 3. Hab. in ins. Bourbon. h

9. *squamatum*, fol. elliptico-lanceolatis acuminatis obtusis, ramulis squamosis floriferis. Vahl. symb. 3. p. 60. t. 61. Swartz. Flor. 2. p. 851. Hab. in Cajenna inque Caribaeis. h

10. *macrophyllum*, fol. elliptico-acuminatis, axillis multifloris, squamis lanceolato-subulatis semilamplexicaulibus striatis. Vahl. eclog. 2. p. 33. Cavan. p. 401. t. 227. Hab. in Cajenna. h

11. *laurifolium*, fol. lato-lanceolatis, squamis acutis concavis, flor. glomeratis terminalibus. Cavan. p. 400. t. 226. Hab. in insula Mauritii. h

12. *longifolium*, fol. oblongis crassis nitidis, squamulis acutis deciduis, floribus axillaribus. Cavan. p. 399. t. 225. Lam. l. c. p. 394. Hab. in Madagascar. h

13. *monogynum*, fol. ovato-lanceolatis, flor. axillaribus monogynis. Roxb. Corom. t. 88. Hab. in India. Stigm. 3.

# TETRAGYNIA.

1131. *MICROPETALON*. Cal. 5-phyllus. *Petala* (minutissima), integra, aut nulla. *Caps.* ovata, cal. longior, 4-valvis. (Habit. *Stellariae*. *Spergulastrum*. Mich.)

1. *lanuginosum*, pubescent, fol. lanceolatis in petiolum angustatis, flor. apetalis. *Spergulastrum*. Michaux. Flor. 1. p. 275. Hab. in meridionalibus Amer. septentrional. Pedunc. subsolitarii, longi, demum reflexi.

2. *lanceolatum*, glabrum, fol. lanceolatis utrinque angustatis. Michaux. l. c. Hab. in Amer. boreali. Petala brevissima, ovalia. Flor. paniculati.

3. *gramineum*, glaberrimum, fol. linearibus, erectis. Michaux. p. 276. Hab. in Pennsylvania. Stell. gramineam exakte refert. Flor. corollati.

Obs. Hae plantae genus naturale cum *Stellariis* efficere videntur.

# PENTAGYNIA.

*Terebinthaceae* Decandriae 5-gynae (gen. 1132-37.)

1132. *AVERRHOA*. Cal. 5-phyllus. *Petala* 5; superne patentia. *Stam.*

annulo nectarifero inserta, alterna breviora. *Bacca* 5-gona, 5-locularis.

1. *Bilimbi*, fol. pinnatis: foliol. ovato-lanceolatis, fructib. oblongis obtusangulis. Willd. Sp. 11. p. 749. Lam. ill. t. 385. Cav. diss. 7. p. 373. t. 219. Rumph. 1. t. 36. Hab. in India. h

2. *Carambola*, fol. pinnatis, foliol. ovatis inaequalibus acuminatis, fructibus oblongis acutangulis. Willd. Cavan. diss. 7. p. 374. t. 220. Rumph. 1. t. 35. Hab. in India.

1133. *TAPIRIA*. Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Caps.* pentacocca, unilocularis, 5-valvis, 5-sperma. Sem. arillata.

1. *guyanensis*. Aubl. guj. t. p. 470. t. 188. Lam. ill. t. 386. *Joncopectia paniculata*. Willd. p. 750. Hab. in Guyanae sylvia. Arb. 50-petalis. Fol. impari-pinnata. Flor. parvi paniculati.

1134. *SPONDIAS*. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala. *Drupa* nucleo 5-loculari.

1. *Mombin*, fol. petiolo communi compresso. L. Willd. Sp. 11. p. 750. S. *Myrobalanus*. Jacq. amer. 139. t. 88. Ed. pict. t. 88. Sloan. hist. 2. p. p. 126. t. 219. f. 3. 4. 5. Hab. in India occidentali. h

2. *Myrobalanus*, petiolis teretibus: foliolis nullis acuminatis. L. S. *Mombin*, racemis terminalibus longitudine folia aequantibus. Jacq. amer. 138. Sloan. hist. 2. p. 125. t. 219. Mer. surin. 13. t. 13. Hab. in Amer. meridionali.

3. *Mangifera*, foliolis oblongis integerrimis panicula racemosa. Willd. *Mangifera* pinnata. Län. suppl. 156. Hab. in India.

4. *dulcis*, petiolis teretib. sexjugis, foliol. serrat. costatis. Forst. profl. n. 198. *Cythera*. Lam. enc. 4. p. 260. ill. t. 384. Sloan. lit. 2. t. 123. Hab. in Societ. insulis et in ins. Mauritii. h

1135. *POUPARTIA*. Cal. minimus: 5-fidus. *Stamina* disco crenato inserta. *Styli* approximati. *Pericarp.* nucle 5-loculari.

1. *borbonica*. Fol. impari-pinnata: simplicibus nonnullis intermixtis. Flor. racemosi. Arb. *Bois de Poupart* dicta. Juss. gen. pl. Genus quoad nonnullos characteres ulterius observandum.

1136. ROBERGIA. *Cal.* 5-partitus.  
*Petala* 5. *Drupa* nucce monosperma, putamine bivalvi.

1. *frutescens*. Willd. Sp. II. p. 752. Rourea frut. Aubl. guj. 1. p. 467. t. 187. Hab. in sylvis Gujanæ. Fol. impari-pinnata. Panic. corymbosa. *h*

Obs. Discrepat caps. simplici, caeteria forsân abortivis, a sequente genere. Juss.

1137. CNESTIS. *Cal.* 5-partitus.  
*Petala* 5. *Caps.* 5, bivalves, monospermae, leguminiformes, utrinque villosæ, latere dehiscences;

1. *glabra*, fol. pinnatis, foliolis ovatis petiolatis utrinque glabris, racemulis fasciculatis brevibus et tenuibus. Lam. enc. 3. p. 23. et ej. illustr. t. 387. f. 1. Willd. p. 752. Hab. in insula Mauritiæ et Boïonia. *h*

2. *polyphylla*, fol. pinnatis, foliolis ovato-oblongis subvillosis brevissimè petiolatis, racemulis tomentosis, capsulis obtusissimis. Lam. l. c. Ej. ill. gen. t. 387. f. 2. Hab. in Madagascar. *h*

3. *corniculata*, fol. pinnatis, foliolis oblongo-acuminatis, nervo medio villosa, capsulis oblongis acutis corniculatis tomentosius prurientibus. Lam. l. c. Hab. in Sierra Leone. *h*

4. *trifolia*, fol. ternatis, foliolis ovatis acuminatis superne laevibus, panic. terminali. Lam. enc. p. 24. Hab. in Africa. *h*

1138. COTYLEDON. (Umbilicaria) *Cor.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala. *Squamæ* nectariferæ 5, ad basium germinis. *Caps.* 5.

\* *Foliis dilatatis, planis.*

1. *orbiculata*, fol. ovato-spathulatis obtusis cum acumine laevibus, flor. paniculatis. Ait. Kew. 2. p. 106. Willd. p. 753. Decand. Pl. grass. ic. Hab. ad Cap. b. spei cum srib. sequentibus. *Cor.* subcampanulata pulchra, coccinea. Var. fol. orbiculatis. *h*

2. *paniculata*, fol. oblongo-ovatis sessilibus, flor. divaricato-paniculatis, caule fruticoso ramoso. Thunb. prod. 83.

3. *fascicularis*, fol. cuneiformibus fasciculatis terminalibus, caul. incrassato, ramis cernosis subconicis. Ait. Kew. 2. p. 106. Burm. afr. 41. t. 18.

4. *cuneata*, fol. cuneatis carnosius lirtis, flor. paniculatis hirsutis. Thunb. prod. 83.

5. *serrata*, fol. ovalibus crenatis, caule spicato. L. Dill. elth. t. 95. f. 112. Hab. in Grecia, Sibiria.

6. *Umbilicus*, fol. peltatis crenatis, caule subsimplici, flor. pendulis, bracteis integris. L. Lam. ill. t. 389. f. 1. Engl. bot. t. 325.

7. *peltatum*, caul. erecto maculato simplici, flor. racemosis pendulis, cor. cylindrica punctata. Wendl. obs. 40. Hab. in Lusitania, Hispania, Anglia. Rad. tuberosa. *h*

7. *lutea*, fol. dentato-crenatis: infimis peltatis, caule subsimplici, flor. erectis, bract. subdentatis. Huds. Smith. brit. 2. p. 484. *C. lusitanica*. Lam. enc. 2. p. 140. Dodel. mem. 265. t. 73. Hab. in Europa australi, Oriente. *h*

8. *alternans*, fol. orbiculato-spathulatis integerrimis, flor. paniculatis glabris quadrifidis. Vahl. symb. 2. p. 51. *C. orbiculata*. Forsk. Hab. in Arabia. *Cor.* ovata, lacinias lanceolatis flavo-rubentibus. V.

9. *hemisphaerica*, fol. suborbiculatis surfure punctatis subtus convexis, flor. subsessilibus. Ait. Kew. 2. p. 107. Pl. grass. ic. Dill. elth. 112. t. 95. f. 111. Hab. in Aethiopia. *h*

10. *triflora*, fol. obovato-carnosis integris, flor. apicatis ternis sessilib. Thunb. prod. 85. Hab. ad Cap. b. spei.

11. *coccinea*, fol. obovatis acutis carnosius, spica foliosa terminali. Willd. Car. ic. 2. p. 54. t. 170. Hab. . . . *h*

12. *Malacophyllum*, fol. lanceolatis acutis carnosius, apica cylindrica terminali aphylla. Willd. p. 756. Fall. it. 3. app. tab. O. f. 1. Hab. in Davyriae alpibus. Similis Crass. spinosae. W. ☉

13. *mamillaris*, fol. alternisterei-ovatis, flor. alternis subsessilibus. Lin. suppl. 249. Hab. ad Cap. b. spei. Cum praecedente ad sequentem divisionem potius pertinet?

\*\* *Fol. teretibus.*

14. *spuria*, fol. spathulato-lanceolatis carnosius, caul. fruticoso. L. Willd. p. 754. *C. teretifolia*, fol. subteretibus carnosius obtusis basi angustioribus, caul. crasso frutescente. Lam. enc. 2. p. 139? Burm. afr. t. 19. f. 2. Moris. L. 12. t. 7. f. 40. Hab. in Africa, loc. petrosis. Flor. pulchri, penduli, rubri.

15. *tuberculosa*, caul. frutescente, fol. subcylindricis lineari-oblongis acutis, flor. subpaniculatis, pedunc. calyribusque pubescentibus. Decand. Pl. grass. Lam. enc. 2. p. 139. Burm. afr. t. 20. f. 1. Ad Cap. b. sp. Flor. speciosi, subaurantiaci, tubulosi. Caul. crass. tuberculatus.

16. *ungulata*, fol. semi-cylindricis canaliculatis: apice margine callosio-purpureo. Lam. enc. 2. p. 139. Burm. afr. t. 22. f. 1. Hab. in Africa.

17. *purpurea*, fol. lineari-oblongis carnosius glabris, florib. paniculatis. Thunb. prod. 83. Hab. ad Cap. b. spei, cum 4 sequentibus.

18. *teretifolia*, fol. carnosius culmetib. hirsutis, flor. paniculatis, caule hirsuto. Thunb. prod. 83.

19. *caecalioides*, fol. teretibus, florib. paniculatis, caule fruticoso. Thunb. Lin. suppl. 242. Flores luvi referunt Caecaliam.

20. *reticulata*, fol. teretibus, floribus reticulato-paniculatis, caule fruticoso. Th. Lin. suppl. 242. Refert Staticem reticulatam.

21. *papillaris*, fol. opposita tereti-ovatis, flor. corymbosis. Lin. suppl. 242.

22. *hispanica*, fol. oblongis subteretibus, flor. tubulosius fasciculatis. Loefl. it. t. 1. Plant. grass. ic. C. pistoriua. Orteg. monogr. f. 2. Hab. in Africa, Oriente, et Hispania. Cor. infundibulif. longi, rubelli. ♂ ☉

23. *viscosa*, fol. teretibus, racem. terminalibus villosio-viscosis, caule ramoso, cor. campanulata. Vahl. symb. 2. p. 51. C. Mueizonia. Orteg. Jacq. Coll. suppl. 112. t. 13. f. 2. C. hispida. Lam. enc. 2. p. 141. Plant. grass. ic. Hab. in montosis Hispaniae et in Barb. Caul. rubescens.

1139. **SEDUM.** *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Squamæ* nectariferæ 5, ad basin germinis. *Caps.* 5.

\* *Planifolia.*

1. *verticillatum*, fol. quaternis, lanceolatis serratis. L. Amoen. acad. 2. p. 252. t. 4. f. 14. Willd. Sp. II, p. 760. Hab. in Europa australi et in Siberia. Caul. pedalis erectus. Racemi axillares et flor. parvi.

2. *Telephium*, fol. planiusculis ovatis sparsis serratis, corymb. folioso, caul. erecto. L. Lam. ill. t. 3. o. f. 1. Decand. Pl. grass. ic. Flor. dan. t. 686. Hab. in agris petrosis sylvaticis.

\* *maximum*, fol. ovatis dentatis conjugatis, umbell. alaribus, flor. albicanibus. Hall. helv. n<sup>o</sup>. 955. Hab. in alpinis.

3. *Telephioidea* (americana), fol. planis ovatis, utrinque subacutis dentatis, flor. corymboso-fasciculatis. Mich. Flor. t. p. 277. Hab. in Amer. septentr. rupib. altissimis. Flor. purpurascens.

4. *Anacampseros*, fol. cuneiformib. integerrimis subsessilibus, caulib. decumbeutibus, florib. corymbosis. L. Plant. grass. ic. Hab. in Gallo-provinciae rupibus, et in Suecia. Flor. purpurei.

*Obs.* Fol. byeme decidua. Lin., persistencia secundum alios.

5. *divaricatum*, fol. cuneiformi-rhombicis emarginatis petiolatis, caulib. ramosis, paniculis terminalib. divaricatis. Ait. Rev. 2. p. 108. S. Aizoides. Plant. grass. ic. 7. Hab. in Madra. h

6. *Aizoon*, fol. lanceolatis serratis planis, caule erecto, cyma sessili terminali. L. Pl. grass. ic. Hab. in Siberia.

7. *hybridum*, fol. cuneiformibus concavis subdentatis aggregatis, ramis repentibus, cyma terminali. L. Gmel. sib. 4. t. 67. f. 1. Murray in comm. nov. Goett. 6. p. 35. t. 5. Hab. in Tataria.

8. *populifolium*, fol. planis cordatis dentatis petiolatis, corymbis terminalibus. Ait. Kew. 2. p. 109. Plant. grass. ic. Curt. msg. t. 118. Hab. in Siberiae alpinis.

9. *stellatum*, fol. planiusculis angulatis subrotundis, flor. lateralibus sessilibus solitariis. L. Camer. hort. p. 7. ic. 2. Hab. in Italia, Gallia, Helvetia. ☉

10. *alsinesolium*, fol. planis ovatis, caule paniculato, petalis obtusis. Hab. in umbrosis lapideis Pedemontii. Fol. tenuia vevota.

11. *Cepaea*, fol. planis sublinearib., caul. ramoso, floribus paniculatis, petal. acutis, Willd. p. 763. Hab. in umbrosis.

\* *galioides*, caule ascendente, fol. oppositis inferioribus 3-4-nis. Allion. ped. n<sup>o</sup>. 1742. t. 65. f. 3. Hab. in agris Pedemont: Flor. rubicundi.

12. *libanoticum*, fol. radicalibus fasciculatis spithulato-lanceolatis, caule subnudo simplicissimo. L. Hab. in Palaestina. Facies semperv. montani. Racem. terminalis, longitudine caulis. L.

13. *heptapetalum*, fol. ovato-oblongis planiusculis, pedunc. subhirsutis, florib. paniculatis. Poir. enc. bot. 4. p. 630. *S. caeruleum*, L. ? Hab. ad Barbariae rupes, ad littora maris. Flor. caerulea. Habitu Sedi, sed stamina 12-15 Sempervivi.

14. *ternatum*, pumilum, repens, fol. planis rotundato-spathulatis ternis, cyma subtristachya. Michaux. Flor. 1. p. 277. Hab. in rupibus Amer. boreal. Flor. albi 8-dri terminalis solitarius 10-andr. M.

\* \* *Teretifolia.*

15. *dasyphyllum*, fol. oppositis ovatis obtusis carnosis, caule infimo, flor. sparsis. L. Jacq. hort. t. 153. Pl. grass. ic. Engl. bot. 7. 656. *S.* fol. semiglobosis subovat. sessilibus quadrifarium imbricatis. Wachend. ult. 301. Hab. in Europ. australior. rupib. Flor. albidis.

*Obs.* Stamina 10-12; styli 5-6. In planta culta rami elongati, flor. sparsis: *♂ gracile*. Decand.

16. *pulchellum*, caul. assurgentibus, fol. sparsis linearib. obtusis plantusculis, cym. polystachya, flor. sessilibus. Mich. l. c. Hab. in rupibus circa Knoxville, Spic. longae recurvatae: flor. unilaterales.

17. *reflexum*, fol. subulatis sparsis basi solutis: inferioribus recurvatis, flor. subcymosis primo recurvis. Hab. in sylvis. Cal. acutus.

18. *sirens*, fol. subulatis sparsis basi solutis, flor. cymosis, petal. calyce lanceolato sesquialongioribus. Ait. Kew. 2. p. 110. Hab. in Lusitania.  $\odot$

19. *rupestre*, fol. subulatis quinquefariam confertis basi solutis, flor. cymosis. L. Engl. bot. t. 170. Pl. grass. ic. Dill. elih. t. 256. f. 333. Hab. ad rupea. Fol. glauca. Cal. obtusiusculus, rubicundus basi 1-phyllus. Sm.

20. *altissimum*, flor. suboctopetalis, fol. sparsis: inferioribus teretibus; superiorib. depressis. Enc. bot. 4. p. 614. Plant. grava. ic. Semperviv. sedifforme. Jacq. Hort. 1. t. 81. et Misc. austr. 1. p. 133. t. 5. Hab. in Europ. australi.

21. *saxatile*, fol. sparsis semiteretibus obtusis basi solutis, caule ramoso decumbente. Willd. p. 765. Allion. ped. n. 1746. t. 65. f. 6. *S.* rupestre. Flor. dan. 59. Plant. grass. ic. *S.* alpestre. Villars. Hab. in alpinis et montosis ad rupea.

22. *rubens*, fol. ovatis alternis sessilibus remotis, caule prostrato basi ramoso, flor. terminalibus subumbellatis, pedunc. simplicissimis. Haenke it. andet. p. 114. Hoffm. Flor. germ. p. 208. Hab. in andetis. Var. prioris secundum Willdeuow Caps. purpureae.

23. *quadrifidum*, fol. sparsis teretibus obtusis, caule simplici, florib. umbellatis tetrapetalis. Willd. Pall. in 3. app. n. 90. t. P. f. s. Hab. in rupibus Asiae borealis.  $\odot$

24. *hispanicum*, fol. linearibus teretibus depressis sparsis, cyma patula, flor. hexapetalis. Ait. Kew. 2. p. 111. Dill. elih. t. 276. f. 332. Hab. in Hispan. Gall. et Carinthia.

25. *lineare*, fol. tereti-linearib. oppositis, cyma trifida. Thunb. jap. 187. Hab. in Japonia.

26. *caeruleum*, fol. oblongis alternis obtusis basi solutis, cyma bifida glabra. Vahl. symb. 2. p. 51. Shaw. it. f. 550. *S.* azureum. Desf. atl. Hab. in fissuris rupium ad Manu Tuncti.

27. *album*, fol. oblongis obtusis teretibus sessilib. patentibus, cyma ramosa. L. Flor. dan. t. 66. Blackw. l. 428. Lam. ill. t. 390. f. 2. Hab. in muris antiquis.

28. *acre*, fol. alternis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. L. Pl. grass. ic. Curt. lond. ic. t. 32. Hab. in campis sterilissimis, ad muros antiquos. Flor. majusculi, aurei.

\* *aestivum*, fol. ovato-teretibus obtusis, caul. bifido, flor. luteis sessilib. Allion. Pl. Pedem. Lob. ic. 378. Hab. in saxosis. Flos inter dichotom. sessilis. Pl. acida annua.  $\odot$

29. *sexangulare*, fol. subternis teretiusculis, adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis, cyma trifida. L. Curt. lond. ic. Hab. in campis siccis, ad muros. Fol. subtus rubentia, insipida.

30. *annuum*, caule erecto solitario annuo, fol. ovatis sessilibus gibbis alternis, cyma recurva. L. Excl. syn. Raj. Hab. in Europa boreali. Simile *S.* antecedenti, sed Fol. rubicunda. Flor. lutei. L.  $\odot$  +

\* *Guetardi*, fol. teretibus obtusis, basi solutis acutis, calycib. teretibus, petal. lanceolatis, caul. corymboso dichotomo. Vill. Delph. 3. p. 67. t. 45. Hab. prope Estampes. Flor. albi. Forte eandem est ac *S. anglicum* aut *rubens*.

31. *anglicum*,

31. *anglicum*, fol. subovatis adnato-sesilibus gibbis subalternis, cyma ramosa bifida. Huds. Engl. bot. t. 171. Flor. dan. t. 82. Raj. synop. t. 2. f. 2. S. rubens. Lightf. Hab. in rupibus et maritimis Angliæ et Norvegiæ. Carl. basi procumbens. Petala acuminata alba; carina rubra. Sm.

32. *aristatum*, fol. teretibus utrinque acutis basi solutis radicalibus fasciculatis, petal. aristatis lanceolatis. Vill. l. c. p. 680. t. 45. Cresc. in Delph. prope Sigoyer. Flor. corymbosi, albid. Totum glabrum? +

33. *hirsutum*, fol. ovalibus obtusis planiusculis, margine pubescentibus, caul. ramoso erecto, petal. aristatis ovatis, stam. longioribus. Allion. pedem. n.º. 1754. t. 65. f. 5. Poir. enc. 4. p. 614. Hab. in Ital. alpinis et in monte aureo. Fnl. radicalis rosacea fasciculata. Caul. rubens. Pet. alba; linea purpurea, pubentia. Col. hirsutus. A.

34. *nicæense*, fol. subulatis sparsis basi solutis, cyma bifida, flor. longe pedunculatis. All. l. c. 1752. t. 90. f. 1. Cresc. super saxa in comitatu Nicæensi. Flor. magni, albid, unilaterales. A. ☉

35. *atlanticum*, ramis filiformibus paniculatis villosis, fol. semiteretibus. S. *hispidum*. Desf. atl. t. p. 161. Hab. in Atlante. Cor. aurea. Stam. 10-12. D.

36. *pubescens*, fol. oblongis obtusis supra planiusculis, cyma bifida, petal. lanceolatis. Vahl symb. 2. p. 52. Hab. in fissuris rupium Tunet.

37. *villosum*, fol. oblongis supra planiusculis pedunculisque axillaribus subunifloris pubescentibus, petal. ovatis obtusiusculis. Vahl symb. 2. p. 52. Fl. dan. t. 24. Engl. bot. t. 394. Pl. grass. ic. Hab. in pratis paludosis. Flor. purpurei. Stam. 7-8.

38. *palustre*, fol. brevi-linearibus, flor. cymosis. Sedum palustre subhirsutum purpureum. Baub. pin. p. 281. Cresc. in palustrib. montosis. Sed. villosa major. Flor. purpureo-caerulei, majusculi. Fol. latiora.

38. *monregalense*, fol. verticillatis linearibus, caul. procumbente paniculato, pedunc. villosis-viscensis. Balbis Miscell. bot. p. 23. t. 6. Hab. in alpestribus ad rupes Pedemontii. Caul. plures ex radice. Flor. primo nutantes, albi.

39. *atratum*, caule erecto, flor. corymbosis fastigiatis. Jacq. aust. t. 8. Plant. grass. ic. Scheuchz. it. 1. p. 48. t. 6. f. 34. Hab. in Helvetiæ, Galliæ et Italiæ alpinis.

Cal. atro-purpurascens. Petal. alba aut flava, ovata. Germina atro-purpurascens.

40. *pusillum*, erectum, fol. alternis teretiusculis oblongis, flor. 8-andris alternis subpedicellatis. Michx. Flor. 1. p. 276. Hab. in Carol. septentr. Flor. albi.

41. *nudum*, fol. sparsis oblongo-cylindraceis obtusis, caul. fruticosis ramosissimis, ramis tortuosis, cymis terminalibus. Ait. Kew. 2. p. 122. Hab. in Madera. h

Obs. In promontorio Cap. b. sp. plantarum succulentarum ceterum feraci nullæ Sedi species, quantum scio, huc usque sunt detectæ.

1140. PENTHORUM. Cal. 5-fidus. Petala nulla, aut quinque. Caps. 5-nuspidata, 5-locularis.

1. *sedoides*. L. Lam. ill. t. 390. Hab. in Amer. boreal. aquaticis. Pedunc. terminal. spicis revolutis.

1141. BERGIA. Cal. 1-phyllus, caducus, 5-dentatus. Petala 5. Caps. 1, glohosa, 5-torulosa, 5-locularis, 5-valvis: valvulis petaloidis. Sem. plurima. (Bacca ovalis: cortice crasso, 1-locularis, polysperma. Roxb.)

1. *verticillata*, fol. lanceolatis apice denticulatis, flor. verticillatis. Willd. p. 770. B. aquatica. Roxb. Corom. 2. p. 22. t. 142. B. capensis. Lin. Rheed. g. t. 78. Hab. in India orientali, nec ad Cap. b. sp.

2. *glomerata*, fol. obovatis crenulatis, flor. glomeratis. Lin. suppl. 243. Thunb. prod. 82. Hab. ad Cap. b. spei.

1142. SURIANA. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Styli inserti lateri interiori germinum. Sem. 5, nuda.

1. *maritima*. L. Jacq. amer. 140. Ed. pict. p. 70. Lam. ill. t. 389. Hab. in Amer. calidioris maritimis. h

1143. GRIELUM. Cal. 5-fidus. Petala 5. Filam. persistentia. Pericarpia 5, mono-perma.

1. *tenuifolium*. L. Lam. ill. t. 388. Geranium. Burm. afr. 83. t. 34. f. 1. Hab. in Aethiopia. Fol. incaua multifida. Cor. lutea.



1144. *OXALIS*. Cal. 5-phyllus. Petala unguibus connexa. Stam. inaequalia, 5-breviora, exteriora basi connata. Caps. angulis elasticè dehiscens, 5-gona. Sem. subarillata.

\* *Fol. simplicibus.*

1. *monophylla*, acaulis, scapo unifloro, fol. ellipticis obtusis, filamentis glabris. Willd. Sp. II. p. 772. Jacq. Oxal. Vien. 1794. n. 35. p. 56. t. 79. f. 3. Thunb. Diss. de Oxal. n. 7. p. 8. t. 1. f. 1. Fol. Bellidis. Flos. O. Acetosellae.

*Obs.* Hab. paucis speciebus exceptis, quarum locus natalis indicator, omnes fere ad *Cap. & spec.* Fol. fere omnia, uti in Filicibus primo convoluta, et plus minusve irritabilia.

2. *leptis*, acaulis, scapo unifloro, fol. obovatis subretusis, filamentis glanduloso-pilosis simplicibus. Willd. Jacq. l. c. p. 53. t. 21. Cor. albidula.

3. *rostrata*, acaulis, scapo unifloro, fol. obovatis retusis, filamentis interioribus apice rostratis piloso-glandulosis, antheris lateralibus. Cor. violaceo-albida. W.

\*\* *Foliis binatis.*

4. *asinina*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis lanceolatis margine cartilagineis denticulatis, petiol. alatis. W. p. 773. Jacq. p. 59. t. 24. Cor. magna flava.

5. *lanceifolia*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis ternatisque margine cartilagineis scabris, petiolis alatis. Jacq. p. 26. t. 26. Cor. flava.

6. *leporina*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis ellipticis emarginatis, margine cartilagineis denticulatis, petiolis alatis. W. Jacq. p. 60. t. 25. Cor. alba, margine rubicunda.

7. *crispa*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis subrotundo-obovatis emarginatis, margine undulatis petiol. subrotundo-alatis. Jacq. p. 58. t. 23. Cor. maxima, alba.

\*\*\* *Foliis ternatis.*

† *Acaulis, scapo unifloro.*

8. *sabaeifolia*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis obovatis emarginatis mucronatis, petiolis alatis. W. p. 774. Jacq. p. 63. t. 27. Cor. ampla flava.

9. *laburnifolia*, foliolo medio sublan- ceolato, lateralibus oblique oblongis, stylis

longissimis, filamentis denticulatis. Jacq. p. 63. t. 28. Pubescens. Petioli compressi. Cor. flava.

10. *sanguinea*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis, foliol. intermedio basi attenuato, petiolo summiter compresso, calycibus simpliciter pilosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. p. 775. Jacq. p. 64. t. 29. Filam. interiora hispida.

11. *ambigua*, stylis longissimis, foliol. immaculatis planis, calycinis foliol. aequalibus. Jacq. Oxal. n. 39. p. 80. t. 43. Cor. alba fudo flavescens.

12. *undulata*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis: foliol. oblongis obtusis undulatis; intermedio coniformi, calycinis foliol. pilosis punctatis, unico spatulato majore, stylis staminibus longioribus. W. Jacq. p. 81. t. 44. Fol. pilosiuscula. Cor. alba fundo flava.

13. *fuscata*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis maculatis oblongis obtusis: foliolo intermedio cuneiformi-subrotundo, calycibus aequalibus interrupte bistriatis, stylis staminibus longioribus. W. p. 776. Jacq. p. 82. t. 45. Fol. subretusa maculata.

14. *glandulosa*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis: foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque glandulosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 83. t. 46. Glandulae pedicellatae. Cor. alba fundo flava.

15. *tricolor*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis, foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque simpliciter pilosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Var. cor. interae flava. p. 84. t. 47. et alba. Jacq. p. 85. t. 48.

16. *rubro-flava*, acaulis, scapo unifloro foliis paullo longiore erecto, fol. ternatis lanceolato-oblongis retusis, foliolo intermedio cuneiformi, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 87. t. 56. Cor. flava, externe rubro-marginata.

17. *flaccida*, acaulis, scapo unifloro fol. duplo longiore nutante, fol. ternatis oblongis retusis, foliolo intermedio cuneiformi, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. p. 777. Jacq. p. 88. t. 51. Cor. l. a fundo flava, externe rubro-marginata.

18. *exaltata*, acaulis, scapo unifloro fol. duplo longiore stricto, fol. ternatis ellipticis emarginatis obtusis villosis: foliolo intermedio cuneiformi, styl. staminibus exte-

rioribus brevioribus. W. Jacq. p. 86. t. 49. Peristite cor. et foliolorum etiam ab antecendentibus distincta. W.

19. *sulphurea*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis subrotundis, calycinis foliolis marginibus clavato-pilosis apice reflexis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 100. t. 63. Fol. subtus sanguinea, aureo-punctata. Cor. pallide-sulphurea.

20. *variabilis*, acaulis, scapo unifloro fol. longiore flaccido, fol. ternatis subrotundis: foliolo intermedio cuneiformi, styl. staminibus exterioribus brevioribus. Jacq. p. 89. t. 52. Rubra, flore rubro. Jacq. p. 90. t. 53. In  $\alpha$ . cal. foliola margine glandulosa, apice pilosa et cor. carnato-alba. In  $\beta$ . cal. simpliciter pilosi at cor. rosei coloris. W. p. 778.

21. *grandiflora*, acaulis, scapo unifloro fol. brevioris erecto, fol. ternatis subrotundis: folioli intermedio cuneiformi, petal. truncatis, styl. staminibus exterioribus brevioribus. W. p. 778. Jacq. p. 91. t. 54. Thunb. prodr. app. p. 189. Cor. candida, fundo flavescante.

22. *purpurea*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis subrotundis, petiol. teretibus, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 93. t. 56.

\* *laxula*, stylis intermediis, filamentis denticulatis, petiolis teretibus, foliol. excisis saepe subtus purpurascens. Jacq. p. 94. t. 57. Thunb. prodr. app. p. 190.

23. *humilis*, scap. unifloris, fol. ternatis: foliol. subrotundis ciliatis. Thunb. prodr. app. p. 190. +

24. *breviscapa*, acaulis, scapo unifloro petiolis duplo brevioris, fol. ternatis subrotundis, petiolis compresso-planis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 95. t. 58. Fol. subtus sanguinea punctata.

25. *spectiosa*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis subrotundis ciliatis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. p. 779. Jacq. p. 97. t. 60. Thunb. prodr. app. p. 189. Ehret. pict. t. 10. f. 2.

$\beta$ . *sagittata*, stylis longissimis, foliol. acutis subtus totis et supra ad oras lividis. Jacq. p. 98. t. 61. Burm. afr. p. 67. t. 27. f. 3.

$\gamma$ . *rigidula*, stylis longissimis, foliolis immaculatis. Jacq. p. 98. t. 59. Cor. majuscula, campanulata, purpurascens. Stigm. plumosa.

26. *Acetosella*, scapo unifloro, fol. ternatis obcordatis, radice dentata. L. Flor. dan. t. 980. Hab. in sylvis umbrosis, vere.  $\beta$ . *carulea*, minor subvillosa.

27. *magellanica*, scapis unifloris, foliol. subrotundis emarginatis crenosis. Forst. comment. goett. p. 33. Hab. in Terra del Fuego, locis irriguis.  $\mathcal{T}$

28. *marginata*, acaulis, scapo unifloro petiolis dimidio brevioris, fol. ternatis obcordatis, calycin. foliol. clavato-ciliatis apice reflexis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. p. 781. Jacq. p. 108. t. 68. Foliola inferne sanguinea, viridi marginata. Cor. alba fundo flavescens. W.

29. *pulehella*, acaulis, scapo unifloro petiolis triplo brevioris, fol. ternatis obcordatis, calycinis foliolis clavato-ciliatis apice reflexis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. Jacq. p. 109. t. 69. Foliol. subtus sanguinea, aureo-punctata.

30. *obtusata*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis dense pilosis, calycinis foliolis apice rotundato-obtusis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. p. 382. Jacq. p. 106. t. 79. f. 2. Cor. rubra. Filam. glabra. W.

31. *lanata*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis villosis, calycin. foliol. acutis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 104. t. 77. f. 2. Cor. alba. Filam. hirta.

32. *truncatula*, acaulis, scapo unifloro foliis duplo longiore, fol. ternatis foliolis triangularibus margine villosis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. Jacq. p. 99. t. 62. Foliola cuneiformia truncata. Cor. lilacina.

33. *strumosa*, acaulis, scapo foliis brevioris, fol. ternatis obcordatis, stylis staminibus exterioribus brevioribus sub apice strumosis. W. Jacq. p. 102. t. 64. Foliol. fuscomaculata. Cor. alba.

34. *punctata*, acaulis, scapo foliis longiore, fol. ternatis obcordatis punctatis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. p. 783. Jacq. p. 105. t. 66. Thunb. Diss. t. 1. f. 3. Hab. in collib. areuosis.

35. *luteola*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis obcordatis pilosis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 103. t. 65.

36. *macrogonia*, acaulis, scapo unifloro foliis brevioris, fol. ternatis obcordatis ciliatis, styl. staminibus interioribus longioribus. W.

Jacq. p. 180. t. 70. Scapi articulus ad basin longior, quam in reliquis. W.

37. *fallax*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis pilosiuscul. ciliatis, styl. staminib. interiorib. breviorib. W. p. 784. Jacq. p. 107. t. 67. Simili, praecolenti: articulus scapi brevissimus.

38. *tenella*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis glabris, styl. staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 53. t. 19. Cor. pallide violacea, fundo flavo.

39. *minuta*, acaulis, scapo foliis longiore, fol. ternatis lineari-lanceolatis acutis, stylis staminib. interioribus longioribus. W. Jacq. p. 65. t. 79. f. 2. Thunb. Diss. t. 2. f. 3.

40. *pusilla*, subcaulescens, scapo unifloro longitudine foliorum. foliis ternatis lineari-cuneiformib. emarginatis, styl. staminib. interiorib. breviorib. W. p. 785. Jacq. p. 79. t. 42. Foliol. glauca. Cor. pallide incarnata.

#### ++ Scapo multiflora.

41. *compressa*, acaulis, scapo bifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis, petiolis planis compressis, styl. staminib. interiorib. longiorib. W. Jacq. p. 40. t. 78. f. 3. Lin. suppl. 243. Hab. in campis arenosis humidis Cap. b. spci. T.

42. *sericea*, acaulis, scapo umbellifero, foliis longiore, flor. nutantibus, fol. ternatis obcordatis sericeis, stylis staminibus interiorib. brevioribus. Jacq. t. 77. f. 1. Lin. suppl. t. 243.

43. *articulata*, scap. umbelliferis, fol. ternatis tomentosis, calycib. apice callosis. Enc. bot. 4. p. 687. Hab. in Amer. meridion. Commers. Rad. longa, repens, nolosca.

44. *megalthisa*, acaulis, scapo umbellifero fol. brevioris, flor. erectis, fol. ternatis obcordatis, radice crassa multiplici. W. p. 786. Jacq. p. 33. O. bicolor. Enc. bot. 4. p. 687. Frutic. peruv. 2. p. 734. t. 25. Hab. in Peru locis montosis. T.

45. *virgosa*, scap. multifloris. fol. ternatis: foliol. ovatis, flor. verticillatis. Molin. chil. hist. p. 110. Enc. bot. 4. p. 685. Hab. in R. Chilensi. Omnium forte maxima. Scapi plures, 5-pedales. M. +

46. *tetraphylla*, acaulis, scapis umbelliferis, fol. ternatis et quaternatis: foliolis cordatis inferne glaucis. Cav. ic. 3. p. 19. t. 237. Hab. in Mexico. Cor. rubro-violacea. T.

47. *violacea*, acaulis, scapo bifido umbellifero, flor. nutantibus, fol. ternatis obcordatis glabris, stylis staminib. exterioribus brevioribus. Jacq. p. 35. t. 20. f. 2. Jacq. hort. 2. p. 84. t. 280. Flos solitarius in dichotomis. Siam. hirta.

48. *caprina*, acaulis, scapo umbellifero paucifloro, flor. erectis, fol. ternatis obcordato-bilobis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. t. 76. f. 1. O. *per caprae*. L. Burm. afr. t. 28. f. 3. Cor. violacea, fundo flavo.

49. *cernua*, acaulis, scapo umbellifero multifloro, flor. cernuis, fol. ternatis obcordato-bilobis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 37. t. 6. Thunb. diss. t. 2. f. 2.

50. *dentata*, acaulis, scapo subbifloro, fol. ternatis obcordatis, calycin. foliol. apice tridentatis, stylis staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. Oxal. n°. 17. p. 83. t. 7. Cor. pallide incarnata.

51. *livida*, acaulis, scapo bifloro, fol. ternatis obcordato-lipartitis, styl. staminib. interioribus brevioribus. W. p. 788. Jacq. p. 39. t. 8. Cor. incarnata.

#### +++ Caulescentes, pedunculis unifloris.

52. *ciliaris*, caule erecto inferne nudo, pedunc. unifloro petiolis longiore, foliis ternatis oblongis emarginatis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. Jacq. p. 66. t. 30. Cor. purpurea, fundo luteo.

53. *arcuata*, caul. decumbente inferne nudo, pedunc. unifloris petiolorum longitudine, fol. ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis ciliatis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. Oxal. n°. 46. p. 67. t. 31. Cor. violacea.

54. *linearis*, caule decumbente inferne nudo, pedunc. unifloro, petiolis brevioris, fol. ternatis linearib. emarginatis ciliatis, styl. staminib. interiorib. longiorib. Willd. p. 789. Jacq. p. 68. t. 32. Cor. violacea, fundo flavo.

55. *cuneata*, caule decumbente inferne nudo, pedunc. unifloro petiolis brevioris, fol. ternatis cuneiformibus emarginatis pilosis, styl. staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 76. t. 40.

56. *cuneifolia*, caul. decumbente inferne nudo, pedunc. unifloro petiolis brevioris, fol. ternatis linearib. cuneiformibus pilosis emarginatis, styl. staminib. exterioribus bre-

vioribus. W. Jacq. p. 77. t. 41. Differt a priore filamentis glandulosis, interioribus inaequalib. et stylis filamentis breviorib. W.

57. *glabra*, caule inferne nudo brevissimo erecto, pedunc. unifloro fol. duplo longiore, fol. linear-cuneiformibus emarginatis ciliatis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. Jacq. p. 78. t. 76. f. 3. Thunb. Oxal. t. 2. f. 1. Cor. purpurea, fundo flavo.

58. *bifida*, caul. inferne nudo erecto subramoso, pedunc. unifloro, f. l. duplo longiore, fol. ternatis cuneiformibus emarginato-bifidis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. p. 79. Jacq. t. 77. f. 4. Thunb. Oxal. t. 1. f. 2. Hab. ad litora fossarum montis Diaboli. Foliol. biloba. Filam. hirta.

59. *filicaulis*, caul. inferne nudo decumbente subramoso, pedunc. unifloro, fol. duplo longiore, fol. ternatis cuneiformibus emarginato-latis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 42. t. 205. Fol. biloba. Filamentis glabra.

60. *longiflora*, caule inferne nudo simpliciter, pedunc. unifloro, fol. ternatis bipartitis. Willd. p. 791. Scapo unifloro, fol. ternatis semilatis, lobis lanceolatis. L. Hab. in Virginia. Flos unicus longus. †

61. *natans*, caule inferne nudo nutante, pedunc. unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis obcordatis, styl. staminib. exterioribus brevioribus. Jacq. t. 76. f. 2. Thunb. Oxal. t. 1. f. 4. Hab. in aquis Cap. b. spel. Caul. filiformis tenuissimus, apice foliosus. Pet. alba.

62. *convexula*, caule inferne nudo decumbente, pedunc. unifloro fol. longiore, fol. ternatis subrotundis punctatis, stipulis dilatatis acuminatis, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 92. t. 55. Cor. rosca, fundo flavo.

63. *versicolor*, caul. inferne nudo declinato, pedunc. unifloro folis longiore, fol. ternatis linearibus emarginatis, apice bipunctatis, styl. staminib. interioribus longioribus. W. p. 792. Jacq. p. 79. t. 36.

64. *sylvestris*, minor, staminib. edentulis. Jacq. t. 77. f. 4.

65. *gracilis*, filamentis edentulis, stylis longissimis, cor. campanulatis. Jacq. p. 69. t. 33. Burm. afr. 66. t. 27. f. 2. Flor. hyeme. Cor. alba, angulis rubris. In  $\gamma$ . fol. paulo latiora et cor. pallide rosca.

66. *elongata*, caul. inferne nudo decli-

nato, pedunc. unifloro, fol. longiore. fol. ternatis linearibus emarginatis apice bipunctatis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. p. 793. Jacq. p. 73. t. 37.

\* *miniata*, filamentis edentulis, stylis brevissimis. Jacq. Oxal. n. 50. p. 71. t. 50.

\* *amoena*, scapis unifloris, fol. ternatis linearibus, calycib. obusis, filamentis denticulatis inaequalib., styl. brevissimis. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 42. t. 206.

67. *reclinata*, caule inferne nudo subramoso reclinato, pedunc. unifloro fol. longiore, fol. ternatis linear-cuneiformibus emarginatis apice bipunctatis, calycin. foliolis adpressis, styl. staminib. interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 70. t. 34. Cor. pallide miniata.

68. *polyphylla*, caul. inferne nudo erecto subramoso, pedunc. unifloro petiolis duplo longiore, fol. ternatis linearibus emarginatis, apice bipunctatis, calycin. foliolis apice reflexis, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 75. t. 39. Icon. rar. 3. t. 423. Burm. afr. t. 27. f. 1.

69. *tenuifolia*, caul. erecto folioso, pedunc. unifloro fol. triplo longiore, fol. ternatis breve petiolatis linearibus emarginatis, styl. staminib. exterioribus brevioribus. W. p. 794. Jacq. p. 74. t. 38. Cor. alba, margine rubra.

70. *macrostylis*, caul. erecto folioso ramoso, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis sessilibus, foliol. linearibus emarginatis, cor. hypocrateriformibus, styl. staminib. interioribus longioribus. W. Jacq. p. 43. t. 9. Cor. purpurea fundo flavo; unguis cohaerent, elongatae.

71. *hirta*, caule erecto folioso ramoso, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis subsessilibus, foliol. linear-cuneiformibus retusis, cor. campanulatis, styl. staminib. interioribus longioribus. W. Jacq. p. 47. t. 13. et t. 77. f. 3. O. *sessifolia*. L.

72. *hirtella*, cor. campanulatis, stylis longissimis, filam. denticulatis inaequalibus. Jacq. 27. p. 48. t. 14.

73. *tubiflora*, caul. erecto subramoso folioso hirta, fol. ternatis subsessilib. linear-cuneiformibus, pedunc. unifloro folis multoties longiore, cor. hypocrateriformibus, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 44. t. 10.

74. *canescens*, cor. caryophyllacis, styl. brevissimis, filam. aequalibus. Jacq. p. 45. t. 12

71. *secunda*, caul. folioso ramoso declinato, ramis secundis, pedunc. unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis subsessilib. linearicuneiformibus, cor. hypocrateriformibus, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. p. 796. Jacq. p. 46. t. 12. Cor. lilacina. Filam. glabra.

72. *multiflora*, caule ramoso folioso erecto, pedunc. unifloris fol. multoties longioribus, fol. ternatis subsessilib. cor. campanulatis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 49. t. 25. Icon. rar. 3. t. 472.

73. *rubella*, caul. ramoso folioso erecto, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis subsessilib. linearicuneiformibus, cor. campanulatis obtusis, stylis staminib. interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 50. t. 16. Icon. rar. 3. t. 471. Burm. afr. t. 28. f. 2.

74. *rosacea*, caul. folioso simplici decumbente, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis subsessilib. oblongocuneiformibus, cor. campanulatis acutiusculis, stylis staminib. interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 51. t. 17. Simillima praecedenti. Cor. rosca.

75. *repens*, caul. folioso ramoso decumbente radicante, pedunc. subbifloro petiol. longitudine, fol. ternatis obcordatis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 32. t. 78. f. 1. Thunb. Diss. p. 16. t. 1. f. 5. Hab. locis aquosis Cap. b. spei, Madagascariae et Zeylone.

76. *reptatrix*, caul. folioso erecto simplici, pedunc. unifloro foliis longiore, fol. ternatis subrotundis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 54. t. 20. Cor. albidis, subincarnata.

77. *disticha*, caul. basi ramoso adacende folioso, pedunc. unifloris foliorum longitudine, fol. ternatis obcordatis glabris, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. p. 798. O. cor. campanulatis, styl. intermediis, petiol. alate stipulatis. Jacq. p. 52. t. 18. Cor. pallide flava.

78. *incarnata*, caul. erecto ram. glabro folioso, pedunc. unifloris longitudine petiolorum, fol. ternatis obcordatis glabris, stylis staminibus interioribus longioribus. W. Jacq. p. 111. t. 71. Comm. hort. t. 22.

++++ *Cauliscentes; pedunculis multifloris.*

79. *conorhiza*, caul. erecto folioso, pe-

dunc. foliis longiore bifloro, fol. ternatis obcordatis. W. p. 799. Jacq. p. 26. Feuille. peruv. 2. t. 24. Hab. in Paraguay in planitie ad septentrion. fluminis de la Plata. ☉

80. *crenata*, caul. folioso erecto, pedunc. umbellifero foliis longiore, fol. ternatis obovatis, cor. crenatis. W. Jacq. p. 27. Feuille. l. c. 3. p. 49. t. 24. Hab. in Peru. ☉

81. *lateriflora*, caul. basi nudo subramoso adscendente, pedunc. umbellatis lateralibus, fol. ternatis: foliol. cuneiformibus, emarginato-bilobis, cor. obtusis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. Schoenb. 2. p. 41. t. 204. Pedunc. longissimi. Filam. hispida.

82. *Dillenii*, caul. erecto folioso luto, pedunc. umbellifero, fol. longiore, foliis ternatis obcordatis, corollis emarginatis. W. Jacq. Oxal. p. 25. Dill. eth. 2. p. 208. t. 221. Hab. in Carolina, Guadeloupe. ☉

83. *stricta*, caul. erecto ramoso, pedunc. umbellifero, petiol. semiteretibus extipulatis, fol. ternatis obcordatis, cor. integris, stylis longitudine staminum interiorum. W. Jacq. p. 29. t. 4. Flor. dan. t. 873. Hab. in Virginia, Jamaica, et in cultis Europae.

84. *corniculata*, caule ramoso decumbente radicante, pedunc. subumbellato, petiol. stipulatis, fol. ternatis obcordatis, petal. emarginatis etosis. Hoffm. germ. p. 210. Jacq. p. 30. t. 5. O. pusilla. Salisb. Hab. in cultis, etiam in Japouia. ☉

85. *tuberosa*, caul. ramoso, pedunc. umbelliferis fol. ternatis: foliol. ovatis, rad. tuberosa. Molin. chil. p. 109. Enc. bot. 4. p. 684. Hab. in R. Chilensi. O. corniculatas similis. Raul. Sol. tuberosi. M. +

86. *pentantha*, caul. erecto ramoso pedunc. umbellifero fol. brevioribus, fol. ternatis pilosis, foliol. lateralibus subrotundis emarginatis: intermedio petiolato obovato obtuso, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 21. t. 1. Hab. ad Caracas in Amer. Pedunc. quinqueflori.

87. *rhombifolia*, caul. erecto ramoso folioso, pedunc. umbellifero trifloro, fol. ternatis pubescentibus rhombeo-ovatis: foliol. sessilibus, styl. staminibus interioribus longioribus. W. p. 802. Jacq. p. 22. t. 2. Hab. cum priore. Filam. interiora hispida.

88. *rosea (chilensis)*, caule erecto, foliol. obversis cordatis, pedunc. divisis racemosis. Jacq. p. 25. Feuille. peruv. 2. p. 733.

t. 23. *O. racemosa*. Savigny in Enc. bot. 4. p. 684. Hab. in Chili locis humidis.

89. *Plumieri*, caul. erecto fruticoso folioso, pedunc. umbellifero quadrifloro folior. longitudine, fol. ternatis ovatis: foliolo intermedio longe petiolato. Willd. *O. frutescens*. L. Thunb. Diss. n°. 22. Enc. bot. 4. p. 684. Plum. spec. 2. ic. 213. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. Flor. lutei, penduli.

90. *Barrelieri*, caula erecto fruticoso ramoso folioso, pedunc. longitudine folior. bifido racemoso, fol. ternatis ovato-lanceolatis: foliol. intermedio petiolato, styl. longitudine staminum interiorum. W. Jacq. p. 24. t. 3. Enc. bot. 4. p. 684. Barr. rar. 64. t. 1139. Bocc. mus. 2. p. 61. t. 51. Hab. in Gujana, Brasilia et ad Carscas. Priorem refert. Flor. parvi. Cor. albo-incarnata, petal. 3 superiorib. basi flavo-maculatis. W.

\*\*\* *Folii digitatis, quinatis, 5. multifidis.*

91. *Burmansi*, aranlis, scapo umbellifero, fol. digitatis. W. p. 803. Jacq. p. 41. *O. bulbosa pentaphylla*, et hexaphylla flor. magnis luteis opopis. Burm. atr. 74. t. 29. Hab. ad Cap. b. spci, cum 6 sequentiibus.

92. *tomentosa*, acaulis, scapo unifloro petiolor. longitudine, fol. digitatis: foliol. lanceolato-cuneiformibus emarginatis, styl. staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 119. t. 81. Pluk. amalth. t. 350. f. 3. Fol. tomentosa, foliola tomentosa, 12-20.

93. *Iopinifolia*, acaulis, fol. digitatis lanceolatis acutiuscolis, petiol. compressis, scapo longitudine petiolor. unifloro, stylis staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 215. t. 72. Filam. glandulosa.

94. *pectinata*, acaulis, scapo unifloro longitudine petiolor., fol. digitatis linearilanceolatis obtusis, calyc. foliolis aequalib. adpressis, styl. staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 118. t. 75.

95. *Abellifolia*, acaulis, scapo unifloro petiolis longiore, fol. digitatis linearibus emarginatis, calyc. foliolis apice reflexis: unico majore spatulato, stylis staminibus interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 117. t. 74. Cor. flava.

96. *Asa*, aranlis, scapo unifloro folior. longitudine, fol. digitatis linearibus canaliculatis acutis, styl. staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 116. t. 73. Burm. atr. 68. t. 27. f. 4. Hab. inter montem Lepois et Diaboli. G

97. *enneaphylla*, scapis unifloris, petiol. enneaphyllis: foliol. cuneatis bifidis. Cav. ic. 5. p. 7. t. 411. Hab. in ins. Maclov. et Fallandi. Cor. rosea, lineis lutescentibus Rad. s. stirps repens squam. roseis imbricatis.

98. *Iaciniata*, scapis unifloris, fol. subduodecim partitis: lacin. linearibus. Cav. l. c. t. 412. Hab. in Amer. meridion. Cor. violacea. Rad. s. stirps repens squam. albi-  
caotibus tecta.

99. *mallobolba*, acaulis, scapis unifloris medio bract. 2-subulatis, foliol. 5-ovatis, bulbis lanatis. Cav. ic. 4. p. 64. t. 393. f. 2. Hab. in Amer. merid. Bulb. piperis magnitudine lana rufa densissima textili obducta. Fol. minuta.

100. *Commerioni*, *O. sexenata*, caul. pluribus foliosis: fol. 6 tomentosis, foliol. obovatis integerrimis. Savigny. Enc. bot. 4. p. 687. Hab. in Montevideo. Commer. Tomentoso-incana.

101. *quinata*, caulescens, fol. digitatis quinatis hirtis: fol. submarginatis cuneiformibus. Enc. bot. 4. p. 688. Hab. ad Cap. b. sp. Caul. apice foliosus. Cor. campanul. limbo rubello, tubo flavo. †

\*\*\*\* *Fol. pinnatis*

102. *sensitiva*, scapo umbellifero, fol. pinnatis. L. Jacq. p. 42. t. 78. f. 4. Rumph. 5. t. 104. f. 2. Rheed. 9. t. 19. Hab. in India orientali. Fol. valde irritabilia. Affinitatem habet cum Mimosis.

CARTOPHYLLUM *Decandrac pentagynae*. (Gen. 1145-48.)

1145. AGROSTEMMA. Cal. 1-phyllus, coriaceus. Petalu 5, unguiculata: limbo obtuso, indiviso. Caps. 1-locularis.

\* *Githago*. Cal. apice 5-phyllus. Cor. nulla.

1. *Githago*, hirsuta, calycib. cor. subaequantibus, petal. integris nudis. L. Flor. dan. t. 576. *Githago segetum*. Desf. atl. 1. p. 363. Hab. inter segetes. ☉

\* *nicaensis*, calycib. cor. multo longioribus, petal. albis. Willd. Altoni. Hab. in agro Nicaensi.

\*\* *Cal. 5-dentatus*. Cor. fauce coronata. Petala emarginata.

2. *Coronaria*, tomentosa, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. elongatis 1-floris, pe-  
k k 4

talibus emarginatis coronatis serratis. L. Cur. mag. t. 24. Enc. bot. 3. p. 641. sub Lychen. Hab. in Italia, Helvetiis, Canciens. ☉

3. *Flos jovis*, tomentosa, flor. umbellato-capitatis, petal. emarginatis. L. Boeck. mus. t. 42. Hal. in Helvetiis, Palatinatu, et Gall. australi. Pedunc. breves, subramosi.

4. *Coeli rosa*, glabra, fol. lineari-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis. L. Moris. f. 5. t. 22. f. 32. Boeck. sicut. t. 14. f. 2. Hab. in Sicilia, Barbaria et Oriente. ☉

1146. **LYCHNIS.** Cal. 1-phyllus, oblongus, lævis. *Petala* 5, unguiculata: limbo subbilido. *Caps.* 1-5-locularis.

1. *chalconica*, flor. fasciculatis fastigiatis. L. Hab. in Russia. In hortis colitur. Var. quoad col. florum.

2. *Flos cueuli*, petal. laciniatis, caps. 1-loculari subrotunda. L. Flor. dan. t. 500. Lam. ill. t. 397. Hab. in pratis et humidis. Var. flor. pleno et albo. ☿

3. *coronata*, glabra, flor. axillariis, terminalibusque solitariis, petal. laciniatis Thunb. jap. 187. L. grandiflora. Jacq. ic. rar. 1. t. 84. Coll. t. p. 149. Hab. in China, Japonia. Flor. coccinei, pulchri.

4. *Viscaria*, caul. geniculis viscoso, petalis integris, caps. 5-loculari. Flor. dan. t. 1032. Hab. in pratis siccis, ad rupes. An genus distinctum?

5. *alpina*, glabra, flor. densis umbellato-capitatis, petal. bifidis. Lam. enc. 3. p. 640. Flor. dan. t. 65. Hall. helv. s. 376. t. 7. Hab. in alpih. Lapponicis, Helveticis, Sibiricis, Pyrenæicis. Pet. incoroata. Flor. rubelli. Styli quatuor.

6. *diœica (alba)*, caps. conicis 1-locularibus. Flor. dan. t. 792. *β. rubra*, hirsuta, flor. diœicis, caps. subrotundis. Hab. in pratis, sylvaticis; ad sepes.

Obs. Flos solitarius inter dichotomiam in individuis foemineis tantum observatur. Flor. in V. alba nocte suaveolent. Sper. distinctae?

7. *laeta*, petal. bifidis, flor. solitariis, fol. lineari-lanceolatis glabris, calycibus decemcarinatis. Ait. Kew. 2. p. 118. Hab. in Lusitania. ☉

8. *sibirica*, pet. bifidis, caul. dichotomo, fol. subhirsuta. L. Hab. in Sibiria. Statura Silenes rupestris. ☿

9. *magellanica*, subvillosa, fol. linearibus graminæis, petal. apice bifidis calycis campanulato via longiorib. Lam. l.c. enc. 3. p. 641. Hab. in freto Magellanico. Cucub. refert.

10. *apetala*, cal. inflato, cor. calyce brevior, caul. subunisifero. L. Cucub. caule simplicissimo onidoro, cor. inclusis. Fl. lepp. 181. t. 12. f. 1. Hab. in alpih. Lapponicis, Sibiricis. ☿

Obs. Hoc genus omnium minus naturalis ea pluribus compositum, quae tantum styliorum numero conveniunt.

1147. **CERASTIUM.** Cal. 5-phyllus. *Petala* bifida, aut emarginata, passim integra. *Caps.* 1-locularis, apice dentatim detracens. (Stam. etiam 4-5.)

\* *Capsulis oblongis.*

1. *perfoliatum*, glaberrimum, ol. comnatis. Willd. Sp. II. p. 815. Gmel. sib. 4. t. 62. f. 1. Dill. elub. 295. t. 217. f. 284. Hab. in Graecia, Sibiria, et in Barbariae arenosis.

2. *sylvaticum*, diffusum repens, fol. inferiorib. ovatis, reliquis ovato-lanceolatis, cor. bifida cal. duplo longiore. Plant. rar. Hongar. p. 100. t. 97. Hab. in vallibus humidis et sylvaticis. Aest. Caps. cal. longior.

3. *vulgatum*, hirsutum subdiffusum, fol. sublanceolatis: infimis linearib., flor. subfasciculatis, cor. cal. subaequante. C. vulgatum. Curt. Lond. 2. t. 34. Vaill. Par. t. 34. f. 1. C. viscosum. Smith. brit. 2. p. 497. Hab. in pratis, ruderalis et sylvis. Non est viscosum. Caul. plerumque fusco-purpurascens. ☿

4. *diffusum*, caul. ramosissimo villosulo opaco diffuso, fol. ovato-lanceolatis tomentosis, flor. paniculato-dichotomis. Hab. in Scotia? Thiehaud. Cor. integra? cum caps. cal. aequans. +

5. *brachypetalum*, caul. erecto tomentoso dichotomo, fol. ovatis infimis rosaceis, flor. paniculatis, cal. villosulo cor. longiore. Hab. in agris prope Cenomanum (Mans) et alibi. Desportes. Caul. basi subpurpurascens, nec viscosus.

6. *spathulatum*, cent. simplice subviloso, fol. hirsutis: inferiorib. obovato-spathulatis petiolatis, caul. sessilib. subovatis,

flor. glomeratis. Hab. ad St.-Domingo. Subparvum. Caps. cal. duplo fere longior.

7. *ovale*, subviscoso-hirsutum, caul. basi ramosissimu, fol. caulinis ovalib. majoribus, flor. glomeratis. *C. vulgatum*. Smith. brit. l.c. et Lin. ? *C. glomeratum*. Thuill. Fl. paris. p. 225. Vaill. t. 30. f. 3. *C. viscosum*. Curt. Hab. in pratis, graminosis.  $\beta$  ? flor. subpaniculatis.  $\odot$

8. *viscosum*, hirsuto-viscosum, caule ramoso (divaricato), flor. paniculatis demum reflexis, petal. apice bifidis cal. subaequantib. *C. viscosum*. Curt. et plur. auctorum. Hab. in apricis, pratis. Arenulis aut terre obviscositatem inquinatum. Cal. margine et bractea apice membrana alba cincta.

\* *Alsinoides*, caul. diffuso subviscoso, fol. ovatis: summis subrotundis, pedunc. elongatis unisporis, petal. emarginatis, cal. aequantibus. Hab. circa Bordeaux. Loiselet. (Herb. Clarion.) Alsinem refert, sed caps. omnino differt, quae cal. paullo major. An var. prioris ?

9. *semidecandrum*, parvulum cespitosum, caul. subviscoso, fol. erectis ovato-oblongis, flor. subglomeratis pentandris, cor. emarg. nata cal. aequante. Vaill. paris. t. 30. f. 2. Raj. syn. t. 15. f. 1. Hab. in apricis, graminos s. Vere. Caul. biuncialis pallescens. Cal. apice purpureo, margine albidonitens. Parum viscosum. Flos solitarius elongatus.

10. *anomalum*, erectum piloso-viscosum, fol. linearibus, petal. cal. longioribus, flor. trigynis. Willd. p. 812. Hab. in Hungaria, in pratis siccis. Petala bifida. Caps. sexdentata.

11. *pentandrum*, flor. pentandris, pet. integris acutis, cal. brevioribus. L. Hab. in Hispania. Planta minima, similis *C. semidecandro*. L.  $\dagger$

12. *arvense*, fol. linearilanceolatis pubescentibus, cor. calyce duplo majoribus. L. Flor. dan. t. 626. Vaill. paris t. 30. f. 4. Hab. in versuris agrorum, ad sepes. Cor. magna. Fol. basi ciliata.

13. *lineare*, fol. linearilanceolatis acutis pubescentibus, pedunc. subunisporis tomentos, petal. cal. majoribus acutis bifidis. Willd. p. 814. Allion. pedem. 2. app. p. 365. t. 88. f. 4. Hab. in rupibus subhumidis alpinum. Pedunc. apice lanati.

14. *dichotomum*, fol. lanceolatis, caule

dichotomo, caps. erectis cal. duplo longioribus. Willd. Desf. atl. 1. p. 326. Alsine corniculata. Clus. hist. 2. p. 184. Hab. inter segetes Hispaniae et Algeriae. Caps. longissima.

15. *longifolium*, fol. linearilanceolatis, caule dichotomo, pedunc. fructiferis horizontalibus, caps. longitudine calycis. Willd. Hab. in Armenia. Caul. piloso-viscosus. Cal. hirtus. Caps. calycis longitudine. W.

16. *alpinum*, fol. ovato-lanceolatis, panic. dichotoma pauciflora, caps. oblonga recurvis. Smith. brit. 2. p. 500. Flor. dan. t. 6. Engl. bot. t. 472. C. latifol. Lightf. t. 10. Raj. syn. 3. p. 349. t. 15. f. 2.  $\beta$ . glabrum. Flor. dan. t. 979. Hab. in alpinis.  $\beta$ . in humidis ?

17. *latifolium*, fol. ellipticis scabris, pedunc. terminalib. simplicibus subsolatis, caps. ovata (turgida). Smith. brit. 2. p. 501. Engl. bot. t. 473. Jacq. Coll. 1. p. 256. t. 20. Hab. in alpib. et montib. alpis. Caespitosa. Fol. subovata, plis brevib. rigidis, articulata scabra. S.

18. *lanatum*, fol. ovato-subrotundis dense inaequalilatis, caps. rectis angulatis, caulic. brevissimis subbitoris. Lam. enc. 1. p. 680. Lapeyr. Flor. d. Pyrén. p. 18. Hall. belv. n. 88. Hab. in alpinis. Pusillum, albicans. Fol. subrotunda, minuta, duriuscula. Lap.

19. *suffruticosum*, caul. cespitoso nondum perennantibus, fol. linearilanceolatis rigidis, cal. aristis glabro, caps. oblongis subcurvis. Lam. enc. 1. p. 681. Hab. in Galloprovincia, in monte Ste.-Victoire.  $\beta$ . *camphoratnefolia*. Tournef. Cor. 18. Circa Smyrnem. Facie Ar. juniperinae. Fol. subscaesculata. Lam. An b. l. *C. taricifolium*. Vill. Delph. 3. p. 644 ?

\* \* *Capsulis subrotundis.*

20. *repens*, fol. lanceolatis, pedunc. ramosis, caps. subrotundis. L. C. caule perenni procumbente, fol. lanceolatis tomentos. Roy. lugdb. 450 ? Lam. ill. t. 392. f. 2. Col. phytob. 115. t. 31. Hab. in Gallia, Italia, Carniola. Fol. glabra. T.

21. *strictum*, fol. linearib. acuminatis glabris, pedunc. bifloris, calycibusque tomentos, caps. globosis. L. Jacq. Coll. 2. p. 65. Scop. carn. t. 19. f. 2. Hab. in alpib. Pedunc. unif.-biflorus, in medio bracteis duabus lanceolatis.

Obs. In *C. stricto* Allioni, caul. simpli



cliter dichotomus, 2-3-florus, caps. cylindrica, pedunc. apice pilis brunneis tomentosi: an diversum?

22. *maximum*, fol. lanceolatis scabris petal. crenatis, capsul. globosis. Gmel. sib. 4. p. 150. n. 51. t. 62. f. 2. Hab. in Sibiria.

23. *dioticum*, hirtum viscidum, fol. lanceolatis. flor. dioicis, petal. calyce triplo longioribus. Ait. Kew. a. p. 120. Hab. in Hispania.  $\bar{\tau}$

24. *tomentosum*, fol. oblongis tomentosis, pedunc. ramosis, caps. globosis. L. Willd. p. 817. Hab. in Granada. Lio.  $\dagger$

25. Secundum cl. Lamarck Eoc. 1. p. 680. caps. cylindrica est, an forte diversa species? quae etiam in Italia et in alpinis provenit. Sed. caps. immatura in puribus globosae.

26. *manticum*, glabrum, caule elongato stricto, fol. lanceolatis, pedunc. longissimis, caps. globosis. L. Plant. long. p. 60. t. 56. Hab. in Hungaria, Vconae, et in Helvetia. Facie differt Stellariae.

1148. SPERGULA. Cal. 5-phyllus.

Petala 5, integra. Caps. ovata, 1-locularis, 5-valvis. (Stam. etiam 5.)

\* *Fol. verticillatis, caule stipulaceo.*

1. *arvensis*, diffusa, fol. verticillatis, flor. decandris. L. Lam. ill. t. 392. f. 1. Flor. dan. t. 2033. Hab. in Europae agris. Var. stam. numero. Sem. reniformia, nec alata.

2. *pentandra*, fol. verticillatis, flor. subpentandris, acminib. margine albo-membraceis. Lam. ill. l. c. f. 2. Hab. in sylva. Verc. Var. stam. 5, 7 et 10.

3. *geniculata*, glabra, caul. elongato, ramis folisque ad nodos verticillatis. Singulari haec species prope Montepellier observata est a cl. Thiebaud. Caul. ultra pedalis, geniculatus, ad nodos quasi viviparus. Pedunc. dichotomi, multiflori: flor. parvulis. An forte prioris var. luxurians?  $\bar{h}$ ?

4. *grandis*, fol. verticillatis internodiis longioribus, pedunc. dichotomis, flor. secundis. Hab. in Monte-Video (Herb. Juss.). Caul. pedalis, crassus.

5. *villosa*, caul. folisque villosopubescentibus. Hab. cum priora.

\* *Folii oppositis. Caul. exstipulaceus. (Saginae?)*

6. *nodosa* (palustris), fol. oppositis subulatis laevibus: infimis late vaginantibus. caulib. simplicibus. Flor. dan. t. 56. Hab. in paludosis et in campis lumenibus.

7. *brevifolia*, caul. simplicissimus: nodis plus approximatis, fol. caulinis brevissimis. In campis subaridis. Flor. major. culi. *Y. maritima*, fol. carnosulis incurvo-patulis. Ad maris litora.

8. *laricina*, decumb., fol. oppositis subulatis ciliatis fasciculatis. L. Smith. ic. ined. t. p. 18. t. 18. Lam. ill. t. 392. f. 3. Gmel. sib. 4. p. 155. n. 61. Hab. in Sibiria. Flor. magis.

9. *saginoides*, fol. oppositis linearibus laevibus, pedunc. solitariis longiss., flor. pentandris, caul. repente. Sw. in Act. nor. holm. 1789. p. 83. t. 1. f. 2. Willd. p. 820. S. laricina. Wolf. ? S. subulata. Smith. brit. 2. p. 504? Hab. in alpinis. Fol. ad genicula fasciculata. (Var. Saginae procumb.?)

10. *subulata*, fol. oppositis subsecundis linearibus subulatis carinatis ciliatis, flor. decandris. Swartz. l. c. 1789. p. 39. t. 1. f. 3. Sparg. saginoides. Curt. lond. Hab. in pascuis subalpinis.

11. *glabra*, fol. oppositis fasciculatis filiformibus, glabris, flor. decandris, petal. cal. majoribus. Willd. p. 821. Sparg. saginoides. Allion. pedem. n. 1735. t. 64. f. 1. Hab. in in pascuis umbrosis alpinum Valdensium.  $\bar{\tau}$

## DECAGYNIA.

1149. NEURADA. Cal. 5-partitus.

Petala 5. Caps. infera, orbicularis, 10-locularis, 10-sperma, aculeata. Sem. solitaria.

1. *procumbens*. L. Lam. ill. t. 393. Hab. in Aegypto, Arabia et Barbaria. Albicans. Fol. alternis, sinuatis, tomentosa. Flor. axillares.  $\odot$

Obs. Semen germinans capsul. perforat. annuli ad iostur in collo radices, etiam in planta adulta, persistit.

1150. PHYTOLACCA. Cal. 6. Petala 5, calycina. Bacca super, 10-locularis, 10-sperma. (Flor. 5-7-8-10-gyni et 7-8-20-andri.)

1. *octandra*, flor. octandris octogynis. L. Willd. elch. 218. t. 239. 308. Lam. ill. t. 393.

f. 2. Kaempf. amoen. t. 829. Hab. in Mexico.  
Cor. albaplena.  $\overline{\text{T}}$  - - -

2. *stricta*, flor. octandris heptagynis, fol. lanceolatis mucronatis. Hoffm. Comment. goett. 12. p. 27. t. 3. P. heptandra, flor. heptandris hexagynis, fol. lanceolatis. Retz. obs. 6. p. 29. Hab. in America.  $\overline{\text{T}}$

3. *abyssinica*, flor. decandris pentagyn. Hoffm. l. c. p. 28. t. 2. P. dodecandra. P'Herit. stirp. 1. 143. t. 69. Hab. in Abyssinia.  $\overline{\text{h}}$

4. *decandra*, flor. decandris decagynis.

L. Lam. ill. t. 393. f. 1. Dill. elth. 318. t. 339. f. 304. Hab. in Virginia, Barberia, et in Helvetia.

5. *icosandra*, flor. leotandris decagynis. L. Mill. ic. 138. t. 207. Hab. in India orientali. Caul. tripetalis, herbaceus, subdivisus. Fol. strictiora. Flor. albi.  $\overline{\text{T}}$

6. *dicica*, frutescens, flor. dioicis. L. l'Herit. stirp. 1. p. 145. t. 70. Hab. in America australi. Fol. Populi nigrae, longius petiolata. Flor. dioici polyandri. L.

### MONOGYNIA.

Asclepiadeae quaedam et Gerania plura. Conocarpus racemosa. Mangifera axillaris. Rhezia et Osbeckiae quaedam. Gnidia daphnacfolia. Cupheae plures species. Grislea tomentosa. Portulaca pilosa et oleracea. Gomphia jabotapita. Sideroxylon decandrum. Icica decandra. Erithalis fruticosa. Combretum purpureum, alternifolium, decandrum. Bocconia frutescens. Stellera chamaejasme. Laurus Borbonia. Viburnum? scandens. Chlora perfoliata, Var.  $\beta$ . Litsea chinensis.

### TRIGYNIA.

Tamarix Germanica. Polygonum Bistorta. Brunichia cirrrosa. Cerastium anomalum.

### TETRAGYNIA.

Silene aegyptiaca et (Lychnis. L.) quadridentata. Lychnis alpina. Reseda undata.

### PENTAGYNIA.

Aloxa moscatellina. Gerania quaedam. Drosera lusitanica. Portulaca oleracea. Rhodiola rosea. Coriaria myrsinifolia. Phytolacca abyssinica.

*Sequentes plantæ LINNÆANÆ, omissæ addantur.*

Pag. 6. *BITUM chenopodioides*, capitellis verticillatis exsuccis. Lin. Mant. p. 170. Hab. in Tartaria. ☉

Pag. 124. *APERULA calabrica* (*foetida*), fol. oppositis lineari-lanceolatis, caul. fruticoso. Lin. suppl. p. 120. Willd. Sp. I. p. 517. L'Her. Stirp. t. p. 65. t. 32. Scherardia foetida. Lam. ill. gen. p. 267. Cyrill. caract. t. 3. f. 7. Hab. in Calabria, Ailante et in Syriæ montibus. Cor. rubella. Suffrutescens.

*Obs.* Hæc species, de cujus loco auctores ambigunt, non male proprium genus tum ab stigmata, tum ab fructum constituere posset secundum characteres sequentes:

**PUTORIA.** *Cal.* 4-dentatus, persistens, demum haccans. *Cor.* tubuloso-infundibuliformis: limbo 4-fido. *Stylus* bifidus acutus. *Bacca* subcompressa. *Semina* 2, oblonga.

Pag. 265. **ALLAMANDA.** Contorta.

*Caps.* lentiformis, echinata, 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *cathartica*. Lin. Willd. Sp. I. p. 1231. Sert. Hannov. Fasc. 4. p. 8. t. 24. *Orelia grandiflora*. Aubl. guj. t. p. 271. t. 106. Hab. juxta fluvios in Guiana et Surinamo. Fol. 4-na, ovato-oblonga subrepanda. Cor. magna, flava. h

Pag. 411. **BURSERA.** *Cal.* 3-4-fidus. *Petala* 4, ovata. *Caps* subcarnosa, 3-locularis, 3-valvis. *Semina* solitaria.

1. *gummifera*, fol. pinnatis ovatis acuminatis, flor. racemosis polygamis. B. gummifera. Lin. syst. veg. Swartz. obs. bot. p. 130. Hab. in Amer. occident. campis. Flor. hermaphroditi 6-audri; masculi stamina 5-8-to. Sw.

2. *balsamifera*, fol. ovatis oblongis acuminatis, flor. paniculatis, pedicellis breviusculis oppositis. *Hedwigia balsamifera*. Swartz. Flor. cfr. huj. libri p. 414. Flor. conformes cum priore.

## CORRIGENDA ET ADDENDA.

- Pag. 12. *Veronica latifolia*. Ait. n<sup>o</sup>. 47. eadem est ac *V. Teucrium*. Roth. N. Bot. Beytr. p. 69. seu *V. Pseudochamedrys*. Jacq. Econtrario *V. urticifolia*. Ait. est vera *V. latifolia*. Lin. Syst. pl. ed Reich. p. 34.
15. in columna 1. Ho. 23. loc. *longo* leg. *longa*, in eolum. 2. lin. 15. dele Hab
28. *Salvia fatida* Desf. eadem ac *tingitana*, n<sup>o</sup>. 86.
34. lin. 29. loc. *scirpae* l. *scirpae* s. *scirpoideae*.
39. post *Rhria petioliflora* add., Willd. Sp. I. p. 186.
61. *Cyper. pygmaeus*. Cav. est *Scirp. michelianus*?
90. n<sup>o</sup>. 28. *Poa sudetica* var.  $\beta$ . non diversa a *P. trinervata*.
94. in col. 2<sup>a</sup> lin. ultima, leg. *divaricata*.
96. n<sup>o</sup>. 23. loc. *retusa* leg. *retusus*.
107. lin. 28. in col. 1. leg. *Collodea* (Cav.)
110. colum. 1. lin. 18. loc. *speculare* l. *peculiare*.
129. Ad *Vallantia cordatam* add. Lam. ill. gen. t. 843. f. 3. et ad *V. cucullatam*. Lam. l. c. f. 2.
139. *Plantago microcephala*. Poir. vix diversa a *Pl. villosa* Roth. n<sup>o</sup>. 13.
143. col. 1. lin. ultima loc. 28. leg. 30.
145. *Ludwigia Jussiacoides* Mich. potius est *Jussiac* spec.; *J. brachysperma*. Lam. enc. 3. p. 331?
150. in col. 1. lin. 15. post-Stam. add. 1 s. unicum.
153. *Sagina cerastoides* nunc *Cerast. tetrandrum*. Smith. brit. 2. p. 498.
161. ad *Symphytum* var.  $\gamma$  dele ( $\alpha$  et  $\beta$ ) post Habit. collocandum.
179. *C. Jalapa* (*Ipomaea*!) eadem ac *Ipomaea Macrorisa* Mich.
180. n<sup>o</sup>. 90. ad Conv. *evoluloides* Desf. add. *C. undulatus*. Cav. ic. 3. p. 39. t. 277. f. 2.
200. in col. 1. in lin. 12 et 35. post stigma pone punctum s. leg. *stigmatc.*  
— in col. 2. lin. 21. leg. *Nyctanthi*.
208. *Coffea* leg. *cal. crescens*.
225. n<sup>o</sup>. 70. dele synonym. *Lamarckii*, quod ad n<sup>o</sup>. 62. pertinet.
232. *Lycium barbatum* n<sup>o</sup> 16. nunc *Serissa capensis*. Thunb. Procl. suppl.
234. *Genera Beckea* et *Imbricaria* (quae tamen pentandra est secundum Gaertnerum) ad classem octavam amandanda.
238. lin. *RHAMNUS* leg. *RHAMNUS*.
244. loc. 1. lin. 23. leg. *saccata*, *fornicata*.
258. *Achyr. halimifolia*. Lam. non diversa ab *Illecebro frutescente* L'Her., quod idem ac *J. alneifolium* Scop.?
267. col. 2. lin. 15. l. *capitatum* leg. *capitulum*.
281. col. 2. lin. 6. loc. *aalto* leg. *alato*.
285. col. 2. var.  $\beta$ ? et  $\gamma$  sub n<sup>o</sup>. 30. ponendae.
290. col. 1. leg. *Linconia alopecuroidea*.

Pag.

310. *Atham. sibirica* n°. 2. crescit quoque in Hungaria, vid. Pl. rar. Hong.  
r. 60. t. 60.  
311. *C. hr. microcarpos*. n°. 5. eadem videtur ac *C. taurica*.  
320. *Anthriscus* n°. 2 et 3. leg. *nodosus* et *trichospermus*.  
327. *Cassine lavigata* Lam. est *Celastrus lucidus* L'Herit.  
330. *Alsine viscosa* forte numero staminum ab *Arenaria viscosa* tantum  
diversa.  
365. *Scilla praecox* n°. 13. est var. *S. bifolia*.  
368. *Phalangium Adenantha* Forst. non differre dicitur a *Dianella nemorosa*.  
417. col. 2. l. *Apolifolium* l. *Opalifolium*.  
442. in col. 2. lin. 3. ab inferiore dele \* \* *Caps. ovatis* et pone ante *Paulliniam curassavicum*.  
453. in col. prima. lin. 3. loco nervillo leg. vexillo.  
467. in col. 1. lin. 15. leg. 5-partitus, loc. 6-partitus.  
503. n°. 21. *Arenaria dianthoides*, post scabris add. flor. capitatis. — Spec. 23.  
delenda.

*Obs.* Vitia typographica, ob litteras minutas correctu difficillima, praecipua hic  
sunt adnotata, ea quae minoris momenti sunt, quisque facile corriget.

## I N D E X

*Generum, subgenerum, nominum Familiae plantarum et  
synonymorum generum præcipuorum.*

| A.                                 | Pag.       |                                      | Pag.       |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Abronia. . . . .                   | <u>156</u> | Aidia. . . . .                       | <u>214</u> |
| Acæna. . . . .                     | <u>141</u> | Aira. . . . .                        | <u>76</u>  |
| Acer. . . . .                      | <u>417</u> | <i>Ajovea</i> vid. <i>Laurus</i> .   |            |
| Achras. . . . .                    | <u>235</u> | Albuca. . . . .                      | <u>361</u> |
| Achyranthes. . . . .               | <u>258</u> | Alchemilla. . . . .                  | <u>149</u> |
| Acisanthera. . . . .               | <u>477</u> | Aldea. . . . .                       | <u>168</u> |
| Acorus. . . . .                    | <u>382</u> | Aldrovanda. . . . .                  | <u>336</u> |
| <i>Acronychia</i> vid. <i>Lau-</i> |            | Aletris. . . . .                     | <u>377</u> |
| sonja.                             |            | Alisma. . . . .                      | <u>400</u> |
| Actinophyllum. . . . .             | <u>404</u> | Allamanda. vid. add.                 | <u>524</u> |
| Adenantha. . . . .                 | <u>461</u> | Allionia. . . . .                    | <u>122</u> |
| Adenostemum. . . . .               | <u>467</u> | Allium. . . . .                      | <u>355</u> |
| Adoxa. . . . .                     | <u>446</u> | <i>Allophylus</i> vid. <i>Orni-</i>  |            |
| Aechmea. . . . .                   | <u>345</u> | trophe.                              |            |
| Aegiceras. . . . .                 | <u>249</u> | Aloe . . . . .                       | <u>378</u> |
| Aegilops. . . . .                  | <u>107</u> | Alopecurus. . . . .                  | <u>79</u>  |
| Aegiphila. . . . .                 | <u>132</u> | Alpinia. . . . .                     | <u>3</u>   |
| Aegopodium. . . . .                | <u>324</u> | Alsine. . . . .                      | <u>330</u> |
| Aesculus. . . . .                  | <u>403</u> | Alstroemeria. . . . .                | <u>380</u> |
| Aethusa. . . . .                   | <u>318</u> | <i>Alternanthera</i> v. <i>Achy-</i> |            |
| Afzelia. . . . .                   | <u>455</u> | ranth.                               |            |
| Agave. . . . .                     | <u>379</u> | Amaryllis. . . . .                   | <u>352</u> |
| <i>Aglæa</i> . . . . .             | <u>46</u>  | Amethystea. . . . .                  | <u>24</u>  |
| Agrostenima. . . . .               | <u>519</u> | Ammannia . . . . .                   | <u>146</u> |
| Agrostis. . . . .                  | <u>74</u>  | Ammi. . . . .                        | <u>307</u> |

|                                  | Pag. |                                 | Pag. |
|----------------------------------|------|---------------------------------|------|
| Amomum. . . . .                  | 2    | Aralia. . . . .                 | 331  |
| Amyris. . . . .                  | 414  | Arbutus. . . . .                |      |
| Amsonia. . . . .                 | 269  | Arctopus. . . . .               | 301  |
| Anabasis. . . . .                | 297  | Ardisia. . . . .                | 232  |
| Anacardium. . . . .              | 450  | <i>Arduina</i> vid. Carissa     |      |
| Anagallis. . . . .               | 173  | Arenaria. . . . .               | 502  |
| Anagyris. . . . .                | 454  | Aretia. . . . .                 | 168  |
| Anassera. . . . .                | 265  | <i>Argolasia</i> vid. Lanaria.  |      |
| <i>Anavinga</i> vid. Casearia.   |      | Argophyllum. . . . .            | 175  |
| Anchusa. . . . .                 | 159  | Ariona. . . . .                 | 212  |
| Ancistum. . . . .                | 30   | Aristea. . . . .                | 41   |
| Andromeda. . . . .               | 480  | Aristida. . . . .               | 98   |
| Andropogon. . . . .              | 103  | Artedia. . . . .                | 308  |
| Androsace. . . . .               | 169  | Aruna. . . . .                  | 30   |
| Anethum. . . . .                 | 323  | Arundo. . . . .                 | 102  |
| Angelica. . . . .                | 315  | <i>Arundinaria</i> vid. Miegia. |      |
| <i>Anguillaria</i> vid. Ardisia. |      | Asclepias. . . . .              | 275  |
| Anredera. . . . .                | 297  | Asparagus. . . . .              | 370  |
| Anthericum. . . . .              | 369  | <i>Asperifolia</i> . . . . .    | 155  |
| Anthistiria. . . . .             | 106  | Asperugo. . . . .               | 162  |
| Antholyza. . . . .               | 42   | Asperula. . . . .               | 124  |
| Anthoxanthum. . . . .            | 30   | Asphodelus. . . . .             | 367  |
| Anthriscus. . . . .              | 320  | Astrantia. . . . .              | 304  |
| Antichorus. . . . .              | 418  | Astanthus. . . . .              | 403  |
| <i>Antirhea</i> vid. Melanea.    |      | Athamanta. . . . .              | 310  |
| Anychia. . . . .                 | 261  | Atraphaxis. . . . .             | 394  |
| <i>Apaltoa</i> vid. Crudia       |      | Atriplex. . . . .               | 292  |
| Aphanes. . . . .                 | 150  | <i>Atriplicina</i> . . . . .    | 292  |
| Aphyllantes. . . . .             | 386  | Atropa. . . . .                 | 218  |
| Apium. . . . .                   | 324  | Avena. . . . .                  | 99   |
| Apluda. . . . .                  | 105  | Averrhoa. . . . .               | 509  |
| <i>Apocynæ</i> . . . . .         | 264  | Ayenia. . . . .                 | 263  |
| Apocynum. . . . .                | 274  | Azalea. . . . .                 | 212  |
| Aponogeton. . . . .              | 400  | Azima. . . . .                  | 145  |
| Aquartia. . . . .                | 133  | Azorella. . . . .               | 303  |
| Aquilaria. . . . .               | 485  | B.                              |      |
| <i>Aquilicia</i> vid. Leea.      |      | Bacopa. . . . .                 | 173  |
|                                  |      | Beckea.                         |      |

|                                     | Pag. |                                           | Pag. |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| Bæa. . . . .                        | 15   | Brunia. . . . .                           | 246  |
| Beckea. . . . .                     | 234  | Brunichia. . . . .                        | 442  |
| Bæobotrys. . . . .                  | 175  | Buhon. . . . .                            | 317  |
| Bambos. . . . .                     | 393  | <i>Buena</i> vid. <i>Gonzalea</i> .       |      |
| Banisteria. . . . .                 | 506  | Buginvillæa. . . . .                      | 418  |
| Banksia. . . . .                    | 113  | Bucida. . . . .                           |      |
| Barreria. . . . .                   | 250  | Buddleia. . . . .                         | 135  |
| Bartonia. . . . .                   | 141  | Buffonia. . . . .                         | 150  |
| Basella. . . . .                    | 331  | <i>Buglossum</i> . . . . .                | 159  |
| <i>Bassia</i> vid. <i>Salsola</i> . |      | <i>Bulliarda</i> vid. <i>Tillæa</i> .     |      |
| Bassovia. . . . .                   | 173  | Bumalda. . . . .                          | 290  |
| Batschia. . . . .                   | 158  | Buttneria. . . . .                        | 262  |
| Bauhinia. . . . .                   | 454  | Bulbocodium. . . . .                      | 355  |
| Bellonia. . . . .                   | 210  | <i>Bumelia</i> . . . . .                  | 237  |
| Bergera. . . . .                    | 466  | Bunium. . . . .                           | 308  |
| <i>Belemcanda</i> . . . . .         | 48   | Bupleurum. . . . .                        | 304  |
| Berberis. . . . .                   | 387  | Burmannia. . . . .                        | 346  |
| Bergia. . . . .                     | 513  | Bursaria. . . . .                         | 248  |
| Bertiera. . . . .                   | 203  | Bursera vid. <i>addenda</i> .             |      |
| Beta. . . . .                       | 195  | Butomus. . . . .                          | 451  |
| <i>Billardiera</i> . . . . .        | 249  |                                           |      |
| Blackburnia. . . . .                | 145  | C.                                        |      |
| Bladhia. . . . .                    | 233  | <i>Caballeria</i> vid. <i>Manglilla</i> . |      |
| Blæria. . . . .                     | 135  | Cachrys. . . . .                          | 311  |
| Blitum. . . . .                     | 6    | Cacucia. . . . .                          | 470  |
| Boerhaavia. . . . .                 | 36   | Cadia. . . . .                            | 461  |
| Borago. . . . .                     | 162  | Cæsalpinia. . . . .                       | 460  |
| <i>Boragineæ</i> . . . . .          | 145  | <i>Calamagrostis</i> vid.                 |      |
| Bororia. . . . .                    | 419  | Agrostis.                                 |      |
| Boscia. . . . .                     | 151  | Calamus. . . . .                          | 383  |
| Bosea. . . . .                      | 297  | Calanchœe. . . . .                        | 445  |
| Bowlesia. . . . .                   | 303  | <i>Calboa</i> vid. <i>Macrostema</i> .    |      |
| Brabejum. . . . .                   | 117  | Calceolaria. . . . .                      | 15   |
| Briza. . . . .                      | 92   | Callicarpa. . . . .                       | 133  |
| Bromelia. . . . .                   | 343  | <i>Callicocca</i> vid. <i>Cephæelis</i> . |      |
| Bromus. . . . .                     | 06   | Callisia. . . . .                         | 56   |
| Brossæa. . . . .                    | 175  | Callitriche. . . . .                      | 5    |



|                                | Pag. |                                  | Pag. |
|--------------------------------|------|----------------------------------|------|
| Callixene. . . . .             | 373  | Cedrela. . . . .                 | 248  |
| Caliodendrum. . . . .          | 248  | Cedrota. . . . .                 | 415  |
| Calymenia . . . . .            | 36   | Celastrus. . . . .               | 241  |
| <i>Calyxhymenia</i> vid. Ca-   |      | Celosia. . . . .                 | 256  |
| lymenia.                       |      | Celtis. . . . .                  | 291  |
| Camax . . . . .                | 249  | Cenchrus. . . . .                | 71   |
| Cameraria. . . . .             | 268  | <i>Centaurella</i> vid. Centaur. |      |
| <i>Campanulacææ</i> . . . . .  | 187  | Centaurium. . . . .              | 137  |
| Camphorosma. . . . .           | 149  | Centunculus. . . . .             | 141  |
| Canarina. . . . .              | 393  | Cephæelis. . . . .               | 202  |
| Canephora. . . . .             | 202  | Cephalanthus. . . . .            | 119  |
| Canna. . . . .                 | 1    | Cerdana. . . . .                 | 168  |
| Canthium. . . . .              | 200  | <i>Ceranthus</i> v. Chionanth.   |      |
| Cansiera. . . . .              | 148  | Cerastium. . . . .               | 520  |
| Cantua. . . . .                | 187  | <i>Ceratia</i> . . . . .         | 287  |
| <i>Caprifoliææ</i> . . . . .   | 213  | Ceratostema. . . . .             | 480  |
| <i>Caprifolium</i> . . . . .   | 210  | Ceratoccephalus. . . . .         | 341  |
| Capsicum. . . . .              | 229  | Ceratopetalum. . . . .           | 471  |
| Capura. . . . .                | 388  | Cerbera. . . . .                 | 266  |
| Cardiospermum. . . . .         | 444  | Cercis. . . . .                  | 454  |
| Carissa. . . . .               | 266  | Cerinthe. . . . .                | 161  |
| Carmonea. . . . .              | 290  | Ceropegia. . . . .               | 277  |
| Carapa. . . . .                | 416  | <i>Cerophyllum</i> . . . . .     | 320  |
| <i>Caroxylon</i> vid. Salsola. |      | Cervantesia. . . . .             | 235  |
| Carphalea. . . . .             | 125  | Cestrum. . . . .                 | 230  |
| Carpodetus. . . . .            | 246  | Chærophyllosum. . . . .          | 320  |
| Carum. . . . .                 | 323  | <i>Chalcus</i> vid. Murraya.     |      |
| <i>Caryophilleææ</i> . . . . . | 491  | Chamærops. . . . .               | 599  |
| Casearia. . . . .              | 484  | Chenopodium. . . . .             | 291  |
| Cassia. . . . .                | 456  | <i>Chenolea</i> vid. Salsola.    |      |
| Cassine. . . . .               | 327  | Cherleria. . . . .               | 503  |
| Cassyta. . . . .               | 450  | Chimarrhis. . . . .              | 210  |
| Catesbæa. . . . .              | 130  | Chiococca. . . . .               | 209  |
| <i>Catha</i> vid. Celastrus.   |      | Chionanthus. . . . .             | 9    |
| Caucalis. . . . .              | 306  | Chironia. . . . .                | 282  |
| Caulophyllum. . . . .          | 387  | Chlora. . . . .                  | 418  |
| Ceanothus. . . . .             | 244  | Chloranthus. . . . .             | 148  |

|                                    | Pag. |                                         | Pag. |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| Chloris. . . . .                   | 87   | <i>Conchium</i> vid. <i>Hakea</i> .     |      |
| Chomelia. . . . .                  | 131  | <i>Condalia</i> . . . . .               | 241  |
| Chrysitrix. . . . .                | 71   | <i>Condalia</i> vid. <i>Coccocyps</i> . |      |
| Chrysophyllum. . . . .             | 236  | <i>Conium</i> . . . . .                 | 308  |
| Chrysosplenium. . . . .            | 487  | <i>Conocarpus</i> . . . . .             | 211  |
| Chrysurus. . . . .                 | 80   | <i>Conospermum</i> . . . . .            | 116  |
| Chunchoa. . . . .                  | 486  | <i>Convallaria</i> . . . . .            | 372  |
| Cicuta. . . . .                    | 318  | <i>Convolvulus</i> . . . . .            | 177  |
| Cinna. . . . .                     | 6    | <i>Convolvulacei</i> . . . . .          | 176  |
| Cinchona. . . . .                  | 196  | <i>Copaifera</i> . . . . .              | 462  |
| <i>Cipura</i> vid. <i>Marica</i> . | 487  | <i>Coprosma</i> . . . . .               | 298  |
| Circea. . . . .                    | 10   | <i>Cordia</i> . . . . .                 | 166  |
| Cissus. . . . .                    | 142  | <i>Cordyline</i> . . . . .              | 372  |
| Claytonia. . . . .                 | 253  | <i>Coriandrum</i> . . . . .             | 319  |
| Clcome. . . . .                    | 390  | <i>Coris</i> . . . . .                  | 171  |
| Clethra. . . . .                   | 483  | <i>Corispermum</i> . . . . .            | 5    |
| Cneorum. . . . .                   | 39   | <i>Cornidia</i> . . . . .               | 445  |
| Cnestis. . . . .                   | 510  | <i>Cornucopie</i> . . . . .             | 71   |
| Cobaea. . . . .                    | 185  | <i>Cornus</i> . . . . .                 | 143  |
| Coccoloba. . . . .                 | 442  | <i>Correa</i> . . . . .                 | 419  |
| Coccocypsilum. . . . .             | 132  | <i>Corrigiola</i> . . . . .             | 330  |
| Codia. . . . .                     | 438  | <i>Cortesia</i> . . . . .               | 249  |
| Codon. . . . .                     | 465  | <i>Cortusa</i> . . . . .                | 170  |
| Codonum. . . . .                   | 136  | <i>Corynocarpus</i> . . . . .           | 233  |
| Coffea. . . . .                    | 208  | <i>Corypha</i> . . . . .                | 382  |
| Colchicum. . . . .                 | 398  | <i>Cosmibuena</i> . . . . .             | 197  |
| Coldenia. . . . .                  | 153  | <i>Cossinia</i> . . . . .               | 388  |
| Colladea. . . . .                  | 107  | <i>Costus</i> . . . . .                 | 2    |
| Colletia. . . . .                  | 244  | <i>Cotyledon</i> . . . . .              | 510  |
| Collinsonia. . . . .               | 29   | <i>Contarea</i> . . . . .               | 392  |
| Columellia. . . . .                | 13   | <i>Coutoubea</i> . . . . .              | 137  |
| Combretum. . . . .                 | 413  | <i>Crassula</i> . . . . .               | 357  |
| Cometes. . . . .                   | 147  | <i>Cressa</i> . . . . .                 | 288  |
| Commelina. . . . .                 | 55   | <i>Crinum</i> . . . . .                 | 352  |
| Commersonia. . . . .               | 340  | <i>Crithmum</i> . . . . .               | 311  |
| Comocladia. . . . .                | 39   | <i>Crocus</i> . . . . .                 | 41   |
| Conanthera. . . . .                | 370  | <i>Crowea</i> . . . . .                 | 465  |

|                                     | Pag. |                                         | Pag. |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| Crudia. . . . .                     | 462  | Dentella. . . . .                       | 205  |
| Cruzita. . . . .                    | 150  | Detarium. . . . .                       | 462  |
| Cryptandra. . . . .                 | 250  | Deutzia. . . . .                        | 505  |
| Cryptospermum. . . . .              | 122  | Dialium. . . . .                        | 9    |
| Cryptostomum. . . . .               | 232  | Dianella. . . . .                       | 312  |
| <i>Cubæa</i> vid. <i>Tachia</i> .   |      | <i>Dianthera</i> vid. <i>Insticia</i> . |      |
| Cucubalus. . . . .                  | 495  | Dianthus. . . . .                       | 493  |
| <i>Cucullaria</i> . . . . .         | 4    | Diapensia. . . . .                      | 185  |
| <i>Cupia</i> . . . . .              | 200  | Dichondra. . . . .                      | 288  |
| <i>Cunninghamia</i> vid. <i>Me-</i> |      | Dichromena. . . . .                     | 57   |
| lanca.                              |      | Dictamnus. . . . .                      | 464  |
| Curculigo. . . . .                  | 362  | Diervilla. . . . .                      | 214  |
| Cuminum. . . . .                    | 318  | Digitaria. . . . .                      | 84   |
| Cunonia. . . . .                    | 486  | Dilatris. . . . .                       | 54   |
| Cupania. . . . .                    | 413  | <i>Dilepyrum</i> vid. <i>Muh-</i>       |      |
| Curcuma. . . . .                    | 4    | lenbergia.                              |      |
| Cuscuta. . . . .                    | 239  | <i>Dimocarpus</i> vid. <i>Eu-</i>       |      |
| Cussonia. . . . .                   | 298  | phoria.                                 |      |
| Cyanella. . . . .                   | 366  | Diodia. . . . .                         | 124  |
| Cyclamen. . . . .                   | 171  | Dionæa. . . . .                         | 469  |
| Cynanchum. . . . .                  | 272  | Diosma. . . . .                         | 246  |
| Cynodon. . . . .                    | 85   | Diphylleia. . . . .                     | 387  |
| Cynoglossum. . . . .                | 159  | Diplasia. . . . .                       | 70   |
| Cynometra. . . . .                  | 456  | Dipsacus. . . . .                       | 119  |
| Cynosurus. . . . .                  | 86   | <i>Dirca</i> . . . . .                  | 435  |
| Cyperus. . . . .                    | 60   | Disandra. . . . .                       | 402  |
| Cyrilla. . . . .                    | 175  | Disodæa. . . . .                        | 210  |
| Cyrthanthus. . . . .                | 352  | Dodecatheon. . . . .                    | 170  |
|                                     |      | Dodonæa. . . . .                        | 415  |
| D.                                  |      | Donatia. . . . .                        | 111  |
| Dactylis. . . . .                   | 88   | Doræna. . . . .                         | 173  |
| Dais. . . . .                       | 471  | Dracæna. . . . .                        | 371  |
| Danaïs. . . . .                     | 198  | Drapetes. . . . .                       | 148  |
| Daphne. . . . .                     | 434  | Drimia. . . . .                         | 374  |
| Datura. . . . .                     | 216  | Drosera. . . . .                        | 336  |
| Daucus. . . . .                     | 306  | Drypis. . . . .                         | 331  |
| Davisia. . . . .                    | 454  | Dulichium. . . . .                      | 65   |

|                                          | Pag. |                                         | Pag. |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| <i>Duroia</i> vid. <i>Genipa</i> .       |      | <i>Ernodea</i> .                        | 131  |
| <i>Duhamelia</i> .                       | 203  | <i>Erycibe</i> .                        | 250  |
| E.                                       |      | <i>Eryngium</i> .                       | 299  |
| <i>Echinophora</i> .                     | 301  | <i>Erythræa</i> .                       | 283  |
| <i>Echites</i> .                         | 270  | <i>Erythronium</i> .                    | 360  |
| <i>Echium</i> .                          | 163  | <i>Erythroxyton</i> .                   | 508  |
| <i>Echiochilon</i> .                     | 164  | <i>Escallonia</i> .                     | 234  |
| <i>Ehretia</i> .                         | 166  | <i>Eucomis</i> .                        | 359  |
| <i>Ehrharta</i> .                        | 393  | <i>Euparea</i> .                        | 249  |
| <i>Ekebergia</i> vid. <i>Trichilia</i> . |      | <i>Euphoria</i> .                       | 413  |
| <i>Elæagnus</i> .                        | 148  | <i>Euridicea</i> .                      | 48   |
| <i>Elæodendrum</i> .                     | 241  | <i>Eustephia</i> .                      | 352  |
| <i>Elatine</i> .                         | 446  | <i>Evea</i> .                           | 122  |
| <i>Elaphrium</i> vid. <i>Fagara</i> .    |      | <i>Evodia</i> vid. <i>Fagara</i>        |      |
| <i>Eleusine</i> .                        | 87   | <i>Evolvulus</i> .                      | 288  |
| <i>Ellisia</i> .                         | 168  | <i>Evonymus</i> .                       | 243  |
| <i>Elymus</i> .                          | 107  | <i>Exacum</i> .                         | 136  |
| <i>Elytraria</i> .                       | 23   | <i>Exoacantha</i> .                     | 301  |
| <i>Embothrium</i> .                      | 117  | <i>Exostema</i> .                       | 196  |
| <i>Empleurum</i> .                       | 149  | F.                                      |      |
| <i>Endrachium</i> .                      | 176  | <i>Fabiana</i> .                        | 176  |
| <i>Epacris</i> .                         | 173  | <i>Fagara</i> .                         | 144  |
| <i>Eperua</i> .                          | 462  | <i>Fagonia</i> .                        | 463  |
| <i>Ephielis</i> .                        | 413  | <i>Fagraea</i> .                        | 212  |
| <i>Epigaea</i> .                         | 482  | <i>Falkia</i> .                         | 287  |
| <i>Epilobium</i> .                       | 410  | <i>Fedia</i> .                          | 38   |
| <i>Epimedium</i> .                       | 143  | <i>Fernelia</i> vid. <i>Coccocyps</i> . |      |
| <i>Eranthemum</i> .                      | 10   | <i>Feronia</i> .                        | 466  |
| <i>Erianthus</i> .                       | 103  | <i>Ferraria</i> .                       | 50   |
| <i>Erica</i> .                           | 420  | <i>Ferula</i> .                         | 311  |
| <i>Eriocaulon</i> .                      | 110  | <i>Festuca</i> .                        | 92   |
| <i>Eriogonum</i> .                       | 450  | <i>Fissilia</i> .                       | 41   |
| <i>Eriophorum</i> .                      | 70   | <i>Flagellaria</i> .                    | 396  |
| <i>Eriospermum</i> .                     | 363  | <i>Floerkea</i> .                       | 393  |
| <i>Eriostemon</i> .                      | 468  | <i>Floscopa</i> .                       | 374  |
| <i>Erithalis</i> .                       | 200  | <i>Fontanesia</i> .                     | 10   |

|                                | Pag.       |                               | Pag.       |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Forgesia. . . . .              | <u>194</u> | <i>Ginannia</i> vid. Palovea. |            |
| <i>Fovcolaria</i> v. Tremanth. |            | Gisekia. . . . .              | <u>337</u> |
| Fragrosa. . . . .              | <u>303</u> | Gladiolus. . . . .            | <u>44</u>  |
| Francoa. . . . .               | <u>445</u> | Glaux. . . . .                | <u>262</u> |
| Frankenia. . . . .             | <u>393</u> | Globba. . . . .               | <u>3</u>   |
| Frasera. . . . .               | <u>137</u> | Globularia. . . . .           | <u>118</u> |
| Fritillaria. . . . .           | <u>358</u> | Globifera. . . . .            | <u>14</u>  |
| Froelichia. . . . .            | <u>130</u> | Gloriosa. . . . .             | <u>360</u> |
| Fuchsia. . . . .               | <u>410</u> | Glossoma. . . . .             | <u>144</u> |
| Fuirena. . . . .               | <u>70</u>  | Glossopetalum. . . . .        | <u>332</u> |
| <i>Furcraea</i> . . . . .      | <u>380</u> | Gluta. . . . .                | <u>263</u> |
| Fusanus. . . . .               | <u>144</u> | Gnidia. . . . .               | <u>436</u> |
|                                |            | Godovia. . . . .              | <u>467</u> |
| G.                             |            | <i>Gomortega</i> vid. Adenos- |            |
| Gartnera. . . . .              | <u>467</u> | temum.                        |            |
| Gahnia. . . . .                | <u>393</u> | <i>Gomozia</i> vid. Nerteria. |            |
| Galanthus. . . . .             | <u>349</u> | Gomphia. . . . .              | <u>465</u> |
| Galax. . . . .                 | <u>250</u> | Gomphrena. . . . .            | <u>257</u> |
| Galaxia. . . . .               | <u>41</u>  | <i>Gonolobium</i> . . . . .   | <u>274</u> |
| Galenia. . . . .               | <u>438</u> | Gonzalea. . . . .             | <u>132</u> |
| Galium. . . . .                | <u>126</u> | Goodenia. . . . .             | <u>195</u> |
| Galipea. . . . .               | <u>8</u>   | Gouania. . . . .              | <u>248</u> |
| Galopina. . . . .              | <u>150</u> | <i>Goupia</i> vid. Glossope-  |            |
| <i>Galphimia</i> . . . . .     | <u>506</u> | talum.                        |            |
| Galvesia. . . . .              | <u>393</u> | Gratiola. . . . .             | <u>14</u>  |
| Gardenia. . . . .              | <u>198</u> | Grielum. . . . .              | <u>513</u> |
| Garidella. . . . .             | <u>505</u> | Gronovia. . . . .             | <u>257</u> |
| Gaura. . . . .                 | <u>409</u> | <i>Grossularia</i> . . . . .  | <u>232</u> |
| Gelsemium. . . . .             | <u>267</u> | Grubbia. . . . .              | <u>434</u> |
| Genipa. . . . .                | <u>198</u> | Guajacum. . . . .             | <u>462</u> |
| Gentiana. . . . .              | <u>284</u> | Gaultheria. . . . .           | <u>482</u> |
| <i>Geutianææ</i> . . . . .     | <u>280</u> | Gnarea. . . . .               | <u>416</u> |
| Gethyllis. . . . .             | <u>362</u> | Guiera. . . . .               | <u>470</u> |
| Getonia. . . . .               | <u>477</u> | Guetarda. . . . .             | <u>200</u> |
| <i>Githago</i> . . . . .       | <u>519</u> | Guevina. . . . .              | <u>118</u> |
| Gilibertia. . . . .            | <u>424</u> | Guilandina. . . . .           | <u>461</u> |
| <i>Gillia</i> . . . . .        | <u>187</u> | Gumillea. . . . .             | <u>290</u> |

|                                          | Pag. |                                     | Pag. |
|------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| <i>Gunnera</i> . . . . .                 | 30   | <i>Herreria</i> . . . . .           | 374  |
| <i>Guzmania</i> . . . . .                | 344  | <i>Heucheria</i> . . . . .          | 290  |
| <i>Gymnocarpon</i> . . . . .             | 262  | <i>Heteranthera</i> . . . . .       | 56   |
| <i>Gynopogon</i> . . . . .               | 266  | <i>Higginsia</i> . . . . .          | 133  |
| <i>Gypsophila</i> . . . . .              | 492  | <i>Hillia</i> . . . . .             | 391  |
| <i>Gyrocarpus</i> . . . . .              | 145  | <i>Hippocratea</i> . . . . .        | 40   |
|                                          |      | <i>Hippotis</i> . . . . .           | 210  |
| H.                                       |      | <i>Hippuris</i> . . . . .           | 5    |
| <i>Hæmanthus</i> . . . . .               | 348  | <i>Hiræa</i> . . . . .              | 507  |
| <i>Hæmatoxylon</i> . . . . .             | 462  | <i>Hirtella</i> . . . . .           | 250  |
| <i>Hagea</i> . . . . .                   | 262  | <i>Hoffmannia</i> . . . . .         | 131  |
| <i>Hagenia</i> . . . . .                 | 416  | <i>Hoffmanseggia</i> . . . . .      | 460  |
| <i>Hakea</i> . . . . .                   | 117  | <i>Hoitzia</i> . . . . .            | 187  |
| <i>Hamellia</i> . . . . .                | 203  | <i>Holcus</i> . . . . .             | 78   |
| <i>Hænkea</i> . . . . .                  | 241  | <i>Holosteum</i> . . . . .          | 111  |
| <i>Haloragis</i> . . . . .               | 446  | <i>Honckenia</i> . . . . .          | 416  |
| <i>Hamamelis</i> . . . . .               | 150  | <i>Hordeum</i> . . . . .            | 108  |
| <i>Hartogia</i> . . . . .                | 145  | <i>Hornstedtia</i> . . . . .        | 2    |
| <i>Hasselquistia</i> . . . . .           | 313  | <i>Hortensia</i> . . . . .          | 505  |
| <i>Hebea</i> . . . . .                   | 44   | <i>Hostea</i> vid. <i>Matelia</i> . |      |
| <i>Hedera</i> . . . . .                  | 232  | <i>Hottonia</i> . . . . .           | 171  |
| <i>Hedwigia</i> . . . . .                | 414  | <i>Houstonia</i> . . . . .          | 125  |
| <i>Hedychium</i> . . . . .               | 2    | <i>Hovenia</i> . . . . .            | 244  |
| <i>Hedycrria</i> vid. <i>Licania</i> .   |      | <i>Huanica</i> . . . . .            | 317  |
| <i>Hedyotis</i> . . . . .                | 122  | <i>Huerteæ</i> . . . . .            | 248  |
| <i>Heisteria</i> . . . . .               | 466  | <i>Humboldtia</i> . . . . .         | 248  |
| <i>Helianthera</i> vid. <i>Helicia</i> . |      | <i>Hyacinthus</i> . . . . .         | 374  |
| <i>Helicia</i> . . . . .                 | 214  | <i>Hydrangea</i> . . . . .          | 480  |
| <i>Heliconia</i> . . . . .               | 263  | <i>Hydrogeton</i> . . . . .         | 400  |
| <i>Heliotropium</i> . . . . .            | 155  | <i>Hydrocotyle</i> . . . . .        | 301  |
| <i>Hellenia</i> . . . . .                | 1    | <i>Hydrolea</i> . . . . .           | 289  |
| <i>Helonias</i> . . . . .                | 398  | <i>Hydrophyllum</i> . . . . .       | 168  |
| <i>Henierocallis</i> . . . . .           | 382  | <i>Hydrophylax</i> . . . . .        | 125  |
| <i>Heracleum</i> . . . . .               | 314  | <i>Hymenæa</i> . . . . .            | 455  |
| <i>Heritiera</i> vid. <i>Dilatria</i> .  |      | <i>Hyoscyamus</i> . . . . .         | 217  |
| <i>Hérmas</i> . . . . .                  | 305  | <i>Hypocoum</i> . . . . .           | 150  |
| <i>Herniaria</i> . . . . .               | 292  | <i>Hypolytrum</i> . . . . .         | 70   |

|                                           | Pag. |                               | Pag. |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------|------|
| <i>Hyperanthera</i> vid. <i>Moringa</i> . |      | <i>Justicia</i> . . . . .     | 19   |
| <i>Hypoxis</i> . . . . .                  | 362  | <i>Ixia</i> . . . . .         | 46   |
|                                           |      | <i>Ixora</i> . . . . .        | 130  |
| I. J.                                     |      | K.                            |      |
| <i>Jaborosa</i> . . . . .                 | 218  | <i>Kæmpheria</i> . . . . .    | 4    |
| <i>Jacquinia</i> . . . . .                | 234  | <i>Kalmia</i> . . . . .       | 477  |
| <i>Jambolifera</i> . . . . .              | 416  | <i>Kochia</i> . . . . .       | 297  |
| <i>Jarava</i> . . . . .                   | 6    | <i>Kœlreuteria</i> . . . . .  | 413  |
| <i>Jasminum</i> . . . . .                 | 7    | <i>Kœleria</i> . . . . .      | 97   |
| <i>Jeffersonia</i> . . . . .              | 418  | <i>Kœnigia</i> . . . . .      | 111  |
| <i>Icica</i> . . . . .                    | 414  | <i>Knautia</i> . . . . .      | 121  |
| <i>Ignatia</i> . . . . .                  | 264  | <i>Knoxia</i> . . . . .       | 125  |
| <i>Ilex</i> . . . . .                     | 151  | <i>Kookia</i> . . . . .       | 466  |
| <i>Illecebrum</i> . . . . .               | 160  | <i>Krameria</i> . . . . .     | 141  |
| <i>Imbricaria</i> . . . . .               | 234  | <i>Kuhnia</i> . . . . .       | 257  |
| <i>Impatiens</i> . . . . .                | 256  | <i>Kyllinga</i> . . . . .     | 57   |
| <i>Imperatoria</i> . . . . .              | 321  |                               |      |
| <i>Imperata</i> . . . . .                 | 103  | L.                            |      |
| <i>Ionesia</i> . . . . .                  | 406  | <i>Labatia</i> . . . . .      | 134  |
| <i>Ionia</i> . . . . .                    | 256  | <i>Lachenalia</i> . . . . .   | 375  |
| <i>Ionidium</i> . . . . .                 | 256  | <i>Lachnæa</i> . . . . .      | 538  |
| <i>Jovellana</i> . . . . .                | 15   | <i>Lacistema</i> . . . . .    | 5    |
| <i>Joncquetia</i> vid. <i>Tapiria</i> .   |      | <i>Lagetta</i> . . . . .      | 434  |
| <i>Inocarpus</i> . . . . .                | 584  | <i>Lagœcia</i> . . . . .      | 253  |
| <i>Ipomæa</i> . . . . .                   | 182  | <i>Lagurus</i> . . . . .      | 98   |
| <i>Iria</i> . . . . .                     | 65   | <i>Lamarkea</i> . . . . .     | 218  |
| <i>Irideæ</i> . . . . .                   | 41   | <i>Lambertia</i> . . . . .    | 116  |
| <i>Iridrogalvia</i> v. <i>Tosiella</i> .  |      | <i>Lanaria</i> . . . . .      | 377  |
| <i>Iris</i> . . . . .                     | 50   | <i>Lapageria</i> . . . . .    | 373  |
| <i>Ischæmum</i> . . . . .                 | 105  | <i>Lappago</i> . . . . .      | 85   |
| <i>Isertia</i> . . . . .                  | 392  | <i>Lappula</i> . . . . .      | 157  |
| <i>Isnardia</i> . . . . .                 | 146  | <i>Larochea</i> . . . . .     | 337  |
| <i>Itea</i> . . . . .                     | 175  | <i>Larrea</i> . . . . .       | 464  |
| <i>Juncus</i> . . . . .                   | 383  | <i>Laserpitium</i> . . . . .  | 312  |
| <i>Jussieua</i> . . . . .                 | 469  | <i>Lasiopetalum</i> . . . . . | 250  |





|                                 | Pag.       |                                | Pag.       |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Massonia. . . . .               | <u>348</u> | Milla. . . . .                 | <u>355</u> |
| <i>Mataiba</i> vid. Ephielis.   |            | Mimusops. . . . .              | <u>416</u> |
| Matelea. . . . .                | <u>267</u> | <i>Mindium</i> vid. Michauxia. |            |
| Mathiola. . . . .               |            | Minuartia. . . . .             | <u>112</u> |
| Matrella. . . . .               | <u>73</u>  | Mirabilis. . . . .             | <u>112</u> |
| Mattuschkæa. . . . .            | <u>130</u> | Mirabilis. . . . .             | <u>176</u> |
| <i>Mayaca</i> vid. Syena.       |            | Mitchella. . . . .             | <u>232</u> |
| <i>Maytenus</i> vid. Celastrus. |            | Mitella. . . . .               | <u>491</u> |
| Medeola. . . . .                | <u>398</u> | Mnasiaum. . . . .              | <u>6</u>   |
| Melanea. . . . .                | <u>131</u> | Mœringia. . . . .              | <u>438</u> |
| Melanthium. . . . .             | <u>397</u> | Mœnchia. . . . .               | <u>153</u> |
| Melastoma. . . . .              | <u>471</u> | <i>Mogorium</i> v. Jasminum.   |            |
| <i>Melastomææ</i> . . . . .     | <u>471</u> | Mollugo. . . . .               | <u>112</u> |
| Melia. . . . .                  | <u>469</u> | Monarda. . . . .               | <u>24</u>  |
| <i>Meliaceæ</i> . . . . .       | <u>467</u> | Monotropa. . . . .             | <u>469</u> |
| Melica. . . . .                 | <u>76</u>  | <i>Montabea</i> vid. Crypto-   |            |
| Melicocca. . . . .              | <u>413</u> | stomum.                        |            |
| Melicope. . . . .               | <u>416</u> | Montia. . . . .                | <u>111</u> |
| Melodinus. . . . .              | <u>265</u> | Moræa. . . . .                 | <u>49</u>  |
| Memecylon. . . . .              | <u>411</u> | Morina. . . . .                | <u>30</u>  |
| Menais. . . . .                 | <u>167</u> | Morinda. . . . .               | <u>201</u> |
| Menyanthes. . . . .             | <u>171</u> | <i>Mouriria</i> vid. Petaloma. |            |
| Menziezia. . . . .              | <u>419</u> | Muhlenbergia. . . . .          | <u>73</u>  |
| Merendera. . . . .              | <u>398</u> | Mulinum. . . . .               | <u>309</u> |
| Meriania. . . . .               | <u>477</u> | Muraya. . . . .                | <u>466</u> |
| <i>Mertensia</i> . . . . .      | <u>161</u> | Musa . . . . .                 | <u>343</u> |
| Messerschmidia. . . . .         | <u>164</u> | <i>Muscari</i> . . . . .       | <u>345</u> |
| Meum. . . . .                   | <u>319</u> | Mussænda. . . . .              | <u>199</u> |
| Michauxia. . . . .              | <u>418</u> | Myginda. . . . .               | <u>151</u> |
| Miconia. . . . .                | <u>476</u> | Myonima. . . . .               | <u>131</u> |
| <i>Micranthemum</i> vid. Glo-   |            | Myosotis. . . . .              | <u>156</u> |
| bifera.                         |            | Myoschilos. . . . .            | <u>235</u> |
| <i>Micranthus</i> . . . . .     | <u>465</u> | Myosurus. . . . .              | <u>341</u> |
| Micropetalon. . . . .           | <u>509</u> | Myrmecia. . . . .              | <u>134</u> |
| Microtea. . . . .               | <u>298</u> | Myrosma. . . . .               | <u>3</u>   |
| Micgea. . . . .                 | <u>101</u> | Myrospermum. . . . .           | <u>472</u> |
| Milium. . . . .                 | <u>73</u>  | Myroxylon. . . . .             | <u>432</u> |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Myrrhis. . . . . | Pag.<br>319 |
| Myrsine. . . . . | 233         |

## N.

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <i>Nacibea</i> vid. <i>Manettia</i> .    |     |
| Neea. . . . .                            | 418 |
| Nama. . . . .                            | 289 |
| Nandina. . . . .                         | 388 |
| Narcissus. . . . .                       | 349 |
| Narthecium. . . . .                      | 370 |
| Nardus. . . . .                          | 72  |
| <i>Nastus</i> vid. <i>Bambos</i> .       |     |
| Nauclea. . . . .                         | 201 |
| Navarretia. . . . .                      | 187 |
| Nectris. . . . .                         | 394 |
| Nerium. . . . .                          | 239 |
| Nerteria. . . . .                        | 150 |
| Neurada. . . . .                         | 522 |
| Nierenbergia. . . . .                    | 176 |
| Nicandra. . . . .                        | 219 |
| Nicotiana. . . . .                       | 217 |
| <i>Nigrina</i> vid. <i>Chloranthus</i> . |     |
| Niota. . . . .                           | 416 |
| Nitraria. . . . .                        |     |
| Nolana. . . . .                          | 168 |
| Nolinea. . . . .                         | 309 |
| Nonatelia. . . . .                       | 204 |
| Nuxia. . . . .                           | 132 |
| Nyctanthes. . . . .                      | 7   |

## O.

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <i>Ochrosia</i> vid. <i>Ophyoxylon</i> . |     |
| Oenanthe. . . . .                        | 318 |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <i>Oenoplia</i> . . . . .                | Pag.<br>240 |
| Oenothera. . . . .                       | 407         |
| Ola. . . . .                             | 39          |
| Oldenlandia. . . . .                     | 146         |
| Olea. . . . .                            | 8           |
| Oliveria. . . . .                        | 319         |
| <i>Onagræ</i> . . . . .                  | 407         |
| Oncus. . . . .                           | 374         |
| Onosma. . . . .                          | 161         |
| Onosmodium. . . . .                      | 162         |
| Opelia. . . . .                          | 241         |
| Opercularia. . . . .                     | 122         |
| Ophira. . . . .                          | 434         |
| Ophiorhiza. . . . .                      | 281         |
| Ophioxylon. . . . .                      | 268         |
| <i>Oribasia</i> vid. <i>Nonatelia</i> .  |             |
| <i>Orixa</i> vid. <i>Othera</i> .        |             |
| Ornithogalum. . . . .                    | 363         |
| Ornithrophe. . . . .                     | 412         |
| Ornus. . . . .                           | 9           |
| Orontium. . . . .                        | 382         |
| Ortegaia. . . . .                        | 40          |
| Oryza. . . . .                           | 314         |
| Oryzopsis. . . . .                       | 73          |
| Osbeckia. . . . .                        | 406         |
| Othera. . . . .                          | 145         |
| Ottelia. . . . .                         | 400         |
| Outea. . . . .                           | 39          |
| Oxalis. . . . .                          | 514         |
| <i>Oxybaphus</i> vid. <i>Calymenia</i> . |             |
| Oxycoccus. . . . .                       | 415         |

## P.

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>Pæderia</i> . . . . .  | 210 |
| <i>Pædorata</i> . . . . . | 13  |

|                                          | Pag. |                                      | Pag. |
|------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Pagamea. . . . .                         | 150  | Petiveria. . . . .                   | 401  |
| <i>Paliurus</i> . . . . .                | 241  | Petiveria. . . . .                   | 402  |
| Palovea. . . . .                         | 450  | Petrocarya. . . . .                  | 403  |
| Panax. . . . .                           | 298  | Petunia. . . . .                     | 218  |
| Pancratium. . . . .                      | 351  | Peucedanum. . . . .                  | 310  |
| Panicum. . . . .                         | 80   | <i>Petromarula</i> . . . . .         | 194  |
| <i>Panke</i> vid. <i>Gunnera</i> .       |      | <i>Peyrousia</i> . . . . .           | 46   |
| <i>Panzeria</i> vid. <i>Eperua</i> .     |      | Phacelia. . . . .                    | 168  |
| Paris. . . . .                           | 446  | Phalangium. . . . .                  | 367  |
| Parkinsonia. . . . .                     | 459  | Phalaris. . . . .                    | 79   |
| Parnassia. . . . .                       | 331  | Pharnaceum. . . . .                  | 330  |
| Paspalum. . . . .                        | 85   | Phellandrium. . . . .                | 318  |
| Passerina. . . . .                       | 436  | Philesia. . . . .                    | 374  |
| <i>Palicuria</i> . . . . .               | 208  | Phillyrea. . . . .                   | 8    |
| <i>Paronychia</i> vid. <i>Illecebr</i> . |      | Phlegoriza. . . . .                  | 450  |
| Pappophorum. . . . .                     | 98   | Phleum. . . . .                      | 79   |
| Paspalum. . . . .                        | 85   | Phlox. . . . .                       | 186  |
| Pastinaca. . . . .                       | 322  | Phrynium. . . . .                    | 4    |
| Pancovia. . . . .                        | 403  | Phormium. . . . .                    | 375  |
| Patagonula. . . . .                      | 166  | Phylica. . . . .                     | 245  |
| <i>Pauletia</i> vid. <i>Bauhinia</i> .   |      | Phylidrum. . . . .                   | 4    |
| Paullinia. . . . .                       | 442  | Phyllis. . . . .                     | 298  |
| Pavetta. . . . .                         | 131  | Phyllactis. . . . .                  | 39   |
| <i>Pavia</i> . . . . .                   | 403  | Physalis. . . . .                    | 219  |
| <i>Paypayrola</i> . v. <i>Wibelia</i> .  |      | Phyteuma. . . . .                    | 193  |
| <i>Payrola</i> vid. <i>Wibelia</i> .     |      | Phytolacca. . . . .                  | 522  |
| Penea. . . . .                           | 134  | <i>Picrium</i> vid. <i>Vohiria</i> . |      |
| Pennisetum. . . . .                      | 72   | Pilocarpus. . . . .                  | 243  |
| Penthorum. . . . .                       |      | Pimelca. . . . .                     | 10   |
| Peplis. . . . .                          | 393  | Pimpinella. . . . .                  | 323  |
| <i>Perama</i> vid. <i>Mathuskea</i> .    |      | Pinguicula. . . . .                  | 17   |
| Pergularia. . . . .                      | 271  | Pinknea. . . . .                     | 197  |
| <i>Peperomia</i> . . . . .               | 34   | Piper. . . . .                       | 31   |
| Perotis. . . . .                         | 103  | Pisonia. . . . .                     | 402  |
| Persoonia. . . . .                       | 118  | Pitcarnia. . . . .                   | 344  |
| Petalonia. . . . .                       | 470  | Pittospermum. . . . .                | 248  |
| Petitia. . . . .                         | 131  | Placoma. . . . .                     | 210  |



|                                       | Pag. |                                      | Pag. |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Randia. . . . .                       | 199  | Roussea. . . . .                     | 130  |
| Ramonda. . . . .                      | 216  | Royena. . . . .                      | 486  |
| <i>Rapatea</i> vid. <i>Mnasium</i> .  |      | Roxburgia. . . . .                   | 412  |
| Rauwolfia. . . . .                    | 265  | Rubia. . . . .                       | 130  |
| <i>Ravenala</i> vid. <i>Urania</i> .  |      | <i>Rubiaceæ</i> . . . . .            | 195  |
| Reichelia. . . . .                    | 329  | Rumex. . . . .                       | 394  |
| Remirea. . . . .                      | 57   | Rumphia. . . . .                     | 39   |
| Repealnia. . . . .                    | 2    | Rupala. . . . .                      | 117  |
| Retzia. . . . .                       | 176  | Ruppia. . . . .                      | 152  |
| Rheum. . . . .                        | 451  | <i>Russelia</i> vid. <i>Vahlia</i> . |      |
| <i>Rhamnei</i> . . . . .              | 238  | Ruta. . . . .                        | 464  |
| <i>Rhamnus</i> . . . . .              | 238  | <i>Rutaceæ</i> . . . . .             | 462  |
| <i>Rhexia</i> . . . . .               | 406  | Ruyschia. . . . .                    | 249  |
| <i>Rhodoraceæ</i> . . . . .           | 477  |                                      | S.   |
| Rhodora. . . . .                      | 477  | Sabal. . . . .                       | 309  |
| Rhododendrum. . . . .                 | 478  | Sabicea. . . . .                     | 203  |
| Rhus. . . . .                         | 324  | Saccharum. . . . .                   | 102  |
| Ribes. . . . .                        | 251  | Sagina. . . . .                      | 153  |
| Richardia. . . . .                    | 392  | Salicornia. . . . .                  | 5    |
| Rinorea. . . . .                      |      | Salmasia. . . . .                    | 349  |
| Ripogonum. . . . .                    | 374  | Salsola. . . . .                     | 295  |
| Riqueria. . . . .                     | 152  | Salvadora. . . . .                   | 129  |
| Rivina. . . . .                       | 149  | Salvia. . . . .                      | 24   |
| Robergia. . . . .                     | 518  | Samara. . . . .                      | 144  |
| Rochefortia. . . . .                  | 290  | Sambucus. . . . .                    | 328  |
| Roella. . . . .                       | 193  | Samolus. . . . .                     | 172  |
| <i>Rohria</i> vid. <i>Tapura</i> .    |      | Samyda. . . . .                      | 484  |
| <i>Romulea</i> . . . . .              | 46   | Sanchezia. . . . .                   | 24   |
| <i>Ronabea</i> vid. <i>Psychotr</i> . |      | Sandoricum. . . . .                  | 469  |
| Rondeletia. . . . .                   | 203  | Sanguisorba. . . . .                 | 141  |
| Roridula. . . . .                     | 253  | Sanicola. . . . .                    | 303  |
| Rosmarinus. . . . .                   | 24   | Sansevieria. . . . .                 | 372  |
| <i>Rouhamon</i> vid. <i>Lasio-</i>    |      | Santalum. . . . .                    | 148  |
| stoma.                                |      | Sapindus. . . . .                    | 444  |
| <i>Rourea</i> vid. <i>Robergia</i> .  |      | <i>Sapindi</i> . . . . .             | 412  |
| Rotala. . . . .                       | 40   | Saponaria. . . . .                   | 492  |
| Rottbœllia. . . . .                   | 106  |                                      |      |

|                                           | Pag.       |                                         | Pag.       |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| <i>Saracha</i> . . . . .                  | <u>219</u> | <i>Senacia</i> . . . . .                | 241        |
| <i>Sarothra</i> : . . . . .               | <u>331</u> | <i>Septas</i> . . . . .                 | 403        |
| <i>Sarmienta</i> . . . . .                | 13         | <i>Serissa</i> . . . . .                | 444        |
| <i>Sauvagesia</i> . . . . .               | <u>253</u> | <i>Seseli</i> . . . . .                 | 321        |
| <i>Saururus</i> . . . . .                 | <u>403</u> | <i>Sesleria</i> . . . . .               | 72         |
| <i>Saxifraga</i> . . . . .                | <u>487</u> | <i>Sherardia</i> . . . . .              | 124        |
| <i>Saxifrageæ</i> . . . . .               | <u>491</u> | <i>Sessea</i> . . . . .                 | 231        |
| <i>Scabiosa</i> . . . . .                 | <u>119</u> | <i>Sibbaldia</i> . . . . .              | 540        |
| <i>Scabrita</i> vid. <i>Nyctanth</i> .    |            | <i>Sickingia</i> . . . . .              | 234        |
| <i>Scævola</i> . . . . .                  | <u>195</u> | <i>Sideroxylon</i> : . . . .            | 236        |
| <i>Scandix</i> . . . . .                  | <u>319</u> | <i>Siderodendrum</i> . . . .            | 131        |
| <i>Scolosantus</i> . . . . .              | <u>130</u> | <i>Silene</i> . . . . .                 | 496        |
| <i>Scheffera</i> . . . . .                | <u>341</u> | <i>Simaba</i> . . . . .                 | 465        |
| <i>Scheuchzeria</i> . . . . .             | <u>396</u> | <i>Sipanea</i> : . . . . .              | 205        |
| <i>Schmidelia</i> vid. <i>Orni-</i>       |            | <i>Siphonanthus</i> . . . .             | 130        |
| <i>trophe</i> .                           |            | <i>Sirium</i> vid. <i>Santalum</i> .    |            |
| <i>Scheffieldia</i> vid. <i>Samolus</i> . |            | <i>Sison</i> : . . . . .                | 317        |
| <i>Schrebera</i> . . . . .                | 7          | <i>Sisyrinchium</i> . . . . .           | 49         |
| <i>Scollera</i> vid. <i>Oxycoccus</i> .   | <u>462</u> | <i>Sium</i> . . . . .                   | 316        |
| <i>Scotia</i> . . . . .                   | <u>462</u> | <i>Skimmia</i> . . . . .                | 145        |
| <i>Schradera</i> . . . . .                | <u>201</u> | <i>Smyrniun</i> . . . . .               | <u>322</u> |
| <i>Schœnus</i> . . . . .                  | <u>58</u>  | <i>Solanaceæ</i> . . . . .              | 214        |
| <i>Schwenkfeld</i> . v. <i>Sabicea</i> .  |            | <i>Solandra</i> . . . . .               | <u>218</u> |
| <i>Scilla</i> . . . . .                   | <u>365</u> | <i>Solanum</i> . . . . .                | <u>220</u> |
| <i>Scirpoidei</i> . . . . .               | <u>56</u>  | <i>Saldanella</i> . . . . .             | <u>170</u> |
| <i>Scirpus</i> . . . . .                  | <u>65</u>  | <i>Sophora</i> . . . . .                | <u>452</u> |
| <i>Sciuris</i> . . . . .                  | <u>30</u>  | <i>Sorghum</i> . . . . .                | 101        |
| <i>Scleranthus</i> . . . . .              | <u>491</u> | <i>Souroubea</i> vid. <i>Ruyschia</i> . |            |
| <i>Scopolia</i> vid. <i>Toddalia</i> .    |            | <i>Sowerbea</i> . . . . .               | <u>355</u> |
| <i>Scoparia</i> . . . . .                 | <u>141</u> | <i>Spananthe</i> . . . . .              | <u>303</u> |
| <i>Scotia</i> . . . . .                   | <u>462</u> | <i>Spartina</i> vid. <i>Limnetis</i> .  |            |
| <i>Secale</i> . . . . .                   | <u>108</u> | <i>Spathelia</i> . . . . .              | <u>328</u> |
| <i>Sedum</i> . . . . .                    | <u>511</u> | <i>Spermacoce</i> . . . . .             | <u>123</u> |
| <i>Segetella</i> . . . . .                | <u>330</u> | <i>Spergula</i> . . . . .               | <u>522</u> |
| <i>Selinum</i> . . . . .                  | <u>308</u> | <i>Spergularia</i> . . . . .            | <u>504</u> |
| <i>Sellieria</i> vid. <i>Goodenia</i> .   |            | <i>Sphenoclea</i> . . . . .             | <u>173</u> |
| <i>Semecarpus</i> . . . . .               | <u>324</u> | <i>Spielmannia</i> . . . . .            | <u>141</u> |



|                                          | Pag.       |                                         | Pag.       |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| Toddalia . . . . .                       | <u>249</u> | Tulipa. . . . .                         | <u>360</u> |
| Tofieldia. . . . .                       | <u>399</u> | Turnera. . . . .                        | <u>329</u> |
| Toluifera. . . . .                       | <u>462</u> | Turræa. . . . .                         | <u>468</u> |
| Tonsella. . . . .                        | <u>41</u>  |                                         |            |
| Tontanea. . . . .                        | <u>134</u> | U.                                      |            |
| Tordylium. . . . .                       | <u>314</u> | Ucriana. . . . .                        | <u>205</u> |
| <i>Touchiroa</i> vid. <i>Crudia</i> .    |            | Ulloa. . . . .                          | <u>218</u> |
| Tournefortia. . . . .                    | <u>165</u> | Ulmus. . . . .                          | <u>290</u> |
| Tovaria. . . . .                         | <u>402</u> | Uniola. . . . .                         | <u>92</u>  |
| <i>Tozettia</i> vid. <i>Alopecurus</i> . |            | Urania. . . . .                         | <u>343</u> |
| Trachelium. . . . .                      | <u>194</u> | <i>Umbellatae</i> . . . . .             | <u>298</u> |
| Trachys. . . . .                         | <u>85</u>  | Urceola. . . . .                        | <u>269</u> |
| <i>Trachinotia</i> vid. <i>Lim-</i>      |            | <i>Urceolaria</i> v. <i>Sarmienta</i> . |            |
| netis.                                   |            | Utricularia. . . . .                    | <u>18</u>  |
| Tradescantia. . . . .                    | <u>346</u> | Uvularia. . . . .                       | <u>360</u> |
| Trapa. . . . .                           | <u>147</u> |                                         |            |
| Tremanthus. . . . .                      | <u>467</u> | V.                                      |            |
| Trianthema. . . . .                      | <u>486</u> | Vaccinium. . . . .                      | <u>478</u> |
| Tribulus. . . . .                        | <u>464</u> | Vaginata. . . . .                       | <u>70</u>  |
| Trichilia. . . . .                       | <u>468</u> | Vahlia. . . . .                         | <u>290</u> |
| Trichophorum. . . . .                    | <u>69</u>  | Valantia. . . . .                       | <u>129</u> |
| Trichodium. . . . .                      | <u>73</u>  | Valentinia. . . . .                     | <u>415</u> |
| Trichoon. . . . .                        | <u>102</u> | Valeriana. . . . .                      | <u>37</u>  |
| Tricycla. . . . .                        | <u>210</u> | Vallesia. . . . .                       | <u>265</u> |
| Trientalis. . . . .                      | <u>402</u> | Vangnira. . . . .                       | <u>205</u> |
| Triglochin. . . . .                      | <u>396</u> | Varronia. . . . .                       | <u>167</u> |
| Trigonia. . . . .                        | <u>467</u> | Velezia . . . . .                       | <u>290</u> |
| Triguera . . . . .                       | <u>218</u> | Veltheimia. . . . .                     | <u>377</u> |
| Trillium. . . . .                        | <u>398</u> | <i>Ventenatia</i> v. <i>Stephelia</i> . |            |
| Triopteris. . . . .                      | <u>508</u> | Ventilago. . . . .                      | <u>250</u> |
| Triosteum. . . . .                       | <u>214</u> | Veratrum. . . . .                       | <u>397</u> |
| Tripterella. . . . .                     | <u>39</u>  | Verbascum. . . . .                      | <u>214</u> |
| Trisetum. . . . .                        | <u>97</u>  | Vcronica. . . . .                       | <u>10</u>  |
| Tristemma. . . . .                       | <u>476</u> | Viburnum. . . . .                       | <u>326</u> |
| Triticum. . . . .                        | <u>109</u> | Vinca. . . . .                          | <u>267</u> |
| Tropæolum. . . . .                       | <u>405</u> | <i>Vincetoxicum</i> . . . . .           | <u>274</u> |
| Tulbachia. . . . .                       | <u>349</u> | Viola. . . . .                          | <u>253</u> |



|                                        | Pag. |                      | Pag. |
|----------------------------------------|------|----------------------|------|
| <i>Vereia</i> vid. <i>Callinchoë</i> . |      | <i>Wulfenia</i> .    | 14   |
| <i>Virecta</i> .                       | 232  | <i>Wurmbea</i> .     | 396  |
| <i>Virgilia</i> .                      | 403  |                      | X.   |
| <i>Visnaga</i> .                       | 307  | <i>Xanthorea</i> .   | 370  |
| <i>Visnaga</i> vid. <i>Amni</i> .      |      | <i>Xerophyllum</i> . | 399  |
| <i>Vitis</i> .                         | 252  | <i>Xerophyta</i> .   | 346  |
| <i>Vitmannia</i> .                     | 412  | <i>Ximenia</i> .     | 415  |
| <i>Vogelia</i> .                       | 210  | <i>Xiphium</i> .     | 54   |
| <i>Vohiria</i> .                       | 283  | <i>Xuaresia</i> .    | 176  |
| <i>Votomita</i> vid. <i>Glossoma</i> . |      | <i>Xylocarpus</i> .  | 416  |
|                                        | W.   | <i>Xylosteon</i> .   | 213  |
| <i>Wachendorphia</i> .                 | 54   | <i>Xyris</i> .       | 56   |
| <i>Walkera</i> .                       | 250  |                      | Y.   |
| <i>Wallenia</i> .                      | 133  | <i>Yucca</i> .       | 378  |
| <i>Watsonia</i> .                      | 70   |                      | Z.   |
| <i>Webera</i> vid. <i>Canthium</i> .   |      | <i>Zanonia</i> .     | 347  |
| <i>Weigelia</i> .                      | 176  | <i>Zanthoriza</i> .  | 341  |
| <i>Wendlandia</i> .                    | 400  | <i>Zigadenus</i> .   | 398  |
| <i>Weinmannia</i> .                    | 438  | <i>Zoydia</i> .      | 73   |
| <i>Wibelia</i> .                       | 210  | <i>Zizyphus</i> .    | 240  |
| <i>Willichia</i> .                     | 40   | <i>Zuccagnia</i> .   | 461  |
| <i>Witheringia</i> .                   | 133  | <i>Zygophyllum</i> . | 463  |
| <i>Witsena</i> .                       | 42   |                      |      |

*Finis Partis primæ.*

COLLECTION  
D'OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES  
SUR DIFFÉRENTES SCIENCES,

E T

D'AUTRES ÉCRITS RELATIFS A L'INSTRUCTION.

---

SYNOPSIS PLANTARUM,  
HUCUSQUE COGNITARUM;  
SECOND OUVRAGE, PREMIÈRE PARTIE.

---

Éditeur,

CH. FR. CRAMER.

CETTE Collection est destinée aux Professeurs et Élèves des Écoles secondaires et des Lycées, aux Maîtres en général, ainsi qu'à tous ceux qui, privés des ressources de l'instruction publique, veulent y suppléer par des Manuels clairs et méthodiques, qui leur offrent les notions les plus nécessaires de Bibliographie et les élémens des principales sciences.

UNE grande partie de ces Manuels manque en France à l'instruction. A la vérité, il existe des Abrégés sur différentes matières qui en feront l'objet; mais ces Abrégés ne sont ni exacts, ni complets, ni méthodiques, et ils sont moins combinés pour l'avantage de ceux qui apprennent, que de ceux qui savent: au lieu que l'utilité de plusieurs de ceux qui composeront cette Collection est reconnue par l'expérience et leur usage habituel dans la plupart des écoles des nations éclairées qui avoisinent la France.

71 24562.13







